

内科秘録

二

傷寒  
天行中風

信  
777  
2





信 9 賦  
777  
2

內科秘錄卷之二

目錄

傷寒

天行中風

內科秘錄

卷之二  
目錄

翰墨齋藏



Table with 11 vertical columns and 10 horizontal rows, containing a list of medical terms and their corresponding page numbers.



內科秘錄卷之二

水戶 棗軒本間救和卿著

傷寒

熱病

溫病

風溫

濕溫

溫毒

溫疫

疫



疫癘

時行

天行

時氣

醫書於諸病若其證有小異則別命名一病遂至有數十稱極覺煩冗恐初學者易眩惑故今每各病門略採異名著世者以附其下云

傷寒ハ素問ニ出ツ後漢ノ張仲景初テ其治法ヲ辨シ傷寒論ヲ著セリ其序文及ヒ本論ニ由テ考フルニ傷寒ハ即チ疫ナリ明ノ戴元禮吳又可等傷寒ト温

疫トハ判然トシテ二病ナルトヲ謂タレ氏決シテ二病ニ非ス先哲已ニ其非ヲ辨駁シタレハ今復此ニ贅セス

傷寒ノ流行スル時ハ人人傳染シテ遂ニ浴門合戸皆病ミ其毒酷厲ニシテ所謂癘氣ナル者アリテ之ニ感シタルヤウニモ思ハルレ氏是モ目ニテ見ルヘキ者ニ非ス手ニテ觸ヘキ者ニ非サレハ必有ノ物氏為シカタシ古ヨリ賢哲ノ傷寒ト唱ヘ来リタル一ナレハ寒邪ニ傷ラレタリトスルヲ善ト為ヘシ寒氣ハ地上ノ常ニシテ四時絶ユル一ナシ春温夏



暑秋涼等ハ大陽行道ノ遠近ニ因テ生スルナリ若  
シ大陽無キハ地上四時共ニ嚴寒ニシテ三冬ノ  
如クナルヘシ假令春温夏暑秋涼ノ變アリト雖  
寒氣ハ四時常ニ存スルモノユ工人ヲ傷ル<sub>レ</sub>多シ  
ト見ヘタリ此病富貴ノ人ニ少ナク貧賤ノ人ニ多  
シ又戰國或ハ凶歳ニ流行スルハ衣食不給ニシテ  
養生ヲ失シ寒邪ニ襲ハル<sub>レ</sub>ナリ寒ハ正氣ナレ<sub>レ</sub>  
人身ニ入ル<sub>レ</sub>ハ變シテ邪氣トナリ邪氣トナル寸  
ハ能ク人ニ傳染ス傳染スルハ此病ノ病性ナレ<sub>レ</sub>  
或ハ一人患フルノミニシテ外ヘ傳染セヌ<sub>レ</sub>有リ

是痘瘡ハ傳染病ナレ<sub>レ</sub>一人ノミニテ外ヘ傳染セ  
ヌ<sub>レ</sub>有ルト同シ假令傳染セヌ<sub>レ</sub>行漿灌膿等ノ的  
證ヲ具ル<sub>レ</sub>ハ人皆痘瘡ト為シテ疑ハス傷寒モ是  
ト同シニテ傷寒ノ諸證ヲ備フル<sub>レ</sub>ハ若シ傳染セ  
サルモ傷寒ナル<sub>レ</sub>ヲ知ルヘシ傳染ト不傳染トニ  
拘泥シテ傷寒温疫ヲ二病ニ分ツヘカラス傳染病  
ナレ<sub>レ</sub>ハ先ツ之ヲ豫防スルノ法ヲ工夫スヘシ古ヨ  
リ雄黄ノ末ヲ鼻ニ塗リ或ハ辟温散ヲ服スルノ法  
アレ<sub>レ</sub>氏格別ノ効ヲ奏スル<sub>レ</sub>ヲ聞カス世人孟子ニ  
有寒疾不可以風ト云フ意ニ本ツキ用心スキテ深



ク密室ノ中ニ卧スユヘ邪氣鬱滯シ人若シ病室ニ  
入ルキハ乍チ其氣ヲ嗅入シテ傳染スル者多シ予  
ハ第一ニ此害ヲ教諭シテ戸障子ヲ盡ク開キ枕邊  
ノ冗物ヲ去リ一掃除シテ席上ヲ清淨ニシ僅ニ小  
屏風ヲ立テ、保護セシム冬時ナレハ障子ノ上ヲ  
ニ間ツ、紙ヲ剪リ去リ新陳ノ氣ノ更代シテ邪氣  
ノ鬱滯セヌヤウニ為サシムルニ人皆傳染ヲ免ル  
ル一ヲ得タリ

傷寒ハ萬病ノ長ニシテ千態萬狀變化無極ノ者ナレ  
氏之ヲ約スルニ陰陽表裏ノ四者ニ過キス陰陽ハ

病位ニシテ經ノ如ク表裏ハ病證ニシテ緯ノ如シ  
陰陽各表裏アリ之ヲ能ク辨知スルキハ傷寒ヲ治  
スルニ於テ大ナル過無カルヘシ若シ此四者ヲ知  
ラスシテ徒ニ見證ノミニ眼ヲ著ルキハ諸證ニ眩  
惑シテ療治スル一能ハス陽位トハ太陽少陽陽明  
ノ三位ニテ太陽ヲ表ト為シ陽明ヲ裏ト為シ少陽  
ハ即チ太陽陽明ノ間證ニテ之ヲ半表半裏ト云フ  
陰位トハ太陰少陰厥陰ノ三位ナレ氏微シク陽位  
ノ次第ト異ナリ太陰ハ陽位ヨリ陰位ヘ轉入シタ  
ル初證ナリ故ニ太陰篇ニ本太陽病醫及下之因爾



腹滿時痛者屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。ト云ヘリ  
 尚表トナスヘシ少陰ハ邪氣直ニ陰位ニ入タルノ  
 初證ニテ表ト為スヘシ故ニ少陰病ニハ麻黃細辛  
 附子湯麻黃甘草附子湯等ノ發表ノ方ヲ用ヒタリ  
 厥陰ハ太陰少陰ヨリ傳變シタル所ノ裏證ナリ故  
 ニ專ラ温經回陽ノ劑ノミニテ絶テ發表ノ方ヲ用  
 ヒス三陰病モ表裏ノ差別有レ氏傳變迅速ニシテ  
 三陽病ノ如ク表裏ノ次第ヲ分明ニ知ルヲ能ハス  
 三陽病三陰病ハ先哲ノ說ニ邪ニ陰陽アルニ非ス其  
 人素ヨリ實強ナル者ハ三陽病ヲ成シ其人素ヨリ

虛弱ナル者ハ三陰病ヲ成スト見ヘタレ氏令歴驗  
 スルニ或ハ肥健ニシテ三陰病ヲ患フルモノアリ  
 或ハ羸弱ニシテ三陽病ヲ患フル者アリ或ハ三陰  
 病ノ多ク流行スルヲアリ或ハ三陽病ノ多ク流行  
 スルヲアリ然レバ必シモ其人ノ強弱ニ因ルト謂  
 フヘカラス愚按スルニ邪氣ノ人ニ中ルト歲運ニ  
 因テ多ク陰位ニ著クヲアリ或ハ多ク陽位ニ著ク  
 一アリ陰位ニ著クハ三陰病トナリ陽位ニ著クハ  
 ハ三陽病トナルノミ譬ハ脚氣瘡疾本是同病ナレ  
 氏歲運ニ因テ其著ク所ヲ異ニシ或ハ脚氣ノミ行



ハレ或ハ瘡疾ノミ行ハル、一アルカ如シ傷寒ノ  
 病タル唯是正邪分争ノミ若シ陽位ニ著ク寸ハ正  
 氣分争カラ起シテ三陽病ノ諸證ヲ發シ陰位ニ著  
 ク寸ハ正氣分争カラ起サスシテ三陰ノ諸證ニ陷  
 ルナリ譬ハ瘡瘍ニ焮腫漫腫ノ二證アルカ如シ  
 太陽病ハ邪氣初テ人身ニ著キ皮膚粟起シ畜畜トシ  
 テ微ニ惡寒シ項背強リ四體懈怠スレト未タ何病  
 ナル一ヲ覺ヘス兩三日ハ強テ產業ヲモ勤メ風呂  
 ヘモ入り髮月代ヲモスルニ病勢稍加ヘ床蓐ニ就  
 ニ及テ翕翕トシテ發熱シ脈浮數ニナリ頭痛ツヨ

ク腰モ疼ミ關節モ疼痛シ口粘リ舌胎白クシテ飲  
 食ヲ思ハス但梨子蜜柑西瓜葡萄ノ類ヲ嗜ミ或ハ  
 汗出テ或ハ無汗モアリ或ハ欬嗽或ハ喘急或ハ衄  
 血出テ大便秘結シ小便赤濁ニナリ氣色惡クシテ  
 微煩スルモノナリ仲景ハ汗ノ有無ニテ桂枝湯麻  
 黄湯ヲ分チ又脈證ノ小異同ニテ桂枝ニ越婢一湯  
 桂麻各半湯等ノ差別アリ常ニ能ク其規則ヲ知テ  
 又深ク此ニ拘泥スヘカラス予ハ汗ノ有無ヲ論セ  
 ス先ツ葛根湯ヲ與フ一日ニ四五貼ツ、モ服サシ  
 メテ汗ヲ取ヲ善トス若シ喘急ノ甚シキ者ハ麻黄



湯ヲ用ヒ煩躁ノ甚シキ者ハ大青龍湯ヲ與フヘシ  
 仲景ハ發汗過多ヲ深ク戒メタレ氏發汗ニテ亡陽  
 スルモノ鮮シ存分ニ發汗スル片ハ邪氣一等減シ  
 テ治シ易シ發汗ヲ怠ル片ハ邪氣愈増劇シテ治シ  
 難シ太陽病ニテ自下利スルハ多クハ發汗ヲ怠リ  
 テ邪氣ノ内陷シタルナリ

傷寒ノ初發ハ輕重ノ分リ無ルモノナレ氏或ハ腰痛  
 強クシテ折ラル、カ如キモノ或ハ乾嘔シテ藥ノ  
 納ラヌモノ或ハ身體沉重シテ轉側ノナラヌモノ  
 或ハ穀氣ヲ惡ム者或ハ氣急スルモノ或ハ自下利

止マサルモノハ後必ス險證ニナルモノナリ  
 太陽病ニシテ自下利ノアルハ誤テ下スト同シ一ニ  
 テ惡證ナリ舌上ニ胎ヲ生セス寒熱一旦ハ減シ夕  
 ルヤウニ見ユレ氏實ハ邪氣ノ内陷シタル者ナレ  
 ハ飲食ヲ思ハス壞證ニナリテ療治ノ仕ニクキ者  
 ナリ先ツ葛根湯ニテ強ク發汗スヘシ是ニテ下利  
 止サル片ハ桂枝人參湯ヲ與フヘシ其内ニ少陽病  
 ニ變シ尚下利スル片ハ柴苓湯ニ宜シ兎角荏苒ト  
 シテ熱ノ解シカ子ルモノナリ或ハ陰證ニ傳變ス  
 ル一有リ



傷寒ノ熱ハ漸漸ニ強クナリテ一齊ニ發熱セサル者  
 ナレ氏或ハ卒ニ惡寒發熱シテ内外共ニ熱シ脈浮  
 緊數ニナリ面目赤ク頭痛腰痛強ク體痛モ甚シク  
 シテ歷節風ノ如ク口舌乾燥シ渴シテ水數升ヲ飲  
 ミ煩躁シテ安眠スルヲ得サル者ハ大青龍湯奇  
 驗アリ

太陽病ノ諸證悉ク備ハリ欬嗽殊ニ甚シク胸脇掣痛  
 スルヲ肺癰ノ如ク或ハ右或ハ左へ偏卧スルヲ  
 好ミ喘急スル者ハ小青龍湯加石膏ニ宜シ  
 表證ノ未タ盡サル者ヲ誤テ下ス片ハ其害小ナルモ

或ハ胸滿或ハ心下滿微痛或ハ下利續不止或ハ協  
 熱利其害大ナル氏ハ熱實結胸或ハ寒實結胸或ハ  
 太陰ニ轉入ス仲景深ク戒シメテ下スヘキノ諸證  
 備リテモ微シク表證ノ殘リテアルモノハ下スヘ  
 カラスト桃核承氣湯大承氣湯ノ條ニ斷リアリ表  
 裏ノ界紙上ニテハ誰ニモ分チ易キヤウニ見ユレ  
 氏實地ニ臨テハ知リ難キモノナリ故ニ世醫ノ誤  
 下ニテ輕證モ壞證ニナリテ日ヲ引キ或ハ治スヘ  
 キ者モ死地ニ墜ルヲ有リ深ク戒ムヘキナリ表  
 證ノ目的トスルハ第一ニ惡寒ト脈ノ浮數トナリ



此ニツラ熟察シテ表證ノ有無ヲ決診スヘシ  
 傷寒ニ傳變ノ迅速ナルモノ有リ名ツケテ急疫ト云  
 フ朝ハ太陽證ニシテ午後ハ少陽證ニ轉シ翌日ハ  
 陽明證ニ變シ一兩日ノ間ニ三陽病ノ諸證悉ク備  
 リテ多クハ死スル者ナリ傷寒論ノ三陽合病ト謂  
 フハ即チ是ナリ治法モ臨機應變ニシテ深ク定法  
 ニ拘ルヘカラス吳又可モ急證ハ急ニ攻ルト云ヘ  
 リ

太陽病ニテ衄血ノ出ルハ邪氣ノ血脈ニ鬱滯シ血液  
 沸騰シテ脈外へ溢ル、ナリ常ノ感冒ニモアル

ニテ適度ニ出ル寸ハ刺絡ト同シニテ却テ幸ニナ  
 リ其熱出血ニ從テ減スルコトアリ衄血ハ發汗ノ足  
 ラヌ所ヨリ發スルモノナレハ麻黃湯若シクハ大  
 青龍湯ニテ發汗スヘシ若シ衄血過多ニシテ七八  
 合或ハ一升餘ニ至ル寸ハ卒ニ亡血シテ脈沈微ニ  
 ナリ四肢微冷シ或ハ冷汗或ハ嘔吐或ハ眩暈等ノ  
 症竝起テ遂ニ死ハルモノアリ是ハ發汗ノ法ノミ  
 ニテハ救ヒ難シ先ツ三黃湯ノ泡沫ニテ犀角粉ヲ  
 用ヒ續テ犀角地黄湯ヲ與フヘシ若シ舌上黃胎ニ  
 ナリ微シク胃實ノ候アラハ桃核承氣湯ニ宜シ若

内科秘録 卷二 九 指掌醫藏



シ衄血ノ後少陽ニ轉入スルモノハ小柴胡加地黄湯若クハ紫物湯ヲ用フヘシ

乳癰痔漏等ヲ截斷シ瘡口未愈者或ハ婦人産後外邪ニ感シ寒熱ヲ發スルヲアリ偏ニ截斷産後ノ所為トノミ心得外感ナルヲ知ラスシテ療治ヲ誤ルヲアリ又平素多病ノ者ハ外邪ニ感シテモ宿疾ノヤウニ見ヘテ療治ヲ誤ルヲ亦少カラス能ク注意シテ誤認スヘカラス傷寒ノ輕症ニ傷寒ト定メ難キ者アリ微熱アレ氏床蓐ニ就カス飲食モ味ハ變レ氏略平生ノ食量ニ近ク其熱時ヲ期シテ潮熱ノ

如ク自汗或ハ盜汗或ハ咳嗽出テ四肢倦怠シ起居疎懶ニナリ神思悒鬱トシテ樂マス人ニ應接スルヲ欲セス病荏苒トシテ永ク愈ヘス其状虚勞ノ如ク婦人ハ血證ニ疑似シク又素小瘡ヲ患ルモノハ卒ニ乾燥シテ内攻ト誤認スルヲアリ宿疾ニ寒疝積聚等ノアルモノハ宿疾ノヤウニ見ヘ何病トモ決シ難キモノナレ氏唯脈浮ニシテ數自ラ他病ノ脈ニ非サルヲ覺フ是ハ邪氣少陽ノ部位ニ固結シ表ヘモ達セス裏ヘモ入ラス故ニ顯然タル證候ヲ見ハサルナリ柴胡桂薑湯若シクハ緩痰



湯若シクハ柴胡鼈甲湯ニ宜シ

太陽病ニテ發斑スル一アリ腋下及ヒ肩背ニ多ク發  
ス痘瘡ニテ發斑スルト同シニテ邪氣深ク血液沸  
騰シテ脈外へ溢レタルナリ發斑ニ拘ハラズ麻黃  
湯若シクハ大青龍湯ヲ與ヘテ專ラニ發表スヘシ  
傷寒論ニ脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之トア  
リテ唯發表ヲ專ニシテ衄血ノ藥ヲ用ヒサルハ即  
チ仲景ノ規矩ナリ又夾疹スル一アリ邪氣ノ深淺  
ニ拘ハラズ矢張血液ノ沸騰ヨリ發スルナリ譬ハ  
澄タル水モ活火ヲ以テ煮ルキハ種種ノ塵埃鍋面

ニ浮ヘルカ如シ是モ夾疹ニ拘ハラズ其證ニ從テ  
發表ノ劑ヲ專用スヘシ

少陽病ハ太陽病ヲ患フル一三四日或ハ六七日ニ及  
テ脈證漸變シ專ニ表證ト為シ難ク亦裏ニ入タル  
ニモ非ス邪氣半表半裏ノ間ニ稽留シタルナリ寒  
熱往來トテ惡寒スル一半時許ニシテ發熱シ自汗  
出テ熱微シク減スルニ及テ又惡寒スル一前刻ノ  
如ク發熱モ前刻ノ如ク晝夜ニハ幾度モ如此其狀  
太陽ノ惡寒發熱ト同シカラス口苦ク舌上ノ白胎  
漸厚クナリ飲食愈減少シ胸脇苦滿或ハ脇下痞鞭



惡心嘔吐アリ數粘唾ヲ吐キ面色赤ク兩耳聾テ精  
 神微シク恍惚トシタルヤウニ見ヘ身體沉重或ハ  
 煩疼氣色惡シクシテ須臾モ頭ヲ舉ル<sub>レ</sub>能ハス或  
 ハ欬シ或ハ渴シ或ハ腹中痛<sub>ミ</sub>或ハ眩暈等ノ諸證  
 竝起ルモノ小柴胡湯ヲ專用スヘシ

邪氣少陽ノ位ニ在ルキハ表ヘモ漸遠クナリ裏ヘモ  
 未タ入ラスシテ如何程藥ヲ用ヒテモ表ヨリモ散  
 シ難ク又裏ヨリモ解シ難シ自若トシテ日ヲ延ク  
 モノナリ初學ノ者ハ此理ヲ會得セス色色ニ氣ヲ  
 揉テ欬カ出レハ小青龍湯ヲ兼用シ渴カ有レハ白

虎加人參湯ニ轉方シ或ハ下劑ヲ試ミ用ヒテ壞證  
 ニスルモノナリ傷寒論小柴胡湯ノ本條ニ許多ノ  
 諸證ヲ舉ケ小柴胡湯ノ一方ニテ主トルト云ヒ又  
 誤治ノ後ニ有柴胡證者與柴胡湯ト云タルハ即持  
 重堅守ノ法ニテ少陽病ト見込タラハ兼證ハ何ホ  
 ト蜂起スルトモ顧<sub>ミ</sub>ス幾日ニテモ小柴胡湯ノ一  
 方ヲ專用シ邪氣ノ轉變ヲ待テ轉方スヘシ

戰慄シテ汗ノ出ルヲ戰汗ト云ヒ發汗ノ劑ヲ服サス  
 自ラ汗ノ出ツルヲ自汗ト云ヒ狂躁シテ汗ノ出ツ  
 ルヲ狂汗ト云フ皆伏邪自潰シテ離散スルニテ其



理瘧疾ノ汗出テ、熱ノ解スルカ如ク極テ愉快ヲ覺ユ

戰汗ハ少陽證或ハ陽明初證ノ時或ハ下後或ハ衄血ノ後卒ニ寒戰ヲ發シ振振トシテ鼓頷股慄シ面色慘淡ニナリ四肢逆冷シテ脈沉伏シ須臾ニ蒸蒸トシテ發熱シ煩渴引飲シテ大汗流漓スル一水ノ如ク被服寢衾モ一絞リニナリテ後熱解シ身涼フシテ病霍然トシテ愈ユ然レ氏數日ノ後再發スルモノ多シ世人之ヲ勞復或ハ女勞復等ノ致ス所ト為セ氏蓋シ邪氣ノ殘リタルニテ再感ニハ非ス瘧ノ

一種ニ熱ノ間歇アリテ十日或ハ二十日ヲ隔テ、發熱スル證ニ同シ柴胡去半夏加瓜蒌湯ニ宜シ自汗狂汗ノ治法モ亦同シ戰汗ニテ四肢厥冷シ時ヲ移セ氏發熱セス遂ニ死スル一有リ常ノ戰汗ト為シテ等閑ニスヘカラス

邪氣十分ノ者ナレハ七分ハ太陽ニ在テ頭項強痛脈浮數四肢煩疼等ノ證尚未夕解セス三分ハ少陽ニ入テ胸脇苦滿心煩喜嘔耳聾等ノ證從テ起レ氏其熱緩慢ニシテ解シ難ク又増加モセス荏苒トシテ日ヲ引ク者ハ即太陽少陽ノ併病ナリ柴胡桂枝湯



ニ宜シ又其邪氣三分ハ少陽ニ在リテ胸脇苦滿心  
煩喜嘔等ノ證尚未タ盡ス七分ハ既ニ陽明ニ入テ  
心下急腹微滿大便秘結舌ハ黃胎ニナリ舌本ハ焦  
黒色ニ變シテ乾燥シ渴シテ冷水ヲ飲ミ或ハ梨子  
蜜柑ノ類ヲ嗜ミ脈ハ微シク沉ニナリ但熱スルノ  
ミニテ惡寒ノ無キ者ハ即チ少陽陽明ノ併病ナリ  
大柴胡湯ニ宜シ又以上ノ諸證ヲ具ヘ嘔吐シテ食  
ヲ欲セス自下利スレバ便色赤クシテ腹滿スル者  
ハ又大柴胡湯ニ宜シ凡下劑ヲ投スルニハ腹滿ヲ  
目的トスヘシ下利スル者モ腹滿ノ有ル者ハ之ヲ

下スヘシ假令可下諸證備ハリテモ腹滿ノ無キ病  
人ハ下劑ノ効ノ無キ者ナリ世醫大柴胡湯ヘ芒硝  
ヲ加ヘテ用ユルモノアリ大黃ノカヲ助ルノ手段  
ナレバ仲景ノ意ニ背ケリ大柴胡湯ハ芒硝ノ入ラ  
ヌ所ニ意味ノ有リナリ若シ大黃芒硝ヲ併用スヘ  
キ場合ナラハ大承氣湯調胃承氣湯ヲ撰用スヘシ  
柴胡加芒硝湯ハ即チ小柴胡湯加芒硝ニシテ大柴  
胡湯ヘ芒硝ヲ加ヘタルニ非ス其論拙著傷寒論類  
釋ニ詳ニス

柴胡桂枝湯小柴胡湯等ヲ服スルノ十餘日ニシテ往  
自辨亭藏



来寒熱尚未夕止マス或ハ寒慄シテ瘧疾ノ如ク右脇下微結シテ癥瘕ヲ生スルカ如ク腹微滿或ハ拘急シ舌上自胎發熱スルハ自汗多ク出テ或ハ頭汗ノミ出ルモアリ或ハ盜汗ノ出ルモアリ渴シテ水ヲ飲テ欲スル者ハ柴胡桂薑湯ニ宜シ

太陽病ノ時自下利或ハ之ヲ誤下シ漸少陽ニ入り往來寒熱喘急欬嗽心下鞭滿或ハ胸脇掣痛シ右脇下微結シ項背強リ小結胸病トナル者ハ柴胡枳桔湯ニ宜シ

自利或ハ誤下ノ後下利續テ止マサル者ハ胃實セス

シテ舌ヘモ胎ヲ生セス熱モ荏苒トシテ解セス兎角永引ク者ナリ柴苓湯ニ宜シ此湯ヲ服スルウチニ下利モ止ミ熱モ減スル者ハ陽明ニ入ラスシテ自ラ愈ルナリ凡下利ノ有ル者ハ胃實セヌ者ナリ多クハ壞證ニナリテ三陰病ニ變スルテアリ病胃實ニ非スシテ精神微シク恍惚トナリ安眠スルテ得ス胸脇苦滿欬嗽出テ痰ヲ吐テ多ク飲食少ク脈浮弱ニシテ自汗出テ其熱長ク解セサル者ハ竹筴温膽湯ニ宜シ

少陽ノ終或ハ陽明ノ始メ或ハ陽明諸證已ニ備ハリ



下ヲ失シテ發黄スル一アリ發黄ハ瘟黄ノ發黄シ  
テ自ラ愈ルト同シクシテ頗ル佳兆ト為ス少陽病  
ニシテ發スルハ茵陳五苓散若シクハ小柴胡湯加  
茵陳若シ陽明ニ轉シテ發黄スルハ大柴胡湯加茵  
陳若シクハ茵陳蒿湯ヲ撰用スヘシ病人ハ面目垢  
ツキ髮ヲ被リ闇室ニ居ルユエ微ノ發黄ハ醫者モ  
氣ノ付カヌ一多シ其證熱ヨリ惡寒多ク或ハ身體  
痒ク右脇下痞鞭シ小便濃煎茶ノ如ク出ルト云フ  
ハ皆發黄ノ候ナレハ詰問シテ發黄ノ初發ヲ知ル  
ヘシ若シ發黄ナル一ヲ知ラスシテ傍觀ノ者ヨリ

氣ヲ付ラレ或ハ後ニ來ル醫工ヨリ發黄ナル一ヲ  
言ハルハ大ナル耻辱ナリ  
發黄ハ血畜血及發斑等ノ後ニ發シ或ハ諸血證ト  
併發スル一多シ諸血證ハ血液ノ沸騰ヨリ起ル所  
ニテ考ルニ肝ハ血ノ多キ臟ニテ一目シタル所ニ  
テハ凝血ノ如ク見ユル者ナリ肝臟ノ血液モ亦沸  
騰シテ遂ニ閉塞スルハ必然ナリ肝臟閉塞スレハ  
必ス發黄スルモノナリ  
少陽病ニテ表裏俱ニ熱シ口舌乾燥シテ胎ヲ生セス  
煩渴引飲スレハ可下證ナキ者ハ柴白湯若シクハ



柴胡加石膏湯等ヲ撰用スヘシ

身體壯熱シテ面目赤色ニナリ心煩喜嘔飲食ヲ思ハ

ス脈浮緊數ニシテ白虎承氣ノ證ナキ者ハ小柴胡

合黃連解毒湯ニ宜シ

陽明病ハ胃實ト云テ邪氣ノ胃中へ充實シタルナリ

然レ氏必シモ胃ノ一腑ヲ指スニ非ス廣ク燥屎ノ

有ル部位ヲ謂フノミ熱結膀胱ト云ヒ熱入血室ト

云フモ皆熱ノ結シタル部位ノ一ニテ必シモ一臟

ヲ指斥スルニ非ス淺學ノ者此意味ヲ知ラスシテ

胃ハ水穀ノ海ニテ燥屎ノ有ル所ニ非ス仲景ノ燥

屎在胃中ト為スハ大ナル謬ナリト云フハ却テ心

得違ナリ胃實ハ邪氣太陽少陽ヲ過經シテ陽明ニ

入タルニテ即チ裏證ナリ是マテ浮數ノ脈沉遲ニ

變シ皮膚ノ熱微シク減シ大便秘閉シテ腹滿シ之

ヲ按スル片ハ急痛シ身體重ク轉側モ不自由ニナ

リ自汗濺然トシテ出テ精神恍惚トナリテ沉醉ス

ルカ如ク譫語妄言ヲ發シ喘急シテ眼赤ク面垢ツ

キ鼻ハ煤ケタルヤウニナリ齒モ汚レ唇ハ乾テ幾

筋モ裂ケ或ハ皮ノ剥ルモ有リ舌ハ黑胎ニナリテ

乾燥シ或ハ血ノ出ル程ニ裂ルモアリ或ハ芒刺ヲ



生シ煩渴シテ冷水ヲ飲ミ或ハ菓瓜ヲ嗜ムモノハ  
可下ノ證ニテ輕キ者ハ小承氣湯重キ者ハ大承氣  
湯ニ宜シ胃實スルノ數日絶食ニテ實證ノ中ニモ  
自ラ虚候ヲ現シ脈沉遲ニシテ力ナク若シ一蕩滌  
スルハ下チ虚脱スヘキヤウニ見ユル者ヘハ調  
胃承氣湯ヲ與ヘテ少少ツ、下スヘシ凡ツ下劑ヲ  
投シ大便ノ色黒キ者ハ勿論赤クシテ舊キ味噌ノ  
如キ者或ハ色淡黒ク粘稠ニシテ藕泥ニ似タル者  
且臭氣甚シキ者ハ皆下劑ノ的證ニシテ續テ下劑  
ヲ用ユヘシ若シ大便黄色ニシテ平生ニ異ナラサ

ル者ハ未タ胃實セサルノ候ナレハ下劑ヲ止ムヘ  
シ

下劑ヲ投シ其肯綮ニ中ルキハ霍然トシテ熱ノ全ク  
解ス者ナリ下後舌上潤ヒ胎モ舌ノ縁ヨリ微シク  
除キ去リ謔語等モ減スルハ下劑ノ効ヲ奏シタル  
ナレハ續テ下劑ヲ與フヘシ下後若シ大便ノ色常  
ニ復スル寸ハ姑ク下劑ヲ見合セテ緩劑ヲ與フヘ  
シ乃チ紫胡清燥湯若シクハ紫胡去半夏加括萋湯  
ニ宜シ二三日ニシテ邪氣復聚リ便秘スルハ再  
ヒ下スヘシ下後寸効ヲ奏セス病勢愈増劇シ夢中



ニナリテ微モ人事ヲ省セス脈細數ニナリ言語蹇澁シ舌ハ乾燥スレハ廻ラヌ者ナレハ湯水ニテ潤スキハ言語ノ出来ル者ナリ若シ湯水ヲ飲テモ舌ノ廻ラヌハ惡候トス獨語スルハ喃喃トシテ止マズ或ハ酸鼻或ハ遺尿或ハ大息或ハ不寐或ハ狂躁等ノ諸證蜂起スル者ハ元氣已ニ損耗スルノ候ニシテ假令舌上黒苔煩渴引飲等ノ下スヘキノ證アリト雖モ妄ニ下スヘカラス調胃承氣湯ヲ與ヘテ少少下スルモ有レハ先ツ白虎湯紫白湯黃連解毒湯導赤各半湯紫雪ノ類ヲ撰用シテ清熱スヘシ若

シ大ニ下スキハ卒ニ疲勞シテ脈沉微ニナリ四肢モ逆冷シ必ス陰證ニ變シテ斃ル

陽明病黒胎煩渴譫語腹滿等ノ下證ヲ備ヘ大承氣湯ヲ投スルニ快利シテ諸證微シク退キ明日ニ至レハ熱又増加シテ故ノ如クニナリ再三之ヲ下シテ正氣已ニ虚耗シ其熱熾盛ナリト雖モ下劑ヲ投シ難ク又薑附ノ劑ヲ與フルハ能ハサルモノハ金箱飲若シクハ升陽散火湯ヲ與フヘシ

邪氣既ニ陽明ニ入り僅ニ舌上乾燥シ心下微滿スルノミニテ黒胎譫語煩渴等ノ確證ヲ見ハサレハ



下證ノ備ルヲ待テ下劑ヲ投スヘシト見合スルニ  
 卒ニ脈沉微ニナリ四肢微冷スル一アリ是ハ熱厥  
 ナリ誤テ陰證ト為スヘカラス此證格別ノ熱ハ無  
 キヤウニ見ユレ氏翌日ニ至レハ腹滿前日ヨリモ  
 加ヘ眼赤ク小便ノ色モ亦赤濁ニシテ臭氣アリ是  
 ハ實證ナレ氏下ヲ失シタルユエ内鬱シテ陰證ノ  
 如クニナリタルナリ急ニ大承氣湯ヲ與ヘテ下ス  
 ヘシ下後必ラス脈モ復シ四肢モ温リ邪氣モ從テ  
 解スル者ナリ  
 胃實シテ汗ノ出ル者及下シテ後ニ汗ノ出ル者總身

ニ小疹ヲ發スル一有リ倉卒ニ見ルキハ汗ノ如シ  
 熟視スルニ細水泡ニシテ透明ナリ之ヲ汗疹ト云  
 フ惡候ニモ非ス又吉兆氏セス  
 府下馬口勞街橋屋金兵衛疫ヲ患ル一十餘日ニシテ  
 小便閉舌上黒胎乾燥煩渴引飲欬嗽氣急少腹滿如  
 敦狀脈浮緊數默默不欲飲食先ツ「カテイテル」ヲ挿  
 入シテ小便ヲ去リ猪苓湯ヲ與フルニ黒胎除キ去  
 テ口舌滋潤シ諸證悉ク退ク明日ニ至テ又小便閉  
 テ黒胎等ノ諸證並起テ前日ノ如シ又「カテイテル」  
 ヲ挿入スルニ諸證盡ク去レリ第三日ニ至テ又前



日ノ如シ又前法ニテ愈ヘ第四日ヨリ小便自ラ快  
 利ス尚猪苓湯ヲ與フルニ諸證從テ退キ不日ニシ  
 テ全愈ス是モ陽明病ノ一證ニシテ熱ヲ膀胱へ入  
 タルナリ「カテイテル」ニテ小便ヲ去リ猪苓湯ヲ服  
 シ小便ヲ利シテ愈タルハ胃實ヲ下シテ愈ルト同  
 法ナリ

邪陽明ニ入タレレ下證未備シテ下劑ヲ見合セルウ  
 チニ衄血自ラ出テ百方スレレ止マス卒然トシテ  
 戰慄シ脈モ沉伏シ四肢モ厥冷シテ危篤ニ見ユル  
 ウチニ又乍チ蒸蒸トシテ發熱シ汗大ニ出テ霍然

トシテ熱ノ解ス「ア」リ是亦戰汗ニ屬ス此等ハ畢  
 竟下ヲ失シタルユエ血液沸騰妄行シテ脈絡ノ自  
 潰シテ血ノ出タルナリ或ハ斑ヲ發シ或ハ畜血ノ  
 下ルモ皆同因ナリ畜血ハ黒クシテ墨ノ如ク見ユ  
 レレ之ヲ水ニ鎔解スレハ赤クナル者ナリ畜血ハ  
 多クハ下ヲ失シタル病人ナレハ舌上黒胎乾燥謔  
 語腹滿等ノウチニテ尚一二證アル者ハ桃核承氣  
 湯ニ宜シ最早下スヘキ證無キ者ハ犀角地黄湯ヲ  
 用ユヘシ

傷寒ノ諸血證モ痘瘡ニ九竅出血ノアルト同シニテ



畜血衄血發斑ノ外ニモ熱ノ甚シキ者ハ牙縫ノ紫  
黯色ニ變シテ出血シ或ハ吐血或ハ尿血或ハ瘡痕  
ノ自潰シテ出血スル一アリ皆惡證ト為ス

陽明病ニシテ喘急太息脈數不省人事遺尿直視循衣  
摸床撮空理線不食等ノ中一二證有リテモ必死ト  
スヘシ傷寒ニハ限ラス何病ニテモ不省人事ニシ  
テ微モ知覺ノ無キハ大病ト知ルヘシ此時活術ヲ  
施シテ應スルモノハ生路ヲ得ル一有リ微モ響カ  
ヌモノハ必死ト定ムヘシ

凡雜病ニテ惡候ヲ備ヘ必死ト見込タルモノハ假令

國手ノ療治ヲ受ルモ決シテ治スル一無シ唯傷寒  
ハ雜病ト異ニシテ必死ト見ヘテモ稀ニハ庸醫ノ  
回春ノ功ヲ取ル一アレハ粗卒ニ手ヲ束ヌヘカラ  
ス

人適精神微シク恍惚トナリ起居飲食ハ平生ニ異ナ  
ラスシテ病トモ覺ヘスニ三日ヲ過ルニ及ンテ或  
ハ喜忘或ハ獨語或ハ不圖妄言ヲ發シテ傍ヨリ笑  
ハレ癡若シクハ狂ノ催シノヤウナレ其レ定  
メカタク唯目中不<sub>レ</sub>了<sub>レ</sub>了<sub>レ</sub>シテ熱アルカ如ク脈ヲ診  
スルニ果シテ緊數ニナリ舌ハ黑胎ニテ乾燥シ便



秘腹滿シテ已ニ可下ノ諸證ヲ備フルモノアリ即  
 子是陽明病ナリ急ニ大承氣湯ヲ與フヘシ  
 潮熱ハ午後或ハ日晡所ニ時ヲ期シテ發スルモノナ  
 レハ寒熱如瘧或ハ往来寒熱等ノ證ニ疑似キモノ  
 ナレトモ惡寒ノナキヲ別トス其熱發スルトハ五心  
 煩熱シテ四肢倦怠シ脈浮數ニナリ自汗濺然トシ  
 テ出テ或ハ微渴或ハ微煩スルモノアリ明日ニ至  
 ルトハ熱漸減シ小快ヲ覺ユルニ前ノ刻限ニ及ン  
 テ又發熱スルト前日ノ如ク數日止マサルモノハ  
 多クハ胃實ニ屬ス舌上焦黃或ハ乾燥シテ便秘ス

ル者大柴胡湯若シクハ柴胡加芒硝湯ニ宜シ然レ  
 一ニ下劑ノ證トナスヘカラス舌上尚白胎ニ  
 シテ大便常ノ如キモノハ柴胡桂薑湯神驗アリ老  
 人ニハ潮熱ノ時ニ同シ調子ニテ數十日荏苒トシ  
 テ止マサルモノアリ是モ柴胡桂薑湯ニ宜シ若シ  
 効ナキトハ柴胡龍甲湯若シクハ補中益氣湯ヲ撰  
 用スヘシ

結胸ハ表證ヲ誤下シ或ハ自下利シテ表邪裏ヘ陷入  
 シ心下ヨリ右ノ脇下ヘ急結シテ癥癖ノ如クニナ  
 リ或ハ心腹一圓ニ鞭滿スルモアリ急痛シテ徵モ



觸レ近ツクヘカラス昏沉シテ居レ尺手微シク觸  
 ル、片ハ痛ニ堪スシテ癰癧シ黒胎譫語等ノ證ア  
 ル者ハ大陷胸湯ヲ以テ下スヘシ其證較緩ナル者  
 ハ大柴胡湯ニ宜シ又一段緩ニシテ黒胎譫語等ノ  
 證ナク大便ノ自調スルモノハ小陷胸湯若シクハ  
 柴胡枳桔湯若シクハ柴胡桂薑湯若シクハ四逆散  
 ノ類ヲ撰用スヘシ此證多クハ肝臟ニ係リテ肝臟  
 ノ焮腫ナリ外マテ赤色ニ變スルコトアリ蜚蠊十箇  
 ツ、モ傳ケテ日ニ血ヲ取ヘシ肝臟焮腫スレハ膽  
 モ閉塞シテ發黄スルコトアリ茵陳蒿湯若シクハ大

柴胡湯加茵陳ヲ與フヘシ  
 急疫ハ前ニモ述ル通りノ急證ニシテ一兩日ノ間ニ  
 三陽諸證ヲ見ハシ黒胎譫語日夜狂躁シ或ハ他ノ  
 家ニ居ル心得ニテ漫ニ歸ヲ促シテ奔走セント欲  
 シ人ヲ見ル片ハ或ハ罵詈シ或ハ噴唾シテ須臾モ  
 安眠セス此證多クハ鬼簿ヲ免レス餘リ迅速ユエ  
 醫者モ傷寒トハ心付カス或ハ邪祟ト為シ或ハ癩  
 證ト為シテ療治ヲ誤ルコト有リ其脈證ニ隨テ大承  
 氣湯若シクハ白虎湯若シクハ柴胡加龍骨牡蠣湯  
 ノ類ヲ撰用スヘシ若シ眼瞼眇淚ニテ膠封シ開カ



サル者ハ必ラス赤クシテ血ヲ注クカ如ク烏睛モ  
昏暗ニ變シテ遂ニ盲スル者ナリ是等ノ事モ早ク  
知リテ家人ニ告クヘシ

凡渴スル者ハ世醫一概ニ石膏ノ證ト為シテ何方ヘ  
モ石膏ヲ加ルヤウニナリテ柴胡桂枝湯ヘモ石膏  
ヲ加ル者アリ可笑ナリ石膏ノ功能ハ熱ヲ解シ  
テ渴ヲ治スルニ非ス神農本經石膏ノ條ニ渴ヲ治  
スルヲ言ハス傷寒金匱白虎湯ヲ始トシテ石膏  
ヲ組入タル諸方ニ渴ヲ舉ケス渴ヲ治スルノ方ハ  
唯白虎加人參湯ナリ石膏ト人參トヲ組合スレハ

熱ヲ清クシ津ヲ生スルユエ渴モ自ラ愈ルナリ石  
膏一味ニテ渴ヲ治スル者ト心得テハ了簡違ナリ  
陽明病ノ諸證備ハリテ口舌乾燥シ或ハ黑胎ニナ  
リ煩渴引飲スレハ脈浮數ニシテ表證ノ未解ヤウ  
ニ見ヘ心下急及腹滿等無クシテ下劑ヲ投シ難キ  
モノハ即是熱ノ表裏ヘ散漫シタルニテ白虎加人  
參湯ニ宜シ服後多クハ自汗出テ、愈ル者ナリ  
呃逆ハ多クハ下後ニ發スルモノニテ胃中虛冷ニ屬  
スレハ又實證ノモノアリ療治モ寒温ノ二法アリ  
實熱ノモノハ橘皮竹茹湯若シクハ柴胡湯加竹茹



橘皮若シクハ半夏瀉心湯ニ宜シ虚冷ノモノハ羌活附子散若シクハ丁香柿蒂散ヲ撰用スヘシ呃逆ハ客證ナレト日夜出テ止マサルキハ安眠モナラス殊ニ疲勞ヲ加ユルモノナレハ捨テ置キ難シ平人ノ呃逆ハ何程出テモ心配ニナラス大病ニテ出ルハ惡證ト知ルヘシ詳ナルトハ呃逆門ニ載セタレハ宜シク參閱スヘシ

發汗ノ劑及附子劑等服法ニ波瀾ノ入ルトナレト得失共ニ死生ニ關係スル程ノトハ無キ者ナリ下劑ハ一服ニテ人ヲ殺シ又一服ニテ起死回生ノ効ヲ

立ル者ナレハ汗吐下三法ノ中ニテ一大緊要ト為スヘシ仲景ノ下劑ヲ用ユルハ至極謹慎ニシテ三承氣湯ノ服法ニ少少與飲之ト言ヒ或ハ得下則止後服ト言ヒ或ハ勿令大泄下ト言ヒ又桃核承氣湯及大承氣湯ノ條ニ下證盡ク備ハリテモ僅ニ惡寒ノ有ルモノハ下スヘカラスト深ク戒メタリ吳又可ハ下劑ヲ專用シテ表證ノアル者モ舌上黃胎ニナル片ハ下劑ニ宜シトテ既ニ三消飲ヲ製セリ若シ仲景ノ言フ通りニスル片ハ失下ノ過ヲ免レス若シ吳又可ノ言ニ從フ片ハ必ラス誤下ノ過アル



へシ此二人ノ者ハ古今ノ名エニシテ如此云々  
ルハ深旨ノ有ルナリ仲景ノ時代ハ攻撃ノ療治  
ノ流行シタルモノト見へテ傷寒論中ニ大下之ト  
云々或ハ誤下之ト云フノ類擧テ數フヘカラス世  
醫傷寒ヲ見レハ表裏ヲ論セス妄ニ下シタルユエ  
仲景其弊ヲ改メント欲シテ下劑ヲ慎ミタルナル  
へシ吳又可ノ時代ハ明末ニテ強陽滋陰ノ療治ノ  
ミ行ハレ世醫疫ヲ療スルニモ大黃芒硝等ハ鴆毒  
ノヤウニ恐懼シテ用ヒス遂ニ下ヲ失シテ起ヘキ  
者モ死地ニ墮ルル多ケレハ吳又可其弊ヲ改メン

ト欲シテ早ク下劑ヲ用ユルヲ述タルナリ二人  
ノ下法ヲ翫味シテ下劑ヲ用ユル片ハ大ナル過チ  
ナカルヘシ

陽明證ニテ喜嘔スル者半夏瀉心湯若シクハ小柴胡  
湯ニテ止マサル片ハ大柴胡湯ニ宜シ一蕩滌ニテ  
嘔立トコロニ止ムモノナリ嘔多雖有陽明證不可  
下之ノ文ニ拘ハルヘカフス先ツ陽明病ハ不大便  
ヲ常トスレバ自ラ下利スルモノアリ太陽病及ヒ  
三陰病ノ下利ト同シカラス其便色ヲ見テ表裏陰  
陽ヲ明辨スヘシ大便水ノ如クナレバ必ス粘膠ニ



シテ色赤ク或ハ黒ク且ツ臭氣アリ吳又可ノ所謂  
熱結傍流ナリ傷寒論ニモ下利讞語者有燥屎也與  
小承氣湯ト見ヘテ大柴胡湯若シクハ大小承氣湯  
ヲ以テ下スヘシ

傷寒ハ正邪分争ノ病ユエ少壯ノ人ハ分争殊ニ甚ク  
シフシテ其病多ク死スル者多シ幼少ノ者ハ分争  
稍緩ニシテ其病輕ク死スル者少ナシ必死ニ見ヘ  
テモ蘓活スル者亦少ナカラス

凡ソ三陰病ノ證候ハ脈微或ハ沉或ハ細或ハ絶セシ  
ト欲シ下利或ハ清穀下利或ハ便膿血惡寒或ハ背

惡寒四肢煩疼或ハ厥冷心煩或ハ心中煩煩躁不寐  
腹痛腹滿乾嘔咽痛身蹇汗出不止等ノ諸證ニ過キ  
ス今此諸證ヲ以テ疾病ニ臨ミ三陰病ナルモノヲ  
尋ルニ明辨シカタシ况ヤ筆紙ヲ以テ三陰證ノ病  
情ヲ述ルト尤モ易カラス然レ氏前ニモ述ル通り  
邪氣陽位ニ入ルキハ正氣旺盛ニナリテ分争ノ力  
ヲ張り三陽證ヲ見ハスナリ邪氣陰位ニ入ルキハ  
正氣陷伏シテ分争ノ力ヲ張ルト能ハス三陰諸證  
ヲ見ハスナリ陰陽ノ差別ハ正邪分争スルト分争  
セサルトニ在ルノミ此意味ヲ能ク會得スルキハ



陰陽二證ヲ知ル<sub>一</sub>亦難カラス  
 太陰病ハ最初ヨリ邪氣ノ陰位へ著キタルニ非ス太  
 陽病ヲ誤テ下シ或ハ菓瓜等ヲ過食シ自下利シテ  
 陰證ニ變シタルナリ下利續テ止マサル<sub>レ</sub>ハ完穀  
 ニテ下リ腹虚脹シテ微ク痛ミアリ身熱ハ薄シト  
 雖<sub>レ</sub>脈細數ニナリ寒疝ノ如クニ見ユルモノナリ  
 桂枝加芍藥湯ニ宜シ若シ微惡寒シテ手足微冷ス  
 ルモノハ前方へ附子ヲ加フ此證素陽證ヨリ来ル  
 モノユエ又本位ニ復シテ胃實スルモノアリ胃實  
 スル<sub>レ</sub>ハ下劑ヲ與フヘシ

太陽病ヲ誤テ下シ或ハ自下利止マス舌胎剝テ薄ク  
 ナリ熱ノ減シタルヤウニ見ユレ<sub>レ</sub>實ニ減シタル  
 ニ非ス正氣衰弱シテ分争ノカヲ失<sub>レ</sub>タルナリ脈  
 ハ沉數ニナリ心下ノミ痞鞭シテ腹力無ク拘急シ  
 テ痛ミ或ハ嘔シテ涎沫ヲ吐キ或ハ渴スレ<sub>レ</sub>熱湯  
 ヲ嗜ミ或ハ自汗出ルモノ是レ太陰病ニ屬ス柴胡  
 四逆湯ニ宜シ  
 少陰病ハ邪氣直チニ陰位ニ著ノ初證ニシテ陽氣固  
 ヨリ微弱ナレハ正邪未タ分争セス二三日ノ間ハ  
 格別ノ脈證モ見レス唯微ニ惡寒シテ氣色寒ク飲



食ヲ思ハス日夜寐テ起坐スルヲ能ハス脈沈微ニシテ浮緊等ノ候ナク遽ニ視ル寸ハ何病ニ定メ難キモノナリ然レモ脈數ニシテ熱候アリ舌ニ白胎ヲ生シ身體沈重ニナリ神思ノ清爽ナラサル等ニテ少陰病ナルヲ決スヘシ治法ハ先ツ麻黄細辛附子湯麻黄附子甘草湯ニテ專ラ表發ス可シ少陰病ハ初發ユヘ陽氣微弱ナレモ尚未夕盡ク竭乏セス四五日ニシテ分爭カヲ起シ發熱シテ太陽證或ハ少陽證ニ變スルヲアリ或ハ附子劑ヲ多ク用ヒテ遂ニ陽明證ニ變シ腹滿譫語等ノ下證ヲ具ユ

ルヲアリ陽證ニ變スルモノハ三陽病ノ治法ヲ撰用スヘシ凡ソ陰證ハ傳變迅速ニシテ邪氣下チ裏ヘ陥入シ嘔吐或ハ乾嘔或ハ心煩腹痛或ハ咽痛或ハ渴シテ熱飲ヲ嗜ミ遂ニ四肢厥逆六脈沈微等ノ諸證竝起テ厥陰病ニ成ルモノナリ是ハ厥陰病ノ治法ヲ撰用スヘシ

厥陰病ハ太陰若シクハ少陰ノ邪一段深ク入り尚惡寒シテ脈細數ニナリ下利清穀止マズ皮膚粟起四肢逆冷シ手足ヲ縮メテ踈卧シ舌上胎既ニ剥テ紅軟無津ニナル者ハ難治ト為ス茯苓四逆湯若シク



ハ四逆加人參湯ニ宜シ  
 本陽明病ニシテ數下劑ヲ投シ大熱已ニ解スレモ元  
 氣損耗シテ精神恍惚トナリ脈ハ細數ニシテ尚餘  
 熱ヲ存シ舌ハ黑胎ヲ殘シテ乾燥シ又短縮シテ言  
 語スルコトヲ得ス唯鄭聲喃喃トシテ止マス日夜眼  
 ヲ閉テ居レモ眠ルニ非ス身體羸瘦シテ腹皮拘急  
 シ四肢微冷シ微喘少氣起キテ或ハ衣ヲ尋子床ヲ  
 摸リ空ヲ撮ミ線ヲ理メ手ヲ揚ケ足ヲ擲テ煩悶ス  
 ル者ハ病陰位ニ轉入シタルナリ亦難治ニ屬ス金  
 箱飲若シクハ升陽散火湯若シクハ柴胡四逆湯ノ

葦ヲ撰用スヘシ

凡ソ陰陽諸病熱已ニ解シテ後舌胎微シク残り飲食  
 モ常ニ復セズ肥立カヌル者ハ柴胡去半夏加栝萐  
 湯若シクハ柴胡清燥湯ヲ撰用ス病愈テ後氣力未  
 復精神恍惚トシテ或ハ健忘或ハ不寐ノ者ハ歸脾  
 湯若シクハ補中益氣湯ヲ撰用スヘシ病瘥テ後但  
 黙黙トシテ不言瘖啞ノ如クニ成ル者アリ名ツケ  
 テ啞瘖ト云フ是癰ナリ必ラス身體ニモ麻痺不遂  
 スル所ノ有ル者ナリ抑肝散加羚羊角ニ宜シ  
 老人傷寒ノ輕證ヲ患ヒ微熱荏苒トシテ數十日解セ



ス胸脇痞塞シテ飲食ヲ思ハス或ハ嘔吐或ハ欬嗽  
等アリテ愈カヌル者ハ六君子湯及香砂六君子湯  
ヲ撰用スヘシ若シ諸證愈テ後チ平生ニ復シカヌ  
ル者ハ老病トナリテ死スル者多シ

傷寒ハ他ノ病ヨリモ微<sup>ズ</sup>ノ一モ障<sup>ル</sup>リテ再感<sup>ス</sup>シ易キモ

ノナリ身體ヲ勞シテ再感スルヲ勞復ト云ヒ房室

ヲ犯シテ再感スルヲ女勞復ト云ヒ過食シテ再感

スルヲ食復ト云フ故ニ病後ハ飲食ヲ節ニシ起居

ヲ慎ミ房室ヲ遠ケ髮ヲ梳リ爪ヲ剪<sup>ル</sup>ミ月代<sup>ヲ</sup>剃<sup>ル</sup>

一ヲ禁シ風呂ニ浴スル一ハ勿論手足ヲモ濯<sup>フ</sup>一

ヲ禁シ養生ヲ專一ニスヘシ病後ハ食ノ進ム者ニ

テ蔬食菜羹ヲモ甘シ<sup>シ</sup>遂ニ食復スル一多シ飲食

ノ進ムハ病中ニ營衛ノ闕乏シタルユエ良能ニテ

自ラ飲食ヲ引テ補フナリ故ニ病瘥テ後モ飲食ノ

進ム間ハ營衛未盈ノ候ト為ス飲食較減シ平生ノ

食量ニ復スルヲ全快ト定ムヘシ病後ニ頽<sup>ニ</sup>ノ卒<sup>ニ</sup>

肥テ浮腫シタルヤウニ見ユルハ飲食ノ過度ニシ

テ穀氣ノ偏勝シタルナリ傷寒ハ其證候千變萬化

ニシテ治法モ亦多端ナレハ此ニ具舉スル一能ハ

ス今僅ニ其概略ヲ述ルノミ其論說及ヒ治法ノ細



辨ニ至テハ傷寒論類釋每篇ノ後ニ附ス宜ク參閱スヘシ

傷寒應用方

竹茹温膽湯萬病回春治傷寒日數過多其熱不退夢寐不寧心驚恍惚煩燥多痰不眠者

柴胡錢二 香附子分八 人參 黃連各五分 甘草三分

竹茹 桔梗 陳皮 半夏 茯苓 枳實各一錢

右十一味薑棗煎服

柴胡清燥湯温疫論下後間服緩劑

柴胡 黃芩 陳皮 甘草 花粉 知母

右六味薑棗煎服

柴胡枳桔湯傷寒蘊要治小結胸脈弦數口苦心下鞭痛或胸

下滿鞭或發熱或日晡潮熱或往來寒熱耳聾目眩者

小柴胡湯加瓜蒌實枳殼桔梗

升陽散火湯傷寒六書治叉手冒胸尋衣摸床譫語昏沉不能

醒此肝熱乘於肺元氣虛不能自主持名曰撮空小便

不利者不可治

人參 當歸 柴胡 芍藥 黃芩 甘草

白朮 麥門 陳皮 茯苓

右十味薑棗入金首飾煎之熱服有痰者加半夏大便



燥加大黃泄瀉者加升麻白朮

導赤各半湯六書傷寒心昏不語或夢中獨語目赤神焦

形如醉人此因火上而逼肺也

梔子 黃芩 麥門 滑石 人參 犀角

知母 茯苓 黃連 甘草 生薑 大棗

右十二味煎服

歸脾湯濟生方治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不

能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛

嗜臥少食或憂思傷脾血虛發熱或肢體作痛大便不

調

黃芪 人參 白朮 茯苓 酸棗 龍眼各二錢

當歸 遠志各一錢 甘草 木香各五分

右十味薑棗煎服

小柴胡合黃連解毒湯醫學正傳治少陽陽明合病熱甚脇痛

嘔逆自利脈數而沉實

小柴胡湯黃連解毒湯合方

黃連解毒湯外臺秘要治時疾苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不

得臥

黃連 三兩 黃芩 黃蘗 梔子各二兩 十四枚

右四味煎服



抑肝散小兒直訣治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或嘔吐痰涎腹脹少食睡卧不安者

當歸 白朮 茯苓 釣藤 川芎 柴胡 甘草

右七味煎服 救曰高階家抑肝散加羚羊角名曰羚羊飲以理諸癩有神驗

柴苓湯方得効治瘧發寒熱病在半表半裏陰陽不分小柴胡湯合五苓散 救曰此方又治傷寒下利及痢疾

六君子湯全治胸膈痞塞脾寒不嗜食

人參 茯苓 炙甘草 白朮 陳皮 半夏

右六味煎服

柴胡鼈甲湯聖濟總錄治傷寒潮熱不解或時熱或時寒如瘧狀

柴胡 鼈甲 茯苓 知母 桑白皮 甘草半兩 黃芩三分 生薑

右八味煎服

香莎六君子湯薛已治脾胃虛弱而兼宿食痰氣飲食不進嘔吐惡心或泄利後脾胃不調或風寒病後餘熱不退欬嗽不止氣力弱者



六君子湯加藿香香附子縮砂

柴白湯

小柴胡湯合白虎湯

參連白虎湯

白虎湯加人參黃連

柴胡四逆湯原氏治疫熱挾陰證者。

小柴胡湯合茯苓四逆湯

金箱飲自準

治傷寒日數過多潮熱譫語精神恍惚渴而  
不欲飲水熱而欲近衣心下急而無腹滿大便不秘便  
色亦如常舌上黑苔而不乾燥或紅軟而無津者。

補中益氣湯合生脈散

紫雪散外臺

療脚氣毒遍內外而煩熱口中生瘡狂易叫

走及諸石草熱藥毒發邪熱卒黃等瘴疫毒癘卒死温

瘡五尸五注心腹諸疾絞刺切痛蠱毒鬼魅野道熱毒

小兒驚癇百病

黃金一百兩

寒水石

磁石

石膏

滑石各三斤

已上伍味並搗碎用水一斛煮至肆斗去滓入下項

羚羊角鎊屑

犀角鎊屑

青木香搗碎

沉香搗碎各伍兩

丁香搗碎各一兩

玄參洗焙搗碎

升麻各一斤

甘草炙搗兩



已上捌味入前藥汁中再煮取一斗伍升去滓入下項

朴硝精者十斤消石肆斤如闕芒硝亦得每斤重米兩柒錢半

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有柒升投在盆中半日欲凝入下項

麝香當門子研一兩錢半朱砂飛研一兩

已上二味入前藥中攪調令勻停之二日

右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大人小兒臨時以意加減並食後服○救曰主治據外臺秘要藥方據和劑局方又按寒水石本草不載蓋石膏

及凝水石之一名而非別有寒水石今此所用恐是凝水石或以方解石當之誤矣

桂枝湯 葛根湯 桂枝加芍藥湯 桂枝人參湯

桂枝二越婢一湯 桂麻各半湯 麻黃細辛附子湯

麻黃甘草附子湯 大青龍湯 小青龍湯 大承氣湯

桃核承氣湯 小柴胡湯 柴胡桂枝湯 大柴胡湯

調胃承氣湯 茵陳蒿湯 四逆散 大陷胸湯

柴胡加龍骨牡蠣湯 白虎加人參湯 小承氣湯

柴胡去半夏加枳實湯 茵陳五苓散 柴胡桂薑湯

四逆加人參湯 茯苓四逆湯 猪苓湯 橘皮竹茹湯



菴活附子散 丁香柿蒂散 歸脾湯 補中益氣湯

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

天行中風 證ニシテ流行スルノ傷寒ト同シ故

中風ハ外感ノ一證ニシテ流行スルノ傷寒ト同シ故

ニ張仲景傷寒中風ヲ併論セリ又半身不遂ノ證ヲ

モ中風ト謂テ二病ヲ一名ニテ一書ノ中ニ舉タル

ハ可疑ニ似タレ氏愚按スルニ後漢ノ時風邪ノ

ヲ中風ト謂ヒ半身不遂ノ證ヲモ亦中風ト謂タル

モノト見ヘテ東觀漢記ニ曰光武避正殿讀讖坐廡

下淺露中風苦欬是即今ノ風邪ナリ前漢書自叙

傳曰班伯道而病中風既至以侍中光祿大夫養病賞

賜甚厚數年未起是即半身不遂ノ中風ナリ仲景世



ニ通稱スル所ノ病名ヲ舉テ別ニ新名ヲ設ケサル  
 ナルヘシ然レモ二病一名ニテハ初學ノ者ハ惑ヒ  
 易キユエ吾門私カニ風邪ノ中風ヘハ天行ノ二字  
 ラ冠シテ半身不遂ノ中風ニ分ツ此病ノ流行ハ必  
 ラス關西ニ起テ關東ニ至ル近世流行シタル阿七  
 風琉球風檀法風薩摩風ノ類即チ是ナリ其邪傷寒  
 ト同シカラス傷寒ハ自ラ傷寒ニシテ輕重有リ中  
 風ハ自ラ中風ニシテ輕重有リ大青龍湯ノ中風ハ  
 即中風ノ重證ナリ又傷寒中風ノ二病各少陽ニ轉  
 入スル寸ハ俱ニ往來寒熱等ノ諸證ヲ發シテ辨別

スヘキ確證ナシト雖モ苟モ疾病ニ對スルニ病性  
 自ラ異ナレハ一目瞭然トシテ辨シ易キノミ若傷  
 寒ノ輕キ者ヲ中風ト為シ中風ノ重キ者ヲ傷寒ト  
 為シ或ハ汗ノ有無ヲ以テ傷寒中風ヲ分ツ片ハ少  
 陽病ニ至テ窮ス

天行中風ノ最初ハ嘔嚏頻ニ出テ、項背強リ浙浙ト  
 シテ惡風シ咽痛ミ發熱スルニ及テ脈浮頭痛腰痛  
 四肢煩疼欬嗽シテ清涕ヲ流シ痰沫ヲ吐キ或ハ汗  
 出テ或ハ汗不出或ハ渴シ或ハ嘔スル者葛根湯ニ  
 宜シ其熱一等甚シクシテ煩躁スル者ハ大青龍湯



ナリ緩證ニハ紫蘓解肌湯若シクハ參蘓飲ヲ撰用  
 スヘシ大抵ハ太陽證ニテ愈ル者多シ少陽ニ入テ  
 胸脇苦滿往来寒熱等ノ有ル者ニハ柴胡桂枝湯若  
 シクハ小柴胡湯ニ宜シ若シ少陽ニ入り因循トシ  
 テ永ク不愈盜汗ノ出ル者ニハ柴胡桂枝乾薑湯奇  
 驗アリ此病如何ホトノ重證ニテモ胃實スルノ無  
 シ稀ニ胃實スル者モアレ氏大柴胡湯ノ病位ニテ  
 三承氣湯ヲ用ルヤウニハ成ラヌ者ナリ  
 天行中風應用方

參蘓飲萬病回春治感冒發熱頭疼痰飲凝節

陳皮 枳殼 桔梗 甘草 木香 半夏

紫蘓 乾葛 前胡 人參 茯苓各三分

右十一味薑棗水煎

紫蘓解肌湯自準亭治天行感冒

紫蘓 葛根 芍藥 川芎 乾薑 杏仁

甘草

右七味煎服

大青龍湯 葛根湯 柴胡桂枝湯 小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯 大柴胡湯



內科秘錄  
卷之二

內科秘錄卷之二

內科秘錄



