

内科秘録

士

婦人





門中武9信  
第777  
卷

內科秘錄卷之十一

目錄

婦人

求嗣

胎孕

惡阻

產

胞衣不下

兒枕痛

血暈

內科秘錄 卷之十一 目錄

一  
自維亭藏



子癰

子腫

子淋

子嗽

子痢

子瘡

經閉 附圖

崩漏

乳汁不出

内科秘録卷之十一

水戸 棗軒本間救和卿 著

婦人

求嗣

胎孕

惡阻

求嗣ハ子ヲ求ルニテ婦人ノ第一專要ト為ル所ナ  
リ故ニ古ヨリ不孝有三無後為大ト云ヒ又無子去  
之ト云ヘリ然レモ男女交接ハ人事ニシテ子ノ有  
無ハ天ナリ然レハ求嗣ハ人カニ求ム可キニ非





ス無子ハ唯婦人ヲ責ムレト唯婦人ノミニ非ス妻  
ニ子種ノアリテ夫ニ無キモノアリ譬ハ無子女離  
別ニナリ外ヘ嫁シテ子ヲ孕ミ男子無子妻ヲ去テ  
後再三娶レト亦無子者往往アルニテ知ルヘシ女  
ノ子ナキハ先ツ經水ノ不調ニ在リ其經水ノ來ル  
一或ハ期ニ先タチ或ハ後レ或ハ過多或ハ甚少ク  
經候ノ時ニ腹痛甚フシテ期日ヨリ永ク下ル者又  
其血色或ハ紫或ハ黑或ハ淡紅或ハ凝血シテ塊ヲ  
成ス者皆孕ヲ成ス一能ハス子宮ノ左右ニ一膜管  
アリ膜管ノ端ニ又膜囊アリ女精ハ此ニ藏ス男精

子宮ヲ射ルルハ女精モ亦此膜管ヨリ宮中ヘ注キ  
一時ノ妙合ニテ胚胎トナルナリ若シ膜管狹窄ナ  
ル者或ハ閉塞スルモノ又子宮口ノ狹窄或ハ無口  
ノ者皆孕ヲ成サス一女子年長シテ經水來ラス嫁  
シテ亦孕ヲ成サス腹脹滿シテ鼓脹ノ如クニ成リ  
タル者アリ探宮スルニ子宮混沌トシテ戸口無シ  
新手段ヲ以テ療治シテ經水モ常ノ如クニ成リ又  
妊娠シテ子ヲ産メリ治驗ヲ續瘍科秘録ニ詳ニス  
後合信氏ノ婦嬰全書ヲ讀ムニ曰經水不得出子宮  
頸窄或陰戶塞妨礙經水之路此偶見之証西國醫法



將塞處以刀微割以經絡通行為度此術予カ手段ニ  
符合セリ男子ニ子ノ無キハ何ノ故ナルヲ知ラ  
ス古説ニハ精氣清冷ト為シテ固本健陽丹續嗣丹  
等ヲ用エ無子ハ固ヨリ天ナレト若シ誠求シテ已  
ムト無クシハ已上ノ二方ヲ試ムヘシ本邦ニテ温  
泉ニ浴シ孕ヲ求ルハ精冷ヲ温ムルノ意ナルヘシ  
予カ舊識ニ無子ヲ患ヒ年年鹽原ノ温泉ニ浴スル  
ト十一年ニシテ初テ孕ミ子ヲ得タル者有リ然レ  
ハ温泉モ試ミテ可ナリ五雜俎ニ以窓間直馬廐毎  
馬交合令婦觀之隨交合則無不孕ト云ヒタルハ求

子ノ權道ナリ

多子ヲ流俗ハ多房ト為セ氏多房ノ者ハ却テ無子寡  
慾清心ニシテ妄ニ交合セズ精ヲ儲ヘ時ニ應シ節  
ヲ得ル寸ハ子アルヘシ漢書藝文志ニ房中者情性  
之極至道之際是以聖王制外樂以禁內情而為之節  
文傳曰先王之作樂所以節百事也ト有リテ房ヲ節  
ニスルハ人道ノ一大緊要ナリ此法ヲ失ハサルヲ  
求子ノ上策ト為スヘシ

胎孕ノ期漢説ニハ月經畢テ後六日ノ内ニ在リト為  
シ賀川家ニテハ十日ノ間ニ在リト云ヘリ經水ハ



受孕ノ為ニ下ルモノニテ經候ニナレハ情慾ヲ起シ經行ク寸ハ愈旺盛ニナリテ受孕ヲ求ムルナリ草木ノ花ヲ開キテ子ヲ結フヲ貪ルニ同シク天然ノ然ラシムル所ニシテ私ノ事ニ非ス故ニ經畢テ後數日ノ間ヲ佳期トスレ氏六日十日ト必ス日數ヲ定ムヘカラス然レ氏經行ノ後旬餘ヲ過ル時ハ情慾漸薄クナリテ孕ヲ受ルヲ無シ受孕ノ理ヲ考フルニ西説ニ左右ノ膜管ヲ喇叭管ト云ヒ膜囊ヲ卵巢ト名ケ巢中ニ卵子ヲ藏シ男精宮中ヲ射ル寸ハ喇叭ヲ通りテ卵子ニ注キ數日ノ後卵子自ラ

分離シテ宮中ヘ歸スト云フヲナレ氏予之ヲ疑フ一久シ男精一旦宮中ヲ射テ再ヒ喇叭ヘ注クヲ難カルヘシ又喇叭ノ子宮ヘ著ク處ハ甚細フシテ僅ニ猪毛ヲ通スヘシト有レハ子宮ノ濶キ處ヨリ細管ニ入ルヲ亦甚難カルヘシ其器形ヲ視ルニ女精ハ宮中ヲ射ル可クシテ男精ハ卵巢ヘ入ル可カラサルニ似タリ又男子感セスシテ女子獨感スル寸ハ女精汪然トシテ涌出シ腔外ヘ溢ルニ至ル然レハ女精モ亦子宮ノ内ヘ入り男精ト相會シ妙合シテ胚胎ヲ成スモノナルヘシ胎子最初ハ玲瓏ト



シテ凝脂ノ如ク漸次ニ形ヲ成シ三月ニ滿テ全體  
ヲ備フルモノナリ淮南精神訓ニ一月而膏二月而  
肤三月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七月而成  
八月而動九月而躁十月而生形體以成五藏乃形ト  
アリ胎子ノ說ハ之ヲ鼻祖トス醫學入門ニ胎子月  
月ノ形狀ヲ審辨シタルモ蓋シ此ニ本キタルモノ  
ナルヘシ解體新書名義解及ヒ近來英國ノ醫士合  
信氏ノ全體新論ニ說ク所皆實驗ニシテ從フヘシ  
漢說モ略西說ニ吻合ス三月ニシテ全體ヲ備フル  
ト謂フハ漢蘭及ヒ本邦モ同說ナルハ蓋シ墮胎ニ

就テ實驗シタルナルヘシ

辨胎又驗胎氏云フ妊娠ハ經絶ト惡阻トヲ明徴トス  
レ氏惡阻ニ遲早アリ又微劇アリ經絶モ處女孀婦  
ノ如キハ秘シテ言ハサレハ證據ニナラヌヲ有リ  
新ニ嫁シテ經絶スル者又經水毎月下リ一月モ滯  
ラスシテ適經絶スル者ハ妊娠ナリ又顔色憔悴シ  
白睛殊ニ白フシテ青キヤウニ見ヘ乳頭紫黯色ニ  
變シ乳房ノ中ヲ捫ルニ常コリ硬ク大ニナル者ハ  
一身ノ血液一ハ子宮ニ歸シテ胚胎ヲ榮養シ一ハ  
乳房ニ入テ預メ乳汁ヲ造ラント欲シ乳房ノ二器



ノミ血液偏勝シ他部ノ血液不足ニナリ致ス所ニ  
テ卽孕候ナリ按腹スルニハ常ニ子宮ノ形狀位置  
ヲ詳ニスヘシ若シ之ヲ知ラスシテ辨胎ヲ求ルハ  
捕風捉影ニ異ナラス子宮ハ肉質ニシテ大サ雞卵  
ノ如ク深ク膀胱ノ背面ニ在リ孕ムト雖モ八九十  
日ノ間ハ尚雞卵ノ大サニシテ之ヲ探リ得ルヲ能  
ハス然レモ胚胎日日ニ生氣ヲ加フル寸ハ自然ニ  
浮動シテ臍下ト横骨ノ間ニテ或ハ沉ミ或ハ浮ミ  
移轉シテ定マラス先ツ孕婦ヲ仰卧セシメ更ニ大  
息ニ呼吸セシムルヲ數息諸臟ノ安靜ニナルヲ待

テ心下ヨリ徐徐ニ輕ク按シ少腹ニ至ル寸ハ七八  
十日ノ胎ハ大サ雞卵ノ如クニ覺ユ此法ニテ十カ  
セハヲ決スヘシ又按腹スルヲ前法ノ如ク數回ノ  
後指頭ヲ以テ斜ニ少腹ヲ撞ク寸ハ自ラ胚胎ノ浮  
動スルヲ覺フ此法ニ熟スル寸ハ百發百中ニシテ  
一モ誤認スルヲ無シ和漢共ニ脈ヲ以テ妊否ヲ決  
スルノ說アレモ其言渺茫トシテ遵用シ難シ畢竟  
人身窮理ヲ知ラサル故ナリ

婦人平素一二月或ハ三四月ツ、經閉スルヲ有ル  
者又有身ノ後モ時時經水ノ下ルモノ又惡阻ノ無



キモノ又大ニ肥テ腹ノ皮厚キモノ又小腹ニ癥癖  
ノアル者ハ三四月ニ及ヒテモ妊否ヲ決シ難キ  
アリ世ニ孕胎ヲ經閉ト心得或ハ結塊ト為シ又腸  
覃ノ類ヲ却テ妊娠ト為シテ大ニ嘲笑セラル、  
多クアレハ能ク診法ヲ詳ニシテ失誤ヲナスヘカ  
ラス

胎居ハ本邦古來ノ說ニ子反リト云テ十月マテハ正  
坐シテ居レ氏産ニ臨メハ乍チ翻轉シ倒首ニナリ  
テ出ルト云ハ誤ナリ先哲已ニ其非ヲ辨ス是ハ外  
ヨリ妄想シテ言ヒタル了簡ナリ人ハ平生坐立俱

ニ首ヲ上ニスルユエ胎子モ亦母ト同シヤウニ正  
居スルモノト心得タルモノナルヘシ子宮中ハ混  
沌タル別世界ニテ天地モナク亦上下モナシ胎子  
ハ胞衣水液ノ中ニ在テ少シク游泳シ移轉シ易ク  
正斜不定ナレ氏兒頭ハ常ニ子宮口ヘ向ヒテ居ル  
ナリ胎子出ヘキ所ヘ向クハ自然ナリ今上下ヲ論  
スル寸ハ子宮底ハ下ニシテ子宮口ハ上ナリ然レ  
ハ倒首ハ反テ正居ト謂テ可ナリ胚胎ハ草木種子  
ヲ土中ヘ植ルニ同シ譬ハ柿核ヲ土中ヘ倒マニ植  
ユ若クハ横ニ植ルモ芽ハ必ス上ヘ向テ出ルナリ



兒頭ノ子宮口ヘ向クハ此理ニ異ナラス子玄子ハ  
胎子大抵五月ヨリ倒首スルト云ヒ西說ニハ六月  
ヨリ倒首スルト云ヒタレ氏前說ノ理ヲ以テ考フ  
ルニ矢張初ヨリ倒首スルモノナルヘシ

婦人良方等ニ產候ヲ述テ兒轉或ハ轉頭遲慢等ノ文  
アレハ明文ナシト雖氏唐山ニテモ胎子ハ產ニ臨  
ンテ頭ヲ轉シ倒ニナリテ生ルヘキモノト心會本  
邦ニテ子及ト云フハ所謂兒轉ノ文ニ本ツキタル  
モノナルヘシ

妊娠三四月ニ至ル寸ハ必ス小産シテ一子モ生育セ

ヌ者アリ金匱ノ當歸散ヲ與フヘシ

回春ニ月經行後一日三日五日交會者成男二日四日  
六日交會者為女ト云ヘリ日ノ奇偶ニテ男女ノ分  
ルハ陰陽自然ノ理ニテ或ハ然ルヘシ孕テ后男女  
ヲ辨スルノ法本邦ノ俗夫婦ノ年及ヒ受孕ノ月ノ  
奇偶ヲ以テ男女ヲトスルアリ假令ハ夫婦ノ年  
ト受孕ノ月トヲ三ツニ算ヘ皆奇數ヲ得ル寸ハ男  
トナシ皆偶數ヲ得ル寸ハ女トナシ其一單ニ奇數  
ヲ得ル寸ハ男トナシ其一單ニ偶數ヲ得ル寸ハ女  
トナスヘシ大抵ハ間違ヌモノナリ古今秘苑ニ夫



婦ノ年及ニ受孕ノ月ヲ八卦ニ配シテ男女ヲトス  
ルノ法アリ夫ノ年ヲ初爻トナシ受孕ノ月ヲ二爻  
トナシ婦ノ年ヲ三爻トナシ之ヲ算ヘテ三爻皆奇  
數ヲ得ル寸ハ即チ乾ニシテ男ナリ三爻皆偶數ヲ  
得ル寸ハ即チ坤ニシテ女ナリ其一爻單ニ奇數ヲ  
得ルモノハ即チ震坎艮ニシテ男ナリ其一爻單ニ  
偶數ヲ得ルモノハ即チ坤兌離ニシテ女ナリ蓋シ  
前法ハ此ニ本ツキタルナルヘシ又腹形ノ突起ス  
ルモノハ多クハ男ニシテ扁平ナルモノハ多クハ  
女ナリ以上ノ法皆陰陽ニ出レハ受孕ノ日ノ奇偶

ニテ男女ヲ成スト是又自然ノ妙ト謂フヘシ  
惡阻ハ別名尤モ多シ千金方ニ單ニ阻トイヒ又阻病  
氏イヒ其外ハ療治知要ニ載セタルユエ此ニ贅セ  
ス受胎ノ後二十八九日ニ至テ催スモノナリ初ハ  
神氣鬱鬱トシテ樂マス四肢倦怠シテ執作スル  
ヲ欲セス但臥スルヲ嗜ミ飲食ヲ欲セス味噌汁新  
炊飯ノ香ヲ惡ミ酸味及ヒ菓實ヲ取ハンヲ欲シ  
二三月ニ至レハ益熾ニナリ心煩喜嘔シテ飲食納  
マラス疲勞シテ床蓐ニ就ヲ一通リノ惡阻ト為ス  
甚キモノハ稀粥一酒盃許リヲ一日ノ食トス殆ト



絶穀ニ至リ但菓瓜ヲ啖ヒ冷水ヲ飲ムノミニテ肉  
燦骨立シ微ニ惡風發熱アリテ脈細數ニナリ虚里  
及ヒ臍下ノ悸動築築トシテ起リ或ハ咳シ或ハ渴  
シ或ハ口舌乾燥眩暈頭痛大便秘結シ虚勞ノ如ク  
血證ノ如クニシテ必死ニ見ユルモノナリ胚胎モ  
削瘦スルト見ヘテ手ニ應セヌヤウニナルヲアリ  
凡ソ阻病二十七八日ニ催シテ七八十日ニ熾ニナ  
リ又漸漸ニ減少シテ六七箇月ニ至ル寸ハ自ラ止  
ムモノナリ或ハ十箇月ノ間患フル者モアリ初孕  
ハ惡阻甚シク二度三度ニ及ヘハ漸漸ニ薄クナリ

後ニハ氣味ノアルノミニテ濟ムモアリ或ハ孕度  
ニ患ヒテ何<sup>イッ</sup>マテモ薄クナラヌモアリ惡阻ハ先ツ  
死ナヌモノニテ三四十日絶食同ヤウニナリ必死  
ノヤウニ見ヘテモ恙カナキモノナリ唯一人危篤  
ヲ免カレ食ノ進ムニ及ンテ牡丹餅<sup>ホタモ</sup>ヲ多ク食シ食  
傷ニテ死シタル者アリ

經水ハ胎子ヲ營養スル爲ニ備ハリタルモノニテ常  
ニハ經水トナリテ下リ若シ滯ル寸ハ病ヲ生ス妊  
メル寸ハ子宮ニ入テ胚胎ヲ養ヒ令婉スレハ乳汁  
ヲ釀シテ小兒ヲ育スルノ料トナルナリ受胎二三



月ノ間ハ胎子尚小ニシテ其血有餘然レ其經水ニナリテ下ルヲ得ス逆退シテ惡阻ヲ患フルナリ六七箇月ニ及ヘハ胎子漸大ニナリテ血ヲ受ル多ク又乳房ヘモ入ルユエ血ノ有餘ナクシテ逆退セサレハ惡阻モ亦從テ自ラ止ムナリ

惡阻ハ素ヨリ病ニ非レハ藥用ニ及ハス唯大便ノ通セヌハ宜シカラヌユエ調胃承氣湯ヲ丸シ或ハ朱明丸或ハ蘆薈一味ヲ丸シ時時用ヒテ通シヲ取ルヘシ險證並起ル寸ハ捨テモ置レヌユエ增損白朮散半夏瀉心湯小半夏加茯苓湯巫神湯ヲ小劑ニシ

テ少シツ、用フヘシ實ハ藥ヲ飲ヌヲ善シトス易ニ勿藥有喜ト云ヘルハ此謂ナリ富貴ノ家ニテハ深ク之ヲ憂ヒ衆醫ヲ招キ諸藥ヲ雜投シ愈吐キテ却テ難儀スルヲ多シ鵲鴝菜「セメンシイナ」ノ類ヲ用フルハ見込チカヒニテ少シモ効ヲ奏セス却テ惡阻ヲ助クルヲアリ予ハ毎ニ衆醫ノ手ヲ束タル迹ヘ一奇方ヲ與ヘテ手柄ヲシタルヲ多シ其方山查子一味ヲ糊丸トナシ五粒ツ、冷水ニテ一日ニ三度服サシム是ハ藥ノ効ニモ非ス今述ル所ノ勿藥有喜ノ意ナリ



求嗣胎孕惡阻應用方

固本健陽丹 回春 治腎水關乏

熟地黄 兩各三 山茱萸 兩各三 巴戟 二兩 兔絲子

續斷 遠志 蛇床子 兩各一 白茯苓 兩半 山藥

牛膝 杜仲 當歸 肉蓯蓉 五味子 益智

鹿茸 枸杞子 人參

右十八味為末蜜丸梧子大溫酒下五七十九臨卧再服

續嗣丹 入門 主治同前

山茱萸 天門冬 麥門冬 兩各二 破故紙 四兩

兔絲子 枸杞子 覆盆子 蛇床子 巴戟

熟地黄 韭子 龍骨 黃芪 牡蠣 山藥

當歸 瑣陽 兩各一 人參 杜仲 錢各七 陳皮

白朮 兩各五 黃狗外腎 二對 紫河車 一具

右二十三味為末蜜丸梧子大日服百丸

增損白朮散 叢桂 治惡阻

錢氏白朮散 去茯苓甘草加陳皮乾薑

朱明丸 本朝 主治軟下

大黃 一錢 蕎麥 三錢

右二味研末糊丸







ニ妄ニ<sup>ミタリ</sup>努力<sup>キカ</sup>カシ早ク草ニ坐シテ速ニ<sup>ハミヤカ</sup>セン<sup>ハミヤカ</sup>ヲ求ル  
寸ハ氣カモ竭キ胎子モ位置ヲ失シ難産ニナル  
有リ先ツ頭ノ出ルハ順ニシテ正産ト云フ先ツ足  
ノ出ルハ逆ニシテ逆産ト云フ先ツ臀ノ出  
ルヲ坐産ト云フ先ツ手ノ出ルヲ横産ト云フ何レ  
モ難産ニ屬ス手足ヲ出ス者ハ之レヲ入レテ順ニ  
シ正産ニスルヲ産科ノ術トス別ニ専門アレハ此  
ニ贅セス催生ハ自然ニシ藥力ノ及フ所ニ非スト  
雖氏當歸散ニ宜シ産後ニハ必ス頭眩或ハ暈倒ス  
ルヲアリ回生散木香瀉心散三黄加辰砂苓桂朮甘

三黄合方巫神湯ノ類其證ノ輕重ニ應シテ撰用ス  
ヘシ

産前ニ下ル所ノ水漿ハ胞衣中ノ水ニテ其色清ク粘  
滑ニシテ雞蛋白ニ似タリ又續テ出ル所ノ惡露ハ  
胞衣外面ヨリ淋出スル所ノ血ナリ胞衣ハ子宮底  
ニ固着シ母ノ血ハ先ツ子宮ニ入リ子宮ヨリ胞衣  
ニ入リ静脈ト成リテ臍帶ヲ行キ臍ヲ穿チ肝ニ入  
リ肝ヨリ心ノ右室ニ入リ心ノ縦膈ヲ穿ツテ左室  
ニ入リ動脈ヘ注キ動脈ノ支管ニ條ニナリテ再ヒ  
臍ヲ穿チ臍帶ニ入リ母體ニ歸ス産ニ臨ンテ陣痛



スルモ血ノ下ルモ胞衣子宮ヲ分離スルノ所致ナ  
リ胞衣ト子宮ト初固著シ産ニ臨ンテ分離スルハ  
譬ハ栗子ノ殼ト固著シテ殼坼ル、寸ハ自ラ分離  
シテ落ルカ如シ

難産ニテ今婉セス遂ニ死スル者尠カラス近世子玄  
子ノ發明ニテ刀ヲ以テ胎兒ヲ截リ或ハ鉤ヲ繫テ  
出スノ法アリ回生術ト云フ子ノ小體ヲ捨テ、母  
ノ大體ヲ救フ一時ノ權道ニテ必死ト見込タラ  
ハ此ノ術ヲ行フヲ却テ仁術ト為ス草澤醫及ヒ年  
少輩術ニ未熟ニシテ徒ニ功ヲ立ントヲ競ヒ今婉

微シク時ヲ移ス寸ハ其難易ヲ辨セス漫ニ難産ト  
ナシ妄ニ刀鉤ヲ用フルノ弊アリ實ニ殘忍ト謂ツ  
ヘシ尤モ大害ト為スハ鉤ヲ以テ腔ヲ穿テ膀胱ヘ  
貫キ小便日夜洩漏シ滴瀝トシテ一刻モ止マス腔  
内ニ結石ヲ生シ陰毛ヘモ細ニ石ヲ結ヒ痛痒ニ堪  
ヘス被服寢衾之カ為ニ常ニ濕露シテ穢氣薰蒸シ  
臭氣一室ニ滿ツルニ至リ産業ハ勿論起居進退モ  
出来ス廢人ニナリテ生涯ヲ送ル者アリ唐山ニモ  
有ル一ニテ丹溪心法ニ曰婦人難産因收生者不謹  
以致尿脬損破得小便淋瀝病遂為廢人試ニ探宮ス



ルニ指頭ヲ容ルヘキ程ニ孔ノ穿テアルモノナリ  
小便常ニ此孔ヨリ漏テ尿道ヘ出テス淋漏ト同證  
ナレ氏見ヘヌ處ユエ手術ヲ施シ難シ固ヨリ難治  
ニ屬ス近頃新工夫ヲ得タリ瓢ノ腔ヘ相應ノ品ヲ  
得テ瓢ノ尻ヨリ強テ押込ニ創口ヲ壓閉シテ仰臥  
セシムルニ小便一滴モ出テス初テ膀胱ヘ溜リ少  
腹モ脹タルユエカテーテルニテ取り尿道ヘ中黄  
ノメイチヤヲ挿入シ時ニ如此スルヲ月餘ニ至リ  
カテーテルヲ用ヒスシテ小便ノ尿道ヨリ出ルヤ  
ウニナレリ瓢サヘ入置ク寸ハ小便漏レスシテ起

居周旋モ妨ナキ様ニナリ後ニハ瓢ヲ抜キテモ少  
シワ、漏ル、位ノ一ニテ多ク出ルヲハ無クナレ  
リ又一エ夫シテ挽物工ニ命シ挽物ニテ瓢ノ大ニ  
造リ漆ニテ塗り此ヘ前衝膏ヲ塗り腔内ヘ容レ尿  
道ヘハカテーテルヲ挿シ不絶小便ヲ流シ溜ラヌ  
ヤウ又創口ヘ漆ヌヤウニシテ數月ヲ經ルニ創口  
漸縮小シテ荒増ニ治セリ後數此法ヲ試ルニ全治  
セスト雖氏大抵ニハ愈ユルモノナリ又愈サル者  
モ此器ヲ入レ置ク寸ハ小便漏レス醫學正傳ニ坐  
婆手法ヲ以テ胞衣ヲ採取テ尿管ヲ損破シ終身ノ



患ヲ為スヲ載ス亦同害ナリ

産ノ時陰門ノ裂ルヲアリ肛門ノ際マテ裂タルハ縫合スルナレ氏多クハ其儘前衝ヲ貼シテ愈ルナリ又産後ニ皮ノ如ク肉ノ如キモノ二三寸モ陰戸ノ外へ下垂スルヲアリ是ハ子宮裡面ノ皮或ハ腔中ノ皮兒ノ出ル勢ニテ剥脱シテ出タルナレハ藥線ニテ緊紮スレハ自ラ脱落シ少シ許リ残りタルハ自ラ牽縮シテ全愈スルモノナリ  
兒枕痛ハ産後ニ腹ノ痛ムニテ矢張分娩ノ時ノ如ク陣痛スルナリ毎痛惡露ヲ下シ下リ盡ル寸ハ痛モ

自ラ止ムモノナリ甲字湯ニ宜シ惡血ノ多キ者ニハ桃核承氣湯ヲ與フヘシ少腹塊物アリテ鞠子ノ如クニ見ルハ即子宮ニテ病ニ非ス初心ノ者誤テ結塊トナスヲアリ子宮ノ大サ常ニハ雞卵大ニ過キス産後ニハ故ニ復スヘキ筈ナレ氏胚胎ノ在ル内ハ血脈増加シテ血液多ク注キ其質自ラ肥盛ニナルユエ速ニ故ノ雞卵大ニ復シカ子ルモノナルヘシ然レ氏十餘日ヲ經レハ自ラ消散シテ失スルカ如クニナルモノナリ

血暈ノ候ハ初メ喜欠シテ卒ニ直視口噤振振トシテ



身ヲ顫<sup>レ</sup>或ハ傍人ノ手ヲ握リ或ハ謔語遂ニ昏迷  
シテ人事ヲ省セス色ヲ失シ自汗出テ脈沉微ニシ  
テ四肢厥冷シ危篤ニ見ユレ正産ノ後ニ發シタ  
ルハ必ス蘇活シテ死スル<sup>ノ</sup>ナシ蓋シ癰ニ屬ス難  
産ニテ回生術ヲ施シ困倦シテ分娩スル者或ハ血  
崩過多ノ者或ハ胞衣不下シテ血暈ヲ發スルハ皆  
脫陽ノ致ス所ニテ十ニ八九ハ死ヲ免レス凡ソ血  
暈牙關緊急スル者ハ活ス可ク口ヲ開ク者ハ蘇ス  
ヘカラス治法ハ已ニ眩運門ニ具ス

變胎ハ「フタゴ」ニテ又雙胎<sup>ハ</sup>仔胎<sup>ハ</sup>云フ希有ニ

シテ百中ノ一ナリ品胎ハ「ミツゴ」ニテ又三胎  
<sup>ハ</sup>云フ是ハ殊ニ希有ナルモノニテ數千中ノ一ナ  
リ西洋ニテ四胎ヲ論シテアレ<sup>ハ</sup>本邦ニテハ聞モ  
及ハヌ<sup>ノ</sup>ナリ又「リンナウ」ト云フ書ニ變胎ノ脊  
ノ相附着シテ一體ニナリタル圖說ヲ載ス房州ニ  
テ先年雙頭胎ヲ産タル<sup>ヲ</sup>アリ府下ヲ距ル<sup>ノ</sup>十里  
許リ助川驛ノ山中ニ雙頭鹿ヲ獲ルモノアリ之ヲ  
解剖スルニ胃ハ各一管ヲ起シ二管相合シ一管ト  
ナリテ胃ニ接ス肺管モ亦胃管ニ同シ其外ノ諸臟  
ハ異ナル所ナシ人胎雙頭ノ内景モ亦之ニ同シカ



ルヘシ

胞衣三分ノ一ハ厚フシテ肉ノ如ク子宮底ヘ連リ母ノ血ヲ此ヘ受ケ臍帶ヲ生シ胎子ノ臍ヲ貫キ肝ニ入リ肝ヨリ心ノ右室ヘ入リ心膈ヲ穿テ左室ニ入リ左室ヨリ動脈ヘ注キ動脈ノ支管再ヒ臍ヲ貫キ臍帶ヲ行テ母體ニ歸シ出入循環スル一環ノ端無キカ如シ其二分ハ膜ニシテ薄ク囊ニナリ透キテ胚胎ノ見ユルモノナリ産ニ臨ム寸ハ自ラ裂テ或ハポント聲ノスル一アリ此時胞漿漏泄ス陣痛ハ此膜ノ子宮ヲ離ルノ候ナリ分娩スレハ胞衣ハ

兒ニ從テ同シク下リ少シ後ル、モ二三刻或ハ一時ヲ歷ルニ過キス若シ時ヲ過キテ下ラサル者ハ醫右手ヲ膈内ヘ入レテ戸口ニ至リ帶根ヲ撮ミ徐徐ニ引キ左手ヲ以テ産婦ノ脇腹ヲ按壓スレハ聲ヲナシテ下ルモノナリ若シ猛カニ引ク寸ハ截レ易シ産後ハ戸口ノ歛縮スルモノユエ指ニテ開クヤウニシテ引クヘシ藥ハ甲字湯或ハ加大黃ニテ宜シ折衝飲ヲ用フルモ亦可ナリ若シ萬方スレモ下ラス淹留シテ日ヲ引ク者ハ虚脱シテ多クハ死ヲ免レス又血暈ヲ發スル者ハ十二七八ハ救ヒ難



シ胞衣ノ遂ニ下ラスシテ死スルハ胞衣ノ子宮底  
ヲ分離セサルモノナルヘシ小産ニテ胞衣ノ下ラ  
サルハ日ヲ經テ腐敗シ片片ニ斷<sup>チキ</sup>テ下リ害ヲナサ  
ヌモノナリ藥初ハ甲字湯虛脫スルモノハ八物湯  
寒熱ノアルニハ逍遙散巫神湯ヲ撰用スヘシ

産兒枕痛血暈胞衣不下應用方

逍遙散<sup>局方</sup>治血虛勞倦五心煩熱頭目昏重心忪頰赤  
發熱盜汗及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧

甘草<sup>半兩</sup> 當歸 茯苓 芍藥 白朮 柴胡

右六味生薑一塊薄荷少許煎服

折衝飲方 產論

芍藥 桃仁 桂枝<sup>各一錢</sup> 紅花<sup>半錢</sup> 當歸

川芎 牛膝<sup>各八分</sup> 牡丹皮 延胡索<sup>各五兩</sup>

甘草<sup>一分</sup>

右十味以水二合半煮取一合半服

桃核承氣湯 三黃湯 八物湯 巫神湯

甲字湯 回生散



[illegible]

婦人

子癰

子腫

子淋

子嗽

子痢

子癰

子癰ハ初テ外臺秘要ニ出ツ子ハ子腫子淋ノ子ニ同  
フシテ孕ノ義ナリ孕婦ノ癰ヲ發シタルニテ胎兒  
ノ病ムニ非ス妊娠七八月ニシテ發スルモノハ多



クハ救ヒ難シ臨月ニ及テ發スル者ハ分娩シテ生  
路ヲ得ル者アリ其候卒ニ眩暈嘔吐ノ後直視搐搦  
逆氣衝心項背強直筋脈攣急齧齒口噤劇キ者ハ角  
弓反張シ昏迷シテ人事ヲ省セス或ハ腥メ或ハ發  
シ遂ニ疲勞シテ蘇活セサル者多シ外臺ニハ瘧病  
ニ屬シ醫學入門ニハ中風ト為シタレ氏皆神經病  
ナレハ格別ノ誤ニモ非ス

治法ハ先ツ探宮シテ羔膜ヲ爪破シ破漿シテ分娩セ  
シムルヲ第一ノ良策ト為ス胎兒出ル寸ハ必ス諸  
症去リ唯昏睡シテ人事ヲ省セス最初屢發作スル

寸ハ桃核承氣湯三黃湯加辰砂ノ類ヲ與ヘテ一旦  
病勢ヲ摧クヘシ分娩ノ後昏睡シテ醒サルモノニ  
ハ羚羊飲若クハ巫神湯ニ宜シ春林軒ニテハ沈香  
天麻湯加羚羊ヲ專用セリ何方ヘモ熊參湯ヲ兼用  
シテ可ナリ常ノ發癇ハ一旦治シテモ多クハ再發  
スル者ナレ氏子癇ハ治スル寸ハ再發スルヲ稀ナ  
リ

子腫ハ妊娠五六月ニシテ腰ヨリ以下兩脚マテ浮腫  
スルナリ上部ハ多クハ腫レス假令腫ルモ多カ  
ラス小便ハ常ノ如クニ通シ或ハ不利スルモアリ



蓋シ胎兒大ニナルニ從テ水脈ヲ過迫シテ致ス所  
ナルヘシ是ハ癰癰ヨリ水氣ヲ生スルト同理ナリ  
世醫或ハ胎兒尿道ヲ妨碍シテ小便不利ニナリテ  
水氣ヲ生スルト心會ルハ大ナル誤ナリ本ヨリ小  
便ノ利スルモノハ分娩スレハ腫モ速ニ消スルモ  
ノナリ若シ不利スルモノハ産後ニナリテモ小便  
愈不利ニシテ一身悉ク腫レ心下滿急或ハ咳嗽或  
ハ喘急等ノ諸症ヲ備ヘ衝心スルヲアレハ能ク注  
意シテ治ヲ失フヘカラス又産後血崩スルヲ過多  
或ハ血熱永ク解サス或ハ難産ニテ身體ノ疲勞ス

ル者ハ亦能ク水氣ヲ生ス又産後ハ風毒ニ感シ易  
フシテ脚氣ヲ患フル者多シ産後ノ脚氣ハ水氣消  
シテモ麻痺痿弱シ雙脚ノ筋脈急痛シテ少モ起ツ  
テ能ハス即乾脚氣ナリ永ク愈スシテ半年或ハ一  
年ニ及フ者アリ

治法ハ常ノ水氣ト異ナルヲナシ水氣門ノ諸方ヲ撰  
用シテ可ナリ若シ血熱ノ解セサル者ニハ巫神湯  
逍遙散ヲ撰用スヘシ瘀血ニ係ル者ハ桃核承氣湯  
甲字湯ニ宜シ血虛スルモノハ八味腎氣丸ヲ與フ  
ヘシ産後ノ水氣ニハ琥珀湯奇驗アリ痿癰及ヒ兩



湯ヲ撰用スヘシ

子淋ハ妊娠五六月ニ及ンテ前後兩陰ヘ張り淋ニナルモノナリ小便頻數ニシテ尿道澀痛シ或ハ膿血ヲ下シ屢圜ヘ上ルユエ胎モ自然ト下ヘサカリ或ハ痔疾ヲ併病シテ難儀スルナリ龍膽瀉肝湯猪苓湯加通車ニテ一旦ハ効ヲ奏スレバ今婉セサレハ全治セス

子嗽ハ適發スルモアリ或ハ風邪ヨリ續テ長ク出ツルモアリ是モ今婉セサレハ愈難シ又水氣ヲ併病

シテ嗽ノ出ルモアレハ能ク明辨スヘシ小青龍麻杏甘石合方苓甘薑味辛夏仁湯寧嗽膏ヲ撰用スヘシ

子痢ハ妊娠中ノ痢病ニテ寒熱ノ強ク裏急後重ノ甚シキハ多クハ流産スルモノナリ産後モ熱解セスシテ病勢ノ加フルハ死ヲ免レ難シ若シ水ノ如クニ泄下スル者ハ葛根湯ニテ專ラ發表シ後重スルヤウナラハ加味黃芩湯ニ宜シ裏急後重腹中急痛スルニハ保命芍藥湯溫疫芍藥湯感證集腋ノ檳榔順氣湯ヲ撰用スヘシ妊娠ニテモ大黃ノ證アラハ



微シモ遠慮スルニ及ハス若シ下ヲ失スル寸ハ却  
テ熱ノ為ニ流産シテ死地ニ墜ルヲアリ嘔スル者  
ハ半夏瀉心湯若クハ黃芩加半夏生薑湯ニ宜シ喜  
嘔シテ涎沫ヲ吐クヲ多ク食氣ノナキ者ハ蛇蟲ナ  
シト雖氏「セメンシイナ」ヲ兼用スヘシ「セメン」ハ殺  
蟲ノミナラス胃中ノ粘液ヲ除キ且ツ脾胃ヲ强健  
ニスルノ効アリ予是等ノ場合ヘ「セメン」ヲ用ヒテ  
奇驗ヲ收ムルヲ數カラス分娩ノ後ニ熱モ減セス  
下利モ止マス者ハ柴苓湯ニ宜シ日數過多ニシテ  
後重漸減シタル氏數更衣シテ膿血如魚腦モノヲ

下スヲ多キ者ハ桃花湯千金大桃花湯真人養臟湯  
ヲ撰用スヘシ孕婦ノ痢病モ平人ノ痢病ノ療治ニ  
異ナラサレハ痢病門ヲ參考シテ療スヘシ  
子瘡ハ平人ノ瘡ト同シ「ナレ」氏妊娠ユエ一段煩悶  
ノアルモノナリ又流産スル「アリ」然レ氏痢病ニ  
テ墮胎シタルヨリハ其害少シ治法ハ柴桂湯柴苓  
湯柴胡桂薑湯等ヲ證ニ從テ用フヘシ又瘡門ヲ參  
考スヘシ

婦人子癰子腫子淋子嗽子痢子瘡應用方

桃核承氣湯 三黃湯加辰砂 八味腎氣丸



烏頭湯 芍藥甘草附子湯 猪苓湯加水通車前子  
小青龍麻杏甘石合方 苓甘薑味辛夏仁湯  
葛根湯 黃芩湯加葛根黃連 黃芩湯加半夏生薑  
半夏瀉心湯 紫苓湯 桃花湯 柴胡桂枝湯  
柴胡桂枝乾薑湯 沈香天麻湯 逍遙散  
大防風湯 龍膽瀉肝湯 保命芍藥湯  
瘟疫芍藥湯 檳榔順氣湯 大桃花湯 琥珀湯  
真人養臟湯 羚羊飲 巫神湯 熊參湯 甲字湯

婦人經閉

經閉

崩漏

乳汁不出

經閉ハ百病ノ因トナツテ害ヲ成ス極メテ多シ經  
水ハ月水月經天癸紅鉛等ノ別名アリ其源ハ小腹  
ノ血脈支別シテ子宮ノ裡面ニ入り孕メル寸ハ胎  
兒ヲ營養シ常ニハ無用ニシテ毎月漏下スルナリ  
之ヲ經行ト云フ若シ經閉スル寸ハ其血逆退シ表  
ニ在テハ瘡瘍諸病ト成リ裡ニ在テハ積聚諸病ヲ



成ス女子十三四歳ヨリ經行ニナリテモ初メハ或ハ来リ或ハ斷シ或ハ二三月モ經閉スルアリ是ハ血ノ未タ滿タスシテ致ス所ニテ逆退ノ患ナシ經閉或ハ多血ノ者行期ニ至レハ吐血・衄血スルアリ之ヲ逆行ト謂フ一生經水ヲ見スシテ受胎スル者アリ之ヲ暗經ト謂フ常ニハ經行ナク適来ル寸ハ必ス孕ミ又分娩ノ後再ヒ孕ムマテハ行ラサル者ヲ本邦ニテ「サカイ」ト云フ即チ暗經ノ類ナリ受胎ノ後モ月月行經シテ害ノナキ者ヲ盛胎ト云フ胎ト謂フ受胎ノ後數月ニシテ血大ニ下リ胎ノ

墮チサル者ヲ漏胎ト謂フ妊娠シテ行經スル者ニハ鬼胎ノアルモノナレハ注意シテ視ルヘシ鬼胎ノ事ハ續瘍科秘錄ニ載ス病ニテ經閉スルモ妊娠ニテ經斷スルモ經水ノ留滯シタル意ハ同シコトユエ經閉ニモ少シク惡阻狀ヲ見ス「ア」レハ誤テ妊娠ト為スヘカラス

治法經閉ニテ病ヲ發シタルハ第一ニ甲字湯或ハ加大黃折衝飲桃核承氣湯抵當湯大黃蟄蟲丸ノ類ヲ撰用スヘシ且ツ戸口ヘ坐藥ヲ挿シテ導ク寸ハ早ク下ル者ナリ坐藥マテニモ及ハス中黃左突ノ紙




熱膏ヲ挿シテ可ナリ處女ニ經閉或ハ經水少フシ  
テ乳房焮衝シ諸藥無効荏苒トシテ日ヲ延クモノ  
ハ刺絡シテ小柴胡湯加石膏ヲ與フル寸ハ速ニ消  
散ス經水逆行シテ吐血衄血スル者ニハ刺絡ヲ行  
フヘシ

東郡友部村儀七ノ女年二十經閉スル一僅ニ二月兩  
乳腫脹シテ漸漸ニ大ニ成リ其形冬瓜ノ架ニ掛ル  
カ如シ之ヲ度量スルニ周圍二尺二寸長サ一尺一  
寸ニシテ殆ト膝上ニ至ル乳頭ハ延長シテ己ニ本  
形ヲ失シ一圓ニ赤色ニ變シタレ氏微シモ疼痛ナ

ク唯重フシテ五千錢ヲ帶ルカ如ク又肩背ノ強ヲ  
覺フ寒熱モナク元氣モ常ノ如クナレ氏邪魔ニナ  
リ不自由ニ成レリ其人常ニ屢經閉スル一アリ夫  
モアリタレ氏贅壻ニシテ經閉スル月ノ初メニ離  
別ニナリ又惡阻ノ症モナク妊娠ト決シカ子タレ  
氏余カ歷驗スル所ノ辨胎ノ法ヲ以テ小腹ヲ按ス  
ルニ僅ニ胚胎ノ浮沈スルヲ覺ユ常ノ孕婦ニテモ  
乳房ノ大ニナル者ナレハ此症モ亦妊娠ノ所致ナ  
ルヘシ分娩ノ後自ラ潰ヘ稀水多ク流レテ常ニ復  
シ乳汁モ出ルヤウニナレリ實ニ未曾有ノ奇症ユ



乳脹圖





エ圖ヲ製シテ此ニ附ス

崩漏ハ又血崩<sub>氏</sub>崩中<sub>氏</sub>謂<sub>フ</sub>産後ニ血崩スルハ胞衣ノ分離シタル跡ハ皮ヲ剥キタルヤウニ赤肌ニナリ血脈ノ破レタル處ヨリ出ル血ナリ水ノ如クニ泄下シテ<sub>カマ</sub>廁<sub>マ</sub>モ真赤ニナリ一二升モ出タルヤウニ見ユルモノナリ凝血ノ雞肝ノ如クニ成リテ下ルハ一旦子宮中ニ留滯シテ時ヲ移シタルナリ陣痛スル<sub>ニ</sub>臨産ニ異ナラス卒ニ色ヲ變シ唇舌刮白ニナリ脈沉微四肢微冷自汗如流須臾ニシテ發熱シ數日ヲ經テ熱解スルト雖<sub>氏</sub>脈尚浮弦ニシテ耳鳴

眩暈虚里悸動人迎ノ脈ハ外ヨリ見ユルホトニ動キ起居スル毎ニ呼吸促迫シ後ニハ爪甲薄クナリ或ハ缺ケテ黃胖ノ如クニ變ス即血虚黃胖ナリ産後ニハ限ラス平人モ適<sub>タマ</sub>血崩スル<sub>一</sub>アリ其症候ハ産後ニ發スル者ト同シ<sub>一</sub>ナリ凡<sub>ソ</sub>亡血スル者ハ諸症退キテモ兎角疎慵ニナリ卧ス<sub>一</sub>ヲ嗜ムモノナリ或ハ遂ニ心氣病ニナルモアリ

治法ハ賀川家ニ遇崩ノ術アリ救急ニ備フヘシ西洋ニテ陰門一杯ニ綿絮ヲ螺旋リ入レテ止ルノ法アリ是モ良策ナレ<sub>氏</sub>瘀血漸漸ニ積累シテ小腹ノ急



脹ニ堪ヘサルヲアリ其時ハ一旦綿絮ヲ去ツテ再  
ニ螺旋ヲ入レテ可ナリ血暈ヲ兼タルハ先ツ三黃  
湯若クハ三黃四物合方ヲ與フヘシ漏下ノ止マサ  
ル者ハ第一ニ芎歸膠艾湯若クハ斷紅飲ヲ與ヘ滋  
血散ヲ兼用トス又洎夫監ヲ間服スヘシ下血既ニ  
止ミ唯血虛シテ動悸怔忡眩暈耳鳴等竝起リ黃胖  
ノ如クニナル者ハ八物湯若クハ連珠飲ヲ與ヘテ  
鎮悸丸ヲ兼用トス或ハ微ニ往來寒熱アリ神思悵  
鬱トシテ樂マサル者ハ逍遙散若クハ巫神湯ニ宜  
シ

乳汁不出ハ又乳汁不通ニ云テ虛實ノ二症アリ實症  
ハ乳汁過多ニテ自ラ壅閉ニ出ルヲ能ハスシテ乳  
癰トナルナリ早ク消散スレハ乳汁ノ出ルヤウニ  
ナルモノナレ氏膿ニ成レハ愈テ後モ多クハ出ス  
後ニ再産スルモ亦出サルモノ有リ虛症ハ乳房細  
小ニシテ肥盛ニナラス初メハ少少ツ、出レ氏日  
ニ減少シテ小兒ヲ營養スルニ足ラス是ハ天稟ニ  
シテ治シ難シ

産後初ハ乳汁隨今出テタレ氏二三月或ハ四五月ニ  
至リテ乳汁ノ減少スルハ多クハ早ク房室ヲ犯シ



タル者ニアルナリ諸人身ノ血ハ假令ハ男子ニ  
一斗アルモノナレハ婦人ハ一斗一升ツ、アリテ  
其一升ハ即チ經水ナリ其血妊娠スル寸ハ子宮ノ  
中ニ入りテ胚胎ヲ養ヒ分娩スル寸ハ乳房ニ入テ  
乳ヲ釀シ小兒ヲ養育ス小兒成長シテ乳ノ入ラヌ  
ヤウニナル寸ハ又下テ經水トナルナリ經水ノ下  
ルハ受孕ヲ求ルノ先觸ト知ルヘシ一旦分娩スレ  
ハ先ツ當今ハ妊娠セヌモノユエ春情モ減シ一年  
或ハ二年程ハ經水モ斷テ来ラサルナリ産後早ク  
房室ヲ犯ス寸ハ強テ春竇ヲ動シ又妊娠ヲ促スユ

工經水モ早ク下リテ乳汁ノ減スルナリ産後乳汁  
不足ノ者ヘハ此理ヲ教諭シテ第一ニ房室ヲ禁斷  
セシメ通乳散ヲ服シモサケ酒及モサケ棘モサケ魚モサケ此目魚鰻モサケ  
鯉魚鱖魚ノ類ヲ食用ニスル氏ハ乳汁常ニ復シテ  
多ク出ルヤウニナルモノナリ

婦人經閉崩漏乳汁不出應用方

滋血散局方治婦人勞傷衝任氣虛不能約制其經血或  
暴下謂之崩中或下鮮血或下瘀血連日不止形羸氣  
劣

赤石脂 海螵蛸 側柏各五兩



右為細末每服一錢一日連進三服

通乳方 四春

木通 天花粉 當歸 川芎 白芍藥

生地 王不留行 各等分

右剉一劑用獺猪蹄傍肉四兩煎湯二鍾入藥同服先

將葱湯頻洗乳房

通乳方 四春 治乳汁不通

天花粉 王不留行 甘草 當歸 各三錢

穿山甲 各五錢

右為細末每服三錢猪蹄湯或熱酒調下其乳即通

通乳散 家試下乳汁

當歸 川芎 芍藥 地黃 通草 酸模根

穿山甲 王不留行 各等分

右八味煎服

桃核承氣湯 抵當湯 大黃蟬蟲丸 三黃湯

小柴胡加石膏 芎歸膠艾湯 三黃湯加辰砂

四物三黃湯 八物湯 逍遙散 甲字湯 參連湯

巫神湯 連珠飲 回生散 洎夫藍 中黃 左突



內科秘錄卷之十一



