

新訂  
增補  
和蘭藥鏡

卷四

武 9  
856  
18-4

學	大田	稻早
館	書	圖
庫	文	田
號	一六	一第
		書托寄
號	9	第
冊	2	第
	4	第



武 856  
卷 8-4

榛齋宇田川先生著

二篇

新訂

# 和蘭藥鏡

增補

風雲堂藏版

青葉閣發兌

新澤氏

武 856  
卷 8-4

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷四

遠志

遠志驅水散

遠志驅水酒

遠志解凝煎

清肺遠志煎

遠志昆設爾弗

水楊梅

著

著鐵鎮痙丸

著鐵解凝丸

著蒸餾油

連錢草

清肺和胸飲

豁痰潤肺飲

洞庭藍

清肺定嗽飲

和蘭藥鏡

卷四

標目

風雲堂藏

大正七年九月廿日寄  
內田赤子氏贈

藏書

乙切草 淨汚清肺飲

乙切草油

金花草

茜草

茜根煎

經閉。茜根經驗說

自第一至第十九

附 經閉。用薩毘那經驗說

自第一至第五

龍茅草

山蘿蔔

草零陵香

芸香

芸香水

苦薏

新訂增補和蘭藥鏡卷四

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

遠志

ホレイガウ。セ子ガ 蘭 ○按ニ藥舖

者ナリ○此一種。羅甸名ホレイガウ。アマ

○榕按ニ嘗テ和蘭本草ニ就テ「セ子ガ」ノ形狀氣

味ヲ考ルニ唐遠志ニ髣髴タリ近來洋船ノ「セ子

ガ」ヲ得テ其氣味形質ヲ徴シ始テ遠志ニ確當ス

ル「ヲ得タリ 江戸藥舖大坂屋四郎兵衛清雅云

志ト呼ブ尋常遠志是ナリ其二ハ肉遠志ト呼ブ

增訂和蘭藥鏡

卷四

屈臣氏藥房

利ナリ然<sup>レ</sup>在昔年ヨリ販ク<sup>レ</sup>ヲ禁ス其三八朝鮮  
遠志ナリ朝鮮ヨリ舶來ス唐遠志ニ比スレバ太  
クノ硬シ此即<sup>チ</sup>遠志ノ大葉ノ者ナルベシ其  
四ハ和産遠志ナリ是ハ藥舖ニ出ル<sup>ル</sup>ヲ少ナシ

**試効** 根ヲ藥用トス。但<sup>シ</sup>其中心ハ木様硬固ニシテ味ナ  
ク又効用ナシ是ヲ去リ其表ノ疏脆淡黄ノ肉ヲ用  
ベシ是ニ灰色ノ粗皮被<sup>レ</sup>フ其味初<sup>ニ</sup>微酸ヲ帶ビ。後辛  
熱侵蝕ノ刺戟シ微苦ヲ帶フ。著キ香臭ナシ○衝動  
疏解ノ粘液ヲ驅泄シ。汗ヲ發シ。小便ヲ利シ。虛症、嗽  
衝ノ凝血ヲ疏解ス。但<sup>シ</sup>過服スレバ吐シ或<sup>チ</sup>瀉下ス○  
此藥。水脉ヲ衝動ノヨク小便ヲ利シ汗ヲ發ス。故ニ  
水腫ニ殊効アリ此根一弓ニ水一斤ヲ加<sup>テ</sup>煮<sup>テ</sup>半<sup>ト</sup>ヲ

減シ。半時毎ニ三匙宛服ス。又左ノ二方水腫ニ峻効  
アリ

**遠志驅水散**

遠志 半錢  
海葱 四片

孕礬酒石 一錢  
杜松實油 十滴

右件三味各別細末ノ調和シ。油ヲ研合シ。分テ四服  
トシ二時毎ニ一服宛用フ

**遠志驅水酒**

遠志 細判  
二弓

右硝子壘ニ内葡萄酒一比ヲ加<sup>テ</sup>浸<sup>ス</sup>三日。漉<sup>テ</sup>滓ヲ

去リ一時毎ニ一匙宛服ス○北亞墨利加洲ニハ常ニ遠志ヲ採リ貯テ「ライテルスランガ」一種毒及蝮蛇ノ咬傷毒ヲ解スル奇藥トス。其咬傷ヲ被レバ患者全身ノ血忽<sup>+</sup>凝固シ。發熱。脉數。呼吸不利。促迫。欬ノ痰唾ニ凝血ヲ交ル等。宛モ肺<sup>+</sup>嗽衝。胸脇<sup>+</sup>嗽衝ノ症ノ如クニノ死ヲ免ル者殆ト希ナリ。然<sup>レ</sup>ニ此藥ヲ與テ吐下發汗スルニ至レバ速ニ其毒ヲ驅泄シ。凝血ヲ疏解ノ愈ザル者ナシ。即<sup>チ</sup>此根ノ細末。一<sup>ト</sup>月ヨリ半錢マデ一服トシ數服ス。或水煎シ一時半毎ニ三匙宛服ノ諸症全治スルニ至ル。或是ヲ嚼テ其汁ヲ服シ。或

其創ニ外敷ス○此藥ハ右ノ如ク凝血ヲ疏解ノ胸肺ノ諸症ニ奇効アル故ニ先哲是ヲ推廣ノ肺<sup>+</sup>嗽衝。胸脇<sup>+</sup>嗽衝ニ用テ一種ノ解凝藥トシ其凝血ヲ疏解ノ大効アルヲ發明シ死ニ瀕<sup>カ</sup>キ幾多ノ患者ヲ救活セリ。然<sup>レ</sup>厄斯如キ辛熱衝動ノ藥ハ總テ壯實多血ノ嗽衝病ニハ害アリ。唯患者虛憊シ諸管纖維ノ運營弛弱怠慢ナルニ因テ嗽衝ノ諸症淹滯ノ治セザル者ニ應効アリ。即<sup>チ</sup>煎劑トシ用テ驗多シ。假令バ後方ノ如シ

遠志解凝煎

遠志 剉

三弓

水

三匕

右煮減ノ三分、一トシ一時半毎ニ三匙宛服ス。但此劑辛熱ニシテ患者ニ害アルベキ症ハ遠志一弓、水二匕ヲ加、煮減ノ三分、一トシ與、ベシ或、細末ニシテ對症ノ劑ニ加、丸藥トシ用、モ良。○或云、胸脇焮衝等ニ此藥ヲ用、レバ能、痰ヲ咯シメ胸中ヲ疏潤シ其諸症ヲ緩解ス。又云喘急、膠痰壅盛ノ呼吸不利、促迫苦悶スル症ヲ治スト。但此藥ハ胸肺ノ汚液ヲ驅除シ粘痰ヲ疏解シ凝血ヲ稀釋スル故ニ右ノ諸症ニ優効アルヲ固ヨリ論ナシト。雖モ血液焮衝ノ稠厚トナリ或

焮衝ノ膿様ノ質トナル者ハ此藥適應セズ。凡、此藥ヲ久服スル患者ニ刺絡ヲ施セバ其血厚膜ヲ被、ヘバナリ。焮衝ノ稠厚ナル候トス○或云此藥辛熱衝動ノ性力アル故ニ肺焮衝、胸脇焮衝等ニハ他ノ解凝藥及、清涼下劑ヲ加用、テ多ク効ヲ得。○肺焮衝後、勞欬トナリ或、吐血後其血肺ニ殘留テ勞欬トナリ焮衝ノ症ナキ者。此藥ヲ用、レバ小便多ク利メ汗減シ吐痰増進ノ輕快ヲ致ス者多シ。或云此藥勞欬ニ大効ヲ稱スレ、肺ニ膿瘍アリテ焮衝ヲ兼ル症ハ必不害アリ。○粘痰多キ勞欬、焮衝ノ諸症ナキ者ハ

此藥ニ依蘭苔ヲ加用テ効多シ○或云勞欬様ノ症  
 ニ此藥ヲ用テ悉ク良効ヲ得ルニ非ズ勞効ニ効功  
ナキニ非ズ  
 ト雖モ熱多ク嗽衝ヲ帶ビ脉強盈ナル症ニハ適應  
 セズ故ニ此症殊ニ審察ヲ加用ルヲ專要トス原註  
 唯痰唾ニ膿様物ヲ雜甚々膠粘ナルガ爲ニ略出シ  
 易カラズ且食欲ヲ失症ハ左ノ煎劑或遠志昆設爾  
 弗ヲ依蘭苔和胸劑出共ニ次ニ加用テ多ク良驗ヲ得タリ

清肺遠志煎

遠志 二割寸

甘草 六割錢

右遠志ニ水一斗半ヲ加煮ル八分時ニノ甘草ヲ  
 加浸一十六分時瀝テ滓ヲ去リ聽用ス

遠志昆設爾弗

遠志 一割錢半

甘草 舍利別一寸

右調和シ一時半或二時毎ニ一錢宛服ス是ヲ服メ  
 吐瀉多尿等ヲ發スルナシ

甘草蘭苔飲

是依蘭苔和  
胸劑ナリ

方名 依蘭苔ノ條ニ出ツ

卷二十七ノ  
二十四葉

○遠志ハ解疑ノ殊効アリテ能痰ヲ豁ノ略出セシ  
 ム故ニ粘痰多キ胸肺病ノ嗽衝ナキ症ニ良効ヲ奏  
 シ又傷冷毒ノ咽喉焮腫ニハ此藥ノ泡劑ニ民埜列  
 利精ヲ加服ノ殊効アリ○冒寒傷冷毒ノ嗽衝熱解

散スレバ其他諸症淹滯ノ治セザル者或遷延性ノ傷冷毒痛。痛風。脚痛風等ニ是ヲ用レバ其解凝ノ効ニ由テ發汗利尿痰唾等ヨリ病毒ヲ排泄ノ治ス○赤斑熱。痘瘡。麻疹等夥ク發見スレバ其脉虛弱ニノ元運力充張セズ。動スレバ潛伏内攻ノ危篤トナルベキ症ニ此藥ヲ水煎シ用レバ能其鬱毒ヲ宣發ノ諸竅ニ排泄ス○服量未ハ半刀ヨリ一刀マデ日三四次或一時毎ニ用フ煎劑ハ此根一弓ニ水十弓或一比ヲ加煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ桂露等香竈ノ飲液ニ一匙宛加服ノ一晝夜ニ一劑ヲ盡ス。是ニ由テ

吐瀉等ノ瞑眩ナシ然レ尚其味ヲ惡ム者ハ此劑ニ水二比ヲ増加ヘ煮テ用ベシ。或其症ニ隨ヒ幾那ヲ加用ベシ通例煎劑尤効アリ或細末トシ蜜ヲ加テ煉膏トシ一二月宛用フ或對症ノ煉膏ニ加用ルモ良依福括 僕叔淑

水楊梅 ダイコンサウ俗稱 カレイヲヘ イルラタ羅 ナゲルコロイト蘭

試効 根ヲ藥用トス。辛温芳香收瀝。氣味丁香ノ如シ。其收瀝質ニ亞的兒樣油及苦味鹽ヲ含リ○神經。心胃ヲ温壯强健シ稍發汗利尿ノ効アリテ壯神ノ一



良藥トス○痙攣ノ運動ヲ鎮メ諸管纖維ノ弛虚緩弱ニ因ル諸症ニ良効ヲ奏シ風氣ヲ驅リ疝痛ヲ治ス○強壯スル効力ヲ以テ神經熱ニ効多シ又腐敗熱ニ用ヒ或間歇熱ノ良藥トシ多ク治驗ヲ稱ス總テ幾那ノ的當スル諸病其他發歇往來定期アル諸症ニ殊効アリ○經久下利及赤痢ノ虚症ヲ治シ婦人崩漏白帶下嘔血等失血過多ヲ止ム○瘰癧毒諸症失苟兒陪苦及大ニ潰爛セル膿瘍等ニ試効多シ○服量細末ハ半錢ヨリ一錢ニ至ル或丸藥煉藥ニ加用ヒ或此根一弓ヲ燒酒ハ弓ニ浸メ藥氣ヲ出シ

一匙宛服スル一日三四次或此根一弓ニ沸湯ハ弓ヲ加泡劑トシ服ス或此根一弓半ヨリ一弓許ヲ水十六弓ニ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去半時毎ニ一匙宛服ス此藥多ハ揮發強壯劑ニ加用テ良功ヲ奏ス

依叔 叔福

薯

ハゴロモサウメドキノコギリサウ俗稱  
レホリウム羅 デウイセンドブライド蘭

試効 莖葉花共ニ藥用トス稍香氣アリ温煖強壯ニシ惡液ヲ淨刷ス○鎮痙止痛ノ一良藥トス故ニ痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症心腹痛風氣痞滿疝痛産後腹痛及經閉ヨリ發スル痙攣諸症ニ殊効ヲ奏ス○

腹部諸藏ノ壅塞ヲ開達シ其壅塞ヨリ發スル痙攣諸症及結石壅塞ヨリ發スル痙痛ヲ治ス○脾病依剥昆垓兒<sup>ホコシデレ</sup>神志鬱憂病等ノ痙攣諸症ハ此藥極テ効驗アリ○肺藏虛弱ヨリ發スル遷延ノ欬嗽喘急ニ良驗ヲ稱ス但<sup>レ</sup>嗽衝ヲ兼ル症ハ害アリ○此藥收瀰ノ効アル故ニ諸失血及諸竅ノ脱泄ヲ止ム○婦人處女孕婦産婦ノ崩漏ヲ止ルニ多ク用フ是ニ腹内諸藏ノ壅塞ヲ兼子或子宮衝逆様ノ痙攣諸症ヲ兼ル者ハ殊ニ的當トス○處女月經調順セズ或過多或稀少ノ症ハ此藥ニ加密列<sup>カミラレ</sup>默栗薩<sup>ノリツサ</sup>捲垓兒<sup>ケシデレ</sup>等ヲ加

用テ適應ス○吐血ノ症體稟薄弱或各部虚損シ或神經攣急ヨリ發シ或痔血月經壅滯ヨリ發スル者ハ皆此藥的効アリ嘔血下血赤痢等亦是ニ同シ○打撲壓傷等ノ外因ヨリ發スル吐血亦良驗アリ殊<sup>ニ</sup>亞兒尼加<sup>アルニカ</sup>ヲ加用レバ脉管外ニ泛溢セル血ヲ管中ニ喻收<sup>メ</sup>ノ其傷消散ス○痔血過多ニ用テ亦良驗アリ或盧會及解凝鹽類ノ下劑吉利詞<sup>キリス</sup>參兒<sup>サイル</sup>等ヲ過用ノ痔血大ニ脱泄スルヲ治ス痔血過泄ノ止サレバ患者漸ク虚衰シ終ニ萎黃病水腫トナリ治シ難キニ至ル○白帶下漏精淋疾ヲ治ス○下利屢發ノ止

ス宿疾ノ如クナル症ニ此藥驗多シ○著越幾斯劑  
トシ製法蒲公英越幾用テ前說ノ諸病ニ良効ヲ稱  
ス。殊ニ痙攣ノ諸症ヲ兼ル病ハ鎮痙強壯藥ヲ加  
テ尤驗アリ假令タトヘ後方ノ如シ

著鐵鎮痙丸

- 著越幾斯劑 四錢
- 阿魏 一錢
- 格碌屈私末爾扶斯名 四錢
- 鹿角鹽 二錢

右各別細末シ調和ノ三匁ヲ一丸トシ一時毎ニ二  
丸宛服ス○脾病神思鬱憂病。痙急内藏壅塞。蟲症ヲ  
兼ル等ハ左ノ丸藥奇効アリ

著鐵解凝丸

- 阿魏 三錢
- 撒兒末爾扶斯名 各一錢
- 著越幾斯劑 各一錢
- 盧會 各一錢

右各別細末ノ調和シ六匁ヲ一丸トシ十丸宛服ス  
ル七日二次又諸蟲ヲ殺シ驅泄ス。諸蟲症ニ用テ峻  
効アリ○此藥水煎。泡劑散劑トシ用テ皆良○衄血  
斷。出血ヲ止メ或斷ノ焮腫及潰瘍ヲ治シ或齒痛ヲ  
止ルニ水煎若ハ泡劑トシ含漱シ或末トシ患處ニ  
摻メ良○外敷メ諸創傷潰瘍ヲ愈シ。出血ヲ止ム汚  
穢腐爛ノ瘡瘍惡厲ノ創傷潰爛甚キ症或寒熱壞疽

等ハ對症ノ藥草ニ加蒸湯劑トシ或、ムシクスリ琶布バツトシ貼メ殊ニ良

**著蒸餾油**此油殊ニ花ニ多シ。製法薄荷油ト同シ名

此油數滴ニ沙糖及酒石英少許ヲ研和シ服メ痔血過多ヲ止ルニ捷効アリ依福伍 叔叔

連錢草

ガキトヲシ俗稱「ヘデラテル」レストリ「アールドヘイル」蘭

**試効**莖葉共ニ藥用トス温煖開達強壯ニ稍收瀋シ創瘍ヲ愈シ殊ニ粘稠惡液ヲ淨刷ス亞兒加利鹽アリテ酸敗液及膠固ノ粘液ヲ淨刷ス性功大抵洞庭藍ノ如シ○内藏壅塞ヲ疏解シ肺腎

等ノ汚液ヲ祛ク○冒寒欬嗽痰欬濕喘等ノ肺病ヲ治ス○勞效様ノ胸痛欬嗽肺傷勞效ニ殊効ヲ稱シ肺瘍ニ用テ敗液ヲ除キ創瘍ヲ愈シ治ス和胸藥草ニ加泡劑或煎劑トシ或細末トシ用ヒ或一味泡劑トシ沙糖若ハ白蜜ヲ和シ甘美トシ與フ○乾效勞嗽ニ此藥ヲ葡萄酒ニ浸シ長服ノ驗アリ黠失刺護及洞庭藍ヲ加テ殊ニ良○熱病及勞瘵様ノ患者血中酷厲毒アリテ肺ヲ侵刺シ欬嗽荏苒トメ休マズ或肺瘍ノ欬嗽呼吸不利等ハ後方ヲ良トス是技爾撒謨様ノ性効アリテ創瘍ヲ愈シ内熱ヲ涼解シ汚

液ヲ清刷シ且、大小便ヲ通利ノ殊効ヲ奏ス

清肺和胸飲

連錢草 二握

甘草 剉 二弓

右大麥煎ノ沸湯八比ヲ加、浸一、一時半ニノ滓ヲ去、次ノ藥ヲ加フ

白蜜 六弓

消石 六錢

右攪和シ日常飲料トス。是ヲ服ノ下利スル者ハ消石ヲ去ル○久効痰血及肺瘍等ニ左ノ方亦効多シ

豁痰潤肺飲

連錢草 二握

洞庭藍

龍牙草

七切草

各等分

右調勻シ泡劑トシ日常飲料トス○小兒虛羸勞瘦、偃僂等ハ先、輕キ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ淨刷ノ後此藥一味細末トシ半錢ヨリ二月許。毎朝空心ニ用テ亦良効ヲ稱ス○痛風脚痛、腎痛等ニ是ヲ煎劑或泡劑トシ多服ノ其惡液ヲ排除シ治ス○赤痢ニ効多シ下利下血吐血等亦良○肝脾等ノ壅塞ヲ疏解シ黃疸ヲ治スルニ水煎シ服ノ効アリ

物叔 斷伍 儀

洞庭藍

江戸花戸稱、ハマトラノヲ俗稱、ハロニカ羅、マレンプレイス蘭

試効葉ヲ藥用トス。微苦收瀋シ茶味ヲ帶ブ。然レ凡ク  
 氣ナシ○淨刷。清血。發汗。利尿。止痛ノ性功アリ○胸  
 肺汚液ヲ淨刷シ。弛弱ヲ強壯シ。創ヲ愈ス。對症ノ劑  
 ニ加。泡劑或、水煎シ服ス○欬嗽喘急。肺傷乾欬。吐血  
 肺瘍ヲ療ス○欬嗽喘息吐血勞欬等ノ初發ニ左ノ  
 方甚ダ驗アリ

清肺定嗽飲

- 洞庭藍 二握
- 連錢草 一握
- 依蘭苔 各半握
- 點失刺薺 名
- 蕁麻葉 各半握
- 土木香 四錢

甘草 一握

右件到。調和シ一撮宛取テ泡劑トシ一二碗宛服ス  
 ル。日。兩三次○痛風。傷冷毒ノ諸症及頭痛等ニ泡  
 劑トシ服メ血液ノ衝動ヲ抑制シ頭ヲ清爽シ鬱毒  
 ヲ排除ス○内藏壅塞。脾病黃疸等ニ良効ヲ奏シ惡  
 液病。疥癬等ヲ治ス。是皆血中ノ惡液ヲ排除スルニ  
 因ル○内外汚穢。潰瘍創傷ヲ淨刷シ治ス○乾葉ヲ  
 水煎或、泡劑トシ或、散劑トシ服シ或、細末ニ舍利別。  
 若、ハ蜜ヲ和シ煉膏トシ或、蒸餾メ露水ヲ取り或、舍  
 利別トシ服メ前說ノ諸症ヲ治ス

依叔 伍

乙切草 俗稱「イッヘリコム」羅「シントヤンスコロイド」蘭

試効 花穂ヲ用フ温煖疏解シ<sup>バ</sup>爾撒謨<sup>ル</sup>様ノ油ヲ含收斂ノ劑ヲ愈シ凝血ヲ散ス○酷厲液ヲ緩解シ和胸ノ良藥トス。欬嗽聲嘎。肺傷勞欬ヲ治シ。吐血。下血等諸脫泄ヲ療ス。葡萄酒ニ浸シ服メ殊ニ良○勞瘵様ノ欬嗽及肺瘍ニ後方間良効アリ

淨汚清肺飲

乙切草 穂

點失刺趨トシラゴ

山蘿蔔

各一握

甘草

一弓

右泡劑トシ適意ニ飲服ス○内藏壅塞。神思鬱憂病。依<sup>イ</sup>剝<sup>ボ</sup>昆<sup>コン</sup>埤<sup>デ</sup>兒。子宮衝逆等ヲ解散シ。又是ヨリ發スル精神錯亂ヲ治ス○小兒搐搦ニ花ノ末十匁ヨリ十五匁マデ毎日兩次。乳汁等ニテ用ヒ治驗多シ○胃腸ノ蛇蟲ヲ殺ス此藥水煎メ服シ或搗爛ノ腹部ニ貼ス○乳汁凝固ヲ稀釋シ。婦人乳房結核ヲ消ス○利尿ノ効アリ故ニ間<sup>マ</sup>黃疸水腫ニ殊効アリ○花穂ヲ細末トシ一錢ヲ服ス。或一握ヲ取り沸湯ニ泡出シ或水煎シ或麥酒或葡萄酒ニ煮テ服ス

乙切草油 製法 花穂ヲ採陰乾メ製ス其法加<sup>カ</sup>密<sup>ミ</sup>列<sup>レ</sup>煎

油名ト同シ。此油血紅色ナリ。**試効**外敷ノ秀偉ノ愈創藥トス。技爾撒謨様ノ効アリテ創傷潰瘍ヲ愈シ膿ヲ排ヒ肉ヲ生シ。又凝血ヲ散シ打撲傷殊ニ神經傷。肢節顫振ヲ治シ或痛風脚痛等ニ擦テ痛ヲ止ム。  
依物  
叔叔

金花草

又「秋ノキリンサウ」共ニ花名「ソリダゴ」  
ヒルガアウレア 羅 ギルデン ルデ 蘭

**試効**葉温煖開達。微收瀘ス。○愈創ノ殊効ヲ稱ス。内  
 外創傷潰瘍瘻瘡並ニ斷ノ腐壞咽喉口中潰爛等ヲ  
 淨刷シ愈スニ用フ。○吐血下血赤痢下利ヲ止ム。○

利尿ノ効アリ。小便閉ヲ通シ腎膀胱ノ結石ヲ碎キ。  
 腎痛石淋ヲ療ス。○肝脾ノ壅塞ヲ疏解ス。○水煎泡  
 劑或細末トシ服ス。  
叔叔  
伍

茜草

アカ子和名 リッピア ティン  
キトリ ハ 羅 マイ カラ ラ プ 蘭

**試効**根ヲ藥用トス又赤色ノ染料トス。○性温味帶  
 苦。收瀘解凝利尿ノ効アリ。故ニ肝脾腎子宮ヲ淨刷  
 シ脾病。黃疸水腫。諸腺腫ニ用テ一種ノ疏解開達ノ  
 良藥トス。肝脾壅塞ノ諸症ニ此藥水煎或泡劑トシ  
 用テ治驗ヲ稱ス。○打撲損傷及内部創傷ニ用テ凝



血ヲ散シ痛ヲ止メ捷効ヲ奏ス。水煎シ或葡萄酒若  
 ハ麥酒ニ浸シ或燒酒ニ浸シテシキ丁幾劑トシ用フ○或  
 云。此根ヲ内服スレバ小便及婦人乳汁赤色トナリ  
 終ニ諸骨亦赤色トナル。是ヲ以テ諸骨病ニ用テ奇  
 効アリ或云是ヲ久服スレバ諸骨軟柔○小兒佝僂  
 病ニ此根ヲ試用テ四年。總テ殊効ヲ得タリ即後方  
 經驗ノ良劑トス

茜根煎

茜根

二錢

橙皮

乾者 十片

茴香

搗碎者 十五片

右細剉三磁罐ニ内水六比ヲ加、煮減メ二比トシ。冷  
 定ノ上清ヲ取硝子壘ニ收メ一日ノ服量トス小兒  
 諸骨漸柔軟痿弱ノ舉動シ難ク或諸骨既ニ彎屈ス  
 ト雖他ノ惡症ナキ者ハ是ヲ用テ回復ス。宜此煎劑  
 ニ蜜ヲ適意ニ加與ヘ且乳母モ亦服セシムベシ若  
 大便祕閉或下利腹脹等ノ患アルキハ各其對症ノ  
 藥ヲ加ベシ但此劑數月連服セザレバ良効ナシ羅  
 ○經閉茜根經驗說 茜根ハ經閉ニ峻効アル  
 藥トス。數是ヲ試用ルニ性効尤平穩ニ他ノ通經  
 藥ノ如キ攻撃驅泄ノ害ナシ即其質驗說ヲ左ニ舉

第一 一婦人十八歲。經閉二個月。發熱。惡心。腹部風氣痞脹。腕脚疼。顫振。脉八十八動。脉動說名幾那條註ス脉力平常ニ異ナラズ。此症先吐劑ヲ與、吐セシメテ胃ヲ淨掃シ。茜根末半錢宛用<sub>レ</sub>テ日四次。連用六日。ニ月經來リ止ザル<sub>レ</sub>テ二日。

第二 一婦人三十四歲。經閉七個月。子宮衝逆ノ諸症ヲ發シ又時々神思憂悶ノ症ヲ患<sub>レ</sub>テ精神錯亂ヲ兼<sub>ス</sub>。因テ孕鹼酒石ヲ用ヒ。次ニ阿魏ノ丸藥ヲ與ル<sub>レ</sub>テ都<sub>ス</sub>テ十八日ニノ顯功ナシ。乃茜根末二刀宛用ル<sub>レ</sub>テ日三次。連服三日ニノ月經來ル<sub>レ</sub>テ四日。是ヨリ諸症漸

退キ爾後月經調順ナリ

第三 一婦人二十三歲。寒氣ニ冒觸<sub>レ</sub>テ經閉ヲ患<sub>レ</sub>テ既ニ五年。其症頭痛。惡心。胃部痞滿。拘痛。渴アリ。肋中疼。肢體懈惰。白帶下。大便秘結。不寐。稍勞動スレバ呼吸短促ス。脉七十動ニノ弱。此症先吐劑ヲ與、テ胃ヲ淨掃シ。茜根末半錢宛用<sub>レ</sub>テ日四次。次ニ一錢宛用<sub>レ</sub>テ。是ニ由テ脉進マス。渴増サズ。連用十日ニノ月經來ル<sub>レ</sub>テ四日。翌月亦月經前月ヨリ多シ

第四 一婦人二十二歲。寒氣ニ冒感<sub>レ</sub>テ經閉ヲ患ル<sub>レ</sub>テ二個月。頭痛。惡心。胸腹痛。欬嗽。脚冷ヲ兼ヌ。此症先吐

劑ヲ用ヒ次ニ通經ノ數方ヲ投スレ<sub>レ</sub>凡皆効ナシ。終ニ茜根末ヲ與ル<sub>レ</sub>一日四次。連用十四日ニ<sub>レ</sub>月經來ラズ。然<sub>レ</sub>凡諸症盡ク解散ス<sub>ル</sub>故ニ患者服藥ヲ厭<sub>レ</sub>ヒ治療ヲ休ム

**第五** 一婦人二十一歲。二年以來月經甚<sub>ク</sub>稀少。二個月以來經閉シ。頭痛惡心。頭眩暈。噫氣。胃中酸敗液ノ症ヲ兼子渴アリ。因テ先<sub>ツ</sub>吐劑ヲ與テ吐セシメ。次ニ幾那及撒兒末爾扶斯名ヲ用ル<sub>レ</sub>數日ニ<sub>レ</sub>患症荏苒。是ニ於テ茜根末ヲ與ル<sub>レ</sub>四日ニ<sub>レ</sub>諸症解散ス。然<sub>レ</sub>凡月經通セズ

**第六** 一婦人二十六歲。經閉一年許。胃中疼<sub>ミ</sub>是ヲ按<sub>セ</sub>ハ増劇シ。效甚<sub>ク</sub>又吐血スル<sub>レ</sub>二十日許。脉八十動。頗ルカアリ。因テ先<sub>ツ</sub>刺絡ヲ施シ。胃部ニ吸角ヲ貼シ。次テ答末林度ヲ用ヒ調治八日許ニ<sub>レ</sub>茜根末半錢宛用<sub>レ</sub>一日四次。漸ク加テ一錢ニ至リ諸症漸ク退キ是ヲ連服スル<sub>レ</sub>九日ニ<sub>レ</sub>子宮ノ部疼<sub>ミ</sub>頭痛ヲ發ス。翌日月經來リ二日連蘇ス

**第七** 一婦人三十六歲。經閉ヲ患<sub>レ</sub>四個月。小腹痛脹。嘔噦。大便秘結。子宮衝逆ノ症ヲ兼子。脉百動。因テ阿魏ヲ與ル<sub>レ</sub>數日ニ<sub>レ</sub>効ヲ得ズ。是ニ於テ茜根末半

錢宛用<sub>レ</sub>一日三次連服三日ニノ月經來ル

第八一婦人三十一歲。產後月經ナク二個月許ノ後。劇キ熱病ニ羅<sub>カ</sub>リ頭痛惡心。胃部痞硬。背及左肋劇痛。シ夜中脚痛浮腫。白帶下。肢體顫振。脉百六動。因テ茜根。末半錢宛與<sub>レ</sub>一日四次。漸ク加<sub>テ</sub>一錢ニ至リ。連用七日許ニノ右乳房刺痛ニ堪<sub>ズ</sub>。因テ此劑ヲ休<sub>メ</sub>ノ刺絡ヲ施ス<sub>ト</sub>五回。十日許ヲ經テ再ビ右ノ劑ヲ用ヒ連用十日許ニノ每次<sub>イッモ</sub>月經前ニ患ル諸症發見ス。然<sub>レ</sub>此時劇キ嘔吐ヲ發<sub>メ</sub>藥劑ヲ服スル<sub>ト</sub>能<sub>ハ</sub>ザル故ニ此劑ヲ休<sub>ム</sub>

第九一婦人二十八歲。經閉三個月。頭痛惡心。冷汗。脚

ニ水腫ヲ發シ。背腕疼ヲ兼子。脉力平常ノ如クニノ百四動。薩毘那<sub>名</sub>末ヲ用<sub>テ</sub>十日ニノ効ナシ。次茜根末一錢宛用<sub>テ</sub>一日四次亦効ナシ。又甘汞。鐵屑ノ丸劑及健質亞那越<sub>名</sub>幾斯劑等ヲ用<sub>テ</sub>數日。總テ寸効ナシ。第十一婦人十八歲。經閉五個月。頭痛。耳鳴。テ聽<sub>ヘ</sub>難ク。子宮部疼<sub>ミ</sub>。脉八十四動。乃刺絡ノ瀉血スル<sub>ト</sub>九<sub>ノ</sub>許。其血焮衝ノ候<sub>血凝固ノ沕<sub>レ</sub>云<sub>アリ</sub></sub>。次ニ茜根末半錢宛用<sub>テ</sub>一日四次。其後二月宛與<sub>ル</sub>五日ニノ月經來<sub>レ</sub>リ

第十一 一婦人二十三歲。熱病後。月經延滯二週許。是  
ニ茜根末一錢宛用ル。日四次。連服十四日。ニノ効  
ナシ

第十二 一婦人二十一歲。體稟多血。經閉一年許。惡心  
胃痛。痞脹。食進マズ。脊推疼。右踝腫起。肢體勞倦  
ス。是ニ刺絡ヲ施シ其血。焮衝ノ候アリ。次ニ吐劑ヲ  
與ヘ吐セシムル。一回。次ニ茜根末一錢宛用ル。日  
四次。但時々嘔氣ヲ發メ服シ易カラズ。然レ是ヲ用  
ル五日。ニノ月經來ル

第十三 一婦人十九歲。經閉二月餘。且傷冷毒樣ノ遊

走痛ヲ發シ發汗甚ダシ。脉九十六動。是ニ刺絡ヲ施  
ス。兩三次。其血質平常ト異ナラズ。乃茜根末半錢宛  
與ル。日四次。其後一錢宛用フ。又其疼甚キ部ニ芫菁  
發泡膏ヲ貼シ右ノ劑ヲ用ル。十四日。ニノ月經來ル

第十四 一婦人三十六歲。經閉三年。ニノ其間暫ク熱  
病ニ罹レ。今既ニ回復ス。乃茜根末一錢宛與ル。日  
四次。連用八日。ニノ月經來ル

第十五 一婦人十八歲。經閉六個月。邇來搐掣ヲ發ス  
ル。日兩三次。又子宮衝逆ノ症ヲ兼ヌ。因テ亞的兒  
ヲ取り四茶匙宛用ル。日四次。即搐掣並ニ子宮衝逆

ノ諸症解散ス。因テ茜根末二刀宛用<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>四次。翌日一錢ヲ一服トシ四服ヲ患者ニ與<sub>テ</sub>四次ニ用<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>ヲ示ス。然<sub>レ</sub>ニ患者誤テ是ヲ一頓ニ服ス。然<sub>レ</sub>ニ瞑眩ノ候ナク。其次日。月經來ル

**第十六** 一婦人二十二歲。經閉一月半許。從前熱病ニ罹<sub>リ</sub>脉百動。乃<sub>チ</sub>茜根末一錢宛用<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>四次。連服十四日ニ<sub>メ</sub>仍<sub>ナホ</sub>月經ヲ見ズ。故ニ後服ヲ止ム

**第十七** 一婦人二十五歲。六箇月中月經一回來リ。且<sub>ニ</sub>炊腫眼ヲ患フ。因テ刺絡スル<sub>二</sub>日<sub>一</sub>兩次ニ<sub>メ</sub>茜根末二刀宛與<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>四次。續用十日ニ<sub>メ</sub>月經來ル

**第十八** 一婦人産後。其兒ヲ乳養スル<sub>二</sub>日<sub>一</sub>三年。其夏乳養ヲ絶<sub>ツ</sub>ト雖<sub>モ</sub>仍<sub>ナホ</sub>月經來ラズ。至<sub>ル</sub>。因テ茜根末半錢宛用<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>四次。其後一錢宛用<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>八日ニ<sub>メ</sub>月經來ル

**第十九** 一婦人二十一歲。經閉四個月。爾來毎月吐血スル<sub>二</sub>日<sub>一</sub>數日。因テ刺絡ヲ施シ綠礬精及消石劑ヲ用<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>八日。次ニ茜根末半錢宛用<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>三次。其後一錢宛與<sub>レ</sub><sub>二</sub>日<sub>一</sub>四次。續用十四日ニ<sub>メ</sub>月經來。爾後吐血止ム

○右經驗說ヲ觀レバ患者十九人ニ<sub>メ</sub>此藥ノ効ヲ得ル者十三人。其餘モ亦他ノ患症アルガ爲ニ全功

ヲ奏セザルガ如シ即第四第五ハ經閉治セザレハ其患症悉ク治スル故ニ此藥ヲ止ム第八ハ此藥ヲ吐スル故ニ功ヲ成<sub>レ</sub>テ能ハズ第九ハ水腫ニ因テ通經藥ノ功ヲ得ズ第十一ハ熱病ニ因テ藥効ヲ妨ク第十六亦既ニ熱病ヲ患ヒ脉仍數ニモ宛モ勞瘵熱ノ如シ故ニ右ノ三症ハ先其當時ノ病全治スルニ非レバ通經藥モ効ヲ奏スル<sub>レ</sub>テ能ハズ然レ唯是ヲ右ノ患者ニ歷試シ其症ニ隨ヒ當否アル<sub>レ</sub>ヲ曉了セシメン爲<sub>メ</sub>ノニ○又右經驗說ヲ考ルニ經閉ノ年月久キ者及病性險重ナルガ如キ症ハ却テ其藥効

切實ニメ治シ易キガ如シ即第一第十三ハ經閉二個月第七第十九ハ四個月第十ハ五個月第十五第十七ハ六個月第二ハ七個月第六第十二ハ一年第十四ハ三年第三ハ五年就中第六第十九ハ吐血ノ症アリ然<sub>ル</sub>ニ其効驗ナキ症第十一ハ二週第十六ハ一月半第四第五第八ハ二個月第九ハ三個月經閉ス○患婦ノ體稟ニ隨テ焮衝性ト粘液性トノ病アリ凡焮衝性ノ症ハ酷厲ナル通經藥ハ大害アリ薩那類故ニ通經藥ハ病性ヲ辨識ノ用ニ非レバ効ナシ然<sub>ル</sub>ニ茜根ハ病性ニ拘ラズ投メ効アリ即第六第十

〔二〕第十七 第十九 ハ皆焮衝性ノ甚者ナリ故ニ刺絡ノ功アリ 第二 第三 第七 第十四 第十五 ハ焮衝性ト相反對ノ粘液性ノ症ナリ然レ皆茜根ヲ用テ全功ヲ得タリ其他不治ノ症 第八 ハ焮衝性ノ病ニ屬ス 第四 第五 第九 ハ毫モ焮衝性ノ候ナシ其餘ハ皆右兩性ノ中間ニ屬スル症トス凡、經閉ハ焮衝ナキ者多シ○茜根ハ焮衝ヲ兼ル症ニ用レレ是ヲ増劇セズ。脉ノ數勢ヲ進起セズ。曾テ焮腫眼ヲ兼ル經閉二人ニ是ヲ試用ニ毫モ其焮衝ヲ増加スルナシ○ 第六 第十九 ノ如キ失血アル症ハ熱性酷厲ノ通經

藥 薩那ノ類

ハ的當セズ。然レ是ニ茜根ヲ與レハ吐血止之。並ニ發熱渴等ノ症減ノ月經通ス。或、經閉治セザル者モ兼症退テ必モ患者ニ損害ナシ。即チ 第四 第五 ノ症ノ如シ。故ニ此藥ハ焮衝ヲ増サズ減セズノ効ヲ爲スト知ベシ○或云。茜根ハ收瀉ノ性能アルニ由テ通經ノ殊効ヲ致ス。猶鐵劑ノ如シト。然レ此說。著實ナラズ。此藥ハ唯刺戟衝動ト收瀉トノ兩効ヲ兼ル者ナリ。試ニ茜根浸劑ニ撒兒末爾扶斯ヲ加ルニ黑色ヲ見ス。ナシ是甚キ收瀉ノ質ナキ候ナリ○此藥。焮衝ヲ兼ル諸症ニ用テ妨害ナシ故



ニ強壯スル効ナキト明白ナリ。然レニ**第五**ノ症ノ如キ幾那ヲ用テ効ナク茜根ヲ與テ諸症解散スルハ是強壯藥ノ如シ。是ヲ考究スルニ茜根ハ脉管質ニ効ヲ爲サズ。又通泄ノ諸器ニ一ニ變化ヲ爲サズ。唯神經質ト諸液質ニ其効ヲ致シ。殊ニ子宮神經ヲ衝動ノ月經ヲ通スル一種ノ奇藥トス。是猶吐藥ハ胃ヲ刺戟シ下劑ハ腸ヲ衝動シ利尿藥ハ腎ニ侵入スル等。各部一處ニ限リテ殊効ヲ見ス者ノ如シ。若然ラズノ全軀諸器一般平等ノ効力ヲ致スハ右ノ**第六****第十九**ノ症ニ用テ必ズ肺胃ノ諸管ヲ刺戟

シ逾其吐血ヲ増發スベキナリ。然レハ體中他ノ諸部ニ効力ヲ爲ス甚緩慢ニ獨リ子宮ニ雄偉ノ變化ヲ致シ駿速ノ排除ヲ爲スト殊ニ奇異ナリトス。○處女未ダ月經ヲ見ズノ久ク經閉スル者ハ間險症アリ。是或生涯月經ナキ者アリ或天賦ニ因テ子宮腔等通經ノ道路生合閉塞シ或子宮ノ形體常資ニ違或體中諸器患害アルヨリ來ト數屍體ヲ剖解メ見聞スレバナリ。○通例細末半錢宛日三次。二日用次ニ二夕宛日三次與へ。兩三日連用メ効ナキ片ハ一錢宛日四次用ベシ。是ニ由テ胃中ニ重滯セズ。泡

劑煎劑ニ比スレバ簡便トス○此藥的當スレバ大抵服後第三日ヨリ第十二日マデノ間ニ月經通ズ是ヨリ遲延スル者稀ナリ○薩毘那<sup>サビナ</sup>モ亦專ラ子宮ヲ衝動スル通經ノ峻藥ナレ<sup>レ</sup>茜根ニ比スレバ性味酷烈ニシテ大ニ刺戟シ過用スレバ崩血ヲ發シ孕婦ハ墮胎ス然<sup>レ</sup>在半錢ヲ一次ニ用<sup>レ</sup>レバ妨害ナクノ經閉ニ捷効アリ但<sup>シ</sup>甚ダ刺戟衝動ノ血ヲ驅逐シ功ヲ成ス故ニ茜根ノ性功ト同ジカラズ因テ其經驗說ヲ左ニ舉テ參攷ヲ資ク

第一 一婦人二十二歲經閉二個月肢體顫振及子宮

衝逆ノ症ヲ兼ヌ因テ刺絡ヲ施シ吐劑ヲ與ヘ次ニ芸香末ヲ用テ衝逆快治ス然<sup>レ</sup>在月經來ル<sup>ル</sup>ナシ因テ縛股法ヲ施シ股動脈ヲ壓止スル<sup>ル</sup>半時許縛<sup>股</sup>帶<sup>ニ</sup>ヲ施シ脚ニ循行スル動脈ノ血ヲ阻遏<sup>ス</sup>是ヲ子宮動脈ニ循行セシムルナリ是ニ由テ眩暈呼吸促迫背及子宮ノ部<sup>ニ</sup>攣急疼痛ノ煩懣シ脉百三十動許次ニ薩毘那<sup>サビナ</sup>末半錢宛用<sup>テ</sup>一日兩次續用四日ニ月經來リ二日連絲タリ

第二 一婦人二十三歲經閉六個月頭痛腹部風氣痞脹食消化シ難ク且<sup>ツ</sup>酸敗液ノ症ヲ兼子脉六十八動ニ弱先是ニ吐劑ヲ用ヒ次ニ鐵屑ト健質亞那<sup>ケンシツアナ</sup>越<sup>エ</sup>

幾斯劑ノ丸藥ヲ用ル<sub>レ</sub>十日ニメ効ナシ。因テ薩毘那末一<sub>ナ</sub>月宛與<sub>レ</sub>一日<sub>ニ</sub>兩次。續服三日ニメ月經來ル

第三一婦人十五歲。未<sub>ダ</sub>月經ヲ見ズト雖モ經閉ノ諸症アルヲ以テ是ニ鐵劑。縛股法前ニ出ツ自餘通經諸藥ヲ投スレ<sub>レ</sub>尺寸効ナシ。因テ薩毘那末半錢宛用<sub>レ</sub>一日<sub>ニ</sub>兩次。續服八日ニメ効功ナク。唯每次腹痛ヲ發スルノミ

第四一婦人三十一歲。經閉八個月。惡心。嘔噦。胃痛ヲ兼子。脉八十二動。乃縛股法ヲ施<sub>メ</sub>服ノ上部及子宮部脹痛シ背疼ム。因テ薩毘那末一<sub>ナ</sub>月宛日<sub>ニ</sub>兩次。次ニ

半錢宛日<sub>ニ</sub>兩次用<sub>レ</sub>五日。少腹痛甚<sub>ク</sub>ノ嘗テ通經前ニ發セル痛ノ如シ然<sub>レ</sub>モ月經來ラズ。因テ數回刺絡ヲ施<sub>メ</sub>竟ニ全功ヲ得タリ

第五一婦人二十五歲。經閉六個月。乃縛股法ヲ施ス<sub>レ</sub>兩次。即<sub>チ</sub>子宮部。變痛ヲ覺ル<sub>レ</sub>嘗テ通經前ニ患ル痛ノ如シ。又頭痛。惡心。呼吸不利ス。因テ薩毘那末一<sub>ナ</sub>月宛用<sub>レ</sub>一日<sub>ニ</sub>兩次。漸ク加テ一錢宛與<sub>レ</sub>七日<sub>ニ</sub>月經來ル。右ノ試說ヲ以テ觀レバ薩毘那ハ通經ノ峻藥タル<sub>レ</sub>知<sub>レ</sub>ベシ但<sub>シ</sub>第三ノ症ハ子宮等ノ常資ニ違<sub>フ</sub>者タルカ。諸方法ヲ施セ<sub>レ</sub>モ毫モ効驗ナシ。凡

此藥ハ甚々多血ノ症ニハ的當セズ故ニ第四ノ症ハ刺絡ノ功ヲ得茜根モ亦獨リ子宮ヲ衝動ノ通經ノ捷効ヲ奏スト雖モ各其性効ノ殊異ナルヲ屢試ノ審ニ察スベシ 依羅 貨伍

龍芽草

ギンミヅヒキ 俗稱 アグリ  
モニア 羅 アグリモニイ蘭

試効 葉ヲ用フ收番愈創淨刷排膿ノ効アリ○血中ノ敗汚惡液ヲ清掃シ腐壞ヲ攘除ス○痰効勞嗽吐血下血下利肝崩白帶下經久淋疾小便頻數等ニ驗多シ○咽喉口中膿瘍潰爛ニ漱藥トシ膿ヲ排ヒ痛

ヲ止メ良驗ヲ稱ス○洗藥トシ汚穢ノ潰瘍創傷ヲ乾愈ス○肝脾壅塞ヲ疏解シ脾病ノ諸症ヲ治ス○水煎或泡劑トシ用フ 叔 伍

山蘿蔔

マツムシサウ 俗稱 スカビヲ  
サ 羅 スキルフトコロイド蘭

試効 莖葉花庄ニ用フ○汚液ヲ淨刷シ血中ノ惡液ヲ排泄シ粘稠ヲ稀釋ス○清血淨刷愈創解凝發汗ノ効アリ○内部ノ膿腫潰瘍ヲ療シ膿穢敗液ヲ小便ヨリ排除ス○欬嗽胸脇痛肺瘍勞效等ニ用テ能胸肺ノ痰ヲ豁ノ咯出セシメ咽喉膿瘍ヲ淨除シ愈

スニ用フ。胸病ニハ水煎シ蜜ヲ攪和シ服メ良○疥癬。白禿瘡。小飽汗。癩瘡。痒及腐穢潰爛ノ膿瘍。等一切皮膚病ヲ治ス○水煎或泡劑トシ内服シ或洗藥トシ外用ス伍叔淑

草零陵香

ギハギ花戸名  
メリロテムス羅  
メリロト蘭

**試効**花穂ヲ用フ○香竄ニノ開達。緩和。止痛。疏解。驅風ノ効アリ○カ密列等ヲ加ヘ水煎シ用テ心腹痛。疝痛。内部。焮衝痛。赤痢痛。腎痛ヲ緩解ス○傷冷毒痛ニ是ヲ内服シ或外敷メ良効ヲ稱ス○接骨木花。加

ミツ密列等ヲ加ヘ泡劑或水煎シ。若ハ吉利詞キリ參兒テイル蒸湯藥。琶布等トシ外用メ疝腹痛ヲ和消シ。寒熱壞疽ノ生肉ト死肌ヲ分離セシメ或焮腫眼。胸脇痛。腫瘍等ヲ消散シ疼痛ヲ止ム伍叔淑

芸香

ベンルダ花戸名  
ルタガラヘ  
ヲレンス羅  
ウインルイト蘭

**試効**葉ヲ藥用トス○香竄質ヲ以テ健胃。利尿。通經ノ偉効ヲ稱ス○神經病。癩症。昏睡。小兒搐搦。蟲症。子宮衝逆痛。頭痛。疝痛。神思憂悶病。等ニ殊効ヲ稱シ風氣痞滯ヲ驅散ス○泡劑トシ或露水ヲ取り眼洗藥

トノ視力乏弱ヲ復シ淚眵漏泄スル症ニ大効ヲ稱  
 ス○虛弱ノ肺嗽衝ハ芸香ニ加密列薄荷ヲ加ヘ煮  
 テ琶布トシ燒酒少許ヲ加テ胸ニ貼シ尚危險ノ症  
 アル者ハ龍腦ヲ加施ノ超羣ノ効ヲ稱ス是皮神經  
 ニ竄透ノ衝動シ疏散ノ功ヲ爲スニ因ル故ニ此症  
 ニハ大ナル發泡膏ヲ胸ニ貼メ尤良トス

芸香水

製法主治  
名ニ出ツ

前説ノ諸病ニ良驗アリ此露水ハ  
 精氣淡薄ナル故ニ芸香ノ生葉ヲ數回加蒸餾スベ  
 シ是ニ由テ醇厚トナル否ラザレハ殊効ナシ或  
 其症ニ隨ヒ茴香水薄荷水等ヲ以テ是ニ代用ノ可ナ

依叔  
伍

苦意

アギク又セレンボシキク俗稱  
 アパルテニウム羅「ムドコロイド」蘭

試効 花穂ヲ用フ○温暖開達シ竄透刺戟ス纖維弛  
 緩ノ粘液壅鬱セル諸病即處女病萎黃病粘液腫等  
 ノ諸症ニ良驗ヲ稱ス○纖維弛弱粘液質ノ經閉ヲ  
 驅泄シ産後腹痛ヲ除キ惡露ヲ下ス○或云體中粘  
 液壅鬱多眠ノ經閉ニ加密列ヲ用テ効ナキ者苦意  
 ヲ加ヘ泡劑トシ與テ捷効ヲ得ルト多シ○小便ヲ  
 利シ水腫ヲ療ス泡劑或水煎シ用フ○結石腎痛等

ノ壅塞ヲ疏解ス○此藥温煖ノ功アル故ニ總テ歎  
 衝性ノ病ニハ害アリ○蒸湯劑。琶布<sup>パプ</sup>等ニ製シ外敷  
 ノ諸寒腫或乳房結腫ヲ消シ又偏頭痛ヲ治ス  
 叔依 叔依

新訂增補和蘭藥鏡卷四終

