


增新訂
和蘭藥鏡

卷五

武9
856
18-5

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號一六一第書托寄
號 9 第
冊 2 第



武 856
卷 18-5

新訂增補和蘭藥鏡標目

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷五

大黃

主

掃腸挂黃飲

葯黃消英散

定痛消毒飲

解凝黃醃丸

芫黃驅水丸

解凝葯醃丸

加羅薑黃散

加羅荷黃丸

加羅疏肝丸

消酸解毒飲

大黃浸劑

黃霸健胃散

大黃越幾斯劑

大黃舍利別

大黃丁幾劑

土木香

越幾斯劑

土木香越幾斯劑

土木香

丁幾劑

土木香舍利別

菖蒲越幾斯劑

菖蒲蒸餾油

增訂和蘭藥鏡

卷五

標目

風雲堂

大正二年九月廿四日
內田 采子氏 贈

新訂增補和蘭藥鏡標目

白芥子

薑芥健胃丸

芥子泥

半夏

半夏健胃散

半夏黃石散

蜀羊泉

排毒羊泉湯

同越幾斯劑

羊泉硫荷飲
安質羊泉丸

山牛蒡

牛蒡排毒煎

金盞花

董菜

董菜舍利別

蘆根

排毒蘆根煎

蘆根越幾斯劑

石長生

白芷

海信 卷活 和蘭藥鏡附目



新訂增補和蘭藥鏡卷五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕

榕菴校補

大黃

「ヲバルバル」又「ウム」羅

「ヲバルベル」蘭

撰品 上品ハ其質充實ノ乾輕外面深黃雜腹蘭色裏

淡黃或白黃色ニメ黃赤ノ紋理及白斑アリ。嚼テ粘

著セズ響ヲ爲シ。黒斑ナク蛀刺ナシ或正中眼ヲ窺

者アリ藥舖コレヲ魯西亞大黃ト稱ス姦商動スレ

ハ土大黃羊蹄根ヲ雜販ク然レ是ヲ横斷スレバ車

輻紋アルヲ以テ知ベシ 眞品ハ必ス車輻紋ナシ ○大黃ハ支那及支

那ニ屬ル韃靼地方ニ産ス。其他是ヲ産スル處ナシ
試効 大黃ノ質ニ護謨ト華爾斯アリ。護謨質尤多シ。
 又香竄揮發ノ質ト收瀋ノ質アリテ相混合ス。香竄
 揮發質ハ刺戟衝動ノ瀉下シ。收瀋質ハ收固强健ノ
 効ヲ爲ス。○胃腸鬱滯ノ粘穢汚物。敗液粘液留飲。膽
 液質惡液ヲ疏滌シ日常瀉下ノ要藥トス。○胃腸ノ
 諸管纖維縱緩セルヲ強壯シ小便ヲ疏通ス。是ヲ服
 スレバ其色小便ニ浸洩ノ黃赤ナルヲ以テ知レベシ
 但胃腸ノ感觸甚キ人。是ヲ服スレバ痞氣腹痛惡心
 嘔噦ヲ發ス。○凡、病毒鬱滯セル諸症ハ大黃闕ベカ

ラザル要藥トス。假令バ下利赤痢發泄。胃腸熱。間歇
 熱。黃疸。脾病。依利昆垓兒。處女病。白帶下。疝痛。胃腸酸
 敗液。小兒遷延熱。腸間膜ニ膠粘液壅滯ノ腹滿スル
 等ノ如シ。○瀉下ノ効ヲ取ルニハ左ノ方服シ易クメ
 捷効アリ

掃腸桂黃飲

大黃 剉 二錢 沸湯 五勺
 桂精 一勺

右罐ニ入。蓋閉シ浸ス。六時ニノ瀘過シ桂精ヲ攪
 和シ二三匙宛數服ス。○左ノ方亦良。殊ニ熱症及水

腫様ノ症ニ尤モ効アリ

葯黃消英散

大黃

葯刺巴

消石 精製者

酒石英

各等分

右細末トシ調和ノ散劑トシ一乃ヨリ二乃マデ服
○惡厲ノ痢疾。初發下劑ヲ與テ治セズ漸ク血ヲ交
へ下シ患者逾々困スル症ハ後方奇効アリ

定痛消毒膏

大黃 細末 十匁

的里亞加 名

半錢

右和調シ適宜ニ舍利別 名ヲ加テ煉膏トシ一次ニ

服ス。其症ニ隨ヒ一晝夜ニ四五次モ與フベシ此劑
的里亞加ヲ以テ腸ノ劇盛ナル運動ヲ靜止ノ其孿
急絞痛ヲ緩解シ。大黃ヲ以テ鬱滯ノ粘穢汚物ヲ導
泄シ且酸敗ノ侵蝕毒ヲ驅逐ノ腸ノ激衝ヲ防ナリ
○胃腸ノ病毒鬱滯ヲ驅除スルニ後方亦良

蜷蛄消黃散

大黃

芒消

蜷蛄石 或、雞卵殼 各等分

右散劑トシ一乃ヨリ半錢マデ服ス。此劑或、噫氣吞
酸嘈雜惡心痞悶ヲ治シ或、間歇熱。替留熱ノ初發ニ

用テ胃腸ヲ清掃シ熱毒ヲ驅除ス。或、風氣痞滯ノ諸症ハ橙皮末少許ヲ加、尤効アリ。疝痛ニハ甘消石精、^{セエ}電阿芙蓉液^④二十滴マデ加、テ速効アリ。淋疾ハ此散劑毎日三四次與、テ尿道、焮熱減シ其膿漸ク清稀トナル片ハ此散劑ニ按爾撒謨^{サム}格^{コツ}拜^{バイ}霍^ハ三四滴宛加、毎日四次用、レバ治ス。其膿盡ク消スレ、片尚稀液出テ荏苒タル症ハ右ノ按爾撒謨^{サム}十滴許宛飲液ニ點服シ仍治セザル者ハ十五滴若、ハ二十滴モ用、テ全治スベシ。但時々右散劑ヲ兼用ノ大便ヲ通利スベシ。○大黃ハ腸ヲ收固シ強壯スル性効ヲ兼ル故

ニ是ヲ服シ瀉下ノ後大便澁滯ノ快利セズ。或居恒^子大便閉ヲ患ル人常ニ大黃ヲ服スレバ是ニ慣テ通利セズ。久服スルニ隨ヒ逾、便閉ヲ患フ。此症ハ患者ノ體稟ニ隨ヒ旃那葉、盧會等ヲ用ヒ。或、大黃ニ白石鹼ヲ加、用レバ能、通利ス。此劑凡、遷延諸病ノ大便閉ヲ患、テ解凝劑ヲ處スベキ症ニ甚ダ適應ス。又腹内諸藏ニ粘稠液及膠粘汚物壅塞ノ發スル諸症ニ極、テ驗アリ。又右ノ諸病ニ於テ患者刺戟ノ藥劑ニ堪フベキ症ハ左ノ數方皆的効アリ

藥鹼錠

「サポ、ヤラ、ピヌ、ス、羅、セ、フ、ハン、ヤ、ラ、ッ、パ、蘭」

藥刺巴ヤラバ華爾斯ハルル或藥刺巴バ細末

白石鹼名 各二勺

燒酒 二十度者分量適宜 溶化スルヲ度トス

右二味ニ燒酒ヲ加ヘ煖處ニ置テ溶化シ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ熬乾シ丸藥トナル可ニ至リ。十日許宛服スル一日三次

解凝藥鹼丸

大黃 石鹼 勿擗ハ祭亞ナ者 各一錢半

藥鹼錠 前出 半錢

右研和シ三氏ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ三丸宛用一日三次。但瀉下ノ多少ニ隨テ加減ス

解凝黃鹼丸

大黃 石鹼 勿擗ハ祭亞ナ者 各一錢半

藥刺巴 半錢

右研末調和シ三氏ヲ一丸トシ三丸宛用一日三次
○水腫ノ停水ヲ驅逐スルニ後方捷功多シ

芫黃驅水丸

大黃越エ幾斯キス劑 後出 一錢 芫菁

甘草 各半勺

右細末ノ調和シ一氏ヲ一丸トシ二丸宛服スル一日兩次
○肝藏虛衰ニ因テ膽液ノ分利虧損シ大便

閉。食消化セザル等ノ症アルハ左ノ方殊効アリ

加羅疏肝丸

大黃 十瓦

加羅茂兒カロメ 三瓦或四瓦

乾姜 三瓦

右細末トシ調勻メ丸藥トシ一服トス。七日ニ一服用フ○蟲症或腸中粘液留飲。膽液鬱壅セル諸症ニ後方超羣ノ下劑トス

加羅姜黃散

大黃 六錢

加羅茂兒カロメ 或甘草 一錢

乾姜 半錢

右散劑トシ每服半錢○後方亦良驗アリ

加羅荷黃丸

大黃 二錢

加羅茂兒カロメ 半錢

薄荷丁幾劑名 十滴

右調和シ蜜少許加テ三十丸トシ。毎日三丸。或三日毎ニ三丸宛服ス○大黃ハ霸王鹽ヲ加テヨク疏解開達シ大便閉ヲ治ス。又體質虚弱。胃腸强健ヲ要スル症ニ用テ一種ノ健胃劑トス假令タト後方ノ如シ

黃霸健胃散

大黃 五瓦

霸王鹽 六瓦

薄荷 少許

右散劑一服トシ用_レ日_二三_一次○小兒酸敗液ノ諸症或大便閉ヲ兼子。其他小兒諸病ニ後方甚_ク驗アリ

消酸解毒飲

大黃 十五匁

麻_マ屈_グ涅_ネ失_シ亞_ア 一匁

益智 十匁

白罌粟舍利別 一錢

蒸餾水 二匁

右先_ツ三味細末トシ餘藥ヲ攪和シ毎日一茶匙宛與_ル一日四五次○傷冷毒失_シ苟_ケ兒_レ陪_ボ苦_ク等ヨリ發スル齒痛ハ大黃ヲ嚼_ミ含_メテ其痛ヲ祛キ斷_リ固_ム

服量 細末ハ一月ヨリ一錢ニ至_ル桂末或肉豆蔻末

ヲ加_ヘテ良○一歳ノ小兒ハ四匁ヨリ十匁ヲ與_フ十歳マデハ十五匁ヨリ一匁マデ用_フ○水煎泡劑浸劑ハ大黃二三錢マデ水八匁ヲ加_ヘ製_ス

大黃浸劑 散劑丸藥ヲ嫌_フ者ハ此劑ヲ用_テ良

製法 大黃_判 一匁 沸湯 十六匁

右蓋閉シ浸ス_ル十二時。漚_テ滓ヲ去_リ聽用_ス 臣

大黃丁幾劑 瀉下ノ良劑トス。虛冷ノ症殊ニ佳服量一錢許。適宜ノ飲液ニ點服_ス

製法 大黃_判 一錢 燒酒 十五度者 八匁

右浸ス_一六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ_後

又法 大黃_剉 四錢 酒石鹽_{或剉} 一錢

桂露 六_勺 燒酒 一_勺

右浸ス_一六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ_後

又法 此方燒酒ヲ用_ル故ニ 水製_丁幾劑ト名_ク

大黃 四_勺 刺篤亞斯 一_勺

蒸餾水 八_勺

右硝子壘ニ内蓋閉シ爐邊ニ置テ浸_ス一四日。滓ヲ去リ固封シ貯フ_後大人ハ一二匙。小兒ハ一茶匙宛與フ

又法 是温煖瀉下ノ良劑トス。疝痛。痞氣鬱滯。腹

脹等ヲ治ス

大黃 十錢 益智 三錢

燒酒 十五度者 十_勺

右硝子壘ニ内蓋閉シ浸_ス一六日。滓ヲ去リ貯ヘ。一錢ヨリ一_勺マデ水等分ニ加_テ用フ。○胃腸虚弱。運化弛慢ニノ風氣痞滯。食消化シ難キ症ハ幾那。乾姜。加_カ密列_レヲ加_テ浸_シ用_テ尤_モ良。○嘈雜懊惱。胸中燒_カ如_ク或_ハ酸水ヲ吐_シ心腹刺痛スル症ハ礬蓬鹽晶ヲ加_テ用_テ速効アリ

又法 胃虚ノ諸症。飲食消化シ難ク或_ハ下利疝痛

等ニ甚ダ驗アリ頑固ノ間歇熱遷延熱等ハ幾
那ヲ兼用シ其効力ヲ補助スベシ

大黃 二匁 健質亞那 四錢

攝爾扁答 或、纈草 一錢 燒酒 十五度者 二匁

右硝子燻ニ内浸メ藥氣ヲ出シ滓ヲ去リ固封シ貯
一匙宛數用フ 依

又法 脾病依剥昆垚兒子宮衝逆ノ諸症ニ用テ

大便壅滯ヲ通利ス○小兒冒寒傷冷毒ニ因テ
頸ニ發スル腺腫ヲ消散ス○凝體纖維ノ弛虛
緩弱ニメ粘稠液腸間膜腺ニ壅塞シ腹滿スル

大黃等ニ大効アリ大人ハ一二匙宛用フ小兒ハ三

十滴ヨリ六十滴ニ至ル

大黃 二匁 乾葡萄 一匁

狗椽皮 十二匁 甘草 各四錢

益智 二錢 葡萄酒 二匁

右五味到合和シ浸ス下四日滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

土木香越幾斯劑 四錢

沙糖 三匁

右攪合メ溶化シ固封シ貯フ 依

大黃越幾斯劑 此劑瀉下シ且強壯スル功アリ故

幾那煎ヲ用ル症ニシテ大便閉ヲ患ル者ニ適應
ス。殊ニ散劑煎劑ヲ嫌フ人ニ用フ。但、瀉下スル
ニハ是ヲ丸藥トシ或、散劑トシ或、飲液ニ溶化
シ用テ尤良。服量一二匁ヨリ一錢ニ至ル。強壯
藥トスルニハ十匁ヨリ二十匁ニ至ル。

製法

大黃

判

一匁

沸湯

十六匁

右蓋閉シ浸ス。十二時。瀝テ上清ヲ取り其滓ニ沸
湯八匁ヲ加ヘ浸ス。十二時。瀝テ上清ヲ取り前ノ
液ト合シ熬乾メ錠ト爲ス。

大黃舍利別

製法主治
名ニ出ツ

緩下ノ良劑ニシテ大便閉ニ用

フ小兒ハ甘味ニシテ服シ易シ。一卵匙宛與フベシ。○
大黃ハ服量少許ニシテ瀉下ナキ程ニ用レバ一種ノ
解凝藥トナリテ効驗甚ダ多シ。凡、諸管纖維ノ弛屈
縱緩ノ粘液壅塞ニ發スル黃疸。脾病。依剥。昆垤兒。粘
液腫。鼓脹等ニ用レバ此藥ノ衝動疏解ノ効力ヲ以
テ其弛緩セル諸管更ニ運動ヲ増發シ其壅滯セル
惡液ヲ推盪メ驅除スルナリ。然レハ纖維ノ強硬牽張
ノ既ニ硬結腫トナル者ハ治シ難シ。○大黃ハ收瀉
ノ胃腸ノ纖維ヲ強壯スル故ニ腸ノ運化弛弱怠慢
ノ諸症ニ用テ効アリ。但、是ヲ強壯劑ト爲スニハ服

量甚少許用、ベシ。○腸ノ虚弱ヨリ發スル下利赤痢ニ此藥少許宛用、テ良驗アリ假令バ後方ノ如シ

護謨乙黃散

大黃^剉 一錢半

乙百葛^{カコ}格安^ア那^ナ末 半錢

右沸湯三勺ヲ加、テ泡出シ。漉テ滓ヲ去、後藥ヲ加フ

亞刺比亞^ア護謨^ビ 一錢

過爾託亞^{アル}舍利^タ別^ア 三錢

右調和シ半時毎ニ一匙宛服ス。○大黃炮炒スレバ瀉下ノ効減メ收固強壯ノ功多シ。故ニ病毒汚物ヲ疏滌メ後、下利止ズ。或腸虚弱ニメ下利スル症ニ與テ腸ヲ強壯シ良驗ヲ稱ス。又赤痢、白帶下等ニ効多

シ。此症後方殊効アリ

薄荷雙黃散

大黃

炮大黃

各半錢

薄荷油

三滴

右研末ノ散劑一服トシ。飲液ニテ送下ス。其症ニ隨阿芙蓉或阿芙蓉液少許ヲ加テ良。○凡、纖維弛弱ノ愈難キ潰瘍ニ大黃末ヲ摻メ排膿生肉ノ功ヲ稱ス

依福叔 福叔 華叔

土木香

オホグルマ^{俗稱} 藥舖ニ官環木香ト呼、ヘレニウム^羅 アランツ^ウトル^蘭

試効 根ヲ藥用トス性温苦味。香氣アリ健胃ノ良藥トス。或云肺胃ニ効。又蒸氣ヲ發シ小便ヲ利シ粘液ヲ稀釋シ汚穢惡液ヲ分利ノ排泄ス。○胃虛烹釀ノ匱乏ヲ復シ。風氣痞滯ノ諸症。疝痛腰痛ヲ治シ。脾病依剥昆垓兒ヲ療シ。經閉ヲ通シ。蟲ヲ殺ス。○欬嗽痰喘等ノ嗽衝ナキ胸病ヲ治ス。○肺ノ粘液ヲ淨刷ス。故ニ傷冷毒ヨリ發スル痰欬喘急等ニ良。但患者虛弱粘液質ニノ粘液。肺ニ壅積スル症ニ尤驗アリ。此症ハ安質沒扭劑發汗或龍腦ヲ加ヘ或其症ニ隨ヒ亞鉛華發汗鎮痙或阿芙蓉ヲ加用テ殊効アリ。○欬嗽。胃

中ノ粘液鬱滯ヲ兼ル症ハ此藥ニ芒消或硃砂少許加用テ多ク驗アリ。○喘急ノ症。肺ニ膠痰壅塞スルハ此根ノ越幾斯劑ヲ安質沒扭酒名ニ溶化シ用テ大効アリ或左ノ丸藥モ亦良

護謨救喘丸

土木香越幾斯劑 甘草膏

硫黃華 各一錢 菖蒲根 半錢

護謨安沒尼亞幾名 二錢

右研和シ二瓦ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トス。時々八九丸或十丸宛服ス胸脇嗽衝。肺嗽衝ノ初發ニ此劑ヲ

與^レバ其刺戟ニ堪^ハズノ害アリ。然^レモ漸ク日ヲ經テ
虛憊ノ諸症ヲ見^スニ至テハ此劑ノ痰ヲ豁シ惡液
ヲ分排スル効力ニ因テ偉効アリ○傷冷熱ニ因テ
痰效ヲ發シ連綿ノ治セザル症亦此劑ニテ多ク治
ス○纖維諸管弛緩ノ血中粘液過多壅滯ヨリ來ル
經閉ニ此根甚ダ驗アリ○此藥ハ血液ヲ淨除シ且
利尿ノ効アリテ水腫ヲ治ス。但^シ諸管纖維緩弱ニ
粘液壅滯ヨリ發スル虛症ノ水腫ニ多ク的當ス○
水銀吐涎法ヲ施ノ水銀體中ニ滯著シ。各處ニ凝聚
ノ惡症ヲ發スル者ハ此根ヲ以テ一種ノ解毒藥ト

ス。其方此根二弓ニ茴香或云茴香根四錢ヲ加ヘ葡萄酒
或、水二比ニ煮テ三分一ヲ減シ滓ヲ去リ數日服ス
レバ水銀漸次ニ諸竅ヨリ排泄ノ諸惡症解散ス○
服量細末トシ一二乃至服ス。或、對症ノ劑ニ加ヘ水
煎泡劑トシ或、水、葡萄酒、麥酒等ニ浸シ用フ

土木香越幾斯劑

製法名健質亞那越幾斯劑ト同シ

前ニ舉ル諸病ニ

用^テ良効ヲ稱ス。服量一錢ヨリ五錢マデ對症ノ劑
加^ハ用フ

土木香丁幾劑

製法名健質亞那丁幾劑ト同シ

竄透衝動ノ藥ヲ與

ベキ諸病ハ此劑尤効アリ

土木香舍利別

製法大黃舍利別ト同シ此劑。殊ニ前舉ノ胸肺諸

症ニ用フ又甘味アル故ニ小兒服シ易シ

㊦㊦

菖蒲

石菖泥菖同効
アロマチカ羅
アコリス又「カルニャス」
ヱルリケンデリス蘭

試効根ヲ藥用トス○香竄衝動シ。温煖強壯ス。殊ニ

健胃驅風ノ偉効アリ○諸遷延病ノ患者精力罷弱。

胃虚ノ諸症。飲食消化シ難ク。痞氣腹痛頭眩ヲ治シ

虵蟲ヲ殺ス○内藏虚弱ヨリ發スル風氣痞滿。疝痛

等ノ諸症ハ此根ヲ藥酒ニ加服シ或糖薑土木香根

等ヲ加煉膏トシ與ヘ健胃ノ効ヲ以テ良驗ヲ奏ス

○此藥ハ劇病緩病共ニ虚弱ニ屬スル諸症ヲ治ス

ル故ニ傷冷毒痛。痛風。及膽液腐敗ヲ兼ル熱病等ノ

精力虚罷セル症ニ効アリ○凡熱病ノ患者虚憊ノ

熾熱甚キ症。即傷冷毒熱。胃腸熱等ノ虚憊ヲ兼ル症

ニ用テ効多シ○諸替留熱。往來熱ニ虚憊ノ諸症ヲ

發シ若ハ血液溶解腐敗ノ候ヲ見ス片ハ必不壯神

衝動劑。防腐劑。並ニ此藥ヲ的當トス○肺熾衝ノ患

者。虚罷ノ傳染熱ノ如ク膽液腐敗ノ諸症ヲ兼ル者

ハ此藥ヲ用テ殊効アリ。其症ニ隨ヒ阿芙蓉。龍腦。亞

的兒等ヲ兼用ノ驗多シ○或云。間歇熱ノ患者。精力

虚乏ノ病毒ヲ排除スルヲ能ハズ且虚罷ノ症ヲ見
 ス者ハ此藥効アルヲ幾那ニ勝リ或幾那ノ功ナキ
 症モ是ヲ用テ治スルヲアリ又頑固ノ三日熱ハ此
 藥ニ阿芙蓉龍腦ヲ加用テ大効ヲ得ルヲアリ然レ
 間歇熱ノ熾衝ヲ夾ム症ハ此藥害アリ宜ク刺絡下
 劑等ヲ施ノ治スベシ○失苟兒陪苦ハ此根末二刀
 ヲ一服トシ日ニ六服或ハ服宛用ヒ專ラ良性ノ蔬菜類
 ヲ食料トシ與ニ由テ全功ヲ得ルヲ甚多シ○此藥
 ハ肝脾壅塞疼痛ヲ疏散シ虚弱ノ經閉ヲ通シ又經
 久ノ潰瘍腐骨疽等ニ用テ驗アリ○服量細末ハ半

錢ヨリ一錢マデ舍利別或葡萄酒ニ和シ一服トス
 或其症ニ隨ヒ龍腦阿芙蓉ヲ加用フ○浸劑トシ或
 泡劑トシ或丁幾劑越幾斯劑蒸餾油トシ用テ右ノ
 諸病ニ良驗ヲ稱ス

菖蒲浸劑

製法 菖蒲根 剉一ヲ或ニヲ 水一匕

右硝子壘ニ内浸ノ藥氣ヲ出シ滓ヲ去リ六時或十
 二時ニ服ス○或此藥ニ揮發衝動藥ヲ加テ殊ニ峻
 効ヲ稱ス假令バ後方ノ如シ

壯神菖橙飲

菖蒲根 一弓半

右水適宜ニ加、煮テ滓ヲ去リ十八弓ヲ取、後藥ヲ如、

橙皮舍利別名 一弓半

龍腦漿 龍腦一二瓜ヲ亞刺比亞護漿
適宜ニ研和スル者 十二瓜

舎電阿芙蓉液名 十八滴

右和勻シ半時毎ニ一小茶碗ヲ服シ十二時ニ一劑
ヲ用フ

菖蒲丁幾劑

製法 菖蒲根 一弓 燒酒 八弓

右硝子壘ニ内、浸ス一八日。滓ヲ去リ固封シ貯ヘ六

十滴ヨリ百滴マデ適宜ノ飲液ニ點服ス

菖蒲越幾斯劑 製法 健質亞那越幾斯劑名 ト同シ此

劑ニ菖蒲蒸餾油ヲ合和シ用テ峻効アリ

菖蒲蒸餾油 製法 薄荷油名 條。蒸餾油製法拈套ニ記

ス如シ右諸製劑ニ此油數滴ヲ加用テ尤モ効アリ

○異地ニ旅行ノ水毒ヲ解シ腹痛下利等ヲ防グニ

菖蒲根ヲ水ニ浸シ服メ効アリ若水清潔ナラザル

片ハ此根ヲ其水ニ投シ醋少許加靜定メ其上清ヲ

取り用ベシ依福叔 伍叔

白芥子 シナピ 羅 モス テルト 又 モス タールト 蘭

〔試効〕温煖衝動開達シ。粘液ヲ稀釋シ。小便ヲ利シ。月經ヲ通ス。○胃ヲ健運シ。飲食ヲ進メ。消化ヲ扶ク。○胃腸ノ運化。怠慢虛衰セルヲ醒起健運シ。大便ヲ順利ス。○粘液腫。萎黃病。處女病ニ用テ。胃腸ヲ開利シ。粘液ヲ分排シ。良驗ヲ稱ス。○痲不遂及昏睡病ニ内服シ。衝動健運ノ粘液ヲ排泄シ。卒仆ニ噫藥トシ。施メ。省復セシメ。舌痲言語蹇澁ニ含漱劑トシ。殊効アリ。○神思鬱憂病。脾病ニ用テ。良驗ヲ奏ス。○諸痰効及喘息ヲ治シ。殊ニ胃効ニ効多シ。○水腫ニ用テ。粘

稠液ヲ疏解シ。小便ヲ利シ。汗ヲ發ス。○胃腸虛衰ノ諸液健輸消化セザルヨリ。水腫若ハ黃疸ヲ發スル者多シ。此症ハ健胃解凝ノ劑ニ白芥子ヲ加用テ。的當トス。左ノ方尤効多シ。

芥薑健胃丸

健質亞那 各一錢

乾姜 各半錢

鐵屑 極細末 四錢 鹿角鹽

金硫黃 各十五分

右各細末ノ合和シ。亞爾鮮越幾斯劑 或野艾蒿葉穗ヲ取リ製ス其

法名蒲公英越ヲ適宜ニ加テ捏和シ二氏ヲ一丸ト
 幾斯劑ト同シ
 シ朝夕十九丸或十二丸宛服ス○春ノ間歇熱ハ白芥
 子ヲ用テ効多シ。秋發頑固ノ間歇熱ハ幾那ヲ加驅
 熱ノ効ヲ扶ルニ非レバ功驗著實ナラズ○刺戟衝
 動ヲ要セザル症ハ此子ヲ搗碎クナクノ胃虛ノ
 諸症ニ毎日數匙ヲ服ノ功アリ然レ通例此子ヲ搗
 碎キ散劑。泡劑或煎劑ニ加服ノ良。胃腸ノ感觸鈍ニ
 ノ粘液多ク。刺戟衝動スベキ症ハ是ニ由テ其功速
 ナリ○失苟兒陪苦ニ用テ酸敗液ヲ消シ海鹽ノ酷
 厲毒ヲ抑制ス○咽喉腫ニ漱藥トシヨク其腫ヲ消

散ス○外敷ノ腫瘍ヲ消シ膿ヲ熟ス

芥子泥

製法主治
名ニ出ツ

麻痺不遂或腕股痛ニ貼ノ其毒ヲ
 外泄シ或痛風毒内攻ノ諸症及熱病ノ發狂譫妄ハ
 腓及蹠ニ貼ノ頭腦潛攻。病毒ヲ下部ニ引降シ煩躁
 ヲ靜止ス或頑癩類。總テ惡厲ノ皮膚病ニ貼ノ能酷
 厲毒ヲ皮表ニ引泄シ捷効ヲ奏ス (依) (物)

半夏

アリウムトリホリウム羅テ
 リーブラーダヘカルプス蘭
 榕按ニアリウムハ林娜私第二十經第七緯ニ收
 ル一宗類ニ其屬スル所ノ種類二十二名ヲ舉

グ。後進ノ名哲又是ニ六種ヲ加テ二十八名トス。其第一種ハ南星。第四種ハ半夏三葉アリハ第六種ハ青芋サトイモ。第十種ハムサシアブニ第十二種ハ藥用ノ本種ニノ莖ニ蛇皮斑アリ。斑杖莖ノ如クニノ葉。斑杖ト異ナリ。和産未詳ナラズ。第十五種ハ海芋。第十七種ハガゼンサウナリ右件所舉數種中ニ半夏ノ効最本種ニ近ク。因テ今是ヲ掲テ本條トス。**試効**乾根ヲ藥用トス或云莖葉亦効アリ生根ハ苛茶ニノ口舌ヲ刺戟ス。是其粘液中ニ精微ノ酷厲液ヲ含カ故ナリ。但此根。水煎泡劑或燒酒。葡萄酒等ニ浸スト雖モ

其効力ヲ含ル精微刺戟ノ質ハ融解シ難シ。故ニ其渣ヲ去テ上清液ノニ用レバ効微ナシ。然レバ乾根ヲ細末トシ蜜或砂糖。舍利別等ニ研合シ或對症ノ煉膏。乳劑其他粘滑ノ劑ニ攪和シ其刺戟ノ味ヲ包攝シ用ルヲ佳トス。○疏解。稀釋。利尿。發汗ノ効アリ。胃中粘稠敗汚ノ惡液ヲ驅除シ。食機虧損。其他胃腸ノ粘液壅滯。汚液鬱積ノ諸症ヲ治ス。○胸中粘痰壅塞。欬嗽痰喘其他頑固ノ胸病ニ良効アリ。○痰欬喘息ニ此根。細末ニ砂糖ヲ研和ノ服シ或乾葡萄ト蜜ヲ和シ水ヲ加。煮テ攪混シ服ノヨク粘痰ヲ疏豁ノ略

出シ治ス○肺瘍勞效ニ是ヲ乳汁ニ煮テ用レバ吐
膿ヲ進メ肺ヲ淨刷ス○痛風傷冷毒痛其他潛結沈
滯ノ諸痛ヲ治ス○内藏壅塞ヲ開達シ月經ヲ通シ
粘液病。萎黃病。處女病。黃疸。水腫。間歇熱。依剥昆垚兒。
神思鬱憂病。失苟兒陪苦ニ良驗ヲ稱ス○胃ノ病患
ヨリ發スル遷延頑固ノ頭痛ニ此藥甚ダ驗アリ。此
症ハ舌苔アリ殊ニ舌本ニ多シ。後方尤良効アリ

半夏健胃散

半夏 二錢

菖蒲根

地榆

桂

各一錢

剥篤亞斯

右散劑トシ硝子壘ニ固封シ貯ヘ十匁ヨリ一錢マ
デ飲液ニ點服スル一日三四次○間歇熱ハ左ノ方
良驗多シ

半夏黃石散

半夏

孕礬酒石

或霸王鹽 各十匁

大黃 五匁

右散劑トシ一服トス。熱ナキ時。每半時。一服宛用フ
○服量細末トシ五匁ヨリ十二匁或半錢マデ適宜
ノ飲液ニ和シ用一日數次或云燒酒ニ和シ服ノ發

汗ス○此藥外敷ノ腫瘍ヲ消散シ或膿熟シ潰瘍ノ膿ヲ排ヒ腐穢ヲ淨除ス即此末ヲ摻シ或水ニ溶シ洗藥トス又面部汚斑小皰赤疹ヲ消シ肌膚ヲ美澤ニス剥^{ハツ}^ト^ア^ス少許ヲ加ヘ或酒石液^名一二滴ヲ加テ殊ニ良或此根ヲ極細末トシ蕃薇露ニ溶ノ粧顔水トス^依^叙

蜀羊泉

^ヒ^ヨ^ド^リ^ゼ^ウ^ゴ 俗稱 ^テ^ウ^ル^カ^マ^ラ^シ^羅
^ビ^ツ^テ^ル^ス^ト 又 ^ア^ル^フ^ス^ラ^ン^カ^蘭

甘。生乾共ニ用フ生鮮ノ者ヲ一頓ニ過服スレバ惡^{試効}蔓ヲ藥用トス春秋ニ採テ氣味尤厚シ味苦微

心嘔吐ヲ起シ或頭眩暈顫動痙攣ノ諸症ヲ發シ或眼焮腫狂躁言語蹇澁麻痺搐掣ヲ發ス多血及諸脉强硬牽張ノ人焮衝性ノ諸症ハ總テ害アリ○温煖解凝稀釋發汗利尿通經微瀉ノ効アリ又酷厲毒ヲ皮表ニ驅發スル峻力アルニ由テ排毒淨穢清血ノ一要藥トス○發汗利尿微瀉ノ効ニ因テ肝脾壅塞ヲ疏解シ黃疸水腫ニ峻効アリ○稀釋發汗ノ効ニ因テ冒寒ヨリ發スル胸病欬嗽喘急及胸膿等ニ殊効アリ和胸煎劑ニ加用フ○肺焮衝胸脇焮衝等ノ初發ハ此藥ヲ與テ害アリ焮衝漸ク退キ病毒自

痰唾及小便等ヨリ排泄スル時。是ヲ用テ偉効ヲ奏ス。但傷冷毒熱ニ於テ肺ノ諸症ヲ發シ虚憊ノ候ヲ見ス者ハ初ヨリ此藥ヲ用テ的當ス。○此藥能産後惡露ヲ通ス。○痛風傷冷毒痛脚痛。歷節痛。或腺腫瘰癧或疥癬類。經久頑固ノ皮膚病ハ是ヲ用テ其毒ヲ疏解排泄ノ大効ヲ奏ス。此藥毎日一匁ヲ取り沸湯十二匁ニ泡出ノ服シ。漸ク其量ヲ加テ惡心ヲ發スルニ至レベシ。是皆粘液壅塞ヲ疏解稀釋シ汗ヲ發シ酷厲液ヲ皮表ニ宣發スルニ因ル。○或黴毒諸症ニ是ヲ多量久服ノ治驗ヲ稱ス。是專ラ黴毒ヲ療スル

藥ニ非レト總テ鬱毒惡液ヲ驅逐シ且發汗利尿ノ効力ニ因テ其皮表ニ發見セル黴毒及疥癬ヲ兼ル等ハ此藥ヲ投ノ卓偉ノ治驗ヲ致スナリ。○黴毒ノ白帶下ハ土茯苓等ノ黴毒劑ニ此藥ヲ加水煎シ用テ殊効アリ但黴毒ナキ白帶下モ亦惡性頑固ノ症多シ。是皮表ニ宣越スベキ酷厲ノ瘡毒内鬱セル症多キ故ニ此藥ヲ與テ其毒ヲ驅除ノ殊効ヲ取ナリ。○經久頑滯ノ淋疾水銃藥ヲ尿道ニ施セト治ガル症ニ此藥ヲ多服ノ諸液ノ分利排泄ヲ進輸シ治スル者多シ。○痔痛ハ出血ノ有無ヲ論セズ此藥ノ細

末ニ硫黄ヲ加用テ其毒ヲ排泄ノ驗多シ。殊ニ痛風毒傷冷毒等ノ酷厲液ヲ兼子或疝痛淋疾等ヲ夾ム症ハ尤良○服量乾莖ハ一二錢用テ瞑眩セズ生莖ハ半錢ヲ取水十六ろニ煮テ半ヲ減シ分テ六服トシ毎日ノ服量トス或嫩莖梢ヲ取り煎服シ或葉ノ絞汁ヲ服ノ瀉下藥トス或根亦用テ開達清血ノ効ヲ稱ス○凡此藥ヲ用ベキ諸病ニ後方効多シ

排毒羊泉湯

蜀羊泉 四錢

右磁罐ニ内水二比ヲ加蓋閉シ文火ニ煮テ半ヲ減

シ滓ヲ去リ其液半盞ニ乳汁少許加一時毎ニ服ス

蜀羊泉越幾斯劑

蔓ヲ採リ製ス其法固健

前說諸病

ニ用テ良或對症ノ劑ニ加用フ但煎熬シ製スルニ由テ効力減シ瞑眩セズ故ニ他藥ニ合和スルニハ一二錢モ用ベシ通例五匁ヨリ十匁マデ芳香ノ露水ニ溶化シ日數次用フ○前說ノ諸病ヲ治シ且痰ヲ豁ノ略易カラシムルニ左ノ方甚ダ驗アリ

羊泉硫荷飲

蜀羊泉越幾斯劑

一ろ半

金硫黃

五匁

薄荷水

六ろ

過爾託亞舍利別

一ろ

右研和シ用ニ臨テヨク振蕩シ一時毎ニ一匙宛與
○或丸藥トシ右ノ症ニ用モ良。即後方ノ如シ

安質羊泉丸

蜀羊泉 細末

蜀羊泉越幾斯劑

安質没扭謨 細末 各半錢

右研和シ二日ヲ一丸トシ十五丸ヨリ三十丸マデ
服スル。日三四次。○蜀羊泉ノ實ヲ取、搗絞テ汁ヲ
取、雨水ヲ等分ニ和シ眼ニ點ノ眼ノ斑翳ヲ消シ或
婦人、面部ニ擦テ肌膚ヲ美澤ニシ汚斑小皰ヲ祛ク
○蜀羊泉ノ葉ヲ取り、琶布トシ乳房腫或打撲腫ニ

貼ノ腫痛ヲ消散ス 依福 叔福

山牛蒡 又「グマボクチ」俗稱。○普山、藤林氏是ヲ充ツ

○榕椏ニ山牛蒡ハ牛蒡ノ一種ニメ花、葉亦是ニ
類ス。商陸ノ「ヤマゴバウ」ト異ナリ。民間此葉ヲ採
テ發火ヲ製ス

試効 根ヲ藥用トス。輕疏ニメ水棉様。味微辛ニメ甘
ヲ帶ブ香氣微ナリ。○汗ヲ發シ小便ヲ利シ血液ヲ
稀釋シ血中惡液ヲ排泄ス。○冒寒傷冷毒痛。痛風。脚
痛並ニ微毒諸症。頑癬。瘡瘍類。頑滯ノ皮膚病。總テ發

汗ノ惡液ヲ驅泄シ治スベキ諸病ニ効スルノ朴窟ボツク福烏篤ホウト土茯苓等ノ如シ。水煎シ多服ノ害ナク起熱ノ妨ナシ○右ノ諸病ニ多ク後方ヲ用フ

牛蒡排毒煎

山牛蒡根

二弓

舍利別

一弓

右山牛蒡根ニ水一比半ヲ加、煮テ一比ヲ取、滓ヲ去、舍利別ヲ攪和シ服ス。或、此根ヲ土茯苓、杜松木等ニ加、水煎シ多服スルモ良○此根ニ土木香、乾葡萄ヲ加、水煎シ適宜ニ蜜ヲ攪和シ、嗽ニ用テ効アリ○山牛蒡子モ亦驅發利水ノ効ヲ稱ス福叔華

金盞花

カレンヂウ羅

ゴウドブルム蘭

試効花及葉ヲ用フ○輕キ發汗藥トシ汗ヲ發シ小便ヲ利シ、疏解開達ノ冒寒傷冷ノ酷厲液ヲ驅發シ、嗽、頭痛、傷冷毒痛等ヲ解散ス○風疹癢痒、赤皰等ヲ排泄シ、疫毒惡氣ヲ驅散ス○水煎或泡劑トシ服ス○喘急ニ乾花ノ末一錢適宜ニ沙糖ヲ和シ服メ良効ヲ稱ス○花ノ露水ヲ焮腫眼ノ洗藥トシ施メ焮赤腫痛ヲ消散ス依叔

堇菜

スミレ和名 ヒヨラオドラタ羅
空ルリケンデヒヨールチイ蘭

○榕按ニ長葉圓葉アリ花色亦種々アリ香氣アリ
此ヲ擇ミ用ベシ銷鍊術ノ諸物質ヲ試ル此花ノ
舍利別ハ其最深碧色ナルヲ用ベシ

試効 花葉共ニ藥用トス。或云葉ハ微吐下 ○酷厲液

ヲ緩和シ滋潤清爽シ汚液ヲ淨刷ス ○冒寒傷冷毒

痛。咽喉焮痛。欬嗽喘息。胸脇痛等ヲ清解ス ○瘞癩ノ

運動ヲ降鎮シ頭目ヲ清利シ頭痛不寐搖掣ヲ治ス

○末トシ沙糖或白蜜ニ研和シ服シ或泡劑トシ用

堇菜舍利別 製法主治 前說ノ諸症ニ尤効ヲ稱シ又

粘液。膽液。過多ノ諸症及攣急痛欬喘急ヲ治ス咽
喉口中ノ焮痛潰爛ハ漱藥トシ緩和止痛淨汚ノ殊
効ヲ稱ス 依 叔 物

蘆根

ヨシノ子俗稱 チリチキムレペンヌ又カラ
ミヌス又カラメンカニヌム羅 ホンドスカ
ラス又カラスワルトル蘭

生根ハ白色。乾ケバ黃色ヲ帶ブ香臭ナシ味甘ヲ帶
乾ケバ味淡沙糖様ノ質アリ。生根ヲ越幾斯劑トシ
是ヲ知ベシ舊根ハ輕虛硬脆枯敗ノ藥用ニ堪ヘズ。
宜ク新生柔潤重實ナルヲ分採ルベシ

【試効】清凉。淨汚。清血。開達。利尿ノ効ヲ稱シ。酷厲液ヲ和解シ。粘稠液ヲ稀釋シ。微收斂シ。凝結ヲ疏解ス。○解凝ノ良藥トス。内藏壅塞。塊腫ヲ疏解ス。○肝脾腎膀胱等ノ壅塞ヲ開通ス。○肝壅塞。結腫。黃疸。脾病。依剝^ホ昆^コ堙^デ兒^ルニ尤^モ驗アリ。又膽液ノ凝石ヲ溶解ス。故ニ發歇アル黃疸ニ殊効アリ。○内藏壅塞ヲ兼ル羸瘦病ニ用テ。津潤滋養シ。酷厲液ヲ緩和ス。但^レ下利アル症ニハ適應セズ。○粘液壅塞セル頑固ノ諸病ハ此根ヲ越^テ幾^キ斯^ス劑トシ。日^ニ五^六ヲ宛^ク用テ良。○此根解凝ノ効アルヲ以テ。稍^ヤ衝動ス。然^レ疢熱病毒ノ刺戟衝動ヲ

抑制シ。脉管纖維ノ充張力ヲ減損スベキ諸症。及熱病ノ稍^ヤ熾^ク衝ニ傾ク症ニ甚ダ効アリ。故ニ胃腸虛罷ノ下利シ易キ等ノ症ニハ的當セズ。○間歇熱ニ用テ。粘液ヲ稀釋シ。壅塞ヲ疏開シ。小便ヲ利シ。病毒ヲ驅散ス。○間歇熱等ノ内藏壅塞ヲ兼テ險重ノ症アルニ用テ尤^モ良。○胸肺咽喉ノ諸症ニ用テ。緩和。疏解。清凉ノ良効ヲ稱ス。○遷延病ノ酷厲毒アリテ刺戟スル症。假令^ハバ痛風。流走痛。傷冷痛。及頑滯ノ瘡腫。疥癬類。或粘稠液壅塞ヨリ發スル黃疸等ハ此根ヲ煎劑ニ加^ヘ長服ノ殊効アリ。假令^ハ後方ノ如シ。

排毒蘆根煎

蘆根

山牛蒡根

各六分

右水適宜ニ加、煮テ藥汁六十分ヲ取り後藥ヲ加フ

接骨木傑列シ名 三分

孕礬酒石 或、霸王鹽 四分

右攪和シ適意ニ飲服ス。大便閉アル者ハ瀉下藥ヲ

加、ベシ。○此根。通例水煎シ服ス。大抵其症ニ隨ヒ四

錢ヨリ二分マデ水適宜ニ加、煎服ス或、對症ノ煎劑

ニ加、服ス或、越幾斯劑トシ四錢ヨリ一分マデ用フ。

頑滯ノ病ハ其量ヲ加へ數週若ハ數月續服スベシ

蘆根越幾斯劑

生根ヲ採リ製ス其法名健質亞那越幾斯劑ト同シ。○海邊ニ採ル者ハ潮

水ヲ含テ鹹キ故ニヨク洗淨ノ製スベシ。或、春月生

但、潮氣ナキ原野山地ニ採ルヲ尤、佳トス。根一坵ヲ取り搗、絞レバ白汁五分出ツ是ヲ煎熬ノ

蜜ノ稠ト爲ス此即、軟越幾斯劑ナリ或、乾根ヲ以テ

製ス乾根ニテ製スレ 裴福物 叔依叔 微生セズト云

石長生

ハコ子グサ俗稱 アヂアンタム、ヘダタム、
又カピルリ、ヘ子リス、羅、アロウエン、ハイイル、蘭

【試効】葉ヲ藥用トス。○和胸豁痰ノ一藥トス。酷厲液

ヲ緩和ノ發汗シ。微、脈管ヲ收瀦メ粘液ヲ分利シ痰

ヲ疏豁メ略、易カラシメ。冒寒效嗽、喘滿、咽喉痛、傷冷

毒痛、胸痛ヲ緩解シ或、胸膿ヲ排除スル等胸肺諸症

ニ良効ヲ稱ス○或云此草汁ニ石鹼質アルヲ以テ
内藏ニ凝聚セル膠粘液ヲ疏釋シ酷厲液ヲ淨刷メ
咯痰及小便ニ排泄シ壅塞ヲ開通ス故ニ内藏硬結
肝脾腸間膜ノ壅塞脾病依剥昆垓兒神思鬱憂病ヲ
治ス○子宮衝逆心動悸搖掣ニ此藥ヲ細末トシ稀
麥酒ニテ送下シ効アリ○此藥泡劑トシ沙糖少許
加テ服シ或對症ノ劑ニ加煎服シ或此葉一握ニ水
四比加徐々ニ煮テ終ニ甘草少許加火ヲ下シ滓ヲ
去リ適宜ニ服用ス○舍利別トシ用テ殊ニ和胸ノ
良驗アリ製法名ニ出○海州骨碎補鐵脚鳳尾草又
リバシキジノヲシシガシララオニシダハ

ルノセウガ等性功
大抵石長生ト同シ
叔僕

白芷 アンゲリカ羅 エンゲルワルト蘭

試効根ヲ藥用トス葉及子亦効アリ華爾斯質ノ液
多クノ香氣アリ○香竄揮發衝動ノ寒粘液ノ壅塞
ヲ開達シ揮發強壯劑ノ的當スル諸症ニ用テ温煖
強壯開達ノ要藥トス○蒸氣及汗ヲ發シ胃ヲ健運
シ風氣ヲ驅散シ小便及月經ヲ通ス○風疝胃痛腸
痛子宮病經閉ニ良効アリ○和胸劑ニ加テ稀痰ヲ
化シ粘液ヲ疏シ咳嗽ヲ治ス○露水ヲ取り製法名
薄荷水

ト同 布片ニ浸シ傷冷毒痛脚痛ニ貼メ疼ヲ緩解ス
 眼洗藥トノ曇暗翳膜ヲ消ス○葉ヲ取リ蒸湯劑ト
 ノ諸寒腫ヲ消散ス 依叔 依叔 伍伍

羌活

イムペラトリアオストル
 ム羅 イーストルウルトル

○按ニ羌活ハ漢産或官園出ル者ヲ用ヘシ藥舖
 尋常和産ノ品ハ別種ニ用ルニ堪ヘズ
 試効根ヲ用フ華爾斯及油多シノ或云龍腦様
 強壯ノ藥トス効用大抵白芷ノ如シ凡寒粘液壅塞
 ノ諸病總テ揮發衝動藥ノ適應スル症ニ良驗ヲ稱

ス○蒸氣及汗ヲ發シ粘液ヲ釋キ諸排泄ノ脉管ヲ
 開達シ冒寒欬嗽寒粘液性ノ水腫三日熱ヲ治ス○
 粘液性ノ痒不遂ニ用テ粘液ヲ排泄ス○胃虚冷ノ
 諸症痞氣鬱蓄疝痛ヲ治ス○粘液性ノ經閉ハ此藥
 ヲ對症ノ劑ニ加用テ殊効ヲ稱ス○服量細末ハ二
 刀マデー服トス或水煎丁幾劑トシ用フ○傷冷毒
 ノ齒痛ニ水煎ノ漱藥トシ良○蒸湯劑或芭布トシ
 施メ硬腫ヲ消散ス 依叔 依叔 伍伍

新訂增補和蘭藥鏡卷五終

