

新訂  
增補  
和蘭藥鏡

卷六

武  
856  
18-6

學大田稻早	館書圖
庫文田內者托寄	號一六一第書托寄
號	9
冊	2
冊	6



武門  
號 856  
\* 18-6

京都府立  
中央圖書館  
藏

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷六

幾那

試効括套

幾那煎 服量

間歇熱

間歇熱。幾那經驗說

發作前用幾那說

經驗自第一至第七

苦味健胃飲

健黃丁幾劑

發作後用幾那說

經驗自第八至第十一

發作前後用幾那說

經驗自第十二至第十四

善書

大正九年九月廿四日  
內田糸子氏贈

發作前後間。用幾那說

間歇往來諸症

鎮痙經驗說 自第一至第八

赤痢 失血

焮腫眼 蛇蟲

酸敗液 痘瘡

瘰癧 肺瘍

潰瘍 壞疽

癌瘡

條詩賦林和蘭藥發露目



新訂增補和蘭藥鏡卷六

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

幾那

○「ゴルテクス・ペルヒア」ニ羅

○幾那ノ產地形狀種類主治名ニ載ス唯此編其遺漏セル試効及經驗說ヲ舉グ

試効括套幾那收瀋衝動ノ諸器脉管ヲ強壯シ血液

ヲ稠厚シ腐敗ヲ遏メ諸脫泄ヲ止メ虚憊ヲ回復ス

然レ一切焮衝病多血壯實ノ熱病胃腸汚物鬱滯ア

ル症ニ用レバ其焮熱稠厚ノ血液ヲ逾稠厚ニシ牽

張セル脉管ヲ益強硬ニシ血ノ運行ヲ更ニ強盛ニ

シ。病毒ノ排泄ヲ壅遏スル故ニ大害アリ○此藥ハ  
總テ虛憊ノ諸病ニ奇効ヲ奏スレモ未ダ虛極危劇  
ノ諸症ヲ發セズ。胃腸ノ運營ハタラキ仍此藥ヲ消化ノ健輸  
スベキ精力アル者ニ非バ功ヲ成<sub>ス</sub>不能<sub>ス</sub>ト知<sub>ル</sub>ベシ  
○大約此藥ノ良効アル病ハ神經熱。腐敗熱。腐敗性  
咽喉潰瘍。諸脫泄失血。瘰癧腺腫。壞疽。虛症。欬衝。痙攣  
搐掣。感觸過甚。諸症。處女病。蟲症。發作定期アル諸症  
ナリ○幾那ハ散劑トシ用<sub>ヒ</sub>テ尤<sub>モ</sub>効アリ。但<sub>シ</sub>患者其味  
ヲ惡ム者ハ薄荷水或甘草泡劑ニ加<sub>ハ</sub>或蜜沙糖等ニ  
調和シ。其他適宜ノ飲液ニ和シ與<sub>ヘ</sub>。或細末一<sub>ヲ</sub>

沸湯若<sub>ハ</sub>冷水或葡萄酒。六<sub>ヲ</sub>ニ浸シ重湯ニテ藥氣  
ヲ出シ滓ヲ去<sub>リ</sub>用<sub>フ</sub>或水煎。越幾斯劑<sub>ヲ</sub>丁幾劑トシ用<sub>フ</sub>。  
丁幾劑ハ幾那ニ含<sub>ル</sub>華爾斯ヨク溶解スル故ニ効  
多シ。幾那<sub>ヲ</sub>丁幾劑單方名ニ出<sub>ル</sub>複○泡劑沸湯若<sub>ハ</sub>冷  
方ハ後ノ神經熱ノ條ニ出<sub>ル</sub>○泡劑水ニ浸シ蓋  
閉<sub>シ</sub>泡<sub>ハ</sub>煎劑ニ比スレバ其精微質蒸散セズ但<sub>シ</sub>水  
煎。後方ノ如クスレバ其精微質蒸散スル<sub>ト</sub>ナシ

幾那煎

幾那 搗碎者 一<sub>ヲ</sub> 蒸餾水 三十<sub>ヲ</sub>  
右磁罐ニ内<sub>レ</sub>ヨク蓋閉シ煮<sub>ル</sub>十密ニ扭ト篤ト條ニ註<sub>ス</sub>滓ヲ  
去<sub>リ</sub>靜定ノ上清ヲ取り服ス○幾那ヲ服<sub>ノ</sub>胃中ニ

重滯シ心下痞滿。食進マザル等ノ症ヲ發スル者ハ其劑一服ニ乾薑末二三匁加ヘ或桂末五匁許加用ベシ。○幾那ハ瀉下ノ効ナシト雖モ體稟感觸シ易キ人ハ動スレバ胃腸ヲ觸動ノ下利スルコトアリ。此症ハ香竄揮發ノ藥若ハ阿芙蓉ヲ用テ治スベシ。或云。幾那ヲ服メ下利シ若ハ嘔吐スル者ハ其劑一服ニ阿芙蓉液三四滴宛加用レバ其症止ム

**服量** 通例諸病ニ用ル服量 間歇熱服量 別ニ次ニ出 散劑ハ一匁ヨリ一錢ニ至ル。煎劑ハ一匁ヲ水八匁ニ煮テ滓ヲ去リ半時毎ニ一匙宛服ス。冷浸劑ハ二匁マデ取テ

水若ハ葡萄酒六匁ニ浸シ濾テ滓ヲ去リ服ス 簡

**間歇熱** 日發熱。間日熱。三日熱ハ幾那ヲ經驗ノ奇藥

トス然レ其病毒惡液ヲ驅除セズノ用レバ治スレバ再發シ其熱頑滯ノ解シ難ク或神思沈重。胸脇苦滿。心下困重。腹肚痞脹。便秘。子宮衝逆。痙攣搐掣。遷延内伏熱。黃疸。水腫等ヲ發ス是幾那ニテ血液ヲ稠厚ニシ諸腺細管ヲ強固シ熱毒沸騰ノ銳勢ヲ抑遏ノ其發動ヲ制服スル故ニ其毒鬱勃メ再ビ沸騰シ或潛伏内攻メ諸部ヲ損害スレバナリ然レバ胃腸及血中ノ汚液ヲ淨除メ幾那ヲ用レバ罷弊弛弱ノ脉管

ヲ收固ノ血液ヲ稠厚トナス故ニ微邪殘毒アレハ  
 發動セズ是ニ來ノ生氣ノ運行旺盛ノ其剩汚ヲ諸  
 竅ニ驅逐ノ治ス○患者眼中黃色ヲ帶胸脇苦滿拘  
 痛心下痞鞭或按テ疼食ヲ惡之或惡心嘔噦口中苦  
 舌苔アリテ燥キ頭痛スル等ハ胃中熱毒鬱滯ノ候  
 ニノ吐劑ヲ的當トス大便壅滯腹肚拘攣痞鞭腸鳴  
 腰痛等ノ症アルハ腸中鬱滯アル候ニノ下劑ヲ的  
 當トス小便濃赤ニノ短少汗亦少キハ病毒凝結ノ  
 未<sub>レ</sub>疏解セザル候トス清涼疏解稀釋ノ劑ヲ用<sub>レ</sub>ベシ  
 斯ノ如ク療法ヲ施ノ大抵發作七八回ニノ治セズ

或患者罷勞ノ病勢險重ニ進ニ或發作ノ諸症劇盛  
 ニノ長ク醒解シ難キハ皆法ノ如ク幾那ヲ用保護  
 温煖ニノ蒸氣ヲ發スレバ治ス○患者脾病及腹内  
 諸器壅塞塊結シ或多血ニノ瘀血諸部ニ凝聚シ或  
 痔血月經壅滯スル者ハ先刺絡ヲ施シ或下劑ヲ用  
 或對症ノ解凝劑苦味解凝鹽霸王鹽孕礬或大黃ニ  
 刺<sub>ツ</sub>篤<sub>ト</sub>亞<sub>ス</sub>斯若ハ酒石葉ヲ加用テ其壅塞凝結ヲ疏解  
 ノ後幾那ヲ用<sub>レ</sub>ベシ以上諸藥皆名幾那ノ條患○畢  
 竟此熱病ハ自然良能ヲ以テ體中ニ潛蟄セル病毒  
 ヲ汗小便痰唾等ヨリ驅逐シ除カ爲ニ發スル故ニ

增訂林蘭齋錄 卷六

風雲堂藏

其數回ノ發作ハ即<sub>チ</sub>病毒ヲ除<sub>ク</sub>ノ一療法ノ如<sub>ク</sub>シ早ク  
是ヲ遏止スル<sub>コト</sub>勿<sub>レ</sub>○或<sub>ハ</sub>吐下劑ヲ須<sub>ス</sub>メ幾那ヲ  
用ル症アリ。是ハ初<sub>ニ</sub>發作ノ熱烈ク。脉動齊ハズ。顔色  
萎<sub>シ</sub>。大<sub>ニ</sub>煩悶ノ數。昏眩冷汗出<sub>テ</sub>。或<sub>ハ</sub>胃疼甚ク。或<sub>ハ</sub>發  
作中昏睡シ。或<sub>ハ</sub>吐下休<sub>ズ</sub>。或<sub>ハ</sub>大便ニ血ヲ交<sub>ヘ</sub>。或<sub>ハ</sub>大<sub>ニ</sub>  
發汗スレ<sub>ハ</sub>熱解セズ。或<sub>ハ</sub>大熱ノ發汗スレ<sub>ハ</sub>惡寒休<sub>ム</sub>  
ザル者ハ大<sub>ニ</sub>危篤トス。速<sub>ニ</sub>幾那ヲ用<sub>フ</sub>ベシ。否<sub>ラ</sub>ザ  
レバ次ノ發作ニ死シ。或<sub>ハ</sub>四五發中ニ斃ル○或<sub>ハ</sub>患者  
疲勞甚ク。或<sub>ハ</sub>老人。虛人。孕婦ノ如キハ。病毒盡ク除<sub>ク</sub>マ  
デ疏滌スレ<sub>バ</sub>其疲勞ニ堪<sub>ザ</sub>ル故ニ幾那ヲ用<sub>テ</sub>治

スベシ○此熱頑滯ノ治セズ患者虛羸ノ水腫ヲ兼<sub>テ</sub>  
或<sub>ハ</sub>其熱治ノ後。水腫ヲ發スル者亦幾那ヲ用<sub>テ</sub>殊効  
アリ○此熱病幾那ヲ用<sub>テ</sub>發作休<sub>テ</sub>後。下劑ヲ投<sub>メ</sub>多<sub>ク</sub>  
瀉下スレ<sub>バ</sub>其熱再發ス。其故ハ數回ノ發作ニテ病  
毒自<sub>ラ</sub>汗。小便等ヨリ解散シ。又吐下清解ノ劑ニテ  
漸<sub>ク</sub>減スレ<sub>ハ</sub>其熱仍<sub>チ</sub>發作スル者ハ諸管血液充張健  
運セズノ些<sub>少</sub>ノ邪毒ト雖モ制服スル<sub>コト</sub>能ハズ且<sub>ツ</sub>  
從<sub>テ</sub>前發歇往來ノ運動。舊滯因循ノ餘勢ヲ挽回スル  
<sub>コト</sub>能ハザルナリ。故ニ幾那ヲ用<sub>テ</sub>精力健旺充足ス  
ル片ハ微邪アレ<sub>ハ</sub>萌發スル<sub>コト</sub>能ハズ。其熱熄<sub>ル</sub>然<sub>レ</sub>ニ

下劑ヲ投ノ其健旺ノ順機ヲ摧折スレバ餘邪復虚ニ乘ノ滾動シ其熱再發ス此症淹滯セル間日熱及三日熱ニ多シ或云此病幾那ヲ用治ノ後速ニ下劑ヲ與レバ幾那ニテ稠厚ニナリタル血液復稀釋ノ沸騰シ其熱再發ス○胃腸病毒鬱滯アル者ハ其症ニ隨ヒ吐劑或下劑ヲ用テ淨掃スルヲ勿論ナレモ長ク疏滌スレバ胃腸虚憊ノ消化ノ機力ヲ失ヒ飲食重滯ノ復敗液粘穢ヲ生シ是ニ幾那ヲ用レバ消化セズノ停滞シ逾虚憊ノ險重ヲ致ナリ是ヲ以テ間歇熱其他諸病ニ於テモ胃腸消化ノ健力ナキ症

ハ幾那ヲ用テ害アリ故ニ先苦味健胃揮發香竈ノ藥ヲ與テ其消化ノ力ヲ復スベシ假令バ葛爾儒健質亞那珊篤里亞爾鮮等ノ越幾斯劑ヲ薄荷水ニ溶用ヒ其症復スルニ至テ幾那ヲ用ベシ初ハ幾那ノ末ヲ薄荷水其他香竈ノ露水ニ加用ヒ或攝爾扁答纈草等香竈揮發ノ藥ヲ加用テ殊効アリ○患者舌苔心下苦滿痞鞭等ノ症アルニ因テ吐劑ヲ與ヘ或數日下劑ヲ用テ胃腸虚憊シ是ニ由テ荏苒トシ治セザル者多シ此症ハ右ノ如ク消化ノ力ヲ復メ幾那ヲ用ニ非レバ治シ難シ殊ニ頑固ノ間歇熱ハ長



下劑ヲ用テ胃腸ニ汚滯ナシト雖モ全身虛衰シ特ニ胃罷弊スル片ハ幾那ヲ用レ其消化セズノ効驗ナク終ニ水腫或羸瘦病トナリテ危險ニ至ル者アリ〔紐〕○凡秋ノ間歇熱治セズノ替留熱トナルハ胃腸熱ノ性ヲ夾ム故ニ甚解シ難シ此症既ニ吐下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨掃スレ其熱仍頑固ニ退ガレ者ハ幾那ヲ用テ良効アリ斯如キ險重ノ症ハ幾那散劑的當セズ浸劑若ハ煎劑トシ揮發防腐ノ衝動藥ヲ加殊ニ龍腦ヲ加テ尤効アリ或龍腦ヲ亞刺比亞アゴム護漿〔名〕ニ研和シ幾那煎ニ加レハ能混和ス燒

酒ニ研和スル者ハ煎劑ニ融化シ難シ○間歇熱ニ微毒ノ諸症或疥癬ヲ兼ル者ハ幾那末ニ甘汞ヲ研和シ用テ効アリ  
○服量間歇熱ハ幾那半時毎ニ一錢宛用フ患者ヨク其量ニ堪ル間ハ効アリ是ニ堪ガル者ハ効ナシ○幾那ヲ服スルト三日ニノ胃腸ニ壅滯ノ諸症ヲ發スル者ハ吐劑下劑或加羅蔑兒カハシヲ加ル下劑ヲ與胃腸ヲ淨刷ノ後幾那ヲ用テ的効アリ○間歇熱ニ幾那ヲ用テ治スレ其再發スルト多キ故ニ治後仍服量ヲ減メ數日用ベシ〔取〕〔物〕〔布〕〔羅〕〔圖〕  
〔斯〕〔自〕〔伍〕〔底〕〔利〕

間歇熱幾那經驗說 古今醫家間歇熱ニ幾那ヲ用テ  
 奇効ヲ稱スレハ是ヲ用的當ノ時限ヲ辨セザレバ  
 服量多ノ功少ク或大害ヲ致シヨク其時ニ的當ス  
 レバ服量少クノ捷効ヲ奏シ毫モ害ヲ貽<sub>レ</sub>ナシ故  
 其時限ヲ知<sub>レ</sub>テ緊要ナリ。但是ニ三等アリ。即其熱ノ  
 發作前發作後及發作後ヨリ次ノ發作前マデノ間  
 ナリ。發作中ハ用<sub>レ</sub>テナシ大害アレバナリ右三等時  
 限ニ用<sub>レ</sub>テ功害各異ル經驗說ヲ左ニ舉テ考證ニ備  
 ○發作前幾那ヲ用ル說  
 先哲幾那ノ細末二錢ヲ取發作ノ一時前ニ用テ治

驗ヲ稱ス。然<sub>レ</sub>ハ數是ヲ試用ニ或嘔吐煩悶シ或熱勢  
 險重ニ進<sub>ミ</sub>或變ノ替留熱トナリ或一旦治スレハ  
 再發スル等ニテ動輒<sub>バ</sub>頑固危篤ノ病トナル者ア  
 リ。舍電發<sub>ハ</sub>謨斯微<sub>ハ</sub>向<sub>ハ</sub>人<sub>共</sub>モ既ニ是ヲ講明セリ○其  
 害アル所以數件アリ其一ハ凡熱病ノ初發及惡寒  
 中ハ全軀ノ脉管纖維悉ク痙攣樣ノ運動ヲ發シ  
 急牽縮シ胃及其傍圍諸器ニ於テ殊ニ甚シ故ニ稍  
 重キ間歇熱ハ發作ノ初惡心嘔噦心下苦悶嘔吐等  
 ノ症アルヲ以テ知ベシ。是ニ由テ胃中ノ物消化セ  
 ズ又是ヲ腸ニ傳送スル<sub>レ</sub>能ハズ故ニ其服スル藥

モ消化セズノ停滯ス○其二ハ右ノ如ク諸脉管牽縮スル故ニ血液凝泣ノ行ラズ。諸液ノ分利排泄殆ト廢止ス故ニ口舌乾燥煩渴引飲等ヲ發シ胃中ノ津液殊ニ減耗ス胃ノ裏面ノ諸腺牽縮ノ然ニ幾那ノ末ヲ服スレバ是ヲ溶化スベキ津液ナキ故ニ血中ニ運輸セズノ其効力ヲ百體ニ布化スルヲ能ハズ故ニ發作中頑然トノ胃中ニ鬱滯シ。逾其熱及攣急ヲ増發ノ發汗ヲ阻遏ス。胃ノ感觸甚キ人ハ其症殊ニ劇盛ナリ○其三ハ發作前ニ幾那ヲ服スレバ吐スル者アリ。即次ニ舉經驗說ノ

**第二** **第五** **第十四**

ノ如シ。是胃中ニ重滯ノ大ニ其攣急ヲ増發スルト宛モ發作中ニ是ヲ與ルカ如クナレバナリ發作後。是ヲ服スレバ曾テ嘔吐スル者ヲ見ズ。乃其經驗說ヲ左ニ舉テ考據トス

**第一** 一婦人二十三歳。重複間日熱ヲ患ル。既ニ一月。五月三日是ヲ診シ先吐劑ヲ與テ吐スル。一回。次ニ苦味健胃飲次ニヲ與ヘ。同六日夜。發作ノ一時半前ニ幾那末一錢ヲ與ヘ。半時ヲ經テ又一錢ヲ與フ。然レ其熱發作ス。翌日モ亦前法ノ如ク一錢宛ニ服用フ。然レ發作ス。但前夜ニ比スレバ差輕シ。其翌

夜モ前法ノ如ク用レ其發作劇ク且胸脇痛ヲ發ス。故ニ幾那ヲ休ム。苦味健胃飲健質亞那四錢 橙皮一錢 胡荽子半錢 銳烈燒酒四 水ヲ加浸ス。一右先三味ヲ暫ク燒酒ニ浸シ次ニ 水ヲ加浸ス。一夜滓ヲ去リ硝子壘ニ入固封シ貯 へ。一匙宛與フ。此劑諸病ニ用ヒテ健胃驅風ノ殊効ヲ稱ス。

第二一男子二十一歳重複ノ間日熱ヲ患レ三週五月十七日はヲ診シ刺絡ヲ施シ一回吐劑ヲ用レ二回次テ健黃丁テニキ幾劑次ニヲ用ヒ同二十日發作ノ三時半前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛與ルニ第三服至テ盡ク其末ヲ吐ス故ニ其量ヲ減シ半時毎ニ半錢宛用然レ第四服後發作ス但前日ニ比スレバ

差輕シ 健黃丁幾劑 大黃二兩 健質亞那四錢 攝爾扁答一錢 銳烈燒酒二升 右調勻シ浸

加用此劑胃腸ヲ健運シ粘液汚物ノ鬱滯ヲ疏滌ス  
第三一婦人二十歳間日熱ヲ患レ三週五月十八日

是ヲ診シ先吐劑ヲ與ヘ次ニ苦味健胃飲前ニヲ用六月朔日發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛用テ四服ニ至ル然レ其熱發作ス同三日發作ノ三時前ヨリ半時毎ニ其末一錢宛用テ六服ニ至ル然レ其熱發作シ同五日モ亦發作セリ

第四一男子三十歳日發熱ヲ患レ七日二月十二日  
是ヲ診シ先吐劑及下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨掃シ同十

六日發作ノ三時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛用  
 一四服。然レ其熱發作ス。但前日ニ比スレバ差輕シ  
 第五一男子二十一歳。日發熱ヲ患テ三週三月二十  
 二日はヲ診シ先吐劑及下劑ヲ與テ胃腸ヲ疏滌シ  
 四月朔日發作ノ二時半前ヨリ半時毎ニ幾那末一  
 錢宛用ル一四服。然レ其熱發作シ少間シテ嘔吐ス。  
 但翌日ハ發作セズ。同三日劇ク發作ス故ニ爾後其  
 時ニ拘ラズ其熱盡醒ル時數幾那ヲ用テ全治セリ  
 第六一男子二十五歳。日發熱ヲ患フ。十一月二十三  
 日はヲ診シ。發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一

錢宛用フ。然レ其熱發作シ翌日モ亦發ス。但前日ニ  
 比スレバ差輕シ。故ニ其後數是ヲ用テ終ニ治ス  
 第七一男子三十六歳。初間日熱ヲ患テ日發熱トナ  
 ル。正月二十三日是ヲ診シ。發作ノ二時前ヨリ半時  
 毎ニ幾那末一錢宛用一四服。然レ其發作ス。其翌日ハ  
 發熱輕クノ惡寒ナシ。因テ其後數幾那ヲ用テ終ニ  
 全功ヲ收ム

○發作後幾那ヲ用ル說

幾那ハ元來速効アル藥ニ非ズ。時日ヲ經テ漸功ヲ  
 成者ナリ。其故ハ是ヲ服ノ胃液ト混和シ徐クニ溶

化ノ血中ニ運輸シ百體ノ筋脉諸管ニ周布巡灌シ  
 漸ク融液浸潤ノ効功ヲ成セバナリ又其收瀦ノ効  
 カヲ以テ諸筋及一切凝體諸器ノ弛虛衰頹ヲ強健  
 スト雖モ其首功ハ專ラ神經質ニ竄透貫徹ノ全身脉  
 管質ノ運動ト觸知トヲ資補強健ニスト知ベシ○故  
 是ヲ用テ大抵七八時ヲ經ザレバ其發作ヲ遏止ス  
 ルヲ能ズ其十分功ヲ成ニハ十五時若ハ二十時ニ  
 至ベシ○通例幾那末四錢ヲ取發作後直ニ用或其  
 發汗ノ終ニ用或間日アル熱ハ發作ノ二十時前ニ  
 用レバ能驅熱ノ功ヲ成ス是其醒解ノ長キ間ニ幾

那ノ効力ヲ遲發スレバナリ然ズノ發作前半時ヨ  
 リ二時ノ間ニ用レバ服量多シト雖モ功少キヲ前  
 ノ經驗說ノ如シ故ニ幾那ヲ用ニハ次ノ發作ニ遠  
 ホド逾功多ト知ベシ是經驗說ノ第五第六第七ノ  
 症ハ是ヲ發作前ニ用テ効ナク次ノ發作ヲ遏止ス  
 ルガ如シ或發作ヨリ次ノ發作マデノ間ニ用片ハ  
 多クハ即日ノ熱ヲ解セズ次ノ發作ヲ遏止スル  
 ヲ以テ知ベシ是間歇熱ノミナラズ凡幾那ノ功ア  
 ル諸病ハ是ヲ用テ兩三日ヲ經ルニ非レバ其功ヲ  
 見スヲナシ神經熱腐敗熱寒壞疽胃虛飲食消化シ

難キ症 重訂内科撰要第二章ニ出ツ等ニ是ヲ用ルガ如シ即  
發作後ニ用ル經驗說ヲ左ニ舉グ

第八 一男子二十五歲間日熱ヲ患フ十四日六月六日  
是ヲ診シ。苦味健胃飲 前ニ出ツニ 旃那葉ヲ加倍シ用  
フ四弓ニノ瀉下八行翌七日夜五更ニ發作シ。八日  
午中刻發汗シ。殆ト醒解スル頃幾那末一錢ヲ用ヒ  
是ヨリ半時毎ニ一錢宛用テ四服ニ至ル。其後必モ  
發作セズ全治セリ

第九 一男子十九歲間日熱ヲ患フ二週六月十二日  
是ヲ診シ。吐劑ヲ與ヘ。次ニ苦味健胃飲ニ旃那葉ヲ

加用ヒ。同十七日發作後速ニ幾那末二錢ヲ與ヘ。一  
時ヲ經テ又二錢ヲ用フ。同十九日微惡寒スルノニ。  
爾後再發セズ

第十 一婦人三十六歲間日熱ヲ患フ三週二月二十  
七日是ヲ診シ。吐劑ヲ與テ吐スル一ニ回。次ニ下劑  
ヲ用フ一ニ回。三月八日發作後半時毎ニ幾那末一錢  
宛用フ四服同十日。些モ發作ノ候ナシ。爾後尚再發  
ヲ防カ爲メニ幾那末ヲ與テ健康ニ復ス

第十一 一婦人十六歲日發熱ヲ患フ。三月二十三日  
是ヲ診シ。吐劑ヲ與ヘ吐スル一ニ回。次ニ大黃劑ヲ

用テ瀉下シ。四月二日發作後。發汗止ムニ至テ速ニ  
幾那末一錢宛。半時毎ニ用テ四服。翌日惡寒ナク唯  
微熱アルノ之同。四日胸脇痛ヲ發ス。因テ刺絡ノ其  
痛消散シ爾後其熱再發セズ回復ス

○發作前後幾那ヲ用ル說

發作後。幾那ヲ用レバ峻効アルヲ右試說ノ如シ然  
レ或云其發作前ニ幾那ヲ用テ効ナキ患者ハ發作  
後。是ヲ用ト雖モ亦同ク効ナカルベシ或發作後幾  
那ヲ用テ効アル症ハ發作前ニ是ヲ與ト雖モ亦同  
効アルベシト。斯ノ如ク疑議スル片ハ一人ノ患者

ニノ右兩件ノ治法ヲ施スニ非レバ是ヲ明決シ難  
シ乃此疑惑ヲ氷釋センガ爲ニ又其一二ノ試說ヲ  
左ニ擧テ考據トス

第十二 一男子三十六歲。間日熱及日發熱ヲ患。二  
月餘。十一月二十六日。發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ  
幾那末一錢宛用テ四服ニ至ル。然レ其熱發作ス。因  
テ翌日發作後。發汗終テ幾那末一錢宛半時毎ニ用  
テ三服。是ニ由テ其熱再發セズ平復ス

第十三 一男子二十五歲。日發熱及間日熱ヲ患。五  
週。五月十一日。是ヲ診シ。同十九日發作ノ一時半前



ニ幾那末二錢ヲ與ヘ。半時後又二錢ヲ用フ。然レ其熱發作ス。但以前ニ比スレバ差輕シ。同二十一日劇ク發作ス。故ニ同二十三日發作ノ一時半前ヨリ四分時毎ニ幾那末二錢宛用テ四服ニ至ル。然レ其熱發作ス。因テ暫ク幾那ヲ休メ。同二十九日發作後發汗終ル頃幾那末二錢宛四分時毎ニ用テ四服ニ至是ヨリ其熱發作セズ回復ス。○此症ハ發作前ニ幾那四錢ヲ服シ又一ヲ服ノ効ナシ。故ニ數日幾那ヲ休其熱ヲメ發作セシム。然ラズメ直ニ發作後幾那ヲ用テ發作歇ルハ其發作前ニ用タル幾那人功

ナリト思フニテ恐レバナリ **第十二**ノ症モ是ニ同

**第十四** 一婦人十六歲頑固ノ日發熱ヲ患フ三月十日是ヲ診シ吐劑及下劑ヲ與テ胃腸ヲ淨掃シ同十五日發作後幾那末一錢半宛半時毎ニ用テ四服翌日其熱輕ク發作ス。故ニ又幾那ヲ用テ前日ノ如クス。然レ翌日仍輕ク發熱ス。因テ數日幾那ヲ休メ。同二十五日發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛用テ三服ニ至ル。然レ其熱發作ス。同二十七日亦發作前ニ幾那末二錢宛用テ三服。然レ發作ノ盡ク其幾那ヲ吐ス。是ニ因テ同二十八日發作後幾那末

一錢宛半時每ニ與テ六服ニ至ル。是ニ因テ其熱發作セズ。然レ其後數日仍微熱アル故ニ幾那ニ攝爾扁答ヲ加用テ全治セリ。此症ハ初發作後幾那ヲ用テ一二日。次ニ發作前ニ用テ一二日ニ効ナシ。因テ暫ク幾那ヲ休メ。復發作後是ヲ用テ發作休ム。然レ此症甚ダ頑固ニシテ微熱尚暫留スル故ニ攝爾扁答ノ加功ニ因テ終ニ全功ヲ收ルナリ。

○發作前後ノ間幾那ヲ用ル說

發作後ヨリ次ノ發作マデノ中間ニ幾那ヲ用テ古來醫家普通ノ善法トス。然レ其効大抵發作前ニ用

ルト發作後ニ用ルトノ中間ニ在ト知ベシ。發作後。用ルニ比スレバ發作ニ近キ故ニ幾那十分ニ消化シ難ク。胃中ニ重滯ノ其効力ヲ逞發スルヲ能ハズ。故ニ多クハ即日ノ熱ヲ制伏セズ。次ノ發作ヲ遏止スルナリ。

間歇往來諸症凡熱病ノ毒體中ニ潛伏ノ發スル病

多クハ時日ヲ定テ發シ或初欠伸ノ頭目鬱重或微惡寒シ終ニ發汗ノ解シ發作ノ時通スル小便塗アリテ洩器ニ沈ムヲ粉ノ如シ。或熱退キ減スルヲ多クノ幾ト間歇アル如キ症。或微惡寒アリテ發熱シ

時日ヲ定テ發シ在苒トノ治セザル症ハ皆幾那良  
 効アリ○一婦人隔日ニ眼焮赤劇痛ス一患者眼焮  
 痛時ヲ定テ發ス皆幾那ヲ用テ治ス○一小兒隔日  
 ニ劇キ衄血ヲ發ス一患者隔日ニ劇キ乾欬ヲ發シ  
 昏睡ノ發汗シ解ス一患者隔日ニ右脇疼痛ス皆幾  
 那ヲ用テ治ス○毎日時ヲ定テ發スル齒痛其他斯  
 ノ如キ諸症下劑ヲ用テ治セザル者或毎年同シ時  
 候ニ發スル病ハ皆幾那ヲ用テ治驗多シ  
 羅布物  
 鎮痙經驗說 幾那ハ鎮痙ノ一藥トス痙攣拮掣ノ諸  
 病ニ試用セル經驗說ヲ左ニ記ス

**第一** 一男子十八歲驚駭ニ因テ癩ヲ發シ淹滯ノ治  
 セザルヲ八年又二年以前ヨリ癡駭ノ症ヲ兼ナリ毎ニ  
 睡中ニ發シ傍人其頭ヲ擡ゲ漸ク起坐セシムレバ  
 間醒解ス然レ患者是ヲ知レナシ此症幾那ヲ用テ  
 一月許ニノ劇症大ニ減シ爾後唯罕ニ輕ク發動ス  
 ルノミ

**第二** 一男子二十一歲癩ヲ患テ二年幾那ニ纈草ヲ  
 加用ルヲ十日ニノ諸症大ニ輕快ヲ得タリ

**第三** 一婦人二十四歲五月以前勞動ノ體大ニ熱シ  
 又遷ニ冷氣ヲ被リ爾後上腹兩側疼ミ其後腹筋數

牽引ノ呃逆ヲ發シ。又下顎掣動ス。諸症發止時アリ。又發作中ハ脉駛數ニノ算<sup>カ</sup>ヘ難シ。稍<sup>ヤ</sup>神思ヲ擾動スレバ乍チ發作ス。但<sup>シ</sup>月經調順ナリ。此症麝香十<sup>ツ</sup>瓦宛用<sup>レ</sup>一日三次或<sup>ハ</sup>テ十五<sup>ツ</sup>瓦宛用<sup>レ</sup>一日六日。然<sup>レ</sup>尺寸効ナク脉狀及肢體ノ冷暖少<sup>シ</sup>モ變動ナシ。又子宮衝逆ヲ兼發ス。因<sup>テ</sup>幾那ニ益智及撒兒末爾扶斯<sup>名</sup>各少許ヲ加<sup>テ</sup>散劑トシ用<sup>レ</sup>三週ニメ全愈セリ。

**第四** 一婦人十八歲熱病ヲ患<sup>テ</sup>後子宮衝逆ヲ發シ淹滯ノ治セザル<sup>ト</sup>數週終ニ幾那ヲ服<sup>メ</sup>回復ス。

**第五** 一婦人二十四歲生稟壯實四年以前左肋ヲ打

撲シ以來其部疼痛脇下苦滿困重腹内風氣痞脹及子宮衝逆ヲ兼<sup>テ</sup>腹内癥塊アリ。又三月以來效嗽心下疼痞氣脹悶殊ニ甚<sup>シ</sup>。月經ノ多少遲速定ラズ。又七日以來頭痛及劇<sup>キ</sup>呃逆ヲ發シ心脇下疼殊ニ甚<sup>シ</sup>シク呃逆休時ト雖モ其疼止<sup>ム</sup>ナシ脉初ハ差數ナレ尺其後平常ヨリハ遲緩ナリ此症先<sup>ニ</sup>呃逆ヲ治セ<sup>ン</sup>ガ爲ニ麝香龍腦阿魏阿芙蓉纈草等ヲ内服セシメ揮發精的里亞加鎮痛膏等ヲ外敷シ七週ヲ經レ尺寸効ナシ。次<sup>テ</sup>幾那ヲ用<sup>レ</sup>五日亦微効ヲ得ズ。終ニ刺絡ノ瀉血スル<sup>ト</sup>九<sup>ツ</sup>其血質平常ノ如シ是ニ

由テ呃逆止ニ諸症寛解シ五六日ヲ經テ回復ス

**第六** 一男子十八歳舞蹈病

癩狂ノ一種重訂内科撰要癩癲搐掣篇第四百十

三章 出ヲ患テ既ニ三週乃チ纈草根末半錢或一錢宛用

一日四次五日連用ノ搐掣ノ諸症寛解シ步履穩靜

言語分明飲食嚥下亦平常ノ如シ但睡中搐掣休ガ

ルニ因テ仍是ヲ用テ數日搐掣筋惕調動等大抵減

スレ氏全治セズ終ニ幾那ヲ用テ平復ス

**第七** 一女子十五歳冒寒及驚駭ニ因テ舞蹈病ニ罹

ル一既ニ十四日纈草根末一錢宛用一日四次四日

連服ノ効ナシ終ニ幾那ヲ用テ全治セリ

**第八** 一少年十四歳卒然トノ昏睡シ肢體彊直些モ

轉側屈伸スルヲ能ハズ時々醒解スレ氏復發シ治

セザルヲ數週乃チ纈草根末二刀宛用ル一日四次六

日ヲ經テ又發シ前ノ發作ニ比スレバ甚ダ癩ニ似

タリ因テ幾那ヲ用テ數週諸症大抵回復セリ

○凡癩癲搐掣ノ諸症ノニテ他病ヲ兼子ザル者

ハ幾那偉効アリ但火モ燉衝ヲ兼ル症ハ甚ダ害ア

リ右八種ノ症ハ些モ燉衝ヲ兼ザル者ナリ○或又

傷骨傷打撲傷等ニテ癩ヲ發スル者ハ即チ神經損傷

ナリ即破傷風此症ハ幾那ニ阿芙蓉ヲ加用ヒ或幾那一

味用テ効アリ或阿芙蓉ヲ用テ増劇スル症幾那ニ  
テ治スル者多シ或幾那ノ煎汁ヲ吉利詞キリス參兒テイルトシ  
施スモ亦驗アリ依

**赤痢**惡性ノ痢疾病毒酷烈ニ血液速ニ腐敗シ終  
ニ腸壞疽トナリ虚脱ノ危劇ノ惡症ヲ發シ死スル  
者多シ此症ハ揮發壯神劑後ノ神經熱ニ幾那ヲ加  
用テ腐敗熱ノ如シ且阿芙蓉劑ヲ兼用メ治スベシ  
**失血**諸失血過多患者虚脱シ必モ焮衝ノ候ナク或  
血液腐敗崩壞ヨリ發スル症ハ幾那峻効アリ○刃  
傷出血多ク患者昏冒或搗掣等ノ危症ヲ發シ或一

旦出血止、在時、迸出シ或潰瘍ノ水綿様肉ヨリ出  
血スル者ハ幾那ヲ内服外用メ殊効アリ協

**焮腫眼**頑固經久ノ焮腫眼ハ幾那ヲ内服外敷メ大  
効アル一先哲ノ經驗說多シ

**虻蟲**幾那ハ殺蟲ノ良驗アリ一小兒六歲蟲症ヲ患  
ヒ幾那ヲ與テ夥ク虻蟲ヲ下シ治ス一女子十六歲  
危篤ノ蟲症ヲ患ヒ諸藥驗ナシ終ニ幾那ヲ葡萄酒  
ニ浸シ用ニ夥ク虻蟲ヲ吐下ノ愈ユ一女兒九歲虻  
蟲ニテ劇ク痲ヲ發シ諸藥効ナシ幾那末一弓水銀  
四錢ヲ蜜ニ研和シ每服一小刀尖宛數用テ治ス協

**酸敗液** 幾那ハ酸敗液ヲ消ノ腐敗ヲ止ム凡、腐敗セ  
 ル者ヲ幾那、浸劑ニ淹<sup>ヒタ</sup>セバ臭穢ヲ消スルモ一ハ制  
 酸ノ効ニ因ル故ニ酸敗液ヨリ發スル經久胃腸ノ  
 諸症ニ殊効アリ 叔底

**痘瘡** 痘見點スレ<sup>レ</sup>起脹セズ或、陷塌シ或、灰白色或、  
 灌膿ノ黃熟セズ或、黯黑ニシテ惡臭アリ或、根脚青色  
 ノ斑アルハ皆惡性ニシテ險痘トス幾那奇効多シ惡  
 痘流行ノ時、稟賦薄弱ノ小兒ハ預、是ヲ用ヒ。或、見點  
 起脹、遲慢ノ症ハ始終是ヲ用テ惡症ヲ防グベシ○  
 灌膿ノ腐敗甚ク、膿熱劇キ症ハ幾那ニ綠礬精ヲ加

用テ大効アリ○見點ノ熱解セズ痘速ニ楮色或、血  
 色或、黑色トナリ痘頂平陷、界地赤色蒼色ノ線縷若  
 ハ斑ヲ現シ痘中ノ液、酷厲ニシテ傍圍ニ侵蝕シ或、諸  
 竅失血ヲ發シ痘ノ臭氣甚、ノ汗大小便共ニ臭、臭ノ  
 如キハ皆腐敗熱ヲ兼ル者ニシテ其毒内攻シ危篤ニ  
 至、者多シ治法亦腐敗熱ト同シ○痘ノ暈圍紅色微  
 ナルハ虛痘トス幾那ヲ饒多ニ用、ベシ○小兒幾那  
 ヲ嫌フ者ハ是ヲ細末トシ砂糖若、ハ乳汁或、舍利別  
 ニ研和シ橙汁ヲ加、用ヒ或、幾那ノ濃煎汁ニ橙汁ト  
 砂糖ヲ加、テ煉膏ノ如クシ用、ベシ○幾那ハ痘瘡麻

疹ノ餘毒ヲ解スル一良藥トス○險痘治ノ後勞瘵ノ如ク欬ノ膿様ノ痰ヲ咯ク症ハ幾那牛乳ヲ與ヘ輕キ下劑ヲ兼用スベシ。總テ痘後ノ勞瘵ハ此二品尤<sup>E</sup>効アリ。但<sup>E</sup>牛乳ハ毎日多ク用<sup>E</sup>ベシ○麻疹腐敗熱ヲ兼レバ壯熱ノ大ニ煩悶昏眩譫語其他劇症ヲ發シ疹色淡白或紫蒼黑等ヲ見シ或ハ血色斑ヲ發シ忽チ消散内攻シ或ハ肺焮衝ノ酷厲液崩壞ノ忽チ失血ヲ發シ敗物ヲ下利ス其治法腐敗熱ト同然<sup>E</sup>治スル者罕ナリ羅物

**瘰癧**瘰癧性ノ酷厲毒ヨリ頸領耳下腺唇等ニ腫瘍潰瘍ヲ生シ其毒血液ニ浸滲ノ壞液ノ諸症ヲ發シ患者虛憊スルキハ幾那良効アリ。先哲瘰癧ニ用<sup>E</sup>テ治驗ヲ稱スルハ皆此症ナリ

**肺癆**痰ニ膿ヲ交テ夥ク咯キ患者精力虚損シ食後發熱シ食盡ク消化スルマデハ熱退カズ或ハ熱少クノ汗多ク小便澄清。或ハ熱退テ小便ニ膿ヲ交ヘ通ズル者ハ其發汗中ニ肺癆ノ膿自ラ血中ニ混メ小便ニ通スルナリ斯ノ如キ症ハ幾那ヲ用<sup>E</sup>テ精力ヲ強壯シ膿ヲ排<sup>E</sup>テ其腐敗熱ヲ治スベシ或ハ幾那ニ麗春花若ハ和胸劑ヲ加テ煎服シ或ハ幾那煎ニ麗春花玫瑰花黥失刺<sup>オキ</sup>獲<sup>ゴ</sup>等ヲ加テ泡出シ温服ノ良効アリ但膿ヲ吐<sup>ク</sup>ナク及<sup>ヒ</sup>凝體纖維強硬乾燥スル者或ハ少<sup>ク</sup>モ焮衝ノ候アル者ハ幾那害アリ



潰瘍 内部或外部ノ潰瘍或外傷潰爛シ患者精力虚損ノ其膿ヲ排泄スルヲ能ハズ内鬱ノ諸惡症ヲ發シ或其膿自ラ血中ニ濫流ノ膿熱腐敗ヲ發シ或膿樣ノ汚物ヲ下利スル症ハ速ニ幾那ヲ用テ膿ヲ排ヒ其熱ヲ解スベシ○腫瘍及外傷ニ炊腫シ將ニ濃潰セント欲スル症ハ幾那害アリ○凡潰瘍ノ腐爛甚クメ患者虚損シ精力充張セズノ愈難キ症ハ幾那ヲ的當トス是ヲ用レハ弛軟ノ敗肉收固ノ臭穢消シ良膿ヲ醸ス○大ナル外傷腐爛ノ惡性ノ潰瘍トナリ患者虚損ノ血液腐敗スルハ瘡口ヨリ

稀キ敗血滲漏ス體中惡液多キ者ハ其腐敗殊ニ甚シ斯ノ如キ症ハ速ニ幾那ヲ用テ腐敗ヲ除キ精力ヲ補充メ治スベシ○瘡口淡白ニメ臭穢ノ稀膿滲出シ脉虚弱ナル症ハ熱甚ク舌燥クト雖モ幾那効アリ脉強數ニメ壯熱アル者ハ或刺絡ヲ施シ或酸收劑ニ消石ヲ加テ用ヒ幾那ヲ兼用スベシ○外傷潰瘍共ニ血液稀薄纖維弛緩ニメ水腫ヲ兼ル者ハ甚ダ危險トス幾那良驗アリ○外敷ニハ此細末ヲ患處ニ搽シ或芭布ト爲シ貼シ或煎劑若ハ浸劑トメ蒸湯シ瘻瘡ハ水鏡ニテ注入シ或水棉ニ蘸メ貼

シ咽喉口中ノ潰瘍ハ漱劑トシ斷舌等ノ潰瘍ハ幾  
 那未ヲ玫瑰蜜ニ和シ塗テ皆良驗アリ布  
 壞疽此病ハ内外所在ニ拘ラズ幾那ヲ内服外敷ス  
 ルヨリ効アルハナシ。幾那細末一弓分テ十二服ト  
 シ一時ニ一服宛用ヒ生肉ト腐肉ト分レテ善膿ヲ  
 成スニ至ルベシ或腐肉消スレハ膿稀クノ夥ク漏  
 泄シ患者虚憊スル症ハ其服量ヲ増シ膿減メ白色  
 稠厚トナルマデ用ベシ老人虚人は患テ大ニ潰  
 爛スル者ハ腐肉除クト雖モ終ニ死スレバナリ○  
 壞疽枯燥セズ稀汁出ル症ハ幾那良驗アリ。乾テ濕

汁ナキ者ハ効ナシ此症ハ血液凝固メ宛モ満ノ如  
 ク諸管纖維モ燥テ牽縮スル故ニ幾那ヲ用テ逾凝  
 固スレバナリ故ニ熱壞疽ノ炊衝性ノ症ニハ大害  
 アリ但脈弱ニノ虚脱甚キ者ニハ症ニ隨ヒ用ル  
 アリ○惡性ノ潰瘍及外傷大ニ腐爛ノ壞疽トナリ  
 或出血ヲ兼子或炊衝ナク唯腐敗熱ヲ發スル者ハ  
 幾那ヲ用テ治スベシ○壞疽ノ性アル咽喉腫ハ幾  
 那ノ煎劑或浸劑ヲ漱藥トメ尤効アリ布  
 癌瘡幾那ハ癌瘡ノ臭穢潰爛メ熱壞疽様ノ症ニ先  
 哲甚ダ効驗ヲ稱ス是ヲ歷試スルニ唯腐敗甚キ潰

爛癌ノ臭氣烈ク稀汁出テ劇痛焚クカ如キ症ハ幾  
那ヲ内服外敷ノ漸ク劇痛退キ出血止之潰爛減  
淨潔トナリ善膿ヲ成ス者多シ然レ其自性ノ酷厲  
毒ヲ變化ノ是ヲ全愈スルヲ能ハズ

新訂增補和蘭藥鏡卷六終

血脈強固ノ衣ヲ流ハ吹  
前書...  
...

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 橋本宇山先生著 全三冊 理學門植學啓原 宇山先生著 全三冊

同 内象銅版圖 同 全一帖 舍密開宗 同 全一冊 醫療正始 中醫學堂先生著 全三冊

增補和蘭藥鏡 同 全一冊 泰西名醫彙講 東川其作先生著 全八冊

遠西醫方名物考 同 補遺 同 全九冊 要術知新 醫學堂先生著 全三冊

同 瘍醫新書 醫學堂先生著 全四冊 醫方例幾 醫學堂先生著 全三冊

蘭學階梯 同 全三冊 同方齊篇 同 全三冊

蘭學佩觿 同 全一帖 西音發微 醫學堂先生著 全二冊

幼幼精義 赤澤大九郎先生著 全三冊 病學通論 赤澤大九郎先生著 全三冊

濟生二方 松田成徳先生著 全一冊 青藜閣 醫學堂先生著 全一冊

須原屋伊八

