



新訂  
增補  
和蘭藥鏡

卷七

武  
856  
18-7

早稻田大學  
圖書  
寄託者  
田內文庫  
寄託書第一號  
第 9 號  
第 2 冊  
第 7 冊





門中武  
856  
卷18-7

榛齋宇田川先生著

三篇

新訂

# 和蘭藥鏡

增補

風雲堂藏版

青藜閣發行

澤氏  
新東

大正七年九月廿四日  
內田采子氏贈

和蘭藥鏡

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷七

幾那

神經熱篇第一

神經熱流行及合併病說

病因 症候 看法 治法總括

治法大別 本病治法

第一揮發衝動劑

揮發衝動劑藥品

揮發衝動劑用法

和蘭藥鏡

增訂和蘭藥鏡

卷七

標目

風雲堂藏



感動敏銳症治

揮發醒神飲

感動遲鈍症治

揮發回生飲

外用法

洗劑法

參兒藥品

蒸溺法  
發泡膏

第二保固強壯劑

保固強壯劑藥品

苦味收瀉品

苦味品

收瀉品

保固強壯劑用法

壯元幾那飲

幾那鎮痙丸

壯肺幾那飲

飲食

舌苔



新訂增補和蘭藥鏡卷七

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

幾那

○按ニ幾那ハ西洋ニ於テ神經熱ヲ療スル聖藥トスレモ先、神經熱ノ病性ヲ數知ノ幾那確當ノ徵候ヲ的識シ且、神經熱ノ正症ト合併諸病ノ兼症ヲ鑒別ノ方症契當ノ機會ヲ曉了スルニ非レバ奇効ヲ奏シ難シ。醫家神經熱ニ幾那ヲ投メ効ナク或害ヲ致スハ畢竟漫投妄施ノ弊アレバナリ。



此編固ヨリ治療ノ書ニ非ズト雖モ斯ニ神經熱  
 治法ノ大較ヲ示シ且幾那ノ的効ヲ數知セシメ  
 ンガ爲ニ累篇ノ繁冗ヲ厭ズ遠西名醫扶歇蘭度  
 人撰述ノ神經熱經驗說和蘭紀元一千八百八年  
 道所同十四年纂攷採修ノ編次シ同好ノ考據ニ備フ是  
 速ニ世ニ少補アラントヲ冀フノミ

神經熱篇第一

神經熱流行及合併病說

神經虛弱ニ係ル諸病多  
 流行スル原由ヲ考索スルニ或四時ノ氣候常調ヲ  
 愆リ寒暄燥濕卒ニ變易シ不正ノ邪氣湮鬱ノ一種

ノ苛毒瘴厲ノ疫氣ヲ醸シ衆人ノ皮膚神經肺頭腦  
 等ニ感襲シ遂ニ脉管纖維縱緩弛解シ諸器罷衰ノ  
 諸液分利ノ常機ヲ失ヒ膽液鬱敗シ胃腸ニ粘穢。蛇  
 蟲等ヲ生スルニ因ル○人身ノ感動銳敏ニノ氣候  
 非常ノ變更ニ感徹スルト宛モタルモ驗冷熱器ハ驗晴雨器  
 ノ天氣渝變ニ隨テ升降變動スルト毫モ異ナルト  
 ナシ即チ天氣ノ變動ト人身ノ失常ト相響應スルト  
 譬ハ創瘍及痛風等ノ患者天氣將ニ變セントスル  
 片ハ忽チ非常ノ感觸ヲ覺テ其疼痛増發シ或神經病  
 ノ宿疾アル人氣候未顯著ノ變更ヲ現セザレバ數



日以前既 = 是ヲ知覺シ頭痛鬱重懈惰拘攣衝逆等  
ヲ發動シ或天稟薄弱ノ人温燠ノ室 = 屏息シ牖戶  
ヲ密閉シ厚被重褥 = 坐卧スト雖モ必氣候ノ變更  
= 觸外邪 = 冒感スルガ如シ尚且飲食起居衣服ノ  
調節互ヲ失フ等内外契合ノ病原トナルト固ヨリ  
論ナシ是衆人ノ流行病ヲ免レザル所ナリ○先哲  
同種ノ流行病 = 或寒涼解熱ノ劑ヲ主張シ或壯神  
温補ノ劑ヲ崇奉シ或掃腸攻瀉ノ劑ヲ遵守スルガ  
如キ歷世諸說一樣ナラザレモ此皆當年流行ノ疫  
疾 = 應シ氣運ノ病性 = 隨ヒ効功ヲ得者ナリ後人

其異同アルヲ觀テ技術未精良ナラズトシ曩哲ヲ  
誹議スルハ固ヨリ無替ノ言トス唯積年施療ノ實  
蹟 = 確據シ時運ヲ經歷ノ各種ノ病性アルヲ覈知  
スル者流行病ノ年々差異アルヲ曉了スル = 足  
ル○或云燠衝壯熱ノ諸病近來漸減ノ虚弱 = 係ル  
諸病及神經熱殊 = 多シ此即患者虚弱 = ノ燠衝壯  
熱ヲ發スベキ精カナキ = 因ル然所以ヲ考究スル  
= 近世民風日 = 奢靡 = 移リ人情漸放肆 = 習ヒ朝  
饗暮飧滋味豐供ヲ貪リ或縱飲沈醉厭<sub>レ</sub>ナク遊惰  
怠逸ノ精神ヲ勞苦シ思慮ヲ困擾シ或房勞過度精



液ヲ虚耗シ或、少年血精未、壯旺セズメ早ク斲喪ヲ致ス等ニテ精氣虧損、筋脉縱弛、血液酷厲ニノ種々、虚弱ノ病ヲ醸シ或、是ヲ兒孫ニ遺傳ノ脆弱多病ノ體質トナリ。尚且、愛養撫育ニ過テ飽煖甘脆、崇ヲ爲ス等ニ因ル

○按ニ神經熱ハ夾虚危險ノ流行疫ナリ。患者資稟薄弱或、神經感動已甚<sup>ナハタリ</sup>或、精力虧損セル者流行疫ニ感染スレバ熾盛熱、焮衝熱ノ如キ壯熱ノ症ヲ發セズ。世人所謂陰症、時疫、勞役傷寒ノ類或、焮衝熱ヲ兼テ熱勢暫、過盛ナルカ如キモ亡幾<sup>本ナク</sup>神經虚憊ノ病性ヲ見

スナリ。是ニ血液腐敗ノ諸症ヲ兼レバ即、腐敗熱ナリ或、胃腸熱、膽液熱。膽液ノ酷厲毒、胃腸ノ如キモ壅滯スル熱病險重ニノ精力缺脱シ神經虚憊ニ至レバ皆神經熱ノ症治ニ屬セサルハナシ故ニ先、神經熱ノ症候主療ヲ覈知シ次ニ各自兼夾ノ病性ヲ辨晰シ方法ヲ施ス一諸熱治法ノ一大綱要トス

○神經熱ハ胃腸熱胃腸中粘液及、蛇蟲ヲ兼ル者殊ニ多シ、冒寒傷冷熱、焮衝熱、腐敗熱等ヲ合併シ或、蛇蟲下利嘔吐痙攣、諸症ヲ兼レテ居多<sup>オホシ</sup>。故ニ先、純粹神經熱ノ病性症候ヲ覈知スルニ非レバ自餘合併病ヲ鑒別シ難シ。是ヲ以テ



初ニ神經熱ノ因症治法ヲ舉ゲ次ニ兼症及合併病ノ症治ヲ論ス

**病因**

神經熱ハ一種ノ流行疫ナリ往古是ヲ傳染疫ト名ク外因ハ全身諸器殊ニ神經衰弱ノ感動シ易キ者疫氣ニ感染スルナリ○其諸器神經衰弱ノ感動シ易カラシムル原因甚多シ即資稟脆弱諸竅脱泄殊ニ房勞過度勞神苦思憂愁鬱悶夜中寢息セズ饑飽勞役飲食麁惡ニシテ良血液ヲ生セズ或寒濕氣ノ冒觸疫毒侵襲等ナリ或疫毒傳染ノ微ナル者熱病トナラスノ漸ク多病トナリ肢體尪羸ノ遷延神經病トナル者アリ○疫毒ハ大氣中ヨリ傳染

シ或直ニ患者ノ毒氣ヲ感受ス此症開暴一男子體稟强健曾テ神經熱ノ患者ヲ看護シ患者ノ氣息其顔ニ觸レ忽刺撃スルガ如キヲ覺テ其毒ニ傳染シ

諸症兩三日中ニ増劇ノ精神昏憤ニ至ル者アリ○内因ハ神經虛憊ノ其機能ノ障碍ヲ爲ス者ナリ

**症候** 名幾那ノ條神經熱ノ症治ヲ舉グ参考スベシ 神經熱ハ病發以前數日漸ク神經罷勞ノ候アリ即肢體勞倦困重情意

不了危懼鬱憂神思樂マズ感動シ易ク頭重ク若ハ鈍痛シ食味ナク時ニ微惡寒眠多ク或安眠セザル等ナリ病既ニ發スレバ屢惡寒戰慄シ肌膚刺戟牽



縮スルガ如シノ乾燥シ或濡潤シ或發汗ノ却テ爽了ナラズ或時ニ各部發汗シ肢體温煖平等ナラズ  
 脉虚軟ニノ細數若ハ緊ヲ帶ビ搏度齊ハズ此脉殊トス或疾數ニノ時ニ緩ヲ現シ或平脉ノ如者アリ  
 惡寒後發熱替留シ或諸部ニ遊移ノ定住セズ或乾燥ノ灼熱シ或内部煩熱甚ノ皮膚微冷或大熱舌燥テ渴ナク舌上白苔燥涸粗糙舌ヲ出セハ振掉シ  
 或肢節痛或胃部疼或心下臍邊動悸或時ニ聲啞テ低弱若ハ忽清亮激急或數噫氣ヲ發シ或泡沫様ノ涎唾ヲ咯キ或惡心乾嘔或綠色ノ粘液ヲ吐シ小便

稀澄清淡或濃厚穢臭アリ大便時ニ秘閉シ或下利ノ種々汚物ヲ糲下シ或腹痛或煩躁擾悶筋惕跳動或顫振抽掣或僅ニ舉動スレバ振々トメ定ラズ若ハ頭眩眩冒シ或故ナフメ慘愴悲惋シ或擊急狀ノ妄笑妄泣ヲ發シ或眩暈昏憤兩耳聾鳴ノ聽ヘ難ク或耳敏聰平日ニ倍シ或目赤眼花閃發眼中曇濁埃ヲ蒙ルガ如ク或眼閉テ開テ稀ナリ或謔語妄言此初起ヨリ發スレバ大抵緩徐ナリ然レ時ニ狂躁スルアリ或胸中痙攣欬嗽喘息呼吸不利胸肋刺痛ス病勢増進スルニ至テ脉忽盈充ノ搏度齊ヒ又忽微細ニノ次序ナキアリ斑疹ヲ發



スルヲ必<sup>ナ</sup>シ間粟疹。微細ノ水胞ヲ發スル者アリ。或  
 失血。溶崩脱泄。血液溶解崩壞ノ下血吐血。斷血。下利。尿崩。漏汗等ヲ發シ或發斑ヲ兼ヌ。此  
 皆腐敗熱ヲ或卒ニ虛熾衝熾衝ニ虛實アヲ發シ寒  
 壞疽ニ變シ或氣急煩躁。昏冒。搐掣。交發シ頃刻ニ斃  
 ル。○患者ノ稟賦。疫毒ノ各異ナルニ由テ或惡心乾  
 嘔ヲ發シ或便秘シ或下利シ或皮膚乾燥。若ハ濡潤  
 スル者アリ。○患者忽甚々爽快ヲ覺エ。諸症俄ニ消  
 散スルハハ開危篤ノ變症ヲ發スルヲアリ。○腐敗  
 熱ハ神經熱ニ於テ血液腐敗溶崩ノ諸症ヲ兼ルノ  
 云。其他兩熱病ノ分別ナシト知ベシ。腐敗熱合併ノ  
 症治後ニ出ツ

○右ノ諸症ヲ發スルヲ急頓漸慢曾テ次序ナシト  
 雖モ皆神經熱ノ正症ナリ。○此病ノ特ニ標準トス  
 ベキハ脉ト諸症ト相反スルナリ。是ヲ以テ神經虛  
 憊ノ病性タルヲ知レベシ。即脉逾小ニ弱ナルニ隨  
 ヒ熱勢。謔語。疼痛等自餘神經ノ諸症逾増劇ス。脉盈  
 揚ノ力ヲ生スルニ隨ヒ熱勢及諸症逾減除ス。又揮  
 發衝動ノ強壯劑ヲ與レバ脉數及熱勢自餘ノ諸症  
 寛解ス。凡壯實ノ熱病。熾衝熱ノ如キハ脉小ニ弱  
 ナルニ隨ヒ熱勢謔語疼痛等自餘ノ諸症逾  
 減除ス。脉盈揚ノ力ヲ生スルニ隨ヒ熱勢及諸症  
 増劇ス。是脉ト諸症ト相應ノ相反セザル者ナリ。神  
 經熱ハ是ニ患者ノ精力甚罷弊セザル時ハ右ノ徵  
 反スルヲ云



候猶顯著ナラザレハ虚憊甚キニ隨ヒ逾是ヲ驗辨  
 シ易シ病勢既ニ危劇ニ至テハ葡萄酒ノ如キ揮發  
 純補ノ藥ト雖モ大ニ清涼降鎮ノ功ヲ奏スルナリ  
 ○此病ノ症狀多端ナレハ是ヲ統括スレバ究竟三  
 件ニ過ズ其一ハ腦髓中意識ニ係ル諸器ノ感觸變  
 動ト其機能ノ失常トナリ 頭痛謔妄精神昏憤多眠  
 キヲ以テ此病 ハタラキ 其二ハ患者ノ虚實ト諸症ト相及ス  
 ノ首候トス壯熱病ハ患者ノ精力強實ニシテ病毒ヲ抗  
 拒スルト相應スル者ナリ神經熱ハ患者ノ精力滋益  
 増劇スニ隨ヒ諸症愈減除シ虚憊スルニ隨ヒ諸症愈  
 諸症ト相及スル者ナリ ハタラキ 其三ハ脉呼吸大小便汗蒸

氣等ニ現スル變動ナリ○神經熱ハ全體若ハ各部  
 ノ機能忽過盛ナルガ如ク或忽衰罷スルガ如キ變  
 化甚多シ然レハ蹤跡スベキ較著ノ起因ナシ○神經  
 熱ノ病性二種アリ一ハ急症一ハ慢症ナリ急症ハ  
 總テ病勢急疾ニシテ諸症劇盛ナリ此症ハ患者ノ資  
 稟感動ノ勢已甚ニ因テ感觸知覺ヲ主ル所ノ纖維  
 其病毒ヲ抗拒スルト甚敏疾ニシテ急劇ナル候トス  
 慢症ハ病勢諸症緩慢ナリ此症ハ其病毒ヲ抗拒ス  
 ルト微弱ニシテ甚遲鈍ナル候トス是專ラ神經質ノ  
 衰弱ヲ見ス者ナリ右二症共ニ神經ノ虚憊ヨリ發



スル故ニ治法ニ於テハ顯著ノ分別ナシ唯其抗拒ノ急劇ナル者ハ急症トナリ元運力亦速ニ虚脱シ其抗拒ノ微弱ナル者ハ慢症トナリ病性遷延ノ元運力漸々虚脱スルノニ○或其病毒ヲ抗拒スルノ身體ノ一處ニ於テハ急劇一處ニ於テハ慢緩ヲ見ス者アリ又急症變ノ慢症トナリ或腐敗熱トナリ或昏睡トナリ或癲狂等ノ遷延病トナル者アリ故此病性毫モ標據スベキ順次ナシト知ルベシ○慢症ハ病中常ニ痰涎ヲ咯ク者多シ

**看法** 資稟薄弱ニノ感動シ易キ人神經熱ニ罹ル

殊ニ多シ然レハ少壯强健ノ人亦能此病ヲ患ヒ其症老弱ノ人ニ比スレバ急劇ニノ危篤ナリ○或他病神經熱ニ非變ノ神經熱トナル者アリ是ハ初用テ功アル所ノ藥劑今些モ効ナク瀉下劑モ害ヲ爲シ脉漸細數トナリ諸筋逾罷勞シ肢體疲勞困倦頭腦神經ニ係ル諸症轉増進スルヲ以テ知ヘシ○神經熱替留ノ日數長短一樣ナラズ預定メ難シ遷延症即慢症ハ諸症留連ノ減セザルヲ六週若ハ八週ニ至ル者アリ但四週以上替留セル者ヲ慢症神經熱ト曰フ大抵數月ヲ經ザレバ全治セズ或長ク餘患ヲ遺ス



者アリ○心藏及動脈管殊ニ病毒ノ刺戟ヲ受易キ者患者ノ稟賦ニ因テ體中諸器ノ強弱感觸ノ銳鈍一様ナラズハ此病全治スレ氏仍數脉數月退カザル者多シ神經其刺戟ヲ被リ易キ者亦神經諸症數月減除セズ○神經熱ハ預死生ヲ決シ難ク其轉變亦測リ難シ或惡症蜂起百出手ヲ閣テ死ヲ埃ツ者偶爾回復スル者アリ或呃逆腹滿脹悶水穀下ラズ兩便失禁脉結促搏度齊ハズ若ハ微細ニ診知シ難ク精神昏冒摸牀撮空等危劇必死ノ候ヲ現スル者モ皆必ズ死スルニ非ズ或外候輕易ニ卒然トノ斃レ或諸般ノ善徵ヲ現メ

醫家既ニ是ヲ生路ニ算スル者モ終ニ死スルヲアリ○凡諸病ノ毒排泄ノ候ナキハ治難キ者居多オホシ蓋病毒ノ分利排泄ニ二般アリ一ハ其毒自汗大小便痰唾等ヨリ排泄ノ病愈ユ是ヲ有形ノ分利ト曰フ一ハ右ノ如キ外泄ノ候ナクメ其毒暗ニ排除シ病愈ユ是ヲ無形ノ分利ト曰フ然ニ神經熱ハ病毒分利ノ候温汗尿塗外アレハ善徵トメ信據シ難シ或分利ノ候部瘡瘍等ナクメ漸々回復スル者アリ或發汗小便溼渣顯著ニ現スレハ病毒除カズメ治セザル者多シ殊ニ鶯口瘡粟疹水皰腫瘍膿瘍等ヲ發スレハ



病毒些<sup>合</sup>モ分排<sup>レ</sup>ビザル者アリ○曾テ神經熱ノ病毒  
 下利ニ由テ排除セル者二人ヲ見タリ俱ニ諸症險  
 重ノ時ニ至テ臭穢ノ下利ヲ發シ瀉下スル毎ニ脉  
 勢復生シ精力轉増シ精神輕爽ヲ覺ユ○神經熱ニ  
 就テ親ク歷試スルニ他病ヲ夾ム<sup>レ</sup>テ逾<sup>レ</sup>必<sup>ク</sup>キキハ病  
 毒分利ノ排泄ヲ現<sup>ス</sup>ル<sup>レ</sup>テ逾<sup>レ</sup>必<sup>ク</sup>シ。傷冷毒若ハ胃腸熱  
 ノ如キ他病ヲ兼併スル<sup>レ</sup>テ逾<sup>レ</sup>多ケレバ病毒分利ノ  
 排泄逾<sup>レ</sup>顯著ニ<sup>レ</sup>是ニ因テ其病治スル<sup>レ</sup>テモ亦信據  
 スルニ足ル○一婦人神經熱ニ罹<sup>ル</sup>ル<sup>レ</sup>テ既ニ三週險  
 症日ニ増發ス是ヲ診フニ脉甚<sup>ク</sup>細數ニ<sup>レ</sup>ノ百四十動

ヨリ百六十動患者喃々譫語循衣摸床大便失禁精  
 力罷極些<sup>合</sup>モ舉動スル<sup>レ</sup>テ能ハズ其夜轉危篤ニ<sup>レ</sup>ノ衆  
 人以爲死期明且ニ<sup>レ</sup>及<sup>ス</sup>ト。然<sup>ル</sup>ニ夜中病毒分利ノ候  
 ヲ現シ翌早病機全<sup>ク</sup>一轉シ諸惡症寬解シ脉勢精力  
 共ニ活揚ス即<sup>チ</sup>其候ハ乾燥セル肌膚遍ク津潤シ全  
 身均ク温煖ヲ得。從前清稀ノ小便今溷濁ノ帶赤ノ  
 渣渣ヲ現シ。皮上種々大小ノ水皰ヲ發シ次テ鶩口  
 瘡ヲ生ス。是ヨリ漸次ニ<sup>レ</sup>快復ヲ得。三週ニ<sup>レ</sup>ノ全治セ  
 リ此症ハ更ニ峻効ノ揮發衝動劑<sup>後</sup>出<sup>ツ</sup>ヲ用<sup>ヒ</sup>テ奇効  
 ヲ得タルニ非ズ唯天資自然ノ良能其機力ヲ奮發



ノ病毒ヲ分排シ病機ヲ一轉ノ回復ヲ得者ナリ

治法總括

神經熱ハ神經虛憊シ或血液腐敗溶崩

即腐敗熱ヲ兼ル故ニ壯神劑ヲ用テ治スルヲ法準トス

然<sub>レ</sub>凡初發患者惡心嘔噦食ヲ欲セズ心下痞滿等胃

中病毒鬱滯ノ候即膽液熱胃腸熱アル者ハ吐劑ヲ

與ヘ其毒ヲ淨掃スベシ是ニ因テ腦及<sub>レ</sub>神經ノ罷弊

沈垂ヲ振起醒覺ノ病毒分排ノ機力ヲ逞發ス○腸

中汚物鬱蓄ノ病毒ノ分利ヲ妨ル者ハ緩下劑ヲ與

或乳汁沙糖食鹽ヲ調和シ吉利詞參兒トシ施メ驅

除スベシ○各部焮衝ヲ兼テ熱勢過盛ノ症ハ防焮

衝法

清涼劑酸收劑及

屋施茂兒

等ヲ用テ涼解シ

屋施茂兒ハ清涼滋潤ノ功アル故ニ始終用テ良或瀉血法亦緊要トス近年

流行ノ神經熱ハ多ク防焮衝法及瀉血法良効アリ

多血家腦肺等ノ貴重ノ部ニ血液湊積ノ焮衝ヲ發

スル者腦及肺ノ焮衝合併篇ニ出ハ初發刺絡ノ殊効アリ

リ然<sub>レ</sub>凡神經熱ハ刺絡過度ニ因テ患者虛憊スル

多キ故ニ各部瀉血法患部ニ蟬針法或ヲ施スヲ最

良トス又冷濕法ヲ頭部ニ施メ殊効アリ後○右

ノ療法ヲ施メ諸症減セズ脉細弱ニシテ精力漸ク罷

弊シ神經虛憊ノ諸症較著ナル者ハ即<sub>チ</sub>惡性熱ノ候



タル故ニ揮發衝動劑及保固強壯劑共ニ出ヲ撰用シ  
 或、橙汁民埵列利精綠蓉精忽弗滿鎮痛液等其症ニ  
 隨兼用スベシ○初發熱性發汗劑ヲ與テ發汗スル  
 ハ甚害アリ是固ヨリ發汗ノ解スベキ病ニ非レバ  
 却テ津液ヲ亡脱ノ涸燥シ逾其熱ヲ増發ス更ニ虛  
 憊セシム但、冒寒傷冷毒合併ノ症ハ發汗劑ヲ兼用  
 シ汗解ノ良驗ヲ奏ス但、蒸發劑ハ始終用テ良効ア  
 リ是蒸發氣ヲ發散スル劑是ヲ以テ蒸氣ヲ宜發ノ  
 皮膚津潤ヲ得レバ疫毒是ヨリ排泄ノ焮衝解散ス  
 治法大別 神經熱ノ治法ヲ大別ノ三件トス其一

ハ神經熱ノ本病ヲ治シ其二ハ兼症ヲ治シ其三ハ  
 併病ヲ治ス即、左ニ歷舉スルガ如シ兼症及併病  
症治後ニ出  
 本病治法 凡、神經熱本病ノ治法ハ其症ノ輕重微甚  
 ヲ論セズ始終專、元運力ノ沈垂罷弱ヲ資輔提揚シ  
 神經虛憊ノ其機能ノ失常乖錯セルヲ挽回シ邪毒  
 ヲ排除セシムルヲ以テ第一ノ標準トス乃其藥劑  
 ヲ分テ三種トス第一揮發衝動劑第二保固強壯劑  
 第三鎮痙劑ナリ此三種ノ劑皆神經虛憊ヲ強壯シ  
 精カヲ資補スレ、患者ノ資稟ト症狀ノ緩急ニ隨  
 其功績大ニ差異アリ即、其藥劑用法等ヲ左ニ列舉ス



第一揮發衝動劑

揮發衝動劑ハ藥性皆精微ニノ  
 竄透シ是ヲ服メ血中ニ入徑ニ神經ヲ揮發衝動ノ  
 其衰頹沈垂セル元運力ヲ挑起撥揚シ血液運行ノ  
 怠慢ヲ衝動増進ス。故ニ神經熱ハ此劑ヲ與ルニ非  
 レバ其虛憊セル神經質ヲ挽回スルヲ能ハト知ベ  
 シ○然レ其藥氣速ニ揮散發越スル故ニ効力長ク  
 體中ニ持留スルヲ能ハズ。服後藥氣揮散スレバ其一  
 且挑發セル患者ノ精力再萎衰シ或其虛憊却テ初  
 ニ倍スル者アリ故ニ數日此劑ヲ連進シ精力漸次  
 ニ盈揚シ。脈力諸症稍ニ回復ノ虛極危劇ノ候ヲ

免ルニ至テハ乃是ヲ補住持重センガ爲ニ第二ノ  
 保固強壯劑苦味收瀋ノ品幾ヲ與テ全功ヲ成ナリ  
 故ニ保固強壯劑ハ此病ノ初發ニ用テ稀ナリ○揮  
 發衝動劑ノ藥品ヲ左ニ歷舉ス但効力最モ緩性ナ  
 ル品ヲ初ニ舉ケ逐次ニ峻性ノ者ヲ後ニ排列ス患  
 者虛憊ノ輕重諸症ノ緩急ニ隨ヒ撰用ベシ

揮發衝動劑藥品

- 一 民垚列利精名
- 二 纈草根越爾昆答刺
- 三 遠志鏡
- 四 安質沒扭酒名
- 五 亞鉛華名
- 六 甘消石精名



七 加密列名 苜蓿花代用ハ

九 白芷鏡

十 亞兒尼加名

十一 攝爾扁答名

十二 葛私篤僕謨名

十三 葡萄酒鏡

十四 鹿角精名

十五 加耶普的名

十六 麝香名

十七 阿芙蓉名

八 薄荷鏡

九 水揚梅根鏡

十 菖蒲根鏡

十一 阿魏名

十二 華尼利補

十三 忽弗滿鎮痛液名

十四 琥珀鹽名

十五 龍腦名

十六 鹿角鹽名

十七 亞的兒名

〔廿〕亞爾箇兒名

〔廿一〕忽斯忽律斯補

○葡萄酒ハ揮發衝動藥中最勝ノ要品トス他藥ノ是ニ代ベキ者ナシ病勢劇盛ノ時ヨリ病未ニ至リ用テ尤効アリ但少許宛數用ベシ○外用法ハ發泡硬膏冷湯法脚湯清凉氣等奇効アリ共ニ後ノ諸篇ニ出

揮發衝動劑用法 神經熱ノ症ニ二種ノ大別アリ 共ニ揮發衝動劑是ヲ主ル此二種ノ差別ヲ辨セズメ妄ニ方劑ヲ投スレバ患者ヲ誤ラザル者殆ト稀ナリ其差別ハ病因ヲ以テ推究スルヲ能ハズ唯其發現セル症候ニ就テ審ニ診察シ是ヲ的識スベキ



ナリ○其第一種ハ患者感動已甚觸知太敏銳ナル  
症ナリ第二種ハ患者感觸知覺甚ダ遲鈍緩慢ナル  
症ナリ二種共ニ神經大ニ虚憊ノ純補強壯スベキ  
症ナレト治術ノ標準甚ダ徑庭アリ即二種ノ症治  
ヲ左ニ舉グ

感動敏銳症治

第一種ノ患者虚憊シ知覺感動太  
敏銳ニノ神經病毒ノ抵觸刺戟ニ堪ザル症ハ脉  
數ニノ甚變動シ易ク性急ニノ怒易ク耳甚聰クノ  
物響ニ堪ズ諸部攣急シ或目赤數瞬ノ休ス或呻吟  
譫語四隣ニ徹シ凡精力ヲ揮發強壯シ血液運行ヲ

増進スル藥劑ハ勿論稍刺戟ノ氣味アル藥ヲ與レ  
バ些モ是ニ堪ズノ諸症大ニ激動シ酒漿等ノ飲液  
及揮發衝動劑ノ最緩性ナル者ト雖モ服量差度ニ  
過レバ忽抵激ノ脉疾數トナリ搏度次序ヲ失ヒ呼  
吸短促或譫語増發シ諸般ノ感觸逾敏疾熱勢増加  
攣急抽掣漏汗煩悶等ノ惡候ヲ現ス此症若誤テ第  
二種感動遲鈍ノ症ニ用ル如キ多量ノ揮發衝動劑  
後ニヲ與レバ患者必其死ヲ免ズ○故ニ此症ハ初  
發峻性ノ揮發衝動劑ハ適應セズ唯其最ニ緩性ナ  
ル者ヲ擇ニ又初ハ服量甚些少ニノ激動セザルヲ



度トシ用ベシ。是ニ由テ患者ノ精力稍クニ復シ神  
 經漸其劑ニ堪ルニ隨ヒ徐クニ其量ヲ加ヘ或差其  
 峻性ノ劑ニ移リ。病勢ニ應シ參酌ノ其度ニ適シ治  
 スルニ至レベシ或是ニ鎮痙劑出後ニテ尤良。是  
 ヲ以テ一ニハ其感觸敏銳ノ諸症ヲ鎮定シ。一ニハ神經  
 ノ機力ヲ補助シ。神經竟ニ保固強壯劑ニ堪テ其効  
 カヲ逞發スルニ至ラシム。○其第一種ノ症ニ用揮發  
 衝動劑ノ最緩性ナル一方ヲ左ニ舉テ處方ノ準則  
 トス。其他諸症ノ變化ニ隨ヒ類推酌料ノ製スベシ  
 揮發醒神飲 揮發衝動劑中最緩性ノ方劑ニメ

患者感動甚ダ敏銳ノ症ヲ治ス初起ヨリ  
 此一方ニテ回復スル者多シ  
 纈草根 二錢 遠志 一錢  
 右各細末シ水六弓ヲ以テ煮滓ヲ去リ後藥ヲ加フ  
 氏堙列利精 四錢 安質沒扭酒 六上滴  
 橙皮舍利別 一弓  
 右調和シ一時毎ニ二匙宛用患者此劑ヲ服ノ惡症  
 漸減シ脉稍盈揚シ太疾數ナラズ太勁緊ナラズノ  
 微常調ヲ帶漏汗大小便失禁等ノ血液溶崩ノ候自  
 歇ニ神經ノ甚キ感觸激迫精神ノ錯誤謔妄等漸靜



止シ精力稍復スルキハ此劑適中ノ候トス。爾後保  
 固強壯劑ノ堪ルニ隨ヒ漸次ニ是ヲ劑中ニ加ベシ  
 感動遲鈍症治 第二種ノ患者虛憊ノ感觸太遲鈍  
 ノ症ハ元運力沈垂甚ク。顔色萎悴。精神蒙昧。屢昏憤。  
 知覺鈍緩。黙々嗜眠。人事辨シ難ク。或喃々鄭聲休ズ  
 或大ニ神思ヲ痛傷スベキ事件ヲ見聞シ。目前非常  
 ノ物形ヲ視ルト雖モ茫乎トノ毫モ意ヲ注ガズ。脉  
 細弱。酒漿慄悍ノ飲液ヲ與レテ脉狀變動セザル等  
 ナリ。此症ハ最峻性ノ揮發衝動劑ヲ與ヘ。且同様ノ  
 藥品ト雖モ時々其劑ヲ更換用テ藥氣ヲ新ニシ又

虚憊ノ甚ニ隨テ藥量ヲ増加シ與ベシ否ザレバ初  
 劑ノ藥氣ニ慣テ駄効ヲ奏シ難シ斯ノ如ク藥劑ヲ  
 連進持重ノ脉力ノ虚慢ナル者。著ク活勢ヲ得。其細  
 數沈弱ニノ次序ナキ者漸舒調シ。譫妄嗜眠。瘧瘵ノ  
 諸症漸減シ精力益復スルニ隨ヒ徐々ニ緩性ノ劑  
 ニ移リ且其服量ヲ減シ或專保固強壯劑ヲ與テ全  
 治ニ至ベシ揮發衝動劑ノ最峻駄ナル一方ヲ左ニ  
 舉テ處劑準則トス其他ハ隨症斟酌ノ適宜製スベシ  
 揮發回生飲 揮發衝動劑中。最峻ノ一方ニ患  
 者感動太ダ遲鈍ノ症ヲ治ス



幾那 上好者 攝爾扁答 四錢

亞兒尼加根 三錢

右各細末シ葡萄酒二比ニ溶和シ後藥ヲ加フ

龍腦 一刃 忽弗滿鎮痛液 少許ヲ加ヘ研和ス

麝香 一刃 舍電阿芙蓉液名 三十滴

右研和シ一時若ハ半時每ニ一小茶椀ヲ與フ此劑

尚峻効アラント欲セバ每服幾那丁幾劑名又或

亞的兒六十滴ヨリ八十滴マテ加ベシ此劑服量甚

饒多ニ用ベキ症アリ。一患者上好列印設酒名二比

幾那二弓。龍腦麝香各二刃。阿芙蓉液三十滴ヲ合和

シ一晝夜ニ與ヘ。芥子泥ヲ腓ニ貼シ諸症始テ輕快

ヲ得ル者アリ。○或諸症劇盛ノ時乙百葛格安那ヲ取

服量些少ニノ嘔氣ナキヲ度トシ數用テ神經質ノ

衰頽沈垂ヲ振起醒覺シ其良機能ヲ挑發ノ偉効ヲ

得ル者多シ。○神經熱ノ一經驗說ヲ左ニ舉テ治例ヲ

示ス。一男子天稟薄弱。偶危險ノ神經熱ニ罹リ。數日

一小室ニ在テ四圍ニ帷幙ヲ垂ル鳥羽ノ軟褥ニ困卧

ス。故ニ患者ノ腐敗ノ蒸氣其室ニ鬱蓄ノ熱蒸ニ堪

ズ。臭穢鼻ヲ撲ツ患者神思昏憤呢喃謔言息ズ。脉細

數百五十動。時ニ甚疾數ニノ指下按算シ難シ。肢節



顫振。諸筋抽動。呼吸促迫。不利呻吟。時ニ戰慄シ。總身  
 油ノ如キ汗出テ臭氣殊ニ甚ク。舌孿縮ノ出難ク強  
 テ出セバ赭色ニノ黑色及圻紋アリ。是皆惡性神經  
 熱ノ危極ニ至ル症候ニノ衆人以為死期ニ晝夜ヲ  
 出ズト。是ニ於テ一ハ先病室ノ帷帳羽褥ヲ去リ窓  
 櫺ヲ洞開シ新鮮氣ヲ迎引ノ清涼乾淨ニ其熱蒸ノ  
 患者ノ皮膚ヲ刺戟シ病勢ヲ助長セル鬱敗氣ヲ驅  
 散シ。一ハ左ノ揮發衝動ノ峻劑ヲ與テ元運力ノ罷  
 弊沈垂セルヲ挑起撥揚セリ。

揮發壯元飲

攝爾扁答 四錢

幾那 一弓

右各細末シ列印設酒一比半ニ浸シ藥氣ヲ出シ渣

ヲ去リ後藥ヲ加フ

龍腦

一乃忽弗滿鎮痛液  
少許ヲ加ヘ研和ス

麝香

十五瓦

舍電阿芙蓉液

三十滴

橙皮舍利別

二弓

右研和シ一時毎ニ半小椀宛與ヘ。漸加テ一小椀ニ  
 至ル又幾那額草ノ煎湯ヲ吉利詞爹兒トノ二時毎  
 ニ施シ葡萄酒若ハ燒酒ニ龍腦ヲ研和ノ二時毎ニ  
 肢節ヲ洗滌シ芥子泥ヲ兩腓ニ貼シ收斂亞的兒



ヲ取テ時々一錢宛飲液ニ和シ與ヘ以テ漏汗ヲ防  
 止シ纖維ヲ收固ス翌日脉數減ノ九十六動トナリ。  
 其甚々沈細ナル者較著ニ盈揚シ頭腦ノ諸患悉寛解  
 シ患者始テ能予ガ顔ヲ認識リ復譫語セズ諸部ノ  
 顫振抽掣休シ肌膚溫柔潤澤ヲ得是表發ノ蒸氣宣  
越ノ病毒排泄ス  
 トル候舌潤ヒ苔穢漸ク消ス是ニ於テ精力復スルニ  
 隨ヒ徐々ニ劑中ノ峻藥ヲ減シ保固強壯藥幾ノ量  
那  
 ヲ加ヘ調治八日ニメ危劇瀕死ノ病回復スルヲ  
 得タリ○前説ノ感動敏銳ト遲鈍トノ症ハ俱ニ神經  
 熱ノ危極ニ至者ナリ此二種ノ中間ニ屬スル症幾

多ノ差等アリ或此二種ノ病性一入ノ患者ニメ往  
 來交替スル者アリ故ニ揮發衝動劑亦緩急輕重ノ  
 差等アルヲ準知スベシ○又揮發衝動劑ノ効力ハ  
 其藥性ト服量トニ因テ緩急輕重アリ假令バ同藥  
 品ト雖モ六倍ノ量ヲ與レバ六倍ノ衝動力アルト  
 宛モ其六倍ノ効力アル峻藥ヲ與ルカ如シ或六倍  
 ノ効力アル藥品ト雖モ其六分一ノ量ヲ與レバ六  
 分一ノ効力アル緩性ノ藥ヲ與ルカ如シ或服量些  
 少ナレモ衝動力甚々峻ニメ他ノ多量ノ衝動藥ニ  
 勝ル藥品アリ假令バ民垓列利精ノ如キ緩性ノ衝



動藥ヲ多量ニ用<sub>ト</sub>雖モ固ヨリ些少ノ阿芙蓉液若  
 ハ燒酒ノ峻力ニ及バザルガ如シ故ニ藥力各血液  
 ノ運行ヲ増進スレ<sub>ト</sub>是ニ多少微甚アリ。但血液ノ  
 運行ヲ増進スル効力ナキ藥品ハ毫モ神經ヲ衝動  
 強壯スル功ナシト知ベシ。或患者ノ天稟ニ因テ  
 神經感動ノ銳鈍緩急種々不同アル故ニ患者ノ藥  
 劑ニ堪ルモ亦甚ダ差等アリ。假令バ甲ノ患者ニ用  
 テ刺戟衝動甚キ藥モ是ヲ乙ノ患者ニ投メ其効緩  
 慢ナルトアリ。或乙ノ患者ニ與テ衝動緩弱ナル藥  
 甲ノ患者ニ用テ甚ダ峻功ヲ得ルトアルヲ預メ

察スベシ凡元運力ヲ挑起撥揚スル藥品ハ皆神經  
 熱ニ効<sub>リ</sub>ト知ルベシ是揮發衝動ノ藥品ヲ云凡  
 皆元運氣及神經ヲ挑起撥  
 揚シ血液ノ運行ヲ増進ス

外用方

揮發衝動藥ヲ外用ノ亦殊効ヲ奏<sub>シ</sub>闕<sub>ベ</sub>

カラザル一療法トス。乃蒸湯劑洗湯劑ハツフ貼膏ハツ擦  
 藥。漱劑キリス吉利詞ス參兒テイルノ如キハ皆一部分ニ施ス故ニ  
 是ヲ一部ノ藥劑ト曰フ蓋内服藥ハ胃ヲ標的トメ  
 用ル故ニ是モ亦一部ノ藥劑ナリ内服劑ノ最多ク  
 効アル所以ハ胃ニ循行スル神經最衆多ニメ其藥  
 氣ヲ感受攝領スルト甚多ク且敏速ニメ是ヲ全軀



百體ニ分布普達スレバナリ然レニ神經熱及自餘ノ  
 神經病ハ間體中ノ一處各部ノ神經罷弊シ或麻痺  
 スルヲアル故ニ若胃ノ神經罷弊シ或麻痺スル片  
 ハ内服劑ノ藥氣ヲ普達スルヲ能ハズ功驗甚ダ  
 鮮少或絶テ功ナシ是内服藥ハ胃ノ一部ヲ標的ト  
 スレバナリ此時醫家他ノ岐徇ナク偏ニ内服劑ヲ  
 與テ悠々トメ日ヲ消レバ病勢日夜ニ増劇シ竟ニ  
 救レザルニ至ル故ニ斯ノ如キ症ハ速ニ轍ヲ改メ  
 胃ニ代テ他部ニ方法ヲ施スニ非レバ効驗ヲ得ベ  
 カラズ然レバ大抵胃ニ次テ神經饒多循行シ藥氣ノ

感受敏捷ニモ効功ヲ奏スル部ハ腸ノ下部ニ若ハ  
 ナシ故ニ吉利詞參兒ヲ尤良トス曾テ數試テ殊効  
 ヲ得ル所ナリ是ヲ以テ外用方法亦一大緊要ナル  
 事知レベシ○揮發衝動劑ヲ吉利詞參兒トシ施ス片  
 ハニハ内服スル所ノ揮發衝動劑ノ藥力ヲ輔助メ  
 遲發セシメニハ胃ノ感動己甚クメ内服劑ニ堪ハザ  
 ル症ニ是ヲ施メ殊効ヲ奏ス但藥力尤緩ナル者ニ  
 宜シ峻駛ナレバ腸ヲ刺戟メ藥汁長ク腸中ニ持留  
 セズ直ニ漏泄メ驗ナケレバナリ又藥汁ノ容量一  
 次ニ四ヨリ六ヲ度トス是ヲ二時毎ニ一次施



スベシ。或其藥汁ヲ粘膠ニシ藥汁粘著ノ腸中ニ持留セシメ且腸ノ攣急  
 シメザルガ爲ナリ或症ニ隨テ鎮痙藥ヲ加フベシ  
 ○吉利詞爹兒ニ施ス藥品ヲ左ニ略舉ス其症ニ應  
 シ擇テ配合シ作ルベシ

吉利詞爹兒藥品

纈草根

亞兒尼加

白芷

各二錢 過ギズ

幾那

三錢ヨリ 四錢ニ至ル

芸香

薄荷

加密列

缺ニ遇ハ荷蒿花ヲ代 用スベシ 各一錢許

白芥子

一錢許

葡萄酒

一二匙

麝香

四錢ニ 過ギズ

龍腦

四錢ニ 過ギズ

藥汁ヲ粘膠ト爲スニハ左ノ品其他粘膠質ノ藥ヲ  
 擇ニ加フベシ

亞麻子

葵根

雜子黃

鯨膠

沙列布

感觸甚ダ敏銳ナル症ハ左ノ鎮痙藥ヲ擇ニ加テ腸  
 ノ攣急ヲ緩弛シ藥汁ヲノ腸中ニ持留セシムベシ  
 菲阿斯失亞密越幾斯劑補二錢ヨリ 四錢ニ至ル  
 番木鱉越幾斯劑分量同上  
 舍電阿芙蓉液四錢ヨリ 六錢ニ至ル  
 ○蒸湯法。洗湯法モ亦甚ダ効アリ是ヲ以テ内服セ



ル揮發衝動劑ノ効力ヲ補助ノ遲發セシメ數良驗  
ヲ得タリ其方 白芥子煎汁 葡萄酒 羯布羅  
右三味合和シ或芫菁ヲシキ丁幾劑名 少許ヲ加布片ニ蘸  
シ是ヲ以テ屢肢節ニ貼被ス又方 薄荷 菖蒲根  
加密列 荊芥 右四味葡萄酒ニ加煮テ布片ニ  
蘸シ全腹ヲ蒸湯ス又方 羯布羅精名 ヲ以テ腹部  
及肢節ヲ蒸湯ス○胸腹諸器殊ニ胃ノ感動甚ノ内  
服劑ノ氣味ニ堪ヘズ或小兒等ノ内服藥ヲ嫌者ハ  
左ノ洗湯法偉効アリ又皮膚ヲ穿開メ蒸氣ヲ宣發  
ス持リ此法ノ之施メ全治セル者多シ其方

葡萄酒 石鹼 右二味水ニ溶シ是ニ芳香ノ藥  
草類ヲ浸シ温テ布片ニ蘸シ適宜ニ數肢體ヲ洗湯  
ス又左ノ洗湯法皮膚ノ孿急牽縮ヲ緩弛シ精力ノ  
虛憊沈衰ヲ挽回メ屢大効ヲ得タリ其方 石鹼  
葡萄酒 燒酒 少許或羯布羅精少許 右三味温湯ニ加テ溶  
化シ是ヲ以テ數全軀肢節ヲ洗湯ス其虛憊ノ多少  
ニ隨ヒ揮發衝動劑ノ藥品ヲ擇ミ加テ殊ニ妙トス  
○芥子泥並芫菁發泡膏ハ患者ノ精力ヲ挑起撥揚  
スル効諸藥ニ超出シ各部疼痛等ノ諸症ヲ速ニ消  
散ス其精力ノ罷弊沈垂ヲ提起醒發スルニハ跣躅



股間。胃部<sub>下</sub>。脊椎等ノ知覺敏銳ノ部ニ少間貼<sub>レ</sub>ノ赤  
 色發スルヲ度トシ發泡セシムルヲナク是ヲ除<sub>キ</sub>去  
 リ。時々更換<sub>トリカ</sub>ヘ貼スルヲ佳トス。諸症危劇ノ際ハ六  
 日若<sub>ハ</sub>八日モ毎日更貼<sub>カ</sub>ノ大効ヲ得タリ。但各部ノ  
 症<sub>一部疼</sub>ハ其患處ノ近傍ニ是ヲ貼<sub>レ</sub>ノ良  
 痛等

○患者ノ室ハ毎日掃刷<sub>メ</sub>テ乾淨ニシ鬱蒸氣  
 ヲ除キ新鮮清爽氣ヲ迎引スルヲ一大緊要タリ

**第二保固強壯劑** 揮發衝動劑ハ藥氣血中ニ入テ  
 神經ヲ揮發活揚シ勉<sub>テ</sub>精力ヲ挑起撥揚スレ<sub>レ</sub>是  
 ヲ以テ神經ノ本質ヲ保充完固スルヲ能ハズ。是ヲ

服ノ後藥氣揮散シ<sub>了</sub>レバ一旦挑撥活揚セル精力  
 復萎衰シ或<sub>ハ</sub>其虛憊却<sub>テ</sub>初ニ倍スル者アリ。約ノ言  
 バ唯神經ノ機力ヲ挑撥<sub>ハ</sub>ノ憤盈セシムルノニ保固  
 強壯劑ハ則<sub>チ</sub>然ラズ。全軀諸器ノ纖維及<sub>レ</sub>神經ノ本質  
 ヲ收固<sub>メ</sub>ノ精力ノ原基ヲ壯實シ。隨<sub>テ</sub>其運營ヲ回復  
 ス又飲食消化ノ機力ヲ保護<sub>シ</sub>ノ血液ノ本質ヲ培補  
 スル故ニ服後患者ノ精力速ニ罷散スルノ弊ナシ  
 又諸器ノ機力ト知覺トヲ調順<sub>シ</sub>其失常ノ運動ヲ  
 抑制ス。故ニ患者虛憊ノ感動甚ダ敏銳ナルヲ鎮定  
 シ常調ニ適<sub>ハ</sub>シムルノ功績アリ。此劑感動敏銳ノ  
 症ヲ鎮定スル効



アレ正最初ヨリ是ヲ用アレバ害アル  
次ノ保固強壯劑用法ノ條ニ説ク如シ

保固強壯劑藥品

此劑ニ屬スル諸藥ハ大率收瀝

苦味ナリ

苦味收瀝品

幾那 名 鏡

楊皮 鏡

榲皮 鏡

安傑斯黥刺 補

芸香 鏡

蘇格爾需謨 補

七葉樹皮 鏡

秦皮 鏡

葛斯加栗刺 補

水楊梅根 鏡

撒爾非亞 名 鏡

苦味品

健質亞那 名

珊篤里 名

睽菜 鏡

沒藥 名

收瀝品

血液腐敗ヲ遏止シ諸液脱  
泄失血ヲ止ルヲ主ル

綠礬精 名

撒兒末爾扶斯 名

阿煎藥 鏡

拳參根 鏡

明礬 名

皓礬 名

吉訥蓮謨 補

鐵劑 名



寒涼氣

保固強壯劑用法

此劑ハ大抵此病ノ初發ニ用テ  
 的當スルヲ稀ナリ唯專ラ揮發衝動劑ヲ與ヘ勉テ  
 其精カヲ揮活提揚シ危劇ノ症ヲ免ルニ至テ漸ク  
 其撥揚セル精カヲ保固滋長センガ爲ニ此劑ヲ用  
 ルナリ然レ初發患者唯虛衰スルノミニテ感動較  
 著ニ敏疾ナラズ甚ダ遲鈍ナラザル症ハ初ヨリ保  
 固強壯劑ヲ用テ功ヲ得ル者アリ患者虛態スレレ  
 症ヲ危劇ニ至ラザル  
 云○感動甚ダ銳敏ナル症ニ初ヨリ此劑ヲ投ス  
 レバ其收固ノ効力ニ因テ脉管纖維逾收縮ノ更ニ

擊急ヲ増發シ其症轉劇盛ナリ又感動太ダ遲鈍ノ  
 症ニ是ヲ用レバ脉管纖維ノ大ニ罷弊シ半麻痺セ  
 ル者逾收縮ノ壅塞シ是ヲ揮活醒覺スルヲ能ハザル  
 ニ至ル故ニ此二症共ニ初發ハ害アリ宜ク揮發衝  
 動劑ヲ用ベシ○然レ若モ感動甚ダ遲鈍ノ者此劑ノ  
 的當スベキ症アルハ是ニ揮發衝動ノ藥ヲ加用  
 ベシ假令バ葡萄酒 忽弗滿鎮痛液 龍腦 攝  
 爾扁答 燒酒等ノ如シ是ニ因テ收固ノ藥性揮發  
 ノ其効敏捷ナリ又斯ノ如キ症ハ其劑ヲ精烈ノ液  
 ニテ浸劑トシ用テ効多シ假令 幾那丁幾劑ノ如



シ或保固ト揮發ノ兩効アル藥ヲ用ルモ良。假令、  
 幾那アールニカ 亞兒尼加アールニカ 水楊梅根 橙皮 葛斯加栗刺  
 安傑斯アージェス 蘇格爾スコーグ 需謨ニモノ如シ又其藥劑ヲ冷  
 浸劑冷液ニ浸ストシ用フベシ。凡、冷浸劑ハ多ク精  
 微揮發ノ藥氣ヲ含ミ煎劑ハ多ク固質ヲ含バナリ  
 右ノ症ハ揮發性多クノ保固性少キ藥劑適應スル  
 故ニ幾那モ冷浸劑トシ用レバ其効尤捷ナリ胃ノ  
 消化カアル者ハ散劑トシ用テ殊ニ良○感動銳敏  
 ナル症ニ保固強壯劑ノ的當スベキ症アル片ハ其  
 藥ヲ冷浸劑トシ或鎮痙藥次ニヲ加用フベシ是ニ因

テ藥氣精微揮發トナリ且其感動過甚ヲ靜止ス○  
 神經熱ハ既ニ回復スト雖モ仍暫ク保固強壯劑ヲ  
 用テ其精力ヲ資補スベシ否サレバ動輒ヤモスバ再發ス  
 ○脉管纖維甚ダ縱緩弛解シ血液溶渙崩壞ヲ兼ル  
 症即腐敗熱ハ保固強壯劑ノ的當トス此症專揮發衝動  
 劑ノ之多用ス。是ヲ以テ其精力ヲ揮發活揚スレバ  
 血液溶崩ノ漏汗失血等ヲ増進ノ途、虛脱スルノ害  
 ヲ償フニ足サレバナリ。此症ニ尤効アルハ綠礬精  
 幾那。明礬。阿煎藥。等ナリ○胃腸消化セザル食物若  
 ハ粘穢汚物。壅滯ノ候アル者ハ保固強壯劑。害アル



胃腸熱ト同シ。先其壅滯ヲ除治スベシ。○神經熱  
 = 傷冷毒ヲ兼ル症。症治後亦保固強壯劑。的當ヒズ  
 其收固ノ効力ニテ傷冷毒ノ酷厲液。皮表及小便ニ  
 排泄スルヲ阻遏スレバナリ。○腦炊衝。肺炊衝ノ如  
 キ各部ノ炊衝ヲ兼ル症。亦保固強壯劑ヲ禁ス。動輒  
 バ其炊衝ヨリ發スル譫妄嗜眠等ノ惡症ヲ増發ス  
 レバナリ。症治後ノ炊衝凡併篇ニ出ツ神經熱ニ兼併セル炊衝  
 ハ神經虛憊シ精力衰弱ノ發スルヲ多キ故ニ幾那  
 ヲ用テ無比ノ大効アルヲ勿論ナレ。凡間又是ヲ用  
 テ諸症増劇シ却テ蟻針法ヲ施メ瀉血シ或冷湯法

等ノ防炊衝法ヲ施メ頃ニ治スルヲアルヲ知レシ  
 ○神經熱ノ初發稍炊衝ノ候アリ。或呼吸蹇難不利  
 スル者ハ幾那害アリ。熱病ノミナラズ諸病ニ幾那  
 ヲ用テ呼吸不利及舌乾燥逾甚キハ幾那害アル一  
 徵トス。○或云熱病。毒。神經ニ侵襲メ脉弱。精力虛乏。  
 患者數大息スル症ハ幾那良功アリト然レ。凡神經熱  
 ハ大抵右ノ症アル故ニ是ヲ以テ標的トシ難シ。○  
 幾那ヲ用テ總身發汗アルハ良徵トス。○筋惕掣動  
 ノ症アルハ幾那的効アリ。○渴ス微ク或渴ナキ症ハ  
 幾那適應ノ一徵トス。○熱勢減シ胃腸鬱滯ノ候ナ



ク。舌苔消シ。脉數減スレバ其病荏苒トノ回復セズ  
或、病末ニ至テ其熱發歇往來スル者ハ幾那良功アリ。斯ノ如キ症。淹滯ノ治セザレバ其虛憊復シ難ク  
ノ變ノ水腫若ハ羸瘦病トナリ或、再感ノ危篤ニ至ル者アリ○凡、神經熱ニ於テ幾那効アル症ハ葡萄酒亦効アリ。但、幾那ハ効ヲ見ハスヲ遅ク且、長ク體中ニ持留ノ消散セズ。葡萄酒ハ其効速ナレバ其氣持留セズノ暫時ニ消散ス○凡、幾那ヲ用フベキ諸病ハ其症ニ隨ヒ左ノ數方ヲ擇用テ良驗ヲ得タリ名幾那條  
亦方劑多シ  
參考スベシ

壯元幾那飲

下患者虛憊ノ痙攣諸症ヲ兼者ヲ治

幾那 末 一弓

續草根 四錢

右沸湯十弓ニ浸シ渣ヲ去、一時半毎ニ二匙宛服ス

幾那鎮痙丸

試効同上

幾那 末 一弓

健質亞那越幾斯劑 四錢

阿芙蓉 一瓦

橙皮舍利別 適宜

右研和シ二瓦ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ十五丸宛用ル、日ニ四次

壯肺幾那飲

欬嗽劇盛。吐痰過多ノ症ヲ治ス

幾那 末

依蘭苔 各一弓



右水二十勺ヲ加煮ル七八分時。漉テ滓ヲ去リ一時  
毎ニ半碗宛服ス

幾那橙黃膏

虛憊ノ便秘ヲ兼ル症ヲ治ス

幾那 未 一 勺

大黃 一 錢

橙皮舍利別 三 勺

右煉和シ一時毎ニ一茶匙ヲ服ス

幾那丁幾劑複方

單方丁幾劑名ニ出

飲食消化シ難ク未

熟惡液ヲ生シ。肢體羸瘦。萎黃病。粘液留飲腫  
等一切胃腸虚弱ノ諸症ハ此劑一匙水二匙  
ヲ加用テ日ニ三次。胃腸弛。虛風氣痞悶。腹滿

及漏汗ノ症ハ此劑ニ綠礬精少許加テ適意  
ノ酸味ト爲シ用テ酸敗液ノ諸症ハ此劑ニ  
麻屈涅失亞或剝篤亞斯ヲ加用テ捷効アリ

幾那 二 勺

攝爾扁答 三 錢

橙皮 一 勺

燒酒 二 十五 勺

右硝子壘ニ内固封シ浸テ六日。滓ヲ去リ固封シ貯

飲食

食料亦患者ノ精力ヲ培補スルテ保固強壯

劑ト同シ。但食物ニ揮發衝動ノ性アレバ亦揮發衝  
動劑ト同シ。然レ患者消化ノ力ヲ察メ與ルテ一大  
緊要トス。稍消化ノ力アル者ハ滋養ノ効アル羹汁



ニ葡萄酒ヲ加與へ。漸ク回復スルニ隨ヒ厚味ノ品  
 ヲ與へシ胃ノ虛罷甚ク或胃中汚物アル症ニ強テ  
 食ヲ與レバ消化セズノ未熟ノ惡液ヲ生ジ更ニ諸  
 器ヲ刺戟ノ其熱及虛憊ヲ倍增ス。故ニ消化ノ力ヲ  
 察ノ食ヲ寡シ。園菜蔬根等消化シ易キ者ヲ擇之與  
 べシ

**舌苔** 或云舌苔アレハ幾那ヲ用テ効アリト。予モ  
 亦舌苔アル症ニ幾那ヲ與テ効ヲ得ルコト多シ。但胃  
 腸熱ノ如キ汚物壅滯ノ症ハ幾那害アルコト固ヨリ  
 論ナシ然レハ胃腸熱ノ病性ト舌苔ノ原由トハ固ヨ

リ同ジカラズ。舌苔アレバ必ス病毒。胃腸ニ鬱積スル  
 ニ非ズ蓋シ舌苔ハ病液ノ舌上ニ滲出セル者ナリ。  
 稀ニ胃若ハ肺ノ蒸氣薰故ニ體中滲出セル諸液ト  
 赤ノ苔ヲ生スル者アリ。種々ノ病因ニ隨テ種々ノ液ヲ滲出ス。或胃中  
 必モ汚物ナクノ熱病ノ惡液舌ニ滲出シ苔ヲ生ス  
 ル者アリ。○熱病ニ因テ虛憊太甚血液腐敗ニ漸ム  
 症所謂腐敗若ハ是ト反對スル欸衝熱ニ於テモ亦舌  
 苔ヲ生ス其虛憊太甚血液腐敗ニ漸ム症ハ舌苔粟  
 殼色。或黑色ナリ。黑色ノ者ハ血液腐敗ノ徵トス此症饒多ニ幾那  
 ヲ用テ舌苔速ニ消シ捷功ヲ得者多シ。若誤テ下劑



ヲ投スレバ患者其死ヲ免レズ。故ニ舌苔アル症概  
 ヲ幾那ヲ禁スベキニ非ズ。殊ニ神經熱ニ於テハ舌  
 苔ヲ以テ幾那ヲ用ル標的トスル者多シ又胃腸汚  
 物アル者モ概シ幾那ヲ禁スベキニ非ズ。汚物些少  
 ノ者ハ強壯劑ヲ與テ胃ノ機力ヲ健運スレバ汚物  
 自ラ排除スル症亦少カラズ。然レ汚物過多ナル者  
 ハ強壯劑ヲ以テ是ヲ分排消化スルヲ能ハズ。然レニ  
 居然トシテ是ヲ用ヒ緩慢ニ排除セシムレバ其精力  
 逾々虚憊スル故ニ徑ニ吐下劑ヲ與テ是ヲ驅除スル  
 ニ若ハナシ。故ニ此症ノニ特ニ幾那ヲ禁スルナリ

此說後ノ胃腸熱凡胃ノ機力ヲ以テ消化ニ難キ症  
 合併篇ニ詳説ス  
 幾那及保固強壯劑ノ諸藥ヲ用レバ胃中困重煩  
 滿。胃疼心痛頭眩暈。大便閉。若ハ下利等ヲ發シ其  
 熱亦增劇ス。○焮衝熱ノ舌苔ハ多ハ稠固ニシテ白色  
 若ハ黃色ノ痂皮ヲ爲ス。此苔ハ體中ノ沍左イ乙稠厚ニ  
 ナリテ舌ニ滲出セル者ナリ。此症ハ消石。其他防焮  
 衝劑清涼劑ヲ的當トス曾テ焮衝熱ノ一患者厚キ舌  
 苔アリ。饒多ニ刺絡シ二時ヲ經テ其苔盡ク消スル  
 者アリ



新訂增補和蘭藥鏡卷七終

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 藥, 鏡, 和, 蘭, 藥, 鏡, 卷, 七, 終.



