

新訂  
增補  
和蘭藥鏡

卷九

武  
856  
18-9

學大田稻早  
館書圖  
庫文田內者托寄  
號一六一第書托寄  
號 9 第  
冊 9 第



武門  
號 856  
卷 18-9

新訂增補和蘭藥鏡標目

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷九

幾那 四

神經熱胃腸熱合併篇第四

胃腸毒患害

膽液熱症治

神經熱膽液熱合併症治

胃腸毒抑遏精力

胃腸毒補瀉利害

胃腸汚物徵候

大正二年九月廿四日  
內田糸子氏贈

藏書

吐下劑標的 鎮痙湧吐散

吐劑用法

瀉劑用法

防炊衝劑

清涼劑 温性下劑

神經熱胃腸熱合併病治例

四則

鎮痙纈草飲

壯神纈草飲

睡菜纈草飲

攝纈壯神飲

芫菁發泡膏

和蘭藥鏡卷九



新訂增補和蘭藥鏡卷九

捧齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

幾那 四

神經熱胃腸熱合併篇第四

神經熱ノ初起間胃腸熱若ハ炊衝熱ノ諸症ヲ發ス  
ル者アレハ亡幾變ノ神經熱ノ諸症トナルナリ○  
胃腸熱ノ症ヲ兼ル者。虻蟲多シ。又虻アレハ能神經  
熱ヲ増劇ス○然レハ神經熱ニ胃腸病ノ合併ナキニ  
非ズ胃腸腐敗ノ汚物アレハ病勢是ガ爲ニ險重ナ

ル故ニ特リ神經熱ノ治法ノミニテ功ナク必ズ其汚物ヲ驅除スルニ非レバ治スベカラス是ヲ以テ神經熱ト雖モ亦吐下劑ヲ用ルナリ○神經熱ニ揮發強壯劑ヲ與テ毫モ驗ナク病勢漸進スル者其症ヲ審察ノ吐劑若ハ下劑ヲ與テ胃腸ヲ淨掃スレバ諸症漸次ニ退ク者數、歷驗セリ或患者自然ニ數、下利ノ其毒排除シ治スル者アリ

○或病性元來胃腸熱ニ是ニ繼テ神經熱ノ諸症ヲ發メ合併病トナリ遂ニ吐劑若ハ下劑ニテ治スル者アリ

**胃腸毒患害**

胃腸腐敗酷厲毒壅鬱スレハ是ヲ以テ全軀ノ神經質ヲ刺戟メ熱ヲ増進シ譫妄及痙攣ノ諸症ヲ發シ或、其毒表部ニ蕩越メ皮膚ヲ侵刺シ粟疹紫斑等ヲ發シ或、腸ヲ刺戟メ劇キ攣急下利此殊ニ害腸炊衝等ヲ發シ或、其毒腸ノ嚙收管ヨリ血中ニ侵入スレバ血液逾酷厲トナリ血質腐敗メ溶解崩壞シ漏汗若ハ失血ヲ發ス○殊ニ膽液熱ハ酷厲ナル膽液血中ニ浸滌メ血質崩壞スルト宛モ惡厲ナル黃疸ノ如シ

**膽液熱症治**

膽液熱ハ膽液若ハ其他酷厲液胃腸

中ニ鬱蓄シ發ス。其症屢惡心シ或水ノ如キ汚液ヲ吐シ。懊懷苦滿。呃逆。顫振。譫語等ヲ發シ或諸部痙攣ノ運動ヲ兼又此病或吐劑ヲ與テ吐セズ却テ下利スル者アリ。或些少ノ吐劑ヲ與テ嘔吐過度。大ニ瞑眩ナル者アリ。此二症俱ニ痙攣ノ運動ニ因テ胃腸ノ常調ヲ失フ者ナリ。故ニ先是ヲ治セザレバ吐下劑モ亦功ナシ其痙攣ヲ治スルハ緩和稀釋ノ飲劑ヲ與ヘ。又是ヲ吉利詞參兒トシ施シ或催睡鎮痙劑阿夫蓉等ヲ用上或腹部ニ緩和ノ蒸濕劑ヲ施シ或熨衝ノ症アル片ハ瀉血法ヲ施シ若ハ腹部ニ發泡膏ヲ

貼スル等各其症ニ隨ヒ適用シ痙攣治ノ後其汚物壅滯ヲ滌除シ治スベシ

神經熱膽液熱合併症治

神經熱ト膽液熱合併ス

レバ間劇キ吐下及痙攣搐掣ノ運動ヲ發シ脉狀屢變易シ元運力俄ニ強盛ナルカ如クニノ忽沈垂シ精力卒ニ虛脱ノ死セントス。此症ヲ惡性胃腸熱ト曰フ此按ニ霍亂即是元運力虛極ノ症タル故ニ神經熱ノ諸症ニ準ノ方法ヲ施シ治スベシ○膽液熱日ヲ經テ増劇シ精力大ニ虛脱シ脉微弱ヲ見シ或輕キ吐下劑ヲ與テ後。虛備逾甚キ者ハ膽液熱ニ神經

熱ヲ兼ル症トス。故ニ其精力ヲ保護シ且皮表ノ排  
 泄ヲ進輸シ治スベシ。表發ノ蒸氣宜越ノ云其藥ハ  
 額草攝爾扁答白芷安質沒扭劑少量ノ韃爾  
 答越默氏埤列利精等ヲ用ヒ發泡膏ヲ貼スベシ  
 此症患者天資薄弱ニノ感動已甚ニ因リ或神經大  
 ニ虛憊スルニ因リ或峻下劑ヲ過用シ或皮表ノ排  
 泄ヲ抑遏スルニ因テ來ル者多シ。此病神經大ニ  
 衰弊ノ其機能ヲ失フ片ハ患者毫モ躁擾セズ知覺  
 感觸甚ダ遲鈍。或人事ヲ省セズ脉細弱熱勢減シ其  
 狀遷延熱ノ如シ。此症ハ專ラ揮發衝動劑ヲ用テ元

運力ヲ撥揚挑起スベキヲ固ヨリ論ナシ然凡間又  
 吐下劑ヲ投スベキ症アリ臨診處方ノ際宜ク精思  
 熟察ヲ致スベシ

胃腸毒抑遏精力

凡胃腸汚物アレバ患者ノ精力  
 ヲ抑遏ノ憊困セシメ虚候ヲ現ス。多シ。醫家は之  
 察スル。一大要事トス。古人云。胃腸ノ汚物能精力  
 ヲ掠奪ス。汚物ヲ驅除スルハ即精力ヲ資補スルナ  
 リ。ト壯實强健ノ人ト雖モ過食ノ胃飽滿スレバ肢  
 體懈惰倦重ノ精力罷勞ヲ覺ルガ如シ。是其精力真  
 ニ虚缺ノ然ニ非ズ。汚物ノ壅滯ニ因テ胃神經牽蹙

鬱塞シ精力是カ爲ニ抑遏ノ舒暢セザルナリ。此症吐劑ヲ與テ汚物ヲ滌除スレバ精力即回復ス。故ニ精力虚憊ニ二般アリ。一ハ精力真ニ虚竭ス是ヲ真虚ト曰フ。一ハ神經ノ感動ニ因テ假ニ精力虚憊ノ候ヲ現スナリ。是ヲ假虚ト曰フ。右ニ論スル症ハ即假虚ナリ。吐劑ヲ與テ惡心ヲ發スルモ患者精力忽虚乏ヲ覺ユ。是胃神經ノ感動ニ因テ精力ヲ抑遏スル者ナリ。胃、焮衝モ亦其病毒ニ因テ胃神經鬱塞シ精力ヲ抑遏スルヲ甚フメ大ニ憊困シ昏眩ヲ發スル。此病ノ常症トス。此皆假虚ニ屬スル者ナリ。

此真假ノ二種ヲ診シ別テ治術ノ一大要務トス。胃、神經ノ最感觸ニ銳敏ナルヲ喻バ大ニ力ヲ極テ胃、部ヲ一撃スレバ其人忽死スルヲ猶頭ヲ一撃ノ即死スルガ如シ。是ニ由テ凡、胃腸、神經ノ嫌ヒ惡ムベキ感觸アル片ハ其勢忽全軀ノ神經ニ施及シ迅速ナルヲ宛モ影響ノ如ク精力頓ニ虚憊スルナリ。乃胃腸汚物アレバ其神經是ニ感動ノ忽虚憊ヲ現スル。亦猶神思ノ困苦勞傷忽腦神經ニ感觸ノ全軀ノ精力虧損スルカゴトシ。若シ其汚物腐敗毒ナル片ハ患害更ニ劇ク。精力ヲ抑遏スルヲ殊甚クメ

宛モ惡厲ノ傳染毒。人身ニ侵掠スルガ如シ。○胃腸汚物壅鬱スレバ飲食ヲ妨ゲ又保固強壯劑ヲ用テ能ハズ。強テ是ヲ與レバ藥食共ニ消化セズノ患者日ニ衰頹ニ就キ徒ニ死ヲ促スノニ。○日常ノ飲食及胃腸ニ滲出セル粘液膽液ノ如キモ多ク鬱聚ノ汚物トナリ人身ヲ賊害スルニ至テハ即チ一病毒ナリ故ニ自然良能ノ機力ニ因テ其毒ヲ攘除スルニ足ザル片ハ必ズ醫藥ヲ以テ是ヲ除クニ非レバ治セザルナリ

胃腸毒補瀉利害

胃腸汚物壅鬱ノ症ニ真假ノ二

症アリ是ヲ診決スルコト一大要事タリ假症ハ胃腸些モ汚物ナクノ汚物壅鬱ノ症ヲ現ス故ニ吐下劑必ズ害アリ胃ノ感動甚キヨリ惡心嘔吐ヲ發スル者アリ或舌苔アリテ胃腸汚物ナキ者等真症ハ胃腸汚物壅鬱スルナリ胃腸汚物有無ノ徵候次ニ出ツ○真症ノ療法ニ二般ノ別アリ。其一ハ胃腸些少ノ汚物アレハ必ズモ吐下劑ヲ要セズ。唯揮發強壯劑ヲ用テ胃腸ノ機轉ヲ増發スレバ汚物自然ニ排除スル者ヲ云其二ハ吐下劑ヲ用ルニ非レバ是ヲ除ク不能ザル者ヲ云。此症ハ揮發強壯劑ニテ胃腸ヲ健運スレハ汚物ヲ除クニ足ラス。縱ヒ日ヲ經テ是ヲ



除ク<sub>1</sub>ヲ得ル者モ荏苒トノ日ヲ經ル間患者ノ精  
 カ大ニ疲勞シ竟ニ救ハレザルニ至ル然レバ吐下劑  
 必ズ闕<sup>カク</sup>ベカラザル者ナリ○或云神經熱ニ下劑ヲ  
 與<sup>レ</sup>レバ偏<sup>ト</sup>ニ患者ノ精カヲ劫奪スルノミニテ病毒  
 排除スル<sub>1</sub>ナシ。瀉劑ハ唯<sup>ニ</sup>激衝性ノ病ニ施スベキ  
 者ナリ。ト是神經熱療法ノ定則ニノ固<sup>ト</sup>ヨリ異論ナ  
 シ。然レ<sup>レ</sup>今幾多ノ經驗ニ因テ是ヲ徵スルニ胃腸ノ  
 汚物些少ノ者ハ右ノ如クニノ治スベシト雖モ其  
 大ニ壅鬱セル者ハ徑<sup>ニ</sup>ニ是ヲ驅除スルニ非レバ虛  
 憊ノ諸症モ亦治セザル<sub>1</sub>既ニ上ニ説ク如シ○或云。

胃腸ノ汚物ニ刺戟毒アレバ自ラ下利ヲ發メ汚物  
 排泄ス。是下劑ヲ與<sup>ル</sup>ニ異<sup>ト</sup>ナラス。且揮發強壯劑ヲ  
 與<sup>テ</sup>テ全身ノ運動ヲ強健スレバ胃腸亦健運メ自然  
 ニ其汚物ヲ吐シ或下利ノ治ス。是亦吐下劑ヲ投ス  
 ルト異<sup>ト</sup>ナル<sub>1</sub>ナシ。故ニ更ニ吐下劑ヲ須<sup>メ</sup>タズメ治  
 スヘシ。又揮發強壯劑ハ全軀ノ神經諸管纖維ヲ衝  
 動健運スル故ニ若シ是ヲ與<sup>テ</sup>テ吐下スレバ直<sup>ニ</sup>吐  
 下劑ヲ用ルニ比スレバ患者ノ精カヲ劫奪スル害  
 ナク却テ資補強壯ノ功アリ。ト此説近來世人ノ遵  
 循唱和スル所ナレ<sup>レ</sup>是唯吐下ノ後患アラ<sub>1</sub>ン<sub>1</sub>ヲ

恐レ。吐下劑的當ノ症ト雖モ遲疑ノ其期ヲ失フノ  
 ニナラス究竟名アリテ實ナキ事トス。其故ハ揮發  
 衝動ノ藥品假令<sup>タトヘ</sup>バ忽弗<sup>オフ</sup>滿鎮痛液。麝香。葡萄酒等ヲ  
 多量ニ連進スレバ是ヲ以テ頻リニ胃腸ノ蠕動機  
 ヲ衝動ノ遂ニ嘔吐シ若ハ下利スルヲアリ。然レバ藥  
 劑ハ補瀉ノ別アレ<sup>レ</sup>吐下スルニ至テハ即<sup>チ</sup>吐下劑  
 ト一般ナリ。若<sup>シ</sup>吐下果ノ神經熱ニ害アラバ揮發強  
 壯劑ニテ吐下スルモ亦害アリ縱<sup>シ</sup>指ニテ探吐ス  
 ルモ亦害ナキヲ得ズ○凡<sup>ソ</sup>體中ノ諸器ハ各區自<sup>ラ</sup>  
 性ノ感觸アリテ刺戟ヲ受ル<sup>ル</sup>各異ナリ刺戟衝動

ノ諸藥モ亦各自固有ノ稟性アリテ刺戟ノ効力同  
 ジカラズ。假令<sup>シ</sup>バ胃ヲ刺戟スル者ハ吐シ。腸ヲ衝動  
 スル者ハ瀉シ。腎ヲ刺戟スル者ハ小便ヲ利シ。皮膚  
 ヲ刺戟スル者ハ發汗スルガ如シ。是皆諸器ノ感觸  
 ト諸藥ノ主能ト相契合ノ効力ヲ遲發スル者ナリ  
 故ニ各其主ル所ノ藥ヲ用<sup>レ</sup>レバ服量少ク刺戟甚シ  
 カラスノ其効敏捷ナリ然<sup>ル</sup>ニ揮發衝動ノ藥劑ヲ用  
 テ強<sup>ク</sup>テ吐下ヲ要スレバ藥量多ク刺戟甚クノ後。始  
 テ吐下スル故ニ其効遲クノ大ニ瞑眩シ<sup>テ</sup>徑ニ吐下  
 劑ヲ用ルガ如キ捷効ナシ。或湧吐ヲ要スル症モ吐

セズノ却テ下利スル如キ意外ノ害ヲ速<sub>子</sub>キ。究竟是  
 ガ爲ニ病毒長ク體中ニ淹留ノ日夜ニ侵襲シ患者  
 ヲノ逾<sub>レ</sub>虚憊セシメ或<sub>レ</sub>其毒遂ニ胃腸中ノ噏收管ヨ  
 リ血中ニ泛溢ノ更ニ諸惡症ヲ増發シ。或<sub>レ</sub>素ヨリ胃  
 腸ノ嫩衝シ易キ者。或<sub>レ</sub>病毒酷烈ニメ刺戟甚ク。若<sub>ク</sub>ハ  
 燥屎。腸中ニアル<sub>レ</sub>ハ其内服セル起熱衝動ノ藥氣  
 ニ因テ大ニ熱勢ヲ助長ノ胃腸嫩衝ヲ萌發ス。或<sub>レ</sub>蚊  
 蟲ニ因テ刺戟スル者モ固ヨリ殺蟲劑ニ非レバ驅  
 除スベカラズ。右ノ如キ幾多ノ損害アルヲ以テ觀  
 レバ吐下スルニ揮發強壯劑ヲ用ルト徑ニ吐下劑

ヲ用ルト損益利害自ラ判然タルベシ。凡<sub>レ</sub>幾那及  
 葡萄酒ノ如キ品類モ多服ノ腸ヲ刺戟スレバ必<sub>ズ</sub>瀉  
 下ス。瀉下ノ功ヲ得ル<sub>レ</sub>ハ即<sub>チ</sub>下劑ノ功ニメ強壯劑  
 ノ功ト云ベカラズ。間歇熱ニ幾那ヲ用テ下利スル  
 者アリ。其下利アル間ハ病必ズ治愈セズ。是<sub>レ</sub>幾那ノ  
 間歇熱ヲ治スルハ強壯ノ効ニ在リ。瀉下スレバ其  
 功ヲ奏スル<sub>レ</sub>能<sub>ハ</sub>ザレバナリ故ニ凡<sub>レ</sub>幾那及葡萄酒  
 等ヲ以テ胃腸毒ノ症ヲ治スト云ハ皆是ヲ多服ノ  
 或<sub>レ</sub>吐<sub>シ</sub>或<sub>レ</sub>下利スレバナリ然<sub>レ</sub>バ是<sub>レ</sub>吐下法ニテ治ス  
 ル者ニノ資補強壯ノ功力ニ非ズ。然<sub>レ</sub>ニ吐下劑ヲ惡

ムノ徒ハ其吐下ニテ治愈セルヲ察セズ。漫ニ揮發強壯劑ノ功トスルハ牽強無替ノ誣説ト謂ベシ

胃腸汚物徵候

舌苔ヲ以テ胃腸汚物アル確徵トシ難ク。汚物ナシト雖モ他因ニ由テ苔ヲ現ス。既ニ前ニ論スル如シ。○胃腸汚物壅鬱スレバ心下若ハ腹肚苦滿痞鞭攣急或拘痛ノ且舌苔アリ殊ニ審察スルニ心下大ニ苦悶スレバ呼吸不利短促セズ。或大渴アリテ些モ飲衝ノ候ナキハ必ズ胃腸汚物アル候トス。或惡心嘔噦シ或屢噫氣ヲ發シ或面部殊ニ口鼻ノ邊圍黃色ヲ現シ。額疼之若ハ眩暈ス

○或熱勢其他神經熱ノ固有ノ諸症ニ右ノ胃腸毒ノ諸症ヲ兼テ共ニ増進シ或自ラ吐下シ若ハ藥ヲ用テ吐下スル所ノ物一種異常ノ毒質ヲ現シ是ニ次テ諸症輕快スルハ皆胃腸毒アル徵候トス。○下劑ヲ用レバ每次其大便ノ質ヲ見テ汚物ノ有無ヲ辨シ患者ノ精力ヲ察スベシ。乃下劑ヲ與テ大便水瀉ニ非ルハ大抵良効アリ。水瀉スルハ汚物ナキ候ニノ害多シ。故ニ大便水瀉トナリ精力虧損スル片ハ速ニ下劑ヲ止ムベシ。○患者嘗テ大ニ神思ヲ勞傷シ或消化シ難キ食物ヲ過用シ或平素胃腸ニ汚

物鬱滯シ易ク若ハ粘液留飲多ク生スル者。或曾テ  
蛇蟲ヲ患ル等ノ諸件ヲヨク驗問メ今其發現セル  
諸症ト參較スレバ其候逾明白ナリ。然レ前因ナク  
ノ病中多ク汚物ヲ生スル者アル故ニ強テ是ニ拘  
ルベキニ非ズ

吐下劑標的

凡、神經熱ハ胃腸汚物壅鬱ノ候アリ  
テ究竟遲疑スベカラザル緊要ノ機會アルニ非レ  
バ縱<sup>タ</sup>古苔アレ<sup>レ</sup>且漫<sup>ニ</sup>吐下攻瀉ノ劑ヲ投スベカ  
ラザル<sup>ヲ</sup>治術ノ大法ニ是ヲ戒慎スベキ<sup>ヲ</sup>猶刺  
絡ノ如シ尚且些少ノ汚物ハ揮發強壯劑ニテ除ク

ベキ者アリ或胃腸病毒アレ<sup>レ</sup>且決メ吐下スベカラ  
ザル症アリ故ニ又慎重メ吐下劑ヲ處スベキ標的  
ヲ左ニ舉グ

第一 神經熱ノ初發患者ノ精力未ダ甚ダ虚脱セザ  
ル時。前說ノ汚物壅鬱ノ候ヲ見、ス者ハ其症ニ隨ヒ  
吐劑若ハ下劑ヲ與ヘ驅除ノ捷効アリ

第二 此病數日ヲ經テ患者ノ精力虚憊<sup>真</sup>既ニ甚キ  
ニ至テ汚物壅滯ノ候ヲ見、ス者。若<sup>モ</sup>汚物少ク其症急  
迫ナラザル<sup>片</sup>ハ先<sup>試</sup>ニ揮發衝動劑其他對症ノ強  
壯劑ヲ與、テ胃腸ヲ健運シ自然ノ排泄ヲ輔助メ尤

切實トス。若此症直ニ吐劑若ハ下劑ヲ與レバ或此  
 モ吐下スルヲ能ハズ或吐下ニ因テ精力遂ニ脱竭  
 ノ救ハレザルニ至ル然ニ先強壯劑ヲ與テ胃腸ヲ  
 健運スレバ汚物自ラ消化メ復吐下劑ヲ用ルニ及  
 ザル者少カラズ。或汚物消化セザル者モ全軀ノ精  
 力健旺スルニ由テ其後吐下劑ヲ與レバ能ニ堪  
 テ捷効ヲ奏スルナリ

第三揮發強壯劑ヲ與テ汚物鬱蓄ノ諸症轉加重シ  
 其熱及病勢増劇シ心煩苦悶心下困重逾甚ク頭疼  
 額重尚且惡心嘔噦等。病毒上湧ノ症ヲ發スル片ハ

吐劑ヲ的當トス凡胃腸汚物アリテ必ズ驅除スベ  
 キ症ハ吐劑尤良トス。下劑ハ腸ヲ衝動メ精力ヲ虛  
 蕙セシムルヲ吐劑ニ比スレバ殊ニ甚ケレバナリ。  
 故ニ吐劑亦ハ百葛格安那ノ如キ腸ヲ刺戟スルヲ  
 少キ品ヲ佳トス即後方ヲ與ベシ

鎮痙湧吐散

百葛格安那 末 半カ  
 葛私多儂謨 二カ

右研合ノ一服トシ八分時毎ニ一服宛與ヘ十分吐  
 スルニ至ルヲ度トス○或吐劑ヲ用テ吐シ且下利  
 スル者アリ。是其藥力胃ヨリ腸ニ連及メ腸神經ヲ

刺戟スレバナリ故ニ是ヲ防グガ爲ニ右ノ劑中。鎮  
 痙藥ヲ加フ。若シ下利スレバ吐劑ト雖モ亦一種ノ下  
 劑ナレバナリ殊ニ韃爾答越默窒ハ吐藥ナレハ間  
 瀉下スル故ニ鎮痙藥ヲ加サレバ痙攣ノ諸症ヲ發  
 シ或此モ吐セザルアリ○病毒上湧ノ顯症ナキ  
 者ハ心下諸症噫氣強壯劑ニ適宜ノ下劑ヲ加用ル  
 ヲ佳トス。假令バ惡心嘔噦等幾那煎汁ニ硃砂。答末林度。大黃等  
 ヲ加ルガ如シ

第四胃腸汚物ノ刺戟ニ因テ假リニ險症ヲ現スル  
 者アリ。假令バ胸脇焮衝。肺焮衝。譫妄等ノ頭胸ノ諸

症ヲ發シ。是ニ腹部拘攣急及焮衝様ノ症ヲ兼ヌ  
 此症多クハ患者精力真ニ虛憊ノ發スルニ非ズ。又  
 真ノ焮衝ニ非ズ唯胃腸汚物ノ刺戟直ニ頭胸ノ神  
 經ニ連及ノ刺戟シ發スル者ナリ。故ニ強壯劑。鎮痙  
 劑。及防焮衝劑毫モ効ナク其症却テ増劇シ。吐劑下  
 劑若ハ驅蟲劑ヲ用テ捷効アリ

第五揮發強壯劑ヲ用テ絶テ功ナク胃腸汚物壅鬱  
 ノ諸症依然トメ退カザル者ハ吐劑若ハ下劑ヲ與  
 淨掃メ後。揮發強壯劑ヲ用ルニ若ハナシ。粘穢汚物。  
 胃腸ノ裏面ニ壅蔽スレバ強壯劑ヲ與レハ直ニ胃

腸神經ニ通徹セズノ効ヲ奏セザレバナリ

第六 神經熱回復ニ向ヒ諸症漸退キ諸器ノ機力大

抵復スルニ臨デ唯食進マズ消化ノ機力荏苒トシ

復セズ健胃劑ヲ與レテ驗ナクモ仍胃腸壅滯ノ候

ヲ兼ル者ハ本病既ニ潰散スレテ胃腸ノ餘毒未ダ

盡除カザル症トス。吐劑若ハ下劑ヲ與テ是ヲ一掃

スレバ諸症解散シ其鬱毒ニテ蹙過セル全軀ノ精

力舒暢ノ充張シ其効幾那葡萄酒ニ勝レリ

吐劑用法 吐劑的當ノ症ニ是ヲ用レバ其効下劑

ノ及所ニ非ズ然レ其吐劇カラズ痙攣ノ諸症ヲ發

セズノ患者ヲ罷勞セシメザルヲ專要トス。此數件

ノ害無ラシメント欲セバハ百葛格安那六氏ヨリ

十氏マデ取テ葛私多僕謨若ハ麝香。其他斯ノ如キ

鎮痙藥ヲ加ハ分時毎ニ與テ吐スルヲ度トスベシ

○心下學痛自餘痙攣ノ諸症多クノ吐劑ヲ與レバ

其症必ズ發動セシムルヲ恐ル者ハ先鎮痙ノ効アル

蒸湯劑膏藥等ヲ心下ニ施シ又鎮痙劑ノ吉利詞多

兒ヲ施シ其後吐劑ヲ用ベシ○吐劑ヲ與テ些モ吐

セザル症アリ或却テ劇ク水瀉シ精力大ニ虛罷ス

ル者アリ是殊ニ惡候トス共ニ多クハ痙攣ノ運動



ヨリ來ル故ニ是亦吐劑ニ鎮痙藥ヲ加用テ良功アリ  
 ○一患者吐劑ヲ服メ些モ吐セズ故ニ一二時ヲ  
 經テ纈草泡劑ヲ取テ少許宛服セシムレバ自ラ嘔  
 吐ヲ發シ患症速ニ快愈セリ○胃神經麻痺ニ感觸  
 遲鈍ニ因テ吐劑ヲ與テ吐セザル者アリ宛モ阿芙蓉  
 等ノ麻藥ヲ過服シ胃麻痺セル者ノ如シ此症ハ  
 揮發衝動劑最効アリ即葡萄酒龍腦亞的兒竝ニ揮  
 發鹽類ヲ内服セシメ又芥子泥ヲ胃部ニ貼メ其觸  
 知ヲ挑發シ其刺戟ノ時ニ乘メ一服ノ百葛格安  
 那ニ安質沒扭酒ヲ加頓服セシムレバ速ニ吐ス○

胃中稠固ノ粘液膠著スルニ因テ吐劑捷効ヲ爲ス  
 能ザル者アリ此症ハ礞砂少許ヲ取テ海葱蜜ニ研  
 和シ與ヘ又地榆根菖蒲根等ヲ用テ胃中凝聚ノ粘  
 液ヲ疏解ノ後吐劑ヲ用レハ即快吐ス

瀉劑用法

瀉劑ニ二般アリ一ハ血液運行ヲ減損  
 シ一ハ血液運行ヲ増進ス○其運行ヲ減損スル品  
 類ハ瀉下ノ効アル中和鹽消石瀉利鹽霸王鹽孕並  
 植酸類枸櫞汁橙汁酸模答未林度酒石英等ナリ是  
 ヲ防炊衝劑ト曰フト曰フ清涼劑然此皆瀉下ノ効有  
 ニ因テ其運行ヲ減損スルニ非ズ假令ハ礞砂ノ如

キハ瀉下ノ効ナキ中和鹽ナレ圧能血液運行ヲ抑  
 制スルカ如シ。又瀉下ノ諸藥モ盡ク血液運行ヲ減  
 損ノ焮衝ヲ防制スルニ非ズ亦能運行ヲ増進スル  
 者アリ○凡、防焮衝ノ諸藥ハ瀉下ノ性効ニ因ラズ  
 ノ別ニ血中ノ煖素和蘭名「ウアル」ヲ奪却シ生運ノ元  
 基ヲ萎衰セシムル稟性アルニ因テ較著ニ全體ノ  
 血質ヲ清涼ノ減損スルナリ○其運行ヲ増進スル  
 瀉劑ハ大黃、旃那カボメル、加羅菴兒ヤリス、葯刺巴、盧會ソノカハ等自餘華爾  
 斯質ノ品ナリ。此類ハ熱性ノ華爾斯ヲ含ムニ由テ  
 熱ヲ起シ血ノ運行ヲ増進ス是ヲ温性下劑ト曰フ

○神經熱其他精力虛衰諸病ニ下劑ヲ用ルニハ防  
 焮衝藥ヲ與ズノ温性下劑ヲ允當トス。或、盧會ノ如  
 キ起熱ノ品ヲ以テ揮發強壯ノ峻藥トスル者アリ。  
 予亦數胃、虛衰ノ症ニ是ヲ用テ健胃消食ノ効ヲ取  
 リ幾那ヨリ多シ是ヲ以テ諸般ノ下劑ハ盡ク精力  
 ヲ減損スト云ベカラズ○然、汚物壅滯ヲ瀉下ス  
 ルニ或、緩性ノ酸收下劑答未林度酒ヲ用ヒ或、是ヲ  
 吉利詞キリス、參兒テールトシ或、大黃、甘汞、答未林度答未林度ヲ用ヒ或、麻  
 僞グ、涅ネ、失亞シアニ酒石英ヲ加用テ每常ツツ的効ヲ得ルヲ多  
 シ。但其症ニ隨ヒ揮發衝動藥及鎮痙藥ヲ加用ベシ

神經熱胃腸熱合併病治例

此合併病ハ醫家審診  
熟察セザレバ動輒<sup>ヤモスレ</sup>バ其因症ニ眩惑ノ治法ヲ的識  
シ難キ<sup>一</sup>アリ故ニ又治例四則ヲ左ニ舉テ考據ヲ  
資ク

○一婦人三十歳。稟賦脆弱。一兒ヲ安産シ乳汁稀少  
ニ<sup>一</sup>自ラ乳養セズ産後十四日ニ當テ風寒ニ感シ  
熱病ニ罹<sup>カ</sup>ル初起胸脇刺痛ス。一醫腕ニ刺絡シ瀉血  
ノ効ナシ。脉甚ダ小弱ナラザレ<sup>一</sup>在搏度齊ハズノ擗  
縮シ。精力大ニ虛憊シ。腠理閉塞。大渴ノ舌苔微ナリ。  
又病毒。腦ヲ侵掠ノ夜中稍譫語ス。然<sup>一</sup>在<sup>一</sup>最患ル所ハ

胸肋刺痛。呼吸不利。乾效ナリ。○予是ヲ診シ病性。焮  
衝ニ非ズ<sup>一</sup>ノ神經熱タル<sup>一</sup>下彰然タリ。前ニ刺絡ノ諸  
症些<sup>ス</sup>モ減ゼザル故ニ胸脇ノ患症亦焮衝ヨリ來ル  
ニ非ズ<sup>一</sup>乃方劑ハ遠志ニ纈草根ヲ加煎劑トシ與ヘ  
氏<sup>シ</sup>堙<sup>レ</sup>列<sup>レ</sup>利<sup>リ</sup>精ヲ兼用シ。又亞兒尼<sup>アルニ</sup>如花ノ泡湯ヲ茶ニ  
代テ服セシメ。芫菁膏ヲ胸肋ノ疼處ニ貼シ。鎮痙藥  
ヲ擦藥トシ胸脇ニ擦シ。又鎮痙劑ヲ吉利詞<sup>キリス</sup>參兒<sup>テイル</sup>ト  
シ施ス。然<sup>レ</sup>ニ諸症依然トシ退カズ。脉稍盈揚スレ<sup>一</sup>在  
呼吸益促進ス<sup>一</sup>予意<sup>オモ</sup>ラク此症固ヨリ神經熱ナレ<sup>一</sup>在  
唯擗急ニ因テ胸肋刺痛ヲ發スル者ナリ。○因テ鎮

瘧ノ峻藥タル麝香ヲ兼用スルニ寸効ナシ。又阿芙蓉ヲ與レレモ毫モ驗ナク患症逾險重ナリ第七日ノ夜呼吸促迫及胸脇痛極テ劇ク。牀褥ニ轉側シ其患狀ヲ告ントスレレ語聲續セズ又欬ノ刺戟甚メ此モ吐痰ナシ熱勢煩渴殊ニ甚ク。頭痛烈ク。腦中騷擾ヲ覺テ時ニ譫語シ。脉急數ニノ攣縮ス是ニ於テ予又意ラク前ニ刺絡ヲ施シ又鎮瘧劑ヲ用テ毫モ痛苦ヲ減セザレバ決メ煥衝性ノ病ニ非ズ又純ラ神經虛憊ノ攣攣ヨリ發スル患症ニ非ズ。揮發衝動劑ハ既ニ峻効ノ品ヲ投スレレモ此ノ驗ナク。勉テ對

症契當ノ方法ヲ施セレ徒ニ患苦ヲ増ノミニ寸効ナシ故ニ予殆ト疑惑シ更ニ再三其患狀ヲ熟察スルニ患者毎イッモ次午後ニ於テ噫氣ヲ發シ時惡心。心下微滿ノ痞悶ヲ覺エ。舌苔亦絶タテナキニ非ズ。且神經熱ノ渴アルハ多ク胃腸汚物ニ係ル一徵トス。是ニ於テ遂ニ吐劑ヲ與ルニ決ス。是汚物ヲ湧泄スルノミナラス。直ニ胸中ヲ疏豁ノ鎮瘧ノ効ヲ得カ爲ナリ。乃イヒ百葛格安那五カ氏ヲ取リ葛私多カ儂ム少許ヲ加テ一服トシ八分時毎ニ一服宛與フ僅ニ二服ニノ夥ク膽液質ノ穢物ヲ快吐ス吐シ了レバ即呼

吸快利シ胸脇痛速ニ減シ患者自ラ身體ノ一變セ  
 ルヲ覺ユ次日胸脇痛盡ク消シ熱減シ肢體蒸氣ヲ  
 發ノ津潤ヲ得痰唾始テ能咯出ス爾後遠志ニ答末  
 林度中和鹽霸王鹽瀉ヲ加用テ數日大便順利シ竟  
 ニ全治ヲ得タリ此病初發刺絡セズ直ニ吐劑ヲ  
 與ハ患症三日ヲ出スメ治スベシ且其病原胃腸ノ  
 汚物ニ係リ其毒連及メ頭胸ノ諸器ヲ刺戟シ危劇  
 ノ諸症ヲ發セルヲ顧慮セズ第七日ニ至テ仍  
 吐劑ヲ與ル決斷ナカリセバ患者必ズ十二一生ヲ  
 得ル下無ルベシ

○一男子三十二歳體稟薄弱依利昆垓兒ノ宿疾ア  
 リ又時々痔疾及痛風ヲ患ヒ或屢胸動悸及吐血ス  
 ルヲアリ然ニ今又熱病ニ罹リ初起甚々輕症ノ如  
 クニ夕亡ホトナク幾神經熱ノ諸症ヲ現シ且左臂左膝痛風  
 ノ疼ヲ發シ下利二三行舌苔アリ翌日熱勢増加呼  
 吸稍不利必ク吐血シ屢噫氣ヲ發ス患者從來肺脆  
 弱ニシ甚々刺戟ヲ受易ク血上湧シ易クノ固ヨリ  
 熱性刺戟ノ藥ニ堪サル予曾テ是ヲ知ル又胃腸  
 汚物アリテ必ズ驅除スベキ症タルヲ察スレテ  
 吐劑ヲ用ベキ徵候未ダ著實ナラス故ニ先續草ニ

答末林度ヲ加用<sup>レ</sup>吉利詞參兒<sup>ル</sup>ヲ施<sup>シ</sup>鎮痙ノ効<sup>ア</sup>  
 ル軟膏ヲ患部ニ擦<sup>シ</sup>芫菁膏ヲ脚ノ疼處ニ貼<sup>ス</sup>其  
 夜噫氣變ノ呃逆トナル。因テ薄荷泡劑ヲ與<sup>ル</sup>ニ煩  
 懣逾<sup>甚</sup>翌日呃逆甚ク。微<sup>ク</sup>下利<sup>シ</sup>呼吸不利<sup>ク</sup>嗽增  
 加<sup>ス</sup>然<sup>レ</sup>疝臂膝ノ疼差減<sup>シ</sup>肢體蒸氣ヲ發<sup>ス</sup>其夜三  
 更頃ヨリ曉マデ大<sup>ク</sup>煩悶<sup>シ</sup>呃逆殊ニ甚<sup>ク</sup>。抽掣狀ニ  
 ノ呼吸ヲ阻<sup>シ</sup>些<sup>モ</sup>睡<sup>ラ</sup>ズ。翌日諸症轉<sup>テ</sup>危劇ヲ加<sup>ヘ</sup>。  
 脈百二十動。盈揚スレ<sup>レ</sup>疝按<sup>メ</sup>虛軟。心下痞脹スレ<sup>レ</sup>疝  
 腹滿セズ。頭腦中少<sup>シ</sup>モ患苦ナク却<sup>テ</sup>精神爽利ニ過  
 ク皮膚潤小便赤。舌苔除カズ。然<sup>レ</sup>疝惡心ナシ。臂膝痛

盡ク消散ス。但<sup>シ</sup>精力罷勞逾<sup>甚</sup>予意<sup>ラ</sup>ク此病<sup>ハ</sup>激衝  
 ノ候ナキ故ニ多ク疏滌スベカラズ唯強壯劑ヲ以  
 テ罷勞ヲ復<sup>シ</sup>鎮痙劑ヲ以<sup>テ</sup>其危劇ノ痙攣ヲ救<sup>フ</sup>ベ  
 シ。ト因<sup>テ</sup>幾那ニ纈草根ヲ加<sup>テ</sup>煎劑トシ答末林度  
 及<sup>ヒ</sup>菲阿斯失亞密越幾斯劑ヲ攪和<sup>シ</sup>内服セシメ。又  
 此劑ヲ吉利詞參兒トシ施<sup>ス</sup>然<sup>レ</sup>疝其夜諸症寬解セ  
 ス因<sup>テ</sup>麝香ニ枳殼爾私發汗散ヲ和<sup>シ</sup>用<sup>フ</sup>。然<sup>ル</sup>ニ煩  
 悶呃逆殊ニ劇<sup>シ</sup>翌早是ヲ診<sup>フ</sup>ニ患者曰<sup>ク</sup>心下急脹  
 苦悶ニ堪<sup>ズ</sup>宛<sup>モ</sup>勁帶ヲ以<sup>テ</sup>緊紮セルカ如<sup>シ</sup>ト。又  
 膽液樣ノ汚物ヲ吐<sup>ス</sup>。因<sup>テ</sup>予意<sup>ク</sup>是<sup>レ</sup>必<sup>ズ</sup>腐敗酷厲

ノ惡液。消化シ難キ汚物。胃腸ニ壅鬱ノ其服用セル  
 幾那。鎮痙藥等ノ効力ヲ妨ル者ナリ。ト乃吐劑ヲ與  
 ント欲スルニ患者嫌惡ムヲ甚シ。因テ芒消四錢ヲ  
 一服トシ水ニ攪和シ與レハ膽液質ノ汚液ヲ瀉下  
 スルヲ行。隨テ煩悶呃逆頓ニ休ム。是ニ於テ幾那  
 煎ヲ與レバヨク胃腸ニ堪テ服スルヲ得。爾後熱  
 減シ諸症輕差ス。但レ二日ヲ經テ復煩悶呃逆。其他胃  
 腸毒ノ諸症再發ス。因テ前ノ下劑ヲ與テ即治ス。數  
 日ヲ經テ復前症ヲ發スレハ下劑ヲ用テ治ス。斯如  
 ク下劑ヲ與テ三回。其間幾那煎ヲ用ルニ由テ此險

症竟ニ全愈セリ

○一男子三十四歲。天資薄弱。平素勞動ノ業ナシ。屢  
 依利昆堙兒ノ症ヲ患フ。偶熱病ニ罹リ發熱暫留五  
 日ニメ是ヲ診フニ唯初起ヨリ頭腦ノ諸症ヲ患ヒ  
 水様ノ液ヲ吐。一兩三次。患者甚ダ脱力勞罷シ頭痛  
 困重。次テ昏冒。人事ヲ省セズ。或譫語シ神思危懼ノ  
 頻ニ死ヲ畏レ。或言人將ニ已ヲ捕ントス。脉小ニメ  
 次序ナシ。然レ疾數ナラズ。熱勢亦過盛ナラズ。肌膚  
 乾燥。呼吸齊ハズ。時々大息シ稍煩悶シ肢體顛振。眼  
 神恐々然トメ寧カラズ。時ニ眼光慌暴異常。大便秘

閉舌苔ナシ。衆人以為此病神經熱ニ其嘔吐亦神經、寧急ヨリ發ス。ト或、以為此病胃腸汚物アリテ病勢ヲ助ルカ。否、ザレバ必ス蛇蟲ヲ兼ル者ナリ。此患者嘗テ蛇ノ患アリ。ト然レバ胃腸汚物ノ確徵ナシ。故ニ先、試ニ左ノ揮發強壯劑ヲ與フ

鎮痙纈草飲

纈草根 三錢 忽弗滿鎮痛液 六十滴

右纈草ヲ泡出シ放冷ノ鎮痛液ヲ加ヘ十二時中ニ服セシム又瀉下、吉利詞、麥兒ヲ施シ、芥子泥ヲ兩臂ニ貼ス。翌日諸症同前因テ前方ニ攝絲施那四錢

舍電阿芙蓉液二十滴ヲ加藥効ヲ助ケ用フ。然レバ譫語逾甚ク第三日始テ藥ヲ用ヨリ第三日亦終日譫語煩悶休マズ。脉勢稍盈揚ス。但、飲液ヲ嚥下スレバ咽喉忽、攣縮ノ噎塞シ瀕死危劇ニ及、一兩三次下利二三行アレ。凡、蛇下ラズ因テ鎮痙軟膏ニ阿芙蓉ヲ加、テ胃部ニ擦シ。香竄藥草ヲ葡萄酒ニ浸メ胃部ヲ蒸湯ス。又前ノ飲劑ニ薄荷水、阿芙蓉液ヲ增加シ用フ。○第四日嘔氣止ト雖モ心下苦悶急迫休マズ時ニ譫語シ舌苔穢黃脉細小。逾、痙攣ノ諸症ヲ見、シ身神甚タ勞罷ス。乃、前劑ニ幾那、白芷ヲ加、テ効力ヲ



醇厚ニシ芥子泥ヲ腓ニ貼ス○翌日諸症稍輕緩ナ  
 レ凡譫語休マズ第六日病勢復増劇シ煩悶譫妄狂  
 躁ノ言フ一物ヲ吞ミ胃中ニ梗塞ノ奈シ凡シ難シ  
 ト是患者意識自然ニ胃中ノ鬱毒ヲ知覺シ宛モ一  
 物ヲ吞カ如ク想像シ病因ヲ告訴スル者ナリ此猶  
 睡中肢體ヲ重壓シ若ハ體中一二妨害アレバ奇怪  
 凶厄ノ想像慘惡ノ魘夢ヲ現スルカ如シ此時舌苔  
 顯著ニ揮發強壯劑モ寸効ナキ故ニ復是ヲ持重  
 スルヲ能ハス是ニ於テ斷然トノ胃腸鬱毒ノ刺戟  
 タルヲ曉了シ直ニ雙聖散

名 雙聖散  
安那ノ條出 百葛格ヲ與ルニ

綠色ノ膽液ヲ快吐スルヲ四次。又數膽液様ノ臭穢  
 物ヲ瀉下ス其夜患者始テ安眠シ譫妄全ク休ミ精  
 神清爽體力増生。脈勢充盈ス乃前ノ纈草飲ヲ與ヘ  
 兩日ヲ經テ精力逾回復シ時々牀中ニ起坐スルヲ  
 ヲ得。但欬嗽及輕キ咽喉焮腫ヲ發セリ。是前ニ胃中  
 蘊蓄セル酷厲膽液ノ餘毒。喉頭ニ施及ノ發スルヲ  
 顯然タリ是ヨリ又鶯口瘡ノ發センヲ恐ル。凡神  
 經熱ノ胃腸毒ヲ兼併セル者。胃腸ヲ淨掃セズ誤テ  
 熱性衝動ノ劑ヲ投スレバ動輒バ欬嗽咽喉焮腫。鶯  
 口瘡ヲ發スレバナリ因テ幾那ノ服量ヲ増シ答未

林度ヲ加用ヒ。芫菁膏ヲ項窩ニ貼シ。緩和粘滑ノ藥  
 ヲ含漱劑トシ。玫瑰蜜ニ蓬砂ヲ和シ口中擦藥トス。  
 是ニ因テ鴛口瘡ヲ發セズ藥劑連進十四日ニノ效  
 嗽喉腫消散シ危險ノ熱病全愈セリ

○一老嫗六十七歳。口中苦味ヲ患ル。數日。肢體勞  
 倦。熱ナク脉頗ルカアリテ數ナラズ。是ニ吐劑ヲ與  
 テ吐セズ却テ水瀉二三行。逾億勞シ夜中安眠セズ  
 翌日數自ラ發汗シ或下利シ諸症稍減ス一醫。羯布  
 羅精ヲ以テ肢節ヲ蒸濕シ。後方ヲ與フ

壯神纈草飲

纈草根 末 三錢

右水四弓ニ煮テ渣ヲ去リ後藥ヲ加フ

忽弗滿鎮痛液 半錢 舍利別 一弓

右調和シ一時毎ニ二匙宛與フ其間ニ後方ヲ以テ

茶湯ニ代飲料トス

瞰菜薄荷飲

麻爾羅歇 補 草名苦味香氣アリ解凝利尿ノ効

痰喘ヲ治シ發汗通經ノ効アリ此  
 藥闕ニ遇ハ洞庭藍ヲ用テ可ナリ

瞰菜 薄荷 各四錢

甘草 二錢

右水二十ヲ以テ泡劑トス其夜稍睡眠シ呼吸緩  
 徐ナリ○第三日。脉昨ニ比スレバ軟弱ニノ緩ヲ帶  
 夜中睡ラズ第四日。大渴シ脉稍盈揚ス然レバ精力憊  
 困煩悶甚ク徹夜不寐。大便一行通ズ第五日稍譫語  
 シ精力逾虚憊ス然レバ脉沈衰セズ。通例神經熱ノ脉  
 ニ比スレバ盈揚ス。口中逾苦ク舌燥白色粘液被患  
 者慘悽悲惋シ甚ダ死ヲ怖レ。咽喉甚ダ乾燥ス。因テ  
 又後方ヲ與フ

攝爾壯神散

攝爾扁答 末 二錢

額草根 末 三錢

沙糖 一錢  
 右調和シ分テ十二服トシ。葡萄酒ニ鎮痛液二十滴  
 ヲ和シ此液ニ右ノ散劑一服宛加一時毎ニ飲服ス  
 又前説ノ内外藥モ兼用ス○沙列布鏡ハ燥潤ヲ潤  
 シ滋養ノ効アル故ニ細末トシ一錢半ヲ取テ乳汁ニ  
 煮テ毎日服セシム。因テ咽喉津潤シ諸症稍寛解ス。  
 又芥子泥ヲ貼ス。夜中稍睡眠ス○第六日仍煩悶シ  
 精神蒙昧。脉搏度齊ハズ。小便稍翳ヲ現ス。患者云病  
 前瘡疹ヲ發スレバ發病以來盡ク消散ス。ト因テ又  
 左ノ發泡膏ヲ擦ス

光菁發泡膏

家猪脂

二錢

光菁

一匁

右研和シ日ニ豆大ヲ取テ項窩ニ擦ス薄暮ニ至テ諸症寛解シ脉稍盈揚ノ緩ヲ帶ブ前ノ撮頰壯神散甚ダ効アリテ身半以上蒸氣ヲ發ス今朝少ク衄血ノ患者輕快ヲ覺ユ小便ノ浮翳器底ニ沈ミ内鬱ノ瘡疹是ニ至テ再發ス夜中稍睡眠シ脉稍數ナレ小弱ナラズ但微煩譫語ス第七日芥子泥光菁膏共ニ焮痛發泡セズ諸症同前仍前ノ諸劑ヲ持重シ服セシム夜中不寐且大ニ發汗シ精力虛憊ス○第

八日九日硬便少許通ズ脉小弱舌苔微ニ潤アレ凡渴甚シ乃前劑ニ幾那ヲ加用フ然レ患者虛憊殊ニ甚ク神思沈重愁鬱ス從前病勢進退アレ凡究竟方法良驗ナク且初ヨリ煩悶心下困重休マズ口中苦味除カズ因テ酒石英一錢ヲ取り十盞ノ水ニ溶化シ與フ午後燥屎一行通ノ患者大輕快ヲ覺夜中睡テ蒸氣ヲ發ス○第十日ヨリ十三日マデ諸症逾快愈シ煩悶稍減シ脉漸和シ口中苦味減シ毎日平便若ハ燥屎一行通シ夜中微汗ヲ發ス藥劑同前仍酒石英ヲ兼用ス但精力罷勞シ食進マズ舌苔栗殼

色○第十四日諸症大寛解ス前方ニ龍腦少許加用  
翌日ヨリ日快愈シ第十九日始テ牀蓐ヲ出ル二時  
許爾後漸次ニ回復ス但微汗連綿ノ止マス因テ撒爾  
非亞ノ泡劑ヲ用ヒテ全治ヲ告グ

新訂增補和蘭藥鏡卷九終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 德蘭東先生著 全三冊 博學植學啓原 全三冊

同 內象銅版圖 同 全一冊 舍密開宗 同 全一冊

增補和蘭藥鏡 同 全一冊 醫療正始 同 全一冊

遠西醫方名物考 同 全一冊 泰山名醫彙考 同 全八冊

同 補遺 同 全九冊 要術 同 全三冊

瘍醫新書 同 全四冊 醫方所集 同 全三冊

蘭學階梯 同 全三冊 同力劑篇 同 全二冊

蘭學佩鐫 同上 全一冊 西音發微 同 全二冊

幼幼精義 同 全三冊 病學通論 同 全三冊

濟生三方 同 全一冊 青藜閣 同 全一冊

須原屋伊八

