

新訂
增補
和蘭藥鏡

卷十二

十武 9
856
18-12

學大田稻早
館 書 圖
庫文田內者托寄
號一六一第書托寄
9
號 2 第
册 12 第



武中門
號 856
卷 18-12

武中門
號 856
卷 18-12

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十二

幾那

神經熱流行病性各異篇第八

流行疫症治

千五百六十六年	千七百六十八年	千八百零四年
千七百六十七年	千七百六十九年	千八百零五年
千七百六十八年	千七百七十年	千八百零六年
千七百六十九年	千七百七十一年	千八百零七年
千七百七十年	千七百七十二年	千八百零八年
千七百七十一年	千七百七十三年	千八百零九年
千七百七十二年	千七百七十四年	千八百一十年
千七百七十三年	千七百七十五年	千八百一十一年
千七百七十四年	千七百七十六年	千八百一十二年
千七百七十五年	千七百七十七年	千八百一十三年
千七百七十六年	千七百七十八年	千八百一十四年
千七百七十七年	千七百七十九年	千八百一十五年
千七百七十八年	千七百八十年	千八百一十六年
千七百七十九年	千七百八十二年	千八百一十七年
千七百八十年	千七百八十三年	千八百一十八年
千七百八十一年	千七百八十四年	千八百一十九年
千七百八十二年	千七百八十六年	千八百二十年
千七百八十三年	千七百八十九年	千八百二十一年
千七百八十四年	千七百九十二年	千八百二十二年
千七百八十五年	千七百九十五年	千八百二十三年
千七百八十六年	千七百九十九年	千八百二十四年
千七百八十七年	千八百零一年	千八百二十五年
千七百八十八年	千八百零二年	千八百二十六年
千七百八十九年	千八百零三年	千八百二十七年
千七百九十年	千八百零四年	千八百二十八年
千七百九十一年	千八百零五年	千八百二十九年
千七百九十二年	千八百零六年	千八百三十年
千七百九十三年	千八百零七年	千八百三十一年
千七百九十四年	千八百零八年	千八百三十二年
千七百九十五年	千八百零九年	千八百三十三年
千七百九十六年	千八百一十年	千八百三十四年
千七百九十七年	千八百一十一年	千八百三十五年
千七百九十八年	千八百一十二年	千八百三十六年
千七百九十九年	千八百一十三年	千八百三十七年
千七百八十年	千八百一十四年	千八百三十八年
千七百八十一年	千八百一十五年	千八百三十九年
千七百八十二年	千八百一十六年	千八百四十年
千七百八十三年	千八百一十七年	千八百四十一年
千七百八十四年	千八百一十八年	千八百四十二年
千七百八十五年	千八百一十九年	千八百四十三年
千七百八十六年	千八百二十年	千八百四十四年
千七百八十七年	千八百二十一年	千八百四十五年
千七百八十八年	千八百二十二年	千八百四十六年
千七百八十九年	千八百二十三年	千八百四十七年
千七百九十年	千八百二十四年	千八百四十八年
千七百九十一年	千八百二十五年	千八百四十九年
千七百九十二年	千八百二十六年	千八百五十年
千七百九十二年	千八百二十七年	千八百五十一年

清涼氣

冷瀉法

武中門
號 856
卷 18-12

大正七年九月廿四日
內田 糸子氏 贈

新訂增補和蘭藥鏡

卷十二

標目

風雲堂藏

神經熱治例篇第九

二則

蓬硫酒石散

蓬黃纈草飲

雙聖湧吐飲

壯運纈草飲

纈草吉利詞爹兒

壯神纈攝飲

幾攝壯神飲

龍腦爽神散

芙蓉催睡飲

爽涼大麥飲

鎮痙誘吐散

鎮痙加纈煎

爽神鎮痙飲

防腐蒸湯方

壯神丁幾劑

鎮痙排毒散

增訂和蘭藥鏡卷十二



新訂增補和蘭藥鏡卷十二

榛齋先生譯述

男

宇田川 榕

榕菴校補

幾那 七

神經熱。流行病性各異篇第八

神經熱ハ沿門闔戸一般感凍スル疫熱ナレト流行
スル毎ニ病性一樣ナラズ或、炊衝熱。胃腸熱。腐敗熱。
惡性發斑熱。等合併ノ症多キ故ニ歷世先哲ノ諸說
亦異同アリ。今其經驗說ニ據テ古今流行疫ノ首症
ヲ歷舉シ。當年ノ病性ニ隨ヒ寒熱補瀉各異ノ療法

ヲ施ノ的効アル説ヲ左ニ略引ス

○和蘭紀元千五百六十六年本朝永祿九年饑饉徭役連年

休ズ衆人困厄勞碌饑飽節ナクノ一種ノ疫即神流

行シ皆腐敗性ノ發斑熱ニ血液溶崩ノ漏汗ヲ兼

初發惡寒戰慄シ次テ壯熱ヤ焚ガ如ク或腹痛ヲ發シ

精力速是惡性脱シ熱ノ候多頭腦ノ諸症ヲ發シ殊頭痛

劇ク精神昏憤譫語或黙々嗜眠或狂躁ノ終昏睡シ

顔面黧澹陷削舌燥黑連綿不寐聲音振搖或下利腐

敗性ノ咽喉腫ヲ發シ或種々發斑大小形色一樣ナ

ラズ全身ニ彌蔓スレ凡諸症寛解セズ或肢節毒瘡

ヲ發ス或膽液質ノ下利ヲ發ノ病毒分利シ或耳腺

腫起ノ聾シ終ニ膿潰シ治ル者アリ○千六百八十

八年本朝元祿元年亦同様ノ疫熱流行シ其首症大抵前説

ノ如ク初起ヨリ精力甚疲勞シ烈キ頭痛頭眩冒

次テ精神錯狂譫語昏睡或發斑ス草醫動輒ヤモスレハ發汗

劑及熱性揮發衝動劑ヲ投ノ大害ヲ致シ死ル者多

治法右兩回ノ熱病大抵清涼酸收劑醋接骨木傑列

乙名等ヲ用或消石精若ハ硫黃精ヲ水ニ滴シ酸美

ト爲用或螻蛄石ニ消石龍腦ヲ研和シ用テ皆良驗

ヲ得リ多血焮衝症ハ初發刺絡ノ大効ヲ得者アリ

○千六百年本朝慶長五年以來。崩汗疫屢流行ス。病性極テ

惡厲ニシテ初起ヨリ汗大漏泄シ劇症ハ兩三日ニシテ

斃ル治法專壯神強壯ノ峻劑ヲ饒多ニ用テ其暴脱

ヲ防護シ救活セリ。然レ此症死スル者甚ダ居多オホシ

○千七百四十年以後十年間本朝元文五年ヨリ寛延三年ニ至ル一種

天行疫流行ス。大抵前説症ノ如ク千五百六十年。千六百八十八年

患者精力大ニ虚脱シ殊ニ手臂振搖ス。初起惡心ヲ發

シ精神甚シ沈重ノ時昏憤シ。譫語狂躁或筋惕抽掣多

發斑ス。脉數ニシテ搏度齊ハズ。然レ此症細弱ナラズ。皮膚

口舌燥キ病勢增長スレバ熱劇盛ニシテ溶崩ノ下利

ヲ發シ終ニ脉細弱沈微ニシテ多クハ第七日ヨリ第十四

日中ニ斃ル治法先病室ヲ清掃メ鬱蒸セル傳染不

潔ノ惡氣ヲ除キ初發吐劑ヲ與テ鬱蓄セル腐敗毒ヲ

滌刷メ皆大功アリ。是ニ由テ病勢過半潰散セリ。或

再吐ヲ要スル症アリ肺嗽衝ヲ兼者ハ刺絡メ効ア

リ頭痛烈ク譫語甚キ症ハ蟬針法ヲ顛顛ニ施メ瀉

血ス。但シ脉力沈垂虚弱ナル者ハ瀉血法大害アリ内

服劑ハ蜚蝨石。消石ニ龍腦少許ヲ加散劑トシ用シ脉

及精力虚憊沈垂スルニ隨ヒ的テ里亞加及鹿角鹽精

ヲ保護強壯シ昆コン答タ刺ラ越エ爾ハ發ハ攝セ爾ル扁ベ答ト幾那。葡萄酒。

等ヲ用_レ發泡膏ヲ貼_メ皆良驗アリ或右ノ如キ熱性
 衝動劑。葡萄酒等ヲ誤用シ或刺絡ノ謔妄ヲ發シ若
 ハ增劇セル者アリ○又一種疫熱流行ス。大抵前症
 ト同_クノ患者大ニ虛憊シ神思昏憤頭痛ナキ者アレ
 正昏憤ナキ者ナ
 シ多_クハ初發ヨリ精神錯亂謔妄狂躁シ呼吸不利促
 迫煩悶。壯熱燠ガ如ク。古燥キ頸及腋下疫腫ヲ生ス。
 其毒烈キ症ハ病勢速ニ增劇シ或第三日ニメ死ス
 ル者アリ治法此流行疫諸藥効ナク唯吐劑ニテ救
 活セリ。即韃爾答越默室三氏ニ多ク水ヲ如_クテ溶シ
 一二匙宛與_テ吐スルニ至ル。是ヲ此病ノ奇藥ノ如

シ用_テ死スル者鮮シ。スナチ是ニ由_テ皆吐劑或_ハ症ニ隨_ヒ
 下劑ヲ與_テ胃腸ヲ淨掃シ次ニ酸收劑及_ハ民埵列利
 精ヲ用_レ又龍腦ヲ與_テ尤効アリ但刺絡セズメ發泡
 膏ヲ貼ス終ニ幾那攝爾扁答等ヲ與_テ全功ヲ收ム
 ○千七百七十年。同七十一年。本朝明和七
 年同八年惡厲ノ發
 斑熱流行ス。其首症發斑謔語昏睡シ血液溶崩ノ脫
 泄漏汗大小
 便失禁等ヲ兼又治法初發吐劑及緩下劑ヲ用_テ
 病毒ヲ清掃シ。次ニ酸收劑植酸礦
 酸前出ヲ用_テ其熱ヲ治
 シ。其危險ニメ精力虛脫ノ症ハ幾那劑ヲ與_テ効ヲ
 得_タリ。但刺絡ハ皆害アリ按此病膏敗
 熱ニ屬ス

○千七百八十二年 本朝天 流行熱。疫毒暴烈ニメ舉
 國速ニ傳染ス。初起傷冷毒ノ諸症ヲ兼_子。其毒深ク内
 藏ニ侵入シ患者速ニ虛脱シ。熱勢劇盛ニメ或、焮衝
 熱ヲ兼_子。或、效嗽呼吸不利甚_クノ肺焮衝ヲ兼_子。或、神經
 感觸ノ諸症甚_ク。或、胃腸熱ヲ兼併セリ。治法 揮發壯
 神劑ヲ標準トシ防焮衝劑 清涼 ヲ兼用シ。焮衝甚_キ
 者ハ瀉血法ヲ施シ或、下劑ヲ兼用メ皆良驗ヲ得_リ
 ○千八百年ヨリ同四年 本朝寛政十二年ヨリ 文化元年ニ至ルマデ赤
 斑熱流行ス甚_ク 惡性ニメ一般傳染シ皆頭腦及神
 經ニ侵襲スル_ト 甚_クノ劇症ヲ發ス。治法 大抵揮發衝

動強壯ノ峻劑ヲ施メ多ク救活セリ。
 ○千八百三年 本朝享和三年 一種ノ疫熱流行ス其症初發
 惡寒發熱。頭痛烈_ク。視聽ノ感觸已甚_ク。些_モ 晴明物
 響ニ堪_ス。小便稠濁。下利ヲ兼_子。肢節顫振筋惕攣動。謔
 妄或、嘔吐呃逆ヲ發シ。遂ニ血液溶崩メ自汗淋漓或、大
 便血ヲ交テ黑色。或、衄血ヲ發シ舌燥黑ニメ中央微
 赤。兩邊殊ニ燥硬。又精神昏憤。全_ク 觸知ヲ失ヒ。脉細數。
 煩躁。痙攣運動。風氣腹滿或、壞疽ヲ生シ或、小便卒ニ
 清澄ニメ水ノ如ク 是ヲ死兆トス 大抵第五日ヨリ第十一
 日中ニ死ス右ノ諸症ヲ考究スルニ一ハ病毒頭腦

及神經ヲ侵襲ノ發ス。即神經熱ナリ。一ハ病毒。尿管
 質ヲ侵襲ノ發ス。即腐敗熱ナリ。治法其多ク神經熱
 ニ係ル症ハ頸項ニ角法ヲ施シ。芥子泥ヲ躑ニ貼シ。
 礦酸綠礬精。硫磺精等。的里亞加精ヲ與レバ大抵其增長ヲ
 遏止ス。病勢增長スルハ龍腦。麝香ヲ用。且龍腦醋
 水。冷湯法ヲ以テ全身ヲ打湯ノ効アリ。但釅醋。發
 泡膏。阿芙蓉ハ此病ニ應セズ。皆害アリ。病勢漸衰ヘ
 唯神經感動ノ症甚キ者ハ幾那煎ヲ用テ自ラ治ス
 其腐敗熱ニ係ル症多者ハ初發吐劑大効アリ。次ニ
 幾那ニ阿芙蓉。攝爾扁答。白芷。大黃。葡萄酒等ヲ加用

テ効アリ。刺絡ハ總テ害アリ。唯病室ヲ清潔ニ爽涼
 氣ノ開通スルヲ緊要トス。○右神經熱ニ係ル諸症
 多者ノ屍ヲ剖觀スルニ腦中黑血聚滿シ。腐敗熱ノ
 症多者ハ胸腹諸藏殊胃腸ニ黑血多ク瀦留セリ
 ○千八百六年。同七年本朝文化三年同四年惡厲ノ神經熱流
 行ス。其症初發ヨリ精力極テ罷勞シ。肢體顫振。精神
 昏憤。譫語。昏睡。筋惕及痙攣ノ運動ヲ發シ。脉細數。熱
 勢過盛ナラズ動輒ハ温煖平日ノ如シ。又初發ヨリ
 下利メ休是血液溶崩。下利ニ此流行熱ノ病性トス其他漸次ニ血液
 溶崩ノ危症。壞疽等ヲ發シ。大抵第八日ヨリ第十四

日ニ死ス。但シ發斑アル者少ク。焮衝ノ候ナク唯精力
 虚憊ノ腐敗溶崩ニ傾、腐敗性此病性トス。神經熱治法初
 發審察戒慎メ揮發衝動劑ノ緩性ナル者ヲ用、即民
 埜列利精。顯草根、ウスキフリタニ稀泡劑及阿芙蓉液少許宛與ヘ浴
 湯ヲ施メ多、回復セリ其既ニ增長セル者ハ最峻ノ
 揮發衝動劑ヲ用、綠礬精酸收劑等ヲ云ハ下利ヲ増、故ニ用
 不_レ但シ阿芙蓉ハ卓偉ノ効アリ能、精力虚垂ヲ發揚シ
 危劇ノ諸症ヲ挽回スル、甚多シ然_レ、凡劇キ下利、昏
 睡、脉疾數ナル症ハ阿芙蓉、葡萄酒等自餘、揮發衝動
 劑ノ過用ヲ戒メ甚_ク、緩劑トシ用、頭ノ諸症多ク及_レ、少

壯多血ノ者ト雖モ刺絡ヲ施メ害アリ。但シ肺焮衝ヲ
 兼ル症ハ刺絡ノ速効ヲ得者アリ、或葡萄酒一二盞
 ヲ與_レ、レバ譫語、下利、昏睡、筋惕等ノ症忽_チ寛解シ。脉ノ
 細數減シ。精神錯亂靜止メ爽快ヲ得ル者アリ

○近年ノ流行疫千八百十二年、同十三年ノ神經
熱ヲ云本朝文化九年、同十年亦

大抵前症ノ如シ其症、初起惡寒戰慄シ次テ發熱替
 留、大ニ罷勞シ食進ス又總テ三件ノ症ヲ發ス其一
 ハ精神昏憤、頭眩暈ナリ其二ハ肢體顫振メ定持
 シ難シ其三ハ脚痿弱ノ步履シ難シ是ニ次テ諸症
 増劇シ殊ニ頭痛劇ク、頭中困重壓迫、嗜眠睡中煩擾

謔語等ノ頭腦ノ諸症甚シ_レ脈數若ハ緩ニ_レ搏度齊
 ハズ或_レ虛軟細小或_レ頗盈張ス_レ凡強實ナラズ皮膚
 乾燥熱勢時ニ増發ノ熯ガ如ク或_レ溫暖平日ノ如シ
 或_レ面部盈赤眼光異常時鮮朗或_レ曇黯眼陷凹視神乏
 弱病增長ス_レバ小便赭赤_レ熯熱シ或_レ赭麥酒ノ如ク
 ニ_レ稠塗ヲ生ス_レ但小便卒ニ澄清ニ_レ水ノ如ク上
 面浮翳ヲ現スハ死候トス危篤ニ至_レバ呃逆昏睡謔
 妄大小便失禁胃管麻痺ノ嚙下ヲ妨ゲ舌痲ノ言_レ
 能_ス右數症ハ殊ニ此病性ヲ見ハス者ナリ患者大抵第四日ヨリ第十
 八日中ニ昏睡ノ死ス○或_レ胃腸熱肺_レ熯衝ノ諸症ヲ

兼子或_レ惡性發斑熱ヲ兼ル者甚多シ或_レ衄血ヲ發メ
 諸症寛解スル者アリ○此熱病ハ溶崩下利筋惕搐
 掣様ノ症稀ナリ是ヲ以テ前說ノ流行熱ト分別ス
 前ノ千八百六年同七年治法神經熱ハ即流行傳染疫ニ_レ或_レ胃
 腸熱腐敗熱ヲ兼ル故ニ吐下劑若ハ防腐劑ヲ兼用
 シ_レ熯衝ヲ兼_レバ各部瀉血法ヲ施スノニ_レテ刺絡
 ヲ禁シ大抵揮發衝動劑保固強壯劑ヲ主トシ用ル
 ヲ常法トス即前說ノ流行熱ハ葡萄酒及揮發衝動
 劑ヲ與_レバ頭腦ノ患症速ニ減シ脈亦緩ヲ帶ヒ寒
 涼攻瀉ノ劑ヲ投ス_レバ諸症忽_レ増進スルガ如シ然

近年ノ流行疫ハ熱性衝動壯神ノ諸劑。葡萄酒等
 ヲ與レバ諸症忽増劇ス。清涼方法。疏滌瀉下劑ヲ與
 レバ劇症減シ殊ニ頭腦ノ諸患輕快ヲ致シ刺絡亦
 効ヲ得タリ。或初發吐劑ヲ與テ大効ヲ得ル者アリ
 然所以ヲ考究スルニ當時流行ノ疫毒各異ナルニ
 由テ或神經質ヲ侵襲スルヲ少クシテ大ニ脈管質ヲ
 損害シ或專神經質ヲ侵掠ノ脈管質ヲ毀傷スルヲ
 少キ等ニテ各自病性ヲ異ニス。又衆人一般體力旺
 盛強健ノ時アリ。或虛缺脫力ノ罷弱ノ時アリ。人類
 ナラズ獸類モ亦然リ。其旺盛ノ時ハ炊衝性ノ病多ク。虛罷ノ

時ハ神經熱多シ。諸病皆然リ。又地方ノ高卑時令ノ
 燥濕ニ由テ病性ヲ異ニス。即卑濕ニハ神經熱腐敗
 熱多ク。高燥ニハ炊衝病多シ。或神經感動甚キ人或
 凶厄失意等大ニ神思ヲ勞傷スル者疫毒ニ感スレ
 バ神經熱トナリ。少壯多血ノ人ニ感スレバ炊衝ヲ
 發シ諸症亦劇盛ナリ。是ヲ以テ疫熱ハ一定ノ治法
 ナシ。唯其毒神經ニ感襲スルヲ居多キ故ニ神經熱
 ト稱スルノニ。然レバ每常新發ノ流行病トシ始テ其
 病性ニ蹤跡ノ方法ヲ考定シ寒熱補瀉其症ニ應メ
 變易シ必常套ニ拘ラズ。同病ト雖モ一軌轍ニ據ラズ

ノ的効ヲ得ル。多年歷驗明試スル所ナリ。○或、病
 毒種々兼併ノ多少ニ由テ病性症狀ヲ異ニシ又其
 感深ノ淺深ニ由テ病勢輕重アリ輕症ハ醫藥ヲ假
 ラズメ自、愈ユ或、傳染鮮少ノ者ハ熱病ヲ發スルニ
 至、ズ唯身體虛憊ノ遷延神經病トナル者アリ。○或、
 神經熱ニ惡性、發斑熱ヲ兼、諸症極、テ劇盛ナレ其
 毒頭腦ニ襲入セズ死ニ至、マデ精神些モ錯誤ナキ
 者アリ。○凡、病院ハ狹隘鬱閉ノ室ニ衆人雜沓羣居
 シ日夜腐敗ノ蒸氣ヲ氣息及、皮膚ニ吸收スル故ニ
 熱病皆惡厲ノ腐敗熱トナリ血液溶崩ノ脫泄、腐敗

交血ノ下利。其他失血壞疽等ヲ生メ臭穢ニ堪、ズ多、
 死ス。然、病室ヲ淨潔シ羣居ヲ禁、シ常ニ新鮮氣ヲ
 開通スレバ熱病皆善性ニ、炊衝樣ノ神經熱トナ
 ル者多シ。○右所說ノ如ク近年流行ノ神經熱ハ總
 テ熱性、揮發衝動劑ヲ與、レバ病勢增劇ノ多、害アリ
 殊ニ險重ノ症。初發ニ是ヲ用、レバ頭ノ諸症ヲ增進
 シ血ヲノ頭腦ニ聚滿セシメ熱ヲ増發ス或、些少ノ
 龍腦、阿芙蓉、纈草等ヲ用、或、葡萄酒ニ多、水ヲ加、與、レ
 凡、病勢轉、劇ク頭ノ諸症殊ニ甚、シ凡、血ノ運行ヲ減損
 シ。防、
 劑、
 皮表ノ壅塞ヲ宣通スル劑
 清涼ノ蒸發劑
 ヲ用、レバ

增訂和蘭藥鏡 卷十二

風雲堂藏

熱減シ血ノ頭腦ニ攻衝スル症漸靜止シ腠理通暢
 シ蒸氣開達スルハ殊日大便通ノ大抵全功ヲ奏セ
此病ニ緊要トスリ其藥劑ハ礪石安質没扭酒民埜列利精及醋答末
 林度ノ如シ又初發鹽酸劑殊ニ良効ヲ得タリ即チ海
 鹽精ニ多ク水ヲ加稀クシ用ルガ如シ消石ハ血液運
 行ヲ減損スル甚キ故ニ用ヘス○頭腦肺肝脾等各
 部焮衝ノ症アレ凡瀉血法ヲ施シ難ク揮發衝動劑
 モ亦害アル症ハ是ニ代テ加羅蔑兒カヲ多量ニ用テ
 患部ノ凝血ヲ疏解メ大効ヲ得タリ○此熱病大抵
 初起ヨリ六七日ヲ經テ熱勢減セズ頭腦ノ諸患逾

増進シ精力虛憊轉加ル症ハ右ノ方法ヲ用ル際更
 ニ細察戒慎ノ壯神劑ヲ用ベシ即チ龍腦ニ消石若ハ
 礪石ヲ研和ノ散劑トシ一瓜若ハ半瓜ヲ一服トシ
 一時若ハ一時半毎ニ纈草泡劑ニテ送下ス此龍腦
 劑ニ由テ譫語狂妄ノ症靜止シ肌膚和柔ノ能蒸氣
 ヲ宣發ス○右ノ壯神劑ヲ與テ寸効ナク脉虛細精
 力甚缺脱シ昏睡譫妄顫振増加シ或痙攣ノ運動ヲ
 發スル者ハ阿芙蓉劑速効アリ大抵十二時中ニ惡
 症消散ス既刺絡若ハ攻瀉ノ劑ヲ施メ諸管纖維弛
 緩セル者並多ク清涼劑ヲ施ス者ハ殊効アリ但過

用スレバ害アリ。假令ハ舍電阿芙蓉液ヲ取り大抵
 一時半毎ニ二滴若ハ三滴宛與ヘ一兩日用テ適應
 ス。長服スレバ却テ害アリ○亞兒尼加根攝爾扁答
 ハ每常此熱病ニ大功ヲ奏ス。亞兒尼加ハ殊疫熱ニ
 特效ノ藥トス○元運力大ニ虛憊シ。病毒神經ヲ侵
 襲スルヲ甚ク。皮膚乾燥休ス。動輒バ肢體各部冷ル
 一アル症ハ麝香ヲ一兩次用ベシ。能皮膝ヲ宜開シ
 脛理間通ノ津潤アル神經質ヲ和調シ此症ニ確當ノ
 無比ノ殊効ヲ奏ス○下利アレバ劇シカラズ。病勢
 是レカ爲ニ增長セザル者ハ是ヲ閉止スルヲ勿レ。若

阿芙蓉劑ヲ與テ還ニ遏止スレハ腹部諸藏ニ焮衝
 様ノ諸症ヲ發シ或瘀血頭腦ニ攻升シ或呃逆風氣
 腹脹及熱勢増發等危篤ノ症ヲ萌生ス○或胃腸熱
 ヲ兼テ自下利ヲ發シ其毒排泄スルハ佳兆トス。其
 下利少キ者ハ下劑ヲ與テ是ヲ助クベシ○下利水
 瀉若ハ失禁ノ脉細弱精力沈垂虛憊スル者ハ速ニ
 其下利ヲ閉止スベシ此症ハ漿粉前ニ出ツニ阿芙蓉液
 十滴若ハ十五滴ヲ加吉利詞爹兒トシ施メ捷効ア
 リ○十年以前流行ノ神經熱ハ刺絡及防焮衝劑大
 害アリテ揮發衝動強壯劑皆偉効アリ。是ニ及メ近

年流行ノ神經熱ハ刺絡防焮衝劑共ニ多ク良功アリ
 凡、少壯多血ノ人。劇キ頭痛或精神昏憤。譫妄。顔面眼
 中焮赤。頸動脈。頭部動脈ノ搏動甚ク或胸腹諸藏焮
 衝ノ候アル者ハ初發一兩日若ハ第七日中ニ刺絡
 ノ捷効ヲ得タリ。殊ニ飽煖優給ニ多血壯實ノ患
 者ハ是ニ由テ死ヲ救フ多シ。大抵初次刺絡ノ劇キ
 煩躁。精神昏憤。煩ニ寛解シ再發セス或微譫語スル
 ノ之若再煩悶スレバ再刺絡シ或既ニ第十二日ニ
 至ル者及農夫脚力ノ如キハ第十四日ニ是ヲ施シ。
 譫語連縣既ニ八日ヲ經ル者モ治スルアリ○然

凡刺絡ハ每常必効ヲ得ルニ非ズ或患者虛憊シ若
 ハ神經感動甚キ症ハ多ク瀉血ノ死スル者アリ凡
 當年流行ノ疫毒及各國住地ノ病性ニ因テ其應否
 亦一様ナラズ故ニ其疑似不決ノ症ハ刺絡ヲ輟テ
 各部瀉血法ヲ施メ切實トス○肺及胸脇ノ焮衝ハ
 既ニ數日ヲ經ル者モ饒多ニ刺絡ノ良功アリ腦焮
 衝様ノ症ハ刺絡ノ害多シ動輒ハ譫妄等增長シ或
 麻痺及血液溶崩ヲ萌生ス故ニ若血ノ頭腦ニ攻升
 セル症アル片ハ顛顛耳後頸項ニ蟻針法若ハ角法
 ヲ施スベシ始終多ク施スト雖モ損害ナシ又芥子

泥ヲ腓。蹶ニ貼スレバ能、頭腦ノ病毒ヲ引降シ其諸
症ヲ寛解ス。○發泡膏モ亦頸項等ニ貼シ化膿ノ良驗
甚多シ

清凉氣

凡、疫熱ハ新鮮清凉氣ヲ患者ノ室ニ迎引
シ。又其卧榻衣衾ヲ淨潔ニスル。最好緊要事ニシ
疫毒ヲ驅散スルニ極テ大効アル一療法トス。殊ニ
近年流行ノ症ハ患者ノ保護温煖ナレバ病勢逾増
長シ保護清凉ナレバ病毒逾消解シ。每常ソ子ニ内服劑ヲ
用ズメ治スル者甚多シ。總テ爽凉新鮮氣ヲ通暢ノ
病室ノ腐敗氣ヲ攘掃スル片ハ其効功藥劑ノ比ス

ベキニ非ル。古今名哲歷試ノ確證セル所ナリ。○
寒冷氣ハ其効防焮衝ニ非ズ。挑起撥揚ヲ爲ニ非ズ
ノ能、疫毒ヲ消尅ス。凡、疫熱ハ凝流體ノ熱蒸沸騰ノ
病トス寒冷氣ハ能、其熱蒸ヲ抑遏ノ内熱ヲ消シ疫
毒沸騰ノ銳勢ヲ摧制シ。一ハ皮膚ノ熱蒸ヲ涼解ス
ルヲ以テ腠理ト肺ニ壅鬱セル病毒ヲ排泄セシム。
殊ニ冷湯法良功アリ。又一ハ日夜患者ノ氣息ヨリ
吐出セル腐敗ノ疫氣病室ニ熏蒸スル。死モ密雲
稠霧ノ如ク患者ヲ圍繞シ。日新轉増ノ神經ヲ侵掠
シ血液ヲ沸騰スル。猶礮炭ノ毒烟中ニ在ルカ如シ

此毒烟ニ中レバ卒^レ仆^レ暈^ル故ニ新鮮氣ヲ迎引シ毒蒸
 倒シ次テ痲不遂ニ罹^ル故ニ新鮮氣ヲ迎引シ毒蒸
 氣ヲ排遣ノ大効アル^レ宛モ毒烟ニ觸テ暈倒スル
 者爽涼氣ヲ得テ忽^チ蘇活スルガ如シ然^レバ先^チ其鬱敗
 氣ヲ除クニ非^レバ峻効アル内服藥モ應驗ヲ得^レ
 能ハズ○腐敗性ノ惡痘ハ清涼氣ヲ病室ニ迎引^ノ
 其鬱敗ノ毒氣ヲ排遣スレバ瞬間ニ其惡症ヲ挽回
 スル一療法トシ是ニ由テ大効ヲ得^ル者甚^ク多シ

冷湯法 冷湯法ハ此神經熱ニ大効ヲ得^{タリ}但^シ是
 ニ三法アリ○其一ハ各部湯法ナリ是ハ冷水若^クハ
 雪氷ヲ取テ患部ニ打湯ス^ル喻^ハ患症頭ニ在^ルカ如^キハ

是ヲ頭部ニ施シ腹部諸藏ノ激衝及^チ痞氣腹脹等ハ
 是ヲ腹部ニ施スガ如シ腐敗溶崩ノ下利ヲ兼症モ
 亦捷効アリ冷水ハ布片ニ浸シ雪氷ハ布片ニ包ミ患部ニ打湯ス○其二ハ冷
 水若^クハ醋ニ水ヲ加^テ稀クシ全身皮上ヲ洗湯スルナ
 リ凡^ソ熱病皮膚乾燥ノ症並ニ粘汗若^クハ稀汗アル症
 ニ是ヲ施セバ皮膚ヲ衝動ノ蒸氣ヲ挑發シ腠理ノ
 病毒分利ヲ進起シ皮膚ノ病毒ヲ分利スルハ熱病ヲ治スルニ一大緊要トス以
 テ壯熱ヲ解散シ病勢ヲ減除ス但^シ病毒分利ノ微汗
 及^チ蒸氣融發スル症ハ冷湯法ヲ禁ス○其三ハ冷水
 ヲ患者ノ身體ニ滴注スルナリ是尤^モ奇効アル一法

トス。凡熱病ノ初發。患者少壯強實。皮膚燥熱スル者ニ施ノ効驗。馭捷ナリ。然_レ在寒冷最_モ劇キ故ニ過用スレバ害アリ。壯實ノ人ト雖モ甚_タ多血ニ表部ノ血脉大ニ盈脹セル者ニ是ヲ施セバ其血遽ニ内藏ニ交流内攻シ。殊ニ腦中ノ血脉腫脹ノ管外ニ泛溢シ。患者昏睡卒倒ス。或老人小兒虛人。神經感動シ易キ人。肢體甚_シ虛羸ノ者。各部殊ニ罷弱セル者。肌膚津潤アル者ニ是ヲ施セバ暴烈ナル寒氣ノ刺戟ニ由テ虛憊ノ精力ヲ劫奪シ。卒ニ温煖氣ヲ撲滅ノ腦髓麻痺シ昏睡卒倒ノ死ス。○千七百二十九年本朝元祿十四年

惡厲疫熱流行スル_レ九個月。皆清涼氣並冷湯法ヲ施シ或氷ヲ以テ總身ニ摩湯スルノミニテ内服藥ヲ用_ヒズ危劇瀕死ノ症ヲ救_フ甚_ダ多シ此流行病ハ多ク激衝性ニ屬スレバナリ。○前說ノ千八百七年ノ神經熱ハ温浴湯及温湯法温湯ニテ蒸湯スルヲ云總テ良効アリ殊ニ汗アル症及患者虛憊ノ病毒ヲ抗拒スベキ精力ナキ者ニ驗多シ此症總テ冷湯法害アリ然_レ在病ノ初發及皮膚燥熱スル症ハ温湯法害アリ但温湯法ヲ施ス時。頭ニ冷湯法ヲ施ノ甚_ダ良

神經熱治例篇第九

神經熱ノ治例二則ヲ舉グ。一ハ患症甚ダ變化シ易ク。一ハ極テ頑固險重ナリ

○一男子二十歳資稟虚弱。十月初旬熱病ニ罹リ。食進マズ且嚥下ヲ妨グ。患者從來屢咽喉腫ヲ患フ。但今回ハ過酒ノ風寒ニ感シ其症殊險重ナリ。一醫吐劑ヲ與夥ク粘液及膽液ヲ吐ス。然レ諸症增長シ億勞更甚シ。吐後兩三日ヲ經テ是ヲ診ニ罷勞及咽喉腫日増劇シ。頭鈍痛少間モ休ス。亞滿埤兒腺^{咽ノ兩}腫脹シ口中斷舌遍ク粘液被ヒ。目眩ノ淚ヲ流ス。但

大便時々通利シ少腹心下脹滿セズ小便淡稀ニノ近ナシ。脉大小堅軟時變ノ定ズ然レ頗盈充シ大抵數ニノ九十動ヨリ九十五動許。時々譫語ス夜中煩燥甚メ多少譫語少間モ休ス乃神經失常ノ運動ヲ防制シ劇症ヲ除キ蒸氣ヲ發センカ爲ニ纈草濃泡劑ニ忽弗滿鎮痛液ト硃砂少許ヲ加テ與。芫菁膏ヲ項窩ニ貼シ又硃砂ヲ屋施蔑兒ニ研和シ含漱藥トス。是ニ由テ脉稍調和シ蒸氣漸發泄シ譫妄減ス。然レ咽喉ノ症逾增長シ甚メ嚥下ヲ苦シ大ニ艱苦スルニ非バ言フ能ス。口中ヲ診ニ遍ク鶯口瘡ヲ生シ涎

唾流溢ス。因テ頻ニ芫菁膏ヲ項窩ニ貼メノ化膿セシメ。内服劑ノ硃砂ヲ去テ用。又幾那泡劑ニ氏垓列利精ヲ加テ兼用シ。蓬砂ヲ玫瑰蜜ニ研和シ口中ノ塗藥トス。是ヲ用テ二日。諸症大ニ寛解シ不日ニ全愈スベキカ如シ然ニ其夜大ニ煩悶シ毫モ眠テ能ハズ。肌膚搔痒ニ堪エス且數日以前ヨリ陰囊小胞ヲ發メ焮熱シ皮膚剥脫セル者。今其焮痛ニ堪エズ其煩悶皮膚搔痒ハ發斑ノ前兆タルベキヲ察ス。翌日果メ白色ノ粟疹ヲ發シ殊ニ胸及四肢ニ多シ然レ諸症尚輕快ヲ得ズ。唯煩悶及咽喉ノ症微減スルノミ。又知覺

感觸甚遲鈍トナリ。脉更ニ數ニノ堅乃前方ノ服量ヲ倍シ攝爾扁答ヲ加用ヒ。又芫菁膏ヲ貼シ。陰囊ハ越没里膏名ニ菲阿斯失亞密越幾斯劑痛止ヲ加貼ス。○翌日粟疹起脹シ邊圍赤色ヲ帶患者爽快ヲ覺ユ。唯脉小ニノ堅搏度齊ハズ。謔妄除カズ小便中雲翳生シ。少間ニノ消散ス乃前方連進二日。粟疹自消シ。患者復煩躁ノ展轉シ。眼光慌暴。夜中謔語甚ク。脉逾堅ニノ次序ナシ。因テ速ニ芥子泥ヲ腓ニ貼シ。數温湯ヲ與。又内服藥ノ量ヲ倍シ用テ十二時ニノ皮上白斑ヲ生シ長二三寸濶五分ヨリ一寸許。漸起脹メ水

增訂和蘭藥鏡 卷十二 十八

充^テ肌膚微冷。黯澹色。額冷汗沾^ヒ。脉細數。呼吸短促。患者恍惚トノ醒覺セズ。是ニ於テ壯神揮發ノ峻劑。闕ベカラザル症トシ幾那。濃煎劑ニ攝爾扁答泡劑ヲ合シ龍腦及民垚列利精ヲ加^テ頻ニ與。又纈草煎汁ヲ吉利詞參兒トシ。芫菁膏ヲ貼^メノ化膿セシメ。又屢芥子泥ヲ貼ス。其白斑暫留二日ニシテ夜中盡消散ス。翌朝患者軒睡シ。脉浮虛散漫シ。少間^ニ大發汗シ。小便數通シ。雲翳ヲ現シ。少頃ニノ器底ニ沈ム。患者醒寤スレ^レ尚煩悶休^ズ。夜中稍安靜。時譫語ス。○翌日諸症輕快。呼吸寬利。蒸氣發泄。脉次序アリ精神快爽。

ナリ。然^レ疔效嗽止^ス。夜中殊劇ク。大ニ困苦ノ僅痰ヲ吐ス。但^シ效^メ疼^{ナク}。胸肺焮衝ノ候ナク。耳聾ス。乃^チ幾那。沙列布。金硫黃。及民垚列利精ヲ内服セシメ。胸ニ芫菁膏ヲ貼ス。是ニ由テ諸症漸回復シ。十月末ニ至テ患者病牀ヲ出ツ。然^レ疔效嗽仍止^{ガレ}。數週。因テ依蘭苔。遠志。蜀羊泉。硫黃。乳汁ヲ用ヒ。發泡膏ヲ貼^メ連日化膿セシメ竟ニ全愈セリ。

○一婦人三十歲。體稟多血ニシテ膽液過多。十一月八日。月經多來リ。偶寒邪ニ感シ月經一日ニ止。同十日肢節倦重。頭痛。眩暈。食進^ス。大便通セズ。脉數ニシテ次

增訂和蘭藥鏡 卷十二 風雲堂藏

序ナク稍盈脹シ肌膚乾燥ス一醫左ノ散劑ヲ與フ

蓬硫酒石散

純精酒石名 四錢 蓬砂 一錢

金硫黃 六分 甘草 三錢

右調勻ノ散劑トシ一時毎ニ一茶匙ヲ取り加密列ノ泡湯ヲ以テ送下ス又温湯ニ食鹽ヲ和シ脚ヲ浴ス翌日稍月經來ル方劑同前○十三日始テ神經熱ノ病性ヲ見シ脉緊細ニノ攣縮搏度齊ハズ精力大ニ虛憊シ舌白苔大便稀溏小便淡稀月經復止時々振掉ス乃後方ヲ處ス中於陳大...

蓬黃纈草飲

纈草根 末 三錢

右沸湯六弓ニ浸ス丁四分時滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

蓬砂 一錢 韃爾答越默室 一分

大黃丁幾劑名 舍利別 各四錢

右調和シ半時毎ニ一匙ヲ與フ○翌日大便溏セス脉甚ダ小ナラズ渴アリ喜テ吐セント欲ス○十五日後方ノ吐劑ヲ與フ

雙聖湧吐飲

乙百葛格安那 末 十五分

增訂口簡藥鏡 卷十二 韃爾答越默室 二氏

韃爾答越默室 二氏

右水三勺ニ溶和シ。海葱蜜四錢ヲ攪和シ。八分時毎
ニ一匙宛服ス。註尋常ノ水ハ清潔ナラズ。故ニ韃爾
答越默室ノ他ノ礦性ノ中和鹽類ヲ溶
和スルニハ必ズ蒸餾水ヲ用ベシ。尋常井水ハ諸種
ノ鹽氣ヲ含ミ或炭酸加爾幾苦土收斂基硫氣滲氣
等ヲ含ム故ニ右ノ諸藥殊ニ升
汞ノ性カヲ尅制スレバナリ是ニ由テ粘液及膽
液ヲ吐スルヲ三次爾後脉小ニメ數搏度齊ハズ頭
目鬱重小便淡稀大便水瀉ス。乃後方ヲ與フ

壯運額草飲

額草根 末 三錢 白芷 末 二錢

右水六勺ニ煮テ渣ヲ去リ後藥ヲ加フ

民垚列利精 一勺 番木鱉越幾斯劑 六

亞刺比亞蕪謨漿 四錢 舍利別 一勺

右調和シ半時毎ニ一匙宛與フ。○十七日。下利止。舌
兩邊黯色苔アリ中央苔ナク潤アリ。肌膚和柔。脉緊
細ニノ攣縮搏度齊ハズ甚數ナラズ九十動許。腹軟。
頭目困重耳聰ナラズ。虛憊甚シ。午後兩額赤色。時譫
語。微直視シ或眼光慌暴乃前劑ヲ用。室中清爽氣ヲ
迎納メ鬱蒸氣ヲ散ス。夜中熱増發ス然レ舌及皮膚
稍潤フ。大便通セズ。○十八日。月經少ク來リ眼光慌
暴。小便水ノ如ク。舌潤アリ栗殼色苔ヲ帶。夜中脉次

增訂口簡藥鏡 卷十二 韃爾答越默室 二氏

序ナシ但昨ニ比スレバ盈實シ夜半後脉細數皮膚
及舌燥キ復謔語甚ク且腹痛ヲ發シ大便失禁ス因
テ芥子泥ヲ兩腓ニ貼シ左ノ吉利詞爹兒ヲ施ス

額草吉利詞爹兒

額草根

加密列 各二錢

菲阿斯失阿密草 一錢

右水煎シ施ス○翌日諸症同前但脉細數皮膚口舌
乾燥粟殼色稠苔アリ水瀉一行腹痛止ズ少腹軟ニ
ノ痞脹シ渴ナシ乃芥子泥ヲ兩臂ニ貼シ後方ヲ與

壯神額攝飲

額草根 一弓

攝爾扁答 一錢

右水六弓ヲ以テ煮テ滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

龍腦

十爪亞刺比亞護漿
少許ヲ研和シ溶ス者

民埕列利精 一弓

安質没扭酒

三十滴

舍利別 一弓

右調和シ半時毎ニ一匙宛與又時々屋施蔑兒一茶
匙宛與テ口舌乾燥ヲ潤シ前ノ額草吉利斯爹兒ヲ
施ス○二十日脉稍和ノ盈揚シ百動許舌潤ヒ膝理
宣通シ小便楮濁ニノ逆ナシ大便通セズ呼吸短促
不利シ時欬ノ痰ナシ頭甚困重夜中脉疾數ニノ次

序ナシ乃チ前方ニ忽弗滿鎮痛液ヲ加與ヘ。又上好ノ
列印設酒一匙宛半時毎ニ與。羯布羅精ヲ以數肢體
ヲ蒸湯シ。又亞兒尼加。纈草根ノ煎汁ヲ吉利詞爹兒
トシ施シ。芥子泥ヲ貼ス。○翌日患者眼ヲ閉。恍惚ト
ノ辨識ナク肢體懈休。頽然トノ倦卧シ時脚ヲ牀外
ニ擲チ。眼中矇矓。舌頭潤テ苔ナク脉昨ニ比スレバ
盈揚ス夜中大小便失禁。呼吸短促。謔語ス方劑同前。
又芥子泥ヲ兩臂ニ貼シ。列印設酒ノ量ヲ增。羯布羅
精及吉利詞爹兒ヲ施ス。前日ノ如シ午後諸症稍寬
解ス。又乙百葛格安那半瓦宛半時毎ニ服セシム夜

分脉復細小。虛憊益甚ク。大便水瀉ス。是服スル所ノ
金硫黃ニ因テ
然乃チ後方ヲ作リ與フ

幾攝壯神飲

幾那 末 一弓

攝爾扁答 末

白芷 末

亞兒尼加根 末 各二錢

右水六弓ニ煮。滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

忽弗滿鎮痛液 八十滴

安質沒扭酒 三十滴 舍利別 一弓

右調和シ半時毎ニ二匙宛與フ。又四分時毎ニ列印
設酒半盞宛用フ。○翌日諸症同前精神差輕快。面赤

耳聾シ大便失禁夜中嗜眠謔語ス乃後方ヲ與フ

幾芷壯神飲

幾那 未一弓

攝爾扁答 未

白芷 未各三錢

亞兒尼加 未一錢

右上好列印設酒六弓ヲ加浸シ渣ヲ去後藥ヲ加フ

民埵列利精 一弓

忽弗滿鎮痛液 六十滴

安質沒扭酒

四十滴 舍利別 一弓

右攪和シ半時毎ニ二匙宛與フ又後方ヲ用フ

龍腦爽神散

龍腦 一瓜 乙百葛格安那 半瓜

沙糖

右合和ノ散劑トシ分テ八服トシ一時毎ニ一服宛與フ○二十三日。二十四日。精神稍輕爽ニノ辨識アリ。脉甚小數ナラズ大抵八十動許。差盈揚シ軟ニノ次序アリ。仍耳聾。舌苔栗殼色ニノ潤ヒ。振搖セズ。肌膚柔潤。面部蒸氣ヲ發シ。欬嗽胸痛ナク。呼吸短促セズ。時々大息シ。小便稠濁。雲翳懸留シ。下利止ム。夜中時々謔語シ。或煩躁ス。眼中朧眊。眩暈シ。内服藥ヲ吐スル。一。一回。其貼セル芥子泥ノ疼ニ堪ス。是ヲ去ル。又呃逆ヲ發スル。一。二。三次。或嘔氣アリテ服藥ヲ

惡ム大便一行通ス方劑同前唯幾那ヲ加倍シ用フ
 ○翌朝譫語シ上臉外皆ニ牽引ス脉昨ニ比スレバ
 小數ニノ堅古頭苔ナク潤フ然レ疝挺出スルヲ能ハ
 ズ大小便失禁夜半以後煩躁甚クメ藥ヲ服セズ因
 テ前ノ諸方ヲ持重シ又後方ヲ兼用ス

芙蓉催睡飲

舍電阿芙蓉液

二十滴

水

半錢

右攪和シ一時毎ニ二十滴宛葡萄酒ニ點服ス又前
 ノ吉利詞參兒ニ幾那ヲ加施ス○患者午後ヨリ夜
 ニ至頻ニ嗜眠シ時々眼半開テ睡リ大息シ兩便失

禁ス方劑同前更ニ芫菁膏ヲ項窩ニ貼メ發泡腫痛ス
 ○二十六日精神輕爽能事理ヲ辨知シ耳聾治シ大
 便通セズ脉稍小軟ニメ次序アリ呼吸利シ時々大
 息シ舌兩側粟殼色潤アリ夜中譫語セズ○二十七
 日諸症同前夜中微譫語ス脉強弱齊ズ然レ疝急數十
 ラズ呼吸利ス或時ニ煩悶甚シ薦骨褥瘡生シ小便
 赭色稠濁雲翳及塗渣アリ○二十八日眼臉復上牽
 ス夜半前蒸氣發シ爾後睡眠ス其他諸症藥劑同前
 ○翌日脉數ニメ次序ナク大小齊ズ呼吸不利大息
 ス皮膚及舌乾燥苔粟殼色大便微溏小便塗ナシ乃

前、幾那劑ニ水揚梅根ヲ加テ効力ヲ峻ニシ又龍腦
 ヲ阿芙蓉液ニ加、一時毎ニ四滴宛與。前列印設酒、羯
 布羅精ノ蒸湯法。吉利詞キリス參兒テイルヲ持重ニ施ス夜中脉
 小軟ニシテ稍ヤ次序ヲ得大抵八十動。呼吸快利。脚ノ肌
 膚和柔。頭腹兩臂蒸氣發ス夜半後煩ノ時譫語ス。乃
 芥子泥ヲ貼スル。三時許○晦日患者精神沈重。面
 赤。眼神乏弱粘液被ヒ。脉軟弱大小齊ナ九十動許。呼
 吸不利ノ大息シ。肌膚和柔。舌苔粟殼色ニシテ厚、微燥
 テ粘液被フ。昨以來大便通セズ。兩日吉利詞參兒腸
 内ニ留ル。小便赭色稠濁雲翳アリ方劑同前。但前幾

那劑ニ遠志二錢ヲ加テ與。又時々左大麥煎ヲ兼用

爽涼大麥飲

綠礬精

半錢

舍利別

一弓

右攪和シ二匙ヲ取テ大麥煎一小茶椀ニ和シ與。又
 芫菁膏ヲ胸ニ貼ス夜中煩躁シ發汗ス。夜半後汗止
 譫語シ曉ニ至テ省覺ス○十二月朔日脉昨ニ比ス
 レバ稍盈揚シ數減軟ニシテ次序アリ皮膚及舌苔潤
 アリ呼吸不利シ大便失禁ス芫菁膏大ニ發泡ス。患
 者肉羹汁ニ蒸餅ヲ煮テ喫ス夜中嗜眠。脉小ニシテ微
 數。呼吸利シ頭臂腹部蒸氣ヲ發ス○二日。脉細小。次

序ナク呼吸短促時大息ス皮膚及舌潤ヒ苔甚シ吉
 利詞爹兒ヲ施シ硬屎少許通ス其他諸症方劑同前
 ○三日精神沈重ス然レ辨識アリ脉甚小ニ疾數
 呼吸不利大息シ皮膚燥舌苔赭色ニ甚厚ク且振
 搖ス口中粘液被ヒ心下苦滿惡心シ大便通セズ小
 便稠濁ニ微赤色ノ塗多シ右ノ如ク峻効アル方
 法ヲ用テ呼吸仍不利スル故ニ左ノ吐劑ヲ與フ

鎮痙誘吐散

乙百葛格安那末 一月 葛私多儂護 四瓦

右研和ノ一頓ニ服セシメ次ノ飲劑ヲ用フ

鎮痙加纈煎

加密列 纈草根 各二錢

右泡劑トシ飲料トス是ニ因テ午後粘液ヲ吐シ呼
 吸稍利ス但嗜眠ノ睡ヲ能ス乃吐劑ヲ休前諸方ヲ
 用又幾那丁幾劑四十滴宛一時毎ニ與○四日嗜眠
 醒覺ス然レ精神鬱重シ兩手顫振惕動ス此症甚片
 ハ麝香二瓦宛一時毎ニ與フ脉小ニノ八十動許或
 時甚數ニノ次序ナシ呼吸不利大息耳稍聾シ皮膚
 及舌乾燥シ赭色稠苔アリ大便通セズ小便同前乃
 復芫菁膏ヲ胸ニ貼シ芥子泥ヲ兩蹠ニ貼ス方劑同

前。但午後筋惕動甚。故麝香二分。宛一時每二
用。夜中嗜眠。微譫語。○五日耳聽難。脉小。稍
數。次序ナシ。時大息。仍筋惕。故又後方ヲ兼用ス。

爽神鎮痙飲

鹿瓊漿

製法。臭氣銳烈ノ鹿角精ヲ適宜ニ取リ。硝
子。曰ニ入レ。是ニ結芒酸性ノ琥珀鹽ヲ
少許宛加ヘテ。些モ沸滓セザルニ至レ。能研和
ノ濃過シ渣ヲ去。硝子塊ニ入レ。固封シ貯フ。

忽弗滿鎮痛液

幾那丁幾劑

各三弓

舍電阿芙蓉液

半錢

右調和シ一時每ニ九十滴宛與。○六日患者倦卧シ
神思沈垂。顔面黧澹。脉小ニ微數。呼吸不利。大息ス。

然レ正顫振筋惕休。乃前ノ鎮痙飲ヲ一時每ニ增加ヘテ
竟ニ百二十滴ニ至リ。龍腦爽神散前出ヲ與ル。每ニ華
尼利莢六分ヲ加用。又爽涼大麥飲ノ綠蓉精ノ量ヲ
增加シ。其他内外方劑モ持重シ用フ。午後患者半睡
シ半。眼ヲ開キ。脉小ニ百動許。呼吸不利。皮膚乾燥
筋惕咬牙。舌苔尚厚ク。大便通セズ。夜ニ入テ醒覺シ。
脉小ニノ次序アリ。大抵八十動。皮膚及舌潤ヒ。效嗽
シ。夜中稍睡眠ス。方劑同前。華尼利ノ量ヲ増テ十二
分ニ至。○七日面部瘦削。眼球陷凹。耳冷。額皺ヲ生シ。
嗜眠ノ睡ラズ。又搐掣ヲ發ス。然レ正辨知アリ。耳聾シ。

脉甚小ナレ_レ序アリ。九十動許。呼吸稍利_シ。效ノ
 粘痰ヲ咯_キ。共ニ嘔氣ヲ發ス。皮膚及_レ舌乾燥_シ苔甚_クシ。
 大便閉四日方劑同前。又加_カ密列。纈草。石鹼ヲ以_テ吉_キ
 利詞_ハ參兒_ヲ製_シ施_ス午後患者直視。搗掣甚_ク。脉細
 數ニ_ノ按知_シ難_シ。皮膚燥キ。小便稠濁ニ_ノ塗ナク。
 斷ニ_ニ驚口瘡ヲ生_ス。然_レ_レ咽喉口中_ニハ發セズ。吉利詞
 參兒_ヲ施_メ大便一行通_ス乃_ナ龍腦爽神散ニ_ニ華尼利
 十五_ニ宛加_テ一時每_ニ與_又蓬砂ヲ煉膏ト_シ驚口
 瘡ニ_ニ擦_ス。其他方劑同前夜中發熱。面赤。倦卧ス。脉甚_ク
 小ニ_ノ微數。次序アリ。稍_ヤ睡眠ス。○八日精神稍_ヤ輕爽

三ノ對晤辨知ス。脉小ナレ_レ序アリ。九十動許。呼吸利_ス。然_レ_レ仍_ホ欬嗽休_ズ。皮膚乾_ケ和柔_シ。舌苔
 消_ノ潤_ヒ。驚口瘡殆_ト消散_ス。午後復_レ煩躁_ノ時々_ニ牀
 外ニ_ニ展轉_ス。然_レ_レ呼吸不利_{セズ}。皮膚及_レ舌潤_ヒ稍_ヤ白
 苔アリ。脉小ニ_ノ微數。大便通_{セズ}。小便赭濁ニ_ノ塗
 ナ_シ夜中大ニ_ニ發汗_シ。稍_ヤ睡眠_シ時_ニ譫語_ス。脉午後ニ_ニ
 比_スレ_バ稍_ヤ盈實_シ次序アリ。九十動許。胸_ニ發泡_創口
 ヲ_モ仍_ホ愈_サラ_シム方劑同前。○九日大便一行通_ス。
 面赤。神思爽_輕。脉昨ニ_ニ比_スレ_バ稍_ヤ盈實_シ。軟ニ_ノ數
 ナラズ。次序アリ。呼吸利_シ。蒸氣ヲ發_ス。夜中嗜_レ眠_メ

睡ラズ。但、謔語セズ。方劑同前。○十日。舌頭潤テ苔ナシ。又大ニ發汗ス。故ニ爽神鎮痙飲ノ鹿瓊漿ヲ去リ。幾那丁幾劑ヲ增加ス。大便通セズ。午後嗜眠。面部赤色ヲ帶。顔面。胸。兩臂ニ豆大ノ瘡胞ヲ生シ。肛門ニ大ナル水胞ヲ發ス。夜中睡眠シ寬快ノ狀アリ。耳能聽エ。晤言辨知平日ノ如シ。方劑同前。○十一日。脉小ノ微數。呼吸快利。欬ノ痰ヲ咯。舌頭苔ナク。舌本ニ向テ赭色ノ苔アリ。大便通セズ。面部蒸氣ヲ發シ。皮膚和柔。兩臂ノ胞稍起脹シ。右臂赤色ノ粟疹ヲ發シ。夜中安眠ス。○十二日。患者知覺全平復シ。脉微數ニメ盈

實シ。其胞多ハ化膿シ。次テ乾固ス。或、化膿セズノ消散スル者アリ。芫菁膏ヲ貼スル部能、發泡シ且、乾愈セサラシム。但、犬ニ褥瘡ヲ生ス。乃、雞子白ニ羯布羅精ヲ和シ貼ス。患者肉羹汁少許並、可喜一二盞ヲ喫シ。味佳美ヲ覺ユ。方劑同前。但、華尼利ヲ去テ用ス。○十三日。諸症同前。乃、滋養ノ羹汁ヲ與。又、欬嗽ヲ治スルカ爲メ、前ノ幾那飲劑ニ金硫黃十五分ヲ加用。夜中安眠ス。○十四日。十五日。脉頗盈實シ。次序アリ。皮膚及舌潤。苔消ス。其胞仍彼此ニ在テ化膿ス。小便稠濁ナラズ。尚雲翳ヲ現ス。大便通セズ。患者稍食ヲ欲

シ。褥瘡膿脹ス。○十六日褥瘡ノ疼甚ノ睡レ不能ス。脉
小ニノ數呼吸稍短促ス。然レ其效嗽減ス。小便拘椽色
ニノ稠濁。褥瘡潰爛深殆ト一寸許。其底黑痴被フ。然
レ邊ニ焮衝候ナシ。因テ後方ヲ作テ瘡上ヲ蒸湯ス

防腐蒸湯方

揚皮

芸香 各四錢

蘇格爾需謨葉

菲阿斯失亞密草 二錢

右剉水三十二ヲニ煮テ患部ヲ蒸湯シ。緩和愈創ノ
膏藥ヲ貼ノ其潰爛ヲ愈合ス。○十七日褥瘡痛ニ因
テ睡眠ヲ妨グ。瘡底黑痴殆ト剝脫セントス。瘡胞盡

消散シ夜中安眠ス。○十八日脉小ニノ數ナラズ次
序アリ。呼吸快利シ效減シ皮膚及舌潤テ苔去。食ヲ
欲シ。小便褐色溷濁。大便固シ。○十九日神思爽快。眠
食逾復ス。因テ前ノ諸方ヲ休テ左ノ二方ヲ與フ

壯神丁幾劑

幾那丁幾劑 四錢 纈草丁幾劑

忽弗滿鎮痛液 各二錢

右調和シ一時毎ニ百五十滴宛服ス

鎮痙排毒散

托歇爾私發汗散 十五瓦 甘草 末 十瓦

右調和ノ散劑トシ分テ六服トシ毎夜一服宛與フ
 ○廿日ヨリ正月朔日マデ諸患日快愈シ脉力盈充
 始テ牀中ニ起坐ス唯效嗽脉數ノ二症退ザルノ之
 ○二日患者神思爽了ナラズ惡心シ吐スル一兩
 次食ヲ欲セズ口中頻ニ淡水湧溢シ舌白苔生ス乃
 乙百葛格安那ヲ用吐スル一四次爾後神思爽快食
 進ニ脉小ナレ凡數ナラズ乃前ノ丁幾劑ヲ與ヘ別
 ニ楊皮ノ浸劑ヲ服セシメ正月十六日ニ至テ竟ニ
 全治ヲ告テ停藥ヲ許ス

新訂增補和蘭藥鏡卷十二終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭 醫範提綱 棟齋宇山先生著 全三冊 門專 植學啓原 宇山捨庵先生著 全五三冊

同 內象銅版圖 同 全一帖 舍密開宗 同 每篇三冊完 白初篇至七篇

增補和蘭藥鏡 同 全七冊 醫療正始 棟齋宇山先生著 每篇三冊完 白初篇至七篇

遠西醫方名物考 同 全五冊 泰西名醫彙講 藤川其作先生著 全八冊

同 補遺 同 全九冊 要術知新 藤川其作先生著 全三冊

瘍醫新書 棟齋宇山先生著 全四冊 醫方例幾 藤川其作先生著 每篇三冊完 白初篇至七篇

蘭學階梯 同 全三冊 同方劑篇 同 全三冊

蘭學佩觿 同 全一帖 西音發微 大塚玄軒先生著 全二冊

幼幼精義 棟齋宇山先生著 每篇三冊完 病學通論 大塚玄軒先生著 初篇三冊完 二篇三冊完 三篇四冊完 四篇五冊完

濟生三方 杉田成卿先生著 全四冊 青藜閣 須原屋伊八

