



新訂
增補
和蘭藥鏡

卷十六

武
856
18-16

早稻田大學
圖書部
寄託者
田文庫
寄託書
第一六一號
第 2 號
第 16 冊



門中印
號 856
卷 18-16

榛齋宇田川先生著

六篇

新訂

增補和蘭藥鏡

風雲堂藏版

青藜閣發兌

大正七年九月廿四日
內田糸子氏贈



新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十六

百藥煎

百藥煎越幾斯劑

百藥煎丁幾劑

巴豆油

附巴豆

椰子油

爹爾水

爹爾 滿 松香 尋常華爾斯
格碌波 尼亞 黃華爾斯

榧植

榧植膏

榧植舍利別 榧植

榧植核

榧植 加鏡丁幾劑

血竭

騏驎血 收斂攝血丸

紫紉

紫紉丁幾劑

增訂和蘭藥鏡

卷十六

標目

風雲堂藏



石榴

沒食子

收飲沒石散

樺

秦皮

檀香

白檀

黃檀

紫檀

乳香

阿沒勒

阿黃涼解飲

落葉松耳

檉柳



新訂增補和蘭藥鏡卷十六

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

百藥煎

一名阿煎藥「カテシウ」カテス「カシウ」羅
「テル」ラヤポニカ「羅」ヤパンセ「アル」デ蘭

榜葛刺等印度地方ニ産スル「ミモサ」カテスト云ル

灌木ヲ水ニ煎熬メ越幾斯劑トシ曝乾スル者ナリ。

樹高三五尺皮厚ク鱗甲狀。赭色。木材堅固。表圍白色。

裏淡赭。或黯赭或黑色。枝ニ刺アリ葉合歡狀。花五出

萼五齒樣。莢ヲ結ヒ仁ヲ收ム製法樹皮及表圍白材

ヲ去中心ヲ取り碎片ト爲シ磁罐ニ入水ヲ加煮減

ノ三分一トシ濾テ汁ヲ取り煎熬ノ凝固シ暴乾ノ塊片ト爲ス或、其濾汁ヲ冷定ノ大陽ニ暴シ數攪稠厚ナルニ至リ毛布ニ牛屎ノ燒灰ヲ摻ケ是ニ其稠汁ヲ展ケ稍乾ハ絲ニテ切分テ方形ト爲シ又大陽ニ暴乾ス是百藥煎ナリ。木材黑色多ケレハ此藥黑色ヲ帶テ下品トス○印度地方アレカカテスト名ル樹アリ其實味收瀝ス。是ヲ搾汁ヲ取テ暴乾シ或煎熬乾固シ一種ノ百藥煎ヲ製スト云按ニアレカカテストハ檳榔樹其實ハ檳榔子ナリ華云此藥往古此樹ヲ穀知セス或調合藥トシ或土質ノ類トス故ニ日本土ノ名アリ然此物水ニ溶化シ火ニ焚消スル故ニ蘆謨質ニメ土質ニ非ス且日本ニ産セス麻刺拔爾琶

牛坎巴牙等印度沿海諸地ニ産ス○上品ハ乾固疏脆破碎シ易ク粗糙黯赤色裏面帶赤赭色或帶白ノ條理香臭ナク味收瀝ノ甘苦ヲ帶其質細密ニメ輕虚ナラス。舌ニ粘著セス盡溶化シ水酒醋及水ヲ雜タル稀キ燒酒ニ溶解ノ渣渣少シ。是皆蘆謨質ノ徵トス或匙ニ入火上ニ置ハ焚テ渣灰少シ下品ハ右ノ諸液ニ溶メ塗渣八分一生ス是製法忽略ニメ土灰等ノ汚物雜リ若ハ姦商他物ヲ雜ル者ナリ或火ニ投シ凝固ノ焚消セス水酒等ニ溶化セス重土類出ルハ偽品トス

○榕按和製并漢說ノ百藥煎ハ五倍子ニテ製ス。

時珍綱目說如之。洋船輸ス者ハ五倍子製ニ非_レト
 左ノ譯說ノ如_シ但_シ清船ノ品亦恐_ルハ五倍子製ニ
 非ス○藥鋪樂只亭清雅云阿煎藥五品アリ即_チサ
 ラ夕_ニ圓_ノ樣_ヲ小圓_ノ樣_ヲ角_ノ樣_ヲ麻刺拔爾_ノナリ。サラ夕_ハ又
 縮_メ樣_ト稱_メ上品ナリ洋船ヨリ輸ス。清船ニ此品
 ナシ皆扁形ニノ縮紋アリ○圓樣ハ中品トス。清
 船_モ齊來ル。形圓_ノ外面稗豪或_モ薯_ノ薯_ノ著_者アリ稗豪
 著_者ヲ好品トシ薯_ノ薯_ノ著_者是_レ次ク○小圓樣ハ圓
 樣ノ小ナル者ニ非ス別種ナリ下品ニノ滋味強
 ク外面灰色裏白色。形小圓ク大_ナ李ノ如_シ文化ハ

年冬始テ清船齊來ル○角樣ハ多分下品トス。方
 形一寸許。布紋アリ是亦清船輸ス又一種小角樣
 ト呼_者アリ方形半寸許。寛政二年始テ清船輸ス
 ○麻刺拔爾ハ藥鋪訛テ_マルハルト云。文政四年
 洋船始テ齊來ル。橢圓。大小塊ヲ爲_シ大ナルハ長_ク
 一尺濶六七寸。重_ク三百二十錢。小ナルハ重_ク二十
 四五錢。皆藥鋪ニテ破碎シ一斤宛ニ分_テ販ク○和
 製ノ品ハ藥鋪ニ菊屋ト云。往時菊屋某創製ス。今
 泉州堺。酢屋清兵衛。日野屋與兵衛是ヲ製ス。五倍
 子ニ好茶末ヲ和_シ蕨粉糊ニテ煉ル者ニノ阿煎

藥ノ偽品ナリ藥用ニ堪ヘス

〔試効〕秀偉ノ收瀦藥ニノ拔爾撒謨樣ノ効ヲ兼ヌ。諸管纖維弛弱ノ發スル諸病。脫泄失血等。收固シ治スヘキ諸症ヲ治ス。○胃腸虛弱ノ經久下利。努責利。赤利。婦人崩漏。尿道弛虛ノ久淋白帶下。小便淋瀝不利。及尿崩ヲ治ス。○虛症ノ失血殊ニ吐血嘔血。尿血ヲ治ス。○冒寒傷冷毒ニ因テ肺虛衰シ淹滯セル欬嗽。聲喎等ハ亞刺比亞蘆謨ヲ等分ニ加ヘ沙糖四倍ヲ研和ノ錠トシ口中ニ溶シ用フ。○遷延ノ下利赤痢ハ此藥半錢ヲ取テ稠厚ノ米粥汁ニ加服ノ効多シ

殊老人赤痢ニ良。○粘液性ノ荏苒タル咽喉焮腫ハ此藥ヲ漱劑トシ。經久無毒ノ淋疾。白帶下ハ此藥ヲ適宜ノ液ニ溶シ水銃ニテ尿道ニ注輸ノ捷効アリ。○服量細末トシ十氏ヨリ一乃至一服トス。泡劑ハ二錢ヲ沸湯六弓ニ泡出シ服ス。或煎劑ニ加用フ。○此藥越幾斯劑。丁幾劑トシ右ノ諸病ニ良効アリ

百藥煎越幾斯劑

製法

百藥煎

細末

一坵

水

二坵

右硝子壘ニ其口ヲ蓋閉シ煖處ニ置浸ス。一三日。放冷靜定ノ渣渣生スルニ至リ紙ニテ上清ヲ濾取硝

子器ニ内微火上ニテ水氣ヲ蒸散シ凝固セシム

百藥煎丁幾劑

製法 百藥煎 搗碎者 燒酒 十五度者 一弓 六弓

右硝子壘ニ内其口ヲ蓋閉シ煖處ニ置浸一三日。濾テ滓ヲ去リ固封シ貯フ。服量一錢ヨリ二錢ニ至ル

百藥煎越列幾劑

製法 百藥煎越幾斯劑

- 百藥煎 昆設爾弗複方
- 吉訥護謨 細末 三弓
- 桂 細末
- 肉豆蔻 細末 各一弓
- 阿芙蓉 一錢半 葡萄酒 適宜 溶ス者
- 玫瑰舍利別 二比二 十四錢

右合和ノ煉膏トス。收瀼止痛ノ良効アリ。失苟兒陪

苦ノ口中潰爛ヲ治シ。又此劑ヲ以テ實亞斯格爾需

謨弗刺加斯篤里煉膏ノ名。功用ニ代用シ諸痛殊腹

痛下利赤痢嘔吐等汚物壅滯ナキ症ヲ治シ酸敗液

ヲ消シ催眠發汗ノ効アリ。服量一錢半ニ至ル

百藥煎錠

製法 百藥煎越幾斯劑 二弓

右熟研合和シ玫瑰水適宜ヲ加テ錠ト爲ス冒寒傷冷毒肺氣管ノ諸症。欬漱吐血等ヲ治ス

外敷 出血ヲ止、口中斷顎腐爛ヲ愈シ疼ヲ止ム。○水銀劑ヲ過用ノ吐涎甚キ症。遷延粘液性ノ咽喉焮腫ニ外敷シ或水。葡萄酒若ハ燒酒ニ水ヲ加稀シ此藥ヲ浸ノ含漱劑トス。○潰瘍弛虛ノ愈難ク及出血シ易キ症ニ此末ヲ摻シ或洗藥水銃劑トシ腐壞ヲ遏水棉様肉ヲ祛ク。

依福叔
叔華伍

巴豆油

附巴豆

オレウム、コロニス、オレウム、チギリイ、羅

巴豆ヲ榨器ニテ搾リ油ヲ取ル黄色辛味香氣微シ。試効 内服。外敷共峻下ノ捷効アリ大抵一滴ノ四分

一。若ハ半滴ヲ内服ノ四分時中ニ快瀉ス。胃腸ニ停止ノ腹痛スル違ナシ故ニ瀉下ノ捷効ヲ要スル症ノ一良藥トス。頑固ノ大便閉或腸ノ運營弛弱怠慢及麻痺ノ大便壅滯スル症。或水腫停水若ハ粘液滯積或血液頭腦ニ攻衝ノ壅鬱シ或睡寐。巔狂等ノ瀉下スヘキ症ニ用。又條蟲ヲ驅泄スルニ速効アリ。○服量一滴ヨリ二滴ニテ甘美ノ舍利別等ニ點服シ或此油十滴ヲ亞刺比亞護謨ト沙糖ニ和シ分テ四十個トシ小錠若ハ丸藥トシ一時毎ニ一個宛服シ或症ニ隨數個ヲ一服トス。○此油六滴許ヲ阿利穢

油若ハ亞麻油一弓ニ研和シ腹部或云臍部ニ擦テ能瀉下ス。小兒服藥ヲ嫌者ニ尤良。又能蟲ヲ下ス。

巴豆

カラナ。チギルム。カラナ。モルカ。羅

錫蘭馬路古麻刺拔爾共印度地方支那等ニ産スル

灌木樹名「コロト」チギルム。羅ノ實ナリ。其樹枝ナ

ク葉長楕。滑澤。鋸齒。梗アリ一株ニ雄花雌花生シ穗

ヲ爲ス。雄花ハ上梢ニ生シ八瓣十六雄蕊雌蕊ニノ

萼ナシ雌花ハ下部ニ生シ瓣ナク三雌蕊雄蕊ニノ

萼アリ第二十實ノ皮三稜様裏ノ仁巴豆味辛辣嚼ハ

口舌咽喉辛熱。焚カ如シ。○樹材根花葉皆味辛辣。瀉

下ス。試効 巴豆性焚熱酷厲毒アリ吐下ノ峻藥トシ

往昔多ク用フ。然レ吐瀉腹痛烈ノ眩暈ニ堪ス。或胃

腸熾衝ヲ發スル者多キ故ニ晚近用ル罕ナリ但峻

捷ノ瀉下ヲ要スル急劇ノ諸症或水腫急脹ノ停水

ヲ滌除シ或頑固ノ粘液病及條蟲ヲ驅泄スルニ服

量適宜ヲ用テ間捷効ヲ取テアリ。或巴豆ヲ熱灰ニ

煨シ或醋ニ煮テ其毒ヲ減シ或緩和ノ芭布ニ和シ

用フ但醫家總テ妨害ナキ峻下劑ヲ擇用ル故今多

ハ此藥ヲ用ヒス密叔

椰子油

オレウム。パール。羅

椰子ノ仁ヲ取リ水ニ浸シ搾取ル油ナリ黄金色味甘。焦香アリ或云莖菜花香アリ稠厚ニシ酪ノ如シ水ニ滴メ浮ム。蓋敗スレハ白色トナリ佳香脱ス。亞墨利加洲亞弗利加洲及印度地方ニ産ス或獸脂ニ姜黄及香料ヲ浸シ偽製スル者アリ

試効 腹肚硬腫。臍脹ニ此油ヲ擦シ布片ヲ蓋貼ス大人小兒病ノ緩急ヲ論セス良効ヲ稱ス。○痛風肢節痛ニ内服外敷シ。痔痛ニ塗テ痛ヲ止ム。○莖菜舍利別名ヲ和シ用テ效嗽喘急ヲ寛解ス

依叔伍 淑華

爹爾水

アム。ピキス。リギ。イダ。羅

製法

爹爾三北製法次出水十二北

右調和シ暫攪流シ靜定二十四時。爹爾盡ク沈ニ至テ上清ヲ取。硝子罈ニ收メ貯フ依

又法

爹爾一北雨水二北

右壺ニ入。鍬匙ニテ攪流スルヲ八分時。靜定二十四時。其水黄色トナリ。爹爾自ラ水ト分ニ至テ上清ヲ取。濾過シ硝子罈ニ入。固封シ貯フ施

試効

蘇亦齊歐羅巴洲國名ニテ痘瘡流行スレハ每朝此水

半比ヨリ一比七テ小兒ニ與テ痘瘡ヲ免ル或云是
ヲ服スモハ必ク善性ノ輕痘ヲ發ス故ニ痘流行ス
レハ小兒ノ齡ニ隨テ大小ノ蓋ヲ用毎朝毎夜與テ痘
流行止ニ至ル或痘中是ヲ服ノ効アル說多シ○或
云一家小兒四人其兩兒ハ種痘ス一兒ハ自然ニ痘
ヲ發ス皆善痘ヲ濟了ル一兒ハ朝夕參爾水ヲ服メ
痘發セス故其父是ニ種痘シ且參爾水ヲ服セシ
ム然レ痘發セス二個月ヲ經テ復是ニ種痘シ參爾
水ヲ與ス是ニ由テ甚ク輕痘ヲ發セリ○或云往年
惡痘流行一都下ノ兒救活セル者殆ト稀ナリ然レニ

參爾水ヲ服スル兒ハ痘ヲ免レ或傳染スル者モ初
ニ此水ヲ與レハ皆輕痘ヲ發メ死スル者ナシ○參
爾水ハ胃虛ノ諸症ニ內服メ殊効ヲ稱シ胃ノ頽弛
セル健運カヲ回復シ飲食ヲ進ム○經久胸肺病喘
急胸水等ヲ治ス○利尿ノ効アリテ結石病ヲ治ス
○頑固淹滯ノ神經病經久ノ微毒諸症疥癬ニ屢殊
効ヲ得○服量三四弓宛一服トシ大抵日一比ヲ服
ス○外敷メ腫瘍ヲ軟化シ膿熟メ潰破セシム創傷
潰瘍ニ貼メ排膿淨刷シ綿絮ヲ浸シ齧齒ニ挿テ疼
ヲ止ム○松樅類ニ一種ノ酸性ヲ稟舍ス是レ火力ニ

由テ^{テイル}參爾ニ混シ且揮發竄透ノ油氣ト共ニ水液ニ和メ精微ノ質ヲ成ス。是ヲ以テ粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解シ小便ヲ利シ蒸氣ヲ發シ腐敗ヲ過ム是ヲ以テ右ノ諸病ニ偉功アリ

參爾 ^{ロビキス} ^{リクイダ} ^羅

齒ノ軟ニノ粘稠流動

スル者ナリ

製法 地ヲ堀リ大甕若ハ桶ヲ埋メ銅鑊版若ハ扁石ニ數孔ヲ穿テ是ヲ蓋トシ其周圍泥土ヲ以テ竈ヲ造リ頂ヲ圓シ是ニ一氣孔ヲ穿テ煙氣ヲ散ス其甕蓋上ニ松樅等ノ割片ヲ縱ニ積重子火ヲ

點ノ焚セハ其材ノ津液ト華爾斯溶解ノ稀液トナリ。次ニ粘稠ノ華爾斯トナリ。共ニ甕内ニ流滴シ其材盡炭灰トナル。其液即參爾ナリ香竄苦味楮黑色。是煙氣華爾斯熏焦スレハナリ。其上面ニ稀キ油浮ム是ヲ黃參爾ト曰フ右ノ參爾ハ炭灰等ノ汚物アル故ニ濾テ淨潔ニス。其法。桶ニ鍍網ヲ張り稗藁ヲ疊敷シ是ニ參爾ヲ注テ透漏セシメ淨除ス

諸 ^{ロビキス} ^羅 ^{ロベッキ} ^蘭 ^{テイル} ^ヲ ^鍋 ^ニ ^入 ^レ ^火 ^ニ ^上 ^手 ^ヲ

任ス攪煮テ凝固セシム是即諸ナリ。硬固ニメ碎截

スレハ細屑迸散シ光澤アルヲ上品トス。柔ニノ粘
 ハ下品トス。火ニ溶メ多煮沸スルハ麁惡ノ多爾ニ
 テ製スル者トス。○詣ヲ蒸餾ノ油出是拔爾撒謨ノ
 効アリ是ヲ拔爾撒謨ト曰フ。○天造多爾アリ。萬
 嶋亞細亞洲ノ巖石罅隙ヨリ流出ス。舶ヲ塗ニ用フ
 試効外敷ノ軟化解凝化膿ノ効多爾外敷ト同シ外
 科多硬膏ノ料ニ用フ

松香 ハルイン 松樹ノ幹ヨリ流滴ス。汚物ヲ淨揀メ凝
 固スル者ハ橙皮色邊透亮。香氣格碌波尼亞ノ如シ

尋常華爾斯 ゲウチ 是亦松樅類ノ幹ヨリ自然ニ流

滴シ或鑽刻メ取ル。其汚物ヲ淨揀セル者亦橙皮色
 ヲ爲ス。或水ニ煮テ麻布囊ニ内絞濾ス者ハ黃色若
 ハ白色ナリ或是ヲ格碌波尼亞名トス

格碌波尼亞 ハルイン 尋常華爾斯ヲ煮テ製ス。赭色
 透亮。硬固疏脆。火ニ温メ若ハ指間ニ摩メ香氣生ス。
 或華爾斯ヲ蒸餾メ的列竝油ヲ取タル滓ヲ以テ製
 ス。或云華爾斯ニ水ヲ加ハス火ニ溶メ赤色透亮トナ
 リ的列竝ノ香氣消スル者ヲ格碌波尼亞トス
黃華爾斯 ウレハル 此樹未詳。其幹ヨリ流
 滴スル華爾斯ナリ。藤黃ノ如ク手ニ染著セス。○右

ノ華爾斯類。性功總テ諸一同シ

〔溼〕〔拔〕〔僕〕〔依〕〔羅〕

楨植

「クリン」和「セイドニア」マリス。セ
ドニア「クローベル」クローアツプル蘭
○楨持同種。實圓キラ楨持トシ楨
長キラ楨植トシ多ク藥用トス

〔試効〕性收斂。清涼ス。實ノ絞汁。清涼滋潤。強壯シ。生氣
ヲ活潑ス。壯熱病。腐敗熱。神經熱等ノ輕キ衝動。強壯
藥ヲ用フヘキ症ニ適應ス。○口中咽喉ノ焮腫ニ含漱
藥トス。○楨植膏。楨植舍利別。甘美清爽ニシテ。滋養潤
補シ。胃腸ヲ強健シ。惡心嘔吐ヲ止。飲食消化ヲ進メ
諸脫泄。吐血。勞效。下利。血痢。膽液病等。殊効ヲ奏ス。

楨植膏

「クローベル」マリス。ラデー。蘭

〔製法〕楨植ヲ取テ皮ト沙穰ヲ去リ。姜擦子ニテ擦
シ布ニ包。絞。濾テ汁ヲ取。靜定メ沈渣ヲ去。上清三
比ヲ取。又其皮ト沙穰ヲ水ニ煮テ其汁一比ヲ取。
絞汁ト合シ沙糖三比ヲ攪和シ文火ニ上手ヲ住
ス攪セ徐々ニ煮テ水氣ヲ蒸散シ稠厚トナルニ
至テ放冷シ硝子壘ニ封固封シ貯フ
〔又法〕楨植肉。擦屑ノ絞汁一斤。其皮及シ沙穰ノ煮汁
一麥酒盞二合許。楨植肉右汁ノ四分ノ三ヲ加。煮テ
肉軟ナルヲ候ヒ粗毛篩ニ内磨メ濾シ其汁ニ沙

糖一比ヲ攪和シ文火ニ上手ヲ住メス攪セ煮テ稠厚トナルニ至リ放冷シ硝子壺ニ貯テ

榎檀膏複方

「セーピングコンヘイト」

製法 榎檀膏

三勺

桂末

亞刺比亞蘆護

各四錢

榎檀舍利別

次出 適宜

右調和シ煉膏トス

榎檀舍利別

「ミハセイドニヲルム」
「シロップハンケイペリン」
蘭

製法 榎檀絞汁

ノ沈渣ヲ去リ上清ヲ濾テ十六勺ヲ

取り沙糖二比半ヲ攪和シ慢火ニ上水氣ヲ蒸散

シ舍利別ノ稠ト爲ス

（注）

○榎檀絞汁ハ能、鍍屑ト合和ス。故ニ鍍屑ヲ加テ丁幾劑トシ用テ輕衝動強壯シ諸管縱緩粘液留飲壅滯ノ症。或神經感觸甚ノ藥劑ニ堪サル症ハ此劑ヲ服ノ收固強壯ニシ或經久淋疾收瀋劑。拔爾撒謨劑ノ驗ナキ症ヲ治シ總テ鍍劑ヲ用テ強壯スヘキ諸病ニ秀偉ノ効アリ服量三十滴ヨリ六十滴ニ至ル

榎檀加鍍丁幾劑

「インキテラヘルリ」
「インキテラヘルリ」
「セイドニアタ」
「セイドニアタ」
「ホマタ」
「イン

キテラマールテス、セイドニアタ、
「インキテラヘルリ」
「セイドニアタ」
「ホマタ」
「イン

製法

鍍粉 一勺

榎檀汁 三勺

桂精

十六勺

右鍍粉ヲ榎檀汁ニ和シ數日浸シ時々攪滾シ鍍鍋

ニ煮テ半ヲ減シ濾テ上清ヲ取り放冷ノ桂精ヲ攪
勻シ硝子壘ニ内固封シ貯フ （溼）

榎植核

「セミナ。セイド
ニヲムム」 羅

核ノ皮多ク粘液ヲ含リ是ヲ

水八倍ニ浸シ絞ハ粘液トナル ○收瀼清涼シ内服
ノ酷厲液ヲ緩和シ吐血肺傷及欬嗽ヲ治ス ○止痛
愈創ノ良藥トス。咽喉簽痛。口中斷頸剝爛腫痛。鷺口
瘡ニ含漱シ或塗敷ス ○皮膚剝傷。唇ノ燥裂。乳頭ノ
毀傷及痔痛ニ塗テ焮腫ヲ緩解シ速ニ治ス ○焮腫
眼ニ捷効アリ玫瑰水ニ加眼ニ點ス ○腸酷厲液ア
リテ裏面剝爛シ腸痛。血痢。努責痢ヲ發スル症ハ是

ヲ吉利詞爹兒トシ施ノ治ス ○右ノ諸症後方甚驗
アリ

榎植拔爾撒謨

榎植核粘汁 一弓

阿利襪油

或甘扁桃油 四錢

白蜜 二弓

右調和ス

又方

榎植核汁 一弓

阿利襪油

醋 各六錢

右調和ス。乳頭坼裂。唇燥揭等ニ塗テ尤良

（施）（叔）

血竭

騏麟血

「サンガイヌ。ダラコニス。羅
ダラケンブルド」 蘭

形狀

三種アリ。第一種カラミッス。ロタンゴト名クル

蔓木 荊藤 一種ノ實ヲ以テ製ス。其蔓柔撓ニノ遍、尖刺アリ蔓延ノ曲ニ傍樹ニ糾纏シ樹ヲ伐サレハ其蔓ヲ採_レ能ハス是ニ圓實ヲ結熟スレハ血紅色ノ華爾斯滲出ス是ヲ取テ血竭ヲ製ス（依云眞品ハ是）印度地方ニ産ス○第二種バルミヤスダラコト名クル樹ノ實ヲ以テ製ス樹高一丈五六尺幹太腕ノ如シ枝莖叢生シ遍尖刺アリ中心白髓アリ食ヘシ。葉バルミヤス樹柳樹、栳柳樹、檳榔樹、樹、檳榔等ノ總稱葉ノ如ク羽狀ニノ蘆ノ如シ長六七尺梗ニ刺アリ。花六瓣六雄蕊一雌蕊第六綱第一目萼六出圓實ヲ結攢簇ス赭赤色鱗甲狀松毬ノ如ク

榛子ヨリ大ニノ肉及核アリ味甚收瀼ス熟スレハ肉ヨリ血赤ノ華爾斯液滲出ス是ヲ取テ血竭ヲ製ス。此樹亦印度地方ニ産ス○第三種ダラコト名クル樹皮ノ華爾斯ヲ取テ製ス。樹高中等ノ松椏ノ如ク幹巨ク差勾屈シ頂ニ至テ八九枝ヲ分チ各二三尺許。繖狀ヲ爲シ其頂又各三四枝ヲ分チ各一尺餘太腕ノ如シ梢端各葉生ス。狹長劒狀ニノ厚ク龍舌草ノ如ク數葉相抱テ開展シ繖ヲ爲シ潤一拇横徑許長一尺半許。末尖テ刺ノ如シ葉脊壟起シ梗ニ刺アリ花枝頂ニ生ス。六瓣六雄蕊一雌蕊第六

綱目第一 萼ナク圓實ヲ結ヒ大ナル櫻實ノ如シ葡萄様ニ攢簇ス淡黄色。酸味ヲ帶フ。幹材堅固。皮粗糙坼裂ス。枝柔ニノ液多シ此樹カナリア加那里亞嶋亞弗利如洲ニ屬スニ産ス此一種。葉羽狀。花蛾形ニノ莢ヲ結者アリ。南亞墨利加洲ニ産ス

血竭製法 第一種 第二種ノ血竭製法ハ潤大ノ磁盃ニ半水ヲ入、鍍網ヲ載セ此樹實適宜ヲ取テ網上ニ置蓋ヲ覆ヒ火上ニ置、ハ沸湯ノ蒸氣ニテ其實融解シ血赤色ノ華爾斯液滲出ス是ヲ取、集テ小圓塊ト爲シ此樹葉ニ裹乾固ス或實ヲ搗爛シ若ハ布囊一

内搾テ其華爾斯ヲ取、小圓塊ト爲ス或實ヲ水ニ煮テ其汁ヲ火ニ上、水氣ヲ蒸散メ凝固シ製ス或其華爾斯ニ右ノ滓ヲ雜テ大塊ト爲者アリ是下品ニノ藥用ニ堪ス○或云實ノ核ヲ取、搗碎キ搾テ華爾斯ヲ取、溫テ小圓塊ト爲シ葉ニ裹ミ或其搗タル核ヲ水ニ煮テ上面ニ浮ム華爾斯ヲ取、餅塊ト爲シ或右ノ滓ヲ搗雜ル者アリ○第三種ハ夏月血赤色。光澤アル華爾斯其樹幹ヨリ滴瀝ス。或其皮ヲ鑽刻ノ取ル是ヲ其樹葉ニ裹、榛子大ノ圓塊ト爲シ販ク榕按上小圓塊ト云ハ藥舖古渡ノ小粽様ト呼フ者或汚物ヲ雜テ餅様ノ大塊

ト爲者アリ下品ニノ藥用ニ堪ス榕按ニ藥鋪椀蘇樣ト呼フ者
 門答刺ノ東濱ホルチラ泥ノ南地共ニ亞細亞洲多ク上品ヲ南海ノ嶋名
 産ス○和蘭藥局ノ品ハ皆第一種第二種ノ樹實ニ
 テ製スル者ナリ。樹皮ヨリ取者ハ和蘭ニ輸テ罕ナ
 リ○上品ハ圓或圓長。大胡桃若ハ肉豆蔻ノ如ク黯
 血赤色光澤アリ質固ク疏脆。研末スレハ朱砂ノ如
 ク香味ナク火ニ投メ焰ヲ發シ蘇合香ノ氣アリ水
 ニ溶化セス燒酒油類ハ盡溶化ス或云其質華爾斯三分
以テ大塊ノ者ハ下品トス。扁圓ノ塊。秤量一二弓ア
 ル者ハ血竭ニ趨謨類ヲ加、蘇木ヲ雜テ赤色トシ爲

者ナリ火ニ投メ焰ナク膨起メ燒化ス
 試効性收瀋乾燥シ止血ノ峻藥トス丹服ノ劇キ脱
 血。下血吐血。虚脱ノ下利等ヲ治ス○枯礬ヲ如用ヒテ
 收瀋ノ峻劑トス。稀涼ノ血液ヲ收固メ稠粘トシ諸
 脱泄過多。婦人崩漏。下血等ニ捷効アリ但ハ血過多
 虚脱ノ症ニ用フヘシ壯實多血ニメ發スル症ハ先刺
 絡下劑等ヲ施メ効ナキ者ニ用フヘシ。後方尤良

收斂攝血丸

血竭 末 一錢
 舍利別 適宜

枯礬 末 三錢

右調和ノ正氏ヲ一丸トシ朝夕五丸宛服ス。劇症ハ
 半時ニ一丸或ニ丸宛與フ斯。○血竭ハ收瀉ノ偉効
 アレ。氏晚近ノ醫家多クハ阿煎藥。吉訶護謨等ヲ以テ
 代用シ尤良効アリトス。○外敷ノ創傷潰瘍ヲ乾愈
 シ揩齒藥ニ加テ齒ヲ固メ斷ノ弛弱ヲ治ス。依叔華

紫紳 「ギムミ、ラカ」 羅 「ゴム、ラカ」 蘭

形状 印度地方ノ「コロトン」ラシヘルム樹ニ生スル
 白蟻翅アリ其枝條ヲ刺蝕ノ滲出セル蘘ハ華爾斯ス
或云華爾斯質液ノ凝固セル者ナリ蟻其華爾斯ヲ以テ窠

ヲ造リ卵ヲ蕃息スル。宛蜜蜂ノ蠟ノ如シ。○是ニ
 三種アリ其一ハ枝條長一指許ノ周圍ニ著テ黯赤
 色ナリ其二ハ右ノ枝條ニ著者ヲ取テ汚物ヲ去テ黃
 赤色ノ小粒ト爲者ナリ。其三ハ顆粒ヲ溶ノ版樣ノ
 扁片ト爲者ナリ或一種耳形ヲ爲ス者アリ。○紫紳
 ハ亞爾箇兒ニ溶化シ火ニ投メ佳香アリ硬脆ニシテ
 赤色ヲ帶微透亮。嚼テ津唾紫赤ニ染暹羅牛度
地方沿海殊錫蘭南海產ハ上好ニシ美赤色淨潔ナリ
海國名封印蠟ヲ製シ漆トシ器械ヲ塗ニ用フ植學啓
原出
試効 緩性ノ收瀉藥トス。漱藥トシ咽喉弛腫。斷ノ虛

脆出血ヲ治シ搖齒ヲ固ム○失苟兒陪苦口中諸症
ハ丁幾劑トシ通用ス

紫紳丁幾劑 紫紳 四錢 枯礬 一錢

右硝子鑊ニ入山蒼菜精八弓ヲ加煖處ニ置テ紅色
トナルニ至テ濾過シ數滴ヲ水ニ和シ含漱藥トス
然レ此藥ニ比スレハ沒藥及沒藥丁幾劑尤モ効アル
故近來用テ稀ナリ

依叔 叔伍

石榴 ガラナタム 羅 ガラナト 蘭

試効根皮ハ條蟲ノ一經驗藥トシ殊効ヲ稱ス。細末

トシ小兒ハ一月大人ハ二月宛四分時毎ニ服ス或
此皮二弓ヲ水煎シ濾テ十二弓ト爲シ適意ニ飲服
ス○實ノ皮收斂清涼ノ一良藥トス收瀉藥適應ノ
諸病凝體諸管ノ弛弱ノ發スル下利血利月經過多
崩漏諸脫泄ノ諸症ニ内服シ又苦味收瀉ノ幾那ニ
代用シ間歇熱ヲ治ス○咽喉焮腫懸壅垂弛腫口中
斷頸潰爛及脫肛等ニ此皮ノ水煎若ハ泡劑ヲ漱藥
蒸溺劑トシ治ス○實ヲ舍利別トシ實ノ絞汁ニテ製
如シ水ヲ加テ適意ノ酸味トシ冷服ノ熱病ノ清涼飲
トシ用テ煩渴ヲ止メ燥涸ヲ潤シ清涼解熱ノ効ヲ

稱ス○此皮水煎。泡劑。浸劑トシ用。或散劑トシ一錢
マテ用フ。舍利別ハ四錢宛用フ○石榴花性効實ノ
皮売ト同メ差緩ナリ

〔淑依福〕
〔宸叔伍〕

没食子 「ガルラ。ケルシナ」 羅 「ガルノイテン」 蘭

〔形狀〕 檨ノ一種「ヘルフエイケ」「ケルックス。イン」 其他檨

類ノ葉及花葉ノ梗ニ生スル贅瘤ノ類ナリ此樹一

種ノ蜚蛾ヲ生ス 蜂類。四ノ 其雌蟲ノ尾尖一鈎アリ

是ヲ以テ葉及嫩枝莖梗ヲ刺蝕シ其孔ニ一小卵ヲ

生シ津液是ニ滋溢シ漸盈脹ノ一塊腫トナリ其卵

ヲ包容ス。是即没食子ノ基趾ニノ卵ノ子宮ニ在ルカ

如シ。其小塊日増息シ漸硬固トナリ卵孵化ノ蟲ト

ナリ小蛹ヲ作り翅ヲ生シ其壳ニ蛀孔ヲ穿テ飛去

ル。是没食子ノ蛀孔ナリ。然レ蟲其裏ニ在テ死スレ

ハ蛀孔ナシ亞列波 亞細亞 得里步利 亞弗利加 等都

兒格ノ地方。煖國ノ産ヲ上好トス。歐羅巴洲亦産ス

レ下品ニノ藥用ニ堪ス○没食子ハ形圓大鴿卵

ノ如ク大小輕重一ナラス疣瘡及微稜アリ是其附

著セル梗痕ナリ多ハ蛀孔アリ香氣ナシ味甚收瀉

ス樹ニ在ルキハ赤色ヲ帶ヒ乾ハ赭色トナル或黃赭

灰白或青綠黑色ヲ帶フ上品ハ大ノ硬固充實シ重
ク赭黒ニノ青色ヲ帶或黃黑色疣瘡様ノ稜起アリ
蛀孔ナシ其裏多ク腐蝕シ或濕氣ニテ敗壞スル者
ハ輕虚ニノ蛀孔多ク性効亦脱ス能充實スル者ハ
自青色ヲ帶フ故ニ姦商間青色ニ染販者アリ

○榕按ニ没食子和産ナシ性効五倍子ノ如シ關
ルニ逢ハ代用スヘシ舍密家没食子ヲ乾餾ノ輕
軟白綿ノ如キ者ヲ製シ是ヲ没食酸ト名ケ溫泉
等ノ金屬質ヲ試ニ用フ曾テ試ニ五倍子ヲ乾餾
ノ輕軟ノ白絮ヲ得タリ是ヲ以テ鑛泉ヲ試ム没

食酸ト差異ナシ其說略植學啓原ニ舉ク

試効多没食酸 凡植物ノ收瀋性ハ皆此酸ヲ含ムニ因リヲ含ムニ由テ性甚

收瀋ス下利諸脱血等收瀋藥的當ノ症ニ用フ○體
中各部弛弱ノ諸症頑固ノ下利婦人崩漏白帶下等
ハ鍊性ノ藥ヲ加用テ効多シ喻ハ後方ノ如シ

收欽没石散 血石 末 没食子 末 各一兩

右合和ノ散劑トシ指環ニ一抄宛舍利別ニ加一時
毎ニ服ス○間歇熱飲食消化シ難ク酸敗液多キ症
ハ此藥ヲ以テ幾那ニ代用ノ熱ヲ増發セス良功ヲ
奏シ且胃虚罷ノ酸敗液ヲ生スル故ニ胃ノ纖維ヲ

收固強壯ノ熱毒ヲ驅逐セシム。但初發ニ用レハ胃腸ヲ壅塞シ病毒ヲ閉澁ス。故ニ能熱毒ヲ驅除ノ後用フヘシ服量末トシ半錢ニテ用フ○外敷ノ虛弱ノ潰瘍寒壞疽等ニ此藥四錢ヲ水煎メ十二弓ヲ取リ服メ大効ヲ稱ス○此末ヲ家猪脂ニ研和メ軟膏トシ盲痔ノ劇痛孕婦ノ痔痛脱肛等ニ擦テ甚驗アリ又槲皮主治ノ諸症ヲ治ス

〔依〕〔叔〕〔華〕〔淫〕

樺

カバノキ和ミタラ羅ミルケンボム蘭

〔試効〕春月新芽生スル頃幹ノ上部ニ一孔ヲ穿テ管

ヲ挿シ壘ヲ接シ置ハ水ノ如キ津液滲溜ス是ヲ細頸硝子壘ニ入テ充シメ其上ニ新鮮ノ阿利襪油ヲ上口ニテ充テ固封シ冷處ニ貯ハ大氣竄透セス一年モ損敗セス○此液淡味ニメ其氣微嫌ヘシ。枝ヲ伐テ出ル液ハ微酸ヲ帶フ此液。日九比或十比出ト云○内服メ小便ヲ利シ血中汚液ヲ淨除シ微瀉利ノ効アリ。水腫及黃疸ニ治驗多シ○此液石鹼質アリテ能鬱毒ヲ疏解シ皮表ニ驅發メ瘡疹ト爲ス。故痛風傷冷毒痛。肢節拘急不遂或神思鬱憂病。勞瘵等ニ効ヲ稱ス○疥癬類。汚穢瘡瘍。總テ癢痒諸惡

瘡ヲ驅發メ治シ面部小胞汚斑ヲ消ス○石淋結石
ヲ挫泄スル一良藥トス毎日一盞宛服ス○失芍兒
陪苦ヲ治シ漱藥トメ斷頸ノ潰爛ヲ淨刷ス○此液
殺蟲ノ効ヲ稱ス毎日服メ多ク蟲ヲ下ス葉ヲ越幾
斯劑トシ服シ或此樹皮ヲ黑灰トシ小兒ノ臍ニ貼
メ蛇ヲ下ス○木材皮葉皆水煎シ内服外敷メ鬱毒
ヲ驅發シ汚血ヲ淨刷スル此液ノ如シ○嫩葉ハ
殊黃疸ニ効アリ一老婦數黃疸ヲ患毎發卒ニ心下
苦悶惡心嘔吐發熱右脇下刺痛シ終ニ下利ス每次
擘ノ嫩芽ヲ麥酒ニ煮テ服シ治ス然レ無幾復發ス

因テ軟化ノ吉利詞參兒ヲ施シ阿利襪油ト醋ヲ合
メ胃部ト右脇下ヲ蒸湯シ毎日甘扁桃油ヲ與テ勉
テ攣急ヲ縱弛シ拘痛ヲ緩解ス是ニ由テ大便幾多
ノ結石ヲ通メ全愈セリ是膽若ハ總管ニ結石窒塞
メ攣急セル者緩解メ通泄スルナリ○或云葉ヲ炒
テ末トシ水ヲ加テ灰汁トシ顛顛ニ擦スレハ鬚髭
ヲ生セス○擘楠ハ止血藥トス創ノ出血痔血等ニ
外敷シ衄血ハ其末ヲ鼻中ニ容テ治ス

秦皮 フラキシニス 羅 エッセンボームエス 蘭

試効樹ノ裏皮。白色。乾ハ黄色ヲ帶フ。味苦。收瀉ス。汗ヲ發シ小便ヲ利シ。間歇熱ニ偉効ヲ稱シ。是ヲ以テ幾那ニ代用ス。煎劑泡劑トシ。或散劑トス。○木材性收瀉。末トシ貼ノ創ヲ愈シ。出血ヲ止ム。或云煎劑トシ用テ微毒ヲ治スル。朴窟福烏篤ノ如シ。○或云此樹ヨリ出ル汁。蝮蛇咬ノ解毒藥トシ大効アリ。是ヲ内服シ葉ヲ創ニ貼ス。○或云綠枝ヲ取り焙ハ津液其端ヨリ流出ス。是ヲ耳中ニ滴メ傷冷毒ノ耳聾ニ速効アリ。○子ハ小便ヲ利シ水腫ヲ治ス。或云此子。毎朝半錢ヲ葡萄酒一盞ニ加服メ速ニ小便ヲ利

シ水腫黃疸ニ試効多シ 伍 叔 淑

檀香 「サングラム」 羅 「サन्देल」 ホウト 「蘭」

○按ニ檀ハ總名ナリ。印度「サングラム」「サングラナコ」ト名ク。漢人はラ音譯メ旃檀。攪檀。真檀ト稱ス

白檀 「サングラム」 アルビム 「羅」

黄檀 「サングラム」 シトル 「羅」

產地 二種アリ。一種ハ印度地方。殊ニ地木兒嶋ニ夥ク産シ。又馬路古諸嶋 「共」 印度地方。南海嶋瓜哇邊ノ嶋ニ産ス。一種ハ亞墨利加洲ニ産ス。

〔形狀〕印度地方ノ樹ハ高胡桃樹ノ如ク數枝ヲ分。葉
 十字樣ニ對生シ。梨葉ノ如ク綠色。長四指橫徑許。潤
 三指橫徑許。老樹葉黃色ヲ帶フ。花單瓣。鐘樣四出。點
 紫色。八雄蕊。一雌蕊。實ハ櫻子及老利兒實ノ如シ初
 綠。熟ノ青黑色。味淡ナリ。○亞墨利加地方ノ產ハ樹
 大約一丈五尺許。枝ヲ分チ。葉橢圓。末微尖リ黯綠光
 澤。長三指橫徑。葉本花攢簇ノ車輪狀ヲ爲シ芳香愛
 スヘシ。六瓣。五雄蕊。或云六雄蕊ノ者多シ一雌蕊。萼六出。子圓
 微稜アリ紫色。二室アリ。卵圓ノ仁ヲ收ム。○樹幹ノ
 中心ハ黃檀トシ表材ハ白檀トス。本草啓蒙云黃色ナルヲ白檀ト呼

ヒ油色ナルヲアブラキト呼ヒ共ニ上品トス。是黃
 檀ナリ。外白ノ者アリ。白キハシラト呼
 トス。○黃檀ハ重實ノ光澤淡黃或曇黃色或微赤
 理ヲ帶フ。味微苦。佳香アリ。摩擦シ若ハ截ハ芬香ニ
 ノ薔薇。麝香。枸櫞ノ香氣ヲ合スル如シ。或云根亦香
 トス。或黃色。鷄子黃ノ如ク微赤ノ脉理ヲ帶テ烈香ア
 ルヲ上品トス。○白檀ハ白色重實ニノ微香氣アリ
 或香味ナシ。○生樹及新ニ伐者ハ香氣ナシ。乾ニ隨
 ヒ香生ス。○或云地木兒嶋ノ嫩木ハ白色ニノ香氣
 ナシ。年ヲ經ニ隨ヒ中心黃色トナル。或云地木兒嶋
 ノ北地ハ多ク黃檀ヲ產シ支那及印度諸國ニ輸ス

○或云瓜哇嶋ノ産ハ皆白檀ニ下品多シ

試効 白檀黄檀共ニ用フ。黄檀尤効アリ。○血液ヲ稀釋シ汗ヲ發ス泡劑トシ用テ胃寒傷冷毒ヲ解散ス。微毒ニ水煎トシ用テ汗ヲ發シ小便ヲ利シ其諸症ヲ治ス。或云杜松木ノ如シ。○頭腦ヲ健運シ精氣ヲ活潑シ頭眩眩冒心動悸ヲ治ス。○稠血ヲ稀釋シ脾病依剝昆垤兒ニ効ヲ稱ス。○一錢半ヨリ二錢ヲ取煎劑トス。或末トシ一錢マテ用フ。○此藥佳香ヲ賞シ多ク香料ニ用フ。○水ニテ黄檀ヲ蒸餾シ油ヲ取ル。冷レハ稠厚トナリ香氣龍涎香ノ如シ。燒酒ニテ蒸餾スレ

ハ佳香ノ華爾斯出ツ。皆香料ニ用フ

紫檀 「チタン」印度地方通稱 「チヤンタン」左ンタン

印度地方通稱 漢人音譯紫檀 「チヤンタン」左ンタン

穀羅滿垤兒等印度沿海地方ニ産スル一種ノ樹ニ

ノ檀木類ト異ナリ性收瀉止血藥トシ或下利血痢等諸失血ニ丹服外敷ス **依叔華** **叔僕**

乳香 「マスチキ」マスチクス **羅**

形狀 乳香樹 ピスタシア 灌木多枝柔撓

柳枝ノ如シ。皮灰白。伐サレハ中等ノ樹トナル。葉兩

對甘草葉ノ如シ冬月凋ハス硬固黯綠梢一葉ナシ
莖帶赤佳香味收瀋微酸或葉ニ小囊生シ裏ヨリ蛾
飛散ス葉本細花攢簇ノ穗ヲ成シ苔ノ如シ淡紫或
赤色ヲ帶フ子大豌豆ノ如シ初綠熟ノ紫赤終ニ黑
色酸味ヲ帶フ或云花ハ子ヲ結ハス別ニ枝條ニ生ス油多シ核黑色微
長裏白仁アリ○此樹印度南海西阿嶋ニ多生シ上
品乳香ヲ輸ス又意太里亞伊斯巴尼亞西齊里亞蘭
牛鐸古福撈察波爾杜瓦爾ニ産ス○樹幹ヲ鑽刻ノ
華爾斯流滴シ顆粒ヲ成ス或云葉ヨリ亦滲出ス大小一ナラ
ス上品ハ乾固疏脆ニノ破碎シ易ク汚物ヲ雜ヘス

半透亮淡黄色光澤味微收瀋香氣アリ嚼テ粘著シ
雪白色トナル火ニ投メ佳香アリ擬脂松香ヲ雜ヘ
偽造スル者ハ焚メ松香氣アルヲ以テ知ヘシ
試効性收瀋酷厲毒ヲ緩和シ疼痛ヲ止メ吐血赤痢
下利ヲ治シ健胃ノ効アリ○冒寒傷冷毒ノ咽喉胸
肺諸症痰欬等ヲ治ス○痛風傷冷毒痛齒痛ヲ治シ
口中斷顎ノ潰瘍ヲ淨刷メ乾愈ス嚼テ齒斷ヲ固メ
口臭ヲ去ル○末トシ一乃宛飲液ニテ送下ス或是
ヲ火ニ投メ薰藥トス依物叔 叔華

阿沒勒 「カシア」「カシア」ヒス「ユラ」

產地 厄日多黑地兀皮亞 共亞弗利百兒西亞亞辣比

亞西里亞瓜哇麻刺拔爾 共亞細亞二產ス。亞墨利加

洲ノ安知列諸嶋ニ夥産スレヒ皆下品トス

形狀 此樹 是亦「カシア」ヒ 幹枝葉共胡桃樹ノ如シ葉

橢圓ニシテ尖リ滑澤大抵一莖五對著キ 或ハ六對長胡桃

葉ノ如ク或莖梢刺トナル花薔薇様五瓣黄色數多

攢束シ或長穗一尺半許懸垂ス十雄蕊一雌蕊 第十

目一花後莢生ス圓長一二尺許最大ナルハ三四尺許

太拇指許或直或勾 「カシア」 横理及兩縫際アリ初綠漸熟

硬固赭黑周歲凋落セス數個懸垂ス是阿沒勒ナリ。

其莢ヲ割ハ膜様ノ横隔數房ヲ爲シ各黑赭色ノ髓

アリ是ヲ藥用トス髓中核アリ扁圓微尖黯赭色○

新鮮上好ノ莢ハ黑赭滑澤充實ノ重ク蛀刺ナク振

テ響鳴ナシ鳴者ハ髓枯燥シ或腐敗ス髓ハ腐敗シ

易キ故ニ新鮮ノ品ヲ擇ヘシ○上好ノ莢ヲ割ハ髓

粘潤黑色光澤アリ軟ニシテ流動セス乾枯セス味甘

毫モ酸味ナク澁敗セス微臭ナシ○姦商陳久乾枯

ノ莢ヲ水ニ浸シ膨脹メ響鳴ヲ止販ク者アリ故ニ

割テ驗スヘシ○其髓ヲ取ニハ莢ヲ温湯ニ浸シ髓

ヲ取テ鉢ニ入、木杵ニテ搗爛シ、毛布ニ入、沸湯少許加テ匙ニテ徐々ニ押擦テ透漏セシメ適宜ノ稠ト爲ス。但是ヲ煮テ製スルト勿レ其味變敗ス。或沙糖ヲ加、舍利別ト爲セハ貯テ速ニ腐敗ス。

〔試効〕 髓味微甘清爽粘滑。輕瀉下シ小便ヲ利シ血ノ運行大過ヲ抑制シ、焮熱ヲ涼解シ。膽液腐敗ノ酷厲毒ヲ疏滌シ、焮衝性ノ熱病ニ用テ清涼緩下ノ良藥トス。性効答末林度名ノ如シ。又腎膀胱ノ病ニ効多シ。○服量一弓ヨリ二弓ニ至ル。或他藥ニ加用フ。小兒ハ一錢ヨリ三錢ヲ與フ。或溫湯若ハ煎劑ニ溶用

或瀉下、吉利詠參兒トシ良効ヲ稱ス。但是ヲ用テ腹痛、風氣痞悶スル者ハ適宜ノ香竈藥或中和鹽類ヲ加ヘシ。○或云此藥性、梅李肉ノ如シ熱國人ハ每日食前ニ一匙宛用テ燥涸ヲ滋潤ス。○胃腸熱ノ膽液酷厲毒ヲ滌除スルニ是ヲ下劑ニ加テ殊効アリ。喻ハ後方ノ如シ。

〔阿黃涼解飲〕

- 阿沒勒髓 各一弓
- 答末林度 各一弓
- 大黃末 一錢
- 蘇甘沒扭護名 八分

右調和ノ煉膏トシ瀉下ノ多少ニ隨ヒ半時若ハ四

分時每一卵匙宛用フ

〔華〕〔淑〕〔叔〕
〔窓〕〔依〕〔伍〕

落葉松耳

〔エ〕ブルリコ通稱
〔ア〕ガリコス羅

○搭按ニ蝦夷產落葉松ノ栴ナリ藥舗〔エ〕ブリコト呼販ク。西說云、大者人頭ノ如ク小者拳ノ如ク上面白黃緒ノ輪紋アリ下面遍針眼アリ上品ハ裏雪白輕虛味苦辛嘔スヘシ。外膜ヲ去曝乾ス。極細末ト爲ニハ亞刺比亞蘆漿或糊漿ヲ加搗テ泥ト爲シ乾固ノ研末ス

〔試効〕性收瀉粘液留飲。膽液ヲ瀉下ニ小便ヲ利シ經

閉ヲ通ス○痛風傷冷毒痛ノ諸症及冒寒傷冷毒ノ粘液湧乙。頭胸ニ壅塞スル諸症ヲ治シ神思鬱憂病。脾病。黃疸ノ汚液ヲ疏滌ス○散劑ハ半錢ヨリ一錢用テ瀉下ス或泡劑。浸劑トシ或越幾斯劑トシ二月マテ用フ。但速ニ瀉下セス。惡心腹痛スルヲアル故ニ桂。丁香。乾姜。益智等ノ香竄藥ヲ加用ヘシ○或云此藥。漏汗ヲ止ニ殊効ヲ稱ス。勞瘵様ノ消耗汗亦止ム。功ナキ症ハ幾那ニ乳汁ヲ兼用ノ良〔依〕〔伍〕

檉柳

一名御柳

〔タ〕マリクス
〔ガ〕ルリカ
〔タ〕マリクス
〔タ〕マリクス
〔タ〕マリクス
〔タ〕マリクス

〔試効〕樹皮及根ヲ用フ。材及葉亦効アリ性收瀉ス。汚液ヲ淨刷シ小便ヲ利シ風氣ヲ驅散ス。○內藏壅塞諸症。痞氣鬱塞脾病白帶下。水腫。黃疸ヲ治ス。○疥癬。乾癬。禿瘡。等總テ皮膚ノ諸症ヲ治ス。水煎再服ス。○含漱劑トシ齒齦潰爛ヲ治ス。○或云此材ヲ水煎シ微毒ヲ治スルヲ剝窟福烏篤ノ如シ。

依僕伍叔物

新訂增補和蘭藥鏡卷十六 終

