

增新訂
補和蘭藥鏡

卷十七

武
856
18-17

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號一六一第書托寄
號 9 第
冊 17 第



門 武 9
號 856
卷 18-17

新訂增補和蘭藥鏡標目

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十七

木賊

拳參

麥奴

蘭草

山箭菜

碎米薺

水蒿苣

艾根

艾葉

拳參健胃丸
劑 拳參丁幾劑
黃參收飲丸

拳參越幾斯

蘭橙解疑飲

附沙蘿蔔
山箭菜舍利別
碎米薺昆設爾弗
山箭菜精
同上複方
同上複方
昆設爾弗

藏書

大正十年九月廿四日
內田糸子氏贈

新訂增補和蘭藥鏡

卷十七

標目

藏書

石松

石松驅屎飲

柳葉菜

大蓼

大蒜

葫橙驅水飲

忽布

忽布越幾斯劑
忽布丁幾劑

麥

木

香

增訂和蘭藥鏡對目

新訂增補和蘭藥鏡卷十七

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕 榕菴枝補

木賊

「エグイセ」ム

羅

「パールデスタルト」ヘルムース

蘭

○榕按ニ「エグイセ」ムハ統名ナリ此類七種アリ其第二種ハ問荊「エグイセ」ム第六種ハ木賊「エグイセ」ムハ峻ナリ又木材及鉛錫等ノ器械ヲ琢磨スルニ用フ麻黃節カハラトクリ菜亦此類ニ屬ス本草綱目啓蒙云今梓人用者ハ鹽湯ヲ以テ略煮過シ乾シタル者



故ニ藥用ニ堪ス生草ヲ乾シ用ヘシ

試効 此藥往古多ク用レ_レ 臣晚近久廢セリ。然_レニ近時
勿能_レ 獨_レ 都_レ 府_レ ノ大學師連_レ 忽_レ 蹟_レ 名_レ 是_レ ヲ質驗ノ利尿ノ
峻藥トシ和蘭ノ醫家はニ從テ試用シ逾世ニ唱明
セリ。此種類皆利尿ノ功アレ_レ 臣問荊ハ性緩木賊ハ
峻ナリ。過用スレハ尿血ヲ發ス。戒慎メ用ヘシ○此
藥血ノ運行及_レ 神經ヲ觸動セスメ小便ヲ驅泄シ性
收瀼_レ ノ保固強壯ノ効アリ。水煎スレハ收瀼苦味ア
ルヲ以テ知ヘシ。尚施用ノ標準ヲ左ニ舉ク**第一腎**
藏衰弱メ小便分泌ノ機力減損シ發スル水腫。小便

閉ニ用フ**第二腎**中血管虛弱ノ能血ト尿ヲ分泌セ
ス尿血ヲ發シ小便帶黑色ノ血ヲ雜ル症ヲ治**第三**
腎ノ分泌力及_レ 尿道諸器通利ノ機力共ニ減損シ若
ハ廢弛スル症ニ用フ。此藥啻ニ小便ノ分泌ヲ増進
スルノミナラス尿道諸器ノ纖維ヲ收固シ小便ノ
健輸力ヲ獎起スレハナリ**第四腎**輸尿管膀胱ニ粘
液沙石等壅積スルヲ驅泄スルニ用フ是ヲ用レハ
小便分泌甚増進ノ其壅滯セル汚物通利シ腎膀胱
ノ結石ヲ防制ス**第五表發**ノ蒸氣壅塞スル症或發
汗過多ノ症ニ用フ蒸氣壅塞ノ症ニ用レハ小便ヲ

利ノ蒸氣ニ換へ内鬱セル病毒汚液ヲ排泄ス。故ニ
 瘡瘍ノ内攻遷延傷冷毒痛痛風等ニ効多シ發汗過
 多ニノ虚罷セル症ニ用レハ小便ノ分泌ヲ増進ノ
 皮表ノ分泌ヲ減損シ其津液ヲ引テ小便ニ導泄シ
 汗自ラ止ム**第六**蒸氣管及_レ噲收管ノ機力虚衰ノ洩
 心様ノ水液壅滯シ發スル水腫ハ効驗他藥ニ超越
 セリ。殊ニ瘡瘍内攻麻疹赤斑瘡羅斯一種ノ後發スル皮
 水水。皮肉間ニ及_レ内部ノ諸水腫ニ治驗多シ但腦水
 腫ハ効ナシ**第七**凡_レ焮衝ナキ諸病自ラ其毒分泌メ
 小便ニ排泄スヘキ症殊ニ其小便少キ症ニ用フ○

此草或散劑トシ用フ然_レ水煎劑ヲ尤佳トス。二錢
 ヨリ三錢マテ水十弓ニ煮テ濾過シ小兒ハ一時毎
 ニ一二匙。大人ハ半茶碗宛與フ○此藥ヲ禁スヘキ
 症**第一**焮衝諸症。殊ニ腎焮衝ニ害アリ**第二**小便過
 多。尿崩。尿血等**第三**尿道諸器ノ膿瘍。硬結腫。癌腫等
第四患者大ニ虚脱シ或諸液脱泄過多。虚憊羸瘦ノ
 症。勞瘵様ノ脱汗。虚脱ノ下利等ハ是ヲ禁ス○或云。
 此藥收瀼利尿ノ効ヲ以テ内外諸部ノ潰瘍。創傷。吐
 血。下利。赤痢。下血。崩漏。白帶下。乾效。等ニ泡劑煎劑ト
 シ與テ良驗ヲ稱ス。搗貼ノ諸創ヲ愈シ神經傷ヲ治

ス
〔家〕〔僕〕〔伍〕
〔淑〕〔叔〕

拳參

「イブキトラノオ和」
「ビストル夕羅」
「ナテルタル」
「搭按ニ拳參山野ニ多シ採用フヘシ藥鋪金線重樓ト呼フ然レ陳久ニノ藥用ニ堪ハス」

〔試効〕

根ヲ用フ。性効篤爾。面室刺〔名〕ト同シ。○秀偉ノ收瀆藥トス。諸管纖維弛緩ノ虛罷セル諸病。殊遷延。溶崩下利。水瀉。失血。稀液脫泄ノ諸症ヲ治ス。○尿道ノ滑液剝脫ノ小便淋痛及經久無毒ノ淋疾白帶下ヲ治ス。○間歇熱。腐敗熱ニ此藥ヲ對症ノ劑ニ加用。テ偉功ヲ稱ス。或云健質亞那〔名〕ヲ加。日三錢宛用。テ

効力殆ト幾那ノ如シ。○右ノ諸病後方治驗多シ

〔拳參健胃丸〕

拳參 根細末 一錢

健質亞那〔名〕越幾斯劑 三錢

右研和シ三氏ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ一時毎ニ六丸宛服ス。○汗過多ヲ止ルニ收瀆強壯劑。的當トス。後方良驗アリ

〔黃參收斂丸〕

拳參根 越幾斯劑 一錢半

大黃 一錢 明礬 半錢

百藥煎 二錢 石榴花 末 一錢

右研和ノ三爪ヲ一九トシ石松粉ヲ衣トシ半時毎ニ四丸宛服シ或症ニ隨増減ス

服量散劑ハ一錢ヨリ三錢ニ至ル。或煎劑ニ加或苦

味越幾斯劑ニ加テ丸藥トシ或越幾斯劑トシ用フ

○煎劑ハ根一弓水煎ノ十二弓或十六弓ヲ取用フ

拳參根越幾斯劑 **製法**健質亞那越幾斯劑(名)ト同シ

拳參根丁幾劑根ノ細末ヲ取十五度燒酒八倍ヲ加

硝子壘ニ入固封シ煖處ニ置キ浸下八日渣ヲ去貯

フ○此根外敷ノ斷ノ腐爛ヲ治ス。咽喉潰瘍ハ漱藥

トシ尤効アリ (依福家) (叔淑涅)

麥奴

セカレコルヌタム 羅 ムドール コーレン ゲホルン デ ハ 子 ス ポーレン 蘭

雨濕多キ年ハ穀類殊稗麥ノ穗中黑青色ニノ裏青

白ノ禾粒生ス長四五分濶一二分許圓或方ニノ勾

屈シ偏面隆起シ柔ニノ味辛ヲ帶嫌惡スヘシ乾ハ

氣味消散ス

性毒アリ過服シ或長服スレハ寒戰惡心嘔吐瀉下

腹痛昏睡顔色黯赤謔妄痙攣瘧疾羸瘦或各部乾枯

死壞或腐敗溶崩ヲ兼ル危險ノ惡症ヲ發ス

試効獨乙都和蘭波羅泥亞(歐羅巴)等ノ產婆是ヲ用

テ臨産痛ヲ催起スル一良藥トス。然レ氏應當ノ症ヲ
 的識セス安ニ過用シ多害ヲ致故ニ世人是ヲ忌避
 シ久廢棄セリ。然ニ近來北亞墨利加洲ノ内科及拂
 郎斯^{ランス}諸厄利亞^{アリア}獨乙都^ド和蘭ノ産科專ラ是ヲ經試シ
 臨産痛ヲ誘發シ子宮牽縮ノ努力ヲ進メ分娩力ヲ
 扶ニ從來未曾有ノ殊効ヲ顯知セリ。然レ氏經驗未久
 カラサル故ニ尚逾試用ノ其性効ヲ確知セントス。
 乃從來質驗セル標準ヲ左ニ舉ク

第一尋常平順ノ分娩ト雖モ全體若ハ子宮虛弱ニ
 ノ臨産ノ陣痛微弱怠慢ナル症ハ是ヲ用フ。但子宮

口開^ク一達爾^{ダール}垚^{ダール}兒^ル 西洋錢ノ名。○十ノ大若ハ尚多
文錢ヨリ差大

ク開ニ至テ用ヘシ否サレハ徒ニ分娩ノ努力ヲ誘
 發シ子宮ノ全圍頸口牽縮メ胎兒ノ墜下ヲ阻遏シ
 終ニ子宮破裂ノ危險ニ至ル**第二**分娩ノ努力緩慢
 ニノ陣痛ナキ症ニ用體稟強實ニノ粘液質ノ人或
 耽淫虛耗ノ者間此症アリ**第三**死胎下サル症ニ用
 フ。既ニ死胎ノ常候ヲ見スハ此藥ヲ用テ子宮牽
 縮ノ努力ヲ獎起シ死胎ヲ下メ母體ヲ救ヘシ**第四**
 臨産中胞衣早ク離脱スルニ由テ崩血スル症ニ用
 フ。胞衣子宮口ニ生著スル症ニ非ハ此藥ヲ與テ

子宮牽縮スル片ハ胞衣自ラ壓塞ノ脫血速ニ止ム
第五分婉後ノ脫血胞衣ノ一處離レ若ハ全ク離脫
 スレトモ子宮ノ牽縮力緩慢或自餘牽縮シ難キ妨患
 アルニ由テ發スル症ニ用フ是ニ因テ子宮ノ牽縮
 カヲ増進シ胞衣ヲ自ラ離脫シ且驅出メ子宮遍
 ク縮收シ危篤ノ諸症ヲ免シム**第六**胞衣ヲ下スニ
 用フ諸病自然ノ良能ニ因リ療術ヲ假スメ治スル
 者多ト雖モ產婦ハ特醫術ヲ以テ胞衣ヲ下スヘキ
 症アルト毎ニ產科ノ知所ナリ其症中此藥ヲ試用
 テ良驗ヲ得ヘシ**第七**臨産中子宮口能開キ胎膜破

ル片ハ催生ノ爲ニ此藥ヲ用ヘシ○此藥ヲ禁スル
症第一子宮口閉塞スル者**第二**產婦多血ニノ血多
 ク子宮ニ運輸スル症ハ瘀血適宜ニ通泄ノ後此藥
 ヲ用ヘシ**第三**子宮ニ一種ノ膜囊アリテ胞衣ヲ包
 容スル者**第四**纖維様ノ膜ニテ胞衣ト子宮連結ス
 ル者**第五**神經諸症。痙攣搐掣。胃痙。攣急。嘔吐アル症
第六傷冷毒痛。子宮痙アル症**第七**漿水甚少ナキ症
第八子宮燉衝アル症**第九**子宮下墜反覆若ハ位置
 枉斜ノ症**第十**孟脊骨腸骨骨ノ空間甚狹窄殊ニ其骨ノ接合
 窄小ナル者**第十一**體稟薄弱感觸已甚ハナシ者**第十二**

全體甚弛緩ノ惡液質ノ者第十三胎兒畸形若ハ頭水アル者第一第三第四第九第十第十三ノ症ハ皆産科手術ニテ探知ヘキ者

服量散劑トシ六氏ヨリ半錢マテ一服トス○泡劑ハ二錢ヲ沸湯ニ泡出シ濾テ四弓ヲ取四分時毎ニ一匙宛服ス○煎劑ハ一錢ヨリ二錢マテ水煎シ濾テ三弓若ハ四弓ヲ取り。八分時或四分時毎ニ一匙宛服ス宛

蘭草

フデバカ和 エウパトムムカン
ナビス羅 プール ケンス コロイド蘭

試効莖葉穂ヲ用フ。味苦辛○虛弱ヲ强健シ諸藏壅

塞殊肝膽脾ノ鬱結硬腫ヲ疏解シ依剝昆垓兒經閉ヲ治ス○黃疸及水腫ニ甚騷アリ殊胃腸酸敗液アル症ニ良。橙皮酒石鹽ヲ加テ尤効アリ喻ハ後方ノ如シ

蘭橙解凝飲

蘭草穂

二弓

葛斯加栗刺補

一弓

右水適宜ヲ加慢火ニテ徐々ニ煮減ノ十四弓ト爲

シ濾テ滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

新橙皮舍利別鏡

二弓

酒石鹽

四刀

右調和シ一時毎ニ一茶碗宛服ス依○間歇熱ニ此

藥ヲ對症ノ劑ニ加水煎シ服メ効ヲ稱ス○失苟兒
陪苦ノ一良藥トス。是ヨリ發スル脚腫潰瘍。其他瘡
瘍。疥癬。赤疹。癢痒。腐爛ノ創傷。腐骨疽等ニ丹服外敷
ノ排膿淨刷シ乾愈ス 依 叔

山芥菜

ワサビ和 ゴクレアリアオヒ
シナリス ゴクレアリアアルブロード 蘭
附 沙蘿蔔 ゴクレアリアアルモラシ ア ラ パ ヌ ス
メ ス チ カ ヌ ス ス 羅 ベ プ ル ワ ルト ル
メ ル ラ デ イ ス ミ イ
リ ク ス ワ ルト ル 蘭

○榕按ニゴクレアリア藥用ノ者二種アリ其一
種ハゴクレアリアオヒシナリスト名ク圖說ヲ

按スルニ花葉ノ形狀氣味山芥菜ト同ノ根細シ
和産ノ根肥大ナル者ニ似ス是土性ニ係ル所ト
ス今菜舗販者ハ甲斐駿河等山澗ノ地ニ出是ヲ
菜圃ニ移植レハ莖葉甚長茂メ根漸瘦細終ニ鬚
根トナリ辛味減スルヲ以テ知ヘシ然レ葉頗辛
味アリ鹽醃賞スヘシ。此藥專ラ莖葉ノ辛味ヲ稱
シ用ル故ニ菜舗ノ山芥菜根ヲ藥用トスヘシ隨
地得易クメ便利トス○其一種ハゴクレアリア
アルモラシアト名ク先輩沙蘿蔔ニ充ツ花葉ノ
形狀能似テ根ノ形穩當ナラス蓋其類ナリ。和蘭

二其根ヲ用性功全山萐菜ト同ト云故ニ是亦菜
舖ノ山萐菜根ヲ以テ藥用ニ充ヘシ

〔試効〕山萐菜氣味辛辣竄透ノ鼻ヲ刺戟ス鑽透ノ揮
發油ヲ含ム故ニ燒酒ニ浸メ精氣出テ水ヨリ多シ
○溫暖開達稀釋利尿清血ノ効アリ失苟兒陪苦ヲ
治スル聖藥トス性効沙蘿蔔ト同シ纖維縱緩諸液
稠粘ニメ壅塞ヲ兼ル諸症ハ殊ニ捷効アリ○此藥
能小便ヲ利シ水腫粘液腫萎黃病黃疸ヲ治ス○脾
病依剝昆垺兒ノ一良藥トス能內藏ノ惡液ヲ疏解
ノ排泄ス○寒粘液質ノ人ニ適應ス熱性乾燥ノ症

ニ用レハ血液ヲ衝動シ焮熱ヲ誘發ス故ニ此藥
清涼藥ヲ兼用スルヲアリ○生菜ヲ嚼服シ或其絞
汁ヲ啐垺名ニ加服シ或昆設爾弗舍利別トシ或燒
酒ニ浸シ或燒酒ニテ蒸餾メ精ヲ取或麥酒若ハ乳
汁ニ浸シ服ス但右ノ諸劑新ニ製シ用フヘシ日ヲ經
ハ揮發精消散メ効ナシ○煎劑ハ効ナシ氣味蒸散
メ苦味ヲ帶レハナリ○左ノ製劑皆前說ノ諸病ニ
通用メ良驗ヲ稱ス

山萐菜精 スピリ左スコクレアリア羅

山萐菜 花アル生 草四弓 沙蘿蔔根 一匕

燒酒 十五度者 五比

右二味燒酒ニ浸シ蒸餾ノ其精十度トナルニ至テ
休ム服量半錢ヨリ一錢半マテ對症ノ劑ニ加服ス
漱藥ハ二錢ヨリ一弓ニ至ル

山箭菜精 複方

アムアンテスコルブチカシデン
ハミセルヒシアスコルブチカ

山箭菜

花アル生草

薄荷

乾者

撒爾非亞

乾者 四十弓

橙皮

生鮮者 六弓

肉豆蔻

四錢

麥酒

三比

蒸餾水

九比

右五味剉搗碎キ浸テ三日。蒸餾ノ精六比ヲ取ル。服

量一二匙宛與^ル一日三四次

山箭菜舍利別

セイロプスアンテ
スコルブチクス

山箭菜

絞汁

沙蘿蔔根

擦屑

碎米薺

絞汁 各二弓

沙糖

十二弓

右攪和シ重湯ニテ水氣ヲ蒸散ノ舍利別ノ稠トシ
又左ノ劑ヲ製メ合和ス

健質亞那

一弓

幾那

苗草

各四錢

右細判ニ水適宜ヲ加煮テ濾過シ十二弓ト爲シ沙
糖一比半ヲ攪和シ文火ニ上^レ水氣ヲ蒸散ノ舍利別
ノ稠ト爲ス。右二劑放冷ノ能合和ス服量日四匙ヨ

リ八匙ニ至ル○此合劑一弓ニ升承一二氏ヲ加經久ノ微毒諸症ニ用テ殊効ヲ稱ス

山萸菜舍利別複方

セイロプスアンテ スコルブチクス

山萸菜

生草 十比

沙蘿蔔根

十三比

碎米薺

生草 五比

桂末

六弓

橙實

熟者皮共ニ細剉ム

一比

燒酒

二十度者 二十比

蒸餾水

八比

右格爾弗ニ入文火ニテ蒸餾シ精液五比ヲ取リ沙

糖十比ヲ攪和シ重湯ニテ水氣ヲ蒸散ノ舍利別ノ

稠ト爲ス○或此劑一弓ニ升承半氏ヨリ一氏ニテ

研和シ經久ノ微毒諸症ニ用テ殊効ヲ稱ス服量日

一弓ヨリ二弓ニ至ル

山萸菜昆諛爾弗

コンセルハアンテ スコルブチカ

山萸菜

生葉 六弓

沙蘿蔔根

碎米薺

生葉 各一弓

右搗爛シ沙糖二比半醋六弓ヲ加攪和ス服量日二

二匙宛用フ

外敷失苟兒陪苦ノ齒斷腐爛出血潰瘍等ニ此草ノ

絞汁ヲ擦シ或山萸菜精ヲ漱藥トシ治ス

沙蘿蔔根巨ク白色多液蘿蔔ニ似テ氣味悍烈辛辣

姜擦子ニ擦ハ竄透ノ眼ヲ刺戟シ肌膚ニ貼スレハ
 發泡ス。乾ハ氣味消散ス。此根及山萐菜。厨房ニ供シ
 辛葷調味ニ用フ。煮食スレハ微甘ヲ帶。蕪菁根ノ氣
 アリ。試効根。溫暖。開達。稀釋。利尿。清血ノ効アリ。失苟
 兒陪苦ノ聖藥トス。性効山萐菜ト同シ。絞汁ヲ舍利
 別トシ。或麥酒ニ浸シ服シ。或此根一比。山萐菜葉。碎
 米薺葉各三握。搗碎キ麥酒若ハ葡萄酒ニ浸シ二三
 盞宛服ス。○水腫。粘液腫ニ用テ能小便ヲ利シ。結石
 ヲ碎キ腎痛ヲ治ス。根ノ絞汁ニ沙糖ヲ和シ服ス。或
 舍利別トシ。或碎米薺葉ヲ加。麥酒ニ浸シ日二三盞

宛服ス。○喘急。頑固ノ效嗽。疫效。粘液壅滯ノ聲啞ス
 ル症ニ用テ膠痰ヲ稀釋シ咯出セシメ治ス。根ノ絞
 汁ニ沙糖ヲ和シ舍利別ノ如シ服ス。○腹部ノ壅塞
 ヲ開達シ寒粘液壅滯ノ食進ニス消化シ難キ遷延
 ノ諸症ヲ治ス。○遷延ノ痛風。傷冷毒痛。歷節痛ニ此
 根ヲ乳汁ニ煮テ服シ溫覆發汗スレハ劇痛解散ス。
 或細剉ニ毎朝一匙宛。杜松實煎湯六弓ヲ以テ送下
 スル。一二月許。劇痛漸休ム。失苟兒陪苦亦是ヲ服ノ
 治ス。○傷冷毒痛。頭痛。昏睡。粘液性ノ睡症等ハ根ノ
 擦屑四錢許ヲ頭部。項窩。蹠等ニ貼シ發泡ノ効アリ

醋。白芥子。蒸餅母名ヲ加テ尤良。齒痛ハ其齒ニ貼メ

治ス叔依
施物僕涅

碎米薺

「オランダガラシ」和「シヤムブルム」ナス左
ラ「カム、アム、チクム」羅「トトルケル」ス蘭

試効 清血利尿稀釋ノ良藥トス。失苟兒陪苦ニ殊効

ヲ稱ス。沙蘿蔔及結爾斯補ニ比スレハ性緩ナリ。蔬

菜トシ食メ能ク小便ヲ利ス或哮喘ニ加服メ清血藥

トス。絞汁ヲ服メ効カ山薺菜ノ如シ○失苟兒陪苦

ニ碎米薺生草山薺菜生葉各十握。沙蘿蔔根一比。麥酒一

桶六斗八升許浸メ毎日適意ニ服メ治ス又方。碎米薺生絞

汁山薺菜上同各四弓。消石錢一白蜜弓一右合和シ一時每

ニ一小茶碗ヲ服ス。或答末ド林度。甘乳清名適宜ニ加

用フ熱性○碎米薺ハ水腫ニ用テ小便ヲ利シ粘液

結石腎痛ヲ治ス○筋纖維緩弛シ粘液多キ諸病ヲ

治ス。故ニ粘液性ノ睡痲ニ良驗ヲ稱ス○腹丹諸藏

頑固ノ壅塞ヲ疏解シ又驅蟲ノ効アリ○頑固ノ效

嗽及勞效ニ試効ヲ稱ス或云勞瘵様ノ病ニ碎米薺

ト甘乳清ヲ服メ治驗多シ

碎米薺昆設爾弗製法 山薺菜昆設爾弗ト同シ施叔

水高苜

カハチサ和 ベカヒンガ「ヘロニカ、ベカ
豆シガ羅 ベーケボム「ベーケスコイム蘭

試効 生草微苦辛。石鹼質ヲ含、粘液稠血ヲ稀釋シ清
血利尿ノ効ヲ稱シ失効兒陪苦ノ一良藥トス性効
碎米薺ノ如シ生絞汁ヲ服シ或山箭菜。碎米薺絞汁
ヲ加服シ或水煎シ用フ○小便ヲ利シ凝血ヲ疏シ
經閉ヲ通シ。水腫小便閉及黃疸處女病ヲ治シ丹藏
壅塞ヲ開達ス○脚痛風及疥癬等皮上諸症此絞汁
毎日二三弓宛服メ血液ヲ淨刷シ病毒ヲ小便ニ驅
泄シ治ス消石ヲ加服メ脚腫ヲ消ス○肺ノ粘液ヲ
稀釋シ效嗽ヲ治ス○條蟲ニ良効アリ一處女條蟲

ヲ患フ多年。水高苜。山箭菜ノ絞汁ヲ乳清〔密〕ニ加服
スルヲ一月餘。諸症大ニ輕快ヲ得。經久ノ蟲症竟ニ全
治セリ○焮腫、羅斯、小疱赤疹、焮熱ノ搔痒甚キ症。及
顔面汚斑汗齧ニ絞汁ヲ擦テ治ス○痔痛及婦人產
後陰處腫痛等ニ此草ヲ水煎メ蒸濕シ速治〔依〕〔物〕〔伍〕

艾根

ヨモギ和 アルテミシア、ヒルガリ
ス羅 ベイフト「グメイ子アルセム蘭

冬春葉未生セサル頃鬚根ヲ取り土沙ヲ洗ヒ文火
上ニテ速乾シ硝子壘ニ入固封シ貯フ。舊根ハ効ナ
シ每年新ニ採ヘシ

【試効】根鎮瘧ノ一藥トス。巔癩ノ發作前ニ用フ。發過定期ナキ症ハ發作後速ニ用フ。患者ヲ床蓐ニ安臥セシメ其齡ニ隨ヒ根末半錢ヨリ一錢マテ一服トシ稀キ麥酒少許ヲ溫テ送下シ又溫麥酒少許ヲ與ヘ臥床ニ在テ發汗セシムヘシ。但甚厚被シ或爐ヲ設ケ熱蒸ノ發汗セシムルハ害アリ又神思ヲ勞擾セシムルヲ勿レ。右ノ如ク漸次ニ服量ヲ增加全功ヲ得レハ久服ヲ要セス。但焮衝ノ諸症アル者ハ防焮衝ノ治法刺絡下劑等ヲ施シ焮衝治ノ後此藥ヲ用フ。婦人月經アル片ハ通經後ニ用フヘシ。○頑固ノ癩症

ニ用テ速効ヲ見ス。アリ或同症ト雖毫モ驗ナキ者アリ。然レ其病久キヲ經ス或甚神思ヲ勞擾セス或腦質ノ資稟異常ノ原由ナク腦ノ諸器畸形或石アリテ發スル等發過次序アリテ頻數ニ發シ或小女十二歳ヨリ十五歳始テ月更アル頃ノ患者ハ此藥多ク効アリ。蟲ヨリ發スル症ハ殊ニ治驗多シ。○高年ノ人及夜中發スル癩ハ効少ク或害アリ。○或云大ニ神思ヲ勞動ノ發スル呃逆。衆藥効ナキ症ニ此根ヲ用テ速効ヲ得タリ。○通經藥トシ治驗多シ。○艾葉疏解強壯ノ効アリ。緩性ノ通經藥トス。鏡卷十四艾葉アリ參考スヘシ

石松

ヒカゲノカツラ和イコボタム
カラハタム羅ワルフスカラウ蘭

○榕按ニ此草深山幽谷ノ石上ニ生ス。闕ニ逢ハ

蒲黃若ハ松黃松花ヲ代用スヘシ共花ノ葯粉ニ

ノ性効同シ○本綱啓蒙云山中地ニハヒテ生ス

蔓五七尺枝多ク分ル葉土馬驤ニ似テ黃綠色四

月枝梢每ニ穗ヲ生ス玉柏ニ異ナラス

試効此草夏月花穗生シ花瓣ナク黃色ノ葯粉多シ

是ヲ採用フ其質精微ニシテ硫黃華或蠟ノ如ク蒸餾

スレハ油及酸精出テ華爾斯ノ如シ燭火ニ接スレ

ハ爆鳴ノ焰ヲ發ス○收漚乾燥清涼シ硫黃樣ノ効

アリ蒸氣ヲ發シ小便ヲ利ス○近來小便不利ニ此

粉ヲ用テ偉効ヲ稱ス殊傷冷毒痔疾小兒生齒等ニ

發スル小便不利ニ良多後方ノ如ク製シ用フ

石松驅尿飲

石松粉

四錢

過爾托亞舍利別

名 三弓

右沸湯四弓ニ攪和シ半時若ハ一時每ニ一匙宛服

ス○肺傷勞效久効ヲ治シ吐血下利ヲ止赤痢腹痛

ヲ祛ク○此粉ヲ赤葡萄酒ニ和シ服メ下利赤痢ヲ

治シ齒ノ弛弱ヲ固ム○癩瘻搗掣小兒癩症風氣腹

痛ヲ治シ總テ神經諸症ヲ鎮定ス○服量一乃至半錢ニ至ル。或泡劑煎劑トシ用フ○外敷ノ痛風ノ劇痛ヲ寛解シ創傷ヲ愈シ出血ヲ止ム○皮膚剝脱ヲ愈シ乳頭坼裂小兒頭疔等ノ濕爛ニ是ヲ搽ノ速ニ乾愈ス○小兒頭瘡疥癬瘙痒或潰瘍ノ汚液漏泄過多ニモ乾愈スヘキ症ニ外敷ノ治ス○丸藥ノ衣トノ能乾キ且蠟樣ノ粘質アルヲ以テ丸藥ノ嫌ヘキ臭味ヲ消ス

依叔僕
華叔伍

柳葉菜

アカバナ和・サリカリア「リシマシア」
ト多ムサリカリア「ルペル

キバスタールト
キバルネケ蘭

試効 莖葉花根皆用フ○緩性ノ收瀉藥トス。經久ノ下利赤痢下血吐血婦人月經過多等ヲ治ス。虚弱ノ症ハ殊ニ良驗アリ○淹滯ノ下利ハ先下劑ヲ與テ胃腸ノ汚液ヲ淨掃シ此藥ヲ末トシ一錢若ハ其餘日ニ兩次用フ○虛症ノ下利赤痢ニ此末ヲ試用一十人皆的効ヲ得タリ。大抵初下劑ヲ與テ後此末一錢或四片宛朝夕用フ。其病未久ヲ經ス或胃腸虛罷ノ症ハ大抵三四日ニモ治ス。經久頑滯ノ諸藥驗ナキ症ハ三週中ニ治ス。或病毒ヲ驅除スレバ胃腸ノ虛

弱ニ因テ下利荏苒タル症ハ皆此藥適應ス。此症ハ
 幾那亦効アリ○或云遷延ノ下利赤痢ニ此草根ヲ
 水煎シ用ヒ或莖葉花ヲ末トシ用テ皆治驗多シ○
 或云此藥ハ痢疾ニ効アルト他ノ緩和劑ニ優レリ
 末トシ一時若ハ一時半毎ニ一刃宛與或煎劑トシ
 用○或云此藥險重虛憊ノ下利ヲ治スト雖モ惡液
 質ノ人及膿様ノ敗液多キ症ハ是ヲ禁ス。然レ乾葉
 ハ收瀋ノ味微ナル故ニ用テ妨ケス。痢疾亦用テ閉
 澁ノ害ナシ○勞瘵ノ血液焔崩下利ニ用テ其脫泄
 ヲ靜止シ呼吸蹇難苦悶等ヲ寬解ス○外敷ノ創ヲ

愈シ血ヲ止メ。焮腫眼ヲ消散ス

依羅 括伍

大蓼

仙人草和 ケレマチス。エレクタケレマチス。
 ヨヒス。アラム。ユラ。ヨヒス。羅。オプ。スター。ン。デ。
 ケレマチス。チス。蘭。

試効葉及花ヲ用フ此草酷厲侵蝕毒アリ過服スレ
 ハ大瞑眩シ咽喉胃腸焮衝ノ吐瀉腹痛。搐搦昏冒ノ
 死ス○斯篤爾窟^人其他先哲此藥ヲ歷試ノ解凝驅
 散ノ峻藥トシ結爾茂斯密^子涅刺列金硫黃^名共ニ優テ
 殊効ヲ推稱セリ。其經驗說ニ云、微毒夜分劇痛スル
 諸症^{筋膜痛 骨痛等}微毒頑滯經久ノ頭痛等。總テ歷年沈痼

ノ微毒諸症。其他鬱毒潛伏ノ發スル頭痛。硬結腫。腐
骨疽。癌瘡。惡厲淹滯ノ疥癬。浸淫腐蝕ノ潰瘍。等ニ内
服ノ大効ヲ稱ス。○微毒ノ潰瘍。腐骨疽ハ此葉ヲ泡
劑トシ内服ノ効多シ。○一婢微毒諸症ヲ患。一五個
月。白帶下殊甚。且大ナル骨腫ヲ發シ夜中劇痛ニ
堪ヘス。白頭翁等ヲ用テ功ナシ。因テ大蓼葉ヲ濃泡
劑トシ與テ全治セリ。○一處女面部頸胸多ク潰瘍
ヲ發シ臭穢ノ敗血漿流泄ス。亦白頭翁等ヲ用テ驗
ナシ。終ニ大蓼葉ノ泡劑ヲ與ヘ且其末ヲ外敷メ全
愈セリ。其他斯ノ如キ試說多シ。○婦人神思鬱憂病。

頑固ニノ治セズ衆藥功ナキ症。此葉ノ泡劑ヲ長服
メ治スル者多シ。○頑固ノ痛風。傷冷毒ノ諸症。或熱
病毒。瘡毒等排泄セズノ肢節ニ潛結シ腫痛急等
ヲ發スル者ハ此藥治驗多シ。○或云潰爛ノ乳癌失
鳩答名功ナキ症ニ此藥ヲ與テ諸惡症寬解シ殆治
スル者アリ。其他癌樣ノ潰瘍ニ試功多シ。服量葉或
花或加ヲ泡劑トシ四弓宛日二兩三次若ハ四次用フ。○或
葉ヲ越幾斯劑トシ製法失鳩答越幾日一二氏若ハ
三氏ヲ沙糖ニ和シ服ス。○或葉ノ末三氏宛日二三
次沙糖一倍量ヲ和シ用ヒ漸服量ヲ增加ヘシ曾云

增訂本草綱目卷十七 風雲堂藏

害アル症ヲ見ス

外敷 大蓼及女萎「ボタル」バ「和」ギ「ケレ」イ「チス」子「ヒ」効

同シ生葉ヲ貼ノ發泡藥トス○疥癬ニ此草ヲ剉搗

テ阿利襪油名少許ヲ和シ患部ニ擦レハ焮熱腫痛

ノ後速ニ乾愈ス○潰瘍中ノ水棉様肉敗穢ノ肝胝

様肉ヲ消化シ或癌様ノ潰瘍或腐骨疽ヲ兼ル症ニ

葉ヲ搗キ貼ノ排膿淨刷ノ殊効ヲ得ル「ス」斯篤爾窟

布廉「キ」幾「共」人名ニ試說多シ或云乳癌潰爛ノ水棉様肉

アル症ニ乾葉ノ末ヲ摻ノ全愈セリ施淑

大蒜 葫「ニン」ニク「和」アル「タム」リ

試効 球根味辛熱刺戟。侵蝕シ不佳ノ葷臭。阿魏ノ如

シ肌膚ニ貼ノ焮腫發泡ス○酷厲揮發ノ油ヲ含ミ

忤服スレハ其氣速ニ全身ニ普達シ錯透開達稀釋

疏解排泄ノ汗ヲ發シ小便ヲ利ス此根乾ハ油氣消

ノ効力脱失ス過用スレハ血液ヲ衝動シ焮熱ノ酷

厲液ヲ生ス資稟脆弱。觸動シ易ク或惡液壅鬱ノ各

部ヲ刺戟シ或多血壯熱焮熱アル症ハ用テ害アリ。

總テ寒性粘液質ノ人。虛冷ノ症ニ良○殺蟲ノ一良

藥トス蚊蟲蟻蟲ヲ殺シ殊ニ條蟲ヲ驅泄ス。根ノ扁

切二三片ヲ取テ嚼碎カス空心ニ嚙下シ或水ニ浸
メ服シ或細剉ミ水若ハ乳汁ニテ送下シ或乳汁ニ
煮テ服シ或細剉ミ飲食ニ摻ケ用フ諸藥効ナキ症
ニ用テ蟲ヲ驅泄シタナ太ナ那セ設チ黠ム補等ノ苦味殺蟲藥
ニ勝テ殊効ヲ得ル多シ○小兒ノ蟲症ハ此根ヲ搗
爛シ一弓ヲ取テ乳汁十二弓ニ浸シ空心ニ二弓ヨ
リ四弓ニテ服ス或乳汁ニ煮テ沙糖ヲ加甘美トシ
一二盞宛與テ蟲ヲ殺シ大便ニ驅泄ス或此根ヲ水
ニ煮テ搗爛シ泥トシ臍及胃部ニ貼メ亦蟲ヲ下ス
○殺蟲劑ヲ服ノ腹痛劇ク搐搦ヲ發スル者ハ其部

ニ石腦油ヲ擦シ或大蒜亞爾鮮名牛膽ヲ麥粉ニ和
シ餅ト爲シ溫テ布ニ夾ミ患處ニ貼スレハ速ニ治
ス○條蟲ハ此根一二個ヲ細剉毎日空心ニ茶湯或
冷水ニテ送下ス數日連服スレハ其臭氣鑽透メ蟲
ヲ刺戟シ且腸ノ蠕動機ヲ増發シ條蟲腸ニ吸貼ス
ルヲ能スメ自大便ニ下ル○或云大蒜ヲ與ル七日
中二三或四次其後下劑ヲ與レハ蟲下リ治スル
者アリ或每朝大蒜二三個ヲ與ル十日ニメ條蟲ヲ
下ス者アリ○一男子條蟲ノ諸症ヲ患ル多年大蒜ヲ
服スルヲ六個月一旦夥ク其死塊ヲ下メ治ス此類

ノ試説多シ但是ヲ服スレハ時々下劑ヲ兼用ノ蟲
ヲ驅除スヘシ○蟻蟲ハ此根ヲ搗テ湯ニ浸シ其蒸
氣ヲ以テ數肛門ヲ薰スレハ蟲死ノ通泄ス○此藥
利尿發汗ノ効ニ由テ水腫小便閉ヲ治シ殊ニ粘液
性ノ水腫ニ用テ停水留飲ヲ驅逐ス一男子五十歲
許體稟粘液質ニシテ水腫ニ罹リ小便通セス左ノ劑
ヲ服メ治ス此方停水留飲滯積ノ諸症ニ治驗多シ

葫橙驅水飲

大蒜 根 二個 洋芹 生草 一握 橙皮 二錢
右剉葡萄酒十六弓ニ浸シ一小茶碗宛服スル一日

三次○胸水ニ用テ小便ヲ利シ汚水ヲ驅逐シ治ス
○腎痛ヲ祛キ結石ヲ通ス○遷延ノ傷冷毒痛及痛
風ニ用テ其毒ヲ排泄シ治ス○頑固ノ間歇熱三日
熱ニ殊効ヲ稱ス或云此根朝夕一個宛服シ毎日一
個宛増加テ第五日ハ朝夕五個宛服シ是ヨリ朝夕
一個宛減シ服了ハ即治ス治後暫朝夕一個宛服ノ
良或云每朝一根宛増服メ五個ニ至ハ其熱發作セ
スメ治ス○適宜ニ服スレハ胃腸ノ粘液ヲ消化シ
食ヲ進メ傳染疫氣ヲ攘フ此根搗爛シ燒酒ニ浸服
メ尤良燒酒ハ能其効力ヲ浸出ス○胃虛冷ニシテ粘

液壅滯ノ諸症。寧急ノ疝腹痛。殊ニ粘液風氣鬱蓄ノ腹痛ヲ治ス。或根ヲ水煎ノ吉利詞爹兒トシ。或煮テ搗爛シ温ナルヲ腹部ニ貼メ速効アリ。○此藥鎮痙ノ効アリ。子宮衝逆。寧急ノ諸症ヲ鎮靜ス。或搗テ臭氣ヲ嗅シメテ治ス。○寒粘液性ノ久効。粘痰多キ効嗽。痰涎壅塞ノ喘急ニ用テ痰ヲ疏散シ。略易カラシム。此根ヲ浸劑泡劑トシ。或煎服ス。○寒粘液性ノ失敬兒陪苦ヲ治ス。殊ニ船中及海邊ノ患者ニ効アリ。根搗爛シ燒酒ニ浸シ滓ヲ去。服ス。○齒痛ハ根ヲ搗テ患處ニ貼シ。或熱灰ニ煨メ貼シ。若ハ齒痛ノ外部

ニ貼スレハ焮赤發泡ノ治ス。傷冷毒ノ齒痛ハ殊ニ良。○焮衝ナキ傷冷毒ノ耳聾及粘液壅塞ヨリ發ス聾ハ此根ヲ搗爛シ絞汁ヲ緋ニ浸シ。毎日耳孔ニ挿テ耳孔焮腫スルニ至レハ治ス。○寒粘液腫。及疣贅魚目。疥癩樣硬肉ニ此根ヲ搗貼スレハ漸軟化シ除ク。療癰腺腫。或寒壞疽亦効アリ。○乾癬類。總テ惡厲ノ皮膚病ハ此根ノ絞汁ヲ蜜ニ研和シ外敷メ治ス。○蒜葱韭ノ類。大蒜ニ比スレハ皆性緩ナリ。大蒜ハ性尤雄悍ニ峻効アリ。○葱根ハ性緩ニ揮發鹽多シ。煮レハ緩和ノ粘液多クノ軟化解凝ノ効アリ。表發

ノ蒸氣及汗ヲ發シ小便ヲ利シ大便ヲ滑シ粘液壅滯ノ喘急水腫腎痛結石ヲ治ス煨葱ハ外敷ノ軟化解凝藥トシ琵琶布トシ腫瘍ニ貼メ膿ヲ釀シ疼ヲ止メ潰瘍ヲ潰破シ便毒ヲ軟化ス或食鹽ヲ研和シ貼メ火傷ヲ療シ頭痛ニ貼メ寛解ス

叔福淑施
依羅密

忽布ホツブ

種カハラハナサウノ江戶花戸ハサウノ

形状 忽布ハ蔓草

ナサラハノ 蔓ナリ。蔓粗糙毛茸多シ

傍木ニ糾繆ス。葉梗アリテ對生シ粗糙三五又葡萄

葉ノ如シ鋸齒アリ一種圓葉此草雌雄二種アリ雄

種ハ蔓梢ノ葉本ニ花攢簇シ瓣ナク五雄蕊。萼中一

生ス萼出實ヲ結ス。雌種ハ花一瓣。又ナク攢簇ス

二雌蕊第二十二 萼。薄膜鱗狀ニ重被メ小頭ヲ爲シ

苦味香氣アリ鱗間黃赤ノ小圓仁アリ。春月莖ヲ採

乾シ貯テ藥用トス

試効 漢石鹼質ヲ含。苦味香竄質ニメ拔爾撒謨様ノ

氣アリ榕按ニ葎草ノ莖。芳香微 健胃強壯利尿驅蟲

ノ効諸苦味健胃藥ノ如シ但過服メ昏眩眩冒スル

故ニ麻痺藥ニ屬シ鎮痙止痛ノ性効アリ○泡劑ト

シ用テ胃弱ヲ強健シ飲食消化シ難キ症ヲ治水○

粘液膽液壅滯ヲ驅逐シ汗及蒸氣ヲ排泄ス○水煎
 シ用テ疏解開達ノ効諸苦味解凝藥ノ如ク肝脾等
 壅塞ヲ開通シ黃疸神思鬱憂病失苟兒陪苦ヲ治シ
 虻蟲ヲ殺ス○水腫ニ用テ小便ヲ利シ又通經ノ良
 藥トス○腺腫瘰癧佝僂病及疥癬浸淫瘡ニ良効ヲ
 稱ス○遷延痛風傷冷毒痛ノ發作ニ用テ劇痛ヲ解
 散ス○間歇熱ニ用テ驅熱ノ一藥トス
服量散劑ハ
 半錢ヨリ二錢ニ至ル○煎劑ハ一弓水適宜ヲ加煮
 テ八弓若ハ十二弓ト爲シ服ス泡劑水量亦同シ○
 越幾斯劑ハ一弓ヨリ二弓マテ丸藥トシ或對症ノ

劑ニ加用フ○**丁幾劑**ハ日半錢ヨリ二錢ヲ服ス

忽布越幾斯劑製法 實 乾者割 水 十坵 右蓋閉

シ煖處ニ置浸ス一十二時文火ニ煮一小時放冷ノ
 濾シ絞テ液ヲ取靜定ノ沈渣ヲ去リ文火ニ上水氣
 フ蒸散ノ越幾斯劑ノ稠トス

忽布丁幾劑製法 實 乾者割 燒酒 十五度者

右硝子壘ニ入固封シ浸ス一六日滓ヲ去リ貯フ○葉
 亦右ノ諸病ニ効アリ或莖葉ノ絞汁ヲ舍利別トシ
 用フ○嫩苗ノ新芽ハ利尿ノ峻効アリ汚血ヲ淨掃
 シ惡液ヲ小便ニ驅泄ス煎劑泡劑トシ服ス○花ハ

止痛ノ効ヲ稱ス○忽布ホッブハ外敷ノ効多シ或蒸湯藥
 トシ肢節腫瘍ノ疼痛ヲ祛キ手足ノ浮腫ヲ散シ或
 咽喉焮腫ニ漱藥トシ或痛風打撲傷捫挫脫臼ノ腫
 痛寒粘液腫惡性潰瘍等ニ乾實ヲ濃煎劑トシ蒸湯
 シ若ハ搗テ温メ貼シ或葉ヲ琵琶布トシ外敷ノ皆良
 驗アリ○忽布ホッブハ麥酒ヲ泡釀ノ其酸敗ヲ防止シ美
 好ノ苦味ヲ生スルニ用フ

〔依〕〔施〕
 〔依〕〔華〕

新訂增補和蘭藥鏡卷十七 終

