

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JA PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

遠西醫方名物考

波下

卷三

十武  
857  
453

學大田稻早圖  
庫大田內者托寄  
號七六一第書托寄  
號  
冊

武 857  
卷 45-3



遠西醫方名物考標目

卷三

大正九年九月四日  
内田糸子氏贈



拔爾撒謨格洋霍  
バーリムラバハ

拔爾撒謨亨露  
バーリムハリウ

附 拔爾撒謨飲  
バーリム

麥酒 附大麥

麥蘖

白葡萄酒 和蘭藥鏡

白降汞

水銀ノ  
二出

白降汞撒爾弗

水銀ノ  
二出

發泡膏

芫菁ノ  
二出

霸王鹽

消石ノ  
條二出

發煙海鹽精海鹽ノ

條二出

礬紅

綠礬ノ  
條二出

發煙消石精消石ノ

條二出

仁乳

附人乳

野羊乳

牛乳

酪

乳清

附甘乳清

酪餘

乾酪

乳糖

附酸味

酸乳清

乳香油

遠西醫方名物考卷三

撫齋先生譯述

男

宇田川 榕菴校補

拔爾撒謨格辦霍羅

「ヴィツテ、アメリカーンセ、バルセム」蘭

○按ニ此品舶來アリ左ノ譯說ヲ以テ眞偽ヲ辨

シ擇云用フベシ

是ハ伯西兒等總テ南亞墨利加洲ノ諸國ニ產スル  
コッハイヘラト名ル一種ノ樹ヲ鑽刻シ大孔ヲ穿テ  
取ル華爾斯ハルス前ニ註スナリ。大約一時半ニ十二北許流出  
スト云○此物二種アリ。第一種ハ淡黃色。透亮。清稀。

ニメ油ノ如シ是ハ其樹ヲ刻メ初ニ出ル脂ナリ第  
二種ハ稠厚黃色ニメ的列竝底那ノ如シ是ハ其樹  
ノ鉢塚ヨリ流溢スル者ナリ。二種凡ニ味辛苦香氣  
芳烈ナリ或ハ其樹ヲ截<sup>キリ</sup>テ片屑トシ煮テ脂液ヲ取  
ル者アリ此亦稠厚ニメ蜜ノ如シ前ノ二種ニ比ス  
レバ下品トス○此物的列竝底那油或ハ扁桃油ヲ  
加ヘ偽ル者アリ是ヲ烙鐵上ニ滴シ或ハ紙上ニ滴  
メ灸<sup>アツ</sup>レバ的列竝底那ノ氣アルヲ以テ知リ或ハ是  
ヲ燒酒ニ滴スルニ真品ハ溶化シ其扁桃油ハ溶化  
セズ又銳烈ノ燒酒ニ滴スレバ底ニ沈ムトナシ

**主治**性熱收瀉ス。神經ヲ強壯ニシ内部ノ創瘍熱十  
キ勞瘵及ビ羸瘦病ヲ治シ。肺傷久嗽或ハ虛症ニ屬  
メ毒十キ滑精淋疾ヲ治ス○服量六滴ヨリ十二滴  
或ハ二十四滴或一二刃マデ適宜ノ飲液ニ點服シ  
或ハ沙糖或ハ雞子黃ニ和シ用フ○此技爾撒謨<sup>ハルサム</sup>  
性熱ノ衝動シ的列竝底那油ニ代用ス。故ニ一切燃  
衝ヲ兼ル病並ニ多血ノ症アル者ハ甚々害アリ又  
妄<sup>ミタ</sup>リニ肺病欬嗽等ニ多ク用レバ發熱苦悶シ或ハ  
吐血ヲ誘發スルヲアリ。唯粘液質ノ勞瘵或ハ粘液  
壅滯スルヨリ發スル肺病ニ大効アリ是レ肺ノ纖

維弛弱メ其運營衰弊セルヲ衝動メ健運シ壅滯セ  
ル粘液ヲ驅散スレバナリ。此症ハ毎服十滴ヨリ四十滴マデ其症ニ隨テ加減シ毎日三四次適宜ノ飲液ニ點服スベシ○腎膀胱尿道ノ膿アル諸病或ハ淋疾ヲ治スル良藥トス然此藥ハ熱性ナル故ニ前說ノ肺病ニ用ル如ク戒慎メ施スベシ殊ニ淋疾ハ其熲熱腫痛休マズ或ハ血ヲ交テ通シ或ハ陰莖怒張メ攣痛スル等ノ症退カザル間ハ是ヲ用ル勿レ其毒ノ排泄ヲ澁閉シ或ハ其熲熱ヲ増發ノ害アレバナリ。此症ハ刺絡ヲ施シ或ハ清涼ノ下劑ヲ

用ヒテ其熲衝ヲ抑制シ其毒ヲ驅除シ爾後熲熱去リ毒漸ク消シ疼痛減レ或ハ其膿盡ク除テ後治セザル症或ハ淋疾後尿道ノ諸器弛弱虛衰ノ淋瀝休マズ或ハ唯白液ノ三漏泄ノ治セズ或ハ斯ノ如キ白帶下ノ薤苒タル症或ハ固ヨリ熲衝ノ候ナク粘液質ニメ感触ノ少キ人ニ發スル者ハ皆此技爾撒<sup>バルサ</sup>謨四滴宛毎日四次用ヒ或ハ十滴ヨリ二十滴マデ雞子黃或ハ亞刺比亞<sup>アラビア</sup>謨漿等ニ研和シ用ヒテ間奇効アリ或ハ毎日二錢マデ用ルアリ或ハ酪餘ヲ兼用ノ殊ニ良○此藥過服スレバ飲食ノ消化ヲ

妨ク。故ニ健胃劑ヲ兼用スベシ假令越栗失爾赫篤立沃利三十滴。宛日ニ兩次用ル等ナリ○肺藏弛弱ノ水ノ壅滯スルヨリ發スル胸水病名。硫黃主治ニ此藥。其他斯ノ如キ技爾撒謨性ノ衝動藥ヲ用テ肺ヲ健運シ停水ヲ驅散メ尤良○外敷メ創ヲ愈スニ奇効アリ或ハ筋纖維。虛弱ニメ荏苒トメ愈ザル潰瘍ニ施シ衝動強壯ノ膿ヲ排ヒ敗液ヲ淨刷シ腐肉ヲ祛テ乾愈スルニ多ク用フ或ハ骨傷脱臼。閃挫。轉筋等ノ荏苒タルニ施メ効アリ。雞子黃或ハ家猪脂ニ和シ貼ス其効大抵的列。竝底那ノ如シ故ニ的列

竝底那ヲ施ス症ニ膏藥或ハ塗藥トシ施スベシ然庄的列竝底那ニ比スレバ衝動ノ性峻ナリ國固國底布福  
**拔爾撒謨**字露又バ尔斯サムペルニアニ羅スワルテインデアンセバルヒ山蘭  
○按ニ此品舶來アリ左ノ譯說ヲ以テ眞偽ヲ辨シ用フベシ

是ハ亞墨利加洲ノ字露國ニ產スル一種ノ小木ヲ鑽刻メ取ル華爾斯ナリ○三種アリ第一種ハ油ノ如ク流動シ透亮白色芳香ナリ是ヲ字露。白技爾撒謨ト名ケ最上品トス然庄齋來ルヲ稀ナリ○第二種ハ乾硬ニメ松脂ノ如シ是ヲ乾技爾撒謨ト名ク

赭色ニノ芳香辛味アリ此亦我國蘭ニ輸サズ是レ  
ドリターンセ。バルセム技爾撒謨ト一般ニメ性尤峻  
ナリ○第三種ハ粘稠ニメ的列竝底那ノ如シ。黯赭  
色ニメ味苦辛芳烈。佳香アリテ蘇合香ニ似タリ火  
燃セバ殊ニ佳香アリ。沸湯ニ滴スレバ其輕清ノ者ハ分レテ  
上面ニ浮三膜ノ如シ其重濁ノ質ハ沈ム。燒酒ニ滴  
スレバ溶化ス。粘稠ノ油類ニ滴スルニ凝結セズ。是  
ヲ芋露ラウ技爾撒謨ト稱シ藥用トス按=舶來ノ是ハ  
品是ナリ其樹ノ幹枝ヲ採リ水ニ煮テ放冷シ其上面ニ浮ム  
油ヲ抄ヒ取ル者ナリ。黑色ニメ焦臭アルハ下品ト

ス藥用ニ堪ズ○或ハ扁桃油ヲ以テ偽製シ或ハ安  
息香油ニ梗油ホヨリールト云樹ノ嫩芽ヨリ取ル油ナリ加テ偽ル者  
アリ是ヲ鑒識スル法。其技爾撒謨ヲ燒酒ニ滴ノ盡  
ク溶化シ混和スルハ真品トス。否ルハ偽品トス或  
ハ此技爾撒謨ニ綠礬油ヲ滴ノ混和スルハ真品ト  
ス但是ヲ滴ノ技爾撒謨膨起シ硫黃様ノ蒸氣ヲ發  
スルハ格澁霍技爾撒謨ヲ雜テ偽ル者ナリ  
**主治**性熱收瀆ス。神經ヲ強壯ニシ腐敗ヲ防止シ且  
淨刷シ敗液ヲ表發ノ蒸氣ヨリ排泄シ寒性ノ結腫  
ヲ消散シ又勞瘵羸瘦病久效喘急淋疾等ノ虛症ニ

効アル「**拔爾撒謨**」**格澁霍**ニ説ク所ノ如シ○服量六滴ヨリニ十滴マテ沙糖或ハ果汁或ハ甘和ノ油類ニ和シ或少適宜ノ飲液ニ點服ス○此**拔爾撒謨**ハ**格澁霍**ニ比スレバ性尤熱ノ峻烈ナリ其効大抵同ジ。故ニ**格澁霍**ニ舉ル諸病粘液質ノ勞瘵自餘斯ノ如キ荏苒タル症ヲ治シ又傷冷毒ヨリ發スル頑固ノ痰欬或ハ肺管ノ痙攣ヨリ起ル欬ニ効アリ又右ノ諸症ニ左ノ方良効アリ

**的列竝拔爾撒謨飲**

**拔爾撒謨的列竝底**

**拔爾撒謨亨露**

各四錢

右硝子壘ニ入レ火上ニテ攬和シ毎服八滴ヨリ十五滴マデ日四次沙糖或ハ果汁ニ和シ服ス。但肺ノ纖維脆弱或ハ熾衝ヲ夾ミ或ハ血液ノ酷厲毒ヨリ發スル肺病ニハ害アリ此症ハ扁桃乳ニ白罂粟舍利別ヲ加ヘ用ヒ或ハ亞刺比亞趨謨漿或ハ阿利禊油等ヲ用ヒテ良効アリ○外敷ノ諸創ヲ愈シ潰瘍ヲ淨刷ノ乾愈シ麻痺不遂ヲ治ス又腐骨ヲ兼ル潰瘍ニ闕ベカラザル藥トス然凡斯ノ如キ症ハ**格澁霍**或ハ**的列竝底**那ヲ用テ効同シ

医布拔

麥酒

セレヒシア

羅

ビール

蘭

○榕按ニ麥酒ハ酒ノ一種ニノ西洋諸國日用ノ飲料トス。葡萄ヲ產セザル地ハ專ラ是ヲ用フ。職方外紀ニ云。無葡萄處或用牟麥釀之是レ元來。大麥。小麥。倮麥。雀麥。糯麥。蕎麥。稻米黍等ノ穀類ヲ以テ造ル酒ノ總稱ナリ然凡通例多ク大麥ニテ造ル故ニ一ニ「ゲルストウイン」大麥酒ノ義ト名ク。漢人亦麥類ヲ以テ酒ヲ造ル。時珍曰。大麥亦有粘者名糯麥。可以釀酒。天工開物曰。古來麴造酒蘖造釀又曰。麴麥米麴隨方土造南北不同其義則一。凡麥麴

大小麥皆可用

大麥主治

性涼。熱ヲ解シ酷厲液ヲ甘メ惡液ヲ除キ小便ヲ利シ身體ヲ榮養ス。○糙大麥ハ清涼ノ功多壯熱病及ビ内部諸藏ノ熱ヲ解シ渴ヲ止メ胸脇煩衝。肺厥衝等ニ効アリ。○精大麥ハ粘滑ニノ緩和ノ功多シ咽喉氣管。肺。胃。腎。膀胱等ノ酷厲液ヲ緩和ス故ニ和胸ノ良藥トシ欬嗽等總テ肺病及ビ冒寒傷冷毒ノ諸症。咽喉刺痛等ニ効ヲ稱シ。一切疼痛ヲ甘メ外用メ硬腫ヲ軟ラゲ厥痛ヲ消ス。煮汁ヲ以テ蒸漏シ或ハ粉麪ヲ以テ芭布トシ貼ス。○榮養ノ功ア

ルニ因テ勞瘵及ビ一切酷厲液ニ因ル病ニ良驗ア  
リ○碎麥煎汁ハ多ク熱病ノ飲液トス。熱剝キ症ハ  
稀キ煎汁トシ用フ。大抵碎麥四錢水十六弓ヲ以テ  
煎汁トス○歎嗽或ハ淋疾ニハ蜜果乾葡萄甘草ヲ  
加ヘ水煎シ用ヒテ尤良伍叔依

**麥酒製法**

麥蘖麥芽ナリ製法次出ノ粗碎。十比許ヲ取り桶  
ニ入レ微温湯二十比許ヲ加フ但湯少ケレバ其酒  
醇厚ニメ氣味悍烈ナリ。湯多ケレバ其酒淡薄ナリ。  
其湯ヲ加ル間ハ木棍ニテ攪セヨク調和シ淹スヒタ  
一宿許能ク融化メ後是ヲ罐ニ入レ漸次ニ火ヲ増

テ適宜ニ煮。其間手ヲ住メズ攪テ焦署セシメズ蘖  
ノ精氣十分ヨク出ルニ至テ火ヲ下シ放冷シ是ニ  
指ヲ入テ耐ベキニ至テ細篩ニテ自然ニ透漏セシ  
メテ瀘シ忽布葎草ノ一種カラハナ少許ヲ取テ他  
ノ罐ニ入レ水ヲ加ヘ適宜ニ煮テ右ノ篩ニ投シ瀘  
テ前ノ麥蘖煮汁ニ合シ桶ニ内レ是ニ指ヲ入テ微  
温ナル臼ニ酵少許ヲ加テヨク攪和シ泡釀スル  
爲ニ加ルナリ製法其桶ニ蓋シテ密閉セズ其隙ヨ  
蒸餅母ノ條ニ出ツ其汁ヲ泡釀セシム夏月ハ清  
リ稍氣ノ漏ル程ニシ其汁ヲ泡釀セシム夏月ハ清  
月ハ溫煖ノ十分泡起沸釀スル臼ハ是ヲ清楚ナル  
處ニ宜シ

桶ニ寫シ窖ニ入レ時々杓子ニテ浮沫ヲ抄ヒ去リ  
兩三日ヲ經テ沸釀盡ク止ム此ハ其蓋ヲ密閉シ十  
四日許ヲ經テ漸々ニ注管ヨリ注出シ用フベシ但  
其氣味淡薄ナルカ或ハ嚴寒ノ時候ニハ右ノ日數  
ヨリハ長ク密閉スベシ凡ソ麥酒清潔芳美ニノ氣  
味竊透シ盞ニ注ゲバ泡アルヲ上好トス○泡釀足  
アザレバ麥酒熟化セズメ甘味ヲ帶ビ剽悍ノ氣微  
ク且其酵モ消化セズ故ニ是ヲ服メ風氣ヲ生シ腹  
痛下利ヲ發ス沸釀過多ナレバ酸敗シ易クメ久ク  
貯ヘ難シ○其初メ煮ルニ由テ麥ニ舍メル鹽氣油

氣出テ泡釀スペキ液トナリ又其攪動スルニ由テ  
泡釀ヲ催起シ又細篩ニテ自然ニ透漏セシムルニ  
由テ麥ノ鹽氣油氣ヨク融化メ其汁澄清純潔ナリ  
○忽布<sup>ホツブ</sup>ヲ濃煎メ加レバ麥酒甚ダ濃色トナル故ニ  
忽布ハ適宜ニ煮ルヲ佳トス○忽布<sup>ホツブ</sup>ヲ加レハ麥酒  
ニ苦味ヲ帶ル故ニ是ヲ加ヘズメ造ルヲアリ然庄  
麥酒ノ氣味ヲ剽悍ニシ或ハ久ク貯ルニハ忽布<sup>ホツブ</sup>ヲ  
加フベシ○酵ヲ加ルヲ多ケレバ麥酒甚ダ悍烈ニ  
ノ赭色トナル但冬月ハ稍多ク加フベシ○冬月冷  
タル酵ヲ加レバ泡釀シ難ク酵モ消化セズメ麥酒

溷濁ス ○ 夏月ハ 造釀ニ宜シカラズ。泡釀極テ甚キ  
カ故ニ爾後酸敗シ易クメ久ク貯ヘ難ケレバナリ  
○ 北地ハ 麦酒ヲ造ルニ宜シ。其水清冽淨潔ニメ汚  
物混セズ又寒氣ニテ麦酒ノ揮發鹽ヲ保固ノ耗散  
セシメザレバナリ ○ 造釀ニ用ル水ハ 寒冽清潔ナ  
ル井水或ハ泉水ヲ最モ良トス是ヲ以テ製スレバ  
麦酒沸釀スルヲ少クノ酸敗セザレバナリ。沸釀速  
クニメ度ニ過シバ 酒中ノ漂悍揮發ノ鹽氣ヲ包攝  
スル所ノ粘稠ノ質速ニ消解散涣シ隨テ其揮發鹽  
モ耗散ノ漸ク粗鹵ノ固鹽ヲ結成シ其性渝變ノ酸

敗ス

淑云忽布ナキ片ハ陳葉ヲ用コト代用スベシ

麥酒主治

爽快シ百體ヲ榮養シ水穀ノ精氣ヲメ滿肢體ニ布  
化セシメ又鎮痛ノ効アリ但過飲スレバ酩酊ス。泡  
囊足ラズ或ハ未熟ノ者ヲ服スレバ腹中風氣ヲ生  
シ絞痛下利ヲ發ス ○ 外敷ノ胸脇歟痛。疝痛。婦人乳  
汁過多ニメ鬱滯スルヨリ發スル諸症。其他歎衝痛  
ヲ兼ル症ニ効アリ。麥酒ニ茴香ヲ加ヘ煮テ淳テ去  
リ布片ニ浸シ貼メ緩和止痛ノ効ヲ稱ス ○ 麦酒ニ  
赤白二種アル。葡萄酒ノ如シ白麥酒ハ帶黃白色。

清稀甘美ニメ尤良性トス赤麥酒ハ赭色ニメ苦味ヲ帶ブ是レ忽布及ビ酵ヲ加ルト多ク化釀醇厚ニメ氣味剽悍ナレバナリ○麥酒ヲ蒸餾メ燒酒ヲ製シ或ハ醸ヲ造ルト葡萄酒ノ如シ叔過

麥蘖モウト蘭 卽チ麥芽ナリ

伍 麥蘖モウト蘭 卽チ麥芽ナリ

製法

大麥一兩年ノ者ヲ用フ多少適意ニ取り桶ニ入レ水適宜ニ加ヘ浸メ麥綻ホコロビ或ハ指ニテ押テ柔ナルキ澆テ汁ヲ去リ盆ニ撒シ濕氣ヲ乾シ聚テ堆積シ置ト五六日漸ク鬱蒸ノ根及ビ芽ヲ生ス但麥ノ善惡新陳時令ノ寒煖ニ從テ芽ヲ生スルモ遲

速アリ○其芽過タガダ長スレバ麥ノ性力脫失ス甚ダ小ナレバ麥ノ性力十分ニ萌發セズ斯ノ如ク過不及アレバ好麥酒成ラズ氣味淡薄ニメ用ルニ堪ヘズ○芽ノ適宜ニ生スル時是ヲ手ニテ摩シ或ハ槌ニテ打テ風日ニ曝乾シ或ハ火氣ニテ乾スベシ○曝乾スルニハ夏秋ノ頃モヤシ蘖ヲ板上ニ撒シ數攪テ濕氣ヲ乾スベシ斯ノ如クメ乾シタル蘖ハ其量輕ク黃色ヲ帶ビ性尤良ナリ○火氣ニテ乾スハ時候ニ拘ラズ爐ニ鐵網ヲ載セ是ニ厚紙ヲ敷キ蘖ヲ撒シ慢火ニテ徐々ニ乾スナリ是レ曝乾ノ者ト異ナル

「ナシ是ヲ以テ製スル麥酒ハ赭色ヲ帶ブト雖モ久ク貯テ損敗セズ○曝乾ノ蘖ハ兩濕ノ時候動モスレバ濕リ徽タヒヲ生ズ。徽氣アル者ニテ造釀スレバ其酒ノ味甚ダ惡シ故ニ曝乾ノ蘖ハ乾ケル木ノ箱ニ收メ密封メ乾淨ノ處ニ貯フベシ○諸穀類ノ蘖モ皆右ノ法ニテ製スベシ」國

## 仁

乳

ラッカ

羅

メルキ

蘭

主治

藥用及ビ食餌ニ供メ良効アルハ人乳。野羊乳。

驢乳。牛乳ナリ各種ノ乳。火出ツ○其主能三アリ卽チ滋養。

緩和。包攝ナリ

第一

滋養ハ天工。動物ノ資養ニ供ス

ル所ノ一靈液ヲ以テ血液ヲ滋補培養シ人ヲメ肥脅セシムルナリ。故ニ一切羸瘦病。勞瘵。肺傷。乾歎等ノ良藥トス但其熱劇盛ナラザル者ニ用フベシ總テ熱甚キ症ニハ動物ニ出ル滋養ノ品ハ皆禁ヘシ乳汁肉類モ禁スルヲ云○乳汁ニ幾那ヤナハヲ兼用メ勞瘵及ビ羸瘦諸病ニ尤効アリ○凡ソ生族ノ諸液中

ニテ人ニ利益アル者。乳汁一若<sup>アシタカ</sup>ハナシ。是レ嬰兒ヲ長育スルノミナラズ大人モ他食ヲ用ヒズ是ノミニテ能ク榮養シ又老人虛人ニ用テ精力ヲ補益シ虛損ヲ回復ス蓋シ人類ハ勿論。凡ソ乳養ノ生族ハ初生ヨリ是ヲ以テ長育スル故ニ乳ハ殆ト生體ノ血液ト同様ノ質ヲ含有シ且母體ニテ化釀ヲ經テ生氣ヲ含メル液ナレバ是ヲ服メ能ク血液ト相和シ滋養スレバナリ。是レ天工動物ヲ資養スル妙用ナリ○乳汁ハ母體ニ在テ生氣ヲ含メル液ナレバ是ヲ絞リ取テ直ニ服セザレバ効鮮シ時<sup>タメ</sup>經<sup>フ</sup>レバ

乳中ノ生氣耗散シ或ハ酸敗ノ臭氣ヲ生スレバナリ○乳汁ハ飲食能ク消化スル者ニ用フベシ否ラザレバ是ヲ用ヒテ消化セズ胃中ニ停滯ノ風氣ヲ生シ或ハ化セズノ下利シ逾妨悶不食ノ却テ榮養ヲ失ヘバナリ』故ニ斯ノ如キ症ハ先ツ健胃ノ劑ヲ用テ其消化ノ力ヲ復シ能ク食スルニ至テ是ヲ用フベシ○或云乳ハ幼兒ヲ養フガ爲ニ既ニ母體ニテ烹釀化熟シタル液ナレバ是ヲ服メ胃腸ニ於テ再び消化スルニ及バズ直ニ血中ニ運輸シ營養スル者ナリト是レ謬說ナリ凡ソ飲食消化ノ道路ニ

入ル者ハ皆必ズ烹釀消化ヲ經テ後。血中ニ運輸セザルハナシ。唯烊解消化ニ關ラザル者。假令水ノ如キ者ノニ直タチニ血中ニ運行ス。故ニ乳汁ヲ服スレバ胃液。腸液。脾液等ノ酸收ニテ是ヲ泌別シ其清稀ノ液ハ先ツ乳糜脉ヨリ血中ニ運輸シ其餘殘ノ凝固セル者ハ必ズ烹釀化熟ノ後。血中ニ運行スルナリ乃チ胃腸消化ノ力。健ナル者ハ乳汁速ニ消化ノ血中ニ運行ス。是ニ於テ患者肢體ヲ舉動メ其消化ヲ扶ル。肝要ナリ然ニ胃ノ弱キ者ハ乳消化セズタ凝滯ス故ニ胃液。脾液等ノ酸液ニテ是ヲ泌別スル

片ハ其重濁凝固ノ乳過多ニノ速ニ酸敗シ是ヨリ諸症ヲ發スルナリ○無病壯健ノ兒ト雖モ乳ミルト多ケレバ動モスレバ乳ヲ吐クアリ然ニ著キ害ナシ。是レ其胃液。脾液等ノ酸液ニテ其嚙ム所ノ乳ヲ泌別シテ清濁ヲ分チ其稠濁ノ者暫ク胃中ニ停滯メ凝固スルヲアレソル後速ニ消化ノ鬱敗セザレバナリ。故ニ無病壯健ノ人ハ乳汁ト共ニ酸味ノ飲食或ハ麥酒ヲ用フト雖モ亦大害ナシ○常ニ酸味ノ酪餘。酸乳清。乾酪皆次出ヲ用ヒ或ハ麥酒ヲ乳汁ニ加テ服スル人ハ其酸液ニテ乳汁。胃中ニ凝固

シ以テ諸症ヲ發スルヲナキニハ非レ凡胃ノ虛弱ニメ飲食消化シ難キ者或ハ酷厲ナル惡液。胃中ニ鬱滯スル者其患殊ニ多シ。是レ其胃中ニ酷厲液アリ或ハ飲食消化シ難キ者ハ良性ノ乳ヲ服スト雖モ消化スルヲ能ハズノ胃中ニ停滯シ漸ク腐敗ノ風氣ヲ生シ或ハ乳汁。胃中ニ入テ温氣ヲ得レハ自ラ化釀ノ幾多ノ細泡涌起シ其氣沸蒸吹騰ノ風氣ヲ生シ胃腸ノ力。是ヲ抑制驅散スルヲ能ハズメ噫氣。痞悶。腹脹。絞痛及ビ飲食進マザル等ノ症ヲ發スレバナリ○然庄酸敗液ノ病ニ乳汁ヲ用レバ其症

ヲ増劇ス。假令呑酸嘈雜等ニ用レバ其症更ニ増劇スルガ如レ牛酪ヲ蒸餾スレバ終ニ白色ノ蒸氣出テ氣味酸烈ナルヲ宛モ硫黃精ノ如シ故ニ乳ハ酸敗液ノ病ニ害アルヲ知ルベシ**第二**緩和ハ其動物資稟ノ油水融和妙合セル所ノ甘美ノ質ヲ以テ血中ノ酷厲侵刺ノ毒ヲ緩和シ急迫ヲ甘メ疼痛ヲ鎮メ。又酸性鹽ヲ含ンデ血中ノ亞兒加利鹽毒ヲ消スルナリ亞兒加利鹽ハ淋灰鹽ノ總稱ナリ。假令石灰性酷厲ニノ皮膚ニ貼スレハ侵蝕ス。又生石灰ニ水是レ皆酸性ト相反ノ相制伏ス。即チ亞兒加利性ノノ注ゲハ忽チ俄ノ發ス。是レ火氣ヲ含ムノ微ナリ。

ヲ以テ知ルベシ。○平全無病ノ身體ニ於テハ血中良性ノ揮發鹽アリテ榮養ノ用ヲ爲ス。此鹽其常性ヲ失ヒ渝變スルハ即チ酷厲ナル亞兒加利鹽毒竟ニ血液ノ腐敗シテ危険ノ又緩和滋養ノ功ヲ以疾患トナルト舉テ算レ難シ。○失苟兒陪苦ノ毒ヲ解テ稀涼酷厲ノ血液ヲメ拔爾撒謨様ノ榮養液トナラレム。是ヲ以テ血液ノ酷厲毒ヨリ發スル歎嗽及ビ勞瘵。羸瘦病ニ尤<sub>モ</sub>驗アリ。○失苟兒陪苦ノ毒ヲ解シ或ハ淋疾白帶下ノ劇痛ヲ除クニ用フ淋疾ニハ稀クレ多。○酷厲毒ヨリ發スル焮腫眼ノ焮痛燻ガ服メ良。如キ症ニ是ヲ蒸湯藥トシ施メ捷効アリ。○焮腫羅斯等ヲ消散スルニ接骨木花ヲ加ヘ煮テ蒸湯シ或

ハ脚痛及ビ腱ノ攣急ヲ緩メ。諸腫瘍ヲ軟ゲ、焮痛ヲ消スルニ小麥粉ヲ加ヘ煮テ琶布トシ貼メ皆驗アリ。第三包攝ハ其甘和ノ粘油質ヲ以テ酷烈刺戟ノ侵蝕毒ヲ包攝メ侵刺ヒザラシムルナリ。即チ金石製劑ノ毒ニ中リ或ハ嘔吐ノ劑ヲ過用メ嘔吐止マズ或ハ芫菁ヲ誤用メ焮熱劇痛スル等ニ内服メ皆捷効アリ斯ノ如キ諸症ハ速ニ多服スルヲ肝要トス

乳質製煉術ヲ以テ乳ヲ蒸餾メ其質ヲ検査スレバ水油鹽土粘液ヲ渾和ノ成ル者ナリ即チ其水ハ乳

清トナリ其油ハ酥酪トナリ。鹽ハ乳糖トナリ。土質  
ハ乾酪トナリ。以上ノ諸物次ニ出ソ粘液ハ乳清ヲ製スル所  
乳ヲ濃過メ出ルヲ以テ知ルベシ。○乳ハ乳糜ト同  
一般ナルガ如クナレ凡更ニ乳糜中ヨリ分泌シ出  
ル一種ノ營養液ニノ乳糜ト異ナリ。其故ハ試ニ乳  
汁ヲ蒸餾スルニ酸性鹽ト中和鹽ハ有レ凡揮發ノ  
亞兒加利鹽ナレ。乳糜及ビ諸血液干ハ揮發ノ亞兒  
加利鹽アレバナリ。○乳ハ水液ト油ト渾和シ成ル  
故ニ血ニ比スレバ稀シ即チ扁桃ニ水ヲ加ヘ搗搗  
レバ其油ト水ト混和メ一種ノ乳汁トナルヲ以テ

知ルベレ其製法扁桃  
乳ノ條ニ出

**乳稀稠**

人乳ノ良性ナルハ甚ダ稀クメ甘シ。野羊乳

**モ稀**

クメ水ノ如シ。驢乳ハ尚稀シ馬乳ハ最モ稀シ。

**牛乳**

ハ他乳ニ比スレバ水氣最モ少クメ稠厚ナリ

**○凡ソ乳**

ノ稠キホド滋養肥腴ノ功モ亦多シ然レバ

**總テ稀**

クメ水ノ如キ乳ハ是ヲ服メヨク細絡纖維

**ニ流通**

メ血液ニ混和シ易キノ利益アリ。乳ノ稠厚

**ナルハ油氣**

及ビ土氣多ク且乳質ノ細球過多ニメ

**水氣少キニ**

因ル乳ハ微細ノ球ヲ以テ其質ヲ成ス

**が如シ其說重訂**

内科撰要吐血篇第百七十九章ニ註ス

是ヲ服スレバ其質ニ

含メル油殆ト消化セズノ血中ニ入り脂膜ニ運行  
メ筋肉ヲ肥盈ス。故ニ牛乳ハ飲食ヨク消化スル人  
ニ用フベシ胃弱キ者ハ消化シ難クノ停滯ノ患ア  
リ斯ノ如キ稀稠ニ由テ功用ノ差別アリヲ分辨メ  
各患者ニ適當セレムベシ

**人乳** 是ハ滋養ノ油氣ヲ含ムト多ク。味最モ甘キ故  
ニ能ク身體ヲ滋養メ肥脅セレム。其質稀ウスキ故ニ胃  
ノ消化ノ力弱キ人ニ用テ尤良○人乳ハ特ニ人ノ  
體質ニ相應スル故ニ諸乳ニ勝レテ良効アリトシ  
羸瘦熱及ビ勞瘵等ニ尤稱用ス但毎日直ニ乳母ニ  
羸瘦熱及ビ勞瘵等ニ尤稱用ス但毎日直ニ乳母ニ

就テ服スベシ絞リ取レバ乳中ノ精氣耗散ス○良  
性ノ乳ハ味甘ク稍粘リ。水ニ滴メ溶易ク。青色或ハ  
黃色ヲ帶ルトナク。雪白色ニノ香臭ナシ。然則飲食  
起居。寤寐。動靜。神思。運用。二便通利等其常調ヲ失ヘ  
ハ良性ノ乳モ忽チ渝變ス。故ニ乳母ノ鑒察差誤ス  
ルト屢多シ○農家ノ婦ハ鹿食ノ勞動シ神志逸メ  
鬱滯ナキ故ニ體質壯實ニノ乳質尤良。然ルニ其婦  
都下ニ出。富貴ノ家ニ仕レバ頻ハニ平素勞動ノ作業  
ヲ廢シ鹿食ニ代テ膏梁ニ飽キ。神志ヲ勞メ鬱悒シ  
日ヲ消ハシルが故ニ忽チ其壯健ノ天質ヲ損敗シ速ニ

其乳ノ良性ヲ失フナカリ○畜類ト雖モ不良鹿惡ノ  
食物ヲ以テ畜ヘバ其乳モ不良ノ質トナリ是ヲ貯  
エ腐敗シ易ク其肉モ味惡ク臭氣アリ故ニ乳汁ヲ  
取ル畜類ハ毎朝牧野ニ放テ新鮮良性ノ草ヲ秣フ  
ト専要ナリ

**野羊乳**其質稀クメ粘脂少シ收敛セズ人ヲメ肥腴  
セシムル効ヨリハ失性不良ノ血液ヲ回復メ良液  
ト爲スニ尤<sup>モ</sup>効アリ滋養ノ性多クノ血液ノ虛損ヲ  
補益シ精神ヲ爽活シ胃弱ヲ復シ凝結ヲ解キ一切  
羸瘦枯澁勞瘵乾歎肺癆ニ良効ヲ稱シ内部焫衝淋

疾白帶下尿道焫痛等ヲ治ス○牛羊ノ乳ニ比スレ  
バ精微竈透ノ揮發鹽ヲ含テ性功尤勝レリ。又是ヲ  
以テ美味ノ乾酪ヲ製ス○服量五六十錢ヨリ百錢  
マデ毎朝空心或ハ毎夜臨臥ニ其絞リ取りタル時  
ホドニ温メ服スペシ

**牛乳**其味佳ク他乳ニ比スレバ脂油及ビ土氣多ク  
メ乳清少シ故ニ多クハ酪及ビ乾酪ヲ製ス滋養ノ  
功多クノ肥腴セシメ羸瘦病ニ稱用ス。他食ヲ絶テ  
是ノニ食料トシヨク榮養ス故ニ藥用ト爲スニモ  
多服スルヲ肝要トス。毎日一硝子壘合<sup>大約五六</sup>容ルノ乳

ヲ取り其絞リタル時ホドニ温メテ毎朝空心ニ用  
フベシ然凡此乳ハ稠厚ナル故ニ患者羸瘦スト雖  
モ飲食ヨク消化スル者ニ用フベシ胃ノ弱キ者ハ  
消化シ難キ故ニ野羊乳ノ如キ稀キ者ヲ用フベシ  
又春月原野ニ牧シ嫩草新芽ヲ食スルキノ乳ヲ尤  
良性トス。冬月ハ乾藁枯草ヲ株<sup>ウ</sup>フ故ニ其効殊ニ劣

レリ

福

酪

「ヨウテイリム」羅

「ボートル」

○按ニ和蘭「ボトル」ト呼バ者ハ漢說ノ酪ノ如ク  
酥ノ如シ「ローム」ト稱スル者モ酥ノ如ク或ハ醸

ノ如シ「カーズ」ト名ル者ハ乾酪ノ如シ然凡酥、酪、醸  
醐ハ皆煎煉ノ製シ「ボトル」「ローム」「カーズ」ハ煎煉セズ  
メ造リ彼此製法ヲ異ニスルユ卫ニ譯名妥當セ  
ズ。然凡其物相似テ先輩モ亦充來ルヲ以テ「ボト  
ル」ヲ酪トシ今又「ローム」ヲ酥トシ「カース」ヲ乾酪ニ充  
ツ

製法

牛乳ヲ絞リ取り磁孟或ハ桶ニ入レ置、  
宿白色粘稠ノ脂油自ラ浮テ其上面ニ聚ル。是即チ  
酥ナリ是ヲ抄ヒ取り別ニ貯フ。其餘ノ乳ヲ深キ桶  
ニ入レ木棍或ハ手ヲ以テ力ヲ極テ疾ク攪滾スル

「良久キキハ其脂油復自ラ分レテ凝リ聚ル。是レ即チ酪ナリ是ヲ分チ取り貯ム。其餘殘ノ乳汁ハ即チ酪餘ナリ後ニ出ツ○酪ヲ久ク貯ルニハ必ズ鹽ヲ調和ス○乾酪ハ通例酪餘ヲ以テ製ス或ハ酪ヲ以テ製スルニアリ。若シ酪ノニ製メ乾酪ヲ製セザル片ニハ初ニ酥ヲ分チ取ラズ攪滚スベシ其酪稠濁ニノ甘美ナリ乾酪ヲ造ルニレバ乾固セザレバナリ○乳中ニ酸氣ヲ含ム故ニ攪滚スレバ自ラ分泌メ其稠厚ノ者凝聚シ酪トナルナリ。乳ヲ蒸餾メ酸氣アルト上ニ說ク如シ。凡ソ風化セル油ノ類ハ皆酸性アリ。

**主治** 内服シ或ハ外敷ノ急迫ヲ緩メ酷厲毒ヲ解シ銅水銀。安質沒扭等諸金石類ノ毒ヲ解スルニ多ク用フ或ハ腸ノ攣急ニ因テ大便閉ヲ患ル者ハ酪ヲ熱湯ニ攪和シ空心ニ服スベシ。攣急弛テ大便通ス○是ヲ水ニ溶シ鹽氣ヲ去リ用レバ粘痰ヲ豁シ略易カラシム○四五月ノ頃牛ヲ原野ニ牧シ其乳ヲ取り製スル酪ハ甘美ニノ性尤良

**酥** ケレモル。ラクチス羅 ローム蘭

是ハ乳中ノ脂油ナリ新ナルハ味尤甘美ナリ。乳中是ヲ含ム故ニ味甘ク曇白色ニノ透亮ナラズ且滋

養ノ功ヲ爲ス

**製法**

牛。野羊驢等ノ乳ニテ製ス。是

ニ二種アリ。一ハ甘酥一ハ酸酥ナリ。○甘酥ハ乳ヲ  
絞リ取テ磁孟ニ入レ蓋木ヲ覆ヒ置。一宿或ハ爐邊  
ニ置ケバ乳中ノ脂油自ラ其上面ニ聚ル。此卽チ酥  
ナリ是ヲ取り貯フ。味甚ダ甘美ニシメ沙糖様ナリ。是  
レ乳中ノ脂油ノ未ダ乳質ト渾和セザル者ニシメ乳  
質ニ比スレバ輕シ故ニ自ラ上面ニ浮ニ聚ルナリ  
○酸酥ハ乳汁ヲ取り磁孟ニ入レ置テ其酥終ニ凝  
結ノ酸味トナルニ至テ分チ取ル者ナリ。或ハ橙汁  
或ハ醋或ハ酒石英ヲ乳汁ニ加レバ酥自ラ凝聚ス

ル故ニ是ヲ分チ取ルモ亦良。○或ハ酥ヲ以テ酪ヲ  
製ス。是ヲ酥酪ト曰フ。通例多ク甘酥ヲ以テ製ス。故  
ニ一ニ是ヲ甘酪ト名ク甚ダ白色ニシメ最モ甘美ナ  
リ。其製法。甘酥ヲ取り底ノ圓キ磁孟ニ入レ擂槌ニ  
テ手ヲ住メズ疾ク攪滚スレバ遂ニ水液自ラ分レ  
酪ハ凝聚スルナリ。是ヲ分チ取り貯フ。主治。甘和清  
涼滋養ノ功アリ。誤テ熱セル飲食ヲ用ヒ。口舌咽喉  
胃管等ヲ傷爛スルニ酥ヲ服メ速ニ其煩痛ヲ消シ  
治ス。○珍饈盛饌ノ調理ニ多ク用フ。然モ多血肥満  
壯實ノ人多ク是ヲ用レバ滋養ニ過テ害アリ又胃

弱キ人ハ消化シ難シ。凡ソ脂油ノ類ハ胃ノ消化ノ

運營ヲ妨クレバナリ。

福

「カル子メルキ」又ボトルメルキ

蘭

○按ニ是ハ酪ヲ取りタル餘殘ノ乳汁ナリ故ニ

譯ノ酪餘ト名ク

是ハ酪ノ條ニ説ク如ク酥ト酪トヲ取りタル餘殘ニ  
メ脂油ヲ脱シタル乳汁ナレバ稠厚ニメ多ク土氣  
ヲ含ミ凝固シ易シ故ニ是ヲ以テ乾酪ヲ製ス主治  
性。乳清ノ如シ然庄土氣ヲ含ム故ニ乳清ニ比スレ  
バ消化シ難シ但酸味ヲ帶テ清涼ノ効アリ諸熱病

或ハ膽液過多勞力ノ人ニ稱用ス。夏月ハ甘味ノ品  
ヲ加ヘ冷飲ノ良。又滋養ノ功アリ故ニ勞瘵失苟兒  
陪苦等ニ驗アル。大抵乳清ノ如シ。但下利ノ効ア  
リ。或ハ厨房調理ニ用フ。

福

乾酪

「カーズ」

蘭

是ハ通例牛乳或ハ羊乳ニテ造ル。二種アリ一ハ酥  
ヲ去ナズノ造リ一ハ酥ヲ去リ製ス然庄多ク酪餘  
ヲ以テ製ス。○此物ハ乳中ノ最モ粗ナル質ニメ塗  
土ヲ含メリ然庄油及ビ酸液アル。酪ノ如シ故ニ  
亦滋養ノ効アリ但酪ニ比スレバ其油稀ク酸性モ

少シ○是ヲ蒸餾スレバ終ニ其壇底ニ重キ塗土殘リ是ヲ火ニ投スレバ焰ヲ發ス然レバ酪ニ比スレバ土氣多キ故ニ飲食消化シ難キ人ハ是モ亦消化シ難シ○牛乳ニテ製スル者八方形ノモノアレ正多クハ扁圓ナリ羊乳製ノ者ハ小ナレ正粘脂多シ但其大小形狀ハ是ヲ製スル地ニ隨テ異ナリ或ハ丁子格墨因等ヲ加ヘ製スルアリ故ニ其色モ一樣ナラズ○新乾酪ヲ琶布ト作シ腫瘍ニ貼メヨク膿ヲ成ス國○乾酪ハ乳汁ヲ凝固メ乾シ鍛ト成スト爲ス者ナリ製法後篇ニ載ス

乳清 セリュム・ラクチス 罗

空イ又ホイ 蘭

是ニ二種アリ一ヲ甘乳清ト名ケ。一ヲ酸乳清ト名ク。通例牛乳ヲ用テ製ス。

甘乳清

セリュム・ラクチス・ドル  
レス・羅・ス・テ・空イ 蘭

製法 新ニ絞リ取タル乳汁一斗ヲ猛ニ入レ。炭火ニ上セ。徐々ニ水氣ヲ蒸散シ漸ク粒塊ヲ生シ黃色ヲ帶ヒ。終ニ乾固スルニ至テ是ニ水ヲ加テ復一斗ノ量ト爲シ。稍煮沸メ火ヲ下シ。濾過ノ清液ヲ取ル。此即チ甘乳清ナリ又法 乳汁ニ雞子白ヲ拌ゼ加レバ清濁自ラ分泌ス。其清液即チ甘乳清ナリ。

酸乳清

セリュム・ラクチス・アシ  
ギム・羅・シ・レ・ウイ 蘭

## 製法

新ニ絞リ取タル乳汁ニ橙汁或ハ醋或ハ酒石英ヲ加レバ乳中ノ酥ハ自ラ凝固ス。是ヲ分チ取り貯フ。此即チ酸酇ナリ。酥ノ條其餘殘ノ清稀ノ汁ハ即チ酸乳清ナリ。又法乾乳乳汁ヲ磁鍋ニ入レ火乾固スル者ナリ。漢人所謂乾酪ニノ江戸官製白牛酪是ナリヲ取り搗碎キ。水適宜ニ加テ溶化シ。是ニ橙汁ヲ加レバ清濁自ラ分泌ス。其清液即チ酸乳清ナリ。

## 主治

酸味ノ害アル諸病ニハ甘乳清ヲ用フ。○性清凉ニメ滋養浸潤ノ功多シ。酷厲毒ヲ消シ。脂肪ヲ益シ。人ヲメ肥腴セシム。肺傷勞瘵。一切血液枯涸消耗

羸瘦病ノ初發ニ用テ効アリ。○乳清ハ乳糖次ニ及ヒ乾酪ノ質ヲ夾ミ。又消石様ノ風化鹽ヲ含ミ。微礬砂ノ性アリ。故ニ收敛清涼ノ血液ノ沸騰ヲ鎮メ。大便ヲ微利ス。一切壯熱煥衝病。膽液熱。咽喉焮腫。眼焮腫等凡ソ熱病ノ飲料トシ用テ甚ダ驗アリ。又血中ノ酷厲毒ヲ消シ腸ヲ淨刷スルヲ以テ清血ノ効ヲ稱シ。間歇熱ヲ治スル良劑トス。甘乳清ハ滋養ノ効シ。酸乳清ハ清涼ノ効多シ。下利ノ功ナシ。故ニ多ク熱症ニ用フ。或ハ乳汁一匙ニ答末林度一弓ヲ加ヘ。前法ノ如ク製ノ酸乳清トシ熱病ニ用テ煩渴ヲ止メ。壯熱ヲ解シ。血液ノ腐敗ヲ遏ム。○粘

稠液ヲ稀解シ壅滯ヲ疏通シ殊ニ肝脾ノ閉塞ヲ祛ク功アリ。故ニ神思鬱憂病即チ依剥レバ昆塗コント兒コノ内科脾病。狂癇。或ハ痛風。失苟兒ナカル陪苦ボイク卒倒癱等ノ初發ニ用テ驗アリ。○總テ莊再タル病ニハ毎日服量ヲ多クノ久服スペシ。經久ノ痛風。或ハ勞瘵様ノ病ニハ一切食物ヲ斷チ唯乳清ノニ用テ滋養シ大効ヲ得ル。ニアリ。虛羸ノ者ハ春月用テ殊ニ効多シ。但胃ノ弱キ者是ヲ過服スレバ胃ニ重滯メ食機ヲ妨ケ精力ヲ減スルニアリ。故ニ時々服量ヲ加減シ用ル。肝要ナリ。然庄壯熱病。内部焮衝ノ如キ卒病ニハ是ニ

拘ラズ饒多ニ用ノベシ。○野羊乳清ハ虛弱ノ患者ニ尤効アリ。又小便ヲ利シ鬱塞ヲ開キ喘息氣急或ハ吐血等ニ峻効アル。牛乳清ニ勝アリ。○乳清ヲ蒸餾スレバ初ノニ水出ル。尤多ク。次ニ酸味ノ精及ビ稠キ油ヲ滴ス。其列篤兒トトコ多ノ底ニ炭ノ如ク土ノ如キ物殘ル。是ヲ水ニ溶シ煮テ水氣ヲ減シ冷處ニ置ケバ海鹽質ノ芒ヲ結ビ或ハ其炭土ヲ煅燒スレバ亞兒アルカ加利性ノ固鹽少許出ヅ。其油ハ酸味ヲ含ム其質。石鹼ノ如シ。然レバ乳清ハ徒ニ水液ノニニ非ズ。ノ許多ノ滋養スベキ諸物ヲ含蓄スル。知ルベ

シ條ニ乳ヲ蒸餾スレハ中和鹽アリト云者是ナリ。  
中和鹽ハ酸性鹽ト亞兒加利鹽ト多以自ラ合和メ  
成ル者ナリ。乳質ニハ揮發ノ亞兒加利鹽ナルシト雖  
七其固性ノ亞兒加利鹽アルヲ以テ  
右ノ如ク中和鹽ヲ結成スルナリ。

製法 叔布福

乳糖 メルキソイクル 蘭

甘乳清ヲ取り磁鍋ニ入レ文火ニ上セ水氣  
ヲ蒸散メ蜜ノ稠ト爲シ冷處ニ置ク片ハ凝テ芒ヲ  
結ブ。此芒卽チ乳糖ナリ性味稍沙糖ノ如シ。乳白色  
ニメ香氣ナシ。主治性。甘乳清ノ如ク滋養ノ効アリ。  
血中酷厲毒アルヨリ發スル諸症ニ毎日一二錢宛  
用フ。欬嗽ニハ二三錢許服シ。或ハ和胸飲劑ニ加ヘ  
テ

用ヒテ効アリ

福

乳香油 オレウム・マスチクス 罗

製法

乳香

三弓  
細搗者

玫瑰油

一升

右磁壺ニ内レ葡萄酒少許ヲ加ヘ。ヨク攪和シ密閉  
シ文火ニ上セ煮テ乳香烊化スルニ至リ。濾過ノ油  
ヲ取り硝子壠ニ入レ固封シ貯フ

主治 温壯收斂ス。外敷メ神經、腱筋ヲ強壯シ。肢體弛  
弱、麻痺、痛風、流走痛、傷冷、毒痛、齒痛等ニ効アリ○心

下ニ擦スルテ胃ヲ健ニシ。痞氣ヲ散シ。惡心嘔吐下利ヲ

治入

医

遠西醫方名物考卷三終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱

慈濟堂富川先生著

全三冊

理學門植學皆宗

富川據毫先生著

八五三冊

同 内象銅版圖

同上

全帖舍密開宗

同上

全萬三冊完

日本萬至三篇

增補和蘭藥鏡

同上

全冊醫療正始

小醫伊東先生著

每篇三冊慕

日本萬至三篇

遠西醫方名物考

同上

拿前泰山名醫彙講

東川實作先生著

全八冊

同 神遺

同上

全九冊要術大新

人望洋先生著

全三冊

瘡醫新書

支那大醫先生著

全四冊

醫方列幾

孫理足章先生著

每篇三冊慕

蘭學階梯

同上

全三冊

蘭學佩觴

同上

全一帖而育發微

大體醫先生著

全二冊

幼幼精義

素堂內先生著

全三冊

病學通論

少林先生著

初篇二冊

濟生丸


杉田成脚先生譯

全冊

青藜閣

少林草夢町二丁目

須原屋伊八



樸齋宇田川先生著

初篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發行

火澤大  
青藜閣