

遠西醫方名物考

仁保
閑

卷四

武9
857
45-4

學大田稻早
館書圖
庫文田內寄托寄
號七六一第書托寄
號 9 第
册 4 第



武 857
45-4

榛齋宇田川先生著

二篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版



青藜閣發兌



遠西醫方名物考標目

卷四

肉豆蔻

肉豆蔻油

肉豆蔻榨油
肉豆蔻蒸餾油

肉豆蔻摩油方

肉豆蔻水

肉豆蔻丁幾去爾

暹篤綸安質沒扭

安質沒扭

保蓬砂

蓬董舍利別

雜膠蘭

通經散

雲砂散

刺篤亞斯

精製刺篤亞斯

物耶獨亞斯

蒲公英越幾斯劑

遠西醫方名物考

標目

風雲堂藏

大正五年九月廿四日
丙田糸子氏贈



忽弗滿鎮痛液

石膽ノ條

福窟篤呼篤兒

綠礬ノ下

卷三十五ノ二
十一葉ニ附ス

閉扁桃

甘扁桃油

扁桃消厲飲

苦扁桃油

扁桃乳

歇巴兒安質沒扭

安質沒扭

勿搦祭亞的列底那

的列底那

勿搦祭亞石鱈

石鱈

整乙典垵羅偈

刺必斯加烏斯蟄屈斯

整乙篤密垵兒

水銀ノ條
赤降汞ノ下

遠西醫方名物考卷四

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴按補

肉豆蔻

ミクスモスカクタ

モスカトノート蘭

〔主治〕辛温芳香ニメ收瀉シ竄透揮發ノ油及ビ鹽ヲ

含ニ破氣驅風ノ効アリ又頭腦神經胃子宮ヲ强健

ニシ諸腸ノ弛弱虚衰ニ因ル經久ノ下利ヲ止メ失

氣昏眩疝痛呃逆小便失禁或ハ粘液寒氣ヨリ起ル

風氣痞滯ノ諸症腹攣痛腸鳴等ヲ治シ孕胎ヲ健固

シ墮胎ヲ防護ス

伍叔
物依



肉豆蔻油 オレウム、ミクス、モスカータ羅

是レ搾油ト蒸餾油トノ二種アリ。然レ其性功同シ。是ヲ蒸餾スト雖モ他ノ蒸餾油ノ如キ竈透揮發ノ香氣多ク出ルヲナシ故ニ多ク搾油ヲ用ヒ蒸餾油ヲ用ルヲ稀ナリ

搾油

オレウム、エキス、ブレシ、ム、ミクス、モスカータ羅

製法

肉豆蔻 一斗

右石臼ニ入レ搗テ泥ト爲シ毛篩クワイタニ入レ布巾ヲ覆ヒ罐ニ熱湯ヲ盛り文火ニ上セ。右ノ毛篩ヲ罐上ニ置テ肉豆蔻泥熱スル時速ニ取テ布袋ニ盛り鐵版

ヲ熱湯ニ浸シ温メテ其袋ヲ夾ミ榨ニ内テ其油ヲ搾リ取ルナリ。但油冷レバ凝固シ酪ノ如シ故ニ是ヲ温メ焔トカシ硝子壘ニ收メ固封シ貯フベシ。○肉豆蔻ヲ細ニ剉ミ搗テ鍋ニ入レ温メ搾テ油ヲ取ル法アレ。凡宜シカラズ火氣ニテ其油ニ含メル竈透揮發ノ精氣耗散スレバナリ。○搾油ニ三種アリ。第一種ハ尤芳香ニメ黄色ヲ帯ヒ透亮粘テ稀シ或ハ血色アリ。冷レバ凝結メ蠟ノ如シ。磁製小壘ニ入レ販ク。是ヲ上品トス。然レ久ク貯レハ赭赤色トナル。第二種ハ第一種ニ比スレバ其色淡薄ニメ性功モ劣

レリ。方形ノ小塊ト爲シ。取ク第三種ハ蠟。羊脂。椰子油ニ肉豆蔻油少許ヲ加ヘ製メ府利油ト稱シ。取ク。是ヲ下品トス。藥用ニ堪ズ。

蒸餾油

オレウム。デスチルリウ。ム。エクス。モスカータ。羅

製法

丁香。蒸餾油ノ製法ト同シ。○肉豆蔻。蒸餾油ハ清稀ナリ。然レ性功搾油ト同シ。

主治 性熱。虚冷ヲ温壯ニシ。破氣驅風ノ良驗ヲ稱ス。

内服シ。或ハ外敷メ肉豆蔻主治ノ諸病ニ峻効アリ。

○服量四瓦ヨリ十瓦マデ適宜ノ飲液ニ點服ス。

○外敷メ鎮痙疏通ノ功ヲ稱シ。麻痺不遂。痙攣。搐掣。痛

風脚痛或ハ劇キ頭痛等總テ神經ノ諸症ニ驗アリ。乳香油ヲ加ヘ施メ尤良。○是ヲ腰部ニ擦テ痞氣鬱滯ヨリ起ル疝痛胃痛或ハ荏苒タル嘔吐ヲ治ス。又左ノ方良驗アリ。

肉豆蔻摩油方

肉豆蔻油

二錢

薄荷油

五二

阿芙蓉液

十瓦

右合和シ患部ニ塗擦スル。日ニ三四次。

肉豆蔻水

エアウ。デ。モスカーデ。羅

製法

肉豆蔻

粗末ニ比

燒酒

六十北

右調和レ罐ニ入レ浸ス_一二三日。文火ニ上セ蒸餾
 シ其精露。氣味淡薄ナルニ至テ火ヲ下シ其露ヲ取
 リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ。○甘味ヲ好ム者ハ其
 露水ニ茴香或ハ沙糖七北ヲ加ヘ浸スベシ。美黄色
 一爲スニハ鬱金ヲ適宜ニ加ヘ浸スベシ。○其氣味
 悍烈ナルヲ嫌フ者ハ方中ノ燒酒ニ水十北ヲ加ヘ
 蒸餾スベシ。主治肉豆蔻主治ノ諸病ニ用ヒテ峻効
 アリ。

肉豆蔻ネキテウ丁テウ幾テウ去テウ爾ル

「ティンキテウラニクス。モスカ_一タル」
羅

製法

肉豆蔻

搗碎者四多

右硝子壘ニ入レ銳烈ノ燒酒ヲ加テ藥料ノ上ニ指
 横徑ニ至リ其口ヲ密封シ爐邊ニ置テ時々其壘ヲ
 振蕩シ藥氣ヲ出シ憑シ貯フ。○府利ノ未少許ヲ加
 レバ氣味尤芳烈ナリ。○適宜ニ沙糖ヲ加ヘ憑シ用
 レバ味甘美ナリ。主治肉豆蔻主治ノ諸病ニ用ヒテ
 峻効アリ。

保

蓬砂

レボラクス又ボラクスソーダアルカリ又ケ
レイソコルラ羅ボラス又ゴウドソル
デールセル蘭

蓬砂ハ諸金坑殊ニ銅坑ニ於テ自然ニ生スル一種

ノ鹽ナリ其質ボラクスニ種ノ酸性鹽ト許多

鹹蓬鹽兒一種ノ鹽ヲ混合ノ成ル製煉術ヲ以テ綠礬

其酸性鹽ト兒如加利鹽ト相分ル其酸性鹽ハ細屑

ノ狀ヲ為シ光澤アル微細ノ眞珠ノ如クニ溶

難シ百兒西亞ノ亞細亞洲等ノ山坑ニ出テ未ダ製煉

セザル者ハ粘汚ニメ淨潔ナラズ是ヲ生蓬砂ト名

ク亞謨斯的爾達謨和蘭ニテ是ヲ精製ス上品ハ其

塊大ク重ク乾固潔白稍透亮ニメ六稜ヲ為シ兩端

鈍ナリ風化セズ貯テ濕ラズヨク水ニ溶化ス酸味

遠西各物考 卷四 風雲堂藏

ノ液ニ加レテ沸騰セズ。味初甘ヲ帶ビ終ニ微苦辛。
淋灰鹽樣ニ侵刺シ不佳ノ氣アリ

產地形質 蓬砂資生ノ原由。性質。製法等。從來確定ノ

說ナシ。然レ今。和蘭販ク所ノ者ハ應帝亞地方。殊ニ
錫蘭印度島名ノ山坑ニ出ルヲ和蘭ニテ精製スル者ナ
リ○或云。百兒西亞等ノ諸金坑。殊ニ銅坑ニ出ル礦
性ノ泉。自然ニ凝結メ此物ヲ成ス。其質及ビ色。石鹽
ノ如シ味鹹ク微辛ナリ○或ハ此物ノミ沙ノ如ク
聚リ生シ或ハ諸礦ニ混メ生シ是ヲ分チ製煉ス○
生蓬砂ハ粘膩及ビ土氣アリテ淨潔ナラズ黯綠色

大榛子ノ如ク小石塊ノ如シ。百兒西亞或ハ莫卧兒
亞細亞洲ニ産ス○生蓬砂ハ綠色ナリ深緑ナルヲ
上品トス淺緑ヲ下品トス是ヲ製メ尋常ノ品ト爲
ス○是ヲ生スル礦ニ隨テ其色ヲ異ニス黄金礦ニ
生スル者ハ黃色。銀礦ニ生スルハ白色。銅礦ノ者ハ
綠色。鉛礦ノ者ハ黑色ナリ○此物山坑ニ出テ氣ニ
曝レバ粘膩ヲ生シ微赤色トナル是ヲ粘蓬砂ト名
ク○應帝亞地方ヨリ輸ス者二種アリ。一ハ黃赤色
ニメ粘潤アリ是生蓬砂ナリ。一ハ灰色ナリ是ハ勿
搦祭亞歐羅巴洲ニテ生蓬砂ヲ水ニ溶シ煮テ結芒

セシムル者ナリ。或ハ是ニ明礬ヲ加ヘ偽ル者アリ
○百兒西亞莫卧兒ノ諸金坑。殊ニ銅坑ニ於テ一種
ノ泉出ツ。濁テ綠色ヲ帯ビ鹽氣アリ。是ヲ煮テ稠厚
トシ其坑ノ泥土ニ獸脂ヲ加テ泥ト爲シ是ヲ以テ
其外圍ニ塗地ニ穴ヲ穿テ是ヲ内レ又其泥ヲ以テ
封シ數月ヲ經テ取出セバ凝固ノ蓬砂トナルト云
製煉法 和蘭拂郎察勿擲祭亞等ニテ生蓬砂ヲ製メ
純潔ト爲ス。諸鹽類ヲ淨製スル如ク是ヲ水ニ溶
シ煮テ放冷シ芒ヲ結バシム此即チ尋常ノ品ナリ
其結芒セザル渣液ハ膽礬氣アリ是レ蓬砂ニ含メ

ル酷厲毒ナリ故ニ製蓬砂ハ性緩ニノ醫藥ニ供ス
○或ハ生蓬砂ニ水ヲ加ヘ搗磨メ淘洗シ靜定ノ上
清ヲ傾去リ又水ヲ加ヘ前法ノ如クスル。數回純
潔鮮美トナルニ至リ日乾シ用フ。○或ハ生蓬砂ヲ
石灰水石灰條ニ溶シ洗淨メ汚汁ヲ去リ煮テ放冷シ
芒ヲ結バシム即チ瑩白ノ塊ヲ爲シ明礬ノ如ク味
鹹辛。淋灰鹽ノ如シ是ヲ勿擲祭亞蓬砂ト名ク今ハ
多ク和蘭ニ於テ精製メ此品ト作シ四方ニ貨ス
性 製煉ノ蓬砂ヲ坩鍋ニ入レ燒ク片ハ溶テ煮沸
シ明礬ヲ燒ガ如シ但明礬ハ泡起メ止ズ。蓬砂ハ水

氣盡レバ坩底ニ固著シ堅硬透亮ノ硝子トナル。逾
火ヲ増シ是ヲ燒ク片ハ漸ク減耗シ終ニ盡ク消散
ス。其硝子ハ堅固ナレバ水ニ淹セバ溶化シ氣ニ曝
セバ風化ノ白霜トナル。○製煉ノ蓬砂ヲ酸性ノ液
ニ投シ或ハ亞兒加利性ノ液ニ加ルニ毫モ沸騰セ
ズ。或ハ蓬砂十六ヲ取り格兒弗ニ内レ漸ク火ヲ
増シ蒸餾スレバ蓬砂大ニ泡起シ澄清ニノ氣味ナ
ク水ノ如キ液。六ヲ出ツ。此水ニ酸性ノ鹽或ハ亞兒
加利鹽ヲ加ルニ滾動セズ。然レバ蓬砂ハ酸性ナラ
ズ。亞兒加利性ナラズノ唯一種ノ鹹鹽ナリ。其格兒

弗ニ火ヲ増シ蒸餾スルニ少モ出ル者ナク蓬砂其
底ニ著テ硝子トナリ堅固透明ナル。尋常ノ硝子
ニ勝レリ。元來蓬砂ノ質ハ硝子トナリ湯シ即チ此
ヲ以テ知ルベシ。此硝子ハ舌ニ觸テ辛辣ス堅固
ナレバ數日温湯ニ淹セバ溶化ス是ヲ煮テ放冷ス
レバ結芒ノ故ノ如キ蓬砂トナル。但尋常ノ者ニ比
スレバ其質差鬆疏ニノ水棉様ナリ即チ是ヲ消石
精ニ投スレバ微沸動シ遂ニ白霜トナレバナリ。○
蓬砂ノ末ニ其三倍量ノ陶土ヲ和シ格兒弗ニ内レ
武火ニテ蒸餾スレバ水ノ如キ清稀ノ液出ヅ。是レ

亞兒加利性ニノ味鹹ク尿氣アリ○蓬砂ヲ水ニ溶
 シ是ニ董菜舍利別ヲ加レバ綠色トナル加是利性亞兒
 微升水ヲ加レバ黃赤色トナル同礶砂ヲ水ニ溶
 シ加レバ尿臭ヲ生ズ上然レバ蓬砂ハ一種固性ノ
 亞兒加利鹽ニノ酒石鹽ニ近シトス然レ是ニ酸性
 鹽ヲ加テ毫モ滾動セズノ相混和スル故ニ真ノ亞
 兒加利性ノ鹽ト差異ニノ唯尿氣礶砂氣アリ微粘
 脂ヲ含テ鹹味アル一種ノ礳性鹽トス
 人工蓬砂或云勿搦祭亞等ニ於テ消石童便礳蓬鹽
 ヲ以テ蓬砂ヲ製造シ或ハ礶砂消石海鹽ヲ合シ或

ハ是ニ酒石ヲ加ヘ製シ或ハ固性消石朋礳尿ヲ合
 シ煮テ乾製スト云然レ其造法從前未詳晰ナラズ
 ○榕按ニ蓬砂和産未ダ詳ナラズコト本邦藥舗ニ
 舶來ノ者二種アリ一ハ白色透亮ニノ上品トス
 是レ右ノ譯說ニ所謂製煉蓬砂ナリ一ハ淡黃赤
 色ニノ粘膩ヲ帶フ是ヲ油蓬砂ト呼ブ是レ譯說
 ノ生蓬砂ナリ
 主治 血液大過ノ運動ヲ降鎮レ催睡ノ功アリ故ニ
 是ヲ清涼阿芙蓉ト名ク○亞兒加利鹽ヲ含ムオホキ居多
 ヲ以テ一種ノ制酸藥トス○凝結ヲ疏散シ輕ク瀉

下シ小便ヲ利シ經閉ヲ通シ生胎ヲ分娩シ死胎胞衣ヲ下ス○經閉ニ一月ヨリ半錢マデ用ヒテ間捷効アリ○蓬砂半錢ヲ蒸餾水一匁ニ溶^{トカ}ノ角膜星翳ニ點シ或ハ痔痛驚口瘡ニ塗テ消散ス○驚口瘡失^シ苟兒陪苦ノ斷ノ潰爛ニ左ノ二方尤驗ナリ

蓬董舍利別 蓬砂^{極細末一錢或二錢} 董菜舍利別 一匁

右調和シ四分時^下毎ニ一茶匙ヲ用フ或ハ棉撒絲ニ蘸シ患處ニ貼ノ亦良

蓬砂蜜 蓬砂^{極細末一錢或ハ二錢} 玫瑰蜜 一匁

右調和シ用ル^下前法ノ如シ驚口瘡遍ク口中咽喉

ニ滋蔓スルニハ半時毎ニ二茶匙ヲ用フ栗^リ殼^ベ子^ス傑^ダ列^レ乙^イ或ハ覆盆舍利別ヲ劑中ノ蜜ニ代用メ尤良惡性ノ驚口瘡モ兩三日連服メ治ス治メ後口中仍腫痛スル者ハ緩和ノ救劑ヲ施スベシ○左ノ二方經閉ヲ通シ胞衣ヲ下ス

雜腹蘭通經散 蓬砂 一匁 沒藥 十二^分

雜腹蘭 三^分 桂油 一滴

右散劑一服トシ葡萄酒或ハ艾蒿^{ヨモギ}舍利別適宜ニ加月經常ニ來ル項ニ用フ

雜腹蘭通經膏 蓬砂 沒藥 各十^五分

土青木香根

雜股蘭

各三爪

薩毘那油

二滴

舍利別

適宜

右調和シ一服トス○産後腹痛ヲ治シ惡露ヲ下シ

白帶下ヲ治スルニ左ノ方尤良

雲砂散

雲母

蓬砂

各半

沒藥

五爪

右散劑一服トス

○蓬砂外敷ノ鑽透シ贅肉ヲ侵蝕シ敗穢ノ創潰瘍等ノ膿ヲ排ヒ淨刷ス○煉金家はヲ以テ諸金ヲ熔シ且錐鍍ニ用フ叔伍揚依福布ツギアセ

剥篤亞斯蘭

シ子レスカラーヘルラチ羅

製法

榭類山毛榉ノ類總テ堅實ナル樹ヲ燒テ灰

ト爲シ水ヲ加テ灰汁トシ其上清ヲ濾シ取テ煎熬

シ乾ノ鹽ト爲ス是レ剥篤亞斯ナリ○是ヲ燒ク法

曠野ニ一大坑ヲ穿チ其底ト内圍ニ遍ク瓦磚ヲ敷

連子樹ノ幹枝ニ截テ其内ニ積ニ焚シ了テ煙消

シ通紅トナル片尋常ノ灰汁ヲ取テ必シ宛頻ニ

撒ス片ハ其灰ノ鹽氣凝結ノ堅キ塊片トナル但數

時ヲ經テ盡ク焚了リ十分燒灰トナレバ其亞兒加

利鹽ヨク凝結シ味鹹辛酷烈トナルナリ○其大塊

ヲ成シ乾固ノ石炭ノ如ク疏脆ニメ碎ケ易ク灰白色或ハ天藍色ヲ帶ビ或ハ白點アルヲ上品トス○氣ニ觸テ溶ケ易ク或ハ水ニ浸メ溶化スルヲ多ク或ハ是ヲ磁盃ニ入レ水ヲ加ハ浸スヲ十二時ヨク攪テ盡ク溶化スルヲ上品トス○或ハ此燒灰ヲ水ニ溶シ是ヲ明礬水明礬ヲ水ニ溶シタル液ニ滴メ其底ニ沈ム物多キハ亞兒加利鹽多キ候トス○或ハ是ニ鹵石様ノ土ヲ含ム者アリ是ヲ試ル法此灰ヲ水ニ溶シ是ニ酸味ノ液ヲ滴スレバ其土多ク底ニ沈ムヲ以テ知ルベシ○或ハ此灰ヲ窖ニ入レ置テ速ニ軟ラ

キ溶ルハ亞兒加利鹽多クノ上品トス否ルハ海鹽ヲ夾ニ或ハ消石質アル者ナリ○此燒灰ヲ貯テ日ヲ經レバ是ニ大氣中ノ酸氣ヲ吸收スルユ工ニ自ラ消石質トナリ其本性ヲ失フ故ニ是ヲ貯ルヲ十ク速ニ製ノ剝篤亞斯ト爲スベシ國國
○尋常ノ剝篤亞斯ハ礬性及ヒ海鹽性ノ酸氣ヲ含ムニ由テ其亞兒加利性純粹ナラズ諸製煉術ニ用ヒ難シ故ニ左ニ記ス所ノ精製法ヲ以テ純粹ニシ用フベシ

精製剝篤亞斯

シ子レスカラヘルラチヂピラチ
羅ログソウチヘコルシレポット

製法

剥篤亞斯ボトアス 細末適宜

雨水 等分

右ヨク攪和シ濶ヒロキ盆ニ入レ平等ニ展ヒゲ大氣ニ曝サス
フ八日。漚過ノ汁ヲ取り是ヲ清キ鐵壺ニ入レ火
ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾カシ手ヲ住ヤメズ攪セテ壺
底ニ固著セシメズ終ニ其底遍ヒク透紅トナルニ至
テ速ニ火ヲ下シ硝子壺ニ收メ固封シ貯フ

又法

剥篤亞斯 適宜
水 三倍

右剥篤亞斯ヲ坩ルンボ鑊ニ入レ武火ニ上セ煨ク
半時許。ヨク其含メル汚物ヲ燒盡シ取出シ研末ノ水ヲ
加ヘ數攪セ溶トカシ靜定ノ上清ヲ取り紙ニテ漚シ火
ニ上セ其液ノ三分ノ二ヲ蒸散シ減シ上面ニ膜ヲ
生スルニ至テ火ヲ下シ冷處ニ置ク片ハ自ラ凝テ
芒ヲ結フ。芒ヲ去リ液ヲ取り又煮テ膜ヲ生スルニ
至リ放冷ノ芒ヲ去ル數次斯ノ如クメ其液必モ芒
ヲ結バザルニ至テ又煮テ手ヲ住メズ攪セ盡ク水
氣ヲ蒸散シ乾シテ鹽ト爲シ又少シク煨テ白色トナ
ス是ニ由テ最モ純粹固性ノ亞兒加利鹽トナル

風化

スル鹽ハ揮發鹽ナリ風化是ヲ硝子曇ニ入レ固封
 セサル鹽ヲ固性鹽ト謂フ者ハ純粹ノ亞兒加利鹽ニ非
 シ貯フ○其芒ヲ結フ者ハ純粹ノ亞兒加利鹽ニ非
 ズノ石膽質ノ酸性鹽ヲ含ムユエニ其二鹽自ラ渾
 和抱合ノ芒晶ヲ結ブ其性食鹽或ハ孕礬酒石ト同
 様ノ中和鹽ナリ凡ソ芒ヲ結ビ晶ヲ成ス鹽類ハ皆
 必ズ酸性鹽ト亞兒加利鹽ト多ク必
 自ラ渾和抱合ノ成ル者ナリ故ニ總テ
 是ヲ中和鹽ト名ク又乳清ノ條ニ註ス故ニ結芒セ
 シメテ盡ク其酸性鹽ヲ含マシメ是ヲ除キ去テ純
 粹ナル亞兒加利鹽性ノ剝篤亞斯ト爲スナリ○凡
 ソ剝篤亞斯ニ温湯ヲ加テ溶化セズ或ハ其汁ヲ瀉
 テ透漏セザル渣至ハ皆純粹ノ亞兒加利鹽ニ非ズ

ノ石膽質ノ酸性鹽ヲ混シ或ハ鹵石様ノ土ヲ夾ム
 ナリ是レニ水ヲ加ヘ煮テ溶シ瀉テ放冷スレハ結
 芒スルヲ以テ知ルベシ因
主治此鹽ハ性侵蝕ノ凝體諸器ヲ衝動シ粘稠ヲ稀
 釋シ衰弱ニ因ル寒性ノ粘液病ニ用ヒテ効アリ○
 胃腸ノ酸敗液ヲ消ス故ニ胃ノ虚弱ニメ酸敗液過
 多ナルヨリ發スル腹痛或ハ頑固ノ間歇熱ヲ治ス
 ルニ此鹽ヲ苦味ノ健胃劑ニ加ヘ用ヒテ尤効アリ
 ○凡ソ虚弱ニメ粘液過多ナル頑固ノ諸病ハ斯ノ
 如キ亞兒加利鹽適効アリ○寒性ニメ粘液多キ發

狂ニ用ヒテ小便ヲ利シ粘液ヲ疏ノ良効ヲ奏ス○
 此鹽ヲ服メ多ク温湯ヲ用ヒ被覆スレバ發汗ス。温
 覆セザレハ小便ヲ利ス。故ニ間水腫ニ大効アリ○
 服量二匁ヨリ十匁マデ水或ハ葡萄酒ニ溶シ日ニ
 三四次三十滴許宛用フ○酸敗液ノ諸症ヲ治シ或
 ハ結石ヲ消スルニハ此鹽二錢ヲ水二比ニ溶シ每
 日連服ス○過服シ或ハ久服スレハ胃ノ運動ヲ減
 損シ飲食ノ消化ヲ妨ルヲアリ。故ニ預メ是ニ意ヲ
 用ヒ施スベシ○此鹽ヲ水ニ溶シ或ハ礶砂ヲ加ヘ
 蒸溺劑若クハ塗藥トシ水腫及粘液腫ヲ消散スル

ニ施メ屢効アリ○此鹽ノ性功。酒石鹽ト同シ又是
 ヲ水ニ溶セバ酒石液ト同シ代用スベシ但酒石鹽
 及物耶獨亞斯出ツニ比スレバ差峻烈ナリ。鱒蓬鹽
 ニ比スレバ酸性ヲ含ム微キユエニ尤酷烈ナリ
 故ニ大氣ニ觸レハ消化シ易シ○此鹽多ク製煉術
 ニ用ヒ或ハ石鹼ヲ製シ硝子ヲ造リ或ハ布帛ヲ晒
 スニ用フ依 叔 侯 福

物耶獨亞斯

シニス。インヘクトリウス羅

製法

葡萄酒ヲ造ル片葡萄酒汁ヲ搾リタル滓或ハ
 葡萄酒汁ヲ泡釀シタル桶ノ底ニ沈ム脚ヲ絞テ渣

ヲ取り炙り乾シ燒テ灰ト爲セバ固性鹽前ニ註ス凝結シ。堅クメ石ノ如ク大小塊片ヲ成シ宛モ酒石鹽ノ如シ。淡綠色。鹹苦ニメ乾固ナルヲ上品トス

主治 酒石鹽ノ如クニメ差峻烈ナリ故ニ生石灰ヲ加ヘ外敷メ腐蝕藥トス。又石鹼匠。漆匠多ク用フ疾叔

蒲公英根 越幾斯劑

エキスタラクト。タラキサキ。

製法 蒲公英根

生鮮者到

沸湯 十比

右罐ニ入レ蓋閉シ浸ス十二時ニメ煮ル半時。

放冷シ絞リ濾テ汁ヲ取り。靜定メ塗カヲ去リ火ニ上

セ水氣ヲ蒸散シ手ヲ住メズ攪テ稠膏ト爲シ貯フ

按 ○蒲公英ハ莖葉根共ニ乳白色ノ汁アリ。護謨華

爾斯様ニメ味苦シ全草ノ性功ヲ此汁ニ含ニ殊ニ

根ニ多シ。季秋初冬ノ頃或ハ早春未ダ芽ヲ生セサ

ル時。根ヲ採レバ其汁多クメ性功モ完ツタシ然レ氏常ニ

生汁ヲ得難キ故ニ多ク越幾斯劑トシ用フ

主治 解凝。驅熱。利尿。發散。排泄。健胃ノ功アリ。○熱病

及ビ間歇熱ヲ解シ。膽液過多ノ人ニ効アリ。是レ嗽

衝質ノ稠厚ナル血ヲ稀釋スレバナリ。然レ氏尋常ヨソ常ニ嗽

衝壯熱ヲ涼解スル藥ト異ナリ。唯諸脉纖維ノ充張
 カヲ稍ヤ虛弱ニシテ血ノ炊衝稠厚ヲ稀釋スルニ尤モ適
 當スト知ベシ。○解凝利尿ノ効アルヲ以テ黄疸或
 ハ腹水病或ハ肝藏ノ壅塞硬腫等ノ初發ニ用ヒ殊
 是レガ粘稠液ノ鬱積メ發スル者ニ用テ適効アリ。其
 深ク根蒂ヲ結者ハ此藥ヲ以テ其頑固ノ壅塞及膽
 液ノ結石等ヲ疏解スルヲ能サレバナリ。○此藥苦
 味ニシテ解凝ノ効アルユエニ胃ノ粘液ヲ祛キ飲食
 消化ヲ進メ稍ヤ健胃ノ効アルヲ他ノ苦味健胃ノ諸
 藥ノ如シ又輕ク神經ヲ強壯シ膽液粘液ヲ分利シ


腹内諸器ノ壅塞ヨリ發スル熱病脾病鬱憂病精神
 錯亂等其他荏苒タル諸病ニ効アリ。○血中ノ惡液
 ヲ淨掃シ瘀血ノ壅滯ヲ疏通シ諸液ノ分利排泄ヲ
 進殊ニ是ヲ腎ト尿管ヨリ排泄ス。故小便ヲ利諸頑固
 ノ瘡瘍ヲ發散ス。○服量日一弓ヨリ一弓半ニ至ル
 ○此根ノ生絞汁ヲ取眼ニ點メ角膜星翳ヲ消ス。○
 此草ノ性功大抵失格列乙根オシシタナリ洋萵苣根ノ如シ。
 依福

福窟ホク篤ト咩イ篤ト兒ル蘭ホク窟ク篤ク篤ハ液ノ義ヲ咩ヲ篤ヲ
 兒ハ測驗器ノ義ナリ

榕按ニ是燒酒及ビ藥精露水等一切水漿ノ輕重

ヲ測^分リテ精粗ヲ知ル器ナリ此篇載ル所ノ方劑
 中。燒酒藥精等。幾十度ノ者ヲ用フト云ハ皆此器
 ヲ用テ測^分ルナリ其造法測度ノ說諸書ニ出レ
 簡便ナラズ但技^バ太^{タイ}肪^ヒ亞^ア新撰局方ニ載ル所尤^モ
 易ニ測法モ密ナリ因テ今秋玻璃匠ニ命^シノ創^シ
 テ此器ヲ製シ家塾日常製劑ノ燒酒等ヲ試^シ測^分
 ルニ其輕重精粗毫釐^ノ差^ハズ故ニ其造法圖說
 ヲ左ニ記シ同好ニ告グ凡ソ西洋ノ醫術ヲ操^ル
 者此器ヲ製ノ常ニ藥室ニ備ヘ諸藥精^ノ丁^{テイ}幾^キ去^テ爾^ル
 等ヲ製スルニ臨テ燒酒ノ度ヲ測^分リ篇中載ル所

ノ製劑ノ定法ニ差^カフ^{コト}勿^レ



造法圖解 全形薄キ硝子ニテ造ル **天**管長五六寸許。
人大球内。空虚ナリ **地**小球内ニ水銀ヲ實ツ○其管
 正直ニノ毫^モ斜歪セズ小球ノ下尖ト正ク相對シ
 水ニ投メ管傾側セズ直立スルヲ要ス。否レバ其度
 正シカラズ○度数ヲ定ル法下球ニ水銀ヲ實チ是
 ヲ鹽水ニ浮ベ管直立メ靜定シ管ト大球トノ接際

鹽水度ノ符マデ没スルヲ度トシ假ニ火石ヲ以テ
 其處ヲ劃ス若シ其球深ク沈ムハ其水銀ヲ減シ
 ○鹽水ハ精製海鹽ノ乾ク者一分ヲ蒸餾水九分ニ
 溶化スルナリ精製海鹽ノ製法海鹽ノ條ニ出ツ
 是ヲ鹽水ヨリ取り出し清水ニテヨク洗ヒ又是ヲ
 蒸餾水製法ニ出ニ浮ムレバ其水鹽水ヨリ輕キユエ
 ニ其管沈ムト多シ假ニ火石ヲ以テ其水際ヲ劃ス
 是ヲ平分トス是ヲ蒸餾水其鹽水度ト平分トノ間
 ノ長ヲ取テ是ヲ平分上ニ移シ此長ヲ十二分チ其
 一分ヲ一度トシ下ヨリ算ヘテ十分ニ當ル處ヲ十
 度ト定メ其長ヲ又十度ノ上ニ移メ二十度ト定メ

斯ノ如ク逐次ニ上ニ移メ五十度ニ至テ止ム其度
 毎ニ皆假ニ火石ヲ以テ管ヲ劃シ又細ク裁リタル
 紙ニ右ノ度数ヲ寫シ其管中ニ容テ透見セシメ其
 口ヲ塗封ス○此器ヲ以テ燒酒藥精等ニ投スレバ
 其液ノ輕重稀稠ニ應メ浮沈出沒各異ナレバ其水
 際ノ度数ヲ見テ幾度ノ液タルヲ知ルナリ○或
 ハ二十度ノ燒酒ヲ十度ニセント欲セバ是ニ蒸餾
 水ヲ加テ重クシ十度ニ至ラシムベシ或ハ十度ノ
 燒酒ヲ二十度ニセント欲セバ復其燒酒ヲ蒸餾メ
 輕クシ二十度ニ至ラシムベシ餘ハ是ニ準ズ○此器

ヲ造リ。初テ鹽水ト蒸餾水トヲ以テ上ニ云如ク其
 度ヲ測リ定ルニハ華鳥賢ハクウケン歇セツ乙度イド名ノ驗冷熱器ニ
 テ五十六度ヨリ六十度ノ氣候ノ時ニ於テスベシ
 驗冷熱器ハ俗間寒暖計ト名ク氣候ノ寒暖ヲ驗ス
 ル器ナリ其華鳥賢歇乙度ノ製シ定ムル者和蘭常
 ニ用テ氣候ノ寒暖ヲ驗シ其度數ヲ諸書ニ載ス予
 此器ヲ得テ五十六度ヨリ六十度ニ至ル氣候ヲ測
 リ驗スルニ大抵春秋ノ稍冷○鹽水及蒸餾水ハ此
 器ヲ造リテ其度ヲ測リ定ル時ニ臨テ製スベシ否ガ
 レハ其水ノ量變ス○海鹽ハヨク乾ク者ヲ用ベシ
 濕タル者ハ水氣多ユエニ鹽ノ秤量切實ナラズ

閉

扁桃

アメイグダリス羅 アマンドル蘭

○榕按ニ扁桃ハ時珍綱目桃ノ集解ニ出ツ扁桃。
 扁桃。巴且杏皆同物ナリ先輩是ヲ巴且杏ト稱
 ス西洋說ヲ考ルニ是レ桃ノ族ニノ杏類ニ非ス
 故ニ扁桃ト稱ノ適當トス時珍曰扁桃出南番形
 扁肉澀核狀如盒其仁甘美番人珍之名波淡樹樹
 甚高大扁桃出波斯國百兒西亞形薄而尖頭偏狀
 如半月○華夷考曰扁桃出波斯國波斯呼爲婆淡
 樹長五六丈圍四五尺葉似桃而濶大三月開花白
 色花落結實狀如桃子而形偏故謂之扁桃其肉苦

澁不可噉核中仁甘甜。西域諸國並珍之。○巴且杏條。時珍曰。巴且杏。出回回舊地。今關西諸土亦有樹如杏。而葉差小。實亦尖小。而肉薄。其核如梅核。殼薄而仁甘美。點茶食之。味如榛子。西人以充方物。○舶來ノ品ヲ見ルニ其核。桃ニ比スレバ扁ク。上下兩端多クハ正ク對セズノ偏欹シ。或ハ勾リテ半月ノ如シ。故ニ扁桃。偏桃。或ハ偏核桃ノ稱アリ。又波淡。婆淡。巴且。皆音譯ノ稱呼ニ別物ニ非ス。花葉核仁ノ形狀氣味凡テ左ノ譯說ニ同シ。時珍。扁桃。偏核桃ヲ分テ二物トシ。又別ニ巴且杏ヲ舉テ杏

ニ屬スルハ其形質ニ就テ親ク查考セザルナリ。○此樹和産未ダ詳ナラス。但花戸ニアメントウト呼フ者二品アリ。一ハ桃ノ一種矮生ニノ漢名壽星桃。一ハ李ノ類ニノ漢名青皮李ナリ。共ニ扁桃ニ非ズ。

形狀 扁桃ハ桃ノ一種ニノ樹葉花實ノ形質大抵桃ノ如シ。但幹高大。勁固。葉微狹長。柔ニノ味苦シ。或云スレバ桃ト異ナリ。又云葉ヲ桃花白色。或ハ紫ヲ帶。葉ニ雜レバ鬚トノ分チ難シ。實ハ差長クノ偏面。縫路罅坼アリ。外皮淡綠。糙澁。毛茸アリ。熟スレバ淡

紫ヲ帶フ。肉薄ク味惡ク硬固ニシテ食フベカラズ。核ニ云桃核ニ比スレバ差長ク扁ク頗ル固ク。皺眼細ニ云紋ニシテ平滑。黃褐色。是ニ白色ノ仁ヲ藏ム仁ニ栗殼色ノ膜ヲ被フ。桃仁ニ比スレバ差長シ。其味甘キヲ甘扁桃ト曰フ重實美味ナルヲ擇ムベシ。蛙徽碎折スルハ藥用ニ堪ズ其苦キヲ苦扁桃ト曰フ即チ甘扁桃ノ一種ニシテ樹ノ形狀モ同シ。二種モ核ノ厚硬ナルト脆薄ナルト二品アリ仁ヲ扁桃ト名ケ藥用ス但枝ヲ去ラガル者亦通ノ。○幹枝ヨリ透亮ナル膠出ヅ。桃膠ノ扁扁桃ト呼フ。○此花候モ亦桃花ト同シ。實ハ五六月ニ熟ス。○此

物多ク暖國ニ産ス。亞弗利加洲ノ北地ニ自ラ生シ又拂郎察意太里亞齊西里亞。跋爾罷利亞。蘭牛鐸古以上歐羅巴洲ノ國名等ニ多ク培養シ或ハ和蘭ニモ長育ス。○按ニ此物舶來アリ。叔云。榛子ハ扁桃胡桃ノ如ク用フ。新鮮ナルハ乳劑ニ製シ或ハ搾テ油ヲ取ル。扁桃ノ如シ一切胸痛腎痛ヲ治ス其効扁桃油ノ如シ。榛子。新鮮ノ者ハ甘美ナリ水或ハ葡萄酒ニ浸シ殼ヲ去リ用フベシ。陳久ノ者ハ燥テ收溜シ咽喉ニ粘刺メ効ナシ。右ノ説ヲ以テ見レバハ胡桃ハ性功榛子或ハ近シ。勃云。桃仁ハ其効苦扁桃ノ如シ。此説ニ依

本草綱目 卷四 遠西名物考

桃ハ桃仁
ニ近シ

主治 甘扁桃ハ甘美ノ油及ビ粘液多シ故ニ甘和滋養シ。寧急ヲ緩弛シ。酷厲毒ヲ包攝和制シ。乳汁ヲ増シ。燉熱ヲ消シ。枯燥ヲ潤シ。乾效。勞嗽。吐血。肺瘍。羸瘦。病ニ驗アリ。○苦扁桃ハ惡液ヲ淨刷シ。能ク醒ヲ解ス。又粘痰ヲ疏豁シ。小便ヲ利シ。脾病。腸痛ヲ治シ。經閉ヲ通シ。壅滯ヲ驅除ス。（収）（伍）（依）（物）（裝）（物）

甘扁桃油

「オレウム。アメイグタリス。ドルシス」羅

製法

甘扁桃

新鮮者分量適宜

右核殻膜皮ヲ去リ仁ノニ取リ

核膜ヲ去ラザレバ其油味辛澁ニシ

和ノ性功 石臼ニ入レ水杵ニテ搗テ泥ト爲シ麻布ヲ失フ 袋ニ入レ榨ニ夾ミ徐クニ油ヲ搾リ出スベシ急ニ搾レバ油濁テ味佳ナラズ○仁ヲ焙ル_ト勿レ油熱性トナリテ其主能ヲ失フ○榛子。胡桃。亞麻。罌粟子等ノ油ヲ製スルモ右ノ法ト同シ（按）

主治 甘和滋潤ノ功ヲ以テ急迫ヲ緩メ。寧痛ヲ止メ。欬嗽。喘急。聲嘎。咽喉刺痛等ヲ治シ。氣管。肺。腎。尿道ノ酷厲液ヲ消シ。痙攣様ノ疝腹痛。結石腎痛。淋疾痛。小兒腹痛等ニ尤_モ効アリ。痛甚キ症ハ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用フベシ。又臨産ノ腹痛甚キヲ鎮メ胎ヲ滑ニシ

小便ヲ利ス○此油ハ新鮮ノ者ヲ擇ムベシ動モス
 レバ腐敗ノ甘和ノ味ヲ失ヒ變ノ辛辣發澁酷烈ト
 ナリ是ヲ用レバ侵蝕刺戟ノ焮痛壯熱ヲ發ス○胃
 弱キ人多ク是ヲ服スレバ胃中ニ鬱滯澁敗ノ酷厲
 トナリ胃ノ諸症ヲ發スルコトアリ故ニ胃弱キ者ハ
 此油四多ニ亞刺比亞アラビヤ亞ア釐ラ謨ビ漿ムニ本條一多ヲ研和シ用
 レハ右ノ患ナシ○新鮮ノ油ハ痙攣性ノ痲腹痛腸
 攣急ヨリ起ルヲ云結石腎痛ニ捷効アリ此等ノ症ニ此油
 一二多ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用フベシ○膽液熱或
 ハ神經熱ノ患者稟賦感觸ノ甚キ者ハ對症ノ藥劑

ト雖モ衝動刺戟ノ攪擾ニ堪ザルコトアリ此症ハ左
 ノ方酷厲毒ヲ甘和ノ大効アリ

扁桃消厲飲

- 甘扁桃油 一多
- 亞刺比亞アラビヤ亞ア釐ラ謨ビ漿ム 一錢
- 茴香水 半比
- 滿那 一多

右調勻研和シ半時ゴト毎ニ二匙ヲ用フ○冒寒傷冷毒
 等ノ劇シキ效嗽或ハ勞瘵様ノ患者痙攣性ノ效肺氣
 攣急ニ因テ發スル效ヲ云重訂内科撰管ノ要喘急篇第百九十五章ノ症ト同シヲ發スルニ
 効アリ但此症ニハ阿芙蓉劑ヲ加ヘ用ヒテ殊ニ良
 ○鬱憂病或ハ子宮病ニ痙攣性ノ效ヲ兼ルハ鎮痙

驅風ノ藥ヲ加ヘ用ヒテ尤^モ驗アリ左ノ方ヲ與ヘン

扁桃鎮瘧飲

甘扁桃油 一匁 雞子黃 二個

茴香水 五匁 鹿角鹽 二十五匁

過爾託亞舍利別 六錢

右調勻研和シ頻々ニ一匙ヲ用フ。小兒ハ一琶布匙
ヲ與フ○諸中毒ニ内服ノ酷厲毒ヲ包攝シ解スル
一亦諸油質ノ藥ノ如シ。礬石或ハ消石精等ノ侵蝕
毒ニ中ル片ハ輕キ中和鹽類ノ下劑ヲ與テ其毒ヲ
滌除ノ後此油ヲ服ノ捷効アリ○新鮮上好ノ阿利

襪油ヲ以テ甘扁桃油ニ代用シ亞刺比亞騰謨阿芙
蓉ヲ加胸病欬嗽等ニ良効アリ○亞麻油モ此油ニ
代用ノ効アリ腸攣急ノ縮窄シ若クハ燥屎滯積ノ
發スル劇^シキ疝痛ハ亞麻油ニ諳厄利斯瀉利鹽ト阿
芙蓉トヲ加ヘ用ヒテ速効アリ○蟲病ハ此油ヲ内
服シ或ハ吉利詞爹兒トシ腸中ニ注入スレバヨク
蟲ヲ殺シ驅出ス然レ久服ヲ禁ス凡ソ蚊蟲ハ胃腸
ノ運化虧損ノ充張健輸セザルヨリ生スルユエニ
是ヲ久服スレバ逾^ク胃腸ノ運營ヲ緩弛ノ轉^イ蟲ヲ釀^カ
スレバナリ○淋疾等ノ尿道焮痛ニ水銃ヲ以テ此

油ヲ尿道ニ注入ノ効アリ○外敷メ疼痛ヲ止メ硬腫及ビ肢節靱帶筋肉等ノ硬強ヲ軟和シ擧急ヲ縱弛ス然レ甘扁桃油ハ外敷スルト稀ナリア麻油阿利襪油ノ如キ廉價ニメ同効ノ油アレバナリ

苦扁桃油

オレウムアメイグダリスアマリス

製法

苦扁桃

新鮮者分量適宜

右殼及ビ膜皮ヲ去リ硝子壘ニ入レ熱湯ニ浸シ温メテ取出シ布袋ニ入レ搾ニ夾ニ搾ルト甘扁桃油製法ノ如シ

主治 肝脾ノ壅塞ヲ疏通シ粘液ヲ稀解シ汚液ヲ淨

除ス外敷ノ硬腫ヲ散シ疼痛ヲ消シ耳鳴ヲ止ム○或云此油ノ苦味ハ一個ノ毒トス多ク服スレバ人ヲ死ス。是ヲ禽獸ニ與ルモ亦死ス

製法

甘扁桃

三多

右温湯ニ浸シ殼ヲ去リ石臼ニ入レ搗テ泥ト爲シ磁盃ニ入レ煮沸セル大麥汁三十二多許ヲ取テ少許宛加ヘ搗リ蓋閉シ浸スト一時許布巾ニテ濾シ絞レバ乳白色ノ汁トナル即チ扁桃乳ナリ。甘味ヲ好ム者ハ沙糖ヲ適宜ニ加ヘ濾過スベシ

又法 甘扁桃

一弓半。殼及ビ膜皮ヲ去ル

右水適宜ニ加ヘ搗テ汁一匕ヲ取り瀝過シ是ニ舎利別三錢ヲ調和ス叔疾

主治 滋潤シ渴ヲ止メ煩熱ヲ涼解シ精神ヲ清爽シ血液虚損ヲ補充シ酷厲液ヲ和制シ痙攣搐掣ヲ緩弛ス○壯熱病ノ患者。飲料ト爲シ用テ滋潤解熱ノ良効アリ但此乳劑一弓ニ水二十弓ヲ加ヘ稀クシ與フベシ或ハ消石一錢ヲ加ルニ良○肺藏ノ酷厲液ヲ和解メ咳嗽ヲ治シ胸痛ヲ消シ嗽衝病ニ尤驗アリ或ハ是ニ亞刺比亞護アラビアゴムヲ焯和シ用ヒテ亦良

○惡性熱ノ患者虚脱シ脉沉微ナル症ニ鹿角鹽ヲ是ニ研和シ用テ奇効アリ但甘味ヲ嫌フ者ハ苦扁桃ヲ以テ製シ用フベシ○服量。一小茶碗ヲ頻々ニ温服スベシ○久服スレバ胃中ニ酸敗液ヲ生ス叔依

遠西名物考

卷四

三

風雲堂藏

