

遠西醫方名物考

(土)

卷五

武  
857  
455

學大田稻早	館書圖	
庫文田內者托寄	號七六一第書托寄	
號	9	第
冊	8	第
	5	第



武庫  
號 857  
卷 45-5



遠西醫方名物考標目

卷五

〔土〕橙皮水

橙皮油

橙皮精

橙皮丁オシキ幾去爾オサル

橙皮舍利別

橙汁舍利別

杜松實油

篤爾トル面シ窒チ刺ラ

度祿布ドロブ

大正五年九月廿四日  
丙田糸子氏贈



礶砂

精製礶砂

礶砂 瑟布

礶砂 蒸湯方

齒痛驗方  
礶砂含方

礶露漱方

礶砂華

礶砂揮發華

礶華膏

礶鐵華

礶砂精

礶油擦方

礶砂加燒酒精

礶砂加石灰精

礶砂揮發精

固性礶砂

礶砂揮發膏

甘礶砂精

民埤列利精

傑列乙發汗散

陀歇爾私發汗散

乙百葛格安那

遠西醫方名物考卷五

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴校補

橙皮水

ア多コルチセスアウラント羅

製法

橙皮

生鮮者黃皮判  
三比

右格兒弗ニ入レ水適宜ニ加ヘ蒸餾ノ露水十比ヲ

取ル其法薄荷水ノ條露水製法括套ニ説ク如シ校

主治胃腸ヲ健運シ痞氣ヲ散シ嘔吐ヲ止メ酸敗液

及ビ粘液ヨリ發スル諸症ニ驗アリ

福収

橙皮油

オレウムコルチセスアウラント羅



**製法** 橙皮

生鮮者或ハ陰乾者黃皮剉分量適宜

右格兒弗<sup>コ</sup>入<sup>レ</sup>水適宜ニ加<sup>ヘ</sup>蒸餾ス其法薄荷油ノ條蒸餾油製法拈套ニ説ク如シ<sup>後</sup>

**主治** 腦心胃ヲ强健ニシ痞氣鬱蓄ヲ驅散シ壅塞ヲ開達シ失氣昏冒風疝腹痛等ヲ治シ小便ヲ利ス○此油ハ清稀ニメ水ノ如シ橙皮ノ製劑中尤峻効アル者ニメヨク竄透刺戟ス故ニ少許宛用フベシ大抵十滴許ヲ沙糖六錢ニ研和シ硝子壘ニ入レ固封シ貯<sup>ヘ</sup>胃ノ衰弱セル諸症ニ時々一小卵匙ヲ用ヒテ効アリ○服量八滴ヨリ十六滴ニ至ル沙糖ニ和

シ或ハ白湯或ハ燒酒ニ點服ス○外敷<sup>メ</sup>痲不遂瘰

癰或ハ熱ナキ痛風等ノ神經病ニ驗アリ<sup>伍</sup>

橙皮精 スピリテス<sup>一</sup>コルチセス<sup>一</sup>アウラント<sup>一</sup>羅

**製法** 橙皮 未熟綠色者白肉ヲ去リ乾シ剉ニ比 燒酒 十度者四比

右浸ス<sup>一</sup>二日蒸餾ノ露精ヲ取リ十度ニ至ル其法薄荷精ノ條蒸餾精製法拈套ニ説ク如シ<sup>後</sup>

**主治** 破氣驅風ノ良劑トス痞氣鬱滯ノ諸症ヲ消シ粘液留飲ヲ祛<sup>ク</sup>キ心胃ヲ健運シ飲食消化ヲ助ケ汗ヲ發シ小便ヲ利シ失氣昏冒ヲ復ス又橙皮<sup>イシキテ</sup>丁幾去<sup>テ</sup>爾主治ノ諸症ヲ治ス○服量三四十滴許ヲ用フ<sup>後</sup>

橙皮オレンジ丁テウトル幾ケイ去キ爾ル

「オレンジキテウトルコルチセス。アウラントト」羅

製法 橙皮

白肉ヲ去リ到一北 燒酒十五度者 六北

右硝子壘ニ入レ硝子塞クチニテ固封シ時々振蕩シ浸ス一六日布片ヲ以テ漚シ又紙ニテ漚シ其液ヲ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ棧

主治

強壯衝動ノ劑トシ凡衰弱ヨリ起ル遷延諸病ニ用テ偉効アリ。諸萎黃病ノ類久ク食機ホカビラヲ失ヒ勞倦虛乏ヲ覺エ腹中風氣痞滯苦滿ヲ患ル等多クハ胃及ビ腸ノ虚弱ヨリ發ス。或ハ凝體諸器虛衰ノ其運營ノ減損スルヨリ發スル經閉及ビ其虛損ノ括

約ヲ失フヨリ發スル崩漏等ニ用ヒテ治驗多シ○服量八十滴マデ葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス○未熟ノ橙實大櫻實ノ如ク黯綠色ニシテ苦味佳香アル者ヲ取リ丁幾オレンジ去爾テウトルト爲シ用テ尤効アリ依疾

橙皮舍利別

セイロフス。コルチセス。アウラントト羅

製法

橙皮

生鮮白肉ヲ去リ細割リ十多 沙糖淨白者 三北 水四北

右橙皮ヲ磁罐ニ入水ヲ加ヘ浸ス十二時蒸餾メ露水ヲ取リ三多。是ニ沙糖六多ヲ加ヘ文火上ニテ溶化ス其罐中ノ橙皮ヲ絞テ汁ヲ取リ其餘ノ沙糖ヲ加ヘ漚テ渣ヲ去リ文火ニ煮テ舍利別ノ稠カゲシト爲シ

放冷シ前ノ露水ヲ和シ硝子壘ニ入固封シ貯フ〔按〕

**主治** 心胃ヲ强健シ飲食ヲ消化シ風氣鬱滯。心下痞

悶ヲ祛〔カ〕キ粘痰留飲ヲ消シ腐敗ヲ遏〔ヤ〕ム〔辰〕

橙汁舍利別 セイロフス。シツクス。アウラント 〔羅〕

**製法** 橙瓢汁 靜定ノ底逆ヲ去ル者。十六号 沙糖 淨白者。二比半

右調和シ文火ニ煮テ舍利別ノ稠ト爲シ放冷ス〔按〕

**主治** 清酸甘美ニメ口舌ヲ滋潤シ渴ヲ止メ熱ヲ解

シ血液ノ沸騰ヲ鎮メ膽液ノ酷厲腐敗ヲ消シ衰弱

ヲ強壯シ一切壯熱病ニ良効アリ〔辰〕

杜松實油 オレウム。デスチルヲチ。バツカ。ユニペリ〔羅〕

**製法** 薄荷油ノ條。蒸餾油製法括套ニ説ク如シ〔按〕

**主治** 性熱甚ダ竄透ス。的列竝底那ノ性アリ然レ酷

烈ナラス。○小便ヲ利スルニ峻効アリ。虛寒ニノ辛

熱衝動ノ劑ヲ用フベキ水腫ニ尤驗アリ。○荏苒々

ル冒寒傷冷毒ノ熱ナキニ與ヘ發汗メ治ス。○風氣

鬱蓄メ心腹痞滿攣痛スルヲ治ス。○服量。感觸甚キ

人ハ六滴ヨリ十二滴許マデ用フ水腫ニハ利尿ノ

煎劑或ハ適宜ノ飲液ニ點服シ或ハ沙糖ニ和シ用

フ。○外敷メ痲不遂ヲ治シ痛風。腕股痛。傷冷毒痛痔

痛等其他神經ノ諸症ヲ治ス 〔依〕〔底〕

篤爾面室刺 トルシチラ 羅「セーヘンブレード」蘭

○榕按ニ此草小野蘭山翁嘗テ度ノ圖說ニ據テ  
蝦夷産ノ「オフシキナ」ト云草ニ充ツ。予此草ヲ得  
テ和蘭ノ諸說ニ徴スルニ形狀氣味篤爾面室刺  
ニ穩當セリ。物依云此根主治拳參根 藥鋪ニ金線  
重樓ト呼フ  
ト同一般ナリト。然レバ拳參根ニ代用スベシ  
形狀篤爾面室刺ハ一根數莖叢生シ高サ一尺許。微  
赤粗糙。細弱。撓ニ易ク地ニ塌シ每節七葉層々湊生

シ狼牙葉ニ似テ小邊缺裂ス。夏月薔薇様四瓣ノ黃  
花ヲ開キ長梗アリ。心蕊一鬚蕊十六。其頭ニ葯アリ  
萼ハ出花後楕圓ハ稜ノ朔ヲ結ビ稍長キ八個ノ核  
ヲ藏ム根拇指大ニ短ク塊節様ニ鬚アリ。栗殼  
色ニ裏赤ク味收瀰ナリ。○北方寒國叢林陰地ニ  
産ス種ヲ下シ或ハ根ヲ分チ培養ス  
主治根温煖強壯ニシ收瀰ノ効アリ故ニ下利赤痢  
下血吐血痔血淋疾白帶下崩漏等ノ虛症ニ用ヒ總  
テ弛弱虛衰セル諸症ニ良驗アリ。○傷冷毒及ヒ熱  
病ニ下利ヲ兼テ虛脫セル症ニ用ヒテ汗ヲ發シ胃

質<sup>チ</sup>亞<sup>ア</sup>那<sup>ナ</sup> 代用ヲ加へ熱病及ヒ間歇熱ニ用ル<sup>レ</sup>日ニ  
 半錢ヨリ三錢ニ至リ其効殆<sup>ト</sup>幾<sup>キ</sup>那<sup>ナ</sup>ノ如シト云○  
 服量末トシ十五<sup>レ</sup>瓜ヨリ一<sup>レ</sup>月或ハ一錢ニ至ル<sup>レ</sup>或ハ  
 根到<sup>ニ</sup>一錢ヲ取り水煎シ一服トス或ハ一<sup>レ</sup>弓ヲ取  
 リ水一<sup>レ</sup>比半ニ浸シ滓ヲ去リ一盞宛服ス○齒痛ヲ  
 止メ斷顎腐爛ヲ愈<sup>ヤ</sup>シ或ハ失<sup>シ</sup>苟<sup>ク</sup>兒<sup>ル</sup>陪<sup>ク</sup>苦ヨリ發スル  
 斷ノ潰瘍ヲ治シ咽喉腫ヲ消スル等ニ此末ヲ患部  
 ニ<sup>ニ</sup>摻<sup>シ</sup>或ハ水煎シ蜜<sup>モ</sup>若<sup>ク</sup>ハ醋ヲ加へ漱藥トシ効  
 アリ○創傷潰瘍瘻瘡侵蝕潰爛等ヲ乾愈<sup>ニ</sup>凝血ヲ

疏散シ打撲傷毒螫刺咬ヲ治スルニ此末ヲ摻<sup>シ</sup>或  
 ハ水煎<sup>メ</sup>蒸<sup>ス</sup>溺劑或ハ洗藥トシ良驗アリ 伍度

度<sup>ド</sup>祿<sup>ル</sup>布<sup>フ</sup>蘭

トロキシ<sup>ト</sup>シ<sup>ホ</sup>ゲ<sup>ウ</sup>レイ<sup>ト</sup>セイ<sup>ス</sup>ル<sup>リ</sup>サ<sup>ロ</sup>グ<sup>キ</sup>ス<sup>ハ</sup>ン<sup>ト</sup>  
 亞<sup>ア</sup>刺<sup>ラ</sup>比<sup>ビ</sup>亞<sup>ア</sup>護<sup>ゴ</sup>謨<sup>ム</sup> 甘草膏<sup>各</sup>ニ 沙糖<sup>四</sup>弓<sup>弓</sup>

製法

右件調和シ蒸餾水ヲ適<sup>宜</sup>ニ加テヨク溶化シ濾過  
 ノ滓ヲ去リ文火ニ上セテ水氣ヲ蒸散シ凝結セシ  
 メテ適意ノ錠ト爲シ放冷ノ乾固シ貯<sup>フ</sup>或ハ茴香  
 油少許ヲ加へ製スルモ良○煎熬スル片手ヲ住<sup>メ</sup>  
 ズ攪<sup>テ</sup>必<sup>シ</sup>モ焦著セシムル<sup>レ</sup>勿<sup>レ</sup> 伍



主治 咽喉氣管肺ヲ滋潤シ酷厲侵刺ノ惡液ヲ甘和シ痰ヲ吐キ易カラシメ傷冷毒ノ欬嗽聲嘎喘急淋疾痛等ニ効アリ

硃砂 サルアムモニアモム

硃砂ハ一種ノ中和鹽ナリ形扁圓ニメ潤二三寸許厚三四指横徑上凸下稍凹尋常ノ品ハ外面灰白微黃或ハ黑色ヲ帶ビ裏淡白ナリ上品ハ乾固潔白石英様ニメ裏亦瑩白破碎スレバ束鍼紋アリ味鹹辛舌ニ滲透シ殆ト香氣ナシ然レハ刺篤亞斯或ハ生石

灰或ハ酒石液或ハ生石灰水等ノ亞兒加利性ノ物ヲ加テ研磨スレバ銳烈竄透ノ香氣ヲ揮發ス其銳烈ナル程逾上品トス火ニ觸ルキハ盡ク溶化ス然レハ大氣ニ觸テ溶化セズ○此物厄日多産ヲ上品トス勿擲祭亞和蘭其他歐羅巴洲ノ諸國ニテ製造スル者亦良ナリ○製煉術ニテ硃砂ヲ溶解シ試ルニ尿ノ揮發鹽三分ノ二アリ海鹽精同様ノ酸精少許出ツ然レバ此物ハ固性海鹽精性ニ風化セザレハ前ニ註ス少許ニ風化揮發ノ亞兒加利鹽居多相渾合升煨ノ固性ヲ爲シ一種ノ中和鹽トナル者ナ

リ。此亞兒加利鹽ハ揮發ナル故ニ諸酸性ノ物ヲ加  
 レハ相激ノ沸騰ス亞兒加利性ノ物前ニ云剝篤亞  
 云ヲ加レバ其海鹽精ト抱合シ揮發亞兒加利鹽ハ  
 分離ノ忽チ銳烈ノ香氣トナル故ニ此物ノ性能モ  
 亞兒加利性ノ揮發鹽ニ在リト知ルベシ叔揭

製法

駝尿

凝固者  
百錢

海鹽

二十錢

煤

十錢

○按ニ駝尿ハ牛馬鹿中ノ尿ノ凝結スル者ヲ取  
 リ代用スベシ叔揭ニ諸馱畜ノ尿ノ凝結セル鹽  
 ヲ用フベシ煤ハ常動物ヲ焚モヤス竈上ノ煙窓ニ著  
 ク者ヲ用フベシト云動物ハ總テ禽獸ノ骨  
 及ヒ皮肉毛羽類ヲ云

右搗碎キ調和シ適宜ニ水ヲ加ヘ煮テ烱化シ濾テ  
 汁ヲ取り火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾シ硝子曇ニ入  
 レ沙火ニテ升煨シ取出シ水ニ溶シ濾テ渣ヲ去リ  
 又火ニ上セ乾固シ貯フ疾○凡硝砂ハ土氣等ノ汚  
 物混スル故ニ是ヲ再製ノ純粹ト爲シ用フベシ

精製硝砂

ゲソイフルデアムモニアクソウト蘭

製法

硝砂

尋常者細末  
分量適宜

沸湯

三倍

右硝砂ヲ湯ニ溶化シ紙ニテ濾シ文火ニ上セ水氣  
 ヲ蒸散ノ上面ニ膜ヲ生スルニ至リ放冷スレバ芒  
 ヲ結ブ是ヲ取り乾シ硝子曇ニ入レ固封シ貯フ疾

**主治** 鑽透刺戟ノ細絡織管ヲ衝開シ膠粘ノ諸液ヲ  
 稀釋ノ汗孔ト尿道ヨリ排泄ス故ニ總テ閉塞ヲ開  
 キ凝結ヲ解クニ奇効アリ○諸藏ノ壅塞及ビ胃腸  
 ノ粘液ヨリ起ル諸病ニ効ヲ奏シ又輕ク衝動ノ胃  
 腸肺等ノ運營ヲ活潑増進ス然レ過服スレバ吐下  
 等ヲ發ス但服量適宜ニ用レバ虚損スベキ脱泄ヲ  
 起スナシ○此藥ハ兼用ノ品ニ隨テ或ハ發汗シ  
 或ハ小便ヲ利ス○粘液質ノ經閉ヲ通ス血脉纖維  
弛弱ニ血  
中粘液過多ニノ壅滯セ○胃腸ニ粘液過多ニノ下  
ル萎黃病様ノ經閉ヲ云利スル症ハ是ヲ苦味香竄ノ藥ニ加ヘ用フ○胃腸

ニ滯著セル膠粘液ヲ疏解スル効ヲ以テ纖維虚弱  
 ニノ粘稠液過多ナル熱病所謂粘  
液熱 粘液質ノ水腫或  
 ハ大便閉。虻蟲等ニ驗アリ○此藥ハ亞兒加利性ノ  
 揮發鹽多キ故ニ一切壯實ノ熱病。嗽衝熱ニハ害ア  
 リ然レ<sup>レ</sup>冒寒傷冷毒及ビ斯ノ如キ酷厲毒ノ壅滯セ  
 ルヲ疏解ノ大抵減スル症ハ是ヲ用ヒテ良効アリ  
 ○熱病ノ毒漸ク化熱ノ諸竅ニ分利スベキ症ニ是  
 ヲ用レバ痰ヲ吐セシメ蒸氣ヲ發シ或ハ小便ヲ利  
 ノ其毒ヲ排泄ス○肺嗽衝ノ嗽熱漸ク退キ病勢減  
 スル者或ハ咽喉焮腫或ハ關節痛。傷冷毒痛等ニ是

ヲ用レバ能、病毒ヲ疏散ノ排泄ス。○膽液熱、胃腸熱  
 等ノ毒甚ダ膠固頑滯ノ解シ難キ症モ亦是ヲ用レ  
 バヨク其毒ヲ疏散ノ排泄ス。○腐敗熱及ビ神經熱  
 ニ於テ其焮衝ノ諸症退キ脉勢衰へ唯精力虚脱ス  
 ルニ因テ專ラ腐敗ヲ防護シ強壯スル劑ヲ與フベ  
 キ症ニ是ヲ用ヒテ驗アリ。○發斑熱、羅斯痘疹等患  
 者虚衰シ舌苔アリ大ニ煩渴スル等ノ症ヲ發シ或  
 ハ其斑疹消散ノ内攻スル症ニ用テ甚効アリ。○硃  
 砂ハ專ラ間歇熱ヲ治スル藥ノ如ク用ル者アリ凡  
 間歇熱ニ吐劑或ハ下劑ヲ用テ胃腸ニ壅滯スル毒

ヲ滌除ノ後其發作ノ一時前ニ此藥半錢許ヲ用レ  
 バ腹内諸器ノ壅塞ヲ開通シ病毒ヲ汗及ビ小便等  
 ニ疏散ノ治ス但此病ハ膠粘ノ惡液、胃腸、腸間膜等  
 ニ鬱塞ノ發スル<sub>カホキ</sub>居多ガ故ニ特ニ此症ニ用テ良  
 驗アルナリ若シ其惡液壅滯ノ解セザレバ動モス  
 レバ黃疸或ハ水腫ヲ發ス或ハ其腹内ニ鬱塞セル  
 病毒漸ク減ズレ<sub>ホ</sub>其熱仍頑固ニ治セザル者ハ  
 幾<sub>キナ</sub>那ニ硃砂ヲ加ヘ用テ効アリ。○硃砂ハ幾<sub>キナ</sub>那ノ四  
 分量ノ一ヲ加フ。○  
 服量五匁ヨリ十匁マデ日ニ數次用フ急劇ノ症ニ  
 ハ十匁ヨリ一月マデ飲液ニ加ヘ或ハ舍利別ニ和

シ甘美ト爲シ用ルモ良末ニテ用レバ惡心嘔吐ヲ  
 發スルヲアレバナリ○末トシ眼ニ點ノ角膜翳星  
 ヲ祛ク○凡、中和鹽ノ類ニ於テ外敷ノ解凝ノ峻効  
 ヲ奏スルヲ此鹽ニ若ハナシ蒸溺劑洗藥或ハ琶布  
 ニ加シ施メ稍衝動シ汗孔ヲ開キ凝結ヲ散シ粘液ヲ  
 鑽<sup>キ</sup>リ細絡ヲ通シ衰弱ヲ強壯ニシ腐敗ヲ防護ス故  
 ニ一切寒腫腺腫肉腫粘液瘤痛風腫粘液腫ヲ消散  
 シ或ハ經久ノ潰瘍ニ洗藥トシ施メヨク其瘡ヲ淨  
 刷シ腐骨疽寒壞疽ノ腐爛ヲ止メ皮上ノ汚斑ヲ消  
 シ或ハ打撲傷皮肉中泛溢ノ血液ヲ疏散ス○關節

ノ水腫ニ是ヲ外敷メ縛帶ヲ施セバ消散ス或ハ陰  
 囊水腫ハ是ヲ醋ト燒酒ト各半ノ液ニ溶<sup>トカ</sup>シ蒸溺ス  
 ルヲ八日ニシテ腫消シ疼止ム或ハ其腫ニ鍼<sup>トカ</sup>メ水ヲ  
 泄シ其水ノ内攻ヲ防<sup>トカ</sup>メ良○輕キ炊衝凍瘡等ハ是  
 ヲ水ニ溶<sup>トカ</sup>シ稀<sup>ウス</sup>クメ患部ヲ洗<sup>テ</sup>テ治ス○是ヲ温湯ニ  
 溶化シ漱藥トメ傷冷毒ノ咽喉炊腫ヲ消ス○疥癬  
 等ノ皮病ヲ治スルニ是ヲ膏藥ニ加ヘ施メ尤<sup>モ</sup>効アリ  
 ○閃挫骨傷ノ後其部弛緩痿弱スルニ是ヲ施メ  
 强健ナラシメ或ハ其部水腫ヲ發スルモヨク消散  
 ス○乳房ニ乳ノ凝聚シ結核腫痛スルニ施メ疏散

ス是ヲ迷迭香精等ニ溶シ施メ殊ニ効アリ或云水ニ溶シ布片ニ浸シ温メテ乳房ニ貼シ乾ケバ更換ス○是ヲ吉利詞爹兒ノ劑ニ加ヘ施メ卒倒昏睡或ハ溺死等ヲ蘇復ス或ハ此末少許ヲ取テ鼻中ニ吹内レテ卒厥ヲ省覺ス○凡右ニ説ク諸外症ニ硃砂ヲ水ニ溶シ醋ト燒酒トヲ加ヘ施セバ其功尤峻ナリ或ハ硃砂一多醋燒酒各四多右溶化シ用ルモ良○一切腫瘍ヲ消散スルニ左ノ琶布捷効アリ

硃砂琶布

亞麻子 末四 草蓼陵香花 二握  
加密列 一握 硃砂 五錢

右水適宜ニ加ヘ煮テ琶布トシ温メ貼ス  
○腫瘍ヲ消散シ或ハ潰瘍ノ腐肉ヲ消シ癩瘡ヲ愈シ疣贅息肉ヲ除クニ左ノ蒸湯方効アリ

硃砂蒸湯方

硃砂 一多

右葡萄酒ト醋ト各半ノ液四多ニ溶シ蒸湯劑トス  
○齧齒劇痛ニ左ノ方奇効アリ

齒痛驗方

硃砂 一錢 橙汁 二錢

右研和シ綿撒絲ニ浸シ齧孔ニ容ル  
○咽喉ノ粘液腫或ハ舌癰ニ左ノ方尤効アリ

硃砂含方

泥菖根 良薑 胡椒 各半

硃砂 一錢

右末トシ布片ニ包<sup>カ</sup>テ嗽<sup>カ</sup>含テ涎唾ヲ湧起ス  
○左ノ漱劑ヲ施スモ良効アリ

硃露漱方

接骨木花水 六<sup>マ</sup> 山蒼菜精 硃砂 各一錢

右調勻シ漱藥トス

○精製硃砂ハ極テ純粹ニシテ前説ノ諸病ニ峻効アリ  
是レヲ末トシ水ニ溶<sup>カ</sup>セバ其水甚ダ寒冷ナリ夏  
月此水ヲ器ニ盛<sup>メ</sup>リ酒壺ヲ浸セバ其酒極テ寒冽ナ  
リ

硃底福依

硃砂華

フロレスサリスアムモニアキ<sup>ル</sup>

製法 硃砂再製乾淨者細末

右陶製ノ格兒弗<sup>コ</sup>ニ内<sup>ル</sup>レ大ナル硝子ノ堯ヲ覆<sup>カ</sup>ヒ承  
餾壺ヲ屬シ膠泥ヲ以テ其接際ヲ固封シ沙鍋ニ入  
堯ノ際<sup>キ</sup>マデ沙ニ埋<sup>メ</sup>文火ニ<sup>ア</sup>シ<sup>テ</sup>蒸餾スレバ硃砂ニ  
含<sup>メ</sup>ル水氣蒸升<sup>ル</sup>ノ承餾壺ニ下<sup>ル</sup>其液必<sup>シ</sup>下<sup>ラ</sup>ガ  
ルニ至テ承餾壺ヲ換<sup>カ</sup>初ノ如ク塗封シ漸<sup>ク</sup>火ヲ増テ  
其堯雪白<sup>ク</sup>トナルニ至テ火候ヲ同等ニシ四時或  
ハ四時半ニ<sup>シ</sup>放<sup>ス</sup>冷<sup>ス</sup>即<sup>チ</sup>堯内ト壺ノ頸トニ雪白柔  
脆輕虛ノ精華升<sup>リ</sup>著<sup>ク</sup>ナリ是ヲ取<sup>リ</sup>集<sup>メ</sup>硝子壺ニ入

密封シ貯フ其格兒弗内ニ白屑片塊等著<sup>コ</sup>アリ是  
 ハ其未<sup>ク</sup>升化セズノ凝結スル者ナリ故ニ是ヲ刮<sup>ク</sup>リ  
 取テ以後此華ヲ製スル<sup>ル</sup>片。硃砂ニ加テ升煨スベシ  
 其格兒弗ノ底ニ殘ル鹽樣ノ黒汚物ハ棄去<sup>ル</sup>ベシ<sup>庚</sup>

**主治** 硃砂ト同フ<sup>メ</sup>尤モ揮發純粹ナリ<sup>庚</sup>

**硃砂揮發華**

「サル・アム・モニアキ・ホラチレ・アム  
 モニアクソウト・フリツケブル・メ・シ・蘭

**製法**

硃砂

一比

剥篤亞斯

二比半

右各別ニ細末シ合メ研和シ頸澗<sup>ヒ</sup>キ列篤兒多<sup>ト</sup>ニ入  
 レ承餾壘ヲ屬シ其合際<sup>アハセ</sup>ヲ塗封シ沙鍋ニ入レ漸ク  
 火ヲ加テ蒸餾スレバ揮發銳烈ナル精華升リ著<sup>ツ</sup>ク

ナリ是ヲ取り硝子壘ニ入レ固封シ貯フ<sup>亞</sup>

**又法**

硃砂

一比

結麗土

二比

右ヨク乾<sup>カ</sup>シ研和ノ極細末トシ硝子ノ頸澗<sup>ヒ</sup>キ列篤  
 兒多<sup>ト</sup>ニ入<sup>レ</sup>大ナル承餾壘ヲ屬シ其接際ヲ塗封シ沙  
 鍋ニ入<sup>レ</sup>武火ニテ升煨ス但<sup>シ</sup>大ナル桶ニ冷水ヲ盛<sup>モ</sup>  
 リ是<sup>レ</sup>ニ其承餾壘ヲ浸<sup>メ</sup>冷<sup>シ</sup>温ナル<sup>ル</sup>片ハ速ニ其水  
 ヲ更換スベシ是ニ由テ硃砂ノ精華升<sup>テ</sup>遍<sup>ク</sup>承餾  
 壘ニ著<sup>ク</sup>ナリ是ヲ取り硝子壘ニ入<sup>レ</sup>固封シ貯フ<sup>拔</sup>

**主治**

大抵硃砂加石灰精<sup>出次</sup>ニノ如ク極メテ鑽透揮

發シ凝結ヲ疏散スルニ峻効アリ○肘臂膝等ノ關



節寒腫ヲ發シ久ヲ經テ治セザル症ニ左ノ膏尤驗アリ

硃華膏

石鹼

二錢

若把兒麻膏

四錢

硃砂揮發華

一錢

右石鹼ト若把兒麻膏トヲ烱和シ冷定メ硃砂揮發華ヲ研合ス

硃鐵華

アローレス・サリス・アムモニアキ・マルチアレ  
ス又ベルリフロス又エンスマルチス羅  
エイズルアムモニア  
クソク・カレ・メ・ノ・ア

製法

右能ク研和メ乾シ大ナル硝子ノ列篤兒多ニ内レ

硃砂

十二弓

升鐵鹽

一弓

封閉シ沙火ニ上セ漸ク火ヲ加テ升煨シ其壘底熾紅トナリテ火ヲ下シ放冷メ其華ヲ取り細末トシ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ

又法

血石

極細末或鐵粉代用  
海鹽精 各二弓

硃砂 細末十六弓

右血石ヲ石臼ニノレ鹽精ヲ加ヘ研磨シ次ニ硃砂ヲ研和シ大ナル硝子ノ列篤兒多ニ入レ沙火ヲ以テ升煨シ漸次ニ火ヲ増テ終ニ其壘底殆ト熾紅トナレバ其華升テ凝結ス但火候ニ強弱アレバ偏ニ硃砂ノミ升ルガ故ニ是ニ意ヲ加ルヲ專要ナリ

又法

鐵屑

鏽ナキ者

硃砂華

各四弓 一弓ヲ加フ

右合ノ硝子白ニ入<sup>レ</sup>研磨ノ亞兒加利鹽樣ノ竄透ノ  
氣ヲ發スルニ至レバ濶大ナル硝子ノ格兒布ニ内  
レ平等ニ其底ニ展<sup>ヒ</sup>ゲ。硝子ノ堯ヲ覆ヒ承餾壘ヲ屬  
シ膠泥ニテ其接際ヲ塗封シ沙鍋ニ入<sup>レ</sup>格兒布ノ頸  
マデ沙ニ埋メ漸ク火ヲ増シ堯ノ頂温ナル片ハ清  
稀ノ液承餾壘ニ下ル。此液下ラザルニ至レバ初ニ  
帶白色ノ華。其堯ニ升リ著<sup>キ</sup>爾後其色一樣ナラズ  
〔國云橙皮色〕斯ノ如ク升煨スル<sup>ト</sup>三時或ハ四時ニメ其  
華少<sup>シ</sup>モ升ラザルニ至リ放冷スレバ鮮美乾淨ノ華  
其堯内及ビ嘴ニ固著ス是ヲ取り速ニ硝子壘ニ内

レ固封シ貯フベシ否レバ忽チ濕テ溶化シ粘テ鹽  
泥ノ如ク石鹼ノ如クニノ黄色トナレバナリ○其  
承餾壘ニハ風化揮發ノ亞兒加利鹽ヲ含メル黄色  
ノ液アリ是ニ白黄色ノ物雜ル此液ヲ鐵油ト名ク  
和蘭名。エイ○格兒布ノ内圍ニ著ク所ノ華ノ如キ  
者ハ其藥料溶化シ烈火ニテ凝結メ未ダ華トナラ  
ザル者ナリ是ヲ取貯へ復升煨メ華ト爲スベシ其  
華赤色ヲ帶ルハ其加ル所ノ鐵氣ヲ多ク含ムナリ  
○格兒布ノ底ニハ赭赤色ノ渣塊殘リ味辛烈ナリ。  
氣ニ觸レバ溶化シ收瀋黄色ニメ鐵性ノ油ノ如シ

然<sup>レ</sup>性効ハ此華ト異ナリ○其初<sup>ト</sup>硃砂ト鐵トヲ研和スルニ由テ其鐵ニテ硃砂ニ含ム所ノ酸性鹽<sup>ニ</sup>出<sup>ツ</sup>ヲ吸收セラレ。故ニ其中ノ亞兒加利性ノ揮發鹽ノ之自ラ放解ノ竄透ノ蒸氣ヲ發ス又硃砂中ノ酸性鹽ニテ鐵ノ質ヲ消化シ。蒸餾ノ火力ニ由テ升化シ凝結ノ華トナルナリ。斯ノ如キ堅實ニシテ消化シ難キ鐵質ヲヨク升化スルヲ以テ觀レバ硃砂ハ一種ノ奇異ナル揮發ノ性カアルヲ察スベシ<sup>疾</sup>

**主治** 此藥ハ硃砂ニ鐵性ノ硫黃ヲ含テ<sup>鐵中硫黃アリ</sup>竄透<sup>ノ功</sup>開達<sup>ヲ</sup>粘液ヲ稀釋<sup>シ</sup>虛冷ヲ温壯<sup>シ</sup>稍<sup>ヤ</sup>

睡<sup>ラ</sup>シメ發汗シ又鎮痛ノ功アリ故ニ内藏ノ壅塞ヲ開通シ脾病<sup>イホコシテ</sup>依<sup>レ</sup>剝<sup>ク</sup>昆<sup>コシ</sup>埴<sup>ヂル</sup>兒<sup>ル</sup><sup>内科撰要膽液ニケツルハイ</sup>敗<sup>ク</sup>黑<sup>ク</sup>篇<sup>ニ</sup>出<sup>ツ</sup>失<sup>シ</sup>苟<sup>ル</sup>兒<sup>ル</sup>陪<sup>イ</sup>苦<sup>ク</sup>等<sup>ク</sup>ヲ治ス○纖維ヲ收<sup>メ</sup>瀦<sup>シ</sup>且<sup>ツ</sup>甚<sup>ク</sup>ダ衝動スル性功アルヲ以テ經久頑滯ノ粘液閉塞病ヲ疏解スルニ峻効アリ故ニ經閉ヲ通スル良藥トス或ハ鐵屑ヲ用テ功アル諸症ニ尤<sup>モ</sup>驗アリ或ハ幾<sup>キ</sup>那<sup>ノ</sup>ヲ加用テ頑固ノ間歇熱ヲ治ス○服量十匁ヨリ一匁ニ至<sup>ル</sup><sup>疾</sup>

**硃砂精** <sup>「ス」</sup>スピリ<sup>「左」</sup>左<sup>「ス」</sup>サリ<sup>「右」</sup>右<sup>「ス」</sup>サル<sup>「ア」</sup>アム<sup>「モ」</sup>モニア<sup>「キ」</sup>キム<sup>「シ」</sup>シム<sup>「リ」</sup>リム<sup>「ビ」</sup>ビム<sup>「ス」</sup>スム<sup>「カ」</sup>カハラ<sup>「リ」</sup>リア<sup>「ア」</sup>アチ<sup>「ス」</sup>ス又<sup>「カ」</sup>カル<sup>「ボ」</sup>ボナス<sup>「ア」</sup>アム<sup>「モ」</sup>モニア<sup>「キ」</sup>キム<sup>「シ」</sup>シム<sup>「リ」</sup>リム<sup>「ビ」</sup>ビム<sup>「ス」</sup>スム

**製法** 硃砂一匁 剝<sup>ボツ</sup>篤<sup>ト</sup>亞<sup>ア</sup>斯<sup>ス</sup>精<sup>リ</sup>製<sup>ギ</sup>者<sup>イ</sup>一<sup>チ</sup>北<sup>シ</sup>半<sup>ロ</sup> 水二匁

遠西名物考

卷五

十六

風雲堂藏

右各別ニ研末シ合和ノ硝子（ト）列篤兒（ト）多ニ内レ水ヲ加ヘ承餾壘ヲ屬シ獸ノ膀胱ヲ濕（シ）メ其接際（ツキ）ヲ卷キ氣ヲ少シモ透漏セザラシメ沙鍋ニ入レ漸ク火ヲ増シ蒸餾ノ其精少シモ出ザルニ至リ承餾壘ヲ放チ其精ヲ取テ硝子壘ニ入レ密封シ貯フ○其列篤兒多ク嘴ヲ塞ギ更ニ其火ヲ増ス片ハ白色ノ硃砂華升テ堯ノ裏面ニ著ク是ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ（是レ上ニ説ク所） （硃砂華ト同シ） （匣） （匣）

**主治** 硃砂精及ビ硃砂揮發華ハ其氣銳烈ニノ極テ鑽透刺戟シ壅塞ヲ開キ粘稠ヲ釋キ蒸氣及ビ汗ヲ

發シ小便ヲ利シ血液ヲ衝動健運シ細絡纖維ニ壅滯セル寒粘液酸敗液ヲ驅散ス○粘痰多キ欬喘急等ニ効アリ○神經及ビ諸脉ニ寒粘液壅塞ノ發スル卒倒昏睡痲痺子宮衝逆水腫ニ用ヒ或ハ痛風關節痛傷冷毒痛等ノ劇痛退ケ凡（オホ）仍多少ノ痠痛荏苒トメ休（ヤ）ザル症ニ用レバ此藥ノ竄透開達ノ性力ニテ其惡液ヲ汗ト小便ヨリ驅逐シ治ス○劇（ハ）キ下利或ハ恐驚等ニテ失氣暈倒（シ）或ハ烟ニ咽（ハ）ビ或ハ水ニ溺（オホ）レ或ハ縊（クヒ）レテ半死セル者ハ此精ヲ嗅（カ）シメ或ハ綿撒絲ニ浸メ鼻中ニ挿（サ）シ或ハ是ヲ眼中ニ滴

スレバ皆其膜ヲ刺戟ノ靈液ヲ衝動シ忽チ甦復ス  
 卒倒昏睡病或ハ子宮衝逆等。總テ人事不省ノ症ニ  
 ハ皆右ノ如ク施ノ即効アリ○子宮衝逆痙攣ノ諸  
 症ニ此精効アレ鹿角ノ亞兒加利鹽鹿角精ノ殊  
 ニ良驗アリ○卒倒昏睡病。痲。痲等ノ粘稠液壅塞ノ  
 發スル症ニハ効有レ多血ヨリ發シ或ハ清涼劑ヲ  
 用テ治スベキ症ハ皆害アリ○小兒齒ヲ生スル片  
 搗掣腹痛下利等ヲ發スルニ用テ効アリ此症動モ  
 スレバ酷厲ナル酸敗液。胃腸ニ鬱蓄メ發スレバナ  
 リ○瘰癧毒諸疔ニ内服外敷シ酸敗ノ諸病。小兒腹

痛等ニ甚ダ驗アリ○此精ハ總テ患者虚脱シ脉小  
 ニノ搏動齊ハズ振惕潤動シ冷汗出。氣息冷テ不利  
 スル等ノ症ニ奇効アリ藥性慄悍ナレレ神經ヲ害  
 セズ或ハ麝香龍腦纈草幾那等ヲ加ヘ用ルルアリ  
 故ニ壯實ノ症ニハ總テ是ヲ禁スベシ○服量五滴  
 ヨリ十五滴マデ沙糖或ハ適宜ノ液ニ點服ス○熱  
 性多血ノ人ハ斯ノ如キ揮發竄透ノ藥精ヲ過服ス  
 ルル勿レ動モスレバ焮衝ヲ發スレバナリ○此精  
 ニ蚯蚓油ヲ和シ傷冷毒痛或ハ痛風痲不遂ノ部ニ  
 塗擦ノ良驗アリ○諸寒腫或ハ咽喉痛ニ左ノ擦方

ヲ擦テヨク疏解消散ス咽喉痛ハ頭ニ擦スヘシ

硃油擦方

硃砂精

阿利襪油

右調和ス 亞叔 依揭

硃砂加燒酒精

スヒリ左ス。サル。アムモニアキ。ヒノス 羅

製法 燒酒

銳烈者

硃砂精

八分

右調和ス 主治 甘硃砂精ト同シ 亞

硃砂加石灰精

一名硃砂 揮發精

リキヲル。アムモニアキ。ヒノス。カウ。スチ。ル。キ。又

製法

生石灰

二分

硃砂

一分

水

五分

又 ス。ヒ。ロ。リ。左。ス。サ。リ。ス。ア。ム。モ。ニ。ア。カ。ウ。ス。チ。カ。セ。ウ。ル。キ。又。ヒ。ハ。シ。又。ア。多。ア。ム。モ。ニ。ア。カ。ウ。ス。チ。カ。セ。ウ。ル。キ。又。ラ。ロ。ベ。イ。テ。ン。デ。ア。ム。モ。ニ。ア。蘭。又。ア。ル。イ。エ。ン。デ。ア。ム。モ。ニ。ア。蘭。

右二味各別ニ研末シ潤大ナル硝子ノ列篤兒多トニ入レヨク混和シ是ニ水ヲ加レバ大ニ沸騰ス速ニ承留壘ヲ接合シ其沸騰盡ク止キハ沙鍋ニ入レ膠泥ヲ以テ其合際ヲ塗封シ初ハ文火トシ漸ク火ヲ増テ精ヲ取ル一比半。是ヲ硝子壘ニ入レ硝子ノ塞ニテ密閉シ貯フ 亞

又法

硃砂 二分

生石灰

燒テ新者十分一ノ水ヲ濕ス者 五分

右各別ニ研テ極細末トシ石灰一比ヲ殘シ置テ其餘ハ硃砂ト共ニ列篤兒多トニ入能合和シ是ニ右ノ殘置タル石灰ヲ加テ其上面ヲ被ヒ其列篤兒多ヲ

沙火ニ入レ是ニ頸彎リタル硝子ノ承餾壘三個ヲ連  
 續ス。但シ第一個ト第二個トノ承餾壘ニハ其頸本ノ  
 側ニ一小孔ヲ穿リ即列篤兒多ノ頸ヲ第一個ノ承餾  
 壘ニ挿シ第二個ノ承餾壘ノ頸ハ第一個壘ノ頸本ノ  
 孔ニ挿シ第三個ノ承餾壘ノ頸ハ第二個壘ノ頸本ノ  
 孔ニ挿テ連續セシムルナリ但シ第一個ノ承餾壘ハ  
 小ナリ是ニ蒸餾水ハ五ヲ盛り劑中ノ硃砂ノ第二  
 個第三個ノ承餾壘ハ大ナリ各是ニ蒸餾水ニ比テ  
 盛り劑中ノ硃砂ノ皆其合際ヲ塗封シ或云頸彎リ  
 多ヲ取其頸ヲ第一個ノ承餾壘ノ頸ニ挿シ其壘ノ頸  
 本ノ小孔ニ彎リタル硝子管ヲ挿シ其一端ヲ第二個

ノ壘頭ニ挿シ其壘ノ頸本ノ小孔ニ又彎リタル硝子  
 管ヲ挿シ其一端ヲ第三個ノ壘頭ニ挿シ其挿際ノ罅  
 隙ヲ塗封シ蒸餾スルモ亦一良法トス是ニ由テ其  
 承餾壘三個共ニ彎頭ノ者ヲ用ルニ及ズ尋常ノ硝  
 子壘ノ頸本ニ小孔ヲ初文火トシ漸火ヲ増蒸餾ノ  
 遂ニ其精少モ下ラザルニ至リ火ヲ下放冷ス乃第一  
 個ノ承餾壘ニ硃砂精アリ然レ不潔ノ物雜ラアリ  
 然ルキハ除去ベシ第二個ノ承餾壘ニハ極テ純粹  
 ニノ銳烈ナル精アリ第三個ノ承餾壘ニモ純粹ノ  
 精アリ然レ第二個壘ノ精ニ比スレバ銳烈ナラズ  
 故各別ニ硝子壘ニ入レ硝子塞ニテ密閉シ貯ヘシ醫  
 主治 此精ハ硃砂ニ含ル酸性鹽ヲ脱メ純粹ノ亞兒

加利性トナル故ニ尋常ノ礶砂精ニ比スレバ揮發  
 竄透ノ氣烈ク酸味ノ液ヲ加レ<sub>レ</sub>甚<sub>々</sub>沸騰セズ○尋  
 常礶砂精主治ノ諸症ニ峻効アリ但<sub>レ</sub>刺戟衝動ノ性  
 極<sub>テ</sub>銳烈ナルユ<sub>レ</sub>ニ諸急卒ノ病ニ用<sub>テ</sub>閉塞ヲ開  
 キ捷効ヲ奏ス卒倒昏睡病或ハ失氣眩冒呼吸絶ス  
 ルガ如キ諸症或ハ驚駭溺死<sub>。</sub>縊死<sub>。</sub>咽烟或ハ大饑神  
 思勞傷劇<sub>キ</sub>脱泄ニテ卒厥スル者ハ頻<sub>ニ</sub>此精ヲ嗅<sub>シ</sub>  
 メ或ハ綿撒絲ニ浸<sub>シ</sub>鼻中ニ挿<sub>シ</sub>或ハ眼中ニ點<sub>シ</sub>  
 醒復ス患者嚥下スル<sub>レ</sub>ハ此精二十五滴マデヲ水  
 二匙ニ加<sub>ヘ</sub>用<sub>フ</sub>○此精ニ芫菁<sub>。</sub>丁幾<sub>。</sub>去兒<sub>。</sub>ヲ加<sub>ヘ</sub>痲

不遂ノ患部ニ擦<sub>メ</sub>効アリ○此精一二滴宛吉利詞  
 爹兒<sub>。</sub>ノ液ニ加<sub>ヘ</sub>施<sub>メ</sub>痲或ハ衰弱ノ患者ニ尤<sub>モ</sub>驗ア  
 リ○小兒酸敗液ヨリ發スル腹痛搐掣或ハ大人酸  
 敗液ノ諸症ニ適宜ノ飲液ニ點服<sub>メ</sub>捷効アリ○黴  
 毒ニ是ヲ用<sub>テ</sub>發汗ノ煎劑ヲ兼用<sub>シ</sub>汗ヲ發<sub>メ</sub>良○  
 卒倒昏睡病等ノ多血ヨリ發スル者或ハ清涼劑ヲ  
 用<sub>フ</sub>ベキ症ニハ此精總<sub>テ</sub>大害アリ○水銀劑ヲ過  
 服<sub>メ</sub>汞熱<sub>。</sub>條<sub>。</sub>ニ出<sub>テ</sub>發スル者ハ此精ヲ用<sub>テ</sub>ヨク解  
 ス○齧齒ノ劇痛ニ此精ヲ綿ニ浸<sub>シ</sub>齧孔ニ挿<sub>テ</sub>速  
 効アリ是ヲ以<sub>テ</sub>其神經ヲ侵蝕<sub>シ</sub>麻痺セシムレバ



ナリ○脚痛風。或ハ打撲傷。或ハ乳。凝固ノ乳房結核  
ヲ生スル等ニ蒸溺劑トシ或ハ是ニ油ヲ和シ塗テ  
ヨク消散ス○此精ニ水ヲ加ヘ稀クシ洗藥トシテ  
關節ノ水綿様腫或ハ狂犬咬創ニ施シ或ハ輕キ火  
傷或ハ惡厲ノ疥癬浸淫瘡等ノ患部ニ施メ皆殊効  
ヲ稱ス或ハ水銃ヲ以テ是ヲ瘻瘡ニ注入メ其腐穢  
頑硬ノ肉ヲ消ス（依底）（依底）

**固性硃砂** ハステ。アムモニアクソウト蘭

**製法** 硃砂加石灰精。或ハ硃砂揮發華法ヲ製メ其  
列篤兒多ノ底ニ殘リタル渣塊ヲ取り沸湯ニ溶シ

發烟海鹽精ヲ是ニ滴スレバ沸騰ス是ヲ滴シ加テ  
毫モ沸動セザルニ至リ紙ニテ漉テ其液ヲ取り文  
火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾白ノ鹽ト爲シ硝子壘ニ  
入レ固封シ貯フ（按）

**又法** 結麗土精製者  
分量適宜

右結麗土ニ發烟海鹽精ヲ滴シ加テ毫モ滾動セザ  
ルニ至リ漉テ其液ヲ取リ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾  
白ノ鹽ト爲シ其温ナルヲ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ（按）  
**主治** 壅塞ヲ開キ粘稠ヲ釋キ汗ヲ發ス。間歇熱發作  
ノ一時前ニ一錢ヲ服シ温覆メ發汗シ其毒ヲ驅發

硃砂揮發膏

ノ殊効アリ故ニ一ニ是ヲ驅熱鹽ト名ク  
サボ・アムモニアキ・ホルチヲル又「リニ  
メン左ム・ホウチレ・ホルチウス・羅「ステ  
ルケレ・セ「プ・ハン・アムモニア  
カ「又「ブルツケ・ス・メルセル蘭

製法

硃砂加石灰精

一弓

阿利襪油

二弓

右硝子壘ニ入振蕩ノ能混和セシメ固封シ貯フ

主治

外敷ノ疼痛ヲ止メ痙攣ヲ鎮メ腫瘍ヲ消散シ  
壅塞ヲ開キ凝結ヲ解ク要藥トス○内部焮衝ヨリ  
起ル頑固ノ痛ヲ消スルニ是ヲ患部ニ擦シ或ハ咽  
喉焮痛ニハ頰ニ頸ニ塗テ殊ニ驗アリ或ハ胸膜焮  
衝。傷冷毒痛。痛風。脚痛風。或ハ痙攣痛。疝痛。或ハ諸般

ノ寒腫。壅結硬腫。便毒腫等ニ擦メヨク消散ス或ハ  
赤痢ノ腹痛ニ外敷シ或ハ非不遂ノ部ニ數塗テ殊  
ニ治驗多シ或ハ水腫ニ塗テヨク小便ヲ利ス○此  
藥一弓ニ羯布羅或ハ實百兒油一錢ヲ和シ施メ尤  
効アリ○專ラ止痛劑或ハ鎮痙劑ト爲スニハ是ニ  
阿芙蓉或ハ阿芙蓉液或ハ含電發謨阿芙蓉液等少  
許加ヘ用フベシ○患部ノ皮膚感觸甚クメ此藥ノ  
刺戟ニ堪ガル者ハ左ノ一方ヲ施メ良  
又法  
サボ・アムモニアカ「又「リニメン「ム・ホ  
ラ「チ「レ「羅「セ「フ・ハン・アムモニア「蘭  
硃砂精 四錢 阿利襪油 一弓半

右硝子壘ニ入レ振蕩ノヨク混和シ固封シ貯フ〔後〕

**甘硝砂精**

スピリタス・サル・アム  
モニアキ・ドルシス・羅

**製法**

剝篤亞斯〔ハット〕六多  
硝砂〔アス〕四多  
燒酒〔スピリタス〕三比

右ニ味各別ニ研末シ合和シ硝子ノ格兒弗ニ入レ  
燒酒ヲ加ヘ蒸餾ノ精一比半ヲ取り硝子壘ニ内レ  
固封シ貯フ〔疾〕

**主治**汗ヲ發シ小便ヲ利シ精神ヲ爽快シ失氣昏冒

癩及ビ痙攣ヲ治シ月經ヲ通スルニ尤効アリ〔疾〕

**民埵列利精**

スピリタス・ミンデレリ〔羅〕

○按ニ浦爾花歇〔アルハハ〕人創〔イ〕テ此劑ヲ製シ其後思〔ス〕可祭〔コチ〕

亞〔ア〕歐〔歐〕羅〔羅〕巴〔巴〕洲〔洲〕ノ民埵列利〔ミ〕名〔名〕多ク是ヲ用テ奇効ヲ  
稱シ大ニ世ニ行ハル。因テ是ヲ民埵列利精ト名  
クト云

**製法**

硝砂揮發華〔後〕

製法

蒸餾醋

各適宜

右醋ヲ硝子ノ格兒弗ニ入レ温沙火ニ上セ硝砂華  
少許ヲ加レバ忽チ沸騰ス其滾動靜止スレバ復〔タ〕硝  
華少許ヲ加ヘ斯ノ如ク逐次ニ少許宛加テ竟〔ツヒ〕ニ其  
液毫〔ス〕モ滾動セザルニ至リ火ヲ下シ靜定スルヲ兩  
三日其間時々格兒弗ヲ振蕩ノ混和セシムベシ爾  
後〔チ〕其二味平等ニ和勻スルヤ否ヤヲ試ル爲ニ此液

二醋一二滴ヲ加へ或ハ礶華少許ヲ加ルニ毫モ滾動セザルハ二物偏勝ナク平等ニ調和スル候トス但此液ニ醋ヲ滴ノ微滾動スルハ仍礶華偏勝ノ候トス故ニ是ニ醋ヲ滴シ加テ毫モ滾動セザルニ至ルベシ或ハ礶華少許ヲ加テ微滾動スルハ仍醋偏勝ノ候トス故ニ礶華少許宛加テ毫モ滾動セザルニ至リ是ヲ硝子壘ニ入レ固封シ貯フベシ

又法

蒸餾醋

礶砂加石灰精

各適宜

右醋ヲ長頸ノ硝子壘ニ入レ礶砂精ヲ一滴宛加レバ少ク滾動ス斯ノ如ク漸ク加テ竟ニ其液毫モ滾

動セザルニ至リ又其二味平等ニ調和スルヤ否ヤヲ試ル爲ニ二個ノ茶碗ニ各此液少許ヲ分チ取り先ツ一個ノ茶碗ノ液ニ醋ヲ滴ノ微滾動スルハ礶砂精仍偏勝ノ候トシ其硝子壘ノ液ニ蒸餾醋ヲ滴シ加テ毫モ滾動セザルニ至ルベシ或ハ其他ノ一個ノ茶碗ノ液ニ礶砂精ヲ滴ノ微滾動スルハ醋仍偏勝ノ候トシ其硝子壘ノ液ニ礶砂精ヲ滴シ加テ毫モ滾動セザルニ至ルベシ或ハ右ノ如ク兩個ノ茶碗ノ液ニ醋或ハ礶砂精ヲ加テ毫モ滾動セザルハ其液偏勝ナキ候トス宜ク硝子壘ニ入レ固封シ

貯フベシ○枸橼汁或ハ橙汁ヲ以テ右ノ蒸餾醋ニ  
代用ノ亦良効アリ○枸橼汁ニ鹿角鹽ヲ加ヘ前法  
ノ如ク製スレバ其効尤峻ナリ斷

**主治**諸峻効アル發汗劑中ニ於テ尤此精ヲ稱ス極  
テ揮發鑽透シ鬱塞ヲ開達シ粘稠液ヲ稀釋スレバ  
亞的兒及ビ阿芙蓉ニ比スレバ侵刺衝動ノ性緩ニ  
シスノ毫モ酷厲刺戟ノ害ナク又血液ノ運行ヲ増發セ  
ズ能ク發汗ス故ニ多ク熱病ニ用テ驗アリ○凡虛  
弱ノ熱病ニ於テ蒸氣ヲ發スベキ症ニ用フ○熱病  
ノ患者虛弱ニシテ血液ノ運行凝泣怠慢ナル症ハ是

ヲ用テ能揮發健運シ腐敗ヲ遏ム故ニ腐敗熱惡性  
熱等ニ多ク用フ神經熱ニハ纈草根ヲ加テ尤良○  
鬱遏セル蒸氣ヲ發泄シ小便ヲ利ス故ニ是ヲ用テ  
溫覆セズ蒸氣ヲ抑遏スレバ利尿ノ効多シ○大ニ  
勞動歩走スル等ニテ憊倦シ肢體痠痛彊拘不遂ス  
ルヲ治ス○傷冷熱嗽衝走注痛痛風或ハ傷冷毒ヨ  
リ起ル咽喉焮腫ニ用ヒ發汗メ治ス或ハ接骨木花  
ノ泡劑ニ加ヘ用フ或ハ蒸溺劑トシ患部ニ施メ効  
アリ○一處ニ住留スル嗽衝ニハ蒸餾醋少許ヲ加  
ヘ適意ノ酸味トシ用テ良○肺嗽衝胸脇嗽衝ニハ

海葱醋ヲ等分ニ加ヘ用テ尤効アリ○秋ノ間歇熱  
 發作ノ時惡心嘔氣甚ク或ハ煩悶ノ熱劇キ者ハ即  
 チ膽液熱ナリ膽液腐敗シ其酷厲毒胃腸ニ鬱蓄ノ  
 侵刺シ其諸症ヲ發スルヲ云是レ替  
留熱ニ在テハ膽液熱  
 或ハ胃腸熱ト稱ス此症ハ吐劑ヲ用テ其毒ヲ滌  
 除ノ後此精四錢ヲ飲液ニ和シ是ニ阿芙蓉液五滴  
 許加ヘ四分時コハントキ毎ニ是ヲ用フベシ三四回用レバ微  
 汗ヲ發メ熱解スイッヒ每次右ノ如ク用レバ其發作漸ク  
 減メ回復ス○服量一錢ヨリ三四錢マデ飲液ニ和  
 シ日ニ數次用フ○過服シ或ハ久服スレバ下利ヲ  
 發シ或ハ飲食消化ヲ妨グ○此液ニ錢ヲ温湯ニ加

ヘ服メ臥床ニ温覆シ少頃シテ復服スレハ微汗ヲ  
 發シ病毒ヲ驅發ス○利尿ニハ每服四錢日ニ兩次  
 用フア過爾託亞根舍利別ヲ等分ニ加ヘ用テ殊ニ良  
 ○蒸氣ヲ發スルニハ鹿角鹽少許ヲ加テ其効尤峻  
 ナリ發汗スルニモ鹿角鹽ヲ加ヘ十二時中ニ十六  
 錢許用フベシ

○發汗スベキ諸症ハ左ノ方良驗アリ

傑列乙發汗飲

接骨木傑列乙 五錢

民埵列利精 一錢

接骨木花水 三勺

右一服トシ八分時中ニ服ス○外用ニハ蒸溺劑或

ハ洗藥トシ或ハ壓定巾ニ蘸シ施シ或ハ其症ニ隨  
 ヒ水ヲ加ヘ稀クシ施<sup>オシモメン</sup>ノヨク凝結ヲ疏解シ諸腫ヲ  
 消散ス炊衝ナキ寒腫肉腫或ハ瘰癧腫或ハ瘤ノ初  
 發ニ施メ消散スルニ殊ニ効アリ或ハ是ニ失鳩<sup>シキウタ</sup>答  
 越<sup>エキス</sup>幾斯劑ヲ加ヘ施メ頑硬腫腺腫ヲ消ス○打撲傷  
 及ビ脉外肉裏ニ瘀血泛溢ノ斑ヲ發スルニ施メヨ  
 ク消散ス○眼中角膜ノ星翳或ハ水樣液ノ曇暗ニ  
 點メ偉効アリ 叔淑依福  
斯底麻

遠西醫方名物考卷五終

