

遠西醫方名物考

與加下

卷八

武9  
857  
45-8

學大田稻早	館書圖
庫文田內者托寄	號七六一第書托寄
號	9
册	8





武門  
857  
45-8

大正五年九月  
內田宗子氏  
贈

遠西醫方名物考標目

卷八

海葱

龍沒海葱散  
酒石海葱散  
海葱酒  
盧會海葱丸  
金硫海葱散  
桂健海葱散  
海葱丁幾去爾

海葱醋

海葱蜜

酒石海葱蜜

葛縷子

葛縷子油

瓦爾拔奴謨

麩謨通經飲

瓦爾拔奴謨膏

海鹽

精製海鹽

海鹽炒乾法

海鹽精

發烟海鹽精

鹽精舍利別

鹽精蜜

瓦老別里鹽

甘海鹽精

遠西醫方名物考

卷八

標目

風雲堂

藏書



葛私多兒 カストレ 葛私多儂 カストレ 葛私多儂 カストレ 鎮瘕丁幾去爾 カストレ

家猪脂淨製法

甘扁桃 扁桃 甘扁桃油 同上 甘硝砂精 硝砂

甘乳清 乳清 甘消石精 消石 甘綠礬精 綠礬

甘汞 水銀 乾酪 乳 乾白撒兒末爾扶斯 鐵

加羅茂兒 水銀 乾白揮發鹽 重訂內科撰

與孕礬酒石 酒石 孕鹼酒石 同上 孕礬酒石液 同上

遠西醫方名物考卷八

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕菴校補

海葱 シキルラ 羅 ゼーアイトイン 蘭 海葱ノ義

形狀 是レ歐羅巴洲ノ南地海邊ニ多ク生スル一種

ノ草ナリ冬月或ハ初春葉生スルヲ五六枚龍舌草

葉ニ似テ小長一尺餘濶三四寸許背凸面凹深綠色

肥厚低テ地ニ塌ス是ヲ截レバ苦味ノ粘汁出ツ初

夏葉盡ク枯レ立秋ノ頃一直莖ヲ抽ク一尺半許六

瓣ノ白花莖ヲ圍テ長穗ヲ成シ其狀月下香花ノ如





シ但一穗ノ中。花開ク<sub>一</sub>漸<sub>ク</sub>以テス。初メ下部ニ開  
 キ萎テ後。中程綻ビ。終ニ頂上ニ及ブ。稀ニ黄花ノ者  
 アリ花後三稜ノ蒴<sub>サヤ</sub>ヲ結ビ。内ニ穎<sub>ヒラカハ</sub>ノ如キ楮黒ノ扁  
 子充ツ。八九月實熟シ莖盡ク枯ル根ハ葱薤ノ如ク  
 層片襲被メ球ヲ爲シ大サ拳ノ如シク。或云兒頭ノ如  
 シ。如外皮楮赤色下底ニ太キ鬚條多シ。淡黄色ノ粘  
 汁アリ味苦辛。舌ヲ刺戟ス肌膚ニ貼スレハ侵蝕メ  
 泡ヲ發ス。香臭ナシ。鐵刀ニテ截レバ其刀鏽テ用フ  
 ベカラズ故ニ木刀或ハ象牙刀ヲ用フ新ナルハ白  
 色ニメ粘液多シ。久ク曝乾シ或ハ焙乾。度ニ過レバ

性力耗散ス○一種根葉<sub>凡</sub>ニ小ナルアリ根大ナル  
 ハ花モ美ナリ○此草<sub>イ</sub>伊斯把尼亞<sub>スバニア</sub>意太里亞<sub>イタリア</sub>波爾杜  
 瓦爾<sub>ワール</sub>齊西里亞<sub>シシリア</sub>以上歐羅巴<sub>ユーロパ</sub>西里亞<sub>シシリア</sub>細亞<sub>シリア</sub>洲<sub>州</sub>其他地  
 中海ノ邊。沙地原野ニ自ラ生ス。和蘭ニハ園ニ培養  
 ス。根ヲ分ケ或ハ種ヲ下シ生ス風氣爽塏温燠ノ地  
 疏脆交沙ノ濕地ヲ好ム。寒氣ニ堪ヘズ冬月春初ニ  
 ハ密ニ覆ヒ養フベシ<sub>度物取</sub>  
 ○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用  
 フベシ

**主治** 根ヲ藥用トス生鮮ノ者効力尤峻ナリ乾ス者



ハ氣味稍減ス○性温。鑽透刺戟シ膠粘液ヲ疏釋シ小便ヲ驅泄スルニ奇効アル藥トス又湧吐ノ功アリ○小便ヲ分利スル諸器衰弱シ若クハ粘稠液壅滯メ發スル水腫小便閉ヲ治スルニ大効アリ○粘液過多ニメ肺咽喉或ハ腹中諸器ニ鬱聚スル諸病ヲ治ス故ニ粘痰多キ喘急及ビ水腫ニ闕ベカラザル良藥トス然レ内藏ニ壅塞及頑硬腫アリ或ハ脉強ニメ煩渴乾燥ヲ兼ル諸症ハ此藥適當セズ○此藥吐劑トシ用ルヲアリ是ハ唯膠粘ノ汚液肺及ビ氣管ニ凝聚ノ壅塞スルヲ疏解湧泄メ吐シ除クニ

用フ但是ニハ海葱蜜後ニ出ツヲ良トス痰欬喘滿短氣促迫等ニ速効アリ○散劑或ハ丸藥トシ用ルニハ四匁ヨリ十六匁ニ至ル但感觸シ易キ人ハ吐下等ノ瞑眩アルガ故ニ初メ一匁許用ヒ患者堪ルニ隨ヒ漸ク加フベシ或ハ香竄ノ藥ヲ加テ瞑眩ヲ抑制スベシ假令バタトハ幾那キナ龍腦阿芙蓉泥菖根等ヲ加ルガ如シ○過用スレバ吐下腹痛尿血ヲ發ス故ニ多血家或ハ感觸シ易キ人或ハ尿道ニ潰瘍アル者ハ是ヲ禁ス○專ラ利尿ノ効ヲ取ガ爲ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用ルヲアリ。否ザレバ吐シ或ハ瀉メ利尿ノ功



減スルコトアレバナリ或ハ阿芙蓉劑ト互ニ用ヒテ  
其吐ヲ防クモ良○海葱ハ粘痰留飲ヲ疏解ノ驅除  
スルニ峻効アレハ焮衝ノ症ナキ者或ハ寒性粘液  
質ノ入。皮膚黧澹灰白。脉小遲ニメ肢體勞倦スル者  
ニ用フベシ右ノ諸症ニ後方良効アリ

龍沒海葱散

海葱 末一 龍腦 十 沒藥 一錢半 沙糖 四錢

右合和ノ散劑トシ分テ十服トシ一日ニ四次一服  
宛用フ○左ノ方亦良

金硫海葱丸

海葱 末一 越謨安沒尼亞幾 各二錢 沒藥 各二錢

金硫黃 十

右調和シ三丸ヲ一丸トシ每服三丸或ハ其餘。日ニ  
三四次用フ○留飲停水粘液ノ胃腸ニ鬱蓄スルヲ  
小便ヨリ驅逐シ水腫脚腫。黃疸。經閉等ヲ治スルニ  
左ノ方捷効アリ清涼驅水ノ効アルヲ以テ熱アル  
症ニ尤良

酒石海葱散

海葱 一 酒石英 一 沙糖 各六錢

右調和ノ散劑トシ分テ十服トシ日ニ四次一服宛



用フ○海葱ハ動スレバ嘔氣ヲ發スルユ又ニ胃ノ  
 運化ヲ妨ゲ漸ク食進マザル者アリ然ル片ハ是ヲ  
 休メ或ハ健胃ノ藥ヲ加ヘ用フベシ○丸藥トシ用  
 レバ胃ヲ攪擾スル患少シ左ノ方尤良

**桂健海葱丸**

海葱 末ニ 桂 二錢 健質亞那 一錢

薄荷油 六滴 過爾託亞根舍利別 適量

右調和ノ百二十九丸トシ三丸宛用ル一日四欠但其  
 症ニ隨テ増減ス○腹水或ハ粘液胸中ニ蓄滿スル  
 症ハ **酒石海葱蜜** 海葱 良効アレモ腹水ハ後方殊良

**海葱酒**

海葱 自一錢 葡萄酒 六錢  
 至二錢 酸性者

右硝子壘ニ入レ固封シ煖處ニ浸ス一兩三日濾シ  
 毎朝一匙或ハ二匙唯悪心ノミニテ吐セシメス海  
 葱モ初メ一錢ヨリ堪ルニ隨ヒ加フヘシ或ハ悪心  
 ヲ防クニ橙皮丁幾劑少許加ルモ良○又左ノ方驅  
 水ノ効アリテ嘔吐ヲ發スル一無シ

**海葱丁幾去爾**

海葱 酒石鹽 各一兩 燒酒 八兩

右硝子壘ニ入レ浸ス一兩三日。濾過ノ滓ヲ去リ十



五滴ヨリ二十滴許。其症ニ隨テ増減シ服ス  
 ○海葱ニ消石一倍ノ量ヲ加ヘ用ヒテヨク小便ヲ  
 利シ停水ヲ驅逐シ水腫ニ大効アリ然レ間吐下ス  
 ルヲアリ○海葱末ニ峻下ノ藥ヲ加ヘ水腫ニ用ヒ  
 テ停水ヲ瀉下シ速効ヲ取ルヲアリ此症ニハ左ノ  
 方峻効アリ

盧會海葱丸

海葱 未二十 四氏  
 蘇甘沒扭護 スカムモニカム  
 藥刺巴華爾斯 各一 錢半  
 盧會 一 刀  
 右調和シ九丸トシ一時半或ハ二時毎ニ一丸ヲ服

ス○水腫ノ患者。右ノ如キ劑ヲ用ヒテ小便夥ク通  
 シ腹脚等ノ腫減スルキハ其收縮スル多少ニ隨テ  
 其部ニ縛帶ヲ施シ又鐵劑ヲ用ヒテ其弛緩セル部  
 ヲ故ニ復スベシ○若シ右ノ諸劑ヲ用ヒテ嘔吐ヲ  
 發スル者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ其吐ヲ鎮ムベシ○外  
 敷ノ瘡瘡ヲ治ス 叔按福 伍依  
 海葱醋 アゼチムシキルヲ羅 生鮮者切片トシ乾シ到  
 製法 イニアゼイン蘭 海葱醋ノ義  
 蒸餾醋 二十四弓  
 右硝子壘ニ入レ固封シ微火上ニ置テ浸シ藥氣ヲ



出ス<sub>一</sub>八日。絞テ汁ヲ取り是ニ燒酒ニ<sub>三</sub>ヲ加ヘ靜定ノ底渣ヲ去リ上清ヲ取り硝子燻ニ入レ固封シ貯<sub>フ</sub>其燒酒ヲ加ルハ久ク貯テ損敗セザラシムルガ爲ナリ

**主治** 粘稠液ヲ稀釋シ肺ノ壅滯ヲ疏通シ頭痛痰欬ヲ治ス ○適宜ニ水ヲ和シ漱藥ト<sub>ノ</sub>咽喉焮腫ヲ消

散ス ○芥子泥ニ加ヘ外敷<sub>ノ</sub>發泡藥トス 〔按〕

海葱蜜

「オツシメル」シキ<sub>ラ</sub>「ホニフアゼイン」ハンゼ<sub>ア</sub>イウ<sub>ン</sub>又ゼ<sub>ア</sub>イウ<sub>ン</sub>「ホニフ」蘭海葱蜜ノ義

製法

海葱醋 一北

蜜 煮テ泡ヲ去ル者 二北

右硝子燻ニ入レ振蕩<sub>ノ</sub>混和シ磁鍋ニ内レ文火ニ煮テ蜜ノ稠ト爲ス 〔按〕

**主治** 膠粘液ヲ稀釋シ留飲停水ヲ驅逐シ小便ヲ利シ痰欬喘急ヲ治シ肺ノ頑痰ヲ祛キ黄疸ニ効アリ ○此劑ハ醋ノ酸性ト蜜ノ甘和ノ性トヲ以テ海葱ノ酷厲毒ヲ抑制スル者ナリ。水腫及ビ小便ヲ利スベキ諸症ニ大効アリ是ニ中和鹽ノ類ヲ加テ殊ニ良効アリ即チ左ノ方ノ如シ

酒石海葱蜜

海葱蜜 四<sub>三</sub> 酒石葉 三<sub>錢</sub>

右研和シ一時或ハ一時半每ニ二錢宛用<sub>フ</sub>。但嘔氣



ヲ發セバ服量ヲ減スベシ此劑胸水腹水及ビ胸中  
 粘液壅滯スル諸症ニ殊効アリ○海葱蜜ハ粘痰吐  
 シ難キ症ニ用ヒテ痰唾ヲ吐セシメ喘急等ニ捷効  
 アリ○肺瘍ノ膿熟セルヲ潰破メ吐セシムルニ用  
 フ○膠痰肺ニ粘結セル症ニ此劑一匁ニ硃砂精一  
 錢ヲ和シ一時或ハ一時半ニ一匙或ハ二匙宛用ヒ  
 テヨク痰ヲ咯出ス○是ニ蘘ガム謨安アシム沒ム尼亞ニキ幾キト茴香  
 水ヲ加ヘ用ヒテ胸水病ニ奇効アリ○此劑殺蟲ノ  
 効アリヨク蚊蟲ヲ驅除ス○適宜ニ水ヲ加テ漱藥  
 シ咽喉焮腫ヲ治ス

底依  
伍福

葛縷子 カルクイ カルクイ又カルクイ 羅ホフ。コメイ ン蘭

**形状** 葛縷草ハ方莖中虛長一二尺許叢生シ枝多シ  
 葉。胡蘿蔔葉ニ似テ細ニ分裂シ枝ニ排列ス。柔ニシ  
 毛茸ナシ夏月五瓣ノ小白花ヲ開キ繖狀ヲ爲ス。花  
 速ニ謝メ子ヲ結ブ茴香ニ似テ小。差長ク灰褐色ニ  
 ノ條理アリ味辛甘香氣アリ根細柔白或ハ黄色ナ  
 リ實熟スレバ莖枯テ宿根久水邊濕地ヲ好ム。煖國  
 ニ産ス根食用トスル者アリ○子ヲ取り藥用トス  
 ○按ニ此藥和産未ダ詳ナラズ舶來ノ者ヲ用フ



ベシ度湿云性功。茴香ノ如シト代用スベシ。○榕  
按ニ此草伊吹防風ニ近シ唯方莖ナラズ根瘦硬  
ナルヲ異ナリトス

**主治** 子性温。衝動開達。破氣驅風ノ劑トス。瘕瘕ヨリ  
起ル疝腹痛ニ尤効アリ然レ焮衝壯熱或ハ膽液過  
多。胃腸ニ汚物敗液壅滯スル症ニハ害アリ汚物ヲ  
滌除メ後用フベシ。○子宮衝逆ヲ治シ小便ヲ利シ  
淋疾痛ヲ甘メ婦人乳汁ヲ増ス。○琶布或ハ慰劑ト  
メ凝結ヲ疏解シ疝痛ニ効アリ又腫瘍硬腫ヲ消散  
シ或ハ化熟メ膿ヲ醸ス 依物麻伍

葛縷子油 オレウム。カルウイ羅

**製法** 薄荷油及ビ茴香油製法ト同シ

**主治** 葛縷子主治ノ病ニ用ヒテ尤効アリ十滴マデ  
内服ス。○胃腸虚弱ニメ風氣痞脹疝痛腸攣急等ノ  
患部ニ塗テ効アリ 戻福

瓦爾拔奴羅 メトピウム羅 ハドルハルス蘭  
是ハ亞弗利加洲南北ノ諸國及ビ伯兒西亞亞刺比  
亞細亞 齊西里亞歐羅巴洲 等ニ産スルヘリラ  
ガルバニヘラ又ヒボン ガルバニムト名ル草及ヒ



其根ヨリ自ラ流滴シ或ハ是ヲ鑽刻ノ乳汁ノ如キ  
 液ヲ取り曝乾ノ凝固セル華爾斯様ノ護謨ナリ云  
 此脂ハ護謨ト華爾斯トノ間ニ屬ス其故ハ是ヲ火  
 二投スレバ燄ヲ發ス是レ華爾斯ノ質ナリ是ヲ水  
 酒醋等ニ浸セバ溶化ス然レ油ニハ溶化セズ是レ  
 護謨ノ質ナレバナリ困云此脂ハ護謨質多クメ華  
 爾斯質少ク或云此脂ハ其質柔ニノ粘リ蠟ノ如ク  
 一種ノ灌木ヨリ生スト  
 黃色或ハ赤ヲ帶ビ臭氣蒜ノ如シ上好新鮮ナルハ  
 淡白ノ粒ヲ雜ヘ大榛子ノ如シ○此脂二種アリ第  
 一種ハ小ナル顆粒ヲ爲シ白色或ハ褐色ニノ淨潔  
 微透亮光澤アリ乾固ノ油様ノ粘氣ヲ含ミ柔ナレ  
 凡過ダ粘著セス磨ノ細末トナル温ムレバ粘レ凡

火氣ニテ溶化セズ火ニ投メ燃易ク味不佳ニノ苦  
 ク辛ヲ帶ビ竄透ノ臭氣アリ氣味凡ニ護謨安沒尼  
 亞幾ノ如クニメ強シ是ヲ上品トス○第二種ハ大  
 塊ヲ爲シ多クハ赭色ニメ鐵鏽色ヲ帶ビ粘著ノ不  
 潔ノ蠟ノ如シ是ヲ下品トス然レ鮮美淡黃淨潔ニ  
 ノ疏脆ノ塊片ヲ成シ乾テ粘著セズ臭氣甚ク味苦  
 辛或ハ裏ニ白キ光澤アル顆粒ヲ雜ルハ上品トス  
 ○赭色或ハ種々汚色アリ或ハ木屑。藁子仁。塵土ヲ  
 雜ヘ或ハ軟ニメ粘著シ或ハ臭氣ナク黑色ヲ帶ル  
 ハ皆下品或ハ偽品トス○此脂ヲ生スル草ハ高升



六七尺許。莖太<sup>+</sup>。拇指ノ如シ。多ク傍枝ヲ分チ中心淡白ノ髓アリ葉<sup>オランダセリ</sup>。洋芹葉ニ似テ濶ク固ク尖テ缺裂シ四時常緑。味辛。臭甚<sup>シ</sup>。莖枝頭ニ五瓣ノ黄花簇生シ。繖狀ヲ爲ス。花後微長キ扁圓ノ繖子生ス<sup>繖子ハ刺ヲ發ス</sup>。條<sup>ニ</sup>。楮褐色。辛味烈香アリ。下品ノ脂ハ多ク此子ヲ<sup>ニ</sup>。雜<sup>フ</sup>。根太ク鬚多シ灰白色ナリ。○此脂ノ顆粒ヲ成ス者ハ此草ニ含メル乳様ノ汁。自然ニ莖枝及根ヨリ流滴ノ凝結<sup>シ</sup>。或ハ鑽刻ノ流滴スルヲ取リ仔細ニ意ヲ用テ塵埃ヲ避<sup>ル</sup>者ナリ。其大塊ヲ成シ下品ナルハ其草ヲ鑽刻ノ倉卒ニ多ク其脂ヲ集メ取テ

塊ト爲ス者ナリ

○按ニ此脂和漢產未ダ詳ナラス舶來ヲ用ベシ

**主治** 性温。竄透酸性揮發ノ鹽油多シ又微<sup>ヤ</sup>水氣土氣ヲ含メリ。○神經ヲ强健ニシ堅硬ヲ軟化シ粘稠ヲ稀釋シ痛ヲ止メ風氣ヲ驅リ諸藏ノ壅塞ヲ疏散スル要藥トス。肺。腸間膜。肝脾等ノ壅塞硬腫ヲ疏散ス。是ヲ以テ又子宮衝逆或ハ月經不調及ビ經閉ヲ治スル一良藥トス。多ク丸藥トシ用フ又欬嗽喘急等。胸肺ノ粘液諸病ニ殊効ヲ奏シ或ハ癩症ヲ治シ虻蟲ヲ殺ス。○經閉ニ左ノ方良効アリ



越謨通經飲

瓦爾技奴謨 一匁 燒酒 十匁

右溶化シ日ニ二卵匙宛適宜ノ飲液ニ和シ服ス○  
此脂ヲ膏藥ニ加ヘ外敷ノ堅腫ヲ消シ凝固ヲ散シ  
或ハ焮腫ヲ化熟ノ膿ヲ成ス故ニ焮熱アル腺腫或  
ハ頑硬腫瘰癧骨腫微毒結腫等ニ殊効アリ○是ヲ  
沸湯ニ投メ溶シ上面ニ浮ム汚物ヲ去リ用フ或ハ  
醋ニ浸シ溶シ煮テ適宜ニ凝固セシメ用ルモ良○  
服量日一匁ヨリ一月半ニ至ル（叔物依）  
瓦爾技奴謨膏 一匁（叔物依） プラストデガルバラム（叔物依） 羅

製法

瓦爾技奴謨ガ 淘淨ノ汚物ヲ去ル者  
若把兒麻膏デ 各一匁  
的列竝底那テ 勿擲ハ 祭亞テ

黃蠟 半匁

右先ヅテ 的列竝底那テ 慢火ニ上セ溶化シ漸次ニ餘シ  
藥ヲ下シ煉和シ硬膏ト爲ス（伍） 錢（伍） 加（伍） 砂（伍） 四（伍）  
主治 諸般ノ堅硬腫ヲ消散ス（叔） （亞）

海鹽 一匁（叔） マリナム（叔） 羅 一匁（叔） セソウト（叔） 蘭

主治 温煖疏解ノ効アリ適宜ニ用レバ胃ヲ健運シ  
飲食消化ヲ扶ク過用スレバ吐下スルヲ海水ノ如



シ或ハ一月ヨリ半錢許ヲ吉利詞キリス參兒ステイルノ藥液ニ加  
 へ施メ下利ノ効ヲ扶ク或ハ浴湯トノ痛風ヲ治シ  
 或ハ刺咬傷ノ洗藥トシ或ハ炒温テ袋ニ入レ貼メ  
 腹痛ヲ治ス○尋常海鹽ハ土氣水氣多キ故ニ藥用  
 トスルニハ精製ノ用フベシ依福伍

精製海鹽

ゲソイフルデゼソウト蘭

海鹽ヲ適宜ニ取り沸湯三倍ノ量ヲ加テ溶化シ其  
 熱セル液ニ鹽蓬晶液ハ蓬晶一比水ハ比ニ溶ス液ヲ滴シ加レハ  
 白塗ヲ生ス終ニ毫モ白塗生セサルニ至リ紙ニテ  
 漚シ其液ヲ取り文火ニ上セ少許スコシ水氣ヲ蒸散ノ冷

處ニ置バ芒ヲ結ブ其芒ヲ取り乾シ貯フ後

海鹽炒乾法 サルキナレデクレピタタハ羅

製法 海鹽ヲ磁鍋ニ入レ蓋フタヲ覆ヒ炭火ニ上セ爆

鳴ノ粉ノ如クナリ透明ナラズ白色トナルニ至リ

硝子壘ニ入レ固封シ貯フ後

海鹽精 スヒリチカスサリスマリニ羅  
ゲースト・ハン・ゼソウト・蘭

製法 發烟海鹽精 一多

蒸餾水 二多 固ニ味等分トス

右硝子壘ニ内レ靜定スルト數日。時々振蕩ノ漸ク  
 混和セシメ固封シ貯フ後



發烟海鹽精

「ロケンデゼソウトウル又ゲーストハン  
ゼソウトハンガラウベル又ソウト  
ル蘭」スピリタスサリス。又マンズ  
此精常ニ蒸氣升發メ烟ノ如シ故ニ名ク  
海鹽精製シ炒乾ノ極細末ト爲ス者

製法

綠礬油 再餾ノ銳烈者 雨水 六多

右鹽ヲ潤大ナル硝子ノ列篤兒多ニ入レ。雨水ヲ磁  
器ニ入レ綠礬油ヲ取テ一滴宛其水ニ加ヘ終ニ少  
モ沸動セズ冷ルニ至テ管長キ硝子ノ漏斗ヲ以テ  
徐々ニ是ヲ右ノ列篤兒多ニ加テヨク鹽ト混和セ  
シメ是ヲ沙火ニ入レ。硝子ノ承餾壘三個ヲ以テ其  
列篤兒多ニ連屬ス。其法第一個ト第二個ノ承餾壘

ノ頸本ノ側ニ一小孔ヲ穿テ先ヅ列篤兒多ノ彎リ  
タル頸ヲ第一個承餾壘ノ頸ニ挿シ其頸本ノ孔ニ  
彎リタル硝子ノ管ヲ挿シ其一端ヲ第二個壘ノ頸  
ニ挿シ第二個ノ頸本ノ孔ニ亦彎リタル硝子管ヲ  
挿シ其一端ヲ第三個壘ノ頸ニ挿シテ連屬セシムル  
ナリ但第二個ノ壘ニ蒸餾水四多 綠礬油ノ三分ヲ  
入レ第三個ノ壘ニ蒸餾水六多 綠礬油ノ半ヲ入レ  
皆其合際ヲ塗封シ初メ文火トシ漸ク火ヲ増シ蒸  
餾ノ遂ニ少シモ蒸氣升ラザルニ至リ火ヲ下シ冷テ  
後速ニ放開スレバ第一個第二個ノ壘ニアル精ハ



尤銳烈ナリ第三個壘ノ精ハ緩弱ナリ各是ヲ分チ  
 硝子壘ニ移シ硝子塞ニテ固閉シ此ニ蠟ヲ塗り貯  
 フベシ右如承餾壘ヲ連屬スルハ其蒸氣ヲ水中ニ  
 吸收スルガ爲ナリ○此精ハ酸性極テ猛烈ナルヲ  
 以テ其硝子塞ヲ放テバ蒸氣升發スルヲ烟ノ如シ  
 ○其綠礬油多此精中ニ混シ清潔ナラザルアリ  
 綠礬油雜バ其斯ノ如キ片ハ精製炒乾ノ海鹽ニ多  
 色清澄ナラズ  
 綠礬油ノ六分ヲ加テ再ビ蒸餾ノ精ヲ取ルベシ是  
 ニ由テ淨潔トナルナリ

又法

海鹽

精製者炒乾極細末ト爲ス  
 六北

綠礬油

三北

蒸餾水

二北

右鹽ヲ頸彎リタル硝子ノ列篤兒多ニ入レ沙火ニ  
 入レ潤キ蒸餾壘ヲ接合シ蒸餾水ヲ磁器ニ入レ綠  
 礬油ヲ取テ一滴宛其水ニ加ヘテ少モ沸騰セズ冷  
 ルニ至テ硝子ノ漏斗ヲ以テ徐々ニ是ヲ右ノ列篤  
 兒多ニ加テ鹽ト混和セシメ其口上ノ口ヲ云  
 栓ニテ塞キ膠泥ニテ其罅隙及ビ壘ノ接際ヲ塗封  
 シ初メ文火トシ鹽精縷狀ヲ爲シテ列篤兒多ノ頸  
 ニ升リ委蛇彎曲ノ承餾壘ニ下ル片ニ漸ク火ヲ増  
 テ遂ニ沙鍋通紅トナリ蒸氣升ラズ精下ラザルニ



至テ放冷シ速ニ其精ヲ硝子壘ニ寫シ硝子塞ニテ固閉シ冷處ニ貯フ<sup>臣</sup>

**主治** 峻酸ノ性。清涼ノ効。綠礬精。消石精ノ如シ。○血液ノ腐敗ヲ遏ル効。綠礬精ニ勝レリ。清涼飲劑ニ加ヘ清爽ノ味アリテ渴ヲ止メ一切腐敗性ノ熱病ニ乾燥熱ヲ兼子咽喉燥キ頭痛譫語或ハ血液焔解崩壞ノ失血等ヲ兼ルニ大効アリ。○總テ此精ヲ内服スルニハ水ヲ加ヘ稀クシ酸美ト爲シ用フベシ。右ノ如キ腐敗性ノ熱病ニハ左ノ舍利別尤良

**鹽精舍利別**

沸湯 九勺

舍利別 一勺

海鹽精 一錢

右調和シ半時ニ二匙宛用フ。○腐敗熱。神經熱ニ於テ血液腐敗ヲ爲ス。多キホド此精逾効アリ。然レ諸熱病。腐敗ナク唯焮衝ヲ兼ル者ハ害アリ。焮衝多キホド害モ亦甚シ。是レ鹽精ノ精微ナル酸性ヲ以テ其焮衝シテ强硬ナル諸脉纖維ヲ衝動メ。逾强硬ナラシメ諸症ヲ増劇スレバナリ。故ニ肺焮衝。胸脇焮衝ニ用レバ其乾欬ヲ増發シ遂ニ勞欬トナリ救ハレザルニ至ル。麻疹ニモ亦害アリ其熱毒ニテ肺ニ焮衝ヲ發スレバナリ。○發斑熱モ腐敗ニ屬スル



症ニハ良驗アリ然レ自餘ノ症ニハ害アリ○日發熱間歇熱モ焮衝ヲ兼ガル者ニ多ク驗アリ○赤痢ノ腐敗ヲ兼ル者ニ偉効アリ勞瘵熱ニハ總テ害アリ○小便ヲ利スルニ峻効アリ故ニ水腫ニ十滴ヨリ二十滴マデ適宜ノ湯液ニ加ヘ用ヒテ驅水藥トス○胃衰弱ノ食進マズ或ハ嘔吐ヲ兼ル症ヲ治シ胃ノ粘液ヲ稀釋ス左ノ方良効アリ

鹽精健胃水 海鹽 四錢 水 四勺

右溶化シ是ニ海鹽精二錢ヲ加ヘ調和シ卵匙ニ一二匙宛冷水一盞ニ和シ毎日數次用ヒテ諸症全治

スルニ至ルベシ或ハ十滴ヨリ二十滴マデ適宜ノ稀キ飲液ニ滴シ酸美口ニ適フヲ度トシ用ルモ良○外用ノ腐壞ヲ遏ル峻効ノ藥トス漱劑或ハ塗藥トシ咽喉頰裏斷顎等ノ潰瘍滋蔓腐爛シ或ハ其骨ヲ蝕スル症ニ大効ヲ奏シ殊ニ失苟兒陪苦ヨリ發スル口中斷顎ノ潰爛ヲ遏ルニ神効アルト他ニ比スベキ者ナシ是ニ玫瑰蜜沒藥丁幾劑龍腦ヲ加ヘ施メ殊ニ良○口顎斷舌ニ癌瘡ヲ生メ臭穢腐爛侵蝕スル症ハ左ノ方奇効アリ

鹽精蜜



玫瑰蜜 六錢 沒藥オンキ丁テタル幾シ去ク爾ル 二錢

海鹽精 二十滴ヨリ 四十滴ニ至

右調和シ外敷ス。速ニ滋蔓腐蝕スル症ニハ鹽精一  
味ヲ患處ニ塗レバ痂ヲ結ビ腐蝕止ム。或ハ失苟兒  
陪苦ノ毒ニテ斷頸潰爛スルニハ右ノ劑ニ龍腦十  
分。海鹽精四十滴ヨリ六十滴マデ海鹽精ノ強弱調  
和メ一時毎ニ鳥羽ニテ斷ニ塗テ捷効アリ。○寒熱  
壞疽ノ漫延侵蝕スルヲ遏止スルニハ此精ヲ幾那  
ノ煎湯ニ加ヘ蒸湯劑トシ施メ奇効アリ。○此精一  
錢ヲ取テ吉利詞キリス爹兒テールノ液ニ加ヘ毎日數次施メ腐

敗熱ノ腐敗ヲ遏止スルニ大効ヲ稱ス。○此精ハ消  
石精。石膽油ノ如ク性甚ダ侵蝕シ又他ノ酸精ニ比  
スレバ殊ニ凝結ヲ解ク効アルユエニ疣贅頑固ノ  
息内及ビ漸ク滋長スル肉腫ヲ消スルニ毎日是ヲ  
塗テ峻効アリ又角膜及ビ臉ノ水棉様息肉ニ點メ  
速ニ消ス。○此精ハ諸金ヲ腐蝕スル故ニ木匙或ハ

硝子匙ヲ用フベシ叔揭福依  
瓦ガ老ラウ別ベリ里リ鹽ソ  
サルミラビリスガラウベリラ羅スワフ  
ルウルソノダ又ガラウベリラウソンドルソ  
ウト蘭

製法 鱒蓬鹽晶 一匕 水 八匕



右溶化シ緑礬精ヲ一滴宛加ヘ終ニ少シモ沸騰セザ  
 ルニ至テ瀘過シ文火ニ煮テ水氣ヲ蒸散シ試ニ其  
 液ヲ冷石上ニ滴メ結芒スル片ハ火ヲ下シ冷處ニ  
 於テ芒ヲ結バシム其芒即チ瓦老別里鹽ナリ是ヲ  
 取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ其餘ノ芒ヲ結バサ  
 ル液ハ前法ノ如ク煮テ冷處ニ置キ芒ヲ結バシム  
 ベシ按

**又法** 發烟海鹽精ヲ製メ後其列篤兒多ニ殘リタ  
 ル白キ凝固セル渣鹽ヲ取り適宜ニ水ヲ加テ溶化  
 ス是酸性多キ故ニ鹽蓬鹽晶ヲ少許宛加レバ沸騰

ス終ニ少シモ滾動セザルニ至テ紙ニテ瀘シ冷處ニ  
 置片ハ芒ヲ結ブ是ヲ取り貯フ此芒白色ニノ半透  
 亮味苦鹹是ニ水三倍ノ量ヲ加レバ溶化ス又氣ニ  
 觸テ消化シ盡ク粉末トナル按

○按ニ洋船齋來ル瓦老別里鹽ヲ見ルニ其氣  
 味形質漢舶來ノ芒硝ト毫モ異ナルナシ但其  
 製法ニ於テハ大同小異アレ其質ハ一ナリ猶  
 諳厄利斯瀉利鹽ハ元來越貌宋ノ泉ヲ煮テ製ス  
 ル者ナレ其或ハ海水ヲ煮テ製シ或ハ山ヨリ堀  
 取テ製スル者モ其氣味性功毫モ差ハルカ如シ



主治 性寒味苦鹹綠礬性ノ酸氣ト亞兒加利鹽ト結成セル中和鹽ナリ消石ニ比スレハ刺戟セズ其性孕礬酒石ノ如シ然レ少許用ヒテ瀉下シ又凝結ヲ溶解シ粘稠ヲ稀釋シ大小便ヲ利シ血液ノ沸騰ヲ降鎮シ焮熱ヲ涼解スル良藥トス一時毎ニ一刃宛用フ○間歇熱ノ壯熱ヲ涼解スルニ半時毎ニ半刃ヨリ一刃マデ用ヒテ良○少宛數用レバ凝結ヲ疏解スル功ヲ稱ス半刃ヨリ一刃マデ飲液ニ溶シ用レバ瀉下ス此物氣ニ觸レバ盡ク風化シ粉末トナル是レ其晶ノ質ヲ成ス所ノ水氣脫シテ氣中ノ濕ヲ

引クヲナク乾ケバナリ故ニ此粉末ハ瀉下ノ効多シ四錢許ヲ用ヒテ大ニ瀉下ス○外敷ノ腐敗ヲ遏ム寒壞疽ニ効アリ

甘海鹽精

「スピリタス・サリス・ドルシス・羅」  
「ステゲイスト・ハン・セソウト・蘭」

製法

海鹽 炒乾者 黑礬斯 澆匣ノ稱 黑礬ヲ繪 亞爾箇兒 燒酒條出 綠礬油 四刃

右鹽ト黑礬斯ト合和シ頸長キ硝子ノ列篤兒多ト入レ亞爾箇兒ト綠礬油ヲ合和ノ其列篤兒多ト加ヘ沙鍋ニ入レ承餾壘ヲ接シ其接際ヲ塗封シ慢火ニテ蒸餾シテ殆ト其液ノ三分ノ二ヲ取り硝子壘



ニ收メ固封シ貯フ 〔按〕

**主治**海鹽精ニ比スレバ性緩和ニノ酷烈ナラス又風化揮發ノ油氣ヲ含ニ酸美ニメヨク竄透シ技爾撒謨ノ質アル故ニ内服メ甘消石精及ビ海鹽ノ如クニシテ又甘和ノ効アリ○服量四滴ヨリ十二滴許。飲液ニ點服シ或ハ沙糖ヲ和シ舍利別ノ如クシ一弓ヲ用フ 〔叔〕 〔疾〕

葛私多兒羅 カストール ベーフル蘭

葛私多兒ハ水陸共ニ住ム一種ノ獸ナリ牝牡共ニ

陰處ノ兩側ニ四個ノ囊アリ 左右二個宛合ノ四個ナリ左右共ニ前部ノ

囊ヲ上囊ト名ケ後部ノ囊ヲ下囊ト名ク 其上囊二個ノ内ニ脂液アリ

是ヲ取テ藥用ニ充ツ是ヲ葛私多儂謨ト曰フ 此猶麝

ノ香アル如キ者ナリ其形狀主治次條ニ詳ナリ 此獸四大洲ノ諸地彼此ニ

産スレト殊ニ加拿達北亞墨利如止白里亞細亞洲 没斯箇未亞入爾馬尼亞波羅泥亞孛漏生

名ニ多シ軀長大約二三尺許。稀ニ四尺ニ及ブ者アリ 其圍略其長ニ稱フ。然ト肉肥厚ニメ軀短ク見ユ。

頭ハ大約圓ク喙長ク齒上下各十枚。互咬メ缺ノ如ク太ク鈷利ニメ力強シ是ヲ以テ樹ヲ倒シ或ハ斷



ツ。切齒ト齧齒ハ殊ニ太クノ銳利ナリ眼小ク黒シ  
 耳短ク圓クノ外面ハ毛被ヒ裏面ハ滑澤ナリ。脚短  
 ク前脚殊ニ短クノ五六寸ニ過<sup>ス</sup>キズ。後脚扁<sup>ヒラタ</sup>クノ鱗  
 被ヒ水鳥ノ脚ノ如シ五指アリ後脚ハ指間ニ膜ア  
 リテ連リ蹠<sup>ミツカキ</sup>ノ如シ故ニ後脚ト尾ヲ以テ能ク水ヲ  
 游<sup>アソ</sup>グ。前脚ハ五指皆離レテ膜ナク手ノ用ヲ爲シヨ  
 ク物ヲ把<sup>ト</sup>ル。獼猴ノ如シ筋肉厚ク勁硬ニメ力強  
 シ指端皆爪アリ斜ニ尖リ管ヲ爲<sup>ナシ</sup>テ翮ノ如シ尾ハ  
 扁圓ニメ長八九寸ヨリ一尺許アリ。其根濶四拇指  
 横徑許。中程ハ五拇指横徑許。厚一拇指横徑許。遍ク

鱗アリテ魚ノ如シ。每鱗形六稜。濶三四分許。厚クノ  
 革ノ如シ其隙ニ必<sup>シ</sup>ク小毛アリ故ニ喙ヨリ股マデ  
 ハ鼠ニ似タリ股ヨリ尾ニ至テハ殆<sup>ト</sup>水鳥ノ如シ  
 故ニ首ヨリ股マデハ味。獸肉ト同シ。後脚及ビ尾ハ  
 味。魚肉ノ如シ。總身ノ毛柔ニメ細ク栗殼色或ハ褐  
 色ニメ光澤アリ北方寒地ニ住ム者ハ色濃ク或ハ  
 黒シ。稀<sup>ヒ</sup>ニ灰白ナルアリ但<sup>シ</sup>其毛二様アリ一ハ長ク  
 ノ遍ク表面ニ見ユ大約一寸六七分許。首尾ニ至レ  
 バ漸ク短ク差<sup>ヤ</sup>硬<sup>コ</sup>シ脚ハ毛甚ダ短シ。一ハ其裏ニ在  
 テ短ク遍ク膚ニ著<sup>ツ</sup>キ長八分餘。毳ノ如ク甚ダ纖細



柔軟稠密ナリ脇腹ノ毛ハ最モ柔ニシ細シ是ヲ以テ多ク笠裘メリヤス莫大小等ニ造ル牝ハ四乳アリ孕テ四個月ニシテ産ス每産三四子ヲ生ス。畢丸甚ダ小ク腹腿合縫ノ凹處ニ在リ是ヲ展レバ殆ト狗ノ畢丸ノ如シ○此獸性温順ニシ馴易シ陸ニ在テハ樹實枝葉ヲ食ヒ河ニ在テハ魚鰕ノ類ヲ食フ又草木ノ枝葉ヲ取テ冬月ノ食物ニ備ヘ蓄ヘ且嚴寒ヲ防クガ爲ニ夏月大河湖澤ノ邊ニ洞穴ヲ穿ツテ五六尺許ニシテ其内ニ居室ヲ造リ出入ノ穴ヲ水中ニ通ス。或ハ河中ニ堤ヲ築テ水勢ヲ堰ギ其下流ノ岸ニ沿テ

厰ヲ造ルト甚ダ巧ニシ伎倆殆ト人工ニ異ナラズ乃チ此獸數百群リ集テ相共ニカヲ戮セ許多ノ樹ヲ嚙截リ挽キ來テ基趾ヲ設ケ大小ノ柱材ヲ以テ室ヲ構ヘ内ニ木ヲ格シ床ヲ造テ三層樓ノ如クシ其内ニ間隔ヲ作シテ各房ヲ設ケ其罅隙ハ悉ク樹枝ヲ挿シ堊ニ樹葉ヲ雜テ泥ト爲シ尾ニ載テ其隔壁及ビ外圍屋上ヲ打チ塗ルト數回ニシテ内外平滑堅牢ナル牆壁ヲ造リ全形圓ク或ハ卵圓ニシテ高サ三四尺許其洞穴中ニ在テ最モ大ナルハ丈餘ノ者アリ。内徑八尺或ハ一丈許其小ナルハ四五尺許アリ



リ此獸牝牡相共ニ各房ニ住ス厥小ナルハ五六個。厥大ナレバ三十個モ住ス其下層ニハ水ヲ瀦メ緑草樹枝ヲ浸シ蓄へ第二層ハ水際ニ接シ是ニ住テ常ニ其尾ト股脚ヲ水中ニ濡ス。否サレバ生活シ難シ若シ水高ク滿レバ第三層ニ住ム斯ノ如ク黨ヲ結ビ類ヲ集テ群居シ又其造築甚ダ堅固ニメ大雨洪水ト雖モ損壞セズト云 叔

○榕按ニ此獸 本邦所産未ダ詳ナラズ是坤輿外紀ニ載ル般第狗ナリ外紀ニ云歐羅巴洲意太理亞國有河名巴鐸入海河口産般第狗晝潛身於

水夜卧旱地毛色不一以黑爲貴能嚙樹木其利如刀又其般第狗ノ圖本編卷三十六ニ出ル葛私多兒獸ノ圖ト差異ナシ

葛私多樓謨 カストトシム ベールゲイル 蘭

葛私多兒獸 カストトシム 前條 出 ハ牝牡ニ横骨ノ下股間ニ四個ノ囊アリ大サ卵ノ如シ其二個ハ前部ニ在リ是ヲ上囊ト名ク所謂葛私多樓謨ヲ此ニ藏ム其餘二個ハ差後部ニ在リ是ヲ下囊ト名ク此ニ稠厚ノ液ヲ藏ム其氣葛私多樓謨ニ似テ性異ナリ○上囊ハ陰具ノ左右ニ傍テ相對峙シ囊底半規形ヲ爲シテ皮



上ニ隆起ス剖解ノ囊ヲ出セバ全形梨子ノ如シ其  
 獸ノ大小ニ隨テ囊亦大小アレ凡中等ノ者ハ長三  
 姆指横徑許。底ノ潤一姆指半横徑許。其本ニ循ヒ漸  
 ク細クメ一姆指横徑許トナリ直腸ニ連ル。下囊ハ  
 肛門ノ左右ニ傍テ相對峙シ皮内ニ在リ其部ノ皮  
 ヲ剥バ囊底見ユ長ニ姆指横徑許。底潤一姆指横徑  
 餘。其本漸ク細クメ直腸ニ連ル。上囊ハ三襲ノ膜  
 ヲ被フ。外膜ハ甚ダ硬固ナリ第二膜ハ厚ク柔ニメ  
 許多ノ脉絡循行ス。裏膜ハ襞積多ク是ヲ展レバ三  
 倍ノ長トナル。表面滑澤灰白色或ハ栗殼色及ビ帶

赭色ノ斑點アリ。裏面粗糙。細絡錯綜シ淡黄色ノ脂  
 液充ツ此液ノ乾固セル者即チ葛私多儂護ナリ味辛ニメ苦ヲ帶ビ臭  
 烈竄透其氣不佳ナリ此囊ヲ取り風乾スル一二月  
 許。或ハ是ヲ烟窻ニ掛レバ五六日ニメ乾固ス。上品  
 ハ囊大ク重ク栗殼色。諸膜乾固ノ破裂シ易ク裏膜  
 襞積アリテ厚ク革ノ如ク其液乾固疏脆ニメ破碎  
 シ易ク蜜及ビ蠟ヲ雜ヘ細膜ヲ以テ組織シタル者  
 ノ如シ桂色或ハ栗殼色ニメ黄ヲ帶ビ味辛苦甚ダ  
 竄透スル一種ノ臭氣アリ火ニ投スレバ炎ヲ發シ  
 臭氣殊ニ甚ダシ新鮮ナルハ稠固ニメ粘ラズ橙皮



色ニノ竄透ノ氣甚ダシ。販賣ノ者ハ炮リテ赭色トナリ乾固ニノ破碎シ易シ○此物止白里及ビ沒斯箇未亞<sup>出上</sup>ニ産ヲ上品トス其囊赤色ヲ帶ビ稍圓ク大ク重實ニノ硬固ナリ横斷スレバ裏赤赭色ニノ肝藏ノ色ノ如キ者充チ細膜筋條ノ組織セル如キモノニテ包裹シテ粉碎トナリ易シ然レ乾燥セズ北亞墨利加洲及ビ波羅泥亞<sup>ボロネア</sup>諸厄利亞<sup>エリヤ</sup>等ノ産ハ下品トス其囊充實セズ且濕リテ脂ノ如ク或ハ燥テ滋潤ナシ凡ソ此物久ヲ經テ黑ク且臭氣ナキハ藥用ニ充タズ○此物價貴キ故ニ偽品多シ或ハ

秤量<sup>カケメ</sup>ヲ増ガ爲ニ鉛錫等ノ丸ヲ囊中ニ挿ス者アリ是ヲ横斷スレバ其丸見ル或ハ撒瓦百奴<sup>サガベヌ</sup>謨<sup>ム</sup>臭氣<sup>ル</sup>アリ名ヲ雜ヘ其囊ニ充ル者アリ是ハ其臭氣ニテ知ルベシ凡ソ眞品ハ人工ニテ質造スベカラザル所ノ細膜ノ組織セル者其囊中ニアルヲ以テ鑒定スベシ或ハ特牛ノ鞞丸ノ包膜ヲ取り是ニ前説ノ物ヲ雜ヘ實チテ葛私多<sup>カストレム</sup>儂謨<sup>ム</sup>ノ全形ヲ偽造スル者アリ或ハ葛私多<sup>カストレム</sup>儂謨<sup>ム</sup>ニ蜜ヲ煉和シ其囊ニ充ル者アリ是ハ其囊ヲ押ス片ハ蜜ノ腐敗セル者迸出スルヲ以テ知ルベシ○下囊中ニハ淡黄色ニノ油ノ如ク



蜜ノ如キ稠厚ノ液アリ其氣微葛私多僂謨ニ似タ  
レ凡久ヲ經レバ凝結シ其質及ビ色モ獸類ノ脂膏  
ノ如シ故ニ藥用トセズ

**主治** 竄透油及ビ揮發鹽多シ頭腦神經ノ壅塞ヲ開  
キ痙攣搐掣ノ諸症ヲ鎮定スル聖藥トス。故ニ子宮  
衝逆風氣痞滯ノ諸症或ハ鬱憂病。癩等ノ諸症及ビ  
頭眩眩暈肢體顫振動ニ奇効ヲ奏ス或ハ纈草阿片  
等ヲ加テ尤効アリ○粘痰多キ喘息ヲ治ス或ハ嗽  
衝ナキ諸疝腹痛ニ是ヲ治疝ノ劑ニ加ヘ用テ驗ア  
リ○子宮病ヨリ發スル經閉ヲ通スルニ屢効アリ

末トシ半錢マデ數用フ然レモ尋常多ク是ヲ用ル  
能ハザル片ハ臭氣アル僂謨類阿魏 僂謨 安汶 亞  
幾 瓦爾 拔奴 謨等  
或ハ琥珀ノ製劑ヲ以テ代用スベシ○妊婦惡疽ニ  
効アリ但此症ハ甘消石精ヲ數日連服シテ亦同ク  
驗アリ○産後惡露ヲ下ス良藥トス○舌非言語蹇  
澁ニ末トシ舌下ニ塗テ効アリ○子宮衝逆及ビ痙  
攣其他前説ノ諸症ニ左ノ丁幾去爾奇効アリ

**鎮痙丁幾去爾**

葛私多僂謨カストレウム 阿魏アウイ 硃砂加燒酒精シウサカカウキウ  
右調勻シ硝子壘ニ入レ固封シ淹ス下六日其間數



其壘ヲ振蕩スベシ。服量十五滴ヨリ四十滴マデ日ニ數次。葡萄酒ニ點服ス。○此藥末トシ用ルニハ一匁ヨリ十匁或ハ半錢マテ沙糖ニ和シ或ハ散劑丸藥或ハ飲劑ニ和シ用フ。

葛私多儂謨カストロレウム丁幾去爾テイキテッセル羅

製法 葛私多儂謨 適宜

燒酒 二十五度者 八倍

右硝子壘ニ入レ淹スヒタス六日。布片ニテ瀝シ又紙ニテ瀝シ滓ヲ去リ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

主治 葛私多儂謨。主治ノ諸病ニ尤良。○卒倒癩瘵。子

宮衝逆ノ苦悶促迫ヲ速ニ解ス。○風氣痞滯ノ疝腹痛ニ甘消石精ヲ加ヘ用テ峻効アリ。○服量一二滴ヨリ五十滴ニ至ル。葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス。○子宮病等一切瘵瘵ノ諸症ニ阿芙蓉劑ヲ加ヘ用テ殊ニ良。左ノ方尤効アリ

葛私多儂謨鎮瘵飲

葛私多儂謨丁幾去爾 二錢 薄荷水 半匁

密涅刺爾鎮痛液 一錢 石膽 橙皮舍利別 一匁

舍電發謨阿芙蓉液 四十滴

右調和シ四分時ニ一匙宛用ヒ其症治ノ後仍半時



ニ一匙宛用フ○葛私多カストレウム儂レウム儂レウム丁幾去爾テインキテウル得難キ片ハ琥珀丁幾去爾テインキテウル或ハ阿魏丁幾去爾テインキテウル少許ヲ以テ代用スルモ亦効アリ叔依

○按ニ葛私多儂儂丁幾去爾カストレウム缺ル片ハ左ノ方ヲ代用スベシ

纈草丁幾去爾

亞爾箇兒ソルコホル十六号十六号燒酒ノ條ニ出ツ

纈草根三号粗末

右硝子壘ニ内レ浸シ其色出ルニ至テ絞リ濾テ滓ヲ去リ又纈草根ノ細末三号ヲ其液ニ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ絞リ濾シ靜定メ其渣ヲ去リ此液

ハ号ニ亞的兒アデル綠レ馨ノ條ニ出三号ヲ調和シ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ○服量二十滴ヨリ四十滴マデ時々葡萄酒ニ點服ス

**主治**此丁幾去爾ハ神經ノ知覺鈍クナリ或ハ其運營錯誤スル症假令神經熱子宮病ノ諸症等ニ奇効アリ凡葛私多儂儂或ハ麝香ヲ用ベキ諸症ニ皆甚ダ驗アリ或ハ薄弱ニメ感動シ易キ人ハ葛私多儂儂及ビ麝香纈草根ノ氣ニ堪ズノ嫌惡ムトアル片ハ此劑ヲ代用メ同ク良効ヲ奏ス或瘧疾ノ諸症甚キ者ハ阿芙蓉液ヲ加ヘ用ベシ依



家猪脂淨製法  
 ゲソイフルデハルケンス。レウセル蘭  
 家猪脂。適宜ニ取り膜ヲ去り細ニ截り水ニテ數回  
 洗テ其水清澄トナルニ至リ清キ鐵罐ニ入。微火ニ  
 上テ溶化セシメ木匙ニテ攪セ温ニ乘メ布片ニテ  
 絞リ瀝シ磁壺ニ入貯フ。○諸獸脂。淨製法皆是ニ同  
 シ。主治 軟化緩和シ疼痛ヲ止メ凝結ヲ溶解ス。  
按 戻

遠西醫方名物考卷八終



