

遠西醫方名物考

計 末
上 下

卷十一

十武
857
45-11

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 9 第
册 11 第



門 武 9
號 857
卷 45-11

京都府立総合資料館蔵

遠西醫方名物考標目

卷十一

滿那

麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア過^ア爾^ル拔^バ

驅^ク風^フ消^{シヨウ}毒^{トク}飲^{イン} 制^{セイ}酸^{サン}消^{シヨウ}毒^{トク}飲^{イン}

煨^{ウイ}製^{セイ}麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア

末^マ兒^ル叔^{シヨウ}尼^ニ斯^ス散

末^マ爾^ル扶^フ斯^ス鎮^{チン}痛^{トウ}液^{エキ} 條^{ジョウ}鐵^{テツ}

計 齏蓬鹽

齏蓬鹽晶

大正十年九月廿四日
内田糸子氏贈

天正堂蔵

遠西名物考

卷十一

標目

天正堂蔵

結麗土

精製結麗土

血石

桂精。桂露

六二增訂和蘭藥鏡ニ出

桂丁幾去爾

桂舍利別

健質亞那越幾斯劑

健質亞那

健質亞那丁幾去爾

結爾茂斯

結爾茂斯舍利別

見篤散

結爾茂斯密涅刺列

安質沒扭

遠西醫方名物考卷十一

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

滿那羅

マンナカラブリナ

滿那加辣豹利亞齊西亞亞彪綾

ニ多ク産スル一種ノ苦櫪木皮ノ幹枝及ビ葉ヨリ

滲出スル白蜜ノ如キ脂液ナリ或云細蟲アリテ其

液ナリト其樹尋常ノ苦櫪木ニ比スレバ幹枝葉

共ニ小ク花ニ瓣アリ花後萌ヲ結ビ内ニ仁アリ是

ヲ滿那樹ト名ク○滿那三種アリ第一種ハ夏月酷



暑ノ頃自然ニ流溢シ清白或ハ帶黃色透亮ノ淚珠
 トナリ炎熱ニテ一日ノ間ニ乾キ凝結ノ顆粒ヲ爲
 シ枝葉ニ懸ル。コレ最上品ニノ稀ナリ○第二種ハ
 形長ク指ノ如ク凝結シ長一二拵指横徑潤一拵指
 横徑許。鮮美純潔輕白ニメ微赤色ヲ帶ブ是ハ其樹
 ヲ鑽刻シ是ニ蘆管ヲ刺テ其流出スル脂ヲ取ル者
 ナリ。故ニ長クノ管ノ狀ヲ爲ス是ヲ滿那カキ加涅兒カキ刺
 答ト名ク蘆管滿那ノ義○第三種ハ秋末暑氣減シ其脂流
 溢セザルユエニ土人其樹幹ヲ鑽刻メ流出セルヲ
 集メ乾固シテ凝塊ト爲ス者ナリ第一種ニ比スレ

バ黃色ヲ帶ブ。淨潔ナル者或ハ不潔ナル者アリテ
 一様ナラズ是レ尋常ノ加辣カキ狼利亞カキ滿那ナリ。其最
 モ純潔ナルヲ滿那カキ越列屈答ト名ク越列屈答ハ上品ヲ擇ムノ義
 其純潔ナラザル品ハ水ニ溶シトカ瀝テ汚物ヲ去ル火
 ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ蜜ノ稠ト爲シ磁壺ニ入キ木筋
 數多投シ置ケバ是ニ凝結メ淨潔トナルナリ○上
 品ハ新鮮透亮白色或ハ淡黃或ハ赤色ヲ帶ビ乾テ
 輕ク柔ニメ脂ノ如ク淨潔ニメ汚物ヲ雜ヘズ。顆粒
 或ハ大小ノ碎塊ヲ成シ性味沙糖或ハ白蜜ノ如ク
 甘美ニメ辛ヲ帶ビ稍粘リ盡ク口中ニ溶化シ殆ド

香臭ナシ○其質ハ沙糖様ニメ粘液ヲ含メリ。故ニ其淨潔ノ者ハヨク燒酒及ヒ水ニ溶化ス○此物極テ鮮麗瑩白ニメ水晶ノ如キハ瀉下ノ効微ナシ粘氣アル者其効却テ勝レリ或ハ淡赤。栗壳色。淨潔ナラズ或ハ流動ノ蜜ノ如クナルハ皆藥用トセズ○或ハ粉麩ヲ加ヘ或ハ沙糖ヲ和シ煮テ偽造スル者アリ是ハ純ラ沙糖ノ味アルヲ以テ知ルベシ○或ハ蜜。沙糖汁等ニ旃那葉。蘇甘沒。扭。謨ヲ加テ是ヲ偽造スル者アリ此ハ眞品ニ比スレバ瀉下ノ効烈シ宜ク仔細ニ擇ミ用ベシ○落葉松。松。榧。榲。杜松。阿利

襪等ヨリモ亦滿那類ノ脂液出ルアリ或ハ楓樹ヨリ出ル液ヲ煎熬ノ一種ノ滿那ヲ製スト云○或ハオーステルセ。マンナ東方滿那ノ義ト稱スル品アリ此ハ百兒西亞及比亞刺比亞共ニ亞細亞洲ノ國名ニ産ス是ニ二種アリ一ハ蜜ノ如ク流動ス。一ハ凝固ス然レバ多クハ前ニ説ク品ヲ藥用トス

○榕按ニ滿那ハ漢人所謂甘露。刺蜜。雀餉ノ類ナリ。和蘭ニ是ヲヘメルダウト名ク。天露ノ義ナリ又ホーニフダウト名ク。蜜露ノ義ナリ。滿那ハ日用糧食ノ義ナリ。其説ニ云昔人意ラク天。幽。裔。荒地

ノ民ヲ愍テ甘露ヲ此樹ニ降シ餓殍ノ感ナカラシム○職方外紀曰度爾格國有樹如橡栗夜露墜其上即疑爲蜜晨取食之極甘美萬寶全書大食勿斯國條云其國秋露降日曝之即成糖霜食之清涼甘美コレ亦一種ノ滿那ナリ○此物和產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ

主治酸味ノ鹽油水及微土氣アリ留飲沕乙敗黑膽液ヲ瀉下ス緩下ノ藥トス故ニ小兒ノ下劑ニ尤良○肺ノ諸症ニ用テ胸ヲ利シ肺ヲ潤シ粘痰ヲ豁シ胸痛喘急經久ノ傷冷毒胃欬重訂內科撰要第百七十七章ニ出等ヲ

治ス是潤滑甘和ノ質ヲ以テ酷厲液ヲ消シ大便ヲ利スレバナリ或ハ大黃ヲ加飲液ニ和シ用テ胸中痰飲ヲ疏滌ス○熱病ニ用テ潤下ノ効ヲ稱ス○產婦或ハ壯熱熾衝病等ノ輕ク大便ヲ通利スベク峻下劑ヲ用難キ症ニ的當トス○小兒呼吸不利胸中苦悶促迫スル者ハ海葱蜜ヲ加用テ粘痰ヲ驅除シ治ス○勞效等虛羸ノ病輕キ下劑ヲ用ベキ者ハ滿那最良トスヨク肺ヲ甘和ノ大便ヲ通スレバナリ○服量小兒五歲以下ハ一錢ヨリ四錢マテ適宜ノ飲液或ハ大麥煎或ハ乳汁ニテ用大人ハ二錢ヨ

リニ弓或ハ三弓マデ水ニ溶シ用ヒ或ハ下劑ニ加
 用フ○過服スレバ酸敗液或ハ風氣ヲ生ノ胸腹痞
 満ス斯ノ如キ者ハ苦味香竈ノ藥品ヲ加ヘ用ベシ
 ○體質薄弱ニノ感觸シ易キ者は是ヲ過服スレバ腹
 痛ヲ發シ或ハ胃腸ニ風氣ヲ生スルアリ故ニ常
 ニ多ク用ルニハ他藥ニ加ベシ或ハ味惡キ下劑ニ
 加テ甘美ト爲スニ用フ○滿那ヲ蒸餾スレバ味辛
 微酸ナル清液出ヅ此液發汗ノ効アリ又惡性熱自
 餘熱病ニ用テ汗ヲ發シ熱ヲ解ス服量半錢ヨリ一
 錢ニ至ル

馱(伍)底(福) 斐(依)福

麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア遏^エ爾^ル拔^バ 羅

ウツテマグ子シア又ゴ
 ルシラレダテルアルデ蘭

製法

諸厄利斯瀉利鹽 四比

剥篤亞斯 精製者 二比

右瀉利鹽ニ雨水ノ沸湯三比ヲ加テヨク溶シ濾過
 ヲ汁ヲ取り次ニ剥篤亞斯ニ雨水ノ沸湯一比半ヲ
 加テ溶シ濾テ汁ヲ取り右兩個ノ灰汁仍熱セルヲ
 合シ磁壺ニ入レ又沸湯八比ヲ取テ是ニ加ヘ火ニ
 上セ煮ル丁四分時ニ是ヲ綴布上ニ傾ケ寫シ其
 布ニ留ル瀉利鹽ニ數沸湯ヲ注キ透漏セシメテ洗

淨シ其鹽毫モ味ナキニ至テ取り出シ夏月ハ日乾
シ或ハ文火ニテ乾シ白色ノ鹽ト爲シ貯フ

又法

諸厄利斯瀉利鹽

四北

水 四十北

右瀉利鹽ヲ水ニ溶シ紙ニテ濾シ精製剥篤亞斯ヲ
取り適宜ニ水ヲ加テ溶シ紙ニテ濾シ此灰汁ヲ以
テ一滴宛右ノ鹽汁ニ滴スレバ毎滴乳汁ノ如クナ
リテ其底ニ沈ニ雪白色トナル。斯ノ如ク數滴ノ終
ニ必モ乳白色トナラズ沈マザルニ至テ此液ヲ火
ニ上セテ煮沸セシメ。其間ヨク攪セ火ヲ下シ微冷

ルニ至テ是ヲ細絹ニテ濾ス片ハ雪白色ノ麻屈涅
失亞其絹上ニ留ルナリ。此ヲ取り數水ニテ洗ヒ必
モ味ナキニ至テ乾シ硝子壘ニ入レ貯フ。上好ノ品
ハ皆右ノ二法ヲ以テ製ス。○古昔ハ多ク消石ヲ
以テ是ヲ製ス。今ハ用ルヲ稀ナリ其法。消石ヲ製造
スル時。消石ヲ結芒セシメテ後其芒ヲ結バザル苦
辛粘稠ノ汁ヲ取り濾過シ徐々ニ煮テ水氣ヲ乾シ
鹽ト爲シ是ヲ坩鍋ニ入煨過メ白色トナルニ至リ
水ニテ洗ヒ絶テ味ナキニ至リ乾シ貯フ或ハ扑硝
ヲ水ニ溶シ煮テ膜ヲ生スルニ至リ故冷メ芒ヲ結

バシメテ上好ノ消石ヲ取り其刺汁ヲ前法ノ如ク
 煮テ結芒セシムルヲ數回ニシテ少シモ芒ヲ結バザル
 汁ヲ取り。煮テ水氣ヲ乾シ煨過シ洗テ味ナキニ至
 リ乾シ貯フ。○或ハ結麗土等ノ石灰質ノ土ヲ以
 テ偽造スル者アリ宜ク仔細ニ擇ニ偽品ヲ用ル
 勿レ。石灰ヲ加ヘ偽ル者ハ其量重シ。眞品ハ秤量甚
 ダ輕シ。眞品一匁ト偽品二匁ト其多ク相等シ又眞
 品ハ甚ダ清潔ニシテ雪白色ナリ。○酸味ノ液殊ニ稀
 キ綠礬精ニ是ヲ加レバ盡ク速ニ溶化シ苦味ノ液
 トナル。是ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ稠厚ト爲シ冷

處ニ置ケバ酸性苦味ノ芒ヲ結テ復諸厄利斯瀉利
 鹽トナルナリ。其苦味ノ液及ビ芒晶ハ微利ノ効ア
 リテ小兒産婦虛人ノ大便閉ニ用フ若シ此物ニ石
 灰質ノ土ヲ雜ルカ或ハ其土ニテ偽造スル品ハ右
 ノ酸液ニ加レテ速ニ溶化シ難ク或ハ絶テ溶化セ
 ズ。雲母ノ如クナリテ底ニ沈ムナリ

主治

此藥ハ一種ノ中和鹽ナリ。酸敗液ヲ消刺スル
 一良藥トス。土質ノ品ナレバ微大便ヲ利スル故ニ
 胃ニ停滞セズ閉塞ノ害ナク大便閉ノ症ニ用テ妨
 ゲズ速ニ制酸ノ良効ヲ奏シ凝結ヲ疏解シ依剥昆

堉兒神思鬱憂病共ニ重訂内科撰要脾病ヲ治ス凡
質ノ藥ハ水液濕氣ヲ吸收シ殊ニ酸敗液ヲ剋制ス
ルヲ主能トス故ニ性收瀦ノ胃腸ニ壅滯シ閉塞ス
ル害アリ石灰様ノ土質ノ如利鹽ト相和シタル中和
鹽ノ酸性ト土質ノ亞兒加利鹽ト相和シタル中和
鹽ナル故ニ是ヲ服スレバ胃中ノ酸液ト抱合メ又
一種ノ中和鹽トナリ輕キ瀉利ノ効ヲ爲ス故ニ土
質ノ藥ナレバ胃ニ壅滯
セズ閉塞スルヲナシ
 病ヲ生スル故ニ小兒諸病ニ多ク良驗ヲ稱ス○每
 服半錢ヨリ一錢ニ至ル小兒ハ二匁ヨリ十匁ニ至
 ル大人ハ半錢ニ砂糖。大黃。橙皮。茴香ヲ加ヘ用テ良
 ○是ヲ酸味ノ液ニ和シ用レバ胃ノ痙攣及ビ逆行
 ノ運動ヲ鎮メ嘔吐ヲ止ム左ノ方劇キ嘔吐ヲ止メ

大便ヲ微利スルニ奇効アリ

麻屈涅失亞鎮嘔飲

麻屈涅失亞過爾拔

枸櫞汁 各適宜

右麻屈涅失亞ヲ取テ少許宛枸櫞汁ニ加ヘ必モ滾
 動セザルヲ度トシ其液ヲ取り硝子壺ニ内レ固封
 シ貯フ○麻屈涅失亞過爾拔ハ小兒酸敗液ノ腹痛
 ニ殊効アリ香味ナクノ服シ易ク他ノ制酸土質ノ
 品ノ如ク澁滯セズ宜ク此未ヲ飲液ニ加テ少許宛
 數用フベシ或ハ左ノ方尤効アリ

制酸消毒飲

麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア過^オ爾^ル技^バ末^マ二^ニ錢

石^シ鹼^{ケン} 勿^カ擗^ヘ祭^ナ亞^ア者^者 半^半夕^夕

薄荷^{ボウカ}舍利^{セリ}別^別 三^三錢

苗^{メウ}香^{カウ}水^{スイ} 三^三勺

右調和シ一時每ニ一^ゴ琶^バ布^フ匙^チヲ用^ユフ。若^モシ大便通セ
ザル者ハ大黃末四五^ハ勺ヲ加^カフベシ大便ヨク通利
スレ^レモ腹痛休^マザル者ハ薄荷舍利別ト大黃ヲ除
テ白罌粟舍利別三錢ヲ攪和シ用^ユフベシ○酸敗液
及^ビ風氣痞滯ヨリ發スル腹痛ハ左ノ方亦屢捷効

アリ

驅風消毒散

麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア過^オ爾^ル技^バ

沙糖

苗^{メウ}香^{カウ} 各^各二^二錢

右散劑トシ半時每ニ一^ゴ叩^ク匙^チ宛^ズ適^ダ宜^イノ飲液ニテ送
下^ス斯^スノ如^クキ散劑ハ小兒勞瘵樣ニ羸瘦シ全軀ノ
榮養虧損シ頻リニ饑テ食シ腹肚膨脹シ酸敗液ノ
症ヲ兼ル者ニ用ヒテ大効アリ。此症ニ搗掣ヲ兼ル
片ハ阿芙蓉或ハ麝香ヲ加^カフベシ右ノ消毒飲ハ小

兒ノ胸熱效嗽痰喘等 胃寒熱。生齒熱。或ハ善性ノ痘瘡麻疹。赤斑熱等ニ良驗アリ。若シ是ニ清涼ノ効ヲ要シ或ハ大便ヲ利セント欲スル者ハ左ノ方。的効アリ

默栗薩滿那飲

默栗薩水 一弓

滿那 六錢

消石 一日

麻屈涅失亞マグ子シア。ヒウラ。ウスタ。又マグ子シア。カルシナタ。羅 過爾拔 四日

右研和シ頻々ニ一茶匙ヲ用フ 依 福

煨製麻屈涅失亞

製法

麻屈涅失亞マグ子シア。ヒウラ。ウスタ。又マグ子シア。カルシナタ。羅 過爾拔ヲ適宜ニ取り坩鍋ニ入レ密ニ蓋ヲ覆ヒ炭及ビ灰ノ入ルヲ防キ火ニ上セ。坩熾紅トナリテ後一時許ヲ經テ火ヲ下シ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ但レ其初メ漸々ニ火ヲ加ヘ坩ヲノ熱セシメ通紅トナスベシ初メヨリ烈火ニテ煨片ハ此藥力脱ノ諸液ニ溶化スベカラザル渣塊トナリ或ハ煨燒其度ニ過レバ侵蝕スベキ酷厲毒トナリ是ヲ服ノ害アレバナリ。故ニ煨製セザルヲ切實トス○ヨク煨過スル者ハ是ヲ酸味ノ液ニ加

テ毫モ沸騰セズ是ヲ醋ニ加ルニ火ニ上セ温ムルニ非レバ融化セズ若シ是ヲ醋ニ加テ稍滾動スルキハ再ビ煨過スベシ○石灰質ノ土ヲ雜テ偽造スル者ヲ煨過スレバ其性更ニ酷厲トナリテ侵蝕ス故ニ是ヲ用ヒテ大害アリ

主治 是ヲ煨燒スレバ其含ム所ノ酸性ヲ脱除シ純ラ亞兒加利性トナル故ニ胃腸ノ酸敗液ヲ除クノ効甚ダ峻ナリ然レ下利ノ効ナシ凡ソ石灰質ノ土ハ速ニ酸敗液ト混和セザル故ニ自ラ侵蝕スベキ酷厲毒ヲ生ス但此藥ハ煨過ノ酸性ヲ脱除スルノ

ニナレバ侵蝕毒トナルヲナク制酸ノ効ヲ成スナ

ii 亞拔 福依

末兒叔尼斯散 マルヒス・マルニシス・マルロクガネヘン・アドル蘭

製法 芍藥根

白鮮皮

柵寄生

鹿角

眞珠母 名三三

蜚蛄石 或ハ石梅ヲ用フ

右各別細末トシ調勻ノ散劑トス

主治 癩瘡播掣等凡ソ神經ノ諸症ニ奇効アリ每服
十匁ヨリ十四匁ニ至ル **辰** **揭**

計

齋蓬鹽

ザルアルカリ羅
ゾーダ蘭

製法

齋蓬

和名「ハママツ」
ナ「又マツナ」

溝ヲ造リ上ヲ狭クシ内ヲ潤クシ此草ヲ填テ燒テ
通紅トナルヲ候ヒ其溝ヲ益封ス是ニ由テ火氣耗
散セズ其灰ニ鹽氣多ク含蓄ノ凝固シ冷レバ堅ク
ノ石ノ如シ槌ニテ打碎キ取り出スベシ○上品ハ
乾固灰白ニメ青色若クハ赤色ヲ帶ビ光澤アリ又
黯色及ビ白色ニメ大小齊シカラザル鍼眼藏黥ア
リ。手ニ取テ重ク打テ響アリ。惡臭ナク舌ニ觸テ辛
鹹滲透シ齶テ聲アリ○是ヲ刺篤亞斯ニ比スレバ

酸性ヲ含ムト多クノ性緩ナリヨク芒晶ヲ結ビ氣ニ觸レバ粉碎トナル

主治 是レ一種ノ亞兒加利鹽ニシテ大抵剎篤亞斯ト同シ製煉術及ビ精好ノ硝子ヲ造ルニ用フ○此鹽ヲ水ニ溶シ濾テ火ニ上セ煮乾メ固鹽ト爲セバ性尤^モ酷烈ニシテ腐藥及ビ打膿法ヲ施スニ用フ又衣服ノ脂垢ヲ除クニ尤^モ良凡ソ亞兒加利鹽ハ油氣アル者ヲヨク溶解スレバナリ○此鹽及剎篤亞斯ニ生石灰ヲ和スレバ其含メル所ノ酸性ヲ脫除メ極テ酷烈ナル亞兒加利鹽トナル 〔辰〕〔辰〕〔辰〕

蘇蓬鹽晶

「キリスタルリノイダ又サルノイダ又ソイダデ
ピラタタノイダキリスタルレン又ゲノイ
フルデデルフストツスレイキログソウト
又「ログソウチヘコイルタレノイダ」蘭

製法 蘇蓬鹽 適宜

右極細末トシ鐵壺ニ内レ水適宜ニ加ヘ煮ルト良久フノ其鹽氣ヲ融解セシメ水減耗スレハ數^ニ加ヘ水氣ヲ蒸散メ稠厚ト爲シ温ニ乘メ濾過シ其液ヲ冷處ニ置^ク片ハ晶ヲ結フ其晶ヲ取り餘殘ノ液ヲ煮ルト前法ノ如クシ芒ヲ結バシム斯ノ如ク數回ノ其液終ニ芒ヲ結バガルニ至リ其芒ヲ集メ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ 〔辰〕

又法 鹹蓬鹽 三比

水 十二比

右鹹蓬鹽ヲ坩ニ内レ火ニ上セ煨テ硫黃ノ蒸氣消
スルニ至リ水ニ溶シ煮テ紙ニテ濾シ其渣ニ又水
六比ヲ和シ煮テ盡ク溶化セシメ紙ニテ濾シ前ノ
液ト合メ又濾過シ暫ク煮テ放冷シ芒ヲ結バシメ
其餘ノ芒ヲ結バザル液モ亦煮テ前法ノ如ク結芒
セシメ終ニ少シモ芒ヲ結バザルニ至リ其芒ヲ取り
貯フ其餘ノ汁ハ煮乾シ白色ノ鹽トナルニ至リ右
ノ芒ト共ニ收メ貯ヘ用フ

亞 國

主治 是鹹蓬鹽ノ純精淨潔ナル者ナリ剥篤亞斯ニ
比スレバ性緩ニノ良効ヲ稱ス○石淋ヲ治スルニ
多ク用フ○蠟壳勿搗祭亞石鹼ヲ加ヘ丸トシ毎日
二錢或ハ三錢マデ用テ酸敗液ノ諸症ニ尤良

國 國

結麗土 蘭 ケレタアルバ羅

○榕按ニ是レ豐後土或ハ白繪土間ノ稱ト呼ブ
者天造ノ結麗土ナリ風化石灰ハ人工ノ結麗土
ナリ西洋說ニ云結麗土ハ能ク火ニ堪ヘ烈火ニ
投メ燒ケ其色少シモ變セズ灰トナラズ消化

セズト。蘭山本草啓蒙ニ云。茶碗ノ白藥ニハ豊後
玖珠郡ノ白土ヲ用フ。燒テ白色變セズト是ナリ。
先輩是ヲ白堊ニ充レ凡堊ハ磨沙ト稱シ且磁器
ノ坏ト爲ス者ニノ和蘭ニホルセルインイルト
ト云陶土ノ義ナリ。其
性結麗土ト異ナリ
結麗土ハ石灰質ノ白土ニノ其形鉛粉ト同シ。其質
精細ニノ輕ク乾キテ脆ク磨碎スベク。ヨク水ヲ吸
收シ沙様ナラズ粘氣アリ指ニ著テ剥易ク味毫モ
收瀋セズ燒テ性色變セズ消散セズ。灰トナラス。消
石精ニ加バ盡ク溶化シ或ハ醋ニ加レバ沸騰ス。故
ニ亞兒加利性ノ土トス。是ニ硫黃精若クハ綠礬精

ヲ和スレバ水ニ溶難キ一種ノ鹽トナル是ヲ硫酸
加爾幾ノ膏ト云燒テ白粉ト爲シ水ヲ和ノ膠泥ニ
用フ○往古此土結麗太島歐羅巴洲ニ屬スニ産ス。故ニ結
麗土ト名ク。今ハ歐羅巴洲ノ諸國ニ出ツ○此物白
色ノ畫料書記及ビ器械牆壁ヲ塗ルニ用ヒ又醫藥
ニ供ス○藥用トスルニハ是ヲ精製ノ汚物ヲ去リ
用フ
精製結麗土 結麗土ヲ取り極細末トシ磁器ニ入
多ク水ヲ加ヘ木棍ニテヨク搗リ和シ暫ク靜定ノ
後徐々ニ其上面ニ浮ム乳白色ノ液ヲ他ノ器ニ傾

ケ寫シ其渣滓ニ又水ヲ加ヘ攪滾ノ前法ノ如ク其水ヲ傾ケ寫シ斯ノ如ク數回シテ其水乳白色トナラザルニ至リ其水ヲ集メ合シ靜定ノ其渣ヲ取リ又緻布ニテ其水ヲ濾テ布上ニ留ル粉ヲ取リ共ニ磁盃ニ入レ日乾シ研末トシ貯フ

主治 結麗土ハ自然ノ風化石灰ニノ性功亦同シ酸敗液ヲ剋制緩和シ且吸收ノ濕ヲ乾ス効アリ故ニ胃中ノ酸敗液ヨリ發スル諸症吞酸嘈雜胸腹刺痛等ヲ治シ或ハ肺血效略下血諸失血ニ効ヲ奏シ蟲ヲ殺ス或ハ甘和ノ効アル舍利別白罌粟舍利別過爾訖亞舍利別等

云ニ加ヘ或ハ一味用ヒテ酷厲ナル粘液肺ヲ刺戟ノ發スル劇キ痰效等ノ胸病ニ驗アリ○下利ニ疝痛ヲ兼子或ハ酸敗液ヲ兼ル症ハ此物ニ驅風ノ藥ヲ加ヘ用ヒテ効アリ○凡ソ亞兒加利性ノ土ハ酸敗液ヲ消化スルノミナラズ又酷厲ナル粘液ノ衝動刺戟スルヲ甘和ノ抑制スル効アリ○服量一月ヨリ一錢ニ至ル或ハ此末六弓ニ水三比ヲ攪和シ煮テ三分ノ一ヲ減シ靜定ノ上清ヲ取り濾過スレバ乳汁ノ如シ是ニ舍利別ヲ和シ服ノ良○但土質ノ藥ハ澁滯ノ閉塞スルユエニ少許宛用フベシ過

服スレバ胃腸ヲ閉塞ノ食ヲ妨ゲ或ハ疝痛ヲ發シ
或ハ便閉ヲ患ルコトアリ故ニ上ニ説ク如ク製シ用
ヒ或ハ火シク下劑ヲ加テ大便閉ヲ防ギ或ハ健胃香
竈ノ藥ヲ加ヘ用フベシ假令タトヘハ肉豆蔻。山柰。薑等ノ
未ヲ加ルガ如シ是亦酸敗液ヨリ起ル胸腹ノ諸症
ニ甚ダ驗アリ○甲介ノ類即チ蠟壳。雞卵壳。蜆壳石。
等ハ皆石灰質ノ土ト生族ノ粘液質トヲ含テ制酸
ノ効アル故ニ粘質少キ結麗土ニ比スレバ尤モ切實
ニノ害ナシトス○外敷ノ焮赤腫痛ヲ消シ酷厲毒
ヲ祛ムク故ニ創傷潰瘍ノ汚液出ルコト多キ症或ハ瘡

中水棉樣ノ贅肉ヲ乾シ癰瘡ヲ愈シ或ハ一切皮上
ノ焮赤小胞及ビ汗漏泄スル症或ハ乳頭坼裂ニ此
末ヲ摻マケ或ハ乾カス藥ニ加ヘ施メ良効アリ
依伍

血石 譯名 ハーマチテス羅 ブルドステーン蘭

此石ハ礦石ノ如ク堅固ニ破碎シ難ク重クオモ稜アリ
ル長キ塊片ヲ爲シ黯赭色ニ微黑色ノ條理アリ
或ハ黄色ヲ上品ハ條理分明ニ破碎スレバ鮮美
帶ルアリノ束織紋ヲ爲シ朱砂ノ色アリ
此品藥舖ニ研末ス
レバ血色ヲ爲シ或ハ水ヲ加ヘ礪ニテ磨スレバ其

汁血ノ如シ故ニ血石ト名ク或ハ止血ノ功ア或ハ
 此石稀ニ葡萄狀ヲ爲シ或ハ腸ノ廻疊スル狀ノ者
 アリ此品藥舖ニ代赭石樣ト呼ブ○此石伊斯把尼
亞獨乙都語厄利亞共ニ歐羅巴ノ鐵坑ニ出ヅ或ハ
 絶ラ此石ノ之出ル坑アリ此坑ニ赤石及ビ赤土ア
 リ或ハ金剛鑽ノ出ル坑ニ血石出ヅ此二物共ニ鐵
 坑ニ出ル故ニ其性甚ダ鐵ニ近ク其質モ亦鐵礦ノ
 一種トス或云血石ハ許多ノ鐵ト少許ノ即チ血石
 ヲ製煉スレバ上好ノ鐵ヲ成シ或ハ是ヲ酸味ノ液
 ニ浸セバ溶化スルヲ鐵ノ如ク或ハ是ヲ綠礬油ニ

溶セバ撒兒末爾トナル鐵ト同シ
 又血石ヲ炭ニ載セ是ヲ火燧鏡ニテ燒クハ忽チ
 變ノ鐵トナルヲ以テ知ルベシ○此石伊斯把尼亞
 ノ産ヲ上好トス束鍼紋鮮美ニ汚物ヲ雜ヘズ堅
 固ナレバナリ○此石種類多シ故ニ是ヲ以テ血石
 ヲ偽造スルヲアリ○此一種シキスト名ル石
 アリ其塊片尖利ニ堅剛ナラズ割面平等ナリ血
 石ハ其稜鈍ニ割面昂低アリ堅固ニ割裂シ易
 カラズ束鍼紋貫通シ其條理ニ循ヒ割裂ス○一種
 ブリュインステーン赭石ノ義ニ即チ下品ノ代赭石
 ナリ畫家ニゴトルト呼ブ者是レニ

近ト名ル石アリ此亦血石ニ比スレバ堅固ナラズ
 ○假血石ト名ル石アリ其色全ク血石ト同シ然レ
 軟脆ニノ小刀ニテ割截シ易シ畫家木匠等ノ摸像
 記痕ヲ爲スニ用フ是レ赤結麗土書記結麗土石筆
 云或ハブルドアルドノ義ト名クベキ者ニノ赤石
 筆ノ類ナリ斯ノ如キ類多シト雖モ血石ニ比スレ
 バ堅固ナラズ又束鍼紋ナキヲ以テ分晰スベシ然
 凡其性功ニ於テハ大約血石ニ似タリ
 [主治] 性收瀋閉澁シ乾燥ス諸失血吐血ヲ止ルニ速
 効アリ○白帶下下利萎黃病經閉ヲ治スルヲ格碌

屈私未爾扶斯鐵ノ條ニ出ツト同シ○服量極細末トシ十
 五氏ヨリ一錢マデ適宜ノ飲液ニ點服ス○燒酒ニ
 浸シ丁幾去爾テタルト爲シ用ヒテ吐血尿血肺血衄血ニ
 効ヲ稱ス○外敷メ潰瘍ヲ乾愈ス是ニ肉豆蔻油少
 許ヲ研和シ創ニ塗テ愈ユ搗伍疾

桂テシキ丁幾去爾テタル

[製法]

桂 剉搗者
 燒酒 二十度者
 右硝子燬ニ内レ固封シ淹スヒク六日。漚コシテ滓ヲ去リ

風雲堂藏

固封シ貯フ 〔按〕

主治 衰弱ヲ強壯シ精神ヲ爽快シ諸失血下利脱泄等ヲ閉止スルノ良効アリ是ヲ單用シ或ハ對症ノ劑ニ加ヘ用フ○服量十二滴ヨリ三十滴マデ葡萄酒ニ加ヘ用ル七日三四次○桂露ニ比スレハ苦味アリテ收瀉ノ功多シ 〔依〕

桂。舍利別

製法

桂 極細末 四分
水 一北

右硝子壤ニ内レ固封シ淹ス_ト三日。布片ニテ絞リ

漚シ其液ヲ靜定ノ渣ヲ去リ左ノ藥ヲ加フ

桂露 一北半
砂糖 淨白者 三北

右磁鍋ニ入レ文火ニ上セ溶化シ水氣ヲ蒸散メ舍利別ノ稠ト爲シ固封シ貯フ 〔按〕

主治 胃ヲ健運シ神經衰弱ノ諸症。處女病。虛寒ノ淋疾白帶下ヲ治シ諸脱泄ヲ止メ驅風ノ効ヲ稱ス 〔按〕

健質亞那羅 〔按〕 ゲンチアイン 〔蘭〕

○按ニ是レ和蘭藥鏡ノ龍膽草條下ニ載ル所ノ

ゲンチアナノ第三種。根太キ者ナリ若シ缺ル片ハ龍膽ヲ代用スベシ其説和蘭藥鏡ニ出ツ

健質亞那越幾斯劑 エキスタラクト。ゲンチアナ羅

製法 健質亞那 根粗末 一匕

沸湯 十匕

右浸ス一十二時ニ磁罐ニ内レ蓋閉シ煮ル一
時。温ニ乗ノ瀝過シ汁ヲ取り沸湯八匕ヲ其滓ニ加
ヘ煮ル一。一時。温ニ乗ノ絞リ瀝テ滓ヲ去リ前ノ汁
ト合シ是ヲ煎熬ノ膏ト爲ス 按

主治 健胃ノ良藥トス是ヲ服ノ刺戟衝動セズ熱ヲ

増發セズ飲食消化シ難キ等總テ胃弱ノ諸症。萎黃
病。胃腸風氣痞滿。疝痛酸敗液腹痛。脾病。依剥イボ昆垓コンヂ兒
子宮病ヲ治シ。虚症ノ黄疸。間歇熱ヲ解シ。痛風關節
痛ヲ消シ白帶下。虚損ニ因ル經閉等ニ良驗アリ。是
ニ幾那キナヲ加テ健胃ノ効尤峻ナリ故ニ頑固ノ間歇
熱ニ用ヒテ治驗多シ○服量十匁ヨリ二十匁ニ至

健質亞那福依 ラン テイ ン キ ラ ゲ ン チ ア ナ 羅

製法 健質亞那 根搗碎者 一匁

燒酒 十五度者 六匁

右硝子壘ニ入レ固封温浸ス_{コシ}一三日。瀝テ液ヲ取リ貯_テフ_後

主治 健質亞那_{ゲチアナ}。越幾斯劑_{エキス}ト同シ_後

結爾茂斯_{ケルメス}羅

アルケルメス又ガライナケルメス羅
カルモセイシベイン又カルメイシ又
シカルライケン
ベイン蘭

是ハイレクス_{コシ}ヘラ_榭ノト名ル小木ノ枝及ビ葉ニ生スル疣贅ノ如キ蟲ノ巢ナリ形チ大約圓ク大サ豌豆ノ如ク灰白色。柔ニメ輕ク髓樣ニメ_水棉_綿ノ如シ。熟スレバ深紅。光澤アリ内ニ紅色ノ液ヲ含

ニ押セバ帶赤色ノ液出ツ味辛苦。微佳香アリ。此物藥用トシ又猩々_{シキキ}絨等ノ殷紅ナル染料及ビ畫料ニ用フ○其蟲ハ微細ノ蚊蛾ノ如ク羽化シ白色ニメ細毛アリ此蟲モ亦結爾茂斯_{ケルメス}ト名ク夏月夥ク其樹ニ生シ枝葉ヲ刺蝕_スメ其精液ヲ吮_スメ枝葉ニ贅瘤ヲ成シ其内ニ夥ク卵ヲ生シ漸ク長育蕃息スルニ隨テ其巢囊モ盈長シ豌豆ノ大サトナル。是猶榭ノ一種ニ没食子ヲ生スルガ如シ若シ其蟲悉ク羽化メ飛去レバ其巢空殼トナル故ニ未ダ羽化セザル頃ニ取リ醋_{フリカケ}ヲ撒テ蟲ヲ殺シ。水或ハ葡萄酒ニテ洗ヒ能

ク乾シ貯フ○此物新鮮肥實虧損セズ黯赤色ニノ
 柔ナル者ヲ擇ムベシ○其樹ハ亭落葉榊ノ一種
 一種ニノ大約四尺許ノ灌木ナリ葉ナラ拘骨イラキニ似テ小
 ク邊ニ刺角アリ四時常緑花ハ茄兒ニノ鱗屑様ノ
 細線ヲ以テ成リ是ニ碎花著ク蓋様ニノ刻缺アリ
 花後實ヲ結バズ實ハ別ニ枝ニ生シ榊實ノ如クニ
 ヲ灰白色斗ニ刺アリ其内ニ仁アリテ兩片ニ分ル
 ○此物意太里亞イタリヤ伊斯イス把バ尼ニ亞ア波ハ爾ル杜ト瓦ガ爾ル拂フ郎ラ察ス福ゴ
 撈ラウ察サ蘭ラン牛ウ鐸ダク古コ甘カン的ダク亞ア洲シヤ以上イシヤ歐オ羅ラ巴バ其他イタ亞ア細シヤ亞ア洲シヤ
 弗フ利リ加カ洲シヤノ諸シヤ煖ウ地シヤニ産ス

○按ニ此物和漢産未ダ詳ナラズ洋舶ノ品ヲ用
 フベシ

主治 性收斂ス油氣鹽氣アリ衰弱ヲ強壯シ失氣眩
 暈ヲ治シ胃ヲ健ニシ嘔吐ヲ止メ飲食ヲ消化シ孕
 婦産婦ノ虛損ヲ復シ墮胎ヲ防護シ痘疹ヲ驅發ス
 ○往古ハ虛損ヲ補充スルニ多ク用フ近來ハ用ル
 一マ罕ナリ○服量半月ヨリ一マ月ニ至ル細末トシ或
 ハ雞卵ニ攪和シ用ヒテ催生藥トス性功大抵哥攝
 尼ニ爾ル後ト出シツト同シ物製伍
 結ケ爾ル蔑メ斯ス舍シ利リ別トセイロフスケルメスシ羅

製法 結爾茂斯 二勺

薔薇露

冰糖 各一匙

右結爾茂斯ニ薔薇露ヲ加ヘ浸ス一十二時。文火ニ上セ煮熟シ搾テ汁ヲ取り冰糖ヲ加ヘ再ヒ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ舍利別ノ稠ト爲ス

主治 結爾茂斯主治ノ諸病ニ尤効アリ

結爾茂斯昆設爾弗

コニヘクチヲアルケルメス
コニセルフハンニカールラーケン
ベニラン

製法 結爾茂斯舍利別 一匙半

沈香

桂 各六錢

右舍利別ヲ文火ニテ溶シ二味ヲ下シ煉和ス

主治 腦心ヲ強壯シ精力ヲ旺盛シ精神沈重ヲ爽快

シ胃ヲ健ニシ眩暈昏冒ヲ醒シ神志鬱憂病ヲ治シ

虚脱ノ下利赤痢水腫ニ効アリ○服量一刃ヨリ一

錢ニ至ル

見篤散

製法 蟹爪 二勺 螞蛄石 一勺

コニヘクチヲアルケルメス
コニセルフハンニカールラーケン
ベニラン

真珠

一月

鹿角灰

琥珀

各二錢

昆答刺越兒發根

八月

反鼻

四月

金箔

一月

右各別ニ極細末トシ調勻ノ散劑トス

〔主治〕小兒癩瘰瘡搨及ビ酸敗液ノ諸症ニ奇効ヲ奏シ汗ヲ發シ惡液ヲ表發ノ蒸氣ヨリ排泄シ神經ヲ強壯ニス○服量六匁ヨリ一月ニ至ル

〔廣〕

遠西醫方名物考卷十一終

