



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN TAIIWA



遠西醫方名物考標目

卷十二

芫菁

芙蓉驅水丸

芫菁丁幾去爾アシキスコトノル

芫菁驅水酒

芫菁乳

治淋丁幾去爾アシキスコトノル

芫菁越粟失爾アシキスコトノル

咬傷消毒丸

大正九年九月廿四日
内田糸子氏贈



咬傷解毒丸

發泡硬膏

發泡軟膏

排毒化膿膏

(不) 覆盆舍利別

蒲里阿尼亞

府利

遠西醫方名物考卷十二

榛齋先生譯述

男

宇田川榕

榕菴校補

芫菁

カントタリデス又ヘシカトリウム羅
スパンセ・フリゲン蘭○葛上亭長ニ代用シテ

効同

シ

性 蔥菁ハ揮發鹽ト華爾斯ヲ以テ其質ヲ成ス。是レ
燒酒ニ浸セバヨク溶解シ水ニハ溶化セザレバナ
リ○製煉術ニテ是ヲ蒸餾スレバ亞兒加利性ノ揮
發鹽。蒸升シ其底ニ華爾斯殘ル。是ニ揮發酸性ノ酷
厲毒ヲ含メリ。味ヒ舌ヲ侵刺シ其氣惡ムベシ○是

ヲ研末スレバ其氣眼鼻咽喉ニ竄入メ大ニ焮腫シ
或ハ總身斑疹ヲ發スル者アリ故ニ研磨スルニ戒
慎ヲ加フベシ○此蟲ハ久ク貯テ性能ヲ失ハズ然
凡新ニメ全形具ル者ヲ擇ニ用フベシ

主治 荒菁ノ主功二般アリ○其一ハ此蟲殊ニ腎輸
尿管膀胱尿道ヲ刺戟スル一種ノ酷厲毒アリ。故ニ
過服スレバ右ノ諸器大ニ焮熱腫痛シ或ハ尿崩。尿
血ヲ發ス或ハ口舌咽喉熱燥シ胃腸肛門モ亦焮痛
赤爛シ甚キ者ハ壞疽トナリ死ス。故ニ右ノ諸器焮
腫アル者ニ用レバ大ニ其症ヲ増劇ス然ルニ精練

ノ醫家病性ヲ察シ服量ヲ慎ミ適宜ニ是ヲ用レバ
其酷厲毒ヲ以テ腎膀胱等ヲ刺戟衝動シ小便分利
ノ機轉ヲ進メ極テ利尿ノ峻効ヲ奏ス。故ニ水腫小
便閉ノニナラズ凡ソ粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解ツ
小便ニ驅泄シ治スベキ諸病ニ奇効アルト是ニ比
スベキ者ナシ○其ニハ是ヲ過用スレバ其酷厲毒
ヲ以テ特ニ小便ノ諸器ノニナラズ全軀ノ凝體纖
維ヲ侵蝕毀壊シ血液ヲ稀渙烊崩ノ危殆ノ諸症ヲ
發ス。是ヲ外敷スレバ肌膚ヲ腐爛シ發泡潰蝕スル
ヲ以テ知ルベシ然ニ良醫ノ手ニ在テ患者ノ強弱

ニ隨ヒ病性ヲ察メ服量ヲ斟酌シ或ハ對症ノ藥劑ニ調和シ用レバ是所謂名匠ノ利器ニノ其酷烈刺戟ノ殊能ヲ以テ衆器諸液ノ運動怠慢衰頽セルヲ警發醒覺シ元運生氣ノ沉滯潛結セルヲ振起發揚シテ一種ノ熱ヲ誘發ス。此熱即チ細絡纖管ニ頑滯セル膠粘液ヲ融解蕩滌メ諸竅ニ驅逐ス是ヲ以テ頑痼危險ノ諸病即チ癰。癟。神經熱。腐敗熱。疫欬。經閉。咬傷毒。癩等ニ奇効アリ。○右兩件ノ主功ハ此蟲ニ稟ル所ノ一種ノ刺戟衝動ノ所爲ニメ古今ノ明哲多ク歴試考究シ殊効ヲ稱スルヲ勝_{カツ}テ算ヘ難シ即

チ其一二ノ經驗說ヲ左ニ舉グ

水腫小便閉 水腫ニ芫菁ヲ内服メ利水ノ峻功アリ殊ニ諸脉纖維ノ弛弱縱緩ノ感触鉢_{カク}ク血液ノ運行怠慢ナル水腫ニ用ヒテヨク停水ヲ驅泄ス是レ動脈ノ神經膜_{スル}神經衣膜_ヲ刺戟メ其搏動ヲ強健ニシ血液ヲ進輸メ壅滯ヲ閑利シ小便ヲ驅逐スレバナリ○服量四分仄ノ一ヨリ一仄マデ龍腦ト沙糖少許ヲ研和シ用フ_ノ龍腦ハ芫菁毒ヲ抑制是小便開ノミナラズ小便不利艱澁淋瀝等ノ症ニ用ヒテ捷効アリ○或ハ芫菁末ニ酒石鹽ヲ加テ驅水藥ト

シ用ヒテヨク水腫ヲ治ス○或ハ此末ニ消石龍腦各、一二丘ヲ加ヘ用ヒテ焮衝ヲ防キ小便閉ヲ治ス○或ハ此末一丘ヨリ三丘マデニ甘汞ト龍腦少許ヲ加ヘ用ヒテ水腫ヲ治スルニ甚ダ驗アリ○一患者小便消滴モ通セザルト十一日利尿ノ諸藥寸効ナク苦悶讐語筋惕肉瞼冷汗等ノ惡症ヲ發ス乃チ芫菁末一丘ヲ扁桃乳ニ研和シ分テ九服トシニ時毎ニ一服宛與フ。第三服ニ至テ小便漸ク利シ諸症隨テ減シ回復ス○一婦人腹水ヲ患フ芫菁丁幾去爾トシキカラレ後出トシキカラレノ取テ二十滴宛列印設酒ニ點服シ爾後漸ク加

テ四十滴ニ至リ小便快利ノ全治セリ○水腫ニ芫菁發泡膏ヲ貼メ亦効アリ然モ内服スルヲ尤タガ切實トス刺戟スルヲ少ク且タガ焮衝ヲ發セズ諸器脉管ノ運動ヲ增進シ粘稠液ヲ稀釋メ小便ニ通利スレバナリ○焮衝ノ候ナク膀胱麻痺不遂メ小便利セズ或ハ尿道粘液質ノ腫瘍アリテ久ク愈ス小便通利ヲ妨ケ是ヲ刺戟衝動ノ疏散スベキ症ハ皆芫菁ヲ用ヒテ効アリ○尋常ノ水腫ハ左ノ丸藥奇効アリ

芙蓉驅水丸

阿芙蓉精製者

十二丘

茺蔚末六爻

右研和ノ十二丸ト爲シ銀箔ヲ衣トシ朝夕一丸宛服シ爾後漸ク半丸ヲ加フ是ヲ用レバ小便崩泄シ水腫隨テ消ス但痛ヲ發シ小便利セザル者ハ速ニ此藥ヲ休ムベシ

茺蔚丁幾去爾

製法 茺蔚 一錢

燒酒二十度者

右硝子壘ニ入レ固封シ浸スト六日紙ニテ濾シ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ 拔 患者ノ感觸甚フノ芙蓉

驅水丸ニ堪ザル片ハ此丁幾去爾ヲ用フベシヨク小便ヲ利ス但毎人瞑眩ノ一樣ナラザル故ニ初少許用テ漸ク加フベシ假令バ十五滴宛日ニ一次用ヒ漸ク加テ患者小便焮痛ヲ覺ルニ至ルベシ諸藥効ナキ小便閉ニ此劑一二匙用ヒテ小便崩泄シ全愈セル者アリ○左ノ藥酒亦水腫ニ奇効アリ

茺蔚驅水酒

茺蔚末一刃

列印設酒 四弓

右硝子壘ニ内レ浸ノ藥氣ヲ出シ濾テ痒ヲ去リ此

液一匙ヲ取テ葡萄酒七匙ニ和シ用フ○芫菁ヲ乳劑トシ用レバ瞑眩ノ恐ナシ故ニ感觸シ易キ者ハ左ノ方ヲ用フベシ

芫菁乳

芫菁未半錢

龍腦 一二瓦

甘扁桃 一弓

水 十弓

右扁桃ニ水ヲ加ヘ搗テ乳白色ノ汁ト爲シ次ニ二味ヲ研和シ一時或ハ一時半ニ一匙宛用フ○或云芫菁ハ小便閉ニ奇効アルト他ニ比スベキ者ナシ

然凡諸般ノ小便閉此一藥ニテ悉ク治スヘキニ非
ズ唯腎中ノ泌尿管重訂内科撰要。尿血篇。第三百十
中ノ細管ナリ輸尿管膀胱等ノ纖維衰弱緩弛ノ感觸鉢ク。
麻痺ノ小便ヲ分泌健輸スルト能ハズ或ハ右ノ諸
道ニ粘液凝聚ノ小便ノ分利ヲ妨ゲ閉塞スル者ハ
此藥ヲ用ヒテ刺戟衝動シ其諸器ノ運營ヲ増發セ
シムレバ小便忽チ利ノ諸症自ラ解ス然ニ腎膀胱
等ノ痙攣腎・輸尿管・膀胱頸拘攣掣急ノ云及ビ及ビ焮衝ヨリ發スル症
ニ用レバ大ニ害アリ凡ソ刺戟衝動ノ諸藥ハ痙攣
及ビ焮衝ヲメ増劇セシムレバナリト。或云芫菁又

内服ノ腎膀胱ニ焔衝ヲ發スル者アレ凡て是ニ因テ
小便閉ニ至ル者ナシ假令バ芫菁發泡膏ヲ外敷メ
其毒皮管ヨリ血中ニ侵入シ腎膀胱ニ觸テ焔衝ヲ
發スル者アレ凡て是ヨリ小便閉ヲ爲ス者ナキガ如
シ或ハ此藥四丘若クハ六丘モ一眼トスルガ如キ
服量過多ナレバ腎膀胱尿道大ニ焔衝シ或ハ尿崩
尿血等ヲ發スルヲアレ凡て小便閉ヲ爲ス者ナシ○
或云水腫ハ水液多ク血中ニ混淆シ血ノ醇厚ノ質
ヲ失ヒ烊解ノ終ニ腐敗ス然ニ芫菁ヲ用レバ其酷
厲毒ニテ血液ヲ烊解崩壊ノ逾危篤ニ至ラシムト

然レ用服量適宜ニ是ヲ用レバ速ニ其停水ヲ驅泄ス
ルガ故ニ曾テ血液ノ腐敗ヲ恐ル、トナシ

淋疾 黴毒淋ヲ患ヒ其毒漸ク解散シ小便通スルニ
痛少ク唯粘液漏泄ノ歇ザル症或ハ頑固ノ遺精ニ
芫菁ヲ用テ良効アリ此症動モスレバ經久治セズ
滯患トナリ諸藥効ナキ者多シ是レ攝護精囊尿道
等ノ腺輸泄管重訂内科撰要 黴毒篇 淋疾ノ條ニ出 衰弱緩弛ノ粘液
ヲ漏泄スル症ナル故ニ是ヲ用ヒテ刺戟衝動シ其
衰弊セル運營ヲ憤起増發セシムレバ其諸器自ラ
健旺ノ小便通利ノ常調ニ復スルナリ夫ノ腎膀胱

ノ麻痺ノ發スル小便閉前條
ニメ原ヲ同フスル故ニ共ニ此藥ニテ治スル所以
ナリ○右ノ諸症ハ芫菁末一丘ヨリ三丘マデ烏賊
骨末一錢ニ研和シ日一服宛用ヒテ効アリ或ハ左
ノ方良驗アリ

治淋丁幾去爾

大黃丁幾去爾

三錢○製法大黃剉十五度ノ
固封シ浸スト六日濾テ

燒酒八倍ヲ加ヘ硝子壠ニ内

其液ヲ取り貯ムフ

拔

亞刺比亞趨謨

一錢半

紫鉢

一錢

芫菁

末ニ錢

右銳烈ノ燒酒一升半ヲ加ヘ浸ノ藥氣ヲ出シ其症
ノ輕重ニ隨ヒ三十滴ヨリ五十滴マデ朝夕兩次微
溫湯少許ニ點服ス○黴毒ナクメ久ク愈ザル淋疾
モ芫菁劑良効アリ○或云芫菁ヲ過用スレバ小便
淋澁焮痛シ腎膀胱尿道ニ焮熱腫痛スル症ニ用レハ害
故ニ總ステ淋疾ニハ害アリト。但是ハ黴毒淋ノ初發
其毒多ク鬱蓄シ尿道焮熱腫痛スル症ニ用レハ害
アルヲ云ナリ黴毒漸ク解散シ小便通スルニ痛ナ
ク粘液漏泄メ久ク愈イエザル症ニ用レバ良効アルト

上ニ説ク如シ○凡ソ凝體纖維衰弱弛緩シ粘液水氣多ク壅滯ノ小便屢不利シ或ハ石淋ノ患アランヲ恐ル者ハ預メ芫菁劑ヲ用テ粘液ヲ稀釋シ小便ヲ驅泄ノ其諸道ヲ淨刷シ後患ヲ防グベシ○結石碎ケテ細沙トナリ膀胱ニ聚ル症ハ是ヲ用ヒテヨク其碎石ヲ通泄ス。然ニ結石腎痛及ビ大ナル結石懸留スル症ハ總テ刺戟衝動ノ驅水藥甚ダ害アリ但甘緩軟化ノ劑及ビ鎮痛劑ヲ用テ尤良トス

尿崩 尿崩ハ小便夥ク通スル病ナリ但其因一ナラヒ小便夥ク通スル症ヲ云其種類及ビ因症治法等重訂内科撰要尿崩篇第三百十九章ニ出ツ併セ考ベシ

芫菁ハ間尿崩ニ大効アリ是レ利尿ノ峻藥ニメ小便閉ニ効アリテ又尿崩ヲ治スルヲ甚ダ恠ムベキが如シト雖モ是唯腎中ノ泌尿管及ビ神經麻痺ノ觸知ヲ失ヒ適宜ニ分泌ノ運營ヲ爲スヲ能ハズノ尿液妄リニ其關ヲ逸メ崩泄スルナリ故ニ芫菁ヲ用ヒテ其麻痺セル諸管神經ヲ衝動シ其廢弛セル運營ヲ増發シテ小便分泌ノ常調ニ復セシムルナリ此猶腎膀胱ノ麻痺ノ發スル小便閉ヲ治スルト同シ此症ハ左ノ方良驗アリ

芫菁越栗失爾

芫菁 未半弓

越栗失爾赫篤立

綠礬條
一比

右調和シ浸スル兩三日。濃過シ十五滴ヨリ三十滴マデ服スル。日兩三次或ハ初十滴。宛日兩次用ヒ爾後二十滴。宛用ヒ終ニ三十滴ニ至ル。扁桃乳或ハ

亞刺比亞趨謨漿

亞刺比亞趨謨ノ條ニ出

ノ兼用メ尤良

小便失禁此症亦芫菁ヲ用ヒテ間奇効アリ是レ膀胱頸ノ括閉筋麻痺不遂ノ括約ヲ失フヨリ發スル故ニ是ヲ用ヒテ効アル。前條ノ症ト同シ○一男子小便失禁ヲ患ヒ經年愈エス幾那ヲ服シ芫菁膏

ヲ薦骨ニ貼メ發泡シ或ハ冷水ニ浴メ皆寸効ナシ終ニ芫菁丁幾去爾上ニ出ヲ内服セシメ又其丁幾去爾二錢。硇砂精一錢。亞麻油少許ヲ研和シ患者ノ會陰ニ塗擦メ全愈セリ

靡此病ハ諸筋及ビ神經虧損ノ官能ヲ失フヨリ發スル故ニ芫菁ヲ用ヒテ其衰弊セル運營ヲ憤起逞發セシムル。尤肝要トス。凡ソ侵刺衝動メ細管纖維ニ鑽透穿入スル。芫菁ニ若ク者ナキ故ニ古入多ク是ニ發泡膏ヲ外敷メ良驗ヲ稱ス。晚近漸ク内服劑トシ其性功ヲ擴充發明ノ沈疴痼疾ヲ救フ

甚ダ多シ。此即チ前ニ説ク小便閉。尿崩。小便失禁ヲ治スルト同シ。○一男子痱アシナノ患フ。芫菁丁インキ幾去爾アラルニ硝砂精ヲ加テ内服セシメ又是ヲ頃寫脊椎及ビ頑痺ク關節ニ擦メ平復ス。一人頑固ノ脚痱アシナノ患フ。毎日芫菁丁幾去爾アラル十滴。宛錦葵花ノ浸劑ニ點服スル。廿七日。其後二十滴。宛前法ノ如ク用ヒ又扁桃乳及び龍腦ノ丸藥ヲ兼用メ。尿道ノ刺戟ヲ防キ二月ニメ回復ス。

癆 **疫效** **頑痰** 蔊菁ハ脉絡纖維ヲ刺戟ノ其運動ヲ増發シ膠固頑結ノ諸液ヲ驅逐スル故ニ癆。疫效。及ビ

肺氣管咽喉ニ膠痰凝聚壅盛セル症ニ間大効アリ。
經閉 婦人體質薄弱ニメ萎黃病及ビ粘液質ノ諸病ニ罹カクリ經閉ヲ患ル者ハ是ヲ用ヒテ膠粘稠固ノ汚液ヲ稀釋メ回復スル者多シ。

遷延神經熱 **腐敗熱** 蔊菁丁幾去爾アラルニ民塙ミシナ列利精。鹿角精。雞腹蘭。龍腦ヲ適宜ニ加ヘ神經熱。腐敗熱ニ用ヒテ大効ヲ得ル。アリ此熱病。險重ニ至レバ視聽嗅味ノ神經麻痺ノ作用ヲ失ヒ。精神亦錯誤スル故ニ是ヲ用ヒテ其神經及ビ元運生氣ノ運營。沈垂怠慢ナルヲ衝動揮發シ血液ヲ活潑健運セシメテ治

スルナリ。是ヲ外敷メ亦効多シ

狂犬咬傷 芫菁ハ犬咬傷ノ要藥トス是ヲ用ヒテ小便ヲ利スルノニナラズ發汗ノ其毒ヲ解ス。芫菁末ヲ丸トシ或ハ丁幾チシキ去爾トシ用テ良○左ノ方殊ニ治驗多シ

咬傷消毒丸

芫菁ヤクモウ末

一瓦

甘汞カム 一瓦半

龍腦ラボン 十瓦

右研和シ亞刺比亞アラビア謹謨漿アゴハヲ加テ丸トシ毎夜一服

トス又規吉撒兒弗カーフヲ以テ毎日其創ニ塗ルベシ効驗尤モ的實ニノ再發スルトナシ。病治メ後半年許ハ右ノ丸藥ヲ用フベシ○咬傷毒ニ因テ狂躁等ノ危症ヲ發スル者ハ左ノ丸藥奇効アリ

咬傷解毒丸

芫菁ヤクモウ末

六瓦

桂ケイ 末

十二瓦

沙糖サトウ 半錢

右研和シ玫瑰蜜適宜ニ加テ三十丸トス五丸ニ芫菁一瓦ヲ含メリ大人ハ一時ヨド毎ニ六丸ヲ服ス一歲

ノ兒ハ一時毎ニ一丸四歳ハ二丸七歳ハ四丸宛服
ス又芫菁發泡膏ヲ其創ニ貼シ患者ヲノ數溫湯ニ
浴セシメテ尤^セ良

癩 芫菁丁幾^{トシキ}去爾^{アラル}ヲ癩ニ用ヒテ間^マ大効ヲ得タル經
驗說甚ダ多シ。是レ腎ニ於テ分泌スル小便モ皮表
ニ發越スル汗及ビ蒸氣モ固ヨリ一種ノ液ナレバ
此利尿ノ駆藥ヲ用ヒテ皮表ニ浸淫セル毒液ヲ小
便ニ驅逐シ一ニハ其頑凝牢著セル惡液ヲ稀釋烊
解ノ諸竅ニ排泄スルニ因ル○凡ソ經久頑滯ノ皮
病ハ表部ニ運輸セル汎^{タカイ}重訂内科撰要第^{十章}註ス 粘稠ニ

メ酷厲毒ヲ夾ムニ因ル故ニ癩ノミナラズ總テ
險重惡厲ニメ諸藥効ナキ瘡瘍ヲ治スルノ効驗甚
ダ多シ○芫菁ハ一種ノ烈キ酷厲毒ナレバ誤用メ
害ヲ致スフ亦少カラズ。故ニ精良ノ醫家病性ヲ察
シ體質ヲ審ニシ戒慎メ服用ヲ些少ニシ用ルニ非
レバ百中ノ効ヲ得難シト知ルベシ^{依福}依福

發泡硬膏

芫菁

細末

コンプラス^トヘシカトリム^ハ羅

アラルテケンデフレイステル蘭

製法

黃蠟 各八弓

松香

端 各四弓

家猪脂 マシティカ 三弓

右臘松香。湍猪脂ヲ文火ニ上セ烊化シ次ニ芫菁末ヲ加ヘ火ヲ下シ煉和シ硬膏ト爲ス

拔

又法 芫菁 細末

家猪脂 各四弓

黃蠟 各一弓

松香 各一弓

醋 七弓

右煉和メ硬膏トス

亞

發泡軟膏

ユングエントム・ヘシカトリュム 罗

製法

越沒里膏 六弓

芫菁 極細末

一弓

右膏ヲ火ニ上セ烊化シ芫菁末ヲ加ヘ煉和ス

拔

又法 技實栗膏 七錢

芫菁 末 一錢

右調和ス

過

○或ハ芫菁末ヲ家猪脂或ハ適宜ノ軟膏ニ和シ貼シ或ハ芫菁末ヲ醋ニ和シ是ヲ攤タル硬膏ノ上ニ敷テ貼スルモ亦ヨク發泡ス○感觸ノ甚キ人ニ施

スニハ芫菁丁幾去爾アインキノル上ニヲ外敷シ或ハ芫菁末ヲ
阿利襪油ニ研和シ塗テ良○此軟膏ハ上ノ硬膏ニ
比スレバ泡ヲ發スルト速ナリ故ニ多ク是ヲ用フ
發泡部位項窩。顎。頸。耳後。肩。胛。ノ間。股。腓。脚。等ナリ但
是ニ拘ラズ其症ニ隨ヒ各處ニ貼ス。齒痛。背痛。手足
痛ノ如キハ直ニ其患部ニ貼スル等ナリ唯神經多
クノ知覺ノ敏ナル部ヲ避ザツルノミ

發泡試効是ヲ貼スレバ其處。水泡ヲ發シ是ヨリ一
切内部ニ鬱蓄スル病毒惡液ヲ外泄シ速ニ其部ノ
疼痛等ヲ治ス。故ニ總テ急迫ナル諸症ニ捷効アリ

但皮中ノ神經ヲ侵刺衝動ノ運動ヲ増發スル故ニ
疼痛ヲ治スル効ヨリハ其部ノ壅塞ヲ開通シ其毒
ヲ疏散スル功尤居多シ○此膏ハ痛風流走痛等ノ
諸痛ニニナラズ内藏ノ焮衝或ハ痙攣ノ諸症或ハ
瘡瘍内攻ノ發スル諸症ニ貼メ其内鬱ノ毒ヲ外部
ニ引泄ス。但患人壯實ニメ刺絡スベキ者ヨリハ虛
弱ニ屬スル症ニ尤効アリ是レ芫菁ノ侵刺衝動ノ
性力ヲ以テ諸器血液ノ弛弱怠慢ナルヲ憤起醒覺
メ其毒ヲ排泄セシムレバナリ故ニ神經血脉ノ弛
弱ニメ運營怠慢ナル者ホド逾功多シ○咽喉焮腫

ハ頸或ハ項窩ニ貼メ泡水出レバ其劇痛忽チ解散
ス。劇ハジキ歯痛ハ其外部ニ發泡メ捷効アリ○痛風。傷
冷毒痛。流走痛。荏苒タル關節痛。肩背腰髋腕脚等ノ
焮熱ナキ痛ハ患部ニ發泡メ其毒ヲ泄シ治ス○内
部ノ焮衝ハ其外部ニ發泡メ効アリ然ニ先ツ焮衝
ノ治法ヲ施メ其劇盛ナル諸症ヲ減スベシ。焮衝劇
クメ稽留スレバ膿ヲ成シテ危篤ニ至レバナリ。胸
腸焮衝。肺焮衝等ハ刺絡スル。一兩次ニノ其焮衝
ノ血ヲ減シ次ニ胸腸ノ疼處或ハ其近傍ニ發泡ス
レバ更ニ病毒ヲ疏解メ分利セシメ且其疼ヲ消散

ス。患人衰弱セル者ハ殊ニ良○胸腸痛ノ表部ニ在
ル者ム者ノ痛ハ其疼處ニ發泡メ速ニ治ス○頑固ノ
疝痛或ハ疝痛ノ腸焮衝トナランコ恐ル症或ハ
既ニ焮衝ヲ兼ル者或ハ赤痢ノ痛劇キ者ハ皆其疼
處ニ發泡メ解散ス○傷冷毒ノ眼耳痛。齒痛。頭痛ハ
項窩。耳後。顎顫等ニ施メ良○焮腫眼ニハ項窩或ハ
顎顫ニ發泡メ速効アリ但預メ尺澤ニ刺絡メ患部
ニ攻衝スル血ヲ漏メ尤良。傷冷毒流走痛ヨリ起ル
焮腫眼モ是ニ同シ○焮腫眼ノ渦多キ症モ亦顎顫
或ハ耳後ニ發泡メ効アリ麻疹後此症多シ○傷冷

毒ノ焔腫眼及ビ齶齒痛ハ其發泡ヲ膿潰セシメテ久ク汚液ヲ漏泄スルヲ肝要トス如_レ此症ハ發泡硬膏ヲ貼メ良○黒障眼。兩形眼ニハ是ヲ額ニ貼シ膿眼ニハ項窩ニ貼メ効アリ○惡厲ノ疥癬。癩。乾癬。浸淫瘡。禿瘡。或ハ頑固ノ頭瘡。雁瘡等ハ患部ニ發泡メ惡液ヲ泄シ若クハ膿ヲ成テ其毒ヲ泄_{ラシ}シ或其内攻セルハ速ニ再發メ鬱毒ヲ驅泄ス○熱病ノ斑疹及ビ痘瘡ハ適宜ノ部ニ發泡スレバヨク其瘡ヲ透發メ潛伏セシメズ或ハ其陥沒内攻スルヲ發越セシム○痘瘡ノ初發。臂腓或ハ背ニ發泡メ痘毒ヲ肢體

下部ニ疏導シ頭面ニ多ク發セザラシメ或ハ眼目ニ傳染スルヲ避_ケ或ハ咽喉ニ侵襲ノ呼吸不利飲食嚥下シ難キ等ノ患無ラシム○痘兒虛弱ニシ見點スレ凡快發起脹セズ或ハ行漿メ善膿ヲ釀セズ苦悶譫語不寐或ハ痘乾枯メ内陷スル等ニ發泡ノヨク其毒ヲ誘發シ諸惡症ヲ治ス○凡ソ頭腦及ビ内藏諸器ニ酷厲毒アリテ諸惡症ヲ發スル者ハ四肢背膂等適宜ノ部ニ發泡シ其毒ヲ外泄メ間大効アリ○潰瘍ヲ作り或ハ打膿法ヲ施メ内部ノ毒ヲ表發シ或ハ種痘ヲ爲スニモ亦此膏ヲ用フ○芫青

ハ諸器血液ノ運營怠慢乏弱ナルヲ刺戟衝動メ警
發省覺セシムルガ故ニ遷延緩慢ノ熱病即チ神經
熱。心藏ノ運動微弱脉微ニメ患者虛煩呻吟耳聾。小
便黽滯色等ノ症ニ是ヲ頭部項窩ニ貼シ或ハ部位
ニ拘ラズ發泡メ大効アリ○惡性熱。腐敗熱ノ患者
虛憊ノ精神沈倦昏曠或ハ脉沈微ニメ四肢厥冷セ
ル者ニ發泡ノヨク其精力ヲ挽回ス○諸病ニ虛熱
ヲ兼子。精力虛乏。精神蒙昧或ハ昏睡様ノ症アルニ
是ヲ貼メ効アル。神經ヲ強壯ニスル諸藥ノ如シ
○卒倒昏睡ハ是ヲ項窩ニ貼シ大ニ發泡メ省復ス

但粘液質ノ患者ニ尤。驗アリ。痱ニモ亦良効アリ然レ
ハ其麻痺ノ部ニ循行スル神經ノ原本ヲ考索メ發
泡スベシ○或ハ發泡膏ニ堪ザル者或ハ遍ク麻痺
ノ部ニ施スベキ者或ハ稍侵刺ノ小泡ヲ發セシメ
ント欲スル症ハ羌菁チニキ丁幾去爾タル前ニテラ布巾ニ蘸メ
廣ク痱不遂ノ部ニ貼シ縛帶ヲ施セバ其部悉ク小
泡ヲ發ス是ニ砲砂精ヲ加レバヨク鑽透シテ其効
尤速ナリ○痙攣ノ部ニ發泡メ効アリ是レ其内鬱
ノ病毒惡液ヲ引泄シ一ニハ刺戟衝動ノ功力ヲ以
テ痙攣ノ運動ヲ變化メ消散スレバナリ故ニ痼症

或ハ痙性ノ欬嗽喘急或ハ痙攣ヨリ起ル經久ノ胸
腹痛及ビ嘔吐ヲ治ス○小便失禁ニハ薦骨ノ部ニ
發泡ノ驗アリ○傷冷毒ノ經久ノ欬嗽ニハ胛間ニ
發泡ノ捷功アリ○狂犬咬傷ハ其創ニ羌菁末ヲ摻
シ縛帶ヲ施シ潰爛ノ愈ルヲ無ラシメ完モ化膿藥
ノ如クシ其毒ヲ引泄ノ内攻セズ惡症ヲ發セザラ
シム○水腫ノ水皮下ニ充滿スル症ハ股脚ニ發泡
メ其水ヲ泄シ効ヲ得ルヲアリ○諸器纖維ノ運營
衰弱ナル水腫ハ是ヲ施メ衝動健運シ小便ヲ利ス
或云。是ヲ水腫ニ貼スレバ其部潰爛ノ壞疽トナル

ト。然ニ皆必ス然ルニ非ス。唯患者老年或ハ元運氣
虛脫シ其腫經久ニノ停水既ニ腐敗スル者ニ是ヲ
貼スレバ間壞疽トナルヲアリ

戒慎此膏ヲ貼スレバ特ニ泡ヲ發スルノミナラズ
皮中ノ喰收管ヨリ其酷厲毒ヲ吸收メ血中ニ運輸
シ一種ノ焮衝ヲ發ス。故ニ多ク貼スレバ發熱苦煩
口中燥渴小便焮痛ヲ發シ或ハ其瘡遍ク皮上ニ浸
淫滋蔓シ焮痛潰爛ニ堪ザル者アリ故ニ是レヲ施
スニ戒慎ヲ加フベシ

防護發泡ノ其部大ニ焮腫ヲ發シ或ハ小便淋痛尿

血等ヲ發スル片ハ緩和ノ効アル飲液ヲ多ク與フ
ベシ假令バ乳汁或ハ扁桃乳或ハ扁桃乳ニ龍腦少
許ヲ加ヘ用ヒ或ハ遏爾託亞根ノ煎汁ヲ頻ニ服シ
或ハ阿利襪油或ハ扁桃油二三匙宛服メ皆捷効ア
リ○芫菁ノ酷厲毒ヲ抑制スルガ爲ニ通例此膏ニ
揭布羅ヲ加フ然ニ是ヲ以テ却テ泡ヲ發スルト速
ニノ甚シク且、焮腫スルモ亦甚ダシ然レバ是レ發
泡ヲ扶ル者ニノ抑制スル者ニ非ズ故ニ感觸ノ甚
シキ人ハ阿芙蓉或ハ阿芙蓉液或ハ拔爾撒謨李露
ヲ是レニ加フベシ共ニ鎮痛ノ良効アリ或ハ其部

ニ緻布ヲ置キ其上ニ此膏ヲ貼スベシ○然ニ此膏
ヲ貼シ或ハ芫菁ヲ内服スルニ就テ内部ノ焮衝ヲ
抑制シ且解散スルニハ龍腦ヲ内服シ或ハ龍腦ヲ
果仁乳扁桃乳・罂粟子乳等果汁等ニ加ヘ用フベシ此毒ヲ解
スルノ良藥トス

貼膏法是ヲ貼スルニ法ノ如クナラザレハ特ニ効
ナキノミナラズ或ハ害アリ故ニ審ニ左ノ所說ニ
從ヒ施スベシ○發泡セント欲スル部ハヨク其膚
上ノ脂垢ヲ拭ヒ去リ毛髮アル處ハ剃リ又醋ヲ塗
リ布片ニテ摩擦シ微赤色トナルニ至テ是ヲ貼シ

其一倍モ大ナル蓋膏ヨク膠著スル適宜ノヨリカニ貼メヨク牢著セシメ又巾ニ醋ヲ撒ケ貼メ縛帶ヲ施シ少シモ移動セシムルヲ勿ルベシ。但是レヲ緊繫ノ發泡ノ起脹ヲ妨ルヲ勿レ速ニ發泡セシメント欲セバ布片ヲ温メテ數其上ニ蓋フベシ。○其膏ノ大小ハ患者ノ資稟感觸ノ銳鈍老少症ノ緩急部位ノ闊狹屈伸スル部ノ遠近ニ隨フベシ。○此膏ヲ貼メ後大人ハ五六時小兒ハ二三時許ニメ其處稍膨起シ泡ヲ發ス輕症ハ其泡膜ヲ去ラズ唯刺破メ水ヲ泄スベシ是ニ由テ痛ヲ發スルヲナシ。但侵

蝕シテ膿潰セシメ長ク愈ルヲ勿ラシムベキ者ハ鉸刀ニテ悉ク其泡膜ヲ截去リ緩和ノ軟膏ヲ貼スベシ或ハ長ク其水ヲ流泄セシムルニハ泡膜ヲ去ルヲナク緩和ノ軟膏ニ荒菁ノ末少許加ヘ若クハ發泡軟膏ヲ加ヘテ其瘡ニ貼スベシ或ハ左ニ舉緩和ノ化膿膏ヲ貼シ連絲刺戟メ愈ルヲ勿ラシムベシ

〔排毒化膿膏〕

荒菁 未 適宜

右水ニ浸シ溶化シ是ニ油ト蠟ヲ適宜ニ加ヘ徐々

ニ煎熬メ軟膏ト爲ス

○發泡後五六日ヲ經テ其瘡稍乾ク者ハ又發泡膏少許ヲ貼スベシ○屈伸運動スル部ノ傍ニ貼メ瘡痛ニ堪ヘズ速ニ愈シノチ欲シ或ハ數日是ヲ貼スルニ因テ瘡中頑肉ヲ生メ汚液ノ排泄ヲ妨ル者ハ緩和ノ軟膏越後里ノ類ヲ貼メ其痛ヲ甘ケ膿ヲ釀メ頑肉ヲ除ケシ或ハ乾愈ノ膏藥微的撒爾ノ類ヲ貼スルモ良○或ハ發泡セシメズ稍侵刺スルノニニテ其部ニ鬱聚セル毒ヲ疏散スルガ爲ニ貼スルニハ緩和ノ軟膏前ニ二發泡膏ヲ加へ貼シ或ハ前ニ記ス註スニ二發泡膏ヲ加へ貼シ或ハ前ニ記ス

化膿膏ヲ貼スベシ○痛風傷冷毒痛ニ發泡メ出ル液ハ其性甚ダ酷厲ナリ腐敗液アル人ニ貼メ出ル液ハ血ヲ交ルアリ○惡液多キ人或ハ麻痺ノ部ニ發泡スレバ動モスレバ其瘡寒壞疽トナルア

リ傑依闕福

不

覆盆舍利別

セイローフス。リウビウス。イダウス。羅

フ。ハン・ブームベニン又ヒン子ベニン蘭

製法

覆盆子絞汁

濾過シ靜定ノ底泣ヲ

去ル者

十六弓

沙糖

淨白者
ニ比半

右合和シ磁鍋ニ入レ慢火ニ上セ煮テ舍利別ノ稠
ト爲シ硝子壠ニ入レ固封シ貯フ

主治

收斂清涼ノ滋潤シ壯熱病。膽液熱。煩渴眩暉ヲ

治シ壯熱病ノ下利赤痢及ビ口中咽喉ノ欬腫等ニ
良驗ヲ奏シ又健胃強心ノ効アリ總テ栗翫子舍利
別ト功同シ

伍
亞
叔
技

蒲里阿尼亞 羅 ローチス・アルバ 納 ナルデ・空イン
ガード又 ガード 宜 イン カード蘭

形狀 是レ一種蔓草ノ根ニメ黑白ノ二種アリ○其白キ者ハ春月蔓莖叢生シ細硬多節粗慥ニメ速ニ蔓延シ卷鬚アル。葡萄蔓ノ如ク能ク傍木垣籬ニ絡フ。葉葡萄葉ニ似テ小サク帶白色粗糙毛茸アリ夏月葉間ニ筒様單瓣五出ノ小白花。簇生メ穗ノ如シ一心蕊 雌 三鬚蕊 雄 アリ形チ常春藤花ノ如シ萼亦筒様五叉。秋間小圓子攢簇スル。小ナル葡萄ノ如ク或ハ櫻子ノ如シ或ハ二子雙生ヌル者アリ初メ綠色熟スレバ赤色黑色 國画 トナル。内ニ許多ノ小核ア

リ卵圓或ハ稀ニ稜ヲ爲ス。黃色ノ汁充ナ味辛。其氣嘔スベシ根太サ腕ノ如ク外面灰白。裏白ク或ハ黃色ヲ帶ビ柔ニメ蘿蔔ノ如ク。白ク乳汁ノ如キ液充ツ。是ヲ横斷メ切片ト爲セバ輪紋アリテ正中ヨリ外邊ニ旋凹ス。味辛苦澁。古ニ刺戟シ嘔スベキ臭氣アリ乾ケバ其氣味差減ス。冬月莖枯レバ唯葉落ルノミ。全草不佳ノ氣アリ○其黑キ者ハ莖赤色ヲ帶ビ卷鬚ナシ 度云 卷鬚アリ然ニヨク傍木ニ絡フ。葉缺裂十ク旋花葉ノ如シ光澤アリ子熟スレバ黑色 國云 深紅内ニ四五核アリ根外面黑色或ハ栗殼色。裏ハ黃色ニ

ノ黃楊ノ如シ其餘總テ前種ト同シ冬月莖葉枯レ
春苗宿根ヨリ生ス○一種葉三出。牽牛葉ノ如キア
リ

○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用
フベシ

主治根白キ者多ク藥用トス黒キ者ハ効稍劣レリ
○根性熱燥辛苦侵蝕鑽透ス油氣鹽氣及ビ粘液多
シ。生鮮ノ者ハ液多ク且臭氣有テ効尤峻ナリ。乾ケ
ル者モ多ク用フ○此物粘稠液ヲ疏釋シ留飲停水
ヲ大便ヨリ漏下シ且血中ニ入テ細管ノ閉塞ヲ鑽

閑シ敗液ヲ驅逐メ小便ヲ利スル峻藥トス故ニ水
腫粘液腫ヲ治スルニ多用フ○水腫及ビ水氣粘液。
胸中ニ滯著ノ喘息欬嗽呼吸不利ノ症ニ此生根搗
碎キ一弓ヲ取り葡萄酒ニ比ニ淹^ドス^ト十二時ニノ
滓ヲ去リ一時毎ニ一匙ヲ與レバ小便利メ速^アニ治
ス○肝脾腸間膜等ニ粘液壅塞スルヲ疏泄シ痛風。
脚痛等ノ惡液ヲ滌除シ或ハ發狂癇等ノ腦中粘
稠液過多ナルヨリ起ル症ニ尤驗アリ是ニ香竄ノ
藥ヲ加テ殊ニ良○寒性粘液質ノ經閉ヲ通スルニ
甚ダ驗アリ又生胎死胎ヲ下シ蛇蟲ヲ殺ス○此藥

ハ性峻ニノ胃ヲ刺戟スル故ニ桂丁香酒石鹽等ヲ
加ヘ胃ヲ健運シテ更ニ良○末ハ半錢ヨリ一錢マ
デ一服トス。水煎ニハ四錢ヲ用ヒ。葡萄酒ニ淹スニ
ハ二錢ヲ用フ○生根ヲ採リ薑擦子ニテ擦リ温メ
テ腹部ニ貼スレバ停水ヲ漏下ス或ハ生根ヲ搗キ
煮テ琶布^{ハラフ}トシ或ハ醋ヲ加テ搗キ或ハ煮テ膏トシ
或ハ阿利襪油ヲ加ヘ煮テ外敷メ痛風脚痛ヲ消シ
療癰堅硬腫及ビ打撲青斑ヲ治シ皮肉間ノ凝血ヲ
散シ疥癬惡厲諸瘡經久潰爛侵蝕瘡瘍ヲ治シ竹
木刺ヲ拔ク

物伍依

府利蘭

マーシス羅ブルム・ハン・イテモスカート蘭是肉

豆蔻花ノ義本邦藥鋪亦花肉豆蔻ト呼ブ

是ハ肉豆蔻ノ外皮ノ下裏皮ノ上ニ纏フ中皮ナリ
○肉豆蔻ニ三皮アリ外皮ハ柔滑ニノ綠胡桃或ハ
扁桃ノ如ク肉様ニノ厚桃ノ如ク稍硬ク裏面淡白
酸澀ノ汁アリ初淡綠熟スレバ桃ノ如キ紅色ヲ帶
ビ且黄ト紫ノ斑ヲ生シ自ラ坼裂スルト胡桃皮ノ
如クニノ中皮即チ府利見ニ裏皮ハ直^ナ核ヲ被ヒ
薄フノ榛子皮ノ如ク硬固赭赤破レ易シ其核即チ
肉豆蔻ナリ○府利ハ形チ薄片ノ細條羅紋ノ如ク

枝椏ノ錯綜スルガ如クニメ裏皮ニ纏ヒ。其質水棉ノ如ク膜ノ如ク柔ニメ粘潤アリ。樹ニアルキハ血紅色ナリ。採リ乾セバ赤黃色或云帶黃紫色トナリ氣味拔爾撒謨ノ如ク芳烈香竄。肉豆蔻ニ勝レリ○上品ハ其片條太ク鮮美赤黃色。形チ全クノ碎折セズ其碎小ニメ赭色或ハ淡黃ナルハ下品トス是レ未熟ナルヲ採リ或ハ久ヲ經テ性味脱スル者ナリ○肉豆蔻ヨク熟メ皮自ラ坼裂スレバ土人府利ヲ採テ曝乾シ鹽水少許ヲ濕ヒミツシ貯フ其燥テ油氣脱スルヲ防ケナリ

主治

府利肉豆蔻共ニ性温。辛微苦。芳香ナリ。肉豆蔻ニ比スレバ收濁ノ効少クノ揮發鹽及ビ精微竄透ノ油氣多ク性功尤勝アリ。レリ肉豆蔻主治ノ諸病ニ用ヒテ更ニ峻効アリ○府利モ亦搾油。蒸餾油ヲ製ス是ヲオレウム。マーシスト名ク肉豆蔻油ニ比スレバ清稀ニメ揮發精微ナリ○府利油ハ性熱ノ虛冷ヲ温メ胃ヲ健ニシ風氣ヲ驅リ蟲ヲ殺シ失氣眩冒。卒倒頭痛。寒疝痛。齒痛ヲ治シ外敷ノ痱及ビ脚痛風等ニ奇効アリ然レ貴價ナル故ニ多クハ肉豆蔻搾油ヲ代用ス○服量四滴ヨリ六滴マデ沙糖ニ和シ適

宜ノ飲液ニテ送下ス

叔物遇

遠西醫方名物考卷十二終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱

株篠守川先生著

全三冊

理學門植學啓原

富川裕庵先生著

全三冊

同 内象銅版圖

同上

全一帖舍密開宗

同上

每篇三冊完

增補和蘭藥鏡

同上

全八冊醫療正始

同上

自初篇至七篇

遠西醫方名物考

同上

拿爾泰西名醫彙講

林川實作虛著

全八冊

同 補遺

同上

全九冊要術知新

大櫻重幹先生著

全三冊

瘡醫新書

支澤太楨先生著

全四冊

醫方列幾

保羅足立先生著

全三冊

蘭學階梯

同上

全三冊

蘭學佩觴

同上

全一帖而育發微

大櫻重幹先生著

全二冊

幼幼精義

素齋內先生著

全四冊

病學通論

初篇二篇

一篇三篇四篇

通之出之

濟生三方

杉田成鄉先生譯

全四冊

青蘋閣

上庄茂草茅町二丁目

初篇三冊末

一篇三篇四篇

通之出之

須原屋伊八



揅齋宇田川先生著

四篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌