

遠西醫方名物考

安

卷十七

武
857
45-17

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 9 第
冊 17 第



內中武
號 857
卷 45-17



遠西醫方名物考標目

卷十七

阿芙蓉

主治

催 睡	腹 痛	頭 痛	癩 癩	嘔 吐	失 血	嘔 血	崩 漏	赤 痢	阿 芙蓉	間 歇
痛	痛	耳 痛	諸 症	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉
疼 痛	傷 冷	齒 痛	子 宮	吐 血	麥 飲	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉
毒 痛	毒 痛	衝 逆	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉	○ 芙蓉
		爾 撒	爾 撒	爾 撒	爾 撒	爾 撒	爾 撒	爾 撒	爾 撒	爾 撒
		丸	丸	丸	丸	丸	丸	丸	丸	丸

大正九年九月
內田采子氏贈



標目
風雲堂藏

阿芙蓉	創傷	石淋痛	癌	尙痿	痘疹	狂癩	癩腫	黃疸	胃	腦	胃腸熱
吉利詞	外敷	犬咬傷	狗咬傷	水腫	微毒	胎毒	芙蓉乳	腎	肝	胸	癩熱
○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉
○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉
○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉
○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉	○芙蓉

遠西醫方名物考卷十七

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補



阿芙蓉 甲

主治 此藥ハ感觸知覺ヲ奪除シ麻痺セシムル効アリ故ニ一切神經ノ感觸已甚キヨリ發スル諸症假令ハ疼痛不寐痙攣搐掣等ヲ治シ蒸氣及汗ヲ發シ風氣痞滯ヲ驅散ス○血液ヲ稠厚ニシ諸失血脫液ヲ治スル聖藥トス假令^{タトヘ}吐血下血痔血過多婦人崩漏惡症腐敗ノ下利赤痢等ノ虛脫セル症ニ大効

アリ○少許用レバ揮發衝動ノ性カヲ以テ神經血
脈ノ運動ヲ増發ノ精神ヲ活潑欣慰ス。或云都兒格
國ノ徭卒戰場ニ臨テ阿芙蓉ヲ服スレバ精神欣愉
ノ少モ恐怖セズ勇悍常ニ倍スト

催眠

諸病ニ於テ疼痛或ハ痙攣ノ運動

重訂內科撰
要痙攣搦掣

篇第二十一アルニ因テ患者睡ルヲ能ハス精力是
章ニ詳ナリカ爲ニ罷勞ノ其病逾增長スル者ハ適宜ニ阿芙蓉
ヲ用ヒテ安眠寢息セシメテ其精カヲ回復スベシ
然レ患者多血焮衝ノ候アリ或ハ胃腸ニ病毒鬱蓄
シ大便閉滯スル者ニ用レバ安眠ヲ得ズ其症増劇

ス斯ノ如キ症ハ刺絡ヲ施シ清涼下劑ヲ用ヒテ其
焮衝ヲ治シ胃腸ヲ淨刷スベシ爾後仍不寐スル者
ハ阿芙蓉ヲ用フベシ

疼痛

各部ニ酷厲液アリテ侵刺シ劇痛スル症ニ用

ヒテ速効アリ但焮衝ノ候ナク胃腸鬱滯ナキ者ニ
用フベシ○患者疲勞ノ感動甚ク其痛一處ニ住リ
移轉セザル症ニ用ヒテ殊ニ良

腹痛

胃腸ニ焮衝及鬱滯アリテ腹痛スル者ハ阿芙

蓉害アリ吐下劑ヲ用ヒ胃腸ヲ淨掃ノ後是ヲ與ハ
速ニ治ス○傷冷毒ノ酷厲液内伏メ疝腹痛ヲ發ス

ル者多シ此症ハ阿芙蓉ニ龍腦サ雜腹蘭ラヲ加用テ其毒ヲ皮表ニ發泄スレバ治ス○腸ノ攣急ヨリ發スル疝痛炊衝ノ候ナク唯荏苒沈滯ノ治セザル症ニ是ヲ用テ大効アリ○胃痛心腹痙攣ノ運動ヨリ發スル者ハ阿芙蓉甚ダ驗アリ然レ其粘液或ハ酷厲液ハ虵蟲等胃中ニ滯著セルヨリ發スル者多シ是ニ阿芙蓉ヲ用レバ胃ノ運動觸知ヲ減損スル故ニ其消化運輸ノ機轉ヲ失ヒ惡液虵蟲等逾滯著ノ其痛增長ス○或云疝痛ニ數是ヲ服スレバ内藏麻痺ノ化物轉送セズ便秘ヲ爲シ其他險重ノ諸症ヲ發ス○

霍亂腹痛ハ淡稀ノ飲液ヲ多ク與テ膽液ノ酷厲毒ヲ稀釋潤渙ノ吐瀉シ易カラシメ。吐下ノ後速ニ阿芙蓉ヲ與テ其劇症ヲ救ベシ。輕症ハ多ク飲食停滯ヨリ發スル故ニ吐下ノ劑ニテ是ヲ驅除スレバ治スベシト雖モ真ノ霍亂ハ膽液腐敗シ酷厲苛烈ノ毒トナリ胃腸ヲ侵蝕ノ劇痛悶亂擗掣ヲ發シ精力卒ニ虛脱メ斃ルガ故ニ是ヲ用テ其危症ヲ救ナリ

痛風傷冷毒痛此病壯熱ヲ兼ル症ハ炊衝熱ト同シ故ニ阿芙蓉害アリ。然レ其劇痛ニ因リ或ハ久ク替留スルニ因テ神經牽引攣急スルヲ甚ク是ガ爲ニ

發熱煩悶等ヲ發スル者ハ此藥ヲ用テ治スベシ。總
 テ焮衝ノ候ナク虛弱ニ屬スル症ニ良効アリ。但此
 病熱ナク寒性ニノ荏苒タル症ハ阿芙蓉ヲ用ヒズ
 唯刺戟衝動ノ健運強壯ニスル藥劑ヲ的當トス。然
 レ夜分劇痛ヲ發ノ睡ルヲ能ハザル者ハ權ニ阿芙
 蓉ヲ用テ其痛ヲ除クベシ。或ハヒ百葛格安那ヲ加
 或ハ韃爾答越默室ヲ加ヘ發汗ノ殊ニ良其痛遊走
 スル者モ亦阿芙蓉良効アリ。或ハ龍腦。纈草。薄荷油
 等熱性衝動ノ藥ヲ加テ良。此症多クハ患者虛弱ニ
 ノ神經ノ感動甚キニ因リ且表發ノ蒸氣壅塞ノ發

スレバナナリ。○痛風ニ妄ニ阿芙蓉劑ヲ投ノ的當セ
 ザレバ患部拘強攣縮ノ頑麻不遂シ或脚痛ニ是ヲ
 外敷ノ痛増發スル者アリ。故ニ尤戒慎ヲ加フベシ
 頭痛耳痛偏頭痛耳痛ノ焮衝ナク病性沈重潛滯セ
 ル症ハ阿芙蓉効アリ。○痙攣ノ運動ヨリ發スル頭
 痛ハ此藥ヲ膏藥ニ加ヘ患部ニ貼スレバ治ス。○傷
 冷毒ヨリ發スル耳痛ハ阿芙蓉丁幾去爾後ニ出ヅヲ綿
 ニ浸シ耳中ニ挿テ速効アリ。○耳中ノ焮腫痛ニハ
 是ヲ施メ害アリ。一患者耳中焮腫ノ劇痛ス。是ヲ耳
 孔ニ挿テ其痛逾甚ク肢體顫振セリ

齒痛 傷冷毒ヨリ發スル齒痛ハ阿芙蓉一匁ヲ丸ト
 シ其齒ニ挿シ或ハ阿芙蓉テシキタル丁幾テシキタル去爾テシキタルヲ綿ニ濕メ齧
 孔ニ入レ若クハ是ヲ痛アル方ノ耳中ニ挿シ或ハ
 此藥一匁ヲ膏藥ニ和メ患處ノ外部或ハ耳後ニ貼
 ノ効アリ。是レ阿芙蓉ノ酷厲毒ニテ患部ヲ刺戟衝
 動メ其痛ヲ驅散シ或ハ唾涎ヲ湧起メ其毒ヲ排泄
 スルナリ或ハ發泡藥ヲ痛處ノ外部ニ貼シ其毒ヲ
 引泄メ後阿芙蓉ヲ膏藥ニ加ヘ貼メ効アリ○總テ
 嗽衝ヲ兼ル齒痛ハ是ヲ外敷メ嗽痛増發ス
 痙攣諸症 胃痙 荏苒タル心腹痛ノ發止時アハ痙攣
 リ留飲停滯ノ嘔吐ヲ兼ル症

ノ運動ヨリ發スル者多シ此症ハ阿芙蓉良効アリ
 但患人壯實胃中粘液留飲鬱滯スル者ハ先吐劑ヲ
 與テ吐セシメ胃ヲ淨刷メ後是ヲ用ベシ○痙攣ノ
 運動ニ因テ心動悸喘急重訂内科撰要喘急篇小便
 不利小便閉重訂内科撰要尿閉篇大便閉子宮衝逆
 症多ク發スル者多シ皆阿芙蓉殊効アリ但小便閉
 ハヨク其原由ヲ察スベシ痙攣ヨリ發スル症ニ非
 レハ此藥甚ダ害アレバナリ○痙攣ノ運動ニ因テ
 子宮口痙縮シ難産ニ罹ル者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ良
 効アリ

子宮衝逆 此症發作スレバ通例阿芙蓉ヲ用ヒ鎮痙ノ良藥トス。但數發作スル症ニ殊効アリ。稀ニ發ノ患者壯實脉強。顔面貫盈。赤色ヲ帶ル症ニハ害アリ。其他痙攣ニ屬スル諸症。脾病等ノ發作ニモ實症ニハ的當セズ又長服ノ病ヲ根治スル藥ニ非ス。

嘔吐 胃中汚物惡液ナク唯胃ノ攣急逆行ノ運動ヨリ發スル嘔吐ハ是ヲ用ヒテ速効アリ。呃逆モ是ニ同ジ。或ハ龍腦ト阿芙蓉ヲ膏藥ニ加ヘ。若クハ阿芙蓉^{テシキ}幾^カ去^ル爾^ニ温^{タル}毛布ヲ蘸^ヒシ心窩ニ貼^ルノ効アリ。然^レモ阿芙蓉ノミナラズ總テ麻藥ハ刺戟衝動

スルヲ以テ輕キ嘔吐ヲ起ス^{コト}アリ。故ニ胃中停滯アル症ニ用レバ嘔吐ヲ増劇ス。

效嗽 效劇ク^カモ安眠スル^{コト}能ハサレバ患者虛憊ノ諸症増發ス。故ニ此藥ヲ用テ其效ヲ鎮ムベシ。但^レ嗽衝ノ症アル者ハ嗽衝解散ノ後用^フベシ。○傷冷毒等總テ酷厲液ノ肺氣管ヲ衝動^シノ發スル效ニハ阿芙蓉劑良驗アリ。○疫^百效^日ノ初發。病毒惡液過盛ナル症或ハ嗽衝ヲ兼^ル者ハ阿芙蓉害アリ。此症ハ吐劑及^ヒ下劑ヲ用ヒ或ハ粘痰ヲ驅除スル劑ヲ用ヒ大抵病毒去^レモ其效荏苒タル症ハ此藥ヲ一味與^ヘ或

乙百葛格安那ヲ加ヘ用テ良又左ノ方殊効アリ

芙蓉拔爾撒謨丸

乙百葛格安那

阿芙蓉 各十五片

技爾撒謨格洋霍 適宜

右調和メ三十丸トシ二時ニ一丸宛服ス。但其症ノ
輕重ニ隨テ増減ス。○凡胸ノ狹窄ナル人。或ハ呼吸
短促ノ患アル者ニ阿芙蓉ヲ用レバ其症逾増劇ス
○勞瘵様ノ羸瘦病多クハ欬ヲ兼ヌ。此症阿芙蓉劑
ヲ用レバ欬嗽不寐等暫ク快愈ヲ得レト是畢竟死

ヲ促スナリ其故ハ多ク勞瘵ノ患者ヲ觀ルニ貧家
ハ阿芙蓉ヲ用ル能ハズノ欬嗽不寐等ヲ耐忍ビ
日ヲ消ル間ニ自然ノ良能ヲ以テ病毒ヲ諸竅ニ排
泄シ諸症大ニ輕差ヲ得ルアリ然レ其症全治ス
ベキニ非レバ日ニ痰沫ヲ吐キ漸ク罷極ノ終ニ死
然レ疔病ノ進下緩慢ニノ諸症亦劇シカラズ。瘦削ス
ル下骸骨ノ如クナレト死ニ臨テ精神亂レズ。較著
ノ患苦ナシ富貴ノ徒ハ僅ノ患症ニモ耐忍フ能
ハズ。衆醫會議シ每症捷効ノ藥ヲ要メ暫時ノ寛解
ヲ取り或ハ不寐欬嗽ニ堪ザレバ阿芙蓉劑ヲ與テ

一旦ノ輕快ヲ得レバ漸ク慣ルニ隨ヒ服量ヲ加ヘ
 ガレバ効ナク終ニ是ガ爲ニ精力衰弊シ諸症増劇
 シ睡中安カラズ常ニ神思朦昧ノ悒悶シ頭重ク眼
 昏ク呼吸促迫或ハ精神錯亂下利等ヲ發メ死ス○
 或ハ肺瘍ノ酷厲液侵刺ノ效甚キ者ニ阿芙蓉ヲ用
 レバ效差堪易シト雖モ其敗膿壞液ヲ吐キ除ク
 能ハズ鬱積ノ肺ヲ壓迫シ更ニ激衝ヲ生メ呼吸促
 迫シ或ハ其膿肺ノ靜血脉ニ吸收セラレテ血中ニ
 泛濫シ膿熱ヲ増發メ血液逾腐敗シ幾多ノ惡症患
 苦死ニ至ルマデ休メナシ

失血 諸失血ヲ止ルニ阿芙蓉峻効アリ然レバ患者多
 血ニメ失血少キ症ニ早ク是ヲ用レバ瘀血ヲ閉澁
 ノ大害ヲ致シ或ハ其血ヲノ熱沸セシムル故ニ却
 テ失血ヲ増發スルヲアリ下血赤痢等亦此ニ同シ
吐血 此症阿芙蓉良効アリ然レバ多血ノ症ハ刺絡ヲ
 施メ後是ヲ與フベシ○痙攣ノ運動ヨリ吐血ヲ爲
 スト甚ダ多シ此症阿芙蓉尤驗アリ肺藏大ニ攣急
 ノ氣管喉頭ヲ衝動シ效休メノ吐血スル者ハ甚ダ
 危篤トス此症亦阿芙蓉良効アリ○神思ノ勞動ニ
 因リ或ハ子宮衝逆ヲ兼ル吐血ハ胃腸ニ鬱滯セル

汚液ヲ疏滌ノ後。是ヲ用テ捷効アリ。○痔血或ハ月經等閉滯スルヨリ吐血ヲ發スル。亦多シ。痔血壅滯ヨリ來ルハ此藥ニ硫黃ト苦鹽瀉利鹽。芒硝。霸王鹽。孕礬。酒石ノ類ヲ加ヘ用ヒテ其痔血ヲ通メ治スベシ。經閉ヨリ來ルハ經血ヲ通シ兼テ肺病ヲ治スル藥ヲ用フベシ。假令バ沒藥。瓦爾。技奴。謨。雜腹蘭ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用ルガ如シ。皆良驗アリ。

嘔血 此症ハ阿芙蓉ヲ桂ノ製劑桂ノ露水。丁香。幾生。加ヘ用テ其危篤ヲ防キ或ハ適宜ノ強壯劑ヲ兼用シ或ハ其酷厲液ノ侵刺衝動ヲ緩和シ血絡ノ破綻

ヲ收斂スル藥ヲ加ヘ用ベシ。假令バ左ノ方ノ如シ

芙蓉桂麥飲

桂丁香。幾生。 二錢

大麥煮汁 六勺

舍電發謨。阿芙蓉液 一錢

薄荷。舍利別 六錢

拳參根。越幾斯劑 二錢 製法。健實。亞那。越幾斯劑ト同ジ

右調和シ四分時ニ一匙宛用ヒ。其症治スルニ隨ヒ服量ヲ減スベシ。○嘔血ニ大熱ヲ兼子或ハ血液腐敗ニ進ニ殊ニ患者熱性ニノ膽液過多ノ候アルハ

右ノ劑ニ明礬少許ヲ加ヘ或ハ收斂亞的兒アールノ條テヲ加ヘ用ヒテ大効アリ

婦人崩漏崩漏ニ子宮衝逆ノ症ヲ兼ルハ阿芙蓉良効アリ。殊ニ脉數ニノ牽縮シ。顫振痙動。罷勞困倦。手足冷テ血。大ニ子宮ニ走注スル症ハ前サキノ芙蓉桂麥飲。峻効アリ○崩漏已甚ナク且連絲ノ歇トマザル症ハ阿芙蓉ニ明礬ヲ加用ヒ或ハ阿芙蓉ヲ越栗失爾エリキ楮ヒツト篤立リ沃利リ條ニ溶トカシ用テ速効アリ但此症數日暫留スレバ危篤ニ至ルガ故ニ收斂鐵液鐵ノヲ用テ速ニ閉止スルモ亦良○產後崩漏ノ治法モ亦右ノ如

シ。痙攣ノ運動ヨリ來ル崩漏ハ阿芙蓉殊道効アリ

赤痢下利 赤痢ハ通例膽液熱或ハ傷冷毒ヨリ發ス

ル者居多ホホ膽液腐敗シ酷厲毒トナリ熱病ヲ發ス是傷冷毒内鬱ノ腸ヲ侵此症ハ胃及ビ腸ニ鬱蓄セル醜厲腐敗ノ毒ヲ滌除ノ後阿芙蓉ヲ用テ腸ノ攪擾感觸ノ甚キヲ靜止シ且表發ノ蒸氣ヲ排泄ノ殊効アリ○大抵痢ノ初發ニ於テ炮大黃ヲ加ル下劑ヲ用テ腸ノ汚物ヲ淨刷シ爾後阿芙蓉劑ヲ用テ腸ノ攪擾ヲ靜止スベシ○炊衝熱ヲ兼子或ハ病毒汚物胃腸ニ鬱積セルヲ驅除セズ早ク阿芙蓉ヲ用レバ

腸ニ焮衝ヲ生シ精力速ニ脱缺ノ死ス。故ニ此病ニハ最モ戒慎ヲ加フベシ。○然レ疝惡性ノ痢ハ酷厲腐敗ノ毒甚ダ夥キ故ニ隨テ下セバ隨テ聚リ。日夜努責下注ノ休歇ノ期アルヲナク患者遂ニ虚脱ノ斃ルカ故ニ速ニ多ク阿芙蓉ヲ與ヘテ其精力ヲ保護スベシ。假令ハ阿芙蓉十二匁許モ一晝夜ニ用フベシ或ハ桂露亞刺比亞麴漿ニ溶シ用テ尤良。○或ハ發熱下利腹痛等ノ發止増減スル症アリ。多クハ夜分増劇シ朝ハ寛解ス。此症ハ毎夜發作ノ初ニ阿芙蓉ヲ與フベシ。○或ハ腹痛發止ナク連綿ノ休ザル

症ハ此藥ヲ以テ少許宛頻々ニ與フベシ或ハ左ノ方良驗アリ

芙蓉定痛飲

- 默粟薩水 四匁
 - 亞刺比亞麴末 二匁
 - 阿芙蓉 二匁
 - 阿利襪油
 - 過爾託亞舍利別 各四錢
- 右調勻シ半時ニ一匙宛用フ
- 下利ニ發熱焮衝ヲ兼ルヲナク數日休マザル症

風雲堂藏

ハ動モスレバ爾後發熱シ次テ諸症ヲ發スルヲア
 リ。此症ハ初起未ダ發熱セザル時ニ於テ阿芙蓉劑
 ヲ用ヒテ其下利ヲ治スベシ。○傷冷毒ニ由テ蒸發
 氣ヲ壅遏シ痢疾ヲ發スル者多シ。此症ハ阿芙蓉一
 味少許宛用ヒ或ハ乙百葛格安那。亞刺比亞。越謨等
 ヲ加ヘ用ヒテ良効アリ左ノ方尤良

越謨芙蓉散

亞刺比亞越謨

甘草 各四月

乙百葛格安那 四匁

阿芙蓉 二匁

右散劑トシ分テ八服トシ一時ニ一服宛飲液ニテ
 送下ス。○凡ソ下利ハ初發ニ下劑ヲ用ヒ病毒ヲ滌
 除ノ後。治セザル者ハ阿芙蓉劑ヲ與テ下利ヲ止メ
 患者ヲ安眠セシメテ治スベシ。但下利及痢疾共ニ
 病毒惡液漸次ニ腸ニ聚リ鬱積スルヲアル故ニ此
 藥ヲ連服スレバ其毒ヲ閉澁スルノミナラズ
 其熱性ノ沸蒸ヨリ風氣ヲ生メ胃腸大ニ膨脹シ或
 ハ腸ニ激衝ヲ生メ熱壞疽トナリ。腹滿煩燥ノ死ス
 ル者少カラズ。故ニ其病毒ノ鬱滯ニ意ヲ用テ時々

下劑ヲ兼用シ或ハ阿芙蓉ヲ投メ諸症減セザル者
ハ仍^ホ病^ホ毒鬱滯ノ候トシ更ニ下劑ヲ與フベシ。能ク
胃腸ヲ淨刷メ後。少許是ヲ用^レハ其學急速ニ緩弛
シ痞氣自ラ消散シ腹脹亦隨テ治ス

阿芙蓉加下劑 凡阿芙蓉ヲ用レバ大便秘結ヲ患^ル故
ニ頑固ノ劇痛アル諸病ニ用ヒテ便秘スル者ハ是
ヲ下劑ニ加ヘ用フベシ。一婦人子宮ニ癌様ノ潰瘍
ヲ生シ。穢液浸淫流泄ノ劇痛ニ堪^タズ。阿芙蓉ヲ用レ
バ便秘ノ腹滿ヲ患フ。因テ左ノ劑ヲ製シ用ルニ其
痛消メ安眠シ。大便ヨク通利メ殊効ヲ得タリ

芙蓉旃那飲

旃那葉

三錢

右水適宜ニ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ。漉過メ其液六^三
ヲ取り左ノ藥ヲ加フ

覆盆舍利別

一^三

舍電發謨阿芙蓉液

四^月

密涅刺爾鎮痛液

二^月

右調和シ一時ニ一匙宛用フ。但其症ニ隨テ加減ス
間歇熱患者天質薄弱若クハ衰老ノ人。惡性ノ間歇
熱ニ罹^カレバ動^ヤモスレバ速ニ危篤ニ至リ死スル者

アリ。此症ハ揮發衝動ノ藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用レバ峻効アルキナ幾那ニ勝レリ。○胃腸ニ粘穢惡液鬱積セル諸症嘔噦不食口苦舌苦心下痞硬腹滿便閉等アリ或ハ發作ノ熱過多キナノ焮衝ノ候アル者ハ阿芙蓉ヲ禁ス。○發作ノ初起惡寒戰慄アレキナ是ニ對抗スル大熱ヲ發セズ。脉小ニノ振惕動スル症ハ阿芙蓉ヲ用テ大効アリ。○患者間日ニ於テモ肢體大ニ勞倦シ精力虛乏ヲ覺エ動モスレバ眩運シ汗ナク小便黧澹色。或ハ神經熱様ノ諸症ヲ發シ。幾那キナヲ用レキナ効ナク。或ハ一處ニ著ツイテ變移セザル疼痛アリ。或ハ痙攣運動

ノ諸症アル者ハ是皆神經ノ感動スルキナ甚キ候トス。斯ノ如キ症ハ其初惡寒ノ時服量稍多ク阿芙蓉ヲ與レバ治スルキナ速ナリ。或ハ是ヲ揮發衝動ノ藥續草山奈昆荅刺越兒發桂。肉豆蔻鹿角鹽龍腦麝香等ニ加ヘ發作ノ四分時前ヨリ半時毎ニ用ヒテ其熱盡ク解散スルニ至ルベシ。其熱ナキ間ハ幾那キナヲ用ヒ或ハ幾那ニ阿芙蓉及ビ金硫黃ヲ加ヘ用ヒテ峻効アリ。

神經熱 神經熱ノ患者疲勞倦卧ノ睡ルキナ多キ症ハ阿芙蓉キナ的當セズ然レ其症變ノ神思ノ感動甚ク。精神醒了。夜間歌キナトノ睫ヲ交ヘズ。物響光輝ノ耳目

ニ徹スル^ニ太甚^ニ脉疾數^ニ牽急^ニ肌膚乾燥スル等ノ症
 ナ見ハス者ハ是レ痙攣ノ運動ヨリ發スル症ニ
 阿芙蓉良驗アリ○遷延神經熱ハ阿芙蓉總テ的當
 シ害アル^ト稀ナリ。此病最モ險重ニ至リ痙攣ノ運
 動ニ因テ不寐煩悶譫語脉小弱皮膚乾燥スル症ハ
 此藥殊ニ驗アリ○總テ遷延緩慢ナル神經ノ諸症
 及ビ虛弱ニ屬スル痙攣搐掣ノ諸症ハ此藥偉効ア
 リ○神經熱及ビ腐敗熱重訂内科撰要及本ノ患者
 虛脫衰弊ノ焮衝及ビ肢節痛ヲ兼ル者ハ阿芙蓉ヲ
 用ヒテ効多シ

胃腸熱

胃及ビ腸ニ腐敗酷厲ノ毒アリテ發スル熱病ナリ。重訂内科撰要熱病篇第十五章第十

六章ニ出此病。壯熱焮衝ノ症アル間ハ阿芙蓉的當セズ
 吐劑或ハ下劑ヲ用ヒテ胃腸ヲ淨刷スベシ但其病
 未患者虛憊ノ下利ヲ發シ或ハ既ニ病毒ヲ驅除ス
 レ^レ治セズ虛罷ノ神經熱トナル者ハ此藥ヲ用ヒ
 テ良効アリ

焮衝病重訂内科撰要黃疸篇第六十七章ニ註ス 焮衝熱ノ患者壯實ニ
 ノ疼痛アル症ニ阿芙蓉ヲ用レバ其症逾增長ノ譫
 語或ハ昏睡等ヲ發ス。但劇症退キ脉和シ漸ク蒸氣
 ヲ發メ遍體津潤アリ。舌苔去リ小便多ク通利スル

ニ至テ唯感觸甚クノ不寐苦煩疼痛等ヲ患ル者ハ
 此藥ヲ與ヘテ良驗アリ○焮衝熱ニ數刺絡ヲ施シ
 或ハ清涼下劑等。法ノ如ク用レテ其脉仍強ニノ牽
 急。肌膚燥キ小便黦澹色ナル者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ
 其痙攣ノ運動ヲ靜止メ治スベシ

腦焮衝

重訂内科撰要精神錯亂篇第百三十三章ノ腦膜焮衝是ナリ

此病ハ阿芙

蓉害アリ。但適宜ノ通利アレバ痙攣ノ運動ニ因テ
 病勢依然トメ減セズ譫語等休マザル者。或ハ脉小
 ニ弱肢體顫振聾動シ元運氣ノ沈垂乏弱ナル症
 ハ此藥ヲ用ヒテ良効アリ

胸脇焮衝。肺焮衝

重訂内科撰要胸脇痛篇第百八十七章。肺痛篇第百八十七章ニ出ヅ

此焮衝劇盛ナル者ハ阿芙蓉害アリ。但刺絡ヲ施シ
 清涼和解ノ劑ヲ用ヒテ其劇症解散スレバ脉小ニ
 ノ牽急シ。疼痛煩悶休ザル者ハ是痙攣ノ運動仍解
 セザル候トス阿芙蓉ヲ用ヒテ其痙攣ヲ靜止シテ
 治スベシ○其焮衝解散スレバ嗽劇クノ休ザル
 ハ此藥殊ニ効アリ○咽喉焮腫ニ阿芙蓉ノ効アル
 亦右ノ諸症ト同シ

胃焮衝

胃及ビ腸焮衝ノ症治。重訂内科撰要心腹痛篇第百三十三章ニ註ス

此病。胸脇焮衝。肺焮衝ニ比スレバ阿芙蓉ヨク適應ス。初發焮

衝ノ劇盛ナル諸症退ク疾ハ速ニ是ヲ用ヒテ其疼
 痛攣急等ヲ靜止スベシ。此病ハ亞刺比亞アラビア越ゴム謨ム漿及
 ビ汞劑規甘汞等ヲ加ヘ用ヒテ殊ニ良。又病末ニ至
 テ患者感動甚ク。痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症多者
 ハ此藥尤ト的當ス。○腸焮衝ニ此藥ヲ用ル標的亦右
 ノ焮衝ト同シ

肝焮衝

重訂内科撰要 哕逆篇 第百五十二章ニ出ヅ

患者虛罷ノ痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症ヲ兼ル者
 ハ此藥良驗アリ凡、肝焮衝ハ是水銀劑加用テ効多シ

黃疸

痙攣ノ運動ヨリ膽液管攣急ノ黃疸ヲ發スル

者多シ

重訂内科撰要 黃疸篇 第六十五章ニ出

或種々ノ起因ヨリ攣急

ヲ發ノ黃疸險重トナル者亦少カラズ。斯ノ如キ症

ハ阿芙蓉殊効アリ總テ焮衝壯熱ナク患者虛弱ニ

ノ拘攣掣急ノ症

即、痙攣ノ運動アル

黃疸ニ用テ良効アリ

腎焮衝

重訂内科撰要 尿閉篇 第三百二十二章ニ註ス

此病モ亦法ノ如ク

治療ヲ施シ焮衝大抵退キ唯患者罷勞ノ痙攣ノ運

動ヨリ發スル患症アル者ニ此藥ヲ用ヒテ殊効アリ

○腎膀胱尿道ノ焮衝痛及ビ結石アリテ焮衝痛ス

ル者ハ一兩回刺絡ノ十分瀉血シ少モ焮衝ノ恐レ

ナキニ至テ甘和ノ藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用ヒテ速効

アリ。左ノ方亦驗多シ

芙蓉消厲飲

阿利襪油 新着

白罌粟舎利別

斯百兒麻攝的

雞子黃

三個

各二勺

二錢

右研和シ四分時ニ一匙宛用フ。但其症ニ隨ニ加減ス
焮腫眼 初發焮腫劇キ時ハ此藥ヲ施メ害アリ。但其
焮腫減スレバ其痛解セザル者ハ是ヲ眼劑ニ加ヘ
外敷メ良驗アリ。或ハ加羅蔑兒若クハ韃爾答越默

室^チ或ハ龍腦ヲ加ヘ施メ尤良。又左ノ方峻効アリ

點眼芙蓉乳

龍腦

五瓦

甘扁桃

二錢

右水適宜ニ加ヘ細ニ搗テ乳白色ノ液ト爲シ。漉過
シ此液四勺ヲ取テ左ノ藥ヲ加フ

鉛糖

七瓦

舎電發謨阿芙蓉液

四十滴

亞鉛華

一月

右研和シ是ヲ四襲ノ布ニ濕メ眼ニ貼シ數更換ス

狂癩患者壯實ニノ脉強盈。狂躁強暴荒亂劇盛ナル
 症ハ刺絡或ハ吐下劑ヲ施シ其後狂症仍休ヤガレ者
 ハ阿芙蓉ヲ饒多ニ用ヒテ間大効アリ。但神經衰弱
 ノ諸症アル者尤効多シ。○神思ノ擾動。恐怖。驚駭。怒
 慍。懊恨等總テ思慮ノ抑遏鬱結ニ由テ沈黙憂悶シ
 狂錯スル症ハ此藥効多シ。但是ヲ用ヒテ十分熟睡
 スルニ非レバ驗ナシ。故ニ漸ク服量ヲ加テ一日或
 ハ其餘モ與フベシ。○此藥。癩ニ用ヒテ驗多シ。然レ
 亦服量多カラザレバ効ナシ。但是ヲ用ヒテ的當セ
 ガレバ發狂スル者アリ

胎産 阿芙蓉ハ孕婦産婦及ビ産後乳婦ノ諸症ヲ治
 スル一良藥トス。○孕婦。神經ノ感動甚キ者。輕キハ
 惡阻ヲ爲シ重キハ頭旋昏眩等ヲ發ス。此ハ阿芙蓉
 ヲ揮發香竄ノ藥ニ加ヘ用ヒテ捷効アリ。此症殊ニ
 甘消石精良驗アリ。○孕婦ノ墮胎シ易キハ多クハ
 子宮ノ感動甚キヨリ發ス。是ヲ防護スルニハ幾キ那
 ニ阿芙蓉ヲ加ヘ大抵受胎ノ後三月頃ヨリ毎日少
 許宛用ヒ漸ク子宮ノ感動ヲ鎮定メ臨月ニ至ルベ
 シ。○臨産ノ婦人ハ適宜ノ時節ニ阿芙蓉ヲ用レバ
 ヨク難産ヲ防護ス。其故ハ子宮ニ攣急ヲ發メ逆換

ノ運動ヲ爲シ兒頭ノ常位ヲ變セシメ。以テ難産ヲ致スガ故ニ阿芙蓉ヲ用ヒテ預メ其痙攣ヲ鎮定スレバナリ○此藥ハ分娩ノ陣痛ヲ進起ノ催生シ又産後ノ腹痛ヲ靜止スルニ驗アリ是其効相反スルガ如シト雖モ其拘攣ヲ緩解スルニ於テハ一ナリ

痘疹 虚痘ハ總テ阿芙蓉良驗アリ。患兒虚弱ニメ痘色黦澹或ハ陷塌スルニ尤モ良○惡性ノ痘ヲ驅發スルニ龍腦ヲ加ヘ用ヒテ峻効アリ○血液ノ運行怠慢乏弱ニメ痘發越シ難ク或ハ發メ起脹セス或ハ善膿ヲ醸シ難キ等皆此藥ヲ用ヒテ尤モ良○但灌膿

ノ時。膿熱甚クノ内藏焮衝ノ候アル者ハ此藥大ニ害アリ。此症ハ下劑ヲ用ヒ内部ヲ疏通ノ壅滯セシメザルヲ肝要トス○痘毒過多ニメ熱多キ症ハ刺絡ヲ的當トシ阿芙蓉ヲ禁ス。但刺絡ヲ施シ或ハ吐下劑ヲ用ヒテ瞑眩甚キ者ハ此藥ヲ用ヒテ其諸症ヲ鎮定スベシ○或云。痘色灰白陷塌スル症ハ是水銀劑ニ加ヘ用ヒテ効アリト。然レ水銀劑ハ血ヲ焯解メ稀薄ナラシメ宛モ險痘ノ血液腐敗メ焯解セルガ如ク爲ス故ニ妄ニ是ヲ用ヒ難シ○麻疹ハ其壯熱焮衝去テ後。效嗽劇クメ休ザル症ニ此藥ヲ

和胸劑ニ加ヘ用ヒテ捷効アリ

黴毒 往古阿芙蓉ヲ黴毒ノ諸症ニ用ヒテ良効ヲ稱スルヲ宛モ水銀ノ如ク殆ト黴毒ヲ治スル藥ノ如クス。晩近ニ至テハ唯其毒肢體各部ニ著テ疼痛ニ堪ザルヲ治シ或ハ陰頭包皮罽丸等ノ劇キ腫痛ヲ止ルニ用フ○黴毒ニ多ク水銀劑ヲ投メ後各部疼痛ヲ發シ或ハ夜中其疼増發シ荏苒トメ解セザル症。或ハ患者虚憊ノ痛ニ耐ザル等ヲ治スルニ用フ
佝僂 小兒稟賦薄弱ニメ佝僂ノ候アリ或ハ腺腫瘰癧アリテ下利ヲ發スル者ハ制酸土質ノ劑。鐵劑幾

那劑等其症ニ隨テ擇ニ。是ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用ヒテ殊効アリ

水腫 凡ソ水腫ニ痙攣ノ運動ヲ兼ル者ハ阿芙蓉間大効アリ或ハ是ヲ驅水ノ峻藥ニ加ヘ用ルモ良。又能ク發汗ス○或ハ峻攻ノ驅水藥ヲ投メ劇痛ヲ發スルニ用フ○阿芙蓉一匁ニ芫菁末半匁ヲ加ヘ丸藥トシ一服トシ朝夕一服宛水腫ニ用ヒテ驅水ノ峻藥トス。間良効アリ

癌 此瘡治シ難シト雖モ唯其劇痛ニ堪ザル片ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ暫ク其痛ヲ除クノ云。是宛モ醉人ノ

痛痒ヲ知覺セザルガ如シ○或云乳癌其他癌様腐爛ノ潰瘍劇痛アル症ニ數阿芙蓉ヲ内服シ或ハ外敷スレバ其痛大ニ寛解スレバ藥氣消スレバ復痛
 云其瘡增長シ或ハ惡症ヲ發シ畢竟死期ヲ促スト
 狽僂屈狽僂屈ハ重訂内科撰要第百二章ニ註此病ス又口中轉屎篇第二百五十四章ニ出此病
 腹筋攣急牽縮シ或ハ腸ノ位置ヲ失ヒ緊搾スルニ
 因テ嘔吐呃逆等ヲ發シ少モ焮衝ノ候ナキ者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ良驗アリ然レ痞氣鬱蓄或ハ大便閉滯或ハ腸ノ下墜突出甚キヨリ右ノ諸症ヲ發シ或ハ腸ノ膨突緊搾ノ焮腫スルヨリ發スル者多シ此

症ハ清凉瀉下ノ吉利詞參兒ヲ施シ疏滌メ治スベシ。是ニ阿芙蓉劑ヲ用レバ其壅塞焮腫等ヲ増發ノ寒壞疽トナリ死ス或云狽僂屈ニ此藥ヲ用レバ其絞痛及ビ呃逆増劇ス又云一患者腸狽僂屈ニ因テ腸ニ焮衝ヲ發ス。一外科手術ヲ以テ其挺突セル腸ヲ腹内ニ納テ本位ニ復スルニ因テ其痛大ニ減ス。是ニ阿芙蓉ヲ與レハ忽チ大腹痛ヲ發メ言語蹇澁シ半日許ニメ死ス是皆審ニ其因症ヲ察セザレバナリ○陰囊ノ狽僂屈漢人所ヲ收納ルニ就テ痛ニ謂癩疝堪ズ或ハ其痙攣ノ運動ヲ鎮定スルニ阿芙蓉ヲ破

氣驅風ノ藥ニ加ヘ用ヒテ良驗アリ。又此症左ノ方殊効アリ

荷蓉定痛飲

薄荷水 四勺

舍電發謨阿芙蓉液 二十滴

密涅刺爾鎮痛液 一錢

右調和シ一匙宛用ヒテ半時二十匙許用ヒ。其症全愈スルニ至ルベシ頑固ノ症ハ阿芙蓉液ノ量ヲ加フベシ

石淋痛 此病ノ劇痛ヲ止メ攣急ヲ弛メテ輸尿管膀胱

胱ニ懸留セル結石ヲ導下スニ阿芙蓉液五十滴ヨリ六十滴マデ用フ。少許用レバ却テ攣急ヲ増ス

犬咬傷 咬傷ニ瘞ヲ發スルハ死候トス然レ阿芙蓉

ヲ用ヒテ間奇効アリ。初メ少許宛用ヒ漸ク加テ半

時ニ一匁宛用フベシ。○此病嚙下ヲ妨ハ咽喉焮衝ニ

因ズノ瘞攣ニ係故ニ阿芙蓉丁幾去爾即チ阿芙蓉液ナリ

油ヲ加ヘ口顎頸等ノ肌膚ニ塗テ良効アリ。○或云。

速ニ其創口ヲ切斷ノ是ヲ用サレバ効ナシ。○或云。

犬咬傷。蝮蛇咬等ニ的里亞加其他阿芙蓉劑ヲ内服

シ或ハ外敷ノ奇効ヲ稱スル。古今定説ノ如シ。是

ヲ研究スルニ凡、阿芙蓉劑ヲ其創ニ外敷スレバ專
 ヲ侵刺衝動ノ膿ヲ釀シ其毒ヲ排泄ス。内服スレバ
 發汗ノ其毒ヲ血中ヨリ驅發スルニ因テ良驗ヲ得
 ルナリト

創傷 神經ヲ毀傷シ或ハ骨傷ノ碎骨侵刺シ或ハ壞
 疽ノ肢節ヲ截斷シ或ハ結石ヲ截出ス等ニ因テ疼
 痛ニ堪ズ若クハ瘧ヲ發スル者ハ阿芙蓉。服量稍多
 ク用ヒテ是ヲ鎮定スベシ○創ヲ被リ瘧ヲ發メ牙
 關緊急スル者ハ危症トス間阿芙蓉ヲ用ヒテ救フ
 一アリ○或云。創ヲ被リ失血過多ニノ瘧ヲ發スル

者ハ此藥ヲ用ヒテ効ナシ其出血止ム片ハ滋養ノ
 肉羹汁及ビ葡萄酒ヲ與テ患者ノ精力ヲ回復シ治
 スベシト○或云。骨傷ノ部。焮腫スレバ患者睡リ難
 ク睡レバ驚悸惕動ノ寤メ自ラ患部ヲ動搖スル故
 ニ傷骨相摩シ鳴テ疼痛ニ堪ズ。是ニ由テ未熟ノ醫
 ハ多ク縛帶ヲ施ノ緊禁シ又睡中驚悸ヲ治センガ
 爲ニ阿芙蓉ヲ内服セシム。然レ是ニ由テ諸症逾増
 長シ縛帶ノ緊禁ニ由テ患部遂ニ壞疽トナル者多
 シ此症ハ嚴ニ熱性ノ劑及ビ阿芙蓉ヲ禁シ縛帶ヲ
 緩クシ刺絡ヲ施シ清涼劑ヲ與ヘ飲食ヲ減スレバ

諸症自ラ回復ス○或云。壞疽等ノ肢節ヲ截斷スルニ就テ其一時若クハ一時半前ニ阿芙蓉ヲ用レバ其痛減メ堪易シ但截斷ノ後數是ヲ用レハ害アリ若シ神經多キ部ヲ截斷メ攣急搐掣ヲ發シ或ハ血ノ運行急疾ニメ發熱スル者ハ速ニ刺絡ヲ施シ下劑ヲ用ヒ清涼ノ効アル飲食ヲ與ヘテ治スルヲ尤良トス○或云。壞疽ノ部ヲ截斷スル等ニテ怯弱ノ患者ハ其疼ニ堪ズ或ハ搐搦ヲ發スル故ニ患者ヲ昏睡メ其痛ヲ知覺セザラシムルガ爲ニ阿芙蓉ヲ用ル者アリ。然レモ多ク與ヘ患者ヲメ昏睡メ肢節

ヲ割斷スレモ毫モ知覺ナキニ至ラシムレバ竟ニ蘇復スルヲ得ズ。是ガ爲ニ服量ヲ減スレハ患者速ニ省寤メ其疼ニ堪ズ設使是ヲ用ヒテ其功アルガ如キモ爾後創熱ヲ發シ或ハ其創焮腫メ安眠ヲ得ス○或云。肢節ヲ截斷メ後。患者ヲ安眠セシメンガ爲ニ是ヲ用レバ肢體筋惕肉瞤メ眠ルヲ能ハズ稍眠レバ驚悸跳動シ患部焮腫拘攣スル者アリ。此症ハ阿芙蓉ヲ用ヒズ唯刺絡ヲ施シ。清涼下劑ヲ用ヒ。縛帶ヲ緩クスルヲ肝要トス大抵其創焮腫スレハ睡中驚悸モ甚ダシ。是ニ膿ヲ成スハ右ノ諸症

速ニ治ス。其膿ヲ成ス者ハ焮腫既ニ解散スルノ候
 ナレバナリ按ニ脱血ノ瘰癧ヲ發スル症ハ血液ヲ滋
 補シ治シ多血焮衝ニ屬スル症ハ刺絡
 清涼ノ劑ヲ施シ疏滌ノ治スベク概
 ノ阿芙蓉劑ヲ用フベカラザルヲ云

外敷拈套

阿芙蓉ハ蒸湯劑。芭布軟膏。硬膏ニ加、外敷

メ諸疼痛ヲ止ム。芭布ニ加、貼スレバ乾燥セズ凝結

ヲ疏散スルニ良効アリ○大麥粉ニ阿芙蓉水水ハ

精製阿芙蓉三錢ヲ和シ潰瘍ノ水綿様肉ニ傳テ

溶化スル液ヲ云

ヨク消化ス○精製阿芙蓉出次ヲ亞刺比亞アア護アア漿アア或

阿利襪油ニ和シ外敷ノヨク痛ヲ止メ焮腫ヲ消ス

尿道ノ焮腫ハ水銃ニテ是ヲ尿道ニ注輸メ其痛ヲ

止ム按ニ阿芙蓉ヲ外敷ノ害アル説前ノ禁戒ノ條
 ニ記ス如シ然レ是麻痺催睡ノ藥ニノ知覺ヲ

奪去シ又侵刺衝動ノ凝結ヲ疏散スル藥ナレバ外

敷ノ輕淺ノ焮腫疼痛ヲ治スベキニ論ナシ然レ病

毒惡液過多ニ焮腫甚キ者ハ外敷ノ麻藥ヨク消

散スベキニ非ズ其熱性刺戟ノ所爲ニテ熱腫痛

ヲ增長スルノ故ニ患者ノ體質病毒ノ多少

諸症ノ輕重ニ隨テ功害相反スト知ルベシ

阿芙蓉。吉利詞。爹兒。阿芙蓉ヲ服スレバ嘔吐メ用ヒ

難キ者ハ是ヲ吉利詞爹兒ト爲シ施メ効ヲ取ル

アリ。但其藥液少許ヲ注入メ長ク腸中ニ留メ置ク

ヲ專要トス。速ニ漏泄スレハ効ナシ。又粘滑ノ藥ヲ

加テ阿芙蓉ノ刺戟衝動スルヲ緩和スベシ假令バ

左ノ方ノ如シ

芙蓉吉利訶爹兒

阿芙蓉アインキタール丁幾テタル去兒

四十滴

亞刺比亞アラビヤ越ゴム護

三錢

温湯 三弓

右越ゴム護ムヲ湯ニ溶カシテ丁幾アインキタール去兒タルヲ加へ。吉利キリ訶ス爹テ兒タルト

鳥スリ注輸ニテスルナリヨ。但シ阿芙蓉アインキタールヲ吉利キリ訶ス爹テ兒タル劑

ニ加へ數ニ注ニ入ルノ昏睡スル者アリ故ニ戒慎スノ施ス

ベシ

遠西醫方名物考卷十七終

