

遠西醫方名物考

幾四

卷二十一

武
857
45-22

早稻田大學
圖書部
寄託書目內文庫
寄託書第一卷七號
第 9 號
第 22 冊



武部 857
45-22

榛齋宇田川先生著

八篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

大澤氏
新開

東京
醫學
圖書
印

遠西醫方名物考標目

卷二十二

幾那 四

主治 下

腐敗熱

幾那解毒飲

幾那消毒飲

代用及兼用藥品

幾那華爾斯 ハルス

幾那丁幾去爾 テシキ

大正七年九月廿五日
內田糸子氏贈

風雲堂藏

遠西醫方名物考

卷二十二 標目


風雲堂藏

幾那越幾斯劑

膠泥

爐圖 三種

圖解記號



遠西醫方名物考卷二十二

榛齋先生譯述 男 宇田川榕 榕菴校補

幾那四

腐敗熱諸症。神經熱ニ比スレハ總テ劇盛ナリ初起
惡寒戰慄シ或ハ寒熱交發シ其後壯熱暫留ノ差進
退アリ。頭痛眩暈甚ク。顛顛。眉骨。眼底等。劇痛ノ休マ
ズ或ハ眼盈脹スルヲ覺エ。黃色ヲ帶ビ或ハ炊腫ス。
顔色黧澹。瘰然トシ腫脹スルガ如シ。脉小弱ニシテ數。
搏度齊ハズ。壯實ノ人ト雖モ此病ニ罹レバ精力速

遠西名物考 卷二十二 凡書...

ニ缺脱シ。全軀大ニ疲倦シ。腰背支節煩痛シ。神思沈
 垂困重甚ク。手顫筋惕。呼吸不利ノ數。大息シ。心下苦
 悶痞痛。惡心嘔噦或ハ臭穢腐敗ノ膽液ヲ吐シ。氣息
 惡臭アリ。病勢増劇スレハ顛顛動脈。頸動脈。大ニ鼓
 動シ或ハ耳騷鳴ニ堪ヘズ。是レ腦壅塞ノ候ニノ次
 テ謔語ス。舌初ハ白苔生シ漸ク乾燥ノ焦黃黯黑或
 ハ藤花色ニノ黯黒ノ小皰生シ或ハ焦黑燥硬ニノ
 芒刺ヲ現シ或ハ齒黒色ニノ煤ヲ塗ルガ如シ是血質腐
敗焯解ノ斷ヨリ病勢増進スル間ハ煩渴引飲ノ食
滲出スルナリヲ惡ミ味苦シ小便赤濁ニノ稠コキ灰汁ノ如ク。逆ナ

ク臭氣甚シ或ハ青緑色ニメ血色ヲ帶ビ血混スル候トス
 或ハ黒色ヲ帶ブ血腐敗ス候トス或ハ胸中壓迫苦悶呼吸
 不利劇クノ宛モ肺焮衝ノ如シ。但肺焮衝ハ效劇シ。
 腐敗熱ハ效ナクノ精力速ニ缺脱シ神思沈重。手顫。
 筋惕。或ハ發斑アルヲ以テ知ルベシ。○此病ハ脉小
 弱。精神沈垂。大小便臭氣甚ク。或ハ鉛色。藤花色等ノ
 發斑或ハ失血ノ症アルヲ以テ焮衝熱ト分別シ。又
 諸症劇盛ニノ熱多ク。煩渴。舌黃黑苔アルヲ以テ神
 經熱ト分別スベシ。或ハ焮衝熱。神經熱。腐敗熱。多必
 兼併セル症アリ。斯ノ如キハ症候甚ダ交錯ノ診決

シ難シ。故ニ預メ各種ノ病性ヲ習知メ兼併ノ標本
 輕重ヲ察スベシ。○疫毒直チニ精氣及ビ神經ニ襲
 入スル症アリ。其候初發ヨリ精力暴脱シ顫振騷動
 甚ク。頭痛極テ烈ク。精神昏瞶。煩躁。譫妄。昏睡等ノ危
 症ヲ發メ死ス。或ハ毫モ病患ナキ人。卒然トメ疫氣
 ニ襲撃セラレテ暈倒昏睡シ宛モ雷ニ震死セル如
 ク斃ル者アリ。是レ疫氣直チニ精氣ニ襲入スルノ最
 モ迅速ナル者ナリ。○此病多ク發斑ス。其斑青色。鉛
 色。黑色。藤花色。黯赭色。或ハ綠色ヲ帶ルハ皆惡症ト
 ス。但シ黑斑ト雖モ色澤鮮明ナルハ善徵トス。斑大ニ

ノ黑色。藤花色ナルハ多ク失血ノ兆トス。青黑色。藤
 花色。黯綠色ノ斑大ニメ苔痕ノ如ク且四肢冷テ黯
 黑色ヲ帶ルハ死候トス。黯赭ノ小斑宛モ汗胞ノ如
 キハ惡候ニ非ズ。藤花色ヲ帶タル斑ノ間ニ粟胞ヲ
 發スルハ善徵トス。發斑メ冷汗漏泄シ粘ルハ惡候
 トス。發汗後。斑消メ白色ノ粟胞ヲ發スルハ佳徵ニ
 非ズ。赤色ノ粟胞ヲ發メ痛痒アルハ善候トス。胸肩
 背等ニ大ナル水胞ヲ發シ或ハ鼻唇等ニ赤疹生メ
 疥ノ如ク焮熱痛痒アリ或ハ耳後若ハ腹腿合縫處
 等ノ腺多キ部ニ腫瘍ヲ生スルハ善徵トス。○舌甚

ダ乾燥セズノ黑色ヲ帶ビ或ハ大熱ナクノ煩渴アリ或ハ頭及ビ胸ニ限リテ汗アルハ其病荏苒トノ速ニ解セザル候トス咽喉痛テ嚥下シ難ク或ハ舌苔厚クノ極テ乾燥スレハ渴ナキハ險症トス多クハ譫妄昏睡等ノ神經ノ諸症ヲ繼發ス汗夥クノ惡寒戰慄シ或ハ冷汗多クノ粘ルハ惡候トス小便黑色ヲ帶ビ若ハ黑塗アリテ煤ノ如キハ譫妄昏睡ノ死ス初發多ク水瀉スルハ惡症トス下利甚クノ腹脹シ爪甲青黑四肢冷テ粘汗出或ハ大便臭氣烈ク綠色黑色藤花色ヲ帶ビ或ハ血若ハ膿血ヲ交ヘ腸

痛ノ下利スルハ腸焮衝及ビ壞疽ヲ發スル確徵ニノ死候トス黯赭ノ鶯口瘡ヲ發スルハ危險トス其瘡白色稠密ニノ脂肉ノ如キモ佳候ニ非ズ是ニ由テ嚥下ヲ妨ケ或ハ咽喉腫痛侵蝕潰爛シ或ハ呃逆ヲ發シ或ハ下利ノ血ヲ交ルハ其毒遍ク口中胃腸ニ滋蔓シ壞疽トナル候トス眼光異常物ヲ視ルテ分明ナラズ聲音變シ舌ヲ出ス不能ハズ或ハ四肢冷ヘ内部煩熱ニ堪ヘズノ胸ヲ露ハシ或ハ小便失禁大便稀クノ自利シ或ハ拈衣摸床煩躁ノ數起臥シ或ハ喘鳴鼻煽仰臥肩息或ハ顫振筋惕等神經掣

引ノ諸症甚ク或ハ吐血衄血下血ヲ發シ或ハ津唾
ニ血ヲ交ヘ或ハ汗疹ニ血色アル等ハ皆血液腐敗
シ其酷厲毒。脉管ヲ穿破シ諸器ヲ崩壞ノ精氣奔散
元力暴脱スル候トス○凡、腐敗酷厲ノ膽液多クメ
血質酷厲ナル人疫氣ニ感染シ其毒凝流ニ體ヲ侵
刺スルキハ纖維諸管其刺戟ニ堪ヘズノ自ラ運動
ヲ増發シ血液沸騰ノ壯熱ヲ生シ又其熱沸ニ因テ
血中ニ含メル揮發ノ鹽油。變メ亞兒加利性ノ熱毒
トナリ逾、疫毒ノ虐勢ヲ扶ケテ血質ヲ腐敗崩壞シ
諸惡症ヲ發ス但、纖維剛強血質醇厚ニノ饒多ノ人

ハ其運動充張ノ勢力過多ニノ其熱及ビ諸症モ劇
盛ナリ或ハ血質酷厲ナレハ纖維柔弱弛緩ノ人ハ
其運動充張ノ勢力乏弱ニノ其熱及ビ諸症モ劇盛
ナラズ。病性緩慢ナリ是、神經熱ノ條ニ説ク所ノ神
經熱ト腐敗熱ト合併スル症
ナリ又右兩件ノ體質每人多少交錯ノ一樣ナラザル
故ニ其諸症モ輕重緩急虛實等。每人多少ノ差異ア
リト知ルベシ是、精氣血液ノ各自ノ資稟ニ係ルノ
ミナラズ神經線ノ弛張緩急大小強弱等アルニ因
テ感動觸知ノ差異アルヲ猶琴箏ノ弦ノ弛張緩急
大小硬軟アリテ各自ノ響音ヲ殊ニスルガ如シ○

凡、雲堂藏

焮衝熱ノ初發刺絡スレバ其血鮮紅ニメ冷レバ凝
 固シ硬塊ヲ成ス腐敗熱ノ初發ニ刺絡スレバ其血
 鮮紅ナレ_レ正疏解ノ固結セズ是ニ觸レバ軟脆ニメ
 崩壞ス其後十二時ヲ經テ刺絡スレバ其血青色或
 ハ黯黒ニメ三分一ハ溶解シ膿血ノ如シ或ハ黒塗
 アリテ煤ノ如ク或ハ藤花色若ハ黯緑ニメ溶解シ
 腐敗セル糊ノ如ク且其針口閉合シ難クノ水ノ如
 キ血滲出ス然_レバ疫毒ノ人ヲ害スル_レ極テ猛厲ニ
 ノ速ニ凝流ニ體ヲ崩壞スル_レ是ヲ以テ察スベシ
 故ニ神經精氣モ殊ニ筋纖維ト脉管ニ充張スル_レ

能ハズノ肢體速ニ疲倦シ心藏及ビ脉管ノ機轉虛
 衰ノ血液ヲ健輸スル_レ能ハズ粘稠ノ血ハ自_レ心
 藏ト大幹脉ニ凝聚ノ滯瀦シ溶解セル血ハ支脉ニ
 散渙ス數此屍ヲ剖觀スルニ心藏心耳及ビ心ニ近
 キ大幹ニハ凝血填滿ノ大ニ膨脹シ諸支脉ニハ悉
 ク稀薄ノ血流動ノ敗血漿名義重訂内科撰要熱ノ病篇第六章ニ註ス
 如シ○疫疾流行ノ時微感赤ヲ覺ル人ハ速ニ輕キ
 吐劑ヲ服メ快吐シ次ニ加密列ノ泡湯ヲ饒多ニ連
 服メ其毒ヲ驅發スベシ或ハ幾那ト加密列ヲ水ニ
 浸シ日常ノ飲料トスルモ良是_レ疫ヲ避ル良法ナリ

○大抵疫毒腐敗熱ノ初發。惡心乾嘔口苦舌苔。心下痞悶等ノ胃中ノ諸症ヲ發セザル者稀ナリ。是其感染ノ疫毒腐敗ノ膽液ヲ沸騰セシメテ逾酷厲毒ヲ逞シ胃中ニ鬱蓄メ刺戟シ右ノ諸症ヲ發スル故ニ此症ハ速ニ輕キ吐劑ヲ與テ吐セシムベシ。其毒除ケバ嘔氣自ラ休ム。輕吐劑ハ即乙百葛格安那若ハ海葱蜜等ノ如シ若シ初發ニ是ヲ吐セサレバ其毒鬱蓄メ逾酷厲トナリ血中ニ泛濫メ血質ヲ腐敗シ病患日ニ增長ス故ニ病毒胃中ニ鬱滯スル候アルニハ時ニ拘ラズ吐劑ヲ與フベシ或ハ腐敗液夥ク

胃中ニ壅滯ノ嘔逆ヲ發スル者アリ此亦吐セシムレバ嘔逆速ニ休ム○ヨク其毒ヲ吐メ後嘔氣休マザル者ハ亞爾鮮鹽一錢ヲ橙汁一盞半ニ溶シ桂露一盞。砂糖少許ヲ加ヘ嘔氣休ムマデ少許宛數與フベシ或ハ亞爾鮮鹽ヲ橙汁ニ加ル右ノ如クシ薄荷水ト的里亞加少許ヲ調和シ與ルモ良。是ニ由テ嘔吐速ニ休ム。或ハ三香散卷二十。芙蓉幾那ニ的里亞加ヲ加ヘ琶布トシ胃ノ部ニ貼スルモ良○右ノ如ク其毒ヲ淨掃メ後。又輕キ下劑ヲ與テ胃腸ノ粘穢汚物ヲ驅除スベシ。腹滿便秘等鬱滯ノ症アリ或

ハ大便通スレハ臭穢甚クノ黯黑色ヲ帶ルハ殊ニ
 下劑ヲ的當トス其劑ハ清涼防腐ノ効アル藥ヲ良
 トス。即チ答未林度梅那滿那大黃。酒石英。瀉利鹽。瓦
 老別里鹽ノ如シ。或ハ緩和ノ吉利詞爹兒ヲ施スモ
 良凡熱病ノ初發峻下ノ劑ヲ用テ多ク津液ヲ奪失
 スレバ精力虛脱シ惡症ヲ發スルト固ヨリ論ナシ
 ト雖モ病毒鬱滯ノ症アレバ特ニ初發ノミナラズ
 病中時々輕キ下劑ヲ與ヘ或ハ吉利詞爹兒ヲ施ノ
 大便壅滯セシメザルヲ緊要トス。是ニ由テ血中ノ
 毒モ亦ヨク腸中ニ導泄ス○數此患人ノ屍ヲ剖觀

スルニ肝。膽。膽管。胃。十二指腸ニ黑綠色ノ膽液充滿
 ス。是膽液腐敗ノ酷厲毒ニ即チ腐敗熱發斑熱ノ
 一病因ナリ。夏暑秋炎ノ後一般流行ノ熱病ハ殊ニ
 焚クガ如キ酷厲毒夥ク鬱蓄シ其觸ル所侵蝕ノ前
 說ノ諸惡症ヲ發スルト他ノ猛烈ナル毒ニ減セズ。
 故ニ初發。病毒胃腸ニ壅滯スル候アルハ吐下劑
 關クベカラザル緊要トス○然レ盧會蘇甘沒扭格
 碌斬篤等ノ峻下劑ヲ與レバ其藥ノ酷厲毒ニテ更
 ニ血質ヲ溶解シ津液ヲ崩泄ノ逾危險ノ諸症ヲ發
 ス○此病ハ酸潤清爽止渴ノ飲液ヲ兼用メ腐敗ヲ

防キ燥涸ヲ潤シ熱毒ヲ解シ虚脱ノ精力ヲ回復ス
 ル。尤モ肝要ナリ。○胃腸ヲ淨刷ノ後。激衝ノ候ナ
 ク且諸症増劇ノ患者虚憊スル者ハ幾那及ビ礮性
 酸精出ツニヲ用テ專ラ諸管血液ノ腐敗崩壞ヲ收固
 ノ強壯スベシ。殊ニ酸精ハ收斂清爽ノ壯熱ヲ涼解
 シ燥涸ヲ津潤シ腐敗ヲ遏メ蒸氣微汗ヲ發スルニ
 峻効アリ。患者精力缺脱シ肢體大ニ疲困シ脉小弱
 ニノ數。其熱肌表ヨリハ内部ニ多ク。顔色慘悽。眼鼻
 陷削。舌強拘ニノ苔アリ。或ハ筋惕顫搖神思沈垂譫
 語大便失禁ノ臭氣甚キ等ノ症ハ幾那ヲ用フベシ

是血液腐敗ノ凝體ニ及ビ纖維諸管ノ括約衛固ヲ
 失ヒ焔解崩壞スレバナリ。○幾那劑ハ假令ハ幾那
 二弓ヲ取り水二比半ヲ以テ煎服シ或ハ幾那越幾
 斯劑ヲ用ヒ或ハ幾那煎若ハ其越幾斯劑ヲ大麥煎
 汁ニ溶シ綠礬精若ハ硫黃精燃ノ製スル者ヲ加テ適意ノ
 酸味ト爲シ與フベシ。若シ其味ヲ惡ム者ハ橙汁含
 利別。覆盆舎利別等ヲ加テ甘美ト爲スベシ。凡ソ腐
 敗熱。發斑熱。粟斑熱。惡厲ノ咽喉潰瘍腐敗病ニ惡性
 ノ痘瘡。及ビ痘ノ膿熱劇キ症ハ皆右ノ藥劑ヲ的當
 トス。○腐敗熱。發斑熱。及ビ神經熱等ノ險重ニノ虚

憊甚キ症ハ左ノ方亦殊効アリ。纖維諸管ヲ強壯シ血質ノ腐敗ヲ挽回シ蒸氣微汗ヲ催起ス

幾那解毒飲

幾那 二勺

橙皮 一勺半

攝爾扁答利亞 三錢

雜腹蘭 四勺

燒酒 二十勺

右浸ス_ト三四日。滓ヲ去リ四錢ヲ取り越_レ衆失爾赫_ト立沃利_ト二十滴ヲ加ヘ二時_ト毎ニ適宜ノ飲液若_ハ

葡萄酒ニ加ヘ用フ○凡ソ傳染惡性熱ニ於テ病毒排泄ノ候アレ_レ精力虛衰シ血液腐敗ニ傾クガ爲ニ其排泄ノ機轉甚ダ怠慢ニノ盡ク分利シ遂ル_レ能ハズ諸症荏苒タル症ハ專ラ幾那ヲ用テ精力ヲ補充シ排泄ヲ扶クベシ○膽液熱ノ初發ニハ幾那害アリ_シ膽液熱初發腐敗膽液過多ニノ胃腸ニ鬱滯_シ壯熱等其_レ劇盛ナル諸症ヲ發シ患者未_ダ虛憊セザル症ヲ云_フ此症速ニ治ヒズノ血液腐敗ス_ルニ至_レバ即_チ腐敗熱ナリ故ニ畢竟腐敗熱ノ初症ナ_リ或ハ腹硬滿脇下痞悶或ハ内藏諸器壅結硬腫アリ者ハ皆幾那ヲ禁ス○危險ノ腐敗熱總身發斑ノ鉛色帶黑色若ハ藤花色ナル者ハ左ノ方峻効アリ

幾那消毒飲

幾那 細末 一勺

赤葡萄酒

水 各十勺

綠礬精

適宜

右幾那葡萄酒。水ヲ調和シ綠礬精ヲ滴シ加テ適意ノ酸味ト爲シ用フ其味ヲ惡ム者ハ橙汁舍利別二三勺ヲ加ヘ一時ニ二匙宛若クハ其餘モ與ベシ若幾那未ヲ嫌フ者ハ細ニ剉ニ葡萄酒ニ浸シ用ベシ此劑惡性發斑熱ノ死ニ瀕キ症ヲ救フ一甚ダ多シ

○若シ發斑俄ニ消散ノ内攻シ脉力缺脱ノ譫妄煩躁スル者ハ速ニ發泡膏ヲ頭項窩股ノ内側等ニ貼シ又芥子泥ヲ蹠ニ貼シ葡萄酒並ニ上ニ舉ル劑ヲ饒多ニ與ベシ此病ノ虚脱ヲ挽回スルニハ葡萄酒ヲ最良トス。性緩ニ刺戟セズ。但是ニ枸櫞汁。橙汁等ノ清爽酸涼ノ液ヲ加テ尤良○赤葡萄酒モ亦收斂強壯ノ良効アルヲ以テヨク精力ヲ峻補ス。橙汁若ハ越栗失爾赫篤立沃利少許ヲ加テ適意ノ酸味ト爲シ用ヒ或ハ症ニ隨ヒ桂。橙皮。玫瑰等ノ香竄ノ品ヲ加テ尤効アリ○龍腦ハ疫毒腐敗ノ熱病ニ殊

効アリ。諸症劇盛ニ至リ或ハ病勢漸ク退ク時ニ用テ蒸氣及微汗ヲ發シ又鎮痛和解ノ効アリテ煩悶躁擾ヲ降鎮シ精神ヲ安靜ニシ快寢セシム。但其香氣ヲ惡ム者ハ龍腦清涼飲世部ヲ用ベシ醋ニ龍腦ヲ溶ス劑ハ總テ腐敗性ノ疫熱ニ奇効ヲ稱ス。又龍腦ニ阿芙蓉ヲ加用レバ催睡及發汗ノ良効アリ即鎮痛和胸飲神經熱條出的里亞加テリアカノ如シ酸收潤灌劑ニテ發汗ナキ症ハ殊ニ是ヲ用テ驗アリ○辛熱走竄ノ劑亞兒加利性ノ揮發鹽類酷烈ナル蒸餾精ヲ用レバ刺戟衝動ノ血質ヲ崩壞シ逾腐敗セシム。故ニ

焮衝熱。神經熱ニ熱劑ヲ投メ腐敗熱トナル者少カラズ○總テ疫熱ニハ刺絡ヲ禁ス。疫毒滿肢體ノ血液ニ浸染スル故ニ瀉血メ其毒ヲ減スル一能ハザレバナリ。然レ初發熱勢劇クメ焮衝ヲ兼子。粘稠ノ血。腦若ハ肺ニ壅塞シ。腦焮衝。肺焮衝ヲ發スベキ者。或ハ多血ノ人其熱極テ劇盛ニメ脉絡充脹シ破裂メ血症ヲ發スベキ者ハ輕ク刺絡メ是ヲ防ベシ。否ラザレバ血液逾酷厲ニメ諸部ニ焮衝ヲ發スレバナリ○凡熱病ハ多少ノ汗ナクメ回復スル者稀ナリ。故ニ病勢漸ク退ク時其毒多クハ汗ヨリ排泄ス

此病自然ニ嘔吐シ或ハ下利ノ病毒解散スルコトアレバ蒸氣及微汗ニ由テ排除スルヲ最良トス。故ニ諸症劇盛ナル時若ハ病勢漸退ク時皮膚温ニノ通身適宜ニ發汗シ或ハ微汗數日連綿ノ脉稍緩ヲ帶レバ病患日快復ス然レバ初發ニ發汗スルハ甚ダ害アリ是ニ由テ津液缺乏ノ逾燥熱ヲ加レバナリ故ニ熱性走竄ノ劑ヲ投シ及温覆熱蒸ノ強テ大汗ヲ發スルコト勿レ。唯酸收潤灌ノ飲劑ヲ多ク與テ酷厲毒ヲ浸潤稀釋シ自然ニ發汗セシムルヲ最良トス。是ニ由テ發汗セザルハ輕キ壯神劑及龍腦的里亞加等ヲ兼用ソ是ヲ扶クベシ○病勢漸退ク時大便黃色若ハ赭黃色多ク或ハ輕ク下利ノ腐敗ノ膽液ヲ瀉スルハ善徵トス。宜輕キ下劑ヲ與テ是ヲ扶クベシ是ニ由テ肌膚温ニ潤澤ヲ生シ或ハ微汗ヲ發スルハ尤佳候トス但斑疹及發汗ニ由テ病毒專排泄スル症ハ下劑ヲ禁ス○下利劇キ症ハ幾那ニ桂ヲ加赤葡萄酒ヲ以テ煮テ滓ヲ去リ綠礬精少許ヲ加テ適宜ノ味トシ用ヒ或ハ玫瑰丁幾去爾ニ的里亞加ヲ溶メ與ヘ或ハ赤葡萄酒ニ桂ヲ浸用テ捷効アリ或ハ玫瑰拳參根ノ煎湯ニ的里亞加少許

亞加等ヲ兼用ソ是ヲ扶クベシ○病勢漸退ク時大便黃色若ハ赭黃色多ク或ハ輕ク下利ノ腐敗ノ膽液ヲ瀉スルハ善徵トス。宜輕キ下劑ヲ與テ是ヲ扶クベシ是ニ由テ肌膚温ニ潤澤ヲ生シ或ハ微汗ヲ發スルハ尤佳候トス但斑疹及發汗ニ由テ病毒專排泄スル症ハ下劑ヲ禁ス○下利劇キ症ハ幾那ニ桂ヲ加赤葡萄酒ヲ以テ煮テ滓ヲ去リ綠礬精少許ヲ加テ適宜ノ味トシ用ヒ或ハ玫瑰丁幾去爾ニ的里亞加ヲ溶メ與ヘ或ハ赤葡萄酒ニ桂ヲ浸用テ捷効アリ或ハ玫瑰拳參根ノ煎湯ニ的里亞加少許

ヲ溶シ吉利詞キリス爹兒テイールトシ施スモ良○病勢退時各部潰瘍ヲ發スル者ハ幾那ヲ葡萄酒ニ浸シ綠礬精少許ヲ加用テ尤良○葡萄酒其他壯神劑ヲ用テ脉力稍生シ顫振靜止シ或ハ熱減シ隨テ耳聾スルハ善候トス但耳聾ノ病毒排泄ノ候ナク小便白塗ナキハ病勢仍退カザル候トス○血液腐敗ノ泡釀ヨリ發スル蒸氣腐敗泡釀ノ說重訂内科撰要諸氣篇第五十七章ニ出腹腔ニ痞滯ノ臏脹シ内藏及横膈ヲ逼迫シ肺ヲ壓スノ甚キハ呼吸大ニ促迫シ速ニ是ヲ治セザレバ煩躁ノ死スル者多シ此症ハ布片ヲ冷醋ニ蘸シ腹部ニ貼ノ

殊効アリ一男子年二十五體稟壯實偶腐敗熱ニ罹リ病勢漸ク増劇シ精神恍惚トノ辨識ナク脉細數自汗漏泄シ呼吸促迫腹大ニ臏脹ノ大便自利シ飲食藥劑ニ嚙下スルノ能ハズ唯死ヲ待ツノニ此症布片ヲ醋ニ蘸シ遍ク腹部ニ貼ス乾ケバ速ニ換施スト早旦ヨリ亭午ニ至ル患者精神漸ク醒復シ冷水少許ヲ嚙下シ腹脹及呼吸促迫差減シ脉稍緩ヲ帶フ尋テ前法ヲ施シ冷水少許宛與フ翌朝腹滿大ニ減シ數下利ノ大ニ風氣ヲ放洩シ其熱及諸症寛解ス因テ前法ヲ休メ幾那ノ濃煎ニ綠礬精ヲ加テ

適意ノ酸味ト爲シ服セシメ又時々冷水ヲ與ヘ一月許ニモ回復ス○凡熱病ハ自然ノ良能其毒ヲ排泄センカ爲ニ運動ヲ増起ノ發熱シ酷厲毒ヲ烹醸化熟ノ終ニ沕クイ乙様ノ液ト爲シ發汗痰唾大小便等ヨリ分利ノ遂ニ回復ス假令バ間歇熱ハ自ラ壯熱ヲ發作ノ粘稠液ヲ稀釋シ汗ヲ發シ小便ヲ利ノ其毒ヲ驅除スレバ諸症忽チ解散スルガ如シ又痘瘡ノ如キモ自ラ一種ノ壯熱ヲ發メ其毒ヲ驅發シ了レバ其熱解スルガ如シ腐敗熱發斑熱ニ於テモ亦右ノ如ク其熱暫留スル間ニ漸クニ病毒ヲ烹醸シ

諸竅ニ排泄シ病患回復スル故ニ此病ヲ治スルニ只管寒涼攻撃ノ劑ヲ投メ速ニ其熱ヲ撲滅シ頃ニ血液ノ沸騰ヲ遏止スレバ諸液ニ稟ル所ノ活潑流動ノ性ヲ失ヒ頑然タル膠粘液トナリ病毒ヲ烹醸セズ漸ク變壞ノ臭穢ノ膿血トナリ危險ニ至ルト猶間歇熱ノ頑滯ノ壞液質ノ萎黃病トナリ或ハ痘瘡ノ善膿ヲ烹醸セズノ腐敗スルガ如シ故ニ此病ニ於テモ上ニ舉ル如キ收斂爽涼ノ劑及ビ壯神劑ヲ用テ凝流二體ノ焔解崩壞ヲ收固强健ノ精力ヲ挽回シ病毒ヲ烹熟ノ排除セシムルト一大肝要ト

ス○腐敗熱惡性發斑熱。傳染疫熱。壞疽ノ如キハ皆腐敗病ニ屬ス。咽喉焮腫。痘瘡麻疹。傳染痢等間腐敗ニ罹ル者多シ故其症ニ隨幾那ヲ投ノ多シ良驗アリ

服量散劑ハ一月ヨリ一錢マデ一服トシ毎日數回用フ。煎劑ハ一匁ヨリ二匁ヲ取り水八匁ヲ以テ煮テ滓ヲ去リ半時ニ一二匙宛與フ。浸劑ハ幾那二匁ヲ取り沸湯或ハ冷水或ハ葡萄酒六匁ニ浸シ用フ

代用及兼用藥品性功幾那ト相似タルヲ以テ幾那ニ代用シ或ハ兼用ノ幾那ノ効力ヲ補助スル藥品多シ即チ加密列ハ腐敗ヲ遏メ間歇熱ヲ治スル効幾

那ニ減セズ。散劑煎劑浸劑越幾斯劑トシ。服量幾那ト同シ。珊篤里ハ効力加密列ニ減セズ總テ幾那ヲ用ル症ニ驗アリ但加密列ヲ加ヘ間歇熱ニ用テ尤効多シ越幾斯劑及煎湯トシ用テ下利或ハ嘔吐ヲ發スル者ハ服量ヲ減シ若ハ阿芙蓉劑ヲ加フベシ。葛爾儒別涅實屈室モ亦間歇熱ニ經驗ノ良藥トス。幾那ニ加ヘ用テ腐敗ヲ遏ルニ峻効アリ揚皮ハ華爾斯。酸性鹽。及ビ鐵氣ヲ含フ幾那ノ如クナル故ニ近來經驗ノ幾那ニ代用シ多ク良驗ヲ稱ス。亞兒尼加ハ幾那ノ効ナキ間歇熱ニ良驗多シ。亞兒尼加ノ條ニ出○或

云櫻桃樹ノ中皮。秦皮及封。水揚梅根。菖蒲根。七葉樹皮。幾那ノ効アリ。○幾那ノ揮發ノ性能ヲ扶ク且消化シ易カラシムルニハ揮發香竄ノ藥及ビ苦味閑達。強壯防腐ノ諸品ヲ加ルヲアリ即チ桂。良薑。山柰。菖蒲根。攝爾扁答。纈草。土木香。白芷。橙皮。亞爾鮮。健質亞那。葛爾儒。珊篤里。沒藥。西的兒等或ハ惡性腐敗熱。發斑熱。痘疹。傳染病。ノ如キ腐敗性ノ病ハ收斂防腐ノ峻効アル藥ヲ加テ收斂ノ性能ヲ扶クベシ即チ葡萄酒。綠礬精。硫黃精。海鹽精ノ如シ又其收斂強壯閑達ノ効力ヲ資補スルニハ鐵劑ヲ最良トス。即チ鐵屑鐵丁幾去爾。格碌屈斯。末爾扶斯。

共ニ鐵ノ如シ
條ニ出ツ

幾那。華爾斯

製法 藥刺巴。華爾斯製法ト同シ。○先哲此華爾斯ヲ

分チ取り藥用トスルヲアレ其經驗ノ諸說分明ナラズ故ニ近來用ルヲ稀ナリ

幾那。丁幾去爾。ラインキタラ。キーナ。羅

製法 幾那 細判 一弓

燒酒 二十度者 八弓

右硝子壘ニ内レ浸スヲ六日。漚テ滓ヲ去リ固封シ貯フ。○此劑ハ燒酒ヲ以テ幾那ニ含メル華爾斯

ヲ溶解ノ其効力ヲ出スナリ

主治 間歇熱ヲ驅除シ纖維ノ虛弱ヲ強健スルニ殊効ヲ稱ス○腐敗熱。神經熱。ヲ治シ精力虛脱ヲ復シ險痘及ビ發斑内攻煩悶等ニ奇効アリ○體稟脆弱ニノ感動シ易キ人。頑固ノ間歇熱ヲ患ルニ用テ殊ニヨク其熱ヲ驅除ス但服量多カラザレバ効ナシ

依 **矣**

幾那越幾斯劑

「エキスタラクト。ハンキーナ蘭」

製法

幾那極細末

沸湯

一北
十二北

右合和シ煮ル_一八分時ニノ火ヲ下シ靜定ノ其焔化セザル末。盡ク沈ムニ至リ。上清ヲ分チ取り其渣ニ又沸湯十二北ヲ加ヘ煮ル_一四分時ニノ火ヲ下シ靜定ノ上清ヲ分チ取り毛布ヲ以テ其渣渣ヲ絞リ濾シ。其液ヲ集メ合メ文火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ熬乾ノ越幾斯劑ノ稠ト爲ス **按** 其凝固ノ丸藥ト爲スベキニ至ルヲ軟越幾斯劑ト曰フ。是ヲ慢火ニ上セ。盡ク水氣ヲ乾シ研末スベキニ至ルヲ硬越幾斯劑ト曰フ **依** 云。幾那ノ細末ニ水ヲ加ヘ暫ク浸シスレバ効カ **研** 磨ノ濾シ慢火ニテ其液ヲ熬乾シ製尤モ優ルト **○** 此劑ハ水ヲ以テ煎熬スル故ニ幾那

ノ越謨及鐵土盡ク溶解シ。華爾斯少許ヲ含メリ
 〔主治〕間歇熱ヲ治シ強壯收瀉ノ虚弱ヲ回復スルヲ
 總テ幾那煎ト同。此劑一弓許ヲ取テ少許ノ飲液ニ
 溶シ用ヒ或ハ煉膏若ハ丸藥トシ日用ニ供メ煎煮
 ノ勞ナク卒病救急ノ需ニ應メ甚ダ簡便トス然レ
 煎熬ノ製スル故ニ精微揮發ノ藥氣減耗シ散劑ニ
 比スレバ驅熱壯神ノ効劣レリ或云此劑ハ越謨ト
 鹽氣ト多ク其煎汁ニ出ル故ニ散劑ニ比スレバ防
 腐ノ効尤優レリト

膠泥

「ルテウム」羅

「ルテールセル」又

「レトメン」蘭

硝子及ビ陶製ノ列篤兒多ヲ直ニ武火ニ上セ蒸餾
 スルニハ其外面ニ周ク膠泥ヲ塗ルベシ是ニ由テ
 破裂セズ且溶解スルヲナシ左ノ膠泥ヲ用フベシ
 〔製法〕 陶土篩過ノ細ナ 密陀僧極細末
 右合和シ水ト牛血ヲ加テ稀キ泥ト爲シ是ニ牛毛
 ヲ雜ヘ鳥羽ニテ遍ク塗リヨク乾カノ復塗リ乾カシ
 ノ如ク數塗テ終ニ其泥一拇指横徑ノ厚サニ至リ
 ヲク風乾シ用フベシ。日乾スベカラス。又盡ク乾カ
 ガル片火ニ上ス勿レ

又法 鐵落 瓦 海鹽 各細末トシ

膠水 膠ヲ沸湯ニ溶 牛毛

麥粉 牛血 各適宜

右攪和シ泥ト爲シ塗ル。前法ノ如クス。但漸次ニ乾ス。ナク初ヨリ武火ニ上セ蒸餾スト雖モ其器破裂セス。又此泥。爐ヲ塗ルニ用ヒテ良

○沙火若クハ鐵屑火ニテ蒸餾スルニハ列篤兒多ノ沙若クハ鐵屑ニ内ル際ノ差上部マデ膠泥ヲ以テ塗ルベシ。○承餽壘ノ接際。其他蒸氣ノ透漏スベキ罅隙ヲ塗封シ或ハ列篤兒多ノ外面ヲ塗テヨク

烈火ニ堪テ破裂セシメザルニハ左ノ膠泥モ亦良

製法 陶土或ハ瓦磚ヲ造ル土ヲ取り乾末トシ篩

ヒ水少許加ヘ濕シ置。一夜ニモ馬屎或ハ牛毛少許ヲ雜ヘ。搗テ適宜ノ泥ト爲シ。是ヲ塗テ厚廿小刀ノ背許ニ至ル。若シ燥テ掲起シ或ハ垢紋ヲ生ゼハ手ニ水ヲ沾シ擦テ合封シヨク乾固スルハ遍ク亞麻油ヲ塗ルヘシ。火氣ニ由テ逾堅剛トナル。但油ヲ塗ル。多ケレハ堅剛ニ過テ列篤兒多破裂スルアリ

○承餽壘ノ接際或ハ硝子ノ列篤兒多及ヒ格兒弗

ノ垢痕ニ塗テ蒸氣ヲ透漏セシメザルニハ左ノ泥ヲ用フベシ

製法

生石灰ヲ極細末トシ雞子白ヲ研和メ適宜ノ泥ト爲シ是ヲ布片或ハ紙ニ攤テ貼リ塞クベシ或ハ雞子白ヲ其罅隙ニ塗リ布片ニ生石灰ノ末ヲ摻ケテ速ニ是ニ貼シ其布ノ外面ニ又生石灰末ヲ摻ケテヨク押シ固メ是ニ又雞子白ヲ塗ルベシ乾ケバ甚ダ堅固ニシテ水火ニヨク堪ルナリ

○右ノ膠泥ヨク硝子器ノ垢痕ヲ封固スト雖モ酷烈ニ侵蝕穿透スル藥精假令バ鹿角精硝砂精或

ハ焚烈ナル酸精ヲ内レバ鑽漏スルナリ故ニ是ヲ塗封スルニハ家猪若ハ牛ノ膀胱ヲ垢痕ニ貼シ或ハ左ノ膠泥ヲ用フベシ

製法

硝子碎末 鉛丹或密陀僧 右二品一方生石 極細末トシ等分ニ攪合シ亞麻油煎亞麻油ヲ煎熟ノ稠厚ト爲ス者ニ研和シ適宜ノ泥ト爲シ前法ノ如ク乾シ用フ

又法

生石灰 雞子白 亞麻油 羅紗ノ剝毛細剝 右研和シ適宜ノ泥ト爲シ用ルナリ前法ノ如ク凡ソ垢痕アル硝子器ハ是ヲ塗封スト雖モ數火氣ヲ被レバ其痕漸ク增長スル故ニ是ヲ承餽壘トシ用

ヒ或ハ藥液ヲ内レ貯ルニ用フベシ
 ○露水及ビ精等ノ液汁或ハ風化揮發ノ亞兒加利
 鹽ヲ蒸餾シ取ル承餾壘ノ接際。其他罅隙ヲ塗封ス
 ルニハ左ノ泥ヲ用フベシ

製法

亞麻子粉ニ雞子白ヲ研和シ固キ泥ト爲シ
 塗封スベシ乾ケバ堅剛トナル。乾テ坼裂スル氏ハ
 又塗擦スベシ○但酸味ノ酷烈ナル精ヲ取ルニ是
 ヲ用レバ溶テ軟ニナリ蒸氣滲漏スル故ニ是ハ後
 ニ舉ル酸精ノ蒸餾ニ用ル膠泥ヲ以テ塗封スベシ
 ○一切草木藥品ノ竄透揮發焚烈ナル精及ビ油。燒

酒或ハ鹿角精。硃砂精等ヲ製スル器ノ接際罅隙ヲ
 塞グニハ家猪若ハ牛ノ膀胱ヲ取り乾シ貯ヘ。用ル
 ニ臨テ適宜ニ截リ温湯ニ浸シ柔ニシ小刀ニテ摩
 シ展ゲ是ヲ以テ承餾壘ノ接際。其他孔隙ニ貼シ或
 ハ絲ニテ纏住スベシ。乾クニ隨テ膠著シ蒸氣少モ
 透漏セズ是ヲ取り去ルニハ布片ヲ水ニ濕シ是ヲ
 卷クベシ浸潤スルニ隨テ自ラ放解シ。損破セズノ
 再ビ用フベシ○草木藥品ノ精油。燒酒ヲ蒸餾シ取
 ル器ノ罅隙ヲ塗封スルニハ紙ヲ雞子白ニ濕メ貼
 シ或ハ亞麻油餅亞麻油ノ糟ヲ云ノ末ニ水若クハ雞子白

遠西名物考

卷二十二

醫學堂藏

ヲ研和シ紙或ハ布片ニ塗テ貼スルモ亦良○鹿角精。硝砂精ヲ製スル器ノ罅隙ヲ塗封スルニ石灰或ハ石灰ト麥粉或ハ石灰ト鉛丹或ハ礬紅ベニカラヲ雞子白ニ研和シ用ルモ亦良

○鹽類。酸精類ノ侵蝕スル者ヲ蒸餾シ取ル器ノ罅痕及ビ接際孔隙ヲ塗封スルニハ左ノ膠泥モ亦良

製法

白石脂 鉛丹 亞麻油煎前ニ註ス

右適宜ニ研和シ泥ト爲シ是ヲ罅隙ニヨク塗り又是ヲ布片ニ塗テ其上ニ貼スベシ

○酸味ノ銳烈酷厲ナル精液タトヘ假令バ消石精。綠礬油

海鹽精等ヲ製スル器ノ罅隙ヲ塗封スルニハ左ノ泥ヲ用フベシ。其器ノ外面ヲ塗ルニモ用ヒテ良

製法

生石灰ニ海鹽六分ノ一ヲ加ヘ半時許研磨シ是ニ雞子白ト水ト等分ニ和シタル液ヲ加テ適宜ノ泥ト爲シ用ス。石灰ハヨク酸性ノ蒸氣ヲ制メ鑽透セザラシム

又法

硝子ノ列ト鴛兒多トハ亞麻油煎ニ礬紅ノ末ヲ研和シ泥ト爲シ用フベシ○陶製ノ列ト鴛兒多トハ陶土ニ馬屎ヲ和シ用ヒ或ハ陶土ニ礬紅。鐵落。生石灰ノ細末及ビ牛毛ヲ研和シ泥ト爲シ用フベシ

又法 細沙 鐵落 各極 陶土 各五 馬屎或八牛

毛 細到一北 硝子 細末 海鹽 各四

右水ヲ加ヘ研和ノ泥ト爲シ用フ

又法 細沙 鐵落 共二極細末 麻絲 判者半比

硝子 細末 消石或剥篤亞斯 細末 各三

右水ヲ和シ泥ト爲シ用フ

又法 陶土 礬紅 鉛丹 生石灰 各細末 等分

亞麻油煎 適宜

右研和シ泥ト爲シ用フ

又法 綠礬油ヲ製シタル列篤兒多ノ底ニ殘リタ

ル渣塊ヲ取り水ヲ加ヘ煮テ上清ヲ去リ數斯ノ如

クノ其鹽氣盡ク除クヲ度トシ乾シ極細末トシ。生

石灰ノ末ヲ等分ニ加ヘ。雞子白ヲ研和ノ適宜ノ泥

ト爲シ微温テ塗封ス。乾ケバ堅剛ニシ石ノ如シ

又法 扁桃ヲ熟研メ泥ト爲シ是ニ膠水 膠ヲ沸湯ニ溶ス汁

ヲ適宜ニ加テ泥トシ用フ是ヨク粘著スルノ之ナ

ラズ。是ヲ取り去ル片水ニテ濕セバ速ニ剥脫ス

○承醜壘及ビ堯ノ接際ニ紙ヲ夾ム片ハヨク緊合

シ且觸レ抵リテ毀傷スルナシ

○或ハ武火ニテ蒸餾スル者。其蒸氣微洩レザレバ

其氣ノ充張ノ勢。已甚クノ列篤兒多破裂スルヲア
 承餾壘潤大ナラザレバ其器破裂スルヲアリ是
 ハ承餾壘ノ接際ニ貼スル膀胱或ハ膠泥ニ針ヲ以
 テ細孔ヲ穿テ微蒸氣ヲ洩スベシ

○硝子及ビ陶器ノ破缺セルヲ錐ニハ雜子白或ハ
 亞麻油煎ニ生石灰ノ末ヲ加ヘ研和メ泥ト爲シ是
 ヲ塗テ接合スベシ。乾ケバ熱湯ヲ内ルト雖モ離ル
 下ナシ劈痕ニモ右ノ泥ヲ紙ニ塗テ貼スベシ。乾ケ
 バ諸液ヲ内テ滲透スル下ナシ
 ○列篤兒多ノ頸ハ漸次ニ勾リ本潤ク末漸ク窄キ


ヲ佳トス屈折スル處アリ或ハ狹窄ナレバ蒸氣頸
 中ニ鬱滯ノ上升シ難ク。餾液列篤兒多ニ返リ下リ
 或ハ稠厚ノ液ハ凝結メ頸ニ壅塞シ迸裂スルヲア
 リ又頸甚ダ勾屈スレバ爐ニ近フメ餾液熱シ凝結
 ス○硝子甚ダ厚ク或ハ厚薄ノ處アリ或ハ凸凹泡
 瑕アレバ破裂シ易ク烈火ニ堪ル下能ハズ
 ○硝子ノ列篤兒多ハ多ク沙火或ハ灰火ヲ以テ蒸
 餾スルニ用フ灰火ハ沙火ニ比スレバ火カ一等露
 水。精油等ノ流動物ヲ蒸餾シ取ルニハ其列篤兒多
 及ビ格兒弗中ノ藥料ノ高サ許ニ沙中ニ埋ムベシ

乾ケル物ヲ蒸餾シ並ニ武火ヲ用ル者ハ列篤兒多
ノ頸ノ際^{キハ}マデ沙中ニ埋ムベシ其藥料沙火ニテ融
解シ難ク一等武火ヲ要スル者ハ鐵屑火ヲ用ヒ或
ハ直^チニ火ニ上スベシ○硝子ノ列篤兒多ハ總テ蒸
餾スルニ用ヒテ宜ク又升汞等ヲ升煨スルニ多ク
用フ然レ^レ火候極テ猛烈ナレバ破裂シ或ハ焔解ス
ル故ニ斯ノ如キ者ハ陶製ノ列篤兒多ヲ用フベシ
○陶製ノ列篤兒多モ總テ蒸餾スルニ用ヒテ宜シ殊
ニヨク烈火ニ堪テ焔解セズ然レ^レ破裂スル^ルアル
故ニ前ニ説ク如ク膠泥ヲ以テ周^子ク其外面ヲ塗リ


又直^チニ火ニ上セ蒸餾スルニ宜シ金石類ノ酷烈ナ
ル酸性ノ精油鹽及ビ尿性ノ精油即チ綠礬油消石
精海鹽精酒石精硃砂精鹿角精等ヲ製スルニ多ク
用フ○鐵ノ列篤兒多ハ烈火ニ堪ヘ又膠泥ニテ外
面ヲ塗ルニ及バズ然レ^レ酷烈ニノ侵蝕スル酸性ノ
精油等ヲ蒸餾シ取ルニ用ヒ難シ
○爐ヲ塗ルニハ陶器或ハ瓦磚ヲ造ル土ヲ取り乾
シ末トシ篩^ルヒ鹽水ヲ濕シ新ナル馬屎或ハ牛毛ヲ
雜ヘ搗テ泥ト爲ス若シ甚ダ膠粘ナル片ハ細沙少
許ヲ攪和シ一兩日^日窖^ラニ入置キ取り出シヨク捏^子合

セ。是ヲ以テ爐ノ内外ヲ塗り固ムベシ。燥テ圻ル片
 ハ手ヲ濕メ擦リ塞グベシ。此泥ニ硝子末或鐵落末
 少許ヲ加ヘ或ハ二品共ニ加レハ甚ダ堅剛トナリヨ
 ク火ニ堪フ。○爐ノ内面ハヨク乾テ後密陀僧ノ末
 ヲ水ニ溶シ塗ルベシ。是ニ由テ瓷油ヲ施ス如ク堅
 固トナル。此膠泥ハ硝子及ビ陶器ノ外面ヲ塗り直
 ニ火ニ上セテヨク火ニ堪ヘ迸裂スルナシ。
 ○爐ノ石ハヨク火ニ堪ル者ヲ擇ミ用フベシ。
 ○爐ハ形方圓六稜八稜等適意ニ造ル。但裏面ハ筒
 形若クハ卵形ト作ス。三種ノ圖ヲ左ニ舉グ。


第一



第二



第三



風雲堂藏

○第一圖 列篤兒多ニテ蒸餾スル爐

イ 灰室 灰此處ニ落且風氣其口ヨリ入ル

ロ 灰室口 是ニ鐵ノ扉アリ火氣強弱ニテ開閉ス

ハ 火室 此處ニ炭或ハ薪ヲ内レ火ヲ蓄フ。此下ニ

鐵網アリテ灰室ト間隔ス。灰室ニ比スレバ

差濶シ

ニ 火室口 是ニ亦扉アリ

ホ 灰室及火室扉 第二圖第三圖モ扉アルト是ニ

同シ

ハ 器室 是列篤兒多格兒弗等ノ蒸餾器ヲ内ル處

ナリ。此下ニ鐵挺二條ヲ横ニ架メ火室ト間隔シ。蒸餾器ヲ載ス此室ハ濶クメ蒸餾器ノ周圍空間アルヲ佳トス。否ザレバ火氣遍ク匝リ達スルヲナシ○上端半規孔アリテ列篤兒多ノ嘴ヲ出ダス

ト 列篤兒多

チ 蓋 爐ノ上部ハ陶製ノ蓋アリテ密閉シ其端ニ

半規孔アリテ器室ノ半規孔ト相合シ一圓

孔ヲ作シ是ヨリ列篤兒多ノ嘴。爐外ニ出ッ

リ 烟孔 蓋ニ三四孔アリテ烟氣ヲ升散ス○格兒

弗ニテ蒸餾スル片ハ其頸ヲ蓋ノ正中ノ烟孔ニ貫テ爐上ニ出シ膠泥ニテ其隙ヲ塗封ス或ハ第三圖ノ爐ヲ用ルモ宜シ

又 栓烟孔ニ鐵ノ栓アリテ火氣ノ強弱ニ隨ヒ開閉ス

ル 嘴

ヲ 承餾壘蓋及承餾壘ノ接際ハ膠泥ニテ塗封ス
○蒸餾器ヲ直ニ火ニ上_レ或ハ沙火鐵屑火隔湯ニテ蒸餾スルモ皆右ノ爐ヲ用ヒテ可ナリ

○第二圖 四個ノ列篤兒多ニテ蒸餾スル爐

イ口ハニ第一圖ノ符ト同シ

ホ 器室 爐ノ左右兩端各ニ孔アリテ列篤兒多ノ

嘴 爐外ニ出_レ承餾壘ニ挿シ膠泥ニテ塗封ス

此室ノ下ニ鐵挺四條ヲ横ニ架_レ列篤兒多ヲ載ス

へ 列篤兒多

ト 承餾壘

チ 蓋

リ 烟孔 此孔亦鐵栓アル_レ第一圖ノ如シ

○第三圖 格兒弗ニテ蒸餾スル爐

イ口ハニ第一圖ノ符ト同シ

ホ 器室

へ 格兒帶

ト 堯

チ 嘴

リ 承餽曇

又 蓋

遠西醫方名物考卷二十二終

