

遠西醫方名物考

美 女 幾
五

卷二十三

武
857
45-23

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
9
號 冊
冊 23 第



門中武9
號 857
卷 45-23

遠西醫方名物考標目

遠西醫方名物考標目

卷二十三

揮發香竄精

堇菜舍利別

蚯蚓油

銀漿

金硫黃

女迷迭香精

迷迭香油

默栗薩

默栗薩水

默栗薩精

刺必斯
那栗斯
安栗斯
扭安栗
質沒條

銀礬

牛乳

必斯
栗斯
安栗
扭安
質沒
條

急製礪砂精

重訂
第五
十章

同
上
乳
條
撰
要

大正五年九月廿四日
內田 采子 贈

藏書

遠西醫方名物考標目

藏書

呼埤 メタル 雜腹蘭酒 上同
默他兒 メタル 雜腹蘭 安ヲ 質沒 ノ 條

美蜜

明礬 白蜜 黃蜜 白蠟 黃蠟 白蠟 芙蓉散 芙蓉丸 清眼膏 芙蓉糖 龍礬水 芙蓉糖 明礬水 芙蓉糖

枯礬

密陀醋 鉛醋 密涅刺列 結爾茂斯 密涅刺爾鎮痛液 綠礬精 民埤列利精 硃砂

遠西醫方名物考卷二十三

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕菴校補

揮發香竄精

製法

肉豆蔻 各二錢 丁香 各二錢 桂 或橙皮新鮮黃皮ヲ取リ 枸櫞皮 白肉ヲ去レ者 一弓半
硃砂 一弓
剝篤亞斯 精製者 二弓



燒酒 十度者 二比

右判ニ搗テ合和シ格兒弗ニ内レ固封シ燒酒ニ浸ス
一ニ日。硝子ノ列篤兒多或ハ磁ニ内レ重湯若ハ
沙火ニテ徐々ニ蒸餾シ精ヲ取ル十四弓

又法 酒石鹽 末 半比

丁香油

茴香油

桂油 各半錢

府利判 一月

山柰 粗末

琥珀 末 各半月

右合和ノ格兒弗ニ内レ固封シ置ク一兩三日ニ
左ノ品ヲ加フ

燒酒 一比半

硃砂 精製者 半比

右攪和シ格兒弗ニ内レ文火ニテ蒸餾シ精ヲ取ル
一九弓

又法 硃砂精

燒酒 各四弓

橙皮油

府利油 各一錢

桂油 半錢

右調勻ス 掲

主治 揮發衝動ノ元運氣ヲ活潑シ腦神經ノ衰弱及
壅塞ヲ健運開達シ感觸知覺ノ微弱ナルヲ銳敏ニ
シ凝血粘液ヲ疏釋シ失氣眩冒昏睡癩精神虛乏煩
悶及ビ痞氣鬱滯ノ諸症ヲ治ス○患者虛衰ノ血液
ノ運行怠慢ナルヲ揮發衝動ノ治スベキ諸症ニ用
ヒ又發汗ノ峻効アリ○痘瘡及ビ傷冷毒痛脚痛風
等ノ内攻ノ惡症ヲ發スルニ用テ捷効アリ雜腹蘭

丁オンキ幾タル去爾ヲ加へ四分時ニ二三十分宛用テ殊ニ良

○服量一錢ヨリ三錢マデ大麥煎其他適宜ノ飲液
ニ點服ス○失氣昏冒ハ此藥ヲ小硝子壘ニ内レ鼻
下ニ接シ藥氣ヲ嗅シメテ醒復ス 叔伍 依戾

董菜舍利別 セイロフハンヒオレン 蘭

製法 董菜花 生鮮芬香ノ花瓣ヲ採リ

砂糖 三北

沸湯 二十弓

右花ヲ硝子壘ニ内レ湯ヲ加へ固封シ慢火ニ上セ

浸ス_レ三時ニ_テ絞リ瀝シ其液ニ沙糖ヲ攪和シ再
ビ瀝シ煮テ舍利別ノ稠ト爲ス 〔按〕

〔主治〕 緩和滋潤清涼鎮痙ノ良効ヲ奏シ粘痰ヲ稀豁
シ咳嗽等肺ノ諸症ヲ寛解ス。又微利ノ効アリ。初生
兒ノ胎屎ヲ下スニ良。○驚口瘡及ビ口舌瘡瘍ヲ治
スルニ蓬董舍利別 蓬砂ノ出 ヲ用_テ捷効アリ 〔収〕〔依〕

蚯蚓油 オレウム、リュムブリコリュム 羅

〔製法〕 蚯蚓 洗淨者 半比

阿利襪油 二比

右硝子壘ニ内レ煖處ニ置キ淹ス_レ二十一日。絞テ

油ヲ取り貯フ 〔戻〕

〔又法〕 蚯蚓 適宜

右磁器ニ内レ置_テ三日。ヨク土ヲ吐_カレメ温湯ニテ
洗ヒ布巾ニテ拭ヒ乾_カシ磁壺ニ内レ阿利襪油ヲ加
ル_レ三指横徑上ニ至リ。又葡萄酒少許ヲ加へ固封
シ煖處ニ置_テ三日ニ_テ磁鍋ニ内レ文火ニ上セ煮
テ水氣ヲ消シ布巾ニ包テ絞リ瀝シ暫ク靜定メ底
ニ沈ム渣ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ 〔収〕

〔主治〕 外敷メ肢節拘強。神經攣急ヲ緩弛シ。痛風。打撲

傷。神經創。火傷ニ良驗アリ 矣 叔

女

迷迭香精

「スピリタスフロスアンリス」又「アークワレギア」
ア。ホンガリア「ローゼマレイン」ゲースト「蘭

○按ニ迷迭香ハ江戸花戸「マン子」ノウト呼ビ
多ク培植ス。 過云効力刺賢埵兒ト同シ○榕嘗テ

越後、長岡邊ノ河濱沙地ニ生スル一種ノ芳草ヲ

鑒識ノ和蘭ノ椀埵兒ニ充ツ。近來多ク採出シ直

ニ其名ヲ以テ藥舗ニ貨セシム 此草江州伊吹山

ニ關西ノ俗。伊吹巖香草ト稱ス。江戸花戸「セキ性

ハツカト呼フ。然レ宜ク和蘭名ヲ以テ稱スベシ性

功。迷迭香。刺賢埵兒。栗薩未沃刺那等ニ類ス。若

製法

迷迭香

生鮮花穂及ビ梢葉
ニ此

遠西名物考 卷二十三 四 風雲堂藏

燒酒 十度者 八比

右迷迭香ヲ燒酒ニ投シ固封シ浸ス一兩日。重湯福窟若ハ沙火ニテ蒸餾ノ精ヲ取り十九度ニ至ル篤呼

驚兒ニテ測リ十九度マデノ精ヲ取ルヲ篤呼云按○此精ヲ一ニ翁加里設水一名ツク

又法

燒酒 三比

右格兒弗ニ内レ蒸餾ノ其液殆ト盡ルニ至リ。其滓ヲ絞リ去リ。其汁ニ又迷迭香ノ花穂梢葉一比。燒酒半比ヲ加へ前ニ取りタル精モ是ニ加へ再ビ蒸餾ノ其精ヲ取り芳烈ノ氣味盡ルニ至テ止ム叔

又法

アウテラレイ子又アウレギアホ
ンカリア羅ホンガリセウトル蘭

迷迭香 生鮮葉花ヲ取り陰乾者 四比

沙糖 一比

水 六比

右先沙糖ヲ水ニ溶シ濃テ渣ヲ去リ格兒弗ニ内レ迷迭香ヲ浸シ文火ニ上セ格兒弗熱ノ大抵手ニ觸テ堪ル許ニ至リ。新ナル麥酒蒸餾ノ條餅母出一二匙ヲ加へ攪合シ。冬ハ密閉セル爐室ニ入レ置クヤハ泡醸ス。大抵三晝夜ヲ經レバ泡醸止テ其沫消散ス。是ニ於テ其格兒弗ニ兜ヲ蓋ヒ。文火ニテ蒸餾スレバ氣

味芳烈ナル露精出ヅ。終ニ氣味薄弱ナルニ至テ火
ヲ下シ其精ヲ取り硝子燻ニ入レ固封シ貯フ○久
ク貯テ香氣脱スルキハ是ニ迷迭香ヲ加ヘ再ヒ蒸
餾スベシ○黙栗薩撒爾非亞薄荷等ノ精モ右ノ如
ク製ノ尤良叔

主治 芳烈竄透シ頭腦神經ヲ強壯シ微衝動シ。粘液、
腦ニ鬱聚スル諸症即チ昏睡病、失氣昏冒ヲ醒復シ
非。頭痛ニ良驗アリ○痙攣、子宮衝逆ヲ治シ粘液、頭
腦子宮等ニ凝滯スルヲ驅散ス○痛風傷冷毒及ビ
虛冷、粘液ヨリ起ル諸病ニ多ク効アリ

○服量一錢マデ飲液ニ點服ス○昏睡失氣ニ嗅藥
トシ或ハ頭部顛顛等ニ塗り或ハ痛風傷冷毒痛、齒
痛、耳痛、鼻塞耳聾等ノ患部ニ外敷シ或ハ非ノ蒸湯
劑ト爲シ神經ヲ強健シ粘液ヲ疏解ノ捷効ヲ稱ス
ハシクネリ

迷迭香油 オレウム、アントス又ロリスマリニ羅

製法 薄荷油ト同シ花葉莖根ニ蒸餾ス

主治 衝逆眩冒、搐掣喘急、卒厥等ニ二三滴内服ノ奇
効アリ又腦神經ノ諸症ニ外敷シ或ハ嗅藥トシ捷
効ヲ稱ス○竄透ノ龍腦ノ如シ性功如耶普的油ト

同シ○腹部攣急衝逆疝痛等ノ患處ニ擦メ速ニ解
散ス又侵刺ノ骨ニ滲透シ齒痛ヲ治ス棉ニ滴シ齒
孔ニ挿テ即効アリ疾過

黙栗薩羅

メリセ又シトルンコロイド
又ベイエンコロイド蘭

〔形狀〕此草方莖硬固帶白色高サ一二尺許叢生シ多
枝兩對ス葉モ亦柄アリテ對生シ楮圓ニメ長一拇
指許邊ニ刻缺及ビ皺アリ深緑光澤微細ノ毛茸ア
リ夏月葉間ニ唇狀單瓣ノ小白花ヲ開キ莖ヲ圍テ
層々簇生シ上唇ニ二分レ圓クノ直立ス下唇ハ三

二分レ低垂ス萼筒様五又ヲ爲ス花後一心蕊ノ本
ニ四ノ細子ヲ生シ圓ク滑澤淡黒ナリ一種花莖ノ
偏側ニ著キ初メ淡黄ニメ熟スレバ白色トナル者
アリ根木ノ如ク鬚多ク經年枯レス或ハ一種宿根
セザル者アリ○莖葉花皆芬香賞スベク其氣狗椽
ノ如シ椽草ノ義ナリ又ベイエンコロイドノ名ハ即チ狗
蜂草ノ義ナリ蜂甚ダ此草ヲ好メバナリメリサハ
蜜ノ義ナリ蜜蜂多ク此花ニ就テ蜜ヲ得レバナリ
味微辛歐羅巴洲ノ南地ニ生ス○變生二種アリ一
種ハ葉斑駁黄色ナリ一種ハ葉大ニメ粗糙萼麻葉
ノ如ク其氣重クノ佳ナラズ或ハ氣烈ニメ臭ニ近

キアリ。是ヲ「ロムセメリ」セト名ク。或ハ花紅。淡紅。紫碧等アリ。或ハ葉淡綠ナルアリ。變生異種多クハ宿根セズ。多ク園ニ培養ス。

○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ用フベシ。性功大抵迷迭香。撒爾非亞ノ如シ。

主治 葉及ビ花。性温。香竄揮發ノ油鹽アリ。頭腦神經ヲ強壯スル効ヲ稱ス。故ニ昏睡病。痲。癩。眩運ニ用フ。

○泡劑トシ用ヒテ敗黑膽液ノ閉塞。脾病。依剥イボ昆埵コンヂ兒ル鬱憂病ニ殊効アリ。○心動悸。婦人子宮病。經閉。白帶下。痔血等ノ壅滯ヲ治ス。○感動シ易キ婦人ノ子

宮病ニ尤モ驗アリ。○是ヲ泡湯トシ用テ經閉ヲ治ス。

ル一藥トシ又産婦ニ用テ惡露ヲ通シ乳汁ヲ増ス。

○健胃ノ効ヲ稱シ胃ノ諸症ヲ治シ風氣痞脹疝痛

ヲ消散ス。○泡湯フリダシ或ハ水ニ浸シ枸櫞汁ト砂糖ヲ加

ヘ酸美清香ノ飲液トシ熱病ノ煩渴ヲ治ス。又腐敗

熱。神經熱ニ用テ輕キ鎮痙劑及ビ發汗劑トシ偉効

アリ。○葡萄酒ニ浸シ用ヒ或ハ蔬ニ加ヘテ佳香ヲ

賞ス 叔物依 伍勃

黙栗マリス薩水ササ アイグメルサル羅

製法 薄荷水製法ト同シ。○或ハ黙栗マリス薩生草六比ヲ

蒸餾ノ露水十比ヲ取ル。或ハ是ヲ蒸餾ノ後其格兒
弗ノ滓ヲ絞テ汁ヲ取り又新ニ此草ヲ加ヘ其露水
モ是ニ加ヘ再ビ蒸餾スレバ香氣尤烈ナリ〔亞〕〔按〕

主治 神經ヲ強壯ニシ精神ヲ欣慰シ。鬱憂病。依剝昆
堉兒。子宮衝逆處女病等ノ諸症。心悸動。失氣等神經
攪擾ノ諸症ヲ治シ風氣ヲ驅リ小便ヲ利シ月經ヲ

通ス〔叔〕〔戾〕

默栗薩精スピリ左ス。メルサ〔羅〕

製法 薄荷精製法ト同シ

主治 腦心胃ヲ強壯シ昏睡失氣。鬱憂病。經閉等總テ

默栗薩〔羅〕主治ノ諸症ニ捷効アリ○服量一二匙ヲ葡
萄酒。麥酒。白湯等ニ點服ス〔叔〕〔伍〕

呼堉〔蘭〕

ヘイドロメル〔羅〕
ホニフダランカ〔蘭〕

是ハ蜜ニ水ヲ加テ釀シ製スル酒ノ如キ一種ノ飲
料ナリ。北方寒地ノ葡萄ヲ産セザル處ニテハ是ヲ
葡萄酒ニ代テ日常ノ飲料トシ或ハ藥用ニ供ス。上
好ノ白蜜ニテ造釀スレバ味甘美ニメ尤〔良〕性トス

製法 白蜜 一比

水 三比

右蜜ヲ水ニ溶シ慢火ニ煮テ浮沫ヲ抄去リ水氣ヲ
 減耗シ是ニ雞卵ヲ投メ浮ムヲ度トシ火ヲ下シ布
 片ニテ濾シ桶ニ内レ注孔桶ノ蓋ヲ塞グナク但
 綿布ヲ被テ塵埃ヲ防ギ竈爐ノ邊煖處ニ置テ泡釀
 セシムルヲ凡四十日餘終ニ必モ泡釀セザルニ至
 テ注孔ヲ塞ギ窖ニ内レ貯ヘ冬月製スレバ翌春月二
 項ヲ取出シ飲料トス其桶ハ新ニ造リ熱湯ヲ盛リ
 浸ス二三回ニメヨク其材ノ氣ヲ去リ又葡萄酒
 ヲ以テヨク洗ヒ用フベシ○此飲料久ク經レバ蜜
 ノ味脱ノ性味凡ニ葡萄酒ノ如シ○時ニ臨テ速ニ

製スルニハ蜜ニ水ヲ加ヘ煮タルノニテ泡釀セ
 ズ用フ是モ亦呼イテ垲ト名ク○或ハ是ニ覆盆子汁桑
 椹汁等ヲ加造釀ノ美味ナル呼イテ垲ヲ製スルアリ

又法

水

六十四斤

蜜

適宜

右水ニ蜜ヲ攪和シ是ニ卵ヲ投メ浮ムヲ度トシ枸
 櫞三個ノ黄皮ヲ刮カリ取テ此液ニ加ヘ煮テヨク泡
 沫ヲ去リ火ヲ下シ又枸櫞三個ノ切片ヲ加ヘ清キレ楚
 ナル桶ニ内レ煖處ニ置テ泡釀セシムルヲ三日ニ
 メ又ヨク泡沫ヲ去リ濾ユシテ渣ヲ去リ小桶ニ内レ置

火_シモ泡釀セザルニ至テ固ク蓋ヲ閉テ貯ル_カ三日許ニノ取り出し用テ飲料トス或ハ丁香_フ府利肉豆蔻_リ各四錢末トシ袋ニ内レ淹_ヒメノ佳香ヲ賞ス

主治 緩和滋潤ノ効アリ欬嗽喘急等肺ノ諸症ニ用ヒ心胃ヲ强健ス○多血熱性ノ人多ク用フレバ膽液ヲ増シ熱ヲ發ス故ニ老人虛冷ノ者ニ宜シ小兒少壯ノ人過飲スレバ害アリ **〔収〕** **〔製〕**

美

蜜

「メル」_羅 「ホーニフ」又「ホーニンフ」_蘭

總テ草木ノ花蕊ノ本ニ花ノ精液ヲ蓄_タル處アリ是ヲ「ホーニングバッキ」_{蜜槽}又「ホーニングキリル」_{蜜腺}ト名ク其液味甘_シ其處ヲ摘_シ取テ嘗_レバ花ノ異_ナルニ隨テ其形モ同ジカラス蜂其液ヲ吸取テ胃中ニ蓄_タヘ蜜_脾ノ窩中ニ吐出シ貯_テ根_ト為ス是即チ蜜ナリ○花ノ精液先ヅ蜂ノ胃中ニ在テ稍熟シ蜜_脾ニ貯ル間ニ全ク釀熟ノ醇厚甘美ノ質トナル是レ衆花ノ精英化釀シ成ルヲ以テ其性_バ爾_ハ撒_ハ謨_ノ如ク且油氣鹽氣アリ但_シ其花ノ性ニ隨テ蜜モ亦差_ヤ

異ナリ假令^{タト}バ迷迭香ノ如キ芳香ノ花ヲ吸テ成ル
 蜜ハ佳香アルガ如シ○凡ソ暖國ノ蜜ハ寒地及ビ
 寒暖中和ノ國ニ産スル者ニ比スレバ皆上好ナリ
 一國中ニテモ山陽及ビヨク大陽ヲ受ル地ニ産ス
 ル蜜ハ氣味尤^モ醇厚ニノ上品ナリ是レ大氣ニ濕穢
 ナク暖和ニノ淨潔ナレバナリ。然レバ上好ノ蜜ヲ
 造ルニハ山地高爽ノ暖地ヲ擇ミ北風ヲ避ケ東南
 ニ向テ蜂籠ヲ造ルベシ平原卑濕ノ地ニ比スレバ
 其蜜尤^モ良性ナリ○蜂ノ吮^フ花ニ因テ蜜亦善惡アリ。
 香氣アル花假令^{タト}バ迷迭香。草零陵香。櫻草。^{サシラサウ}洋石竹。
^{オラシキキチ}

薔薇。鈴蘭。羅勒。金盞花等ヲ吮テ成ル蜜ハ最^モ上品ト
 ス故ニ總テ芳香ノ花アル草木ヲ以テ蜂籠ノ邊ニ
 培栽スベシ○蜜ヲ取ルニハ春夏及ビ秋ヲ佳トス
 花多クノ其精液モ充滿シ春月ハ殊ニ蜂ノ氣力壯
 旺ノ舊房ヲ離レ新巢ヲ造テ多ク蜜ヲ蓄フレバナ
 リ又暖國ニテハ天氣晴和ノ早且ニ湛露降テ草木
 ノ花葉ニ珠ヲ成ス。此即チ一種ノ滿那^{マナ}ニノ味甘美
 ナリ。蜂是ヲ吮テ多ク良蜜ヲ釀シ又此時令ニ於テ
 草木ノ英華多ク萌發ノ充溢スレバナリ
 ○蜜ノ善惡ヲ試ル法 蜜ヲ手指ニ著ケ長ク絲ヲ

遠西名物考 卷二十三

風雲堂藏

引テ折斷セズ。或ハ蜜ヲ匙ニ内レ文火ニ温メテヨク焯化シ流動スルハ良品トス。否ラズノ稠厚凝結スルハ偽品若クハ沙糖ヲ雜フル者ナリ

製法 蜜ニ黄白ノ二種アリ。白蜜ハ火力ヲ假ラズ製其法新蜜脾ヲ取り碎テ篩或ハ籬ニ内レ桶ニ載テ爐邊ニ置キ或ハ天日ニ曝ス片ハ潔白鮮美ノ蜜自ラ淋リ下ル和蘭ニ是ヲ姬蜜原名「マ」ト名ク。即チ白蜜ニ最上品トシ多ク内服製劑ニ用フ但其暖氣ニ過ルト勿レ蠟モ共ニ焯テ下レバナリ上品ハ潔白鮮麗ニノ稠ク。粒塊ヲ雜ヘ甚ダ甘美ニノ微舌

ニ滲透シ佳香アリ漢名 生蜜 ○右ノ如クノ白蜜ヲ取テ後蜜脾ヲ布袋ニ内レ榨ニテ搾リ餘殘ノ蜜ヲ取ルトアリ。然レ是ハ蜂子等雜ル故ニ潔白ナラズ其品劣レリ

○黄蜜ハ蜜脾ノ新陳ヲ擇ハズ取リ。碎テ鍋ニ内レ或ハ水必許加火ニ上セ温メ布袋ニ内レ搾リ取ル者ナリ即チ其滓ヲ以テ蠟ヲ製ス然レは蠟モ少許ハ其蜜ニ雜ル故ニ是ヲ再煎メ放冷スレバ蠟ハ自ラ分ルナリ此蜜ハ蜂子等ノ汚物雜ル故ニ白蜜ニ比スレバ淨潔ナラズ下品トス漢名 熟蜜 然レは鮮黄稠厚ニノ甘美

ナルハ良品ニ屬ス○白蜜モ久ク貯レハ黄色ヲ帶
 フ。或ハ火力ヲ假ラズ淋漓ノ取ルト雖モ黄色ノ者
 アリ是ハ蜂ノ吮フ所ノ花ノ性ニ因テ其色ノミナ
 ラズ蜜ノ性モ差異ナルト上ニ説ク如シ

○蜜ヲ藥用トスルニハ宜ク左ノ法ヲ以テ淨製ス
 ベシ

淨製法

蜜ニ水四分一或ハ六分一ヲ加ヘ雞子白
 ヲ拌セ文火ニ煮テ盡ク上面ノ浮沫ヲ抄ヒ去リ是
 ニ雞卵ヲ投メ浮ムヲ度トシ毛篩ニテ漚シ放冷シ
 貯フ○新鮮上好ノ蜜ハ火力ヲ假ラズメ淨製スル

モ亦良其法。蜜ヲ潤キ磁器ニ内レヨク蓋ヲ覆ヒ寒
 燠中等ノ處ニ置テ三四日。上面自ラ泡沫生ス。數回
 是ヲ抄ヒ去リ泡沫少クモ生セザルニ至リ貯フ新蜜
 ハ是ニ由テヨク純粹トナルナリ○蜜ヲ煮テ稍稠
 厚ト爲シ二個月許貯レバ芒ヲ結テ砂糖ノ如シ

主治 性温。白蜜ハ油氣土氣ヲ含ニ鹽氣少シ專ラ内
 服藥ニ用フ○凝結ヲ疏解スル良藥トス。故ニ粘液
 痰飲多キ症ニ用フ○肺ノ壅急ヲ甘解シ酷厲液ヲ
 除キ粘痰ヲ釋キ大便ヲ滑シ小便ヲ利シ胸中ノ諸
 病ヲ療ス○技爾撒謨樣ノ性アリテ枯燥ヲ滋潤シ

津液ヲ生シ痛ヲ止ム ○久病血液枯涸。虚羸。勞瘵ノ
初起瘦削セル者或ハ老人虚冷ノ症ハ飲液ニ和シ
用ヒテ良 ○蜜ハ砂糖ニ比スレバ凝結ヲ疏釋スル
効多シ故ニ肺藏ニ膿瘍アルヨリ發スル勞瘵ハ的當
セス ○胃弱クメ食進マザル症ニ多ク用レバ停滯
メ消化ヲ妨グ又少壯多血熱性。膽液過多ノ人ニ多
ク用レバ害アリ ○黄蜜ハ酸性鹽ヲ含ミ。油氣土氣
必ナシ。白蜜ニ比スレバ氣味慄悍ナリ。汚液ヲ滌刷シ
凝結ヲ溶解シ粘痰ヲ祛ク ○外敷ツヨシメ軟化。淨刷。化膿
ノ効アリ ○蒸湯藥トシ或ハ小麥粉ヲ加ヘテ泥ト

シ或ハ雞子黄ヲ加ヘ貼メ堅硬ヲ軟ラゲ膿ヲ釀ス
○吉利詞キリコト參兒マシトシ施メ腸ノ絞痛ヲ消シ大便硬結
ヲ潤シ通ス 取伍依 裏邊

蠟 セラ羅 ワス蘭

蜜蜂。草木ノ花蕊頭ノ粉及ビ葉ノ脂粉ヲ吮ステ胃中
ニ蓄ヘ或ハ是ヲ脚ニ著ツケテ蜂籠ニ集リ是ヲ以テ蜜
脾ヒヲ造ル。是ヲ搾ヒテ蜜ヲ取り又其滓ヲ搾テ蠟ヲ取
ルナリ。是ニ黄白ノ二種アリ ○白蠟又二種アリ。其
一ハ當年ノ蜜脾ヨリ取りタル蠟ニメ白色ナリ。是
ヲ自然白蠟ト名ク但是ニメ鮮黄色ノ者アリ此ハ

蜂ノ吮取ル花ノ性ニ因テ然リ其ニハ黄蠟ヲ晒ノ
 白蠟ト爲ス者ナリ是ヲ尋常ノ白蠟ト名ク蜜ヲ取
 ルニハ大抵蜜脾ノ新古ヲ擇バズ相混シ搾ル故ニ
 自然白蠟ヲ取ルニ便ナラズ多クハ黄蠟ヲ晒メ白
 蠟トシ用ルナリ○二年ノ蜜脾ヨリ取リタル蠟ハ
 黄色ナリ是ヲ黄蠟ト名ク三年ノ蜜脾ヨリ取ル蠟
 ハ黄赭或ハ黑色ヲ帶ブ

黄蠟製法 蜜脾ヲ搾テ蜜ヲ取リタル滓ハ蜂子塵
 埃等ノ汚物雜ル故ニ是ヲ淨淘メ蠟ト爲スナリ其
 法先ヅ蜜脾ヲ鉢ニ内レ水ヲ注キ加テヨク其粘著

セル蜜ヲ淘洗シ罐ニ入レ文火ニテ烱シ上面ノ浮
 沫穢物ヲ抄ヒ去リ或ハ酒石英少許ヲ加テ盡ク浮
 沫ヲ去レバ甚ダ淨潔鮮明トナル是ヲ布袋ニ内レ
 瀝テ鉢ニ内レ是ニ微温湯少許ヲ加レバ蠟其上面
 ニ凝リ聚ル冷テ後是ヲ取り貯フ再ビ右ノ如ク烱
 シ製スレバ蠟尤モ純潔ナリ蜜脾新ナルホド蠟逾鮮
 麗純潔ナリ

又法 蜜ヲ取テ後蜜脾ニ水ヲ加ヘヨク洗ヒ是ヲ
 網杓子ニテ抄ヒ取り罐ニ内レ火ニ上セ其蠟ヲ烱
 シ煮テ水氣ヲ去リ又上濶ク下窄キ鉢數多排列シ

遠西名物考 卷二十三 十六 風雲堂藏

各是ニ三分一許ノ沸湯ヲ盛り其烱シタル蠟ヲ以テ適宜ニ分々内レ冷テ後是ヲ取り出セバ汚物ハ盡ク其底ニ聚リ著テ凝固ス是ヲ刮リ去リ貯フ

又法 蜜ヲ取タル蜜脾ヲ火ニ上セヨク烱化シ布袋ヲ水ニ濕メ其蠟ヲ注キ内レ水ヲ盛タル桶ノ上ニ掛テ其蠟ヲ淋リ下ラシメ又其袋ヲ太キ木棍ノ間ニ夾テ絞レバ蠟盡ク水ニ入テ凝固ス是ヲ取り再ビ前法ノ如ク烱シ濾テ水ニ淋リ下ラシメ其水中ニ凝固スル蠟ヲ取り貯フ多ク製スルニハ右ノ袋ヲ搾ニテ搾ルベシ

白蠟製法

黃蠟ヲ火ニ上セ烱シ熱湯ニ投シ濾テ汚物ヲ去リ冷テ後濶キ鍋ニ内レ火ニ上テ烱シ平等滑澤ナル薄キ板ノ正中ニ長キ釘ヲ刺テ柄ト爲シ冷水ニテヨク濕シ是ヲ以テ其烱タル蠟中ニ投スレバ蠟遍ク其板ノ兩面ニ著テ厚キ紙ノ如シ是ヲ取出セバ速ニ凝固ス是ヲ冷水ニ投スレバ蠟離レテ薄片トナル數回斯ノ如クメ其蠟ヲ取り集メ四五月ノ頃天日ニ曝シ烱レバ數回水ヲ撒ケ濕シ或ハ蠟ヲ引タル布ヲ覆フテ塵埃ヲ避ケ夜ハ星ニ露スベシ其蠟終ニ潔白硬脆ニメ碎ケ易ク嚼テ齒

ニ粘著セザルニ至テ是ヲ鍋ニ内レ火ニ上セ煇シ
放冷ノ塊ト爲シ貯フ

【又法】 黄蠟ヲ鍋ニ内レ火ニ上テ煇シ水ニ投メ攪

液スレバ碎片トナル其水ヲ換ヘ淹ス_{ヒタ}數回ニシテ
漉シ取リ布巾上ニ展グ盆ニ載テ日乾及ビ露宿ス

ル_ト五六十日。終ニ白蠟トナルニ至テ再ビ火ニ上
セテ煇シ是ニ酒石英少許ヲ加テ上面ノ浮沫ヲ扱

ヒ去リ漉テ放冷シ凝固セシメ收メ貯フ
【主治】 蠟ハ花ノ脂油ニ其性拔爾撒謨樣ナリ故ニ

諸油ニ加テヨク溶化ス又鹽氣水氣アリ○黄蠟ハ

外敷ノ堅硬ヲ軟ラゲ凝結ヲ解キ急迫ヲ緩メ膿ヲ
釀シ或ハ腫瘍ヲ消散ス。乳頭ノ焮熱腫痛及ビ疔裂
等ニ塗テ良効アリ多ク膏藥ニ用フ○白蠟ノ性功
大抵黄蠟ト同シ但清凉スベキ症ニハ多ク白蠟ヲ
用フ。但黄蠟ニ比スレバ急迫ヲ緩ル効必シ○赤痢
ニ左ノ方ヲ用ヒテ治驗多シ

【瑰蠟昆設爾弗】

玫瑰昆設爾弗 二弓

黄蠟 四錢

甘扁桃油 一弓半

右蠟ト油ヲ文火ニ上セテヨク烱シ。玫瑰昆設爾弗ヲ合和シ服ス或ハ其症ニ隨テ阿芙蓉少許ヲ加テ殊効アリ○勞瘵様ノ症或ハ稟賦薄弱ニメ肺ノ運營罷勞シ効嗽喘急吐血聲嘎等ノ症ヲ患ヒ或ハ傷冷毒ノ痰欬甚キ症ハ左ノ方多ク驗アリ

薰蠟方

黃蠟ニ松香或ハ乳香沒藥ヲ等分ニ加ヘ或ハ拔爾撒謨字露ヲ加ヘ適宜ニ是ヲ取テ小鍋ニ内レ文火ニ上セ漸ク烱解スレバ佳香ヲ生ス。患者常ニ其蒸氣ヲ口ニ受テ吸入スルナリ

叔 裴 伍 週

明礬

アリメン 羅 アリュイニ蘭

是レ一種ノ酸性鹽ナリ天造ノ者ト人工ノ者ト二種アリ天造ノ者ハ山坑及ビ土中ニ出ヅ人工ノ者ハ一種ノ礫泉ヲ煮テ製シ或ハ一種ノ石ヲ煨テ製シ或ハ礬氣ヲ帶ル土ヲ煮テ製ス人工ノ者ヲ以テ藥用トス○製煉術ニテ此物ノ質ヲ研究スレバ綠礬油礬土次結晶水補卷七及ヒ少許ノ剝篤亞斯ヲ以テ成ル者トス明礬ヲ蒸餾スレバ初ニ淡水出ツ。次ニ酸味ノ精液出ツ。其性。綠礬精ト同シ但シ明礬ハ武火ニテ蒸餾スト雖モ精出ルヲ甚ダ少ク且氣味亦

緩弱ナリ是明礬ニ含ム所ノ土質ト綠礬油ト甚ダ
密ニ混合スルヲ以テ烈火ニテ蒸餾スレハ分離シ
難ケレバナリ。故ニ此精ヲ用ヒズ綠礬精ヲ藥用ト
ス。是ヲ蒸餾ノ後其列篤兒多ニ殘ル渣塊ハ即チ枯
礬ナリ。是レ明礬ニ含メル水ト綠礬油少許トヲ脫
スルノミニテ仍許多ノ綠礬油其土質ニ固著スル
者ナリ。明礬ヲ沸湯ニ溶シタル濃キ液ニ峻ツヨキ亞兒
加利鹽ヲ加レバ白色ノ土其底ニ沈ム。此即チ前說
ニ謂フ所ノ礬土ナリ。○明礬ハ諸金類ノ質ヲ含ム
トナシ。是レ石膽ト異ナル所以ナリ又石膽ニ比ス

レハ酷烈ナラズ然レ收斂ノ効ハ同シ。○明礬ハ亞
兒加利鹽ヲ含ム故ニ能ク結芒ノ八稜或ハ十稜ヲ
爲ス即チ一種ノ結晶鹽ナリ。是ヲ沸湯ニ溶シ草木
類ノ灰汁若クハ其亞兒加利鹽剝篤亞斯ヲ滴シ加
テ滾濁セザルニ至リ煮テ放冷シ結芒セシムレバ
孕礬酒石トナル。但右ノ明礬ノ溶液ニ鱗蓬鹽ヲ加
ヘ前法ノ如クノ結芒セシムレバ瓦老別里鹽トナ
ル。○明礬種類多シト雖モ潔白ニシテ石英狀ヲ爲ス
者ヲ藥用トス。此所謂明礬不潔ニシテ汚色アル者ハ研
末シ雨水ノ沸湯ニ溶シ瀝テ滓ヲ去リ又煮テ放冷

シ結芒セシムレバ上好ノ品トナル○此物冷水及
ビ燒酒ニハ溶化セズ沸湯ニハ溶化ス

主治甚ダ收斂シ稍刺戟ス其効力專ラ其含ム所ノ
許多ノ綠礬精ニ在ル故ニ甚ダ脉管ヲ收斂メ止血
ノ効ヲ稱ス。多ク諸失血及ビ水液脱泄ノ諸症ニ用
フ○衄血吐血婦人崩漏痔血等ノ劇キ症ハ二時毎
ニ明礬半錢ヲ取テ大麥煎ニテ送下ス其血漸ク減
スレバ朝夕一服宛與フベシ○危險ノ失血ハ半時
或ハ四分時ニ十五氏若クハ一刃宛用ヒテ其血盡
ク止ニ至ル。但輕キ失血ハ少許宛用ベシ多ク與レ

バ嘔吐スレバナリ○諸失血劇キ者ハ左ノ方亦殊
効アリ

斂血丸

明礬 末 二弓

血竭 末 四錢

右明礬ヲ火ニ上テ煇シ。血竭ヲ加テ攪和シ。温ニ乘
メ丸トス。服量二時毎ニ一刃ヨリ一錢マデ症ニ隨
テ加減シ適宜ノ飲液一二碗ヲ以テ送下ス。血症治
メ後モ日一二服與フベシ但諸失血ノ初發速ニ閉
澁ノ藥ヲ用ルヲ勿レ動モスレバ瘀血ヲ壅滯セシ

ムレバナリ。故ニ失血過度ノ候アルニ就テ用、ベシ
此劑ヲ用、レバ大便秘結スル故ニ時々下劑ヲ兼用
スベシ○諸失血ニ疼痛或ハ痙攣ノ諸症、眩暈等ヲ
兼ルハ此藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用、ベシ。左ノ方尤モ良

芙蓉糖礬丸

阿芙蓉 精製者 三匁

明礬

阿煎藥

沙糖 淨白者 各二錢

右研和ノ散劑トシ。分テ二十五服トシ。一時半ニ一

服宛用フ。但其症ノ輕重ニ隨テ加減スベシ○月經
過多ナルガ爲ニ諸症ヲ發スル者ハ明礬ヲ丸藥ト
シ毎月。經水常期ノ七八日以前ヨリ毎朝空心ニ用
フベシ。下血モ是ニ同シ痔血甚キ者ハ明礬ヲ亞刺
比亞^ア樓^ゴ謨^ムニ加ヘ火ニ上セ焯ノ適宜ノ坐藥ニ造リ
肛門ニ挿テ治ス○頑固ノ遺精及ビ黴毒淋疾治メ
後唯粘液淋瀝ノ歇^ヤガル症ハ毎日明礬十匁ヨリ一
月マデ用ヒ且冷水ニ浴メ良驗アリ○腎膀胱尿道
等衰弱セルヨリ小便淋瀝白帶下。小便失禁及ビ淋
疾ヲ發シ頑固ノ者ハ對症ノ藥ニ加用ヒテ効多シ

○間歇熱。傷冷毒熱ノ患者衰弱ノ其症在苜トノ解
セズ或ハ腐敗熱。神經熱ノ患者虚弱ニノ綠礬精ヲ
用ベキ諸症。明礬對症劑加用ヒテ適應ス○明礬ノ
蒸餾精ヲ治熱ノ飲劑ニ加ヘ用テ清涼解凝利尿ノ
効ヲ稱ス。然レ味惡キ故ニ皆綠礬精ヲ用ベシ但腐
敗熱ヲ兼ル赤痢ニ於テ酷烈ナル酸精綠礬精消石
精硫黃精等
ヲ用ヒ難キ症ハ胃腸ノ汚物ヲ滌除ノ後明礬ヲ
用テ間良驗アリ腐敗熱ヲ兼ル痢ハ胃腸罷弊スル
ニ堪ガ
ルナリ○腐敗熱及ビ腐敗ノ痘ニ於テ小便失禁ス
ル者ハ明礬ヲ用テ良効アリ毎日十匁モシ若クハ十二

匁ヲ舍利別ニ和シ一卵匙宛與フレバ服シ易シ薄
弱ノ小兒ハ日一月マデ用ベシ○腸ノ衰弱弛緩ノ
發スル疝痛頑固ノ大便閉下利或腸焮衝ヲ兼ル疝
痛ノ焮衝既ニ解散スレハ腸大ニ衰弱セルニ因テ
其痛荏苒トノ治セサル者ハ明礬十匁ヨリ一月マ
デ用フレバ下利ヲ發メ治ス○腸ニ粘液過多ニノ
疝痛ヲ發シ且其粘液自ラ下利スル症ハ此藥ヲ用
テ良効アリ但多ク粘液ヲ下利スレハ治セサル者
ハ是ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用フベシ即チ左ノ方ノ
如シ

芙蓉散

阿芙蓉 四匁

明礬 二匁

右研和ノ散劑トシ分テ四服トシ時々一服宛飲液ニテ送下ス○痙攣ノ運動ヨリ發スル疝痛モ胃腸ニ鬱滯セル惡液ヲ疏滌ノ後明礬ヲ用テ腸ノ纖維ヲ收固シ強壯ニメ治スル者多シ○明礬ハ瀉下ノ功アル故ニ下利ノ症ニハ効少シ○尋常ノ服量ハ五匁ヨリ十匁ニ至ル多ク服スレバ胃ニ觸テ嘔吐ヲ發シ或ハ下利ス○明礬ハ收斂甚フメ刺戟スル

故ニ胃腸ノ感動シ易キ人ハ是ニ堪ズ宜ク戒慎ヲ加ヘ用フベシ

外敷 收斂清涼ノ強壯シ腐穢ヲ淨刷ス○經久ノ炊腫眼ニ明礬ヲ沸湯ニ溶シ湯六匁ニ溶シ明礬半錢沸湯六匁ニ溶シ故冷メ眼ニ點スレバ收斂強壯ノ炊腫ヲ消ス殊ニ淚多ク出ル症ニ良或云其効皓礬及ビ鉛糖ニ勝ル症アリト○炊腫眼ノ淚多キ症ハ左ノ方良驗アリ

清眼膏

雞子白 一個

明礬 適宜

右雞子白ニ明礬末ヲ研和ノ適宜ノ搨キ膏ト爲シ
 是ヲ布片ニ塗り眼ニ被_レ貼スル_一一時許ニ洗ヒ
 去リ。其後一時許ヲ經テ復_タ貼スベシ。久ク貼スレバ
 其熱セル淚眼中ニ鬱住ノ焮腫ヲ増發スル_一アレ
 バナリ。然_レ疔數_カ換_カ貼スレバ是ヲ以テ眼膜ノ細絡ヲ
 收斂ノ強壯ニシ淚ヲ他ノ部ニ驅散メ其毒ヲノ眼
 中ニ鬱聚スル_一無_ラシム。故ニ此症ハ兼テ刺絡ヲ
 施シ下劑ヲ用ヒ或ハ發泡膏ヲ貼シ或ハ吸角ヲ施
 ノ其毒ヲ諸部ニ排泄スベシ。○明礬ト沙糖ト等分
 ニ研和シ眼膜ノ障翳星斑ニ點メ消散ス。○明礬ニ

雞子白ト薔薇水ヲ研和シ煮テ泥ト爲シ温ニ乘メ
 按指大ノ錠ト爲シ放冷ノ乾固セシム。是ヲ糖礬ト
 名ク。外敷メ婦人粧顏料トシ又面部ノ小皰赤疹汗
 皰汚斑ヲ消シ或ハ焮腫眼ノ淚多キ症ヲ治シ或ハ
 脫肛子宮及ビ腔ノ下墜ニ良驗アリ。○咽喉焮腫ノ
 初發ニ明礬ヲ漱藥ニ加ヘ施メ消散ス。患者虛弱ニ
 メ焮衝劇盛ナラザル症ニ尤_モ良_ク或ハ左ノ漱劑亦殊
 効アリ

瑰礬舍利別

玫瑰花

明礬 各一錢

桑椹舍利別製法覆盆舍利別

右玫瑰花ト明礬ニ水八勺ヲ加ヘ煮テ漉過シ滓ヲ去リ舍利別ヲ攪和シ含漱ス○明礬半錢ヨリ一錢マデ取テ沸湯六勺ニ溶シ漱藥トシ咽喉口中ノ焮腫及ビ潰瘍或ハ斷腫起出血及ビ腐蝕潰爛若ハ斷水棉様ニノ出血シ或ハ懸壅垂腫脹シ或ハ失苟兒陪苦ニ因テ斷顎腐爛スルヲ治ス○失苟兒陪苦ノ毒ニテ斷腐蝕スルニ左ノ方奇効アリ

龍礬水

龍腦 一勺

明礬 二勺

沙糖 四勺

燒酒 二匕

右調勻シ浸ス一ニ日。漉テ液ヲ取り含漱ス○纖維虛弱ニノ愈難キ潰瘍及ビ水棉様ノ腫瘍或ハ鞞帶ノ弛緩ノ發スル閃挫脱臼ハ左ノ明礬水ヲ以テ患部ヲ洗ヒ或ハ蒸湯シテ偉効アリ

明礬水

明礬 極細末 一匕

沸湯 三北

右攪和シ熱灰上ニ置テ明礬盡ク溶化スルニ至リ
 放冷シ瀝テ上清ヲ取り硝子壘ニ收メ固封シ貯フ
 ○金創等外傷ノ出血或ハ衄血ニ右ノ明礬水ヲ外
 敷ノ即効アリ○頸或ハ膝等ニ發スル水棉様ノ腺
 腫ハ右ノ明礬水ニ的列竝底那精少許ヲ加ヘ蒸漏
 ノ驗多シ○脱肛及ビ子宮。腔等ノ下墜突腫スルニ
 右ノ明礬水ヲ蒸漏藥トシ殊効アリ○一切搔痒ヲ
 去リ腋臭ヲ消スルニ明礬ノ末ヲ患處ニ擦ノ速効
 アリ又搖齒ヲ固メ且淨潔ニス

枯礬 「ゲブラン ドアリ」 蘭

明礬ハ多ク水氣ヲ含メリ。是ヲ陶壺ニ内レ煨テ水
 氣ヲ脱スレバ乾白輕虚トナリ其酸性鹽。凝聚ノ酷
 厲トナリ收斂ノ性逾峻ニメ侵蝕藥トナル。故ニ細
 末トシ外敷ノ尤止血ノ効ヲ稱シ或ハ潰瘍ノ腐肉。
 贅肉。水棉様肉ヲ消シ或ハ便毒ヲ潰破シ斷ノ息肉
 ヲ消シ或ハ腐穢潰爛ノ創瘍ヲ淨刷シ。又甚ダ乾燥
 スル効アリテ汚液多キ潰瘍ヲ乾愈シ。口中咽喉ノ
 粘液腫ヲ消ス○此末ニ沙糖六倍或云和シ眼ノ星
 斑翳膜ニ點ノ消散ス○腋臭及ビ總テ惡臭アル部

遠西名物考

風雲堂藏

消散ス
依福
布叔
叔
伍
 此末ヲ擦リ或ハ是ヲ布片ニ摻カケ數換貼カノヨク

遠西醫方名物考卷二十三終

