

遠西醫方名物考

惠之

卷二十七

武
857
45-27

學大田稻早	館書圖
庫文田	者托寄
號七六	第書托寄
號 9	第
冊 8	第
冊 27	第





遠西醫方名物考標目

卷二十七

蒸餾水

失格列^シ乙^レ

西瑪爾^シ拔^マ皮^ル

紫堇越^シ幾^マ斯^ル劑^バ

瀉利鹽^シ 即瀉利鹽

收斂亞^シ的^マ兒^ル 石膽

升汞^シ 水銀條 升汞撒^シ爾^マ弗^ル 同上

惠^シ 諸厄^シ利^マ斯^ル瀉^バ利^バ鹽^バ

失格列^シ乙^レ越^シ幾^マ斯^ル劑^バ

紫堇昆^シ設^マ爾^ル弗^バ

舍利別^シ 世部

收斂皓^シ礬^マ水^ル 同上

赤降汞^シ 同上 朱^シ 同上

收斂鐵^シ液^マ 鐵條

升鐵^シ鹽^マ 鐵條

大正九年九月廿四日
內田糸子氏贈



遠西醫方名物考 卷二十七 標目

越栗失爾剝祿布利恒

鉛糖

鉛醋

附 密陀醋

越列密

越列密膏

阨日多膏

越没里膏

燕窩

依蘭苔

附圖

甘草蘭苔飲 治勞蘭苔飲

幾那蘭苔飲

越栗失爾。赭篤立沃利石膽

越扶屋布斯密涅刺

列水銀

越扶屋布斯末爾扶亞栗斯鐵

遠西醫方名物考卷二十七

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕

榕菴校補



蒸餾水

アイクデステイルラタ羅 ゲソイフルデ。ウイトル又オフルゲイルデ。ウイトル蘭

製法

雨水ヲ取り硝子若ハ磁製ノ格兒弗ヲ以テ

蒸餾ノ其水ノ四分ノ三ヲ取り

或云初ニ出ル硝子

壘ノ口マデ満シメ固封シ貯フ

水ヲ蒸餾ノ殆ト乾

クニ至レバ罐底ニ泥土殘ル故ニ數凡水ハ臭味

ナク淨潔ナルガ如シト雖モ土氣鹽氣硫氣ヲ含ミ

或ハ諸礦氣ヲ帶ル者アリ故ニ蒸餾ノ其汚物ヲ去

藥用ニ供スベシ○水ノ臭味アル者或ハ濁テ異色ヲ帶ル者或ハ是ヲ貯テ泥土粘汚ノ逆ヲ生スル者ハ皆惡水ニ汚物多ク雜ル候トス。飲料ニ用ルヲ勿レ○雨水ハ天造ノ蒸餾水ナル故ニ最モ輕清淨潔ナリ。但大氣中ノ酸性鹽ニ固性礫砂ト固性消石トヲ含故ニ洎餘ノ水ニ比スレバ竄透シ粘膩脂膏ヲ淨刷シ且ヨク物ヲ溶解ス。故ニ諸藥ヲ浸シ或ハ蒸餾スル等其他製煉術ニ多ク用フ。然レ早後ノ暴雨ハ夥ク蒸氣ヲ含ミ且土氣等ノ汚物ヲ夾ム故ニ淨潔ナラズ○雪水モ亦雨水ノ如ク固性ノ二鹽ヲ

含故ニ大抵雨水ト同シ。但大氣中ノ酸性鹽ヲ含ムナシ田云、泉河雨雪露ノ水ハ石灰質○泉水ノ岩罅石縫ヨリ迸出スル者ハ土氣御結土固性礫砂。海鹽。酸性鹽ヲ帶ブ泉ノ沙中ヨリ出ル者ハ土氣及固性礫砂ヲ脫除メ海鹽ト酸性鹽少許ヲ帶ルノニ凡泉ハ直ニ地中ヨリ滲出スル故ニ極テ清冽ニノ澄明ナレバ瀾熟セズ。飲液ニ用テ凝固シ易ク。消化シ難クメ停滯ス。常ニ是ヲ用レバ細絡纖管ニ壅塞メ痲痛風。疝痛。結石等ヲ患ル者アリ。或ハ銅鐵鉛等。諸金類ノ氣ヲ帶ビ或ハ硫黃。石膽。明礬等ヲ含ム者アリ。故

ニ異常ノ氣味アル水ハ皆飲料ニ用ル_レ勿_レ○井水ノ石縫ヨリ湧出スル者ハ泉ニ含メル三種ノ鹽氣ヲ帶ビ或ハ石灰及ビ消石氣ヲ含_レ或ハ諸礦氣ヲ帶ル者アリ。故ニ泉ト同シ○河水ハ右ノ諸物ヲ含_ト雖モ沙上ニ長流渙瀾ノヨク泡熟シ且大陽ノ照耀煦温ノ氣ヲ含_テ融解シヨク滑利流動メ汚物ヲ淨除ス。故ニ消化シ易シ。但_シ微鹽氣ヲ帶ル故ニ開達微利ノ効アリ。資稟壯實ニメ膽液多キ人ハ早旦空心ニ一二碗ヲ服メ胸中ヲ潤涼シ酷厲液ヲ和解シ大小便ヲ利ス。但_シ沙氣泥臭アルハ用ル_レ勿_レ又

泉井ノ水ニ比スレバ融解瀾熟スル故ニヨク石鹼ト合和シ脂垢ヲ滌刷ス。故ニ布帛ヲ晒シ石鹼ヲ造ルニ多ク用ヒ又画家洙匠ハ大抵河水ヲ用_テヨク碧綠黃等ノ色ヲ鮮麗ニス但_シ絳赤等ノ收溜ノ宜キ色ハ井泉ヲ用フ○湖澤陂池ノ水ハ前ニ舉ル諸物ヲ含_ムノミナラズ草木蟲類多ク水底ニ沈_テ腐敗シ又硫氣鐵氣及_ビ油鹽等多シ。故ニ飲料ニ用ル_レ勿_レ○凡_レ良性ノ水ハ澄清淨潔ニメ秤量輕ク。火ニ上_セテ速ニ煮沸シ又速ニ冷へ。穀肉蔬菜ヲ煮_テ速ニ化熟ス。故ニ飲液ニ用_テ消化シ易ク速ニ運輸メ胃ニ重

滯セズヨク諸竅ニ排泄ス水ノ量輕キハ土氣粘脂
等ノ汚物雜ラザレバナリ或云水ニ風化揮發ノ物
及銳烈慄悍ノ物ヲ含片ハ其量輕シ故ニ輕清ノ水
ト雖モ純潔ナラザル者アリト然レ水中多ク右ノ
如キ精微ノ物質ヲ含片ハ其氣揮發竄透スル故ニ
必ズ香臭アリ然レ輕清ニメ香臭ナキ水ハ設令精
微ノ物混スルコトアリ凡甚微少ニメ水ノ良性ヲ害
スルニ足ズト謂ベシ○沙ヲ以テ水ヲ濾ス片ハ汚
濁塵土等皆沙ニ留リテ其水清潔ナリ然レ是モ亦
全純粹トナルニ非ズ其故ハ水氣ノ漸漬浸透セル

細沙自剥裂ノ石質ノ液トナリ水ニ和メ滲漏ス故
其液承溜甕ノ底ニ粘著シ時日ヲ經ルニ隨ヒ漸凝
固ノ石英狀ヲ成者アリ又水中ニ含所ノ精微ノ物
質ハ水ニ混メ洞然トメ沙隙ヲ透過シ下ヲ以テ唯
其夾雜セル粗大ノ汚物ヲ除ノミナレバナリ○水
ノ汚物ヲ去ハ蒸餾スルヲ最良法トス然レ是モ亦
其夾雜セル凝體物ヲ除ノミ其故ハ水中ニ含所ノ
極テ精微ニメ水ノ如キ物質ハ水ト凡ニ蒸升シ出
レバナリ但シ沙ヲ以テ濾過スルニ比スレバ蒸升氣
化メ出ルガ故ニ一切凝體ノ物質ヲ脱メ最淨潔ナ

リ。但文火ニテ蒸餾シ唯精微ノ蒸氣慢緩ニ升化シ
 徐々ニ餾滴スルヲ度トスベシ。若モ火候ニ意ヲ加ス
 忽卒ニ蒸餾スレバ汚物モ共ニ蒸升シ出ス。斯ノ如ク
 蒸餾ノ其格兒弗ニ少モ渣滓ナキハ其水大抵汚物
 ナキ候トス。○温湯ハ内飲外用ニ緩和スル効アリ
 ○浴湯ノ主用ハ第一。皮膚ノ汗管ヲ淨除メ蒸氣
 ヲ開達シ第二。凝體纖維。脉管ノ強硬孳急ヲ縱緩弛
 解シ疼痛ヲ止ム。假令バ勞動歩趨ノ肢體拘急孳痛
 スル者。湯ニ浴メ治スルガ如シ第三。血液ヲ融解渙
 釋メ運行ヲ進輸増盛シ蒸氣及ビ汗ヲ發ス。故ニ血

液ヲ衝動ノ沸騰シ運行ヲ増進ノ害アル病ニハ是
 ヲ禁スベシ。叔揭 叔伍

失格列乙蘭 シコリウム 羅

○按ニ此草。洋葛苳ノ一種ナリ。物叔度云。此草洋
 葛苳ニ比スレバ葉粗糙ニメ差長ク。缺裂深クノ
 且、宿根ス。○性功大抵洋葛苳及ビ蒲公英ト同シ
 此二品多ク失格列乙主治ノ病ニ用フ。叔云。此草
 ノ性功。蒲公英。羊鬚。譯名。花戸。ジャガタラト同シト。
 皆代用スベシ。蒲公英ノ性功。蒲公英越幾

〔形状〕此草二種アリ○第一種ハ春月葉生シ洋蒿^{オランダチサ}苗葉ノ如クメ差深ク缺裂ス但其淺深多少一様ナラズ或ハ缺又少キモアリ淡綠色ニメ稍粗糙^ヤ或ハ黯赭ノ斑紋生ス梢葉ハ小クメ缺裂少ク或ハ刻缺ナシ葉間太キ圓莖ヲ抽^ヤ一二三尺許中虛粗糙^ヤ稍轉^{子ナレ}換シ枝ヲ分^ヤ葉多ク生ス枝梢ノ葉間ニ重瓣美碧色ノ花簇生シ瓣端ニ鋸齒アリ花白色或ハ黃色ノ者アリ後變ノ毛絮トナリ萼中ニ子ヲ結ブ白色ニメ稜アリ根白ク長ク太サ指ノ如ク鬚アリ根葉莖皆味苦ク折レバ乳様ノ白汁出ツ此草原野ニ生シ或ハ

種ヲ下シ培植ス二三年宿根ス根葉共ニ蔬菜ニ用フ○第二種ハ葉小ニメ缺裂深ク莖短ク白刺アリ其他第一種ト同シ沙地海邊ニ多ク生ス宿根セズ〔主治〕根或莖葉花モ用フ性涼收斂ス消石様ノ鹽氣ヲ含^ヤ清凉滋潤シ軟化稀釋シ稍刺戟ス粘稠液内藏ニ壅塞シ殊ニ腸腸間膜ニ滯著スルヲ疏解シ間歇熱ヲ治ス○膽液ノ油質稠厚ナルヲ稀^ヤ換シ其敗液ヲ大小便ニ排除ス故膽液腐敗ノ酷厲毒ヨリ發スル諸症ニ効アリ○血中ノ惡液ヲ淨刷シ清血ノ良藥トス故肝脾ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ脾病^{イボ}依剥^ポ昆^コ埴^デ

兒鬱憂病。黃疸。水腫。粘液腫ヲ治ス。○焮衝病ノ酷厲ナル血ヲ涼解シ壯熱焮衝熱肝脾焮衝遊走熱胃熱鬱蒸嘈雜及勞瘦消耗熱ヲ解散ス。○胃腸粘液酸敗液ヲ驅除シ蟲ヲ下ス。○蒸餾ノ露水ヲ取。眼ニ點メ焮腫赤爛ヲ祛翳膜ヲ消ス。○根。水煎シ或露水。舍利別。昆設爾弗等ニ製用フ。葉及花モ亦効アリ。○大黃ヲ加。舍利別トシ用テ諸焮衝ヲ涼解シ膽液過多及胃中不化。敗液ヲ滌除シ黃疸尤効アリ。又初生兒胎尿ヲ下スニ多用。○根。末トシ酒石英ヲ加。黃疸及水腫ニ用テ殊効アリ。○子ニ大麥煎汁ヲ加。搗テ汁ヲ絞

取乳劑トシ熱病ニ用テ清涼滋潤シ渴ヲ止ム
失格列乙越幾斯劑製法蒲公英越幾斯劑ト同シ
主治失格列乙主治所説ト同シ

伍伍 叔叔

西瑪爾シマール技バ皮ロウバ羅シマール
是ハ南亞墨利加洲ニ産スル一種ノ喬木皮ナリ其
狀菩提樹皮ノ如ク厚輕柔韌ニ革ノ如シ。表皮粗
糙ニ皺アリ帶黃白色ノ香氣ナク味苦稍收瀋ス。
技爾撒謨バールサム樣油氣アリ或云是根皮ナリ一尺許ニ裁
主治緩和ノ收瀋シ腸ノ急腹痛ヲ解シ虛症ノ赤

痢及經久ノ下利ニ偉効アリ。但初下劑ヲ用。病毒ヲ驅除シ胃腸ヲ淨刷ノ是ヲ用ガレバ効ナシ又赤痢後。腸ニ潰瘍ヲ生シ多。膿ヲ下スニ用テ効アリ○壯熱。嗽衝ナク。膽液及粘液ニ血ヲ交下ス赤痢ヲ治ス○服量四錢ヨリ一弓半許ヲ水煎シ用フ或ハ一弓ヲ水一比ニ煮テ半ヲ減シ服ス煎汁温ナル間ハ白色粘滑殆ト乳汁ノ如シ冷レバ帶赤色トナル或ハ末トシ半錢ヲ一服トス 〔叔〕〔叔〕〔依〕〔依〕

○按ニ此樹皮未詳ナラズ 〔依〕云。如密列ハ赤痢及經久ノ下利ニ用。脫泄ヲ收固シ痛ヲ止ル効アル

「西瑪爾拔皮ニ勝リト○又按ニ此藥虛弱ノ下利亦痢ヲ治スル功大抵幾那ノ如シ代用スベシ

紫堇越幾斯劑

〔エ〕キスタニクドイヘケルフル蘭紫堇一名地錦苗和名ヤブクマン

製法 生草莖葉ヲ以製ス其法蒲公英越幾斯劑ト同

主治 粘液及ビ膽液ヲ疏釋シ皮表ノ鬱毒ヲ排泄シ大小便ヲ利シ腐敗ヲ遏メ強壯ニス○萎黃病。黃疸ヲ治シ肝脾。腸間膜等ノ閉塞ヲ開通ス○一切瘡疹類經久頑固ニノ愈サル皮病ニ朝夕ニ多宛用テ能ク其酷厲毒ヲ驅發シ治ス。蜀羊泉 〔用〕及ビ安質沒扭

劑安質質沒扭若波列等ヲ用フ或ハ安ヲ加ヘ用テ殊ニ効アリ

○間歇熱ニ良驗ヲ稱ス ○肝脾門脈ノ壅塞ヲ兼ル

胸脇焮衝熱ヲ治ス ○黃疸ニ効多シ。殊ニ粘液多ク

胃腸ニ鬱滯ノ大便通セズ腹部痞悶ヲ覺ル者ハ下

劑ヲ加ヘ用ベシ ○腎痛結石ニハ大黃石鹼勿ハ加ヘ用テ殊ニ効アリ

ヲ加ヘ用テ殊効アリ福主治蒲公英ト同シ此草味苦クノ鹹ヲ帶ブ生絞汁ハ二煎湯トシ用ヒテ亦効同シ依福亞

紫堇昆コシ設ル爾フ製法生葉ヲ以テ製ス其法山薺菜昆コシ設ル爾フ同シ

爾フ同シ主治紫堇越幾ス劑ト同シ

惠

諸厄リ利ス瀉リ鹽

ガルカタルチキム又ガルアンゲルソウト蘭

○榕按ニ是即チ漢人所謂凝水石ナリ。時珍綱目

凝水石條別錄曰。生常山山谷。時珍曰。別錄言凝水

鹽之精也。陶氏亦云。鹵地所生碎之似朴消。范子計

然云。出河東河東鹵地也。獨孤泊丹房鑑源云。鹽精

出鹽地。狀如水精塊。此諸說則凝水即鹽精石也。一

名泥精。昔人謂之鹽枕。今人謂之鹽根。生於鹵地積

鹽之下。精液滲入土中。年久至泉結而成石。大塊有

齒稜如馬牙。消清瑩如水精。亦有帶青黑色者。皆至

暑月回潤入水浸久亦化○小野蘭山本草綱目啓
 蒙云。凝水石ハ真ノ寒水石ニメ即鹽ノニカリノ
 凝テ石ノ如キ者ナリ。年久ク食鹽ヲ多ク積置シ
 下。或ハ土中ニアリテ白色透明ナル。石蜜明礬
 ノ輩ノ如クノ重カラズ。味微苦ニメ鹹ナラズ。暑
 中ニモ解ケズ。濕ラズ。水中ニ投スル。久ケレバ
 融化ス。諸州鹽戶ニ多シ。市中鹽販ニモアリ又播
 州赤穂ニ氷柱ノ如クニメ長廿五寸許。中ニ稻草
 一條ヲ包モノアリ○榕按ニ下總小松川ノ邊ニ
 テ海鹽ヲ以テ和芒硝ヲ製シ亦凝水石ヲモ製シ

多ク藥舗ニ販ク。左ノ譯説ト參考ノ知ルベシ
 馮利鹽ハ一種ノ泉鹽泉ヲ煮テ取ル鹽ノ總稱ニノ
 天造人工ノ二種アリ。天造ノ者ハ諸厄利亞國ノ越
 貌宋ト云ル鑛泉ノ傍ニ凝結シ或ハ山谷中ニ生ノ
 消石ノ如ク凝結ス其天造ノ越貌宋鹽ハ鑛性ノ亞
 兒加利鹽ト礬性ノ酸收鹽ト抱合セル一種ノ中和
 鹽ナリ人工ノ者ハ古昔ハ越貌宋ノ泉ヲ煎熬メ結
 芒セシメ製ス。然レ此鹽ヲ得ル。少キ故ニ今ハ諸
 厄利亞ノ製煉家。海水ヲ煮テ食鹽ヲ取りタル後ニ
 殘ル苦汁ヲ以テ製ス。此亦礬性ノ酸性鹽ト苦味ノ

土トヲ以テ成ル一種ノ中和鹽ニメ其性天造ノ品ト同シ此鹽潔白光瑩殆ト雪ノ如ク味苦クノ滲透シ乾固ナルヲ上品トス其質消石ニ類シ瀉利ノ効アリヨク水ニ溶化ス火ニ投スレバ焔テ泡起シ焔ヲ發セズ爆聲ナク重固ノ質消シ輕屈ニメ綿絮ノ如シアルカリ亞兒加利鹽液ニハ溶化セズ大氣ニ觸テ風化セズ○是ヲ水ニ溶シ汚物ヲ淨凍メ精製後ニスレハ芒ヲ結テ蒸白瑩徹後ヲ成シ或ハ方形ヲ成シ瓦老別里鹽前ニ出ソノ如シ故ニ藥局家はヲ瓦老別里鹽ニ代テ販クコアリ

製法

海水ヲ取り是ニ粗朴ノ海鹽ヲ適宜ニ加テ溶シ火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾固ノ鹽ト爲シ此鹽ヲ取テ再ビ水ニ溶シ瀝テ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ上面膜ヲ生スルニ至テ放冷メ芒ヲ結ハシメ其芒ヲ取リ乾シ貯フ是ヲ瓦老別里鹽ト名ク其剩餘ノ芒ヲ結バザル液ヲ取り火ニ上セ水氣ヲ消ノ上面膜ヲ生スルニ至リ故冷シ芒ヲ結バシメ其芒ヲ取リ乾シ貯フ此即チ瀉利鹽ナリ和蘭ニテハ海水ヲ煮テ食鹽ヲ製スル後ニ殘ル苦灰汁ヲ以テ造ル

精製法

尋常ノ瀉利鹽ヲ適宜ニ取是ト

等分ノ沸湯ヲ加テ溶シ温ニ乘メ濾過シ放冷ノ芒
ヲ結バシメ其芒ヲ取り貯ヘ又其汁ヲ火ニ上テ水
氣ヲ蒸散シ試ニ是ヲ冷石上ニ滴メ凝結スルヲ度
トシ其液ヲ放冷メ芒ヲ結バシム數斯ノ如クノ終
ニ必モ結芒セザルニ至テ悉ク其芒ヲ取り集メ乾
シ貯フ其剩餘ノ汁ハ麻僞涅失亞過爾按ヲ製スル
ニ用ベシ按

又法 瀉利鹽 一坵 沸湯 三坵 右溶化メ火ニ上

セ煮テ上面膜ヲ生スルニ至リ紙ニテ濾シ放冷ノ
芒ヲ結バシメ大約半坵許ノ芒ヲ取ルベシ潔白透

瑩水ニ溶化シ易キヲ上品トス **亞** ○此鹽ハ氣ニ觸
レバ濕ル故ニ固封シ貯フベシ ○瓦カ老ラウ別バ里鹽ノ下
品ナルヲ此鹽ニ充テ偽り取ク者アリヨク擇ムベ
シ是ヲ驗スル法其鹽ヲ水ニ溶シ剥ボツ篤ト亞ア斯スヲ水ニ
溶シタル液少許ヲ取テ是ニ滴シ加ルニ忽チ其底
ニ苦味ノ塗ヲ生スルハ眞品トス其水澄清ニノ塗
ナキハ下品トス

主治 清涼下劑トス味苦ク稍刺戟シ効力峻ナラズ
メヨク瀉下スハル華爾斯質ノ下劑盧會藥刺巴龍骨木
ハ多ク腹攣急絞痛ヲ發スレ此鹽ハ必モ腹痛ヲ

發セズ。又嘔吐ヲ起スナシ。故ニ暫留熱。腎熾衝。酷烈ナル傷冷毒痛。脾病。水腫。黃疸。等ノ熱症ノ兩便不利及ヒ内藏ノ壅塞ヨリ發スル荏苒タル諸病。疝痛等ニ用テ大便ヲ利スルニ尤良。是ヲ服ノ嘔氣ヲ發スル者ハ香竈ノ藥ヲ加ヘ與フベシ。桂。姜。益。智。○服量一錢ヨリ一匁マデ水若ハ適宜ノ飲液ニ溶シ或ハ飲劑ニ加ヘ用フ。依。叔。裴。亞。

越栗^{エリキシル}失爾^{ポロブ}剥祿^ブ布利^リ恒^ト
エリキシルハ又サムンゲステルデエリ
キシルハ又アロエ又アインキウラアロ
エリキシル^{エリキシル}パ^パラ^ラセル^{セル}シ^シ羅^ロア^アル^ルゲ^ゲイ^イ子^子
ア^アロ^ロエ^エ又^又ア^アイン^{イン}キ^キウ^ウラ^ラア^アロ^ロ

エス。コム
ボシタ蘭

製法

盧會 末

沒藥 末

雜腹蘭 各一匁

燒酒 二十度者 三十匁

叔雜腹蘭四錢ニ作ル

右雜腹蘭ヲ細ニ割シ硝子壘ニ内レ燒酒ヲ加ヘ微火上ニテ浸ス。十二時。瀝テ液ヲ取り。盧會。沒藥ヲ加ヘ時々振蕩シ。淹ス。三日。紙ニテ瀝シ其液ヲ取硝子壘ニ内固封シ貯フ。叔

又法

前方ノ藥液一匁ヲ取り硫黃精若ハ綠礬精

十滴ヲ加フ

又法 前方中ノ没藥ヲ硝子燬ニ内レ硫黄精ヲ加
 濕シ置、二日ニメ廬會雜腹蘭ヲ加ヘ。是ニ燒酒ヲ
 注キ加テ其藥料ノ三指橫徑上ニ至リ。微温沙火中
 ニ置、七八日。其間數振蕩シ其浸染セル燒酒ヲ他ノ
 硝子燬ニ寫シ内レ。其滓ニ又前ノ半分量ノ燒酒ヲ
 加ヘ浸ス、前法ノ如クシ。終ニ其兩回ノ燒酒ヲ取
 テ合和シ硝子燬ニ收メ固封シ貯フ。右後ノ二方ヲ
 エリキシル。ポロプリタチス。キム。アシチュムト名ク。
 是レ方中ニ酸收ヲ加ルノ
 義ナリ。酸收ハ硫黄精ヲ云 ○右ノ方中硫黄精ヲ加

ヘズ。酒石液二錢ヲ以テ右ノ三味ノ藥末ニ加ヘ濕
 ス。一十二時ニノ燒酒ヲ加ヘ復浸ス、前法ノ如ク
 ス。是ヲエリキシル。ポロプリタチス。キム。アルカリ
 又ムト名ク。是レ方中亞兒加利液ヲ加ル義
 用テ害アル諸症ハ此方ヲ用ルナリ

主治 健胃ノ要藥トス。又内藏ノ壅塞ヲ開達シ粘液
 ヲ稀解シ大便ヲ利シ汗ヲ發シ腐敗ヲ遏メ飲食ヲ
 消化シ血中ノ惡液ヲ祛キ虻蟲ヲ殺シ寒粘液質ノ
 人及ヒ子宮病。經閉ニ良驗アリ ○内外創傷。潰瘍ヲ
 淨刷シ愈スニ尤効アリ
 此症ニハ硫黄精若クハ酒
 石液ヲ加ヘガル方ニ宜シ

○服量三十滴ヨリ五十滴マデ適宜ノ飲液ニ點服
ス効用大約律比丸前ニ出ツト同シ 叔伍 亞庚

又法 盧會

沒藥 各一弓

右細末トシ硝子壘ニ内レ孕鹼酒石液若ハ酒石葉
液一弓ヲ加ヘ固封シ微温沙火中ニ置キ泡熟ノ藥
料ヨク溶化スルニ至リ燒酒度者二比ヲ加ヘ浸ス
一六時ニメ其液ヲ他ノ硝子壘ニ寫シ内レ其渣ニ
又新ニ燒酒ヲ加ヘ浸メ其液ヲ取ル一前法ノ如ク
シ數斯ノ如クメ其渣盡ク消化シ唯汚物ノ殘ル

ニ至テ其液ヲ合シ文火ニ上セ其量ノ半ヲ減耗シ
硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

主治 是レ開達疏通ノ峻効アル藥ニメ纖維細管
竄透シ凝結ノ敗液ヲ溶解シ經久頑固ノ壅塞ヲ疏
解シ荏苒淹滯ノ廢疾ニ殊効アリ○的里亞加ヲ加
ヘ用テ汗ヲ發シ下劑ニ加テ汚滯ヲ滌除シ乳清ニ
和シ服メ小便ヲ利ス 庚

鉛糖

「サカルム。サタルニ羅
ロドソイクル蘭

製法

鉛粉 一比

蒸餾醋 十比

右鉛粉ヲ磁鍋ニ内レ蒸餾醋ヲ加ヘ煮テ酸味消シ
甘味トナルニ至テ紙ニテ漉其液ヲ文火ニ上水氣
ヲ蒸散メ上面膜ヲ生スルニ至リ再漉シ放冷メ芒
ヲ結シメ其芒ヲ取貯フ又其餘ノ液ヲ煮テ結芒セ
シムルノ前法ノ如シ其芒ヲ取集乾シ貯フ○鉛丹
若ハ黑錫ニテ前法ノ如ク製スル者アレバ鉛粉ニ
テ製スルヲ上品トス○此藥ハ一種礮性ノ中和鹽
ニメ潔白微透亮ノ芒針ヲ結ビヨク水ニ溶化ス若
潔白ナラザル者ハ蒸餾醋ト水ト等分ニ合是ニ其

芒ヲ投メヨク溶シ紙ニテ漉火ニ上水氣ヲ蒸散メ
結芒セシムルノ前法ノ如スレバ潔白トナルナリ
主治味甘收斂清涼ス外敷メ焮熱ヲ涼解シ血液ノ
酷厲毒ヲ甘和シ疼痛ヲ止ム故ニ一切焮熱腫痛及
ビ小炮赤疹等ヲ收斂メ消散シ潰瘍ノ侵蝕スル敗
膿ヲ淨掃シ乾愈ス○焮腫眼ニ是ヲ薔薇水ニ溶メ
眼ニ點シ或ハ鉛糖硃砂各四分水八分ニ研和シ眼
ニ點メ殊効アリ○咽喉焮腫ニ管ヲ以テ此末ヲ咽
喉ニ吹入テヨク腫痛ヲ消散ス○淋疾ノ酷厲毒ヲ
消シ焮腫ヲ止ルニ薔薇水若ハ乳汁ニ鉛糖一二分

風雲堂藏

ヲ和シ水銃ニテ陰莖ニ注入ノ驗アリ○是ヲ蕃薇
 水ニ溶シ面部ニ塗テ皮膚ヲ美澤ニシ汚斑瘡痕小
 飽赤疹等ヲ消散ス○膏藥及ビ塗藥ニ和シ外敷ス
 水ニ溶シ用テ効力羅度宛篤爾出ツノ如シ
 主治ト參 ○羅斯其他焮腫瘡瘍類皮表ニ發越ノ病
 考スベシ ○羅斯其他焮腫瘡瘍類皮表ニ發越ノ病
 毒排泄シ治スベキ症ニ此藥ヲ外敷ノ消散セシム
 レバ其毒忽チ内攻ノ諸惡症ヲ發ス云鉛糖鉛粉
其他諸鉛劑ノ
 性功大抵同様ナリ外敷ノ收斂シ濕ヲ乾シ臭汗及
 ビ腋臭ヲ消シ羅斯焮腫等ヲ治スレ其毒ヲ潜伏
ノ内攻セシムル故 ○此藥一日ニ半匁ヨリ
 ニ常ニ戒慎ヲ加スベシ ○此藥一日ニ半匁ヨリ
 五六匁マデ内服ノ痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症痲

及ビ痙急ニ因テ嚙下ヲ妨レ症ニ効ヲ稱シ又纖維
 諸脉ノ弛緩虚弱ニメ感動シ易キヨリ起ル諸症ニ
 良効ヲ稱ス然レ其鉛毒ニ因テ動モスレバ内藏ヲ
 閉塞シ烈キ疝痛痲不遂等ヲ發スルヲアル故ニ内
 服スルヲ稀ナリ亞西亞
亞西亞
 鉛醋 エキスタラクトサテ
ニシテ ニシテ ニシテ ニシテ ニシテ
 鉛醋 ニシテ ニシテ ニシテ ニシテ ニシテ

製法 密陀醋 次ニ出ツ
適宜
 右磁鍋ニ内レ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ油若クハ
 蜜ノ稠ト爲ス 後

又法 密陀僧 適宜

蒸餾醋 四倍

右磁鍋ニ内レ文火ニ上セ煮テ酸味ナキニ至リ紙ニテ漉シ文火ニ上セ水氣ヲ耗散ノ蜜ノ稠ト爲ス

又法 密陀僧 一匕

醋 二匕

右文火ニ上セ攪セ煮テ半ヲ減ス

主治 密陀醋ト同シ。但收斂ノ効峻烈ナルノニ

爾ト參考スベシ

密陀醋 アゼ左ム。リタリゲイリ又アゼ左ム。フルムビ。羅ゴウド。ゲリット。アゼイン又フル

製法 密陀僧 十弓

醋 四十弓

右頸。窄キ硝子ノ格兒弗ニ内レ數、振蕩ノ淹ス。十ニ時。慢火ニ上セ。二時煮テ放冷シ。是ヲ青紙ニ浸少モ色不變ニ至。紙テ漉去。渣硝子壘固封貯。

又法 密陀僧 半匕

醋 二匕

右磁壺ニ内レ數攪和シ酸味消スルニ至テ靜定シ其上清ヲ取り硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

主治 收斂ノ嘔スベキ甘味アリ。外敷ノ收斂清涼シ
焮腫ヲ消散ス。焮腫眼ニ點シ。咽喉焮腫ノ漱藥トシ
痔、焮痛。湯火傷。凍瘡。淚癭瘡。指疽。腺腫等ヲ治ス。水ヲ
加ヘ稀クシ皮膚顔面ニ塗テ赤皰小疹及ビ腫瘍潰
瘍。毒螫刺咬ヲ愈シ長途歩行ノ踵蹠焮熱。水疱腫痛
スルヲ治ス。或ハ洗藥。蒸溺藥トシ或ハ油ヲ和メ軟
膏硬膏トス 過底

越列密 ゴム。エレミ。又「エレムニ羅
是ハ黑地兀皮亞 亞弗利加洲ノ國名 伯西兒新伊斯巴尼亞共

亞墨利加洲ノ國名ニ産スルアルボル。エレムニヘラト名ル
樹ヨリ自然ニ流滴シ或ハ其樹皮ヲ鑽刻ノ取ル華
爾斯ナリ。其樹阿利襪樹ノ如ク葉長狹。淡綠色。或ハ
銀色ヲ帶ビ小赤花ヲ開ク。實亦阿利襪ノ如シ 或云
阿利襪ノ一種ニノ黑地 兀皮亞阿利襪ト名ク 其樹皮縦ニ坼裂スル處多
クノ宛モ鑽刻スルカ如シ。是ヨリ華爾斯多ク流溢
ス。上品ハ淨潔ニノ微透亮。淡黄色ニノ綠色ヲ帶ビ
且、白色ニノ透亮セザル顆粒間錯ノ大塊ヲ爲シ。質
重ク外面乾キ。裏軟ニノ粘潤アリ。味苦ク。香氣拔爾
撒謨様ニノ茴香ノ如シ 依云。灰色ニノ綠色ヲ帶ビ
其氣瓦爾拔奴謨ノ如シ

蘭蕉葉或ハ椰樹葉ニ卷テ四方ニ貨ス○或ハ伯西
兒新伊斯巴尼亞其他南亞墨利加洲ノ諸島ニ産ス
ルイシカリバト名クル樹ノ華爾斯ヲ越列密ト名
ケ取ク者アリ其樹葉梨樹ノ葉ノ如シ淡黃花ヲ開
キ實ハ阿利襪ノ如シ其華爾斯微黃透亮軟ニノ粘
リ甚ダ松脂ニ似タリ久ヲ經レバ乾固ノ磨碎スベ
シ前種ニ比スレバ下品トス又火ニ温メテ香氣的
列竝底那ノ如キハ偽品トス

○按ニ此樹脂和漢産未詳ナラズ舶來ヲ用ベシ
主治性温油氣鹽氣多シ外敷ノ凝結ヲ疏解スル殊

効アリ膏藥若ハ塗藥トシ稍衝動ノ腫瘍ヲ消散シ
疼痛ヲ止メ堅硬ヲ軟ゲ或ハ膿ヲ釀シ腐敗ヲ淨除
シ創ヲ愈ス良藥トス又神經ヲ強壯シ頭創神經創
及ビ骨傷脱臼ニ尤モ驗アリ頭痛齒痛肩背痛等ノ患
部ニ外敷ノ其疼ヲ消散ス燒酒若ハ油ニ溶シ塗テ
良○内服ノ粘液ヲ稀釋シ汚液ヲ淨除シ痛ヲ止ル
良効ヲ稱ス雞子黃ニ研和シ用フ或ハ水ヲ加ヘ蒸
餾ノ芳香ノ露水及ビ精微ノ油ヲ取ル右ノ諸症ニ
偉効アリ或云蒸餾ノ十六
越列密膏エムプラストエレニ
版依庚

製法 越列密ヲ取リ文火ニ溶トカシ若バ把ル兒マ麻膏ニ煉和ス
主治 越列密主治ニ舉ル諸症ニ外敷ノ良驗アリ **叔**

厄エ日デ多ト膏 「ユンギユエンナム、エゲブテキム」羅
「エゲイブチセ、サル」蘭

製法 銅綠細末 一比

酒石英 三比

右水適宜ニ加ヘ煮テ盡ク溶化スルニ至リ。瀝コシテ汁ヲ取り文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾クニ至リ。又風日ニ曝サラノ自ラ溶化セシメ。瀝コシテ滓ヲ去リ蜜十二比ヲ加ヘ攪和シ軟膏ト爲ス **後**

又法 銅綠細末 五弓

醋 七弓

蜜 十四弓

右文火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ煮テ軟膏ト爲ス **亞**

主治 汚穢腐爛ノ潰瘍ヲ淨掃シ。膿ヲ排ハラヒ壞肉ヲ祛クキ好肉ヲ生シ。水棉様肉ヲ除キ。熱壞疽。癌様及ビ徽毒ノ腺腫潰瘍。口中斷顎。爪。諸骨ノ腐爛ヲ淨除スルニ貼ノ良驗アリ **叔** **底**

越没里膏 「ユングエンナム、エモリンス」羅
「エンケルホウヂヘ、サル」蘭

製法 阿利襪油 五多

白蠟 二多

右文火ニ上セ烱化シ攪和ノ軟膏ト爲ス 亞按

主治 外敷ノ緩和止痛ノ捷効ヲ奏シ。堅硬ヲ軟化シ
焮熱腫痛ヲ消散シ或ハ善膿ヲ釀メ潰破セシメ或
ハ皮膚皴揭甲錯枯澁汚斑赤皰小疹瘡痕火傷凍瘡
等ヲ治シ肌膚ヲ滑澤ニス ○他ノ藥品ヲ加テ諸膏
藥ヲ製スルニ用フ 叔布 疾

燕窩 スワル_レ立子スト 蘭 ○人家屋簷ニ架スル燕
巢ナリ。燕窩菜ニ非ズ

主治 堅硬ヲ軟化シ凝結ヲ疏散ス。 琶布トシ頸ニ貼
ノ咽喉焮腫ヲ消散ス。是レ燕屎ニ酷厲ナル鹽氣土
氣アリテ凝血及ビ粘液ヲ驅散スレバナリ 叔 疾 伍

依蘭苔 リセンイスラシラシ エイスラシラシドセモス蘭

○榕按ニ是和名ハナゴケト呼ブ一種ノ苔ナリ
深山巖石林中地上老木等ニ生ス。西洋ニ於テハ
往昔始テ依蘭地 歐羅巴洲ニ採リ和蘭ニテ「エ」ス
ランドヒモスト名クモスハ苔ノ義即チ依蘭地
苔ナリ。今是ヲ略譯ノ依蘭苔ト名ク

形狀 形チ鹿角菜ノ如ク花又ヲ爲シ花又大小アリ
 圖ノ邊ニ微細ノ毛刺アリケシクモ 蘭細色或云一面ハ淡緑若ハ
 黯黒 味苦微收瀝粘滑ニメ香氣ナシ。水ニ浸シ若ハ
 水煎スレハ粘汁出テ鹿角菜ノ如シ。日乾シ或ハ水
 若ハ沸湯ニ浸シ淘洗スレバ苦味減ス

依蘭苔圖



產地 此苔。往古ハオスランド 依蘭地ニ採ルト雖モ今ハエウロパ 歐羅巴
 洲ノ北方諸國ノ山地巖石。礫确瘠土。荒野及ビ松林
 中ニ多ク生ス

主治 油。酸性鹽。許多ノ水。及ビ些少ノ土ヲ含ニ又コ 獲
 謨及ビハル 華爾斯アリテ其苦味ヲ生ス○人及ビ畜類
 共ニ食料トシヨク身體ヲ榮養ス。生鮮ノ者ハ微利
 ノ効アリ一晝夜水ニ浸セバ苦味消シ下利ノ効去
 テ唯粘液ノニ殘ル此粘液ヲ以テ諸蒸餾油及ビ龍
腦ニ研和シ水ニ加レバ 稀ナリ○
ト混 和ス但乾腊ノ者ヲ用フレバ下利スルヲ稀ナリ○
 此藥内服ノ消化シ易ク。大ニ滋養シ虚損ヲ補充シ

諸酷厲液ヲ包攝綏和スル殊能アリ。故ニ飲食消化ノ力衰へ羸瘦スル諸病及ビ勞瘵ノ要藥トス。○勞瘵ノ初發及ビ經久頑固ノ效嗽ヲ治スルニ近來是ヲ用テ經驗甚ダ多シ。○水煎ノ粘液ニ乳汁ヲ加ヘテ稀クシ。勞瘵様ノ病ニ毎日飲料トシ用テ全治スル者必カラズ。○胃ノ虛弱ナル者ハ乳汁ト雖モ消化シ難シ。此藥ハ良性ノ榮養液ヲ醸生スル殊効アルヲ以テ乳汁ヲ消化シ易カラシム。故ニ此藥ニ味乳汁ニ煮テ用。或ハ左ノ如キ劑ニ乳汁ヲ加用フベシ。

甘草蘭苔飲

依蘭苔 一匁

甘草 三錢

右苔ニ水一匕半ヲ加ヘ煮テ十四匁ト爲シ。火ヲ下シ甘草ヲ加ヘ浸ス。十六分時ニノ濃過シ用フ。○羸瘦消耗熱。肺傷久效。血液ノ虛損ヨリ發スル荏苒タル虛羸病。下利止マズ。瘦削スル等ヲ治ス。○傷冷毒ノ酷厲液。肺ヲ刺戟シ效劇クメ。虛憊セル症ニ的當トス。患人體稟薄弱ナル者殊ニ良。或ハ是ヲ用テ效治セザル者モ唯肺及ビ全軀ヲ滋養シ精力ヲ保

續ノ虚脱セシメザル爲ニ用テ良驗アリ○效嗽及
 ビ勞效ニ効アレハ嗽衝ニ傾ク症ニハ適應セズ脉
 弦數ニノ頗ル力アリ。舌及ビ皮膚乾キ。總テ纖維充
 張ノ候アル者ハ此藥ノ粘液質ハ妨ゲザレハ其收
 滿強壯ノ効ハ害アレバナリ唯患者ノ天質薄弱ニ
 ノ感動シ易ク。且腹部ノ諸藏及ビ肺虚損ノ粘痰多
 ク湊アツクリ火ヒモ嗽衝ノ候ナキ症。或ハ傷冷毒ノ酷厲液
 刺戟ノ肺虧損スル症ハ此藥ヲ用テ大ニ輕快ヲ致
 スナリ○肺虚弱ニノ感觸シ易キヨリ漸ク勞效ニ
 罹カリ吐痰過多ナル症ハ此藥大効アリ。但レ他ノ病毒

ヲ夾テ肺ヲ刺戟スル者ハ先ツ對症ノ藥ヲ與ヘ其
 毒ヲ驅除ノ後是ヲ用テ殊ニ的當ス○肺嗽衝ノ劇
 キ諸症退テ後每ニ是ヲ用テ効多シ。是レ一ニハ肺ノ
 虚損ヲ回復シ。一ニハ肺ニ壅滯セル膿ヲ排ヒ腐爛
 ヲ除キ淨掃ノ愈セバナリ○凡ソ肺瘍大ニ膿潰ス
 ル症ハ此藥ヲ用テ曾テ害アル者ヲ見ズ○總テ嗽
 衝ヲ兼ザル勞效ハ是ヲ用テ肺ノ虚損ヲ補充シ膿
 質ノ酷厲液ヲ消ス○勞效ニ幾那ヲ用テ應セザル
 片ハ此藥ヲ加ヘテ幾那ノ効ヲ扶ケ用テ良効ヲ得
 ルト多シ○肺ノ虚弱ナルヨリ勞效ニ罹カリ夥ク粘

痰ヲ咯ク症ハ幾那ヲ加ヘ殊効アリ。假令^{タトヘ}左ノ方ノ如シ

幾那蘭苔飲

幾那 一弓

依蘭苔 四錢

右水二比ヲ加ヘ煮ル^ル四分時ニノ十六弓ト爲シ
漚過^アノ滓ヲ去リ過爾託亞^ア舍利別。一弓ヲ調和シ一
時毎^トニ一小茶碗ヲ温服ス。○肺瘍勞效ノ既ニ膿ヲ
成ス症ハ動^ガモスレバ痰甚ダ膠粘ニノ咯出シ易カ
ラザル者多シ。此症ハ總テ強壯收瀦ノ藥ハ害アリ

故ニ右ノ飲劑ノミナラズ此藥一味與フト雖モ呼
吸促進煩悶等ノ惡症ヲ増發ス。○乾效及ビ痰咯出
シ難キ勞效。麻疹後ノ乾效休マザル症ハ此藥四錢
ヲ取り甘草二錢ヲ加ヘ水二比ヲ以テ煮テ十六弓
ト爲シ半時毎^トニ一小茶碗ヲ温服ノ殊効アリ多ク
痰ヲ咯^カシムベキ症ハ海葱蜜少許ヲ加フベシ假令^{タトヘ}
ハ此藥一弓ヲ取り水十六弓ヲ以テ煮テ一比ト爲
シ海葱蜜四錢マデ加ヘ一時ニ一弓宛^ツ用フ。總テ羸
瘦消耗熱ハ效ノ有無ヲ論セズ右ノ飲劑ヲ與ヘテ
患者ノ精力ヲ保護シ消耗脱泄ノ汗ヲ止ムベシ又

左ノ泡劑良驗アリ

治勞蘭苔飲

依蘭苔 一匁

甘草

蜀羊泉 各六錢

黥失刺越葉

乙切草 各三錢

茴香穗 二錢

右件調勻シ沸湯ニ泡出ス○肺ニ害ナキ諸般ノ羸瘦病モ亦病毒ノ所在ニ拘ラズ依蘭苔ヲ用テ多ク

効アリ○腹部ノ諸藏若クハ腸間膜腺ニ膿瘍等ヲ生スルニ因テ荏苒タル内伏熱ヲ發シ。身體消耗枯瘦スル症ニ是ヲ用テ治驗多シ○此藥腐敗熱ニハ峻効ナシ是防腐ノ性力慢緩ナレバナリ。然レ病毒漸ク退キ唯其榮養ノ虧損スルヲ培補シ精力ノ虛缺ヲ回復スベキ症ニハ大効アリ○殮泄下利肝崩等ノ脱泄ニ因テ胃腸ノ運化虛衰シ全軀ノ榮養ヲ失フ者ハ此藥甚ダ驗アリ。其病性分明ナラザル者モ是ヲ連服セシメテ効ヲ得ルヲ多シ○痛痢赤痢ノ初發ハ此藥的當セズ先ヅ吐劑或ハ大黃劑ヲ用

テ胃腸ノ酷厲毒ヲ驅除スベシ。否ラズノ早ク此粘
 涎ノ強壯藥ヲ投スレバ其毒逾壅鬱ノ病患淹滯シ
 惡性トナレバナリ。故ニヨク胃腸ヲ淨掃ノ是ヲ用
 レハ腸中ノ粘液剝脫ノ傷爛セルヲ填補シ精力ヲ
 強壯ノ大効アリ。○赤痢ノ膿ヲ下ス症ハ此藥良驗
 アリ石灰水石灰ノ條ニ出ニ煮テ用レハ殊ニ良。○痢疾惡
 性ナラズ。唯傷冷毒ヨリ發ノ其酷厲液ヲ和解スベ
 キ症。及ビ患者疲勞シ胃腸虛衰スルガ爲ニ荏苒ト
 ノ治セザル症ハ此藥ヲ用テ偉効アリ。亞兒尼加アールニカ若
 クハ幾那キナヲ加ヘテ殊ニ良。

服法 此藥一弓ヲ取り水一比ニテ煮ル。四分時。布
 巾ニテ絞り瀝ヒバ大約七八弓ノ粘汁トナル。或ハ
 茲養ノ効ヲ取ルニハ乳汁チ若クハ乳清一比ヲ加シ
 毎日飲料トス。○苦味ヲ惡ム者ハ沸湯ニ浸ス。ハ
 分時ニノ苦味ヲ去リ水煎シ服スベシ。効力脱スル
 下ナシ。小兒ニ與ルニハ右ノ如ク苦味ヲ去リ水煎
 ノ稀ウキ粘汁ト爲シ。桂水少許ト砂糖トヲ加ヘ一茶
 匙宛數用フベシ。○此藥ヲ連服ノ味ヲ惡ム者ハ乳
 汁ヲ以テ煮テ用ヒ。或ハ水煎ノ砂糖ヲ加ヘ甘美ト
 爲シ。或ハ香竄ノ諸藥ヲ加ヘ水煎ノ消化シ易カラ

遠西名物考 卷二十七

風雲堂藏

シムヘシ○或云泡劑ト爲セバ効力醇厚ナラズ濃煎スレバ甚ダ膠粘ニノ是ヲ服ノ細絡織管ニ滲入シ難シ或云水ニ浸シ用レバ味淡薄ニノ服ニ易シ

依 福 依 福

遠西醫方名物考卷二十七終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 林業山先生著 全三册 理學植學啓原 宇田川格庵先生著 全五三册

同 內象銅版圖 同 全一帖 舍密開宗 同 全一册 醫方正始 同 全一册

增補和蘭藥鏡 同 全一册 醫方正始 同 全一册

遠西醫方名物考 同 全一册 醫方正始 同 全一册

同 補遺 同 全九册 要術知新 同 全三册

瘍醫新書 文澤大總亮著 全四册 醫方同類 同 全四册


蘭學階梯 同 全三册 同方齋篇 同 全三册

蘭學佩觿 同 全一帖 西音發微 同 全二册

幼幼精義 素堂内先生著 全三册 病學通論 同 全三册

濟生三方 松田成卿先生譯 全四册 青藜閣 同 全四册

須原屋伊八



榛齋宇田川先生著

九篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

大澤大
青藜閣
發行