

遠西醫方名物考

世比
世毛

卷二十八

武田
857
45-28

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 9 第
冊 28 第



門中武
857
卷45-28

榛齋 宇田川先生著

十篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

大正九年九月廿四日
贈
內田糸子氏

遠西醫方名物考

遠西醫方名物考標目

卷二十八

比百合油

冰糖

毛沒藥

赫篤立沃利末爾扶斯撒兒末爾扶

沒藥糖 未爾扶斯沒藥丸 蘭苔沒藥丸

珊黃沒藥丸 雜腹蘭沒藥飲 酒石沒藥飲

沒藥丁幾去爾 沒藥越仙扶亞

沒藥越幾斯劑

沒藥油

木炭

遠西名物考

卷二十八

標目

風雲堂藏

世消石

精製消石

挑舍涼解飲
瑰麥潤涼飲
未爾疾斯消石散
鎮痛清涼飲
爽神涼血飲

霸王鹽

固性消石

消石液

消石錠

消石精

發烟消石精

蒸餾器圖四種

斯的爾苦苾篤兒

暹羅多倫赫篤栗沃刺黠謨
過兒加奴謨需百利加黠謨

甘消石精

杜松驅水飲



遠西醫方名物考卷二十八

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補

比

百合油

オレウムレリヲリム羅

製法

百合花瓣ヲ取製ス。其法加密列煎油ト同接

主治

外敷ノ温煖ニシ凝結ノ解キ堅硬ヲ軟ケ疼ヲ

止メ胸病ヲ治ス疾叔

冰絲糖ルボルストソイクル和糖ノケダライイデソイク

ル捻糖ノアルヘニ氷絲糖通稱

製法 白沙糖ヲ水ニ溶シ雞子白ヲ加煮テ泡沫ヲ

去放冷ノ凝結セシム○一種大麥煮汁ニ沙糖ヲ加

煎煉凝結セシムル者アリ是ヲ一ニゲルストソイク

煎煉凝結セシムル者アリルト名ク麥糖ノ義ナリ

主治 急迫ヲ緩メ疼痛ヲ祛キ胸中ノ酷厲液ヲ甘和

シ粘痰ヲ稀豁ノ吐易カラシメ欬嗽咽痛口中乾燥

聲嘎ヲ治ス○沙糖ハ石鹼ノ質アリテ纖維諸管ノ

強硬ニメ拘急セルヲ緩弛シ酷厲毒ノ刺戟ヲ甘解

ス故ニ乾欬及冒寒ノ諸症ヲ治ス○沙糖一弓半ニ

阿利襪油半錢ヲ研和シ用テ欬嗽ニ殊効アリ石長

生舍利別モ亦良○沙糖赤石脂酒石英各等分極細

末トシ角膜ノ星翳及肉翅ニ點メヨク消散ス○沙

糖ヲ鼻中ニ吸引ノ嚏藥トス或ハ吉利詞參兒トシ

肛門ニ注入ノ大便ヲ導通ス或ハ沙糖ノ末ヲ潰瘍

ニ摻ケ水棉様ノ壞肉ヲ除キ淨掃ス伍過

毛

沒藥 メイルラ 羅 メイルレ 蘭

沒藥ハ阨日多エト黑地エチ兀皮エビ亞共ニ弗ア刺ラ比亞細

亞州等ニ産スル一種ノ樹ヲ鑽刻ノ採ルハ護ハ華ハ爾ル

國名等ニ産スル一種ノ樹ヲ鑽刻ノ採ルハ護ハ華ハ爾ル

スナリ依云大ス約ス越ス護ス七ス錢ス其樹ハ三モサノ一種ニ

ノ棘刺アル小木ナリモサハ三モサノ一種ニ

東百名物考 卷二十一 風雲堂藏

邊及^ビ亞刺比亞^ア沿海^アノ諸國殊^ニ多シト云^ハ○沒藥ハ種々大小ノ碎片顆粒凝固ノ乾硬ノ塊ヲ成ス故ニ形^チ大約圓クノ粗糙昂低ノ稜ヲ爲ス。上品ハ淨潔ニノ顆粒多ク。赤赭色或、黯赭或、黃赤或、銅色或、黃金色等ノ碎片。錯雜シ。透亮若、ハ半、透亮ニノ輕ク。是ニ觸テ粘潤アリ。破碎シ易ク。破レバ裏面光澤アリ且、白色若、ハ灰色ノ條紋斑點ヲ爲シ。口ニ含、バ盡ク溶化シ味苦クノ辛ヲ帶^ビ按爾撒謨^ア樣ノ香氣アリ。火氣ニテ溶解セズ火ニ投スレバ燃^モテ焰ヲ發ス。新鮮ノ者ハ指ニテ壓扁^{オシ}メ易シ○尋常ノ品ハ黑色ノ碎片ヲ雜フ。但、木屑塵土

沙石等ヲ雜、テ重ク。香氣微ニノ苦味ナク或、惡、ベキ味アルハ藥用トセズ宜ク其汚物下品ヲ除キ上品ノ碎片ヲ擇^ニ用、ベシ或、亞刺比亞^ア越謨^ム櫻脂等ヲ雜テ偽造スル者アリ然、^レ其質ト氣味トヲ驗スレバ真偽自、明白ナリ○此物ハ上下數品相混ノ輸^イス故ニ和蘭ノ藥局ニテ上品ヲ擇^ニ分テ藥用ト爲ス。是ヲメイ^ルラ、エレクタ^タ擇^ニ分ツト名^ク。上品ハ其量一^ニ比ヲ以テ越^エ幾斯劑^ス出^後ニ半比ヲ製スベシ○沒藥ヲ蒸餾スレバ香氣苗香ノ如キ油出、然、^レ其^タ少シ。二比ヲ蒸餾ノ油僅ニ半錢許出、故ニ是ヲ用、^ルナシ

○按ニ藥舖ニ煉沒藥ト呼フ者是ナリ。花沒藥ト云ハ紫鉞ナリ混スベカラズ○此物多クハ楮黒色ニメ香氣微ク。苦味ナク土石木屑等ヲ雜ル故ニ其中ニ就テ明淨透亮ニメ香氣強ク味苦辛ノ者ヲ擇ニ藥用ニ供スベシ

主治 温煖衝動ノ衰弱ヲ強壯ニシ。又解凝。稀釋。開達。防腐。止痛ノ殊効ヲ稱ス○凡、凝體諸器ノ運營機轉。衰弱怠慢ニメ諸液粘稠ナルヨリ發スル諸病ニ的當ス○鑽透衝動ノ細絡織管ヲ開達シ諸液ノ分利排泄ヲ進メ殊ニ腹部諸器ノ分利排泄ヲ扶ク○諸

管ノ運營^{ハタラキ}乏弱怠慢ニメ粘液壅滯スル諸病及内藏^{ハタラキ}虚弱ニメ壞液鬱滯ノ疴ヲ治ス故如此勞瘵ニ用テ多ク驗アリ○微發汗シ胃ヲ健運シ蛇蟲ヲ殺ス○内藏壅塞硬腫。依剝^{イボ}昆垓^{コンゲル}兒。脾病。萎黃病。喘急。欬嗽ヲ治ス○患者強實ニメ壯熱^{ハタラキ}衝^{ハタラキ}ヲ兼ル症ニハ大ニ害アリ。熱症ハ先其熱ヲ解メ後用ベシ○肺病ノ一良藥トス。肺ニ粘痰壅滯スル症ハ左ノ方良驗アリ

沒藥糖

沒藥越幾斯劑^{後ニ出ツ} 沙糖 一弓
麻^マ 屈^グ 涅^ネ 失^シ 亞^ア 遏^エ 爾^ル 拔^バ 一弓

右研和シ一卵匙宛用_レ日四五次_ド一方没藥越幾斯劑四錢沙糖二弓ヲ研和ス一方没藥越幾斯劑四錢乳糖二弓ヲ研和シ尤良トス○患者粘液質ニノ粘痰多キ勞效ニ没藥良効アリ。是肺ノ虛衰弛緩セルヲ衝動ノ強壯スレバナリ。但_レ焮衝ノ候アル者ハ害アリ○粘液質ノ勞效ハ亞兒加利鹽及鐵劑ヲ加用テ効多シ。後方ノ如シ又經久下利白帶下甚驗アリ

未爾扶斯没藥飲

- 没藥 上好者 一錢
- 茴香水 七弓
- 驅風精 二錢
- 酒石鹽 半錢

右研和シヨク溶化セシメテ左ノ藥ヲ加フ

撒兒末爾扶斯 十二弓 過爾託亞舍利別 一弓

右調和シ一匙宛用_レ日四次_ト或云此劑ニ幾那丁幾去爾六錢ヲ加テ尤効アリ○肺瘍ノ膿ヲ成ス症ハ没藥効多シ。肺中硬結セル膿腫アリテ焮衝ノ候ナキハ硫黃ヲ加用テ殊ニ的當ス。左ノ方良驗アリ

珊黃没藥丸

- 没藥 上好者 二錢半
- 硫黃華 淘洗者
- 珊黃里越幾斯劑 各二錢

右三弓ヲ一丸トシ蝟蛄石ノ末ヲ衣トス一時ニ三

丸宛服ス○總テ内部ノ膿瘍ニ良効アリ赤痢治ノ
後腸ニ膿ヲ成シ尋常ノ藥劑ニテ治セザル症ハ左
ノ劑殊効アリ

蘭苔沒藥飲

依蘭苔 四錢 加密列 三錢

右石灰水半比ヲ以テ煮テ瀝過シ三多ヲ取り左ノ
藥ヲ加フ

沒藥越幾斯劑 一錢半 實亞格日温 三錢

右溶化シ一匙宛用テ日四次○體稟薄弱ニノ感動
シ易キ婦人ノ子宮衝逆ニ沒藥良驗多シ又敗液瘀

血ヲ子宮ヨリ驅泄シ催生シ胞衣ヲ下ス○諸管纖
維ノ弛弱ニノ血中粘液多キヨリ發スル經閉ヲ通
ス白帶下ヲ兼ル症ハ殊ニ驗アリ子宮衝逆ヲ兼ル
經閉ニハ阿芙蓉ヲ加テ尤良○寒粘液質ノ經閉ニ
ハ沒藥丁幾去爾殊効アリ或ハ通經ノ藥ヲ加用モ
良假令ハ左ノ方ノ如シ

雜腹蘭沒藥飲

沒藥丁幾去爾 一多 雜腹蘭丁幾去爾

藜蘆丁幾去爾 各四錢 製法健質亞那丁幾去爾ト同シ

右調勻シ三十滴若ハ其餘葡萄酒或ハ啤埵ニ點服

スル一日三四次○没藥ノ華爾斯質ハ衝動ノ壅滯ヲ驅泄シ凝結ヲ疏解ノ經閉ヲ通ス然レ水ニハ溶化シ難クノ其性能盡ク出ルヲ能ハズ故ニ丁幾去爾トシ殊ニ効アリ但水様ノ飲劑トシ用ント欲セバ亞兒加利性ノ藥ヲ加フベシ華爾斯質盡ク溶化ノ餘カヲ殘スヲナシ即チ左ノ方ノ如ク製スベシ

酒石没藥飲

没藥

芸香葉 各一弓

酒石液 四錢

右没藥芸香ヲ搗碎キ酒石液ヲ加テ泥ト爲シ水一斗ヲ加ヘ浸ス一三時ニメ文火ニ上セ煮一四分時

漉テハ弓ノ液ト爲シ一匙若ハ其餘患症ノ輕重ニ隨ヒ加減シ用一日三次○纖維諸管弛弱縱緩ナルヨリ水腫ヲ發シ或ハ寒粘液質ノ人水腫ヲ兼ル症ハ没藥ヲ用テ温壯利水ノ良効ヲ奏ス但其病增劇ノ内熱ヲ發シ焮衝ニ傾ク者ハ斯ノ如キ熱性衝動ノ藥ハ害アリ○粗工妄ニ胞衣ヲ牽離スニ因テ子宮ノ裏面毀傷シ潰爛メ敗膿汚液子宮ヨリ流泄スル症ハ此藥ヲ内服外用ノ殊効アリ

服量 十氏ヨリ半錢マデ一次ニ用フ丸藥ハ三氏ヲ一丸トシ四丸宛用一日ニ四次

○外敷ニ多ク用フ。愈創ノ拔爾撒謨膏藥類ハ多ク
沒藥ヲ加テ製造ス○拔爾撒謨ノ愈創ノ性功ア
ルヲ以テ臭穢腐爛ノ創傷潰瘍ニ此末ヲ摻シ若ハ
丁幾去爾トシ施メ腐爛ヲ淨刷シ侵蝕ヲ遏止シ良
肉ヲ生ス又瘀血ヲ散シ打撲傷ヲ愈シ寒腫ヲ消シ
壞疽腐骨疽ニ内服外敷ノ尤良○寒壞疽ノ生肉ト
死肉トノ間ニ此末ヲ摻シ或ハ腐骨ノ部ニ摻シ或
ハ此丁幾去爾ヲ棉撒絲ニ塗リ貼メ腐壞ヲ除キ治
ス○斷及ビ咽喉ノ腐爛ニ甚ダ驗アル藥トス齒ノ
腐爛ニ沒藥ヲ嚼ミ含ミ或ハ失苟兒陪苦ノ毒ヨリ

來ル症ハ此末ニ明礬玫瑰蜜海鹽精ヲ加テ患處ニ
塗リ或ハ總テ口中若ハ咽喉腐爛ノ漱衝ナキ症ハ
右ノ劑ヲ幾那煎或ハ擗皮煎ニ溶化シ漱藥トシ捷
効アリ但レ徽毒ノ咽喉腐爛ハ水銀劑ヲ内服セシメ
升汞ヲ漱藥ニ加ヘ施メ治スベシ依布伍物
沒藥テインキテラ去爾メイルラ羅福叔
製法 沒藥 上好者細搗 燒酒 二十度者
一弓 一弓
右硝子壘ニ内固封シ置テ六日其間時々振蕩シ布
片ニテ瀝シ滓ヲ去リ又紙ニテ瀝シ硝子壘ニ收メ固
封シ貯固○或云酒石液若ハ消石液ヲ此劑ニ加製

遠西名物考 卷二十一 七 風雲堂藏

スレバ没藥ヨク融解ノ其色及藥氣出。其法没藥ノ末ヲ酒石液ニテ濕シ煖處ニ置テ溶化スルニ至。乾シ硝子壘ニ内燒酒ヲ加前法ノ如ク製スルナリ。

主治 内藏壅塞ヲ開達シ粘液ヲ解小便ヲ利シ疼痛ヲ止。腐壞ヲ除ク。○衰弱虚羸ノ病ニ用テ精神ヲ爽快ニシ胃ヲ健運シ風氣ヲ驅散ス。○諸管纖維ノ弛弱怠慢ニシノ粘液壅滯セル諸病ニ用ヒ衝動健運ノ微汗ヲ發シ諸器ノ虚衰ヲ回復ス。○卒倒昏睡。依利昆垓兒。脾病。粘液腫。及壞液諸病ヲ治シ殊ニ經閉ニ効アリ。又白帶下。子宮ノ諸症ヲ治ス。○此劑ハ總テ

寒性ノ病ニ効アリ。熱性ノ患者及焮衝ノ候アル者ハ害アリ。○服量六滴ヨリ十五滴マデ飲液ニ點服ス。○外敷ノ汚穢ノ潰瘍。創傷及鼻口舌斷。咽喉等ノ臭穢潰爛ヲ淨刷シ治ス。○凡患部弛弱虚衰ノ排膿内托ノ勢カナク荏苒トノ愈ガル潰瘍及打撲傷。腐骨疽。寒壞疽ヲ治ス。寒壞疽様ノ咽喉腐爛ニ漱藥トシ効アリ。熱壞疽ハ初發ニ患處ヲ刺テ惡血ヲ瀉シ此劑ニ羯布羅精少許ヲ加施ノ良。○右ノ亞兒加利液酒石液或ハ消石液ヲ加ヘ製スルヲ云ヲ加ヘ製スル劑ハ殊ニ衝動ノ効多キヲ以テ腐肉多キ潰瘍ヲ淨刷スルニ良

沒藥越幾斯劑

エキスタラクト。メイラ。アキヲシ
ム。羅。ウトリゲ。ゴム。エキスタ
ラクト。ハン。
メイラ。ハシ。

製法

沒藥 上好者極細末 水 二比
半比

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置テ三日。故冷メ其
逆ヲ去リ紙ニテ濾シ其液ヲ慢火ニ上セ水氣ヲ熬
乾ノ錠ト爲シ貯フ其溶化セザル渣逆ハ華爾斯質
ナル故ニ丁幾去爾ト爲シ用ベシ

主治 沒藥ト同シ。唯熱性衝動ノ華爾斯質ヲ脱スル
故ニ稍熱性ノ人ニ用テ害ナシ丸藥及煉膏トシ一
頓ニ一月許用ベシ或云煎熱ノ製スル故ニ性力減

耗シ且華爾斯ヲ脱スル故ニ其効緩弱ナリ。因テ
ノ局方ニハ此劑ヲ收録セズ

沒藥油

オレウム。メイラ。ペル。デリギイウム

製法

煮タル雞卵ヲ縱ニ割り其黄ヲ去リ沒藥末
ヲ填充シ其白ヲ接合シ絲ニテ縛定シ。窖等ノ濕處
ニ懸テ其下ニ鉢ヲ置ハ沒藥融解ノ透亮赤色ノ油
樣液トナリ淋漓ス。是ヲ取り硝子壘ニ内固封シ貯

又法

沒藥末一比ニ煮タル雞子白ノ搗碎者二比
ヲ拌ゼ温湯少許ヲ濕ノ布袋ニ内濕處ニ懸テ其液
ヲ取テ前法ノ如クス。○此藥變敗シ易シ。此液一

ニ銳烈ノ燒酒一錢ヲ和シ貯レバ腐敗セズ久ク貯
フベシ

主治 拔爾撒謨樣ノ揮發油ヲ含_レ創傷。潰瘍等ニ外敷
ノ膿ヲ排ヒ疼ヲ止ノ侵蝕腐壞ヲ除キ乾愈ス○口
中唇舌乳頭ノ坼裂。凍輝等ニ塗テ速ニ愈○面部ノ
小皰汚斑ヲ消シ。肌膚ヲ美澤ニシ。頭瘡ヲ治ス
沒藥_越仙扶亞 沒藥_丁幾去爾ト同シ
〔辰〕 〔過〕 〔布〕 〔叔〕

木炭

製法 質輕キ木炭ヲ搗碎キ陶埴ニ内レ。一孔ヲ穿

カルボ子スリグノリュム羅
ランテンヨル又ホウトヨル蘭

タル蓋ヲ覆ヒ。火ニ上セ燒テ通紅ト爲_ス。半時許_或
一_時ニ放冷シ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

主治 一切香臭ヲ奪除シ腐敗ヲ遏絶スル奇効アリ。
假令バ阿魏。麝香ノ如キモ新ニ製スル木炭ノ末ヲ
加テ研磨スレバ其氣速ニ消散ス。腐蝕ノ肉類。變敗
ノ水漿等ニ此末ヲ摻_シ加フレバ臭氣消メ故ノ如
シ○凡ソ臭穢腐蝕ノ膿瘍腐骨疽。壞疽等。膿汁汚液
多キ症ハ此末一味患處ニ摻シ若_クハ幾那。楊皮。槲皮。
沒食子。枯礬等ノ末ヲ適宜ニ擇_テ加テ摻シ或ハ經久
頑固ノ潰瘍。頭瘡等。臭穢ノ壞液。滲漏浸淫シ或ハ濕

酸性氣ナリ然ニ消石ヲ燒燬スレハ其酸性氣消散
 ノ盡ク酷烈ナルア兒カ利リ鹽即チ後ニ舉ルトナル
 ヲ以テ知ベシ○其酸性氣ハ大氣ニ含ル者ニ自
ア兒カ利リ鹽ニ著テ凝結シ消石トナル○凡レ琢磨セ
 ル銅鐵類ノ漸、鏽敗シ瓦礫垣墻等ノ色變シ崩壞ス
 ルモ此大氣ニ含ル酸氣ノ侵蝕スルニ非ルハナシ。
 ○消石ヲ水ニ和スレハ寒氣ヲ生ス是レ消石ト水
 ト抱合スルニ因ル消石清涼ノ性効モ是ニ係ナリ
 ○其ア兒カ利リ鹽ハ即チ剝ト篤ア斯ニノ草木ノ燒灰中
 ニ在ル所ノ鹽ト同シ是レ草木ニ稟ル所ノ固性ノ
兒加カ利リナリ○凡レ鹽ノ質少シモ

風化消散セズ火ニ投メ消滅セズヨ此ア兒カ利リ鹽
 ク火ニ堪ル者ヲ總テ固性鹽ト名ク
 ヲ基資トシ酸性氣ト抱合渾化メ消石トナルナリ
 或云消石ハ酸性氣ト植物固性ノア兒カ利リ鹽ト抱
 合メ成ル海鹽ハ酸性氣ト山物固性ノア兒カ利リ鹽ト抱
 ト抱合メ成リ硃砂ハ酸性氣ト動物固性ノア兒カ利リ鹽ト抱
 利鹽ト抱合メ成ル○或云消石ニ含ルア兒カ利リ鹽ト抱
 ハ海鹽ニ多ク含リ又石灰類ニ含ルア兒カ利リ鹽ト抱
ア兒カ利リ鹽ト抱合メ成ル○大氣中多ク消石氣アリ殊ニ蒸升セル地氣
 ナリ○此氣鬱遏メ迅雷ヲ作ス丁猶火藥ノ如シ○
 植物モ亦消石質ノ鹽氣ヲ含者多シ假令ハ蒲公英
 失格列乙碎米薺萵苣紫葢等ノ生汁清涼性アル者
 ノ如シ○雨露深井水瀦水及膏腴ノ地ハ消石ヲ含

又一切動物ノ血液ニモ是ヲ含リ。故ニ尿尿糞道ノ多、
 汚汚セル土地ハ消石ヲ含、下珠ニ多シ。○上好ノ消
 石ハ乾淨瑩白。長大。六稜ノ氷柱狀ヲ爲。氣ニ觸テ濕
 ラズ。風化溶消セズ。敲テ響ヲ爲。火ニ投メ爆聲ヲ發
 セズ。唯焯鳴シ速ニ燃テ鮮明ノ焰ヲ發シ。質消化ノ
 固鹽少許残り。舌ニ觸テ辛微苦冷徹鑽透ス。消石ヲ
 湯ニ溶シ。剥篤亞斯ヲ水ニ溶シタル液ヲ是ニ滴メ
 其底ニ土沈マザルハ上品トス。○火ニ投シ爆聲ヲ
 發スルハ海鹽雜ル微トス。燃テ質消滅セザルハ土
 氣多微トス。氣ニ觸テ濕ルハ亞兒加利鹽多微トス。○

粗朴消石ハ必ス土氣海鹽粘液ヲ雜故ニ精製用ベシ

精製消石

ニットリウム。デヒュラチウム。羅ゲソイフ
 ルデサルペートルシルポットアス蘭

尋常ノ消石ニ多ク沸湯ヲ加テ溶化シ湯六倍放冷
 ノ芒ヲ結バシム。若ヨク結芒セザルハ是ニ精製
 剥篤亞斯ノ溶液十倍ノ水ヲ加ヘ滴シ加ベシ。初ハ其
 底ニ沈ミ降レ。終ニ少モ沈ミ降ラス。其底ニ渣渣
 ヲ現ス。ニ至テ其液ヲ紙ニテ濾テ滓ヲ去。文火ニ煮
 テ上面膜ヲ生スルニ至リ放冷スレバヨク結芒ス。
 其芒ヲ取。乾シ貯。是ニ由テ消石ニ含ル海鹽粘液
 等盡ク脱メ明淨ノ質トナルナリ。是ヲ以テ消石精

ヲ製スレバ極テ銳烈ナリ。消石上好ナラザレバ其
 精。薄弱ニシテ^ス斯的^ル爾^ク苦^ト窳^ト兒^ル出^後ツトナルヲナシ精
 製消石ハ八倍ノ水ニテヨク溶化ス。沸湯ニハ等分
 ノ量ニテ溶化ス

主治性寒。壯熱ヲ涼解スル峻藥トス。血液ノ沸騰。強
 盛ノ運行ヲ降鎮シ。煩渴ヲ止メ。脉ノ洪大強數ヲ減
 シ腐敗ヲ防護ス。○諸管ニ鑽透ノ凝結ヲ溶化シ閉
 塞ヲ開達シ病毒ヲ分利ノ諸竅ニ排泄ス。○血液ノ
 大過強盛ナル運行ヲ抑制スト雖モ他ノ酸精ノ如
 クニ收斂セズ。ヨク稠厚ノ血液ヲ稀釋ノ壯熱ヲ涼

解ス。○綠礬精。硫黃精ノ如キ礮性ノ酸精ハ收斂ノ
 血液ノ焔解崩壞ヲ遏止シ腐敗ヲ防護ス。譬バ乳汁
 ニ酸味ノ液ヲ加レハ凝固スルガ如シ。消石ハ一種
 ノ中和鹽ナレバ收斂セズノヨク血液ヲ稀釋溶解
 シ壯熱ヲ清涼ス。○心藏大幹動脈及ビ諸筋ノ強盛
 ナル勢力ヲ抑制ス。故ニ動脈ノ温煖急疾ノ運行及
 ビ纖維ノ充張力ヲ減損シ又腸腎皮表ノ排泄ノ諸
 管ヲ疏通ノ大小便蒸氣ヲ開達ス。然レ清涼利水ノ
 効殊ニ居多故ニ^{オホシ}焔衝壯熱ヲ解スル主藥トシ。熾盛
 熱胸脇咽喉腎膀胱等ノ焔衝ヲ涼解ス。○凡ソ焔衝

病ハ消石一錢ヲ扁桃乳一弓ニ研和シ用ヒ或ハ左ノ乳劑良凡、焮衝病ハ瀉下ノ害多シ故ニ乳劑ニ宜シ

桃舎涼解飲

扁桃乳 十六弓

舍利別 六弓

消石 一錢半

右研和シ半時毎ニ一小茶碗ヲ温服ス○劇キ焮衝病ノ效ナキ症ハ初發消石ヲ屋施蔑兒ニ研和シ與テ効アリ○患者精力虚損シ殊ニ肺腎胃腸ノ虚罷セル諸症ハ消石害アリ○總テ熱病ノ壯實ナシ諸症減スルニ隨テ消石ノ服量ヲ減シ然ノ凝結ヲ疏釋スベキ症ハ硃砂ヲ以テ消石ニ代用ヒ終ニ虚候

ヲ現スニ至テハ專ラ壯神劑ヲ與ベシ○胸脇焮衝ノ脉強ニノ數乾、欸ニ血ヲ交ル痰少許略ク症ハ消石適應ス一日ニ三四錢マデ用ベシ但、脉力衰へ焮衝減スルニ隨テ此藥モ減スベシ○胸肋焮衝ノ腐敗膽液ヨリ發シ其毒胃腸ニ鬱蓄スル症モ初メ消石ヲ用ヒ焮衝減スルニ隨テ其量ヲ減シ輕キ下劑ヲ多ク用ベシ○神經胸脇痛ト名ル症アリ胸脇痛ハ胸脇焮衝ナリ是ハ初、焮衝ヲ發スレモ無幾精力虧損ノ虚候ヲ見スナリ故ニ初發消石ヲ用ヒ虚候ヲ見スニ隨テ強壯劑ヲ與ベシ○虚弱ノ肝焮衝ハ消石良効ア

リ。然レ是ヲ用テ嘔氣甚キ者ニハ用難シ如此症ハ水銀劑ヲ加テ凝結ヲ溶解シ。阿芙蓉劑ヲ加テ疼痛ヲ寛解ノ効アリ○胃及ビ腸ノ焮衝ハ總テ消石類ノ中和鹽ハ害アリ○子宮焮衝ノ劇盛ナル症ハ消石効アレト多クハ患者虚憊シ或ハ壞疽トナル故ニ戒慎ヲ加ベシ。此症ハ酸味收斂ノ藥ヲ用テ焮衝ヲ治シ。精力逾虚損スル片ハ攝爾扁答。纈草。等ノ揮發壯神ノ藥ヲ加フベシ○孕婦ノ頭痛發熱等神思ノ感動ヨリ發シ。血液ノ運行過盛ナル者ハ消石良驗アリ○間歇熱。膽液熱。發斑熱ノ初發。焮衝ノ諸症多

キ者ハ消石ヲ用ベシ。凡ソ膽液過多ノ症。並ニ壯熱病ニ是ヲ用レバ啻ニ其熱ヲ解スルノミナラズヨク發汗ス。然レ惡性ノ熱病ニ於テ脉虚シ精力缺脱スル症ニ是ヲ用レバ病毒排泄ノ汗。斑疹。等ヲ効テ發越セザラシム○中暑霍亂大渴煩熱甚キ症ニ是ヲ用テ壯熱ヲ撲滅シ煩渴ヲ涼解ス○焮衝性ノ痘ハ消石ヲ的當トス○焮衝性ノ痛風。關節痛。脚痛或ハ其毒。橫膈ニ衝テ煩悶シ嘔氣ヲ兼ル者ハ是ヲ用テ尤驗アリ○焮衝性ノ傷冷毒熱ノ初起。其痛劇キ症ハ是ヲ用テ効アリ然レ其劇痛ニ因テ患者速ニ

虚憊スル故ニ久服セシムルヲ勿レ。寒涼刺戟ノ藥ニ堪ザレバナリ。○發斑熱ノ患者虚憊セル症ニ長ク此藥ヲ用レバ斑疹卒ニ消散ノ内攻スルヲアリ。○焮衝性ノ失血ニ是ヲ用レバ血液ノ沸騰ノ妄行スルヲ抑制スル故ニ多ク驗アリ然レバ焮衝性ノ症ニ非レバ大ニ血液ヲ稀釋ノ逾其脱泄ヲ増劇ス。○徽毒淋疾ノ焮痛甚キ症ニ此藥ヲ稱ス。然レバ其焮熱腫痛劇キ症ニ刺戟驅水ノ峻藥ヲ用レバ却テ其疼増長スルヲアリ。此症ハ粘滑緩和鎮痛ノ劑ヲ施シ大ニ寛解ス。○眼耳斷舌ノ焮衝痛。羅斯等甚クノ發

熱スル者。焮衝性ノ頭痛及ビ熱毒發狂等ニハ是ヲ用テ的當ス。○咽喉及ビ口中ノ焮腫ニ是ヲ漱藥ニ加ヘ施シ効アリ。酷厲ナル熱ヲ兼ル症ハ殊ニ良。此藥ハ輕ク衝動ノ解凝ノ効アル故ニ咽喉口舌ニ膠布セル粘液ヲ稀釋シ。燥熱ヲ凉散ス。或ハ玫瑰蜜ニ研和シ塗ルモ良。或ハ左ノ漱劑ヲ用ベシ

玫瑰麥潤涼飲

大麥煎 六勺
玫瑰蜜 一勺
消石 三錢
右溶化シ温メ漱劑トス。○傷冷毒ノ咽喉焮腫ニ消石ヲ漱劑トシ施シ其効。硃砂明礬ヲ調和シ用ルカ

如シ。又懸壅垂ノ腫脹ヲ消ス○小兒齒生スルニ由
テ齒痛劇ク。發熱咳嗽。便閉。睡中驚悸等ヲ兼ルハ消
石の效アリ。又斯ノ如キ諸症ニ左ノ劑驗多シ

鎮痛清涼飲

實亞格日温ダアコダ十弓 消石 一弓

右研和シ半時ニ一卵匙宛用フ○凡ソ勞瘵様ノ病
及ビ麻疹後ノ勞瘵等ハ此藥ノ刺戟ニ堪ヘズノ害
アリ然レニ遷延消耗熱及ビ荏苒タル内伏熱ハ左ノ
方驗多シ

爽神涼血散

螻蛄石 一弓 消石 四錢 銀朱 一弓

右調和ノ散劑トシ。硝子壘ニ貯ヘ。一卵匙宛乳汁ニ
點服スル一日ニ四次○發汗劑ニ消石ヲ加ハ能ク發
汗ス。又瀉下ノ効アレハ小便ヲ利スル効居多故ニ
多ク水腫小便閉ヲ治ス左ノ方良驗アリ

未爾扶斯消石散

消石 一弓半 格碌屈斯未爾扶斯 一弓

右研和シ每服一弓。日ニ四次此劑寒性粘液質ノ人
ニハ利尿瀉下ノ効必シ○膽液酷厲ニノ熱毒多キ
下痢。及腸焮衝ヨリ發スル下利ニ消石ヲ用レハ下

利自ラ止ム○熱性ノ經閉及産後惡露壅滯ノ熱ヲ兼ル症ハ是ヲ用テヨク瘀血ヲ下ス○脾病神思鬱憂病等ニ兼ル煩熱風氣痞滯。攣急。心腹痛ヲ解散ス○消石ヲ温湯ニ溶シ外敷ノ疑血ヲ疏散ス。冷水ニ溶シ施セバ血液ヲ凝固セシム○消石ニ醋。海鹽ヲ加ヘ蒸溺劑トシ解熱涼散ノ効ヲ稱ス。或ハ醋。海鹽。屋施茂兒ヲ加ヘ吉利詞參兒トシ施メ大便燥結ヲ通ス○服量大約一月ヲ一服トシ加テ一錢ニ至ル

霸王鹽

ガルポレイクレスト又「リキシハ」トリ
 ヲラタソルフレア「ア」羅「ベルフルモ」ゲン
 デソウル「エ」レ「ボットアス」蘭

製法

消石

精製者

硫黃華

各等分

右各極細末トシヨク合和シ。坩鍋ヲ火ニ上セ通紅トシ。右ノ末一匙ヲ取テ坩ニ投シ焰ヲ發シヨク燒化シ火モ煙ナキニ至テ又一匙ヲ投ス。斯ノ如クノ盡ク其末ヲ燒了リ仍其坩ヲ火上ニ置テ四分時許ニ火ヲ下シ。是ヲ取テ速ニ沸湯ニ溶シ。紙ニテ濾シ。其液ヲ靜定ノ上清ヲ取り渣ヲ去リ。文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ上面膜ヲ結ブニ至リ。磁壺ニ内レ冷處ニ置テ瑩白ノ芒ヲ結ブ。其結芒セザル液ヲ取り初ニ除キタル渣ヲ加ヘ沸湯ヲ増シ加テヨク攪和

シ。紙ニテ濃シテ水氣ヲ蒸散スルノ前法ノ如クシ。
 放冷ノ結芒セシム。數斯ノ如クノ終ニ火モ結芒セ
 ザルニ至リ。其芒ヲ取り集メ水ニテ洗ヒ乾シ硝子
 堊ニ收メ貯フ〔按〕或云此鹽潔白ナラズ。黑色ヲ帶ル
 ハ硫黄ヨク燒化セザルナリ。故ニ再ビ是ヲ大ナル
 坩鍋ニ入テ燒煨シ。鐵篋ニテ手ヲ住メズ攪セ一時
 半若ハ二時許ニノ潔白ノ鹽トナル。是ヲ沸
 湯ニ溶シ結芒セシムルノ前法ノ如クス

主治 是一種ノ中和鹽ニノ解疑ノ峻藥トス。内部諸
 藏ノ壅塞ヲ開通シ。腐敗ノ膽液。粘液。留飲。停水ヲ稀
 釋ノ小便ニ驅泄シ。微大便ヲ利ス。故ニ實症ノ水腫
 ニ尤効アリ。殊ニ其壯熱及ビ煩渴ヲ治ス○性功孕

礬酒石ノ如シ。但孕礬酒石ニ比スレハヨク水ニ溶
 化シ稀釋解疑ノ効多シ○服量半錢ヨリ一錢ニ至

ル〔候〕〔叔〕〔賜〕
〔伍〕〔依〕

固性消石

コットリム。ヒキシム。羅
 ハステサル。ペトル。蘭

製法

坩鍋ヲ火ニ上セ。漸ク火ヲ加ヘ。精製消石
 ノ末ヲ投メ熔シ。是ニ木炭ノ通紅ナル小片。若ハ其
 細末ヲ以テ少許宛投スレバ爆聲ヲ發メ焚燒ス。數
 是ヲ投メ火モ焚メ消石凝固スルニ至テ逾火ヲ增
 火モ烟氣ナキヲ度トシ放冷スレバ消石ニ含ル鹽
 盡燒化メ白綠色ノ亞兒加利鹽トナリ。氣ニ觸レバ

速ニ溶解ス。是ヲ沸湯ニ溶シ火ニ上セ煮熬ノ乾固ノ
 白鹽ト爲ス。是ヲ固性消石トス。○此鹽若ハ他ノ亞
 兒加利鹽ヲ水ニ溶シ是ニ消石精ヲ滴シ加レバ沸
 騰ス其沸騰止ヲ度トシ火ニ上セテ水氣ヲ熬減シ放
 冷スレバ復結芒ノ故ノ消石トナル。○性功酒石鹽
 ト同シ。 庚

消石液

一名亞兒加利
 一名亞兒加利
 一名亞兒加利
 一名亞兒加利

製法

固性消石ヲ製シ了テ速ニ蒸餾水ニ溶シ
 漚テ渣ヲ去リ火ニ上セ水氣ヲ減メ油ノ稠ト爲ス
 是ヲ消石液トス。○性功酒石液ト同シ。 庚

消石錠

ガルプリユ子ルヲ羅
 ガルペートルクケシ蘭

製法

精製消石ヲ坩鍋ニ内レ。火ニ上セテ焯シ。其
 量二十分一ノ硫黃末ヲ取テ少許宛其坩ニ投メ焚
 燒セシメ。是ヲ石上ニ寫シ放冷ノ凝固セシム。 庚

主治 清涼シ渴ヲ止小便ヲ利シ閉塞ヲ開キ粘液ヲ

稀釋ス。○壯熱。嗽衝熱。咽喉焮腫及淋疾小便閉等ノ

焮熱アル症ヲ治ス。○服量半片ヨリ三錢ニ至ル。○

咽喉口舌ノ焮腫ニ是ヲ口中ニ含テ溶シ或亞刺比

亞邁謨ト砂糖ヲ加テ研和シ含テ驗アリ。 依云此藥

酸性消石ノ効ヲ取ルニハ精製消石ヲ優レリトス。 依云此藥

消石精

製法

スヒリテラスニツトリアシガウム又スヒリ
タスニツトリスハ羅サルペートルシユル蘭
消石精製乾淨者
細末二十四弓
蒸餾水 各十二弓
綠礬油 再餾者

右消石ヲ硝子ノ列篤兒多ニ内レ。綠礬油ニ水ヲ和
シ。此液ヲ一滴宛右ノ列篤兒多ニ加ヘ。硝子ノ承餾
壘ヲ接合シ。接際ヲ塗封シ。沙火ニ内レ。初文火トシ。
漸ク火ヲ加。蒸餾ノ其精必モ蒸升セザルニ至リ。其
精ヲ取り硝子壘ニ内レ固封シ貯フ。○右ノ消石精。
澄清ナラズ微濁ルキハ是ヲ承餾壘ニ内レ。口ヲ開
沙火ニ安シ火候ヲ平等ニシ濁リタル蒸氣蒸散シ

盡キ澄清ナルニ至リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ 拔

又法 發煙消石精

蒸餾水 各等分

右件合和ス 亞

發煙消石精

スピリテラスニツトリヒュマン。スガラウ
ベリ羅。ロケンテサルペートルシユル
又「サルペテリヘ。サルペートル。シユル蘭
此精蒸氣升發ノ焚烟ノ如シ故名ク

製法

消石 精製乾淨者
極細末二十四弓
綠礬油 再餾者
十二弓


右消石ヲ潤大ナル列篤兒多ニ内テ其半ニ充シメ。
嘴長ク彎タル硝子ノ漏斗ヲ列篤兒多ノ頸ニ挿シ。
是ニ綠礬油ヲ一滴宛徐々ニ淋滴ノ列篤兒多ノ頸

ニ觸ル^ルナク消石ニ加テヨク混和セシメ^一頭ニ^注レハ大ニ沸騰ノ列篤^レ速ニ列篤^レ兒多ヲ沙火ニ内レ^レ兒多迸裂スレバナリ^ニ列篤^レ兒多ヲ沙火ニ内レ^レ頸長キ硝子ノ承餾壘三個ヲ連続ス。其法第一個ト第二個ノ承餾壘ノ頸本ノ側ニ一小嘴アリ。先列篤^レ兒多ノ彎^レタル頸ヲ第一個承餾壘ノ頸ニ挿シ。一個ノ彎^レリタル硝子管ヲ取テ第一個承餾壘ノ頸側ノ嘴ニ挿シ。其一端ヲ第二個承餾壘ノ頸ニ挿シ又一^レ個ノ彎^レリタル硝子管ヲ取テ第二個承餾壘ノ頸側ノ嘴ニ挿シ。其一端ヲ第三個承餾壘ノ頸ニ挿シ。連續セシムルナリ。但第二個承餾壘ニハ其列篤^レ兒多

ノ消石ノ二十分一ノ蒸餾水ヲ内^レ九分^六錢^三第三個承餾壘ニハ消石ノ四分一ノ蒸餾水ヲ内^レ六分^六石^灰ト雞子白ト適宜ニ合和シタル膠泥ヲ布條ニ塗テ諸承餾壘ノ接際ニ纏^キ貼^メ蒸氣ヲ透漏セザラシム。其承餾壘ヲ連續ノ多少ノ水ヲ内^ハ其蒸氣ヲ水ニ吸收スルガ爲ナリ。然^レ初ハ文火トシ漸次ニ火ヲ加^レレバ黄色ノ蒸氣出ツ。列篤^レ兒多ノ底通紅トナレバ赤色ノ蒸氣升テ酸精溜滴ス。終ニ蒸氣少シモ升ラザルニ至テ火ヲ下シ。放冷スレバ第一個承餾壘ニハ極^テ銳烈ナル消石精出ツ。此即發烟消石精ナリ。

速ニ是ヲ硝子壘ニ内レ。其三分ノ二ニ充_メシメ。硝子壘ニテ固封シ。冷處ニ貯_ルベシ。煖處ニ置_キハ其精沸溢ナリ。第二個承餾壘ニハ銳烈ナラズメ黄色ヲ帶ル精アリ。第三個承餾壘ニハ澄清ニメ多少消石氣ヲ含メル精出ツ。其精ハ各別ニ硝子壘ニ内レ固封シ貯_ルベシ。○或ハ兩嘴アル承餾壘ヲ以テ製スルモ良_シ。即_チ左ニ舉ル圖ノ如シ。又是ヲ以テ鹿角精發烟海鹽精硃砂加石灰精等ノ銳烈揮發ノ精ヲ製スベシ。

イ 列篤兒多
 □ 燼
 ハ 承餾壘
 ニ 硝子管
 ホ 鉢ニ冷水ヲ盛ル。承餾壘ノ半水中ニ内ル



○消石精ハ右ノ如ク綠礬油ヲ加ヘ製スレバ消石ニ含ル亞兒加利鹽ヲ以テ其油氣ノ蒸升スルヲ阻遏スル故ニ毫モ綠礬油ヲ含ムナキ純粹ノ消石精トナルナリ○是ヲ製スルニハ嚴寒ノ時令ヲ最良トス○爐ノ火氣ニテ承餾壘ヲ温ナラシメズ勉テ寒涼ニスベシ○承餾壘ヲ放開スル片其蒸氣口鼻ニ觸レバ呼吸噎塞スル故ニ預メ意ヲ用テ是ヲ避クベシ○此消石精和蘭ニ於テ一斯的爾苦成篤兒ト名ツケ羅甸ニテ亞括怒爾扶斯ト名ク是ヲ用テ銀ヲ焔解ス○其列篤兒多ニ殘ル渣塊ハ消石ノ亞

兒加利鹽ト綠礬油ノ酸收ト抱合セル中和鹽ナリ是ヲ晒多綸赫篤栗沃刺黠謨ト名ク性功鑽透開達病疔病黃疸等經久ノ病ヲ治ス是ヲ服メ嘔下ス肝氣ヲ發セハ再煨過メ用ベシ嘔氣ヲ發セス是ヲ修製ノ邊兒加奴謨需百利加黠謨ト名ク此即孕礬酒リ酒石ノ條孕礬酒石○消石精ニ植物固性ノ亞兒加利鹽剝篤亞斯酒石鹽亞爾鮮ヲ加レバ故ノ消石トナル○此精ハ極テ猛烈ニノ焚カ如キ烟氣ヲ蒸發ス諸油類ニ加レバ大ニ熱沸ス亞爾箇兒及丁子油ノ如キ揮發香竄ノ蒸餾油ニ加レバ忽燃テ焰ヲ發ス○此精ヨク固封シ貯レバ其焚蒸赤色ノ烟氣一

遠西名物考

卷二十八

一風雲堂

年モ消散セズ○然レ性大寒ニ消石ニ勝レリ。是
 清凉ノ峻功アルヲ以テ其性寒ナルヲ知ノミナラ
 ス。雪若^{モシ}ハ水ニ此精ヲ加レバ極テ寒冷トナリ。又是
 ヲ以テ氷及ビ雪ヲ作り、或ハ水銀ヲ凝固セシムル
 ヲ以テ知ルベシ○其秤量、海鹽精ニ比スレバ重ク。
 綠礬精ニ比スレバ輕クノ酸性モ緩弱ナリ

主治 性大寒。味峻酸ニ一切壯熱及ビ焮衝性ノ諸
 病ニ用テ涼解ノ峻藥トシ。津液ヲ生シ煩渴ヲ止メ。
 血液ノ燥涸ヲ潤シ。壅塞ヲ開達シ。小便ヲ利ス○熾
 盛熱。膽液熱。腐敗熱等ノ壯熱ヲ涼解ス○綠礬精。硫

黃精海鹽精ハ收斂清凉ノ纖維諸管ノ弛緩虚弱ヲ
 健固ニス。此精ハ清凉ノ血液ヲ稀釋スル効。殊ニ峻
 ナリ。故ニ焮衝性ノ水腫熱ヲ兼ル症ニ用テ清凉利
 水ノ偉効アリ○或云微毒ニ水銀劑ヲ長服ノ體中
 ニ懸留シ効ナキ症ニ是ヲ用レバ水銀ヨク融解ノ
 其主能ヲ逞發ス水銀ノ條ニ舉ル溶汞劑ノ効アルガ如シ○此精一二
 滴ヲ水一盞ニ加適意ノ酸味ト爲シ服ス○瘡疹潰
 瘍等内服外敷シ又疥癬ニ塗テ良驗ヲ稱疾揭依

甘消石精

ス。ポリタス。ニトリ。ドルシス。羅。ステ。サ
 ル。ペ。トル。ゲ。スト。又。アル。コ。リ。セ。サル。ペ
 テル。ア
 テル。蘭

遠西名物考 卷二十八 二十六 風雲堂藏

製法 燒酒 三十度者 二北半 發烟消石精 一北

右燒酒ヲ潤大ナル長頸ノ列篤兒多ニ内レ硝子ノ漏斗ニテ消石精ヲ一滴宛其列篤兒多ニ加テ每次振蕩シ其頸口ヲ塞キ沙鍋ニ安シ承餾壘ヲ接續シ置テ數日置テ冷處ニ文火ニテ蒸餾シ其燒酒量ノ三分二ノ精ヲ取ル若其精ニ酸味アル片ハ是ニ煨製麻屈涅失亞ヲ加テ沸騰止ニ至リ列篤兒多ニ内レ文火ニテ蒸餾ノ精ヲ取硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

又法 亞爾箇兒 三北 發烟消石精 六多

右亞爾箇兒ヲ潤大ナル硝子壘ニ内レ消石精ヲ取

テ一滴宛加テ每次其壘ヲ振蕩シ頸口ヲ疎ニ塞キ冷處ニ置テ七日是ヲ列篤兒多ニ内レ承餾壘ヲ接續シ慢火ニテ蒸餾シ精ヲ取ルテ三十二多其精ニ蒸餾水六多加テ攪和シ又煨製麻屈涅失亞ノ末ヲ取テ少許宛加テ必モ液動セザルニ至リ是ヲ列篤兒多ニ内レ文火ニテ蒸餾シ精ヲ取ルテ三十多是ヲ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ ○純粹ナル油質ノ燒酒 亞爾箇兒ヲ云燒酒盡ク水氣ヲニ猛烈ナル消石精ヲ加レバ宛モ焰ヲ吐カ如ク沸騰スル故ニ一頓ニ是ヲ加レバ大ニ沸溢メ列篤兒多ヨリ迸出シ其

蒸氣肺ヲ侵刺ノ呼吸噎塞ス或云此精ハ製法ニ意
ト雖モ時日ヲ經レバ必
ズ消石精ノ酸味ヲ帶ブ

主治是油質ノ酸精ニノ拔爾撒謨様ノ性能アリ。諸
壅塞ヲ開達シ。鬱結ヲ揮散シ。汚液ヲ排除シ。腐敗膽
液ヲ疏泄ス。○汗ヲ發シ。小便ヲ利シ。胃ノ諸症。子宮
衝逆ヲ治ス。○清涼飲ニ加。熱病ニ用。テ血液ノ沸騰
ヲ降鎮シ。渴ヲ止メ。惡性熱ヲ治ス。○此藥忽弗滿鎮
痛液綠蘇條ノ性能アリ。然レ正鎮痛液ニ比スレバ効力
緩和ニノ起熱ノ性少シ。故ニ焮衝ヲ兼ザル者ハ熱
アル症ニモ皆良効アリ。○此藥鎮痙ノ効アルニ因

テ發斑熱ニ多ク効アリ。然レ正赤斑熱ニハ害アリ赤斑
熱ハ總身面部ニ極テ赤色ノ斑ヲ發シ。欬嗽
頭痛等ヲ兼ヌ是多クハ傷冷毒ヨリ發ス。是消石
精ノ氣アリテ咽喉ヲ刺戟スレバナリ。○利尿藥ヲ
加テ水腫ニ殊効アリ。假令タトヘバ左ノ方ノ如シ

杜松驅水飲

- 杜松實水 六勺
- 海葱蜜 一勺
- 甘消石精 二錢
- 安質沒扭酒 半錢

右調勻シ。一時ニ一匙宛用フ。○荏苒タル胸中諸症。
欬嗽痰喘等ノ患者虛衰シ傷冷毒ノ諸症ヲ兼ルハ
此精甚驗アリ。○此藥諸腹痛ヲ治シ食ヲ進メ風氣

痞滯ノ疝痛ニ捷効ヲ稱ス。故ニ一ニ是ヲ治疝露ト名ク。但胃腸ノ激衝ヨリ發スル症ハ斯ノ如キ竄透衝動ノ藥精ハ害アリ○子宮衝逆。脾病。神思鬱憂病ニ兼發スル拘攣痛ヲ治ス○孕婦ノ惡阻ヲ治スル良藥トス○神經感動甚キ人及ビ老人婦人ニ發スル頭眩眩冒。胃ノ虛冷ノ諸症。肢節顫振。臍動等ニ多ク速効アリ。是ニ驅風藥ヲ加テ殊ニ良○性功。大抵甘綠礬精。甘海鹽精ノ如シ○服量三十滴許。葡萄酒若ハ^ハ吟^テ堙^テニ點服スル^ル日ニ三四次^{依_侯揭_布福_淑遏}

遠西醫方名物考卷二十八終

