

遠西醫方名物考

世

卷二十九

十武
857
45-29

學大田稻早	館書圖
庫文田內者托寄	號七六一第書托寄
號	冊
9	8
	29



門 賦
857
卷 45-29

石 齋 印 信

遠西醫方名物考標目

卷二十九

石膽

皓礬

綠礬

綠礬油

淨製綠礬油

再餾綠礬油

綠礬精

皓礬造法
收斂皓礬水

皓礬水

揮發清血飲
爽酸清涼飲
消毒治癬飲

健胃玫瑰煎
爽酸舍利別

大正五年九月廿四日
內田 宗 子 氏 贈

石 齋 印 信

亞的兒

揮發壯神飲
亞的兒回生飲

收斂亞的兒

亞的兒芙蓉飲

遏設印亞的兒

忽弗滿鎮痛液

密涅刺爾鎮痛液

甘綠礬精

越栗失爾赫篤立沃利

礬紅

蓬礬鹽

膽礬 雙礬收斂水

煨膽礬



遠西醫方名物考卷二十九

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

石膽

ヒットリヨルム羅
ヒット
リヨル又ゴペル
ロド蘭

○按ニ「ヒットリヨルムハ膽礬。綠礬。皓礬ノ總稱ナリ。漢說ニ此總稱ナキヲ以テ假ニ石膽ヲ以テ是ニ充ツ

此物分テ三種トス。膽礬。綠礬。皓礬ナリ。共ニ天工人
工ノ二種アリ○天工ノ者ハ山坑若ハ地上ニ於テ
硫黃ヲ含ム酸精即チ硫銅。鐵。亞鉛等ト抱合メ溶化

シ。遂ニ凝固ノ石英狀ノ塊ヲ成者ナリ。其鉛ト抱合
 ノ成者ヲ膽礬トシ。鐵ト抱合ノ成者ヲ綠礬トシ。亞
 鉛ト抱合ノ成者ヲ皓礬トス。○人工ノ者ハ山坑ニ
 出ル一種礬性ノ礦石。若ハ其性ノ土ヲ採リ搗碎水
 ニ溶シ淘洗ノ漚過シ。其汁ヲ煮テ放冷シ。石英狀ノ
 晶ヲ結シムルヲ宛モ消石ヲ製スルガ如シ。或山坑
 ニ出ル礬性ノ泉ヲ煮テ晶ヲ結シメ製スル者アリ
 但、其產地ニ隨テ品ヲ異ス。又其銅鐵等ニ硫黃ヲ含
 多少ニ隨テ其性及色ヲ異ス。卽是ヲ分別メ左ニ舉
 皓礬
 「ヒットリヲリムアルビュム又「シンキム。ヒットリ
 ヲリム。羅 ヲイツテヒットリヲル又スピアウ

テル。ヒットリヲル蘭。○「ウイツテヒットリヲルハ
 白礬ノ義ナリ。然レ礬石ト同稱ナル故ニ今
 詳ノ皓
 礬トス

是天造人工ノ二種アリ。天造ノ品ハ亞鉛ト硫黃ヲ
 含ム酸精前出ト抱合シ地中ニ於テ自然ニ凝結セル
 中和鹽ナリ故ニ一ニ是ヲ亞鉛礬ト名ク其質硫黃酸
 性氣土氣水氣ヲ含白色ニメ石英狀ノ小塊ヲ成シ
 或帶白色。乾固淨潔ニメ其狀。沙糖ノ凝塊ノ如ク或
 赤點若ハ綠色ヲ帶ブ味酸澁ニメ甘ヲ帶ビ收斂侵
 刺ス。然レ綠礬ニ比スレバ苛烈ナラズ或ハ未熟ノ
 銅鐵礦。爐甘石。鉛等ヲ夾雜セル者アリ。火ニ投スレ

ハ焯テ黄赤色ノ灰トナル。或ハ礦性ノ泉ノ蒸氣。自然ニ凝聚ノ成者アリ。○右ノ如ク銅鐵鉛等ノ礦質ヲ雜ル故ニ藥劑ニハ天造ノ品ヲ用ズ製造ノ用フ
○製造ノ品ハ往昔ハ綠礬ヲ煨過メ白色ト爲シ水ニ溶シ漚過シ其液ヲ煮テ熬乾シ製ス。是綠礬ニ比スレバ性緩ニノ酷烈ナラズ。或云愕斯刺盧獨歐洲地名ニ於テ製スル者ハ山坑ヨリ毳毛ノ如ク綿絮ノ如キ者ヲ採テ水ニ溶シ。熬乾メ白色ノ塊ヲ爲ス。沙糖ノ如シト。○今時ハ製煉術ニテ皓礬ノ質ヲ覈知シ。新タニ是ヲ製造ノ醫藥ニ供ス。其法左ノ如シ

皓礬製法

亞鉛 粗末 適宜
蒸餾水 十勺
綠礬油 再餾者 四勺

右綠礬油ニ水ヲ合和シ。亞鉛末ヲ取テ少許宛是ニ加レバ熱沸ス。終ニ少モ沸騰セザルニ至リ。温ニ乘メ紙ニテ漚シ。其液ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ上面膜ヲ生スルニ至リ冷處ニ置バ白色ノ晶ヲ結ブ。是ヲ取り乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。此物ハヨク水ニ融解シ又氣ニ觸レハ速ニ溶化ス。

主治 鎮痙ノ良藥トス。痲痺。搐掣。子宮衝逆。等神經ノ

諸症。及ビ内藏壅塞。虻蟲等ニ奇効アルト亞鉛花ノ
 主治ニ舉ル如シ亞鉛華ノ條ニ皓礬ノ殊効ヲ稱ス参考スベシ○中毒等
 ノ速ニ吐スベキ症ハ一二日ヲ飲液ニ點服ノ快吐
 ス○漱藥トノ鵝口瘡ヲ治ス。或ハ玫瑰蜜ニ研和シ
 塗テ捷効アリ○焮腫眼ニ點メ腫痛ヲ去リ淚多キ
 ヲ治ス或ハ皓礬一錢沙糖二錢研和シ眼ニ點ス○
 角膜曇暗潰瘍等ニ是ヲ胡桃油若ハ乳汁或ハ家猪
 脂ニ研和シ眼ニ點シ或ハ煮タル雞卵ノ黃ヲ去リ
 皓礬ヲ填充シ置バ自ラ溶解ノ津液滲流ス其液ヲ
 取り眼ニ點メ皆良驗アリ。但藥性侵蝕スル故ニ一

頃ニ多ク施スヲ勿レ○疥癬及失苟兒シカク陪苦ノ潰瘍
 ニ皓礬。硫黃。家猪脂各等分研和シ軟膏トシ貼メ治
 ス。但硫黃ノ臭氣ヲ去ルニハ芳香ノ蒸餾油一二滴
 ヲ加ベシ或ハ硫黃ヲ除クト雖モ亦効アリ頑癬浸
 淫瘡ノ類ハ總テ皓礬良驗アリ○此末ヲ摻テ出血
 ヲ止メ潰瘍ヲ淨掃シ乾愈ス搗福依
 皓礬水アノ多オアタルニカヒトリヲ
ル羅ヒトリヲルウト止蘭
製法 皓礬 九斤
 水 六斤
 一方薔薇露ヲ用フ
 右研和シ硝子壺ニ内レ貯フ

リ。或、多少ノ銅氣ヲ含リ然レモ鐵氣ヲ含ム殊ニ多キ
 ヲ以テ一ニ是ヲ鐵礬ト名ク○鐵屑ニ綠礬精ヲ加テ
 溶シ結芒セシムレバ鮮美上好ノ綠礬トナルヲ以
 テ知レベシ是即チ鐵ノ條ニ舉ル撒兒又綠礬ヲ燒煨
 スレバ赤色トナリ或ハ綠礬一塊ヲ草木ノ煎汁ニ
 溶シ殊ニ沒食子ノ煎汁ニ加ヘ溶セバ漆黑色トナ
 ル和蘭ニ是ヲ以テ墨汁ヲ製ス是皆鐵氣ヲ含ル顯微ナリ○味收
 斂ノ甘ヲ帶ビ深綠色ナルハ鐵氣尤多トス○碧色
 ヲ帶ルハ銅氣多クノ膽礬ノ質ヲ兼ヌ但シ是ヲ蒸
 餾スレモ其精銅臭ナシ○上品ハ大塊ヲ爲シ碎屑

少シ。美綠色透亮ニシテ汚物ヲ雜ス斯ノ如キ品ハ水
 氣殊ニ多ク其質ノ半ニ過ギ又硫氣土氣多シ是綠
 礬油ヲ製スルニ尤良トス白色ノ碎片ヲ雜ルハ下
 品トス○其品產地ニ隨テ差異ナリ諸厄利亞ノ産
 ハ楮綠色ノ晶ヲ成シ鐵氣殊ニ多シ

主治 綠礬ハ稍銅氣等ノ礦氣ヲ含ム故ニ内服藥ニ
 用ス撒兒末爾扶斯ヲ用フ是人工ノ綠礬ニシテ汚物
 ヲ雜ヘズ純粹ノ鐵性礬トス故ニ内服ノ効用甚ダ
 多シ鐵ノ條ニ出ツ併セ考フベシ○外敷ノ諸失血ヲ止ム此末ヲ
 綿撒絲ニ掺ケ大動脈創ノ出血ニ貼スレバ其血凝

固ノ創口ニ被ヒ脉管ヲ縮收ノ痂ヲ結フ○水ニ溶シ寒壞疽ノ蒸漏藥トシ腐敗ヲ遏ム

綠礬油

オレウム・ヒトリオリ又アシダム・ヒトリオリ
スワイフル・シュル又オリ・ハン・コーペルロード・蘭

○按ニ綠礬。膽礬共ニ油ヲ取レ其藥劑ニハ皆綠礬油ヲ用フ。是綠礬ハ膽礬ニ比スレハ酸精出ル
最モ多ケレバナリ。然レ銀ヲ焔シ銅ヲ蝕スル
ニ用ル。斯的爾苦窠寫兒發烟消石ハ膽礬油ニテ製スベシ。ト云説アレ其性綠礬ト同シ

製法

綠礬ヲ坩鍋ニ内レ煨過ノ黃色或云トナリ乾固スルニ至テ五比ヲ取リ。陶製ノ列篤兒多ノ

三分ノ二ニ充シメ。潤大ナル硝子ノ承餾壘ヲ接合

シ。膠泥ニテ其合際ヲ塗封シ乾ス一晝夜。爐ニ内

レ膠泥ノ條ニ出初文火トシ。漸ク白色ノ蒸氣出テ

列篤兒多温ナル火候ト爲ス一大約三時。其蒸氣消

スルニ至テ温タル硝子ノ承餾壘ヲ以テ換。合際ヲ

塗封シ。火ヲ加蒸餾ノ油ノ如ク精ノ如キ液。承餾壘

ノ裏面ニ著テ下ル一條縷ヲ引ガ如キニ至ル。此火

候ト爲シ蒸餾スル一三時ニノ後。烈火ト爲シ列篤

兒多通紅トナル火候ト爲シ蒸餾スル一又三時。其

間ニ稠厚ノ油出ヅ。終ニ其液必モ出ザルニ至テ火

ヲ去リ承餾壘冷テ列篤兒多^ト少温ナル片意ヲ用テ承餾壘ヲ放開シ其油ヲ長頸ノ硝子壘ニ寫シ固封シ貯フ。其油大抵二十弓許アリ。是粘油ノ如ク稠厚ニシテ甚ダ重ク楮黒色。其氣極テ酷烈ニシテ焚ガ如ク。口鼻ニ觸テ效ヲ發ス。水ヲ加レバ大ニ熱沸ス。○其列篤兒多^トノ底ニハ楮黒色ニシテ土質ノ渣塊四比許アリ。○初ニ出ル清稀ノ液ハ綠礬精ニ代用ス。○承餾壘ノ接際ヨリ蒸氣透漏スル片ハ膠泥ヲ布片ニ塗リ温テ貼シ封スベシ。○此油ハ淨潔ナラザル故ニ再ビ蒸餾ノ純粹ト爲シ藥劑ニ供スベシ

淨製綠礬油

オホシム。トトリヲリ。コンセンタラ。カ。ム。シ。ル。デ。ス。ワ。フル。シ。ル。蘭。

製法

綠礬油ヲ長頸ノ硝子壘ニ内レ。沙鍋ニ安シ。初、文火トシ漸ク火ヲ加ヘ終ニ水氣少モ升ラザルニ至レハ壘中ノ油澄清トナル是ヲ硝子壘ニ寫シ固封シ貯フ。

再餾綠礬油

アシダム。ヒトリヲリ。コンセンタラ。カ。ム。レ。キ。チ。ヒ。カ。左。ム。又。カ。レ。ウ。ム。ヒ。トリヲリ。ピリウ。ム。シ。ル。蘭。

製法

綠礬油 二比
右硝子ノ長頸、列篤兒多ノ半ニ充シメ。沙火ニ内レ。承餾壘ヲ接合シ。其合際ヲ塗封セズ。初ノニ升騰ス

ル蒸氣ヲ滲漏セシムル力爲ナリ其後漸次ニ火ヲ加テ沸湯ノ火候トシ蒸留スレバ蒸氣速ニ升テ漸ク列篤兒多ノ頸ニ凝リ滴瀝トナル。逾漸次ニ火ヲ加テ煮沸ニ至レバ列篤兒多ノ裏面周圍ニ油様ノ條縷及ビ濃白色ノ蒸氣見ル。是ニ於テ速ニ温タル承餾壘ヲ換ヘ慢火ニテ蒸餾シ一密扭篤ノ四分時ニ一滴宛下ル許ニ爲シ密扭篤ハ本篇幾那ノ終ニ條神經熱ノ下ニ註ス餾液盡ルニ至ル。此即チ精製綠礬油ナリ。是ヲ硝子壘ニ内レ硝子塞ニテ固封シ貯フ。

綠礬油主治 峻酸酷烈ニノ侵蝕シ外敷スレハ腐爛

ノ火傷ノ如ク痂ヲ結ブ然レ水ヲ加ヘ綠礬精ト爲シ用レバ酸美爽涼ノ味トナリ凝體諸器ノ弛緩虛弱ヲ強壯シ血液ノ腐敗ヲ過メ一種ノ峻効アル清涼飲トナル。綠礬精ノ主治ニ舉ル如シ

綠礬精

スピリ左ス。ヒトリヨリ又アシガム。ヒトリヨリ。ダル。左ム。羅。ヒトリヨルゲスト。又ブルダンドスワフルシ止蘭

製法 綠礬油 精製者 一錢

蒸餾水 六錢ニ作ル

右綠礬油ヲ取テ一滴宛水ニ加ヘ混和セシム

主治 清涼滋潤シ津ヲ生シ渴ヲ止メ血液ノ沸騰ヲ

鎮メ小便ヲ利シ又腐敗ヲ過ルニ峻効アリ。故ニ腐敗熱ノ要藥トス。防腐ノ効。硫黃精ニ比スレハ更ニ峻ナリ。○海鹽精ニ比スレバ揮發竄透スルヲ少クメ收斂ノ効多シ故ニ凡、纖維諸管ノ弛解縱緩ノ虛憊セルヲ收固メ強健ニシ。兼テ潤涼解熱ノ効ヲ稱ス。但、腐敗ノ症ナキ神經熱ニハ的當セズノ間害アリ。○患者精力虛衰シ纖維諸管弛緩シ酷厲毒アリテ血液腐敗ニ傾ク諸熱病ニ尤モ効アル藥トス。故ニ腐敗熱ニ殊効アリ但、胃腸ノ病毒汚物ヲ淨掃メ用ニ非バ効ナシ。○腐敗熱ノ血液焔解渙崩スルヲ收

斂メ防護ス。故ニ失血ヲ兼若ハ發斑アル症ニ殊良。○海鹽精ニ比スレバ刺戟スルヲ少キ故ニ總テ發斑熱ニ驗アリ。赤斑熱ノ脉小ニ弱。皮膚青赤色ニメ氣息惡臭アリ。咽喉内黧赭ニメ殆ト壞疽ノ如キ等ノ腐敗ノ病性アル片ハ此藥尤モ効アリ。虛憊甚キ症ハ龍腦、麝香、攝爾扁答等ノ壯神藥ヲ兼用スベシ。○焮衝性ナキ間歇熱ノ熱甚キ症ニ間効アリ。然レハ壯實ノ症ニハ害アリ。其強壯スル効力ヲ以テ壯熱煩悶等ヲ増發スレバナリ。○壯實ナル焮衝性ノ諸病ニ効ナキハ海鹽精ノ如シ。故ニ此藥ハ總テ虛症

ニ適應スト知ベシ○腐敗ノ症アル麻疹ハ此類ノ
 酸精偉効アリ○惡性ノ痘ニ最奇効アル藥トス凡
 惡痘ハ見點ノ赤色ニ黯青ヲ帶ビ其形次序ナク患
 者疲勞甚ク精神困重沈垂スル等ナリ斯ノ如キ症
 ハ腐敗性ノ痘タルヲ察ノ初ヨリ此藥ヲ用ベシ
 但右ノ諸症ナキ者ハ灌膿ノ時ニ與ベシ此時多ハ
 其毒ニ因テ血液腐敗シ其膿血中ニ混淆ノ一種ノ
 腐敗熱ヲ發シ危篤ニ至ル故ニ此藥ヲ用テ血液ヲ
 收斂メ其腐敗崩壞ヲ阻遏シ壯熱ヲ涼解ノ血脉ヲ
 強固シ以テ其膿ノ血中ニ泛濫スルヲ制止シ且下

利ヲ誘起メ臭穢ノ膿ヲ通瀉セシメ患者ヲ大ニ
 輕快ヲ得セシムル等ノ殊効アリ○痘ニ失血ノ症
 ヲ現シ或ハ紫黑色ノ斑ヲ兼ルハ危險トス此藥ヲ
 幾那煎ニ加與テ峻効アリ○此藥諸失血ヲ療シ殊
 ニ崩漏痔血ニ効アリ但劇キ崩漏ハ收瀦ノ峻藥ヲ
 用ザレバ捷効ヲ得難シ○患者壯實多血ニメ吐血
 ヲ發スル症ハ此藥甚害アリ唯腐敗熱失苟兒陪苦
 等總テ虛弱ニ屬スル血症ニ適應ス○痙攣ノ運動
 ヲ兼ル失血ハ阿芙蓉ヲ加テ良○血脉脆薄ニメ弛
 解シ發スル失血ニ効アリ即顔色鮮美嬌紅ナル少

年及婦人ノ劇キ效ナクノ吐血スルガ如シ○勞瘵ノ吐血ニ効ヲ得テアリ。是ハ肺瘍ノ膿。自血中ニ混シ膿熱ヲ發ノ血液腐敗スルヲ遏止シ。諸液焯解崩壞ノ發スル自汗盜汗ヲ收斂ノ治スルナリ。或越栗失爾シレヒツト赫ヒツト立トリ後ニ等ノ香竄藥ヲ加劑ヲ用レ此症ニハ害多シ。唯此精ヲ十滴ヨリ十五滴マデ適宜ノ粘滑ナル液亞刺比亞樓謨漿過爾若ハ舍利別一攪和シ日ニ數次與テ驗アリ○健胃ノ一良藥トス。腐敗膽液胃中ニ鬱滯スル症ハ是ヲ驅除ノ後此精ヲ用テ尤驗アリ。斯ノ如キ症ハ越栗失爾ヒツト赫ヒツト立トリ等ノ

香竄藥ヲ加劑尤良。凡胃虛ノ食進マズ噫氣妨悶。重滯不化。心下痞滿等ヲ治シ。脾病依剝イボ昆垓コンゲ兒子宮病ノ諸症ニ間捷効アリ○白帶下ニ左ノ方殊効アリ

揮發清血飲

亞爾箇兒 二勺

綠礬油 再餽者 三錢

右調和シ。十五滴宛。冷水一盞ニ點服スル。一日三次○痛風ノ劇痛。漸減スル時。此精ヲ用テ血中ノ毒ヲ疏散シ。胃ノ虛罷セルヲ健運ノ効アリ又左ノ方良

健胃玫瑰煎

本草綱目卷之九 卷二十一 風雲堂藏

玫瑰花 六錢

綠礬油 再餽者 半錢

沸湯 三匕

右玫瑰花ニ沸湯ヲ注ギ蓋閉シ浸ス_レ一時半。冷テ後。綠礬油ヲ攪和シ一茶碗宛服スル_レ日ニ三四次此劑。收斂清爽ノ胃腸ヲ健運シ。惡心嘔氣ヲ鎮メ飲食ヲ進メ。凝體纖維ノ弛緩虛弱セル諸病。或ハ熱病ニ因テ虛羸瘦削セル症或云幾那ヲ兼用ノ良或ハ失血過多。崩漏。或ハ傷冷毒。流走痛等ニ用テ殊効アリ○此精ハ水ニ滴シ適意ノ酸味ト爲シ服スベシ熱病ニハ

水若クハ對症ノ清涼飲四十_三ニ此精十五滴若クハ二十滴ヲ加テ酸美ノ味トシ用フ○是ヲ服_レ腹攣痛シ食ヲ妨ゲ若クハ下利スル者ハ香竄ノ露水或ハ舍利別ヲ加ヘ或ハ適意ニ沙糖ヲ加ヘ飲液ニ和シ用ベシ○水ニ滴シ適意ノ酸味トシ用_レ凡藥力緩弱ニ峻効ナキ片ハ左ノ方ヲ用ベシ

爽酸清涼飲

綠礬精 二錢

暹爾託亞舍利別 一_三

沸湯 八_三

右調和シ四分時。若ハ半時ニ一匙宛服ス但此劑ノ酸味ニ堪ガル者ハ大麥煎少許ヲ加用ベシ或ハ左ノ方ヲ用ルモ亦良

爽酸舍利別

綠礬精 四錢

過爾託亞舍利別 四手

右調和シ。一匙宛適宜大麥煎ニ加用フ。是ニ由テ其酸味甘和ニノ咽喉ヲ刺戟スルナシ○瘡疹類諸皮病ニ此精良驗アリ。或久ク發汗劑ヲ用テ効ナキ症ヲ治ス○乾癬類ニ用テ速治スル少カラズ。或

云。乾癬濕癬共ニ効アリ。又汚液多ク出ル浸淫瘡ニモ良。或云。多血ノ人ニ發スル疥癬ニ効アリ。其症患處焮腫シ多ク膿潰ス但粘液質ニノ萎黃病様ノ人ハ酸性ノ藥ハ害アリ○小兒ノ疥癬ハ是ヲ乳母ニ與テ母子共ニ治ス。然其兒薄弱ニノ酸精ノ侵刺ニ堪ズ。腹痛搖掣等ヲ發スル者ハ左ノ方ヲ與ベシ

消毒治癬飲

綠礬油 再箇者 一錢
泉水 五錢

右綠礬油ヲ水ニ滴シ沸騰止テ左ノ藥ヲ加フ

栗覽子舍利別 二錢

右攪和ス。服量一錢ヨリ二錢マデ水一盞ニ加、與_レ下
日_二三次。其症ニ隨_レ加減ス。○外敷ノ亦疥癬ニ良効
アリ。綠礬油一錢。家猪脂一弓煉和シ貼ス。○此精ニ
水ヲ加、稀クシ疥癬類ニ外敷ノ淨刷收斂劑トシ殊
効アリ。○腐壞性ノ潰瘍ニ綠礬精ヲ水ニ加、蜜若_クハ
玫瑰蜜ヲ溶シ塗テ治ス。○此精ヲ熱壞疽ノ邊圍ニ
塗テヨク腐壞ヲ過ム。○疣贅。小肉腫。小瘤ニ塗テ消
散ス。○此精ニ玫瑰蜜ヲ和シ鷺口瘡ニ塗テ治ス

亞的兒

「アートルソルアリキス羅」
「アートル」又「スワフル」アートル蘭

製法

亞爾箇兒

綠礬油 再留者 各四匕

右綠礬油ヲ亞爾箇兒ニ滴シ加。每滴振蕩ノヨク混
和シ冷ルヲ候ヒ滴シ加へ終テ硝子壘ニ内_レ固封シ
冷處ニ置_レ一兩三日ニメ長管アル硝子ノ漏斗ヲ以
テ是ヲ硝子ノ長頸ノ列_レ篤兒多_ル其頸本ノ側ニ一嘴
ヲ塞_レニ内_レ底ニ一小孔アル承餉壘ヲ接合シ底ノ孔ハ
膠泥ニテ其接際ヲ塗封シ又家猪ノ膀胱ヲ襲テ其
上ニ纏_レキ蒸氣ヲノ透漏セザラシメ。其列_レ篤兒多_ルヲ
沙火ニ内_レ速ニ煮沸スル許ノ火候トシ蒸餾ノ液ヲ

取_レ一六_三ニ至リ。是_ヲ承餾壘底ノ孔ヨリ泄_シ取リ。
 此液_ヲ復_シ其列篤兒多_ト中ノ液ニ加_ヘリ。頸側ノ嘴ヨリ蒸
 餾ノ其頸ニ油様ノ滴瀝凝聚セズ唯枝極ノ如キ條
 縷_ヲ引_ニ至_テ火_ヲ下_シ。承餾壘ノ液_ヲ硝子壘ニ入
 是_ニ其量ノ半分ノ蒸餾水_ヲ加_ヘ振蕩ノ上面ニ浮
 ム亞的兒_ヲ抄_ヒ取リ小硝子壘ニ内_シ。必_モ空隙ナク
 充_シメ。硝子壘ニテ固封_シ水中ニ倒置_シ貯_フ。○若
 其亞的兒_ニ硫黃ノ臭氣アル片ハ黑蘊斯_{卷八ト}煨
 製_レ麻_極涅_失亞_ノ末_ト等分ニ合和_ノ少許宛_是ニ加
 テ必_モ滾動沸騰セザルニ至_テ再_ビ蒸餾_シ其亞的

兒_ヲ取リ前法ノ如ク貯_フ 後

又法 亞爾箇兒 四比

綠礬油 再餾者
三比

右亞爾箇兒_ヲ硝子ノ列篤兒多_ニ内_シ。綠礬油_ヲ一滴
 宛_加レバ沸騰ノ香氣_ヲ發_ス。每滴ヨク振蕩_シ。沸騰
 止_ニ冷定_ノ硝子ノ潤大ナル承餾壘_ヲ接合_シ罅隙_ヲ
 塗封_シ沙鍋ニ内_シ。慢火ニテ蒸餾_シ。其液。六攝昆度_ノ
 間_ニ一滴宛_下ル_ヲ度_トシ。晝夜平分ノ時ノ半時_ヲ
 扭_ツ篤_ト云_ニ密扭篤_ヲ六十分_ニ分_タル_一分_ヲ密
 云_ニ三針_ヲ具_ル自鳴鐘_ニテ驗_スベ_シ。六攝昆度_ハ大
 約_ニ一呼_吸ノ終_ニ列篤兒多_及承餾壘ノ裏面ニ硫黃
 間_ニ在_リ

質ノ蒸氣現レ。油氣漸ク疏解シ水様ノ條縷稍凝聚
 ノ滴瀝ノ狀ヲ透見スルニ至テ速ニ火ヲ下シ承餾
 壘ヲ放開スレバ其液大抵二十七号許アリ。是ニ煨
 製麻屈涅失亞ノ末。少許宛加テ數振蕩シ。火モ滾動
 セズ硫黃ノ酸臭盡ク消スルニ至テ復列篤兒多ニ
 内底ニ一小孔アル承餾壘ヲ接續シ底ノ孔ハ罅隙
 ヲ塗封シ沙鍋ニ内。慢火ニテ蒸餾シ液ヲ取リ一坩
 ニ至リ其液ヲ底ノ孔ヨ是ニ承餾水牛比ヲ加テヨ
 ク振蕩シ上面ニ浮ム稀キ油様ノ液ヲ抄ヒ取。硝子
 壘ニ内。硝子塞ニテ固封シ貯フ是亞的兒ナリ匣

主治 亞的兒ハ極テ輕清精微ノ液ニシテ鎮痙ノ奇効
 ヲ奏ス。故ニ失氣昏冒。心動悸。子宮衝逆ノ諸症。痙性
 ノ喘急。疫效等ヲ治ス。○神經熱。腐敗熱。子宮病ノ諸
 症ニ用テ精神ヲ揮活快暢シ。神經ヲ健運充張シ。微
 衝動ノ靈液ノ罷弊怠慢ヲ振起醒覺スル要藥トス
 十滴ヨリ二十滴マデ葡萄酒ニ點服シ或ハ沙糖ニ
 和シ服ス。○凡熱病ノ患者。精力虛脱シ脉細弱。泛然
 トノ飄蕩シ定準ナキ者ハ此藥極テ的當ス。惡性熱。
 腐敗熱。神經熱ニ右ノ症アル者ハ殊ニ驗アリ或ハ
 揮發衝動ノ藥ヲ加テ尤良假令バ左ノ如シ

揮發壯神飲

桂露 四勺

桂丁アインキ幾アタル去爾

亞的兒アタル

揮發香竄精

各一錢

右調和シ四分時ニ一匙宛與へ諸症寛解スルニ至
○痙攣ノ運動ヨリ發スル疝痛ニ亞的兒ヲ用テ捷
効アリ○痛風毒等ノ肢節痛消散ノ内攻シ煩悶腹
痛等ヲ發スルニ用テ速ニ寛解ス此症左ノ方亦奇
効アリ

亞的兒回生飲

亞的兒 一月

麝香 二錢

桂露 四錢

右研和シ一服トス○航海ニ慣レザル人船暈ヲ發
シ頭眩胸悶嘔吐等ヲ患ル者ハ亞的兒ヲ冷水ニ點
服メ速ニ治ス預メ是ヲ服スレバ其症ヲ發スルコ
トナシ又齒痛ニ外敷メ速効アリ

收斂亞的兒

アメリキシルアシダムハルレリ又
アテルソルプリキスアシダス羅
シテルエリキシル
ハンハルレル蘭

製法

綠礬油

再餾者

燒酒

三十度者
各等分

右燒酒ヲ硝子壘ニ内_レ意ヲ用_テ綠礬油ヲ一滴宛加_テヨク合和セシメ。固封シ浸_ス三日ニノ聽用ス_亞按

主治

收斂衝動ノ神經ノ感觸知覺已甚_分ヲ鎮定シ。是ヨリ發スル神經ノ諸症ニ奇効アリ○神經質ノ感動シ易キヨリ發スル諸病ニ於テ脉ニ焮衝ノ候ナク。且諸筋弛緩_レ虚弱ニノ渴ナキ症ニ的効アリ○子宮衝逆。脾病。依_レ剝_レ昆_レ堙_レ兒_レ等ノ神經感動甚_レキ症。及肢節各部。顫振。搐掣。頭眩。眩暈等ヲ治ス○服量十五滴

マデ水ニ加ヘ稀クシ用ル_ル日ニ三次○是ニ鎮痛驅風ノ藥ヲ加テ殊ニ驗アリ。假令_{タト}バ左ノ方ノ如シ

亞的兒芙蓉飲

收斂亞的兒 一錢

薄荷水 三勺

橙皮舍利別 一勺

阿芙蓉 精製者

纈草_三丁_八幾_三去_八爾_三 製法健質亞那_二丁_幾去_爾ト同シ

右調和シ一匙宛用ル_ル日ニ四次

邊設印亞的兒 蘭

製法

酒石葉 各十六号
亞爾箇兒 各十六号

綠礬油 再餾者 六号

右酒石葉ヲ硝子ノ長頸列篤兒多ニ内。沙鍋ニ安シ。
亞爾箇兒ニ綠礬油ヲ加テヨク混和セシメ。是ヲ右
ノ列篤兒多ニ加ヘ。潤大ノ承餾壘ヲ連接シ。合際ヲ
塗封シ。文火ニテ蒸餾シ。必モ餾液下ラザルニ至テ
承餾壘ヲ放開シ其液ヲ取り。是ニ石灰水ヲ加ヘ攪
セテ亞的兒上面ニ浮ムニ至リ是ヲ抄取り。硝子壘
ニ内レ硝子塞ニテ密閉シ貯フ

主治 精神ヲ活潑爽快ニシ。神經熱。腐敗熱。子宮衝逆
ノ諸症ニ峻効アリ。服量十滴ヨリ二十滴マデ葡萄
酒ニ點服スル。日ニ數次

忽弗滿鎮痛液

ノロキヲル。ニ子ライリス。アノデイナ。
ス。デ。イ。ナ。又。ホッ。フ。マ。ン。又。リ。キ。ヲ。ル。ニ。子。ラ。イ。レ。ア。
ス。ロ。ド。ロ。ッ。ペ。ン。又。メ。イ。ン。ス。ワ。フ。ル。ア。イ。テ。ル。又。ホッ。フ。マ。
ニ。子。ラ。イ。レ。ペ。イ。ン。ス。チ。ル。レ。ン。デ。ホ。ク。ト。蘭。

製法

亞爾箇兒 各等分
亞的兒 各等分

右調和ス 依云古昔ハ亞爾箇兒ニ綠礬油三分
シ。氣味不佳ニメ加テ蒸餾シ製ス。然レ硫黃氣汚
隨テ右ニ味等分トシ製スルヲ最良トス

主治 此液ハ清稀ノ油ノ如クニノ佳香アリ或云阿利襪油
 ノ如シ。鎮痙定痛ノ聖藥トシ。一切神經病ニ奇効ヲ奏シ。微睡ラシメ。汗ヲ發シ小便ヲ利ス。○此藥ハ血液ヲ收斂清涼セズ凝固セズ。多ク亞兒アル加利カリ鹽ヲ含テ揮發竄透シ。油氣ヲ含テ神經ヲ強壯ニシ。一切劇痛ヲ止メ。痙攣搐掣ヲ鎮メ。風氣ヲ驅リ。鬱塞ヲ開通ス。故ニ失氣昏冒ヲ醒復シ。精神ヲ欣慰シ。動悸ヲ鎮。上衝セズ。頭ニ鬱滯セズ。ヨク精力ノ虛衰ヲ挽回ス。○痲ノ諸症。小兒痲瘵。子宮衝逆。腸攣急等ヲ速ニ解散ス。但先ヅ下劑若ハ吉利詞キリス爹兒テールヲ施シ大便ヲ通利

ノ是ヲ用ベシ。○硃砂精若ハ鹿角精ヲ等分或ハ三分一加ヘ用テ失氣眩暈。痲瘵。搐掣ノ諸症ニ速効アリ。○諸劇痛ニ奇効ヲ奏ス。即痙攣性。喘急。疫効。痛風。毒内攻痛。心腹痛。劇キ疝痛。小兒腹痛。頭痛。齒痛。及痛風。結石痛ヲ治ス。○此液ヲ沙糖一撮ニ滴シ加テ口中ニ含ミ燕下ノ頭痛ヲ解散シ。神思鬱重ヲ開暢ス。○破氣驅風ノ偉効アルヲ以テ痞氣鬱滯ノ諸症。胸腹苦滿。噫氣惡心ヲ治ス。又喘息。脾病。依剝イボ昆垤キニ兒等ノ苦悶。痞脹。嘔氣。嘈雜。吞酸及呃逆ヲ治シ。胃ヲ健運シ。諸竅ノ壅鬱ヲ開利ス。○嘈雜吞酸等ノ胃中ノ酸

敗液ノ諸症ニハ十五滴ヨリ三十滴マデ冷水ニ點服スレバ忽チ噫氣ヲ發ノ治ス○薄荷水ニ點服ノ嘔吐下利ヲ治ス○肉豆蔻末ヲ加用テ霍亂ヲ治シ腹肚攣急ヲ解ス○勞瘵肺傷ノ内伏熱ニ用テ精力ヲ補充シ神思ヲ欣慰ス○頑固ノ不寐三日熱及白帶下ニ用テ驗多シ○止血ノ効ヲ稱シ殊ニ衄血痔血ヲ止ム○結石腎痛及膽液凝固ノ結石ヲ生シ黃疸ヲ發スル症ニ用テ結石ヲ溶解シ治ス是ヨク華爾斯ヲ溶化ス結石ハ華爾斯質ナレバナリ○此藥ハ甚ダ竄透揮發スル故ニ感動シ易キ婦人ハ其藥

氣ニ堪ザルヲアリ○壯熱疾及欬衝ノ諸症ハ是ヲ用テ害アリ血液ノ沸騰ヲ強盛ニシテ運行ヲ増進スレバナリ○服量十滴ヨリ四十滴マデ葡萄酒若ハ冷水ニ點服スル一日ニ數回其症ニ隨テ加減ス○小兒ハ六滴許適宜ノ飲液ニ點服ス○頭痛ハ二十滴許ヲ砂糖一匁ニ和シ用フ○痙攣搐掣ノ諸症痞氣鬱蓄等ニハ十五滴ヨリ二十滴許用フ揭叔依
密涅刺爾鎮痛液ハツフマシ忽弗滿鎮痛液ト同シ

甘綠礬精 同上

越栗失爾赫篤立次利

エリキシルヒットリヨリメイ
ンシフト又エリキシルヒット

本草綱目卷之二十一 藥部 二五 一風雲堂

リヲリ。アシガム。又エリキシル。アシガム。アロマ
チキム。羅シレ。スベセレイ。ティンキタル。蘭
製法 收斂亞的兒 四弓

桂 搗碎者

薑 搗碎者 各四錢

燒酒 二十度者 八弓

右亞的兒ト燒酒ト調和シ。桂薑ヲ加ヘ。硝子壘ニ内
固封シ浸ス。八日ニメ紙ニテ濾シ。其液ヲ硝子壘
ニ内レ固封シ貯フ。〔按〕

〔又法〕 シレヒトリヲル。エリキシル。蘭

亞爾箇兒 二比

綠礬油 再餾者 半比

桂 搗碎者 一弓半

薑 一三

右亞爾箇兒ヲ硝子壘ニ内レ。徐クニ綠礬油ヲ滴シ
加ヘ。固封メ微火ニ上セ浸ス。三日ニメ桂薑ヲ加
浸ス。一六日。紙ニテ濾シ其液ヲ取り硝子壘ニ内レ
固封シ貯フ。〔亞〕

〔主治〕 健胃ノ要藥トス。胃ノ虛衰セル諸症ヲ治シ。神
經。心。子宮ヲ強壯ニス。○病後胃虛ノ食進マザル症
ニ三十滴ヨリ四十滴許用ヒ或ハ肺瘍ノ膿ヲ吐。下

本草綱目卷之二十一 藥部 二五 一風雲堂

多キ症ニ驗アリ 底叔

礬紅

ヒットリヲリ。マルチス。カルシナト又「ベリム」
ヒットリヲリ。ム。ウス。左ム。羅。ゲ。ブ。ラン。デ。エ
イスル。ヒットリヲリ。又「ブルカル」クト。ブ。ラン
ドス。ワ。フル。エ。イス。ル。蘭。是。レ。本邦藥舖ニ
真ノ「ベンガ」
ラト呼ブ者

製法

撒兒末爾扶斯 適宜

右陶埴ニ内レ。文火ニテ炒乾シ。漸ク武火トシ煨過
ノ黯赭色ト爲シ貯フ 技

又法

綠礬油ヲ製ノ後。列篤兒多ニ残りタル赭
色ノ渣塊ヲ取り。水ニテ淘洗ノ汚物ヲ去リ乾シ貯
フ。但列篤兒多中ニテ燒煨足ラザレバ綠色ヲ帶ル

故ニ再ビ是ヲ燒煨スベシ

主治

鐵氣ニ綠礬鹽ヲ含テ甚ダ收瀋シ外敷ノ止血
ノ効ヲ稱ス。雞子黃ニ研和シ塗テ出血ヲ止メ。又息
肉ヲ消ス 叔

蓬礬鹽

一名綠礬揮發鹽。ガルホラチレ。ヒットリヲリ。
ホムベルグ。又「ア」シ。ボム。ボラクス。又「サル」
セ。ダ。チ。ヒ。ス。ホム。ベルグ。羅。ボラクス。ヒットリ
又「ベ」イン。ス。タ。レン。デ。多。ト。ホム。ベルグ。蘭

製法

蓬砂 再餾者 各適宜

右蓬砂ヲ適宜ノ沸湯ニ溶シ。綠礬油ヲ滴シ加テ硝
子筋ニテ手ヲ住メ攪ゼ。其液差酸味ヲ帶ルニ至

テ冷處ニ置バ薄片様ノ芒ヲ結ブ。其餘ノ芒ヲ結バ
 ザル液ヲ取り。煮テ上面ニ膜ヲ生スルニ至リ。冷處
 ニ置テ結芒セシメ。數斯ノ如クノ終ニ必モ結芒セ
 ガルニ至リ。其芒ヲ取り集メ。水ニテ淘洗シ乾シ貯
 フ。是レ潔白ニシテ眞珠色ノ光澤アリ。或ハ是ヲ再ビ
 沸湯ニ溶シ前法ノ如ク結芒セシムレバ鮮麗ニシ
 大ナル晶ヲ結ブナリ技

又法

蓬砂極細末
六分

綠礬油再餾者
一分半

沸湯四升

右蓬砂ヲ硝子壺ニ内レ。沸湯ヲ加テ溶シ。沙火ニ上
 徐々ニ綠礬油ヲ滴シ加ヘ。硝子筋ニテ攪セ。温ニ乘
 ノ瀝過シ。其液ヲ文火ニ上セ水氣ヲ熬散ノ上面ニ
 膜ヲ生スルニ至リ。放冷ノ結芒セシメ。其芒ヲ取り
 蒸餾水ニテ洗ヒ乾シ貯フ臣

主治 是一種ノ酸鹽ナリ。効用蓬砂ノ如クニシテ更ニ

鎮痙止痛ノ偉効アリ。蓬砂ノ主治ト 神經血液ノ鬱

熱上衝ヲ降鎮シ。諸熱ヲ涼散シ。催眠ノ効アリ。故ニ

一ニ清涼阿芙蓉ト名ク○ 諸神經病ノ鬱熱ヲ涼解シ。

識妄狂躁ヲ靜止シ。子宮衝逆。痙攣搐掣。脾病。依ホ剥コ昆

堉兒等ノ發動ヲ鎮メ。又ヨク月經ヲ通ス。○服量未
 トシ三氏ヨリ十氏マテ飲液ニ點服シ。或ハ沸湯ニ
 溶化シ用フ。○肺。嗽。衝。吐血等ノ肺病ニハ是ヲ禁ス。
 肺ヲ刺戟シ效ヲ發スレバナリ。○外敷ノ疥癬ヲ治
 シ潰瘍ノ息肉ヲ消ス。依叔庚

膽礬

ヒトリヨルム。クイル。レウム。羅。ブライウ
 ヒトリヨル。又。コペル。ヒトリヨル。蘭

是。硫黃ヲ含ム酸精補。硫酸。銅ト抱合ノ烱化シ。天藍色。
 石英狀ノ晶ヲ結成セル中和鹽ナリ。味收斂。侵蝕ノ
 酷烈ナリ。銅氣ヲ含ム故ニ一ニ是ヲ銅礬ト名ク。即
 銅簿ニ硫黃ヲ加ヘ坩鍋ニ内テ燒煨シ。水ニ溶メ煮

熬シ乾固スレバ膽礬トナルヲ以テ知ルヘシ。○是
 ヲ製スル地方ニ隨テ差其品ヲ異ニス。世布兒私亞細
 亞洲ノニ産スル品ハ石英狀ニノ碧色鮮美ノ大塊
 ヲ成ス。或ハ尖稜ノ小片ト爲シ或ハ外面黃鏽ヲ被
 フ者アリ。但碎ケバ天藍色ナルヲ上品トス。翁加里
 亞歐羅巴洲ノ産モ是ニ同シ。或ハ銅坑中ノ泉ヲ煮
 テ製スル者アリ。獨ド都ツ上同ノ品ハ綠色ニノ天藍色
 ヲ帶ビ石英狀ヲ爲ス。或ハ一種鐵鏽色若ハ銅鏽色
 ニノ味辛。硫黃臭アル灰様ノ土ヲ淘洗ノ製シ碧綠
 色ヲ爲ス者アリ。總テ碧綠色ノ品ハ銅性ト鐵性ト

相混スル者ナリ

主治 綠礬ニ比スレバ苛烈侵刺ノ味甚ク。酷厲ノ酸性鹽及硫氣多クノ水氣土氣少シ。故ニ潰瘍腐肉息肉ニ外敷ノ腐蝕スルノ刺必斯印歇兒那栗斯ノ如シ。但潰瘍ノ贅肉ニ此末ヲ摻スレバ侵蝕ノ劇痛ヲ發ス。○外敷ノ血液ヲ凝固シ脉管ヲ牽縮ス。故ニ出血ヲ止メ痂ヲ結バシム。左ノ方亦止血ノ捷効アリ

雙礬收斂水

膽礬

明礬

各一錢

水 二勺

右溶化シ布片ニ蘸シ貼ス。劇キ衄血ハ是ヲ繼ニ浸シ鼻孔ニ挿スベシ。○膽礬ヲ水ニ溶シ稀クシ。眼ニ點メ收斂清涼シ。焮腫ヲ消シ。星翳ヲ除ク。○惡厲ノ癬ニ膽礬半勺ヨリ半錢マデ。越沒里膏一勺ニ研和シ貼ノ良効アリ

煨膽礬

ゲブランド。コブルヒトリヲル蘭

製法

膽礬ヲ坩鍋ニ内レ。火ニ上セ。燒煨ノ通紅ト爲シ。放冷ノ白末トシ貯フ。是ヲ一ニ舎謨琶扶設止血散ト名ク

主治 外敷ノ血液ヲ凝固シ。血脉ヲ牽縮ス。此未^カテ
 撒絲ニ^{フリカ}摻ケ貼ノ一切出血ヲ止ム。○頑固ノ衄血ハ
 是ヲ水ニ溶シ。水銃ニテ鼻孔ニ注入メ速効アリ。但
 誤テ喉中ニ溢泄スレバ氣管ヲ牽縮メ效ヲ發シ呼
 吸ヲ妨グ。故ニ少許宛徐々ニ注輸スベシ。○大ナル
 創ニ多ク此未^カテ摻スレハ其血止ムト雖モ其末。血脉
 中ニ入テ血ニ混シ心肺ニ運行メ其部ニ^ハ焮腫息肉
 等ヲ生シ。呼吸不利喘急等ヲ患ル者アリ。

遇叔
 布揭
 侯伍

遠西醫方名物考卷二十九終

