


遠西醫方名物考

寸

卷三十三

武庫
857
45-33

早稻田大學
圖書部
寄託者
內田文庫
寄託書第一七六號
第 9 冊
第 23 冊



西醫
號 857
卷 45-323



遠西醫方名物考標目

卷三十三

水銀 目

汞質

溶化諸金

重量

寒熱過甚

暗室現光

汞毒

性功原由

汞性走竄揮發

流動原由

喻引力

極寒凝固

溶解消化

禁戒

性功拮套

大正九年九月廿四日
內田 宗 子 氏 贈



内藏壅塞腺腫

水腫 技爾撒謨驅水丸

皮膚病 殺蟲

大便閉 狂犬咬傷

吐涎法 内服劑吐涎法

外敷吐涎法 内外兼施吐涎法

薰烟吐涎法 吐涎調護法

吐涎法試効 吐涎患害

徽毒擦膏治法

遠西醫方名物考卷三十三

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

水銀

〔汞質〕水銀ハ諸金ニ屬スト雖モ全金類ニ非ズノ半
 金ニ屬ス是一種ノ流動體ニノ鑄鎔槌琢スベカラ
 ザレバナナリ○水銀ハ香臭及味ナクノ其質純粹ナ
 ル一種ノ元素補ナリ但古説ニ是ヲ剖解スレバ礬
 石質土硝子性土硫黄ヲ以テ體質ヲ成ス者トス○
 礬石質土羅甸名テラテラテラチア其量甚ダ重シ水
和蘭名サリニセアルデ



銀重キハ此土アレバナリ。是製煉術ニテ剖析シ後
 スル所ナリ或云水銀ノ質ニ子イム。或先
 哲ノ説ニ云水銀ハ礬石氣ヲ帶ルノミナラズ是レ一
 種ノ流動セル礬石ナリ。○悍ツヨキ木灰汁ヲ以テ水銀
 ヲ煮テ其上清ヲ取り是ニ蒸餾醋ヲ滴シ加レバ硫
 黄分レテ其底ニ沈ム。是水銀ニ硫黄ヲ雜フル微ナ
 リ此硫黄ハ水銀ノ光彩ト流動體トヲ成ス者ナリ。
 其故ハ久ク水銀ヲ研磨シ或燒煨スレバ其硫黄質
 消散ノ汞灰トナリ水銀ノ光彩ト流動體ヲ失フ。然
 ニ是ニ硫黄質ノ物ヲ加レバ復マタ光彩ヲ生メ流動體

トナルヲ故ノ如シ。即汞灰ニ木炭是硫黄ノ末ヲ加
 テ燒煨スレバ忽チ流動メ光彩ヲ生スルガ如シ。○
 大ナル火燧鏡ヒトリノカキヲ以テ水銀ヲ燒ケバ烟トナリテ盡
 ク消散ス。或水銀ヲ長頸ノ陶壺ニ内蓋フタナクメ慢火
 ニ上セ燒煨スレバ初灰色トナリ漸黄色トナリ終
 ニ赤色ノ汞灰トナル。是水銀大氣ノ酸素ヲ引テ酸
 化シ其光彩ヲ失フ者ナリ。此汞灰ヲ木炭上ニ置キ
 火燧鏡ニテ燒ケバ燂解メ流動セル水銀トナリ其
 光彩復生ス木炭ノ炭素ハ酸素ト合メ炭酸ト。或
 其汞灰ヲ瓦磚上ニ置キ右ノ如ク燒煨スレバ亦燂

解ノ硝子トナル然レ光彩ナク唯烟ヲ生メ速ニ升散シ終ニ赭色ノ末少許残り或赭色ノ硝子トナル凡ソ金屬酸化過度ニ至レハ光彩ヲ失ヒ硝子トナル
 ○右ノ説ニ因テ觀レバ水銀ハ硝子性土ヲ基趾トシ硫黃氣ヲ含テ銀様ノ光彩ヲ生スルニ非ルヲ知ベシ○水銀ハ些少ノ水氣ヲ含リ是ヲ火上ニ温レバ水氣消散ス然レ冷レバ復氣中ノ水氣ヲ吸收ス
 汞性走竄揮發水銀ハ流動スルヲ水ノ如クナレレ其性甚ダ揮散ノ無量數ニ分析ス。是ヲ火上ニ置バ速ニ烟氣トナリ微細ニ分析メ升散ス然レ毫モ其

體ヲ變スルヲナシ即チ革ニ水ヲ濕ノ其烟氣ヲ覆ヘバ水銀悉ク是ニ著テ微細ノ珠ヲ爲シ或水銀ヲ蒸餾スレバ精微ノ蒸氣トナリ升騰スレレ承餾壺ニ下レバ復故ノ水銀トナルガ如シ○升汞。降汞。溶汞等ノ水銀劑モ水銀微細ニ分析メ溶化シ或乾固ノ鹽體トナレレ顯微鏡ニテ是ヲ見レバ其體變セズ光輝アリテ逆流スベキ細珠間錯ス升汞甘汞等ノ細珠ヲ指頭ニテ磨スレバ漸ク相聚テ大珠ヲ成シ眼鏡ヲ假ラズメ分明ナリ故ニ水銀ハ一種ノ奇異ナル質ニメ三富ノ萬類。是ニ比スベキ者ナシ○

或云水銀一滴。胡荽子大ナルヲ取テ磨碎シ顯微鏡ニテ算^カフレバ其碎粒二千七百万アリ

溶化諸金 水銀ノ體質極テ微細ニ揮發竄透スル故ニ純粹ノ水銀ヲ以テ金銀鉛錫銅鋅等ニ加レバ其體質ニ竄透ノ密ニ混和シ溶解ノ泥トナリ磨碎スベキニ至ル。殊ニヨク黄金ヲ軟化ス。銀是ニ次グ鉛錫又是ニ次グ銅鋅及ビ安質^{アンチモ}没^モ扭^ニハ速ニ軟化シ難シ鐵ニハ絶テ合和セズ。○或云諸金ノ火力ヲ以テ溶化スルハ皆其質ニ多少ノ水銀ヲ含ニ因ル。故ニ水銀ハ諸金ノ基趾^{キシ}タリ。又云金銀ノ質ハ水銀ト

硫黄ヲ以テ成ル或云金銀ノミナラス諸金類モ亦然リ。○水銀劑ヲ内服ノ口ニ黄金ヲ含メバ體中ノ水銀是ニ著テ銀色トナル。水銀劑ヲ服メ吐涎スル人黄金ノ器ヲ帶レバ其蒸氣ニテ黄金軟ニメ白色トナル。是皆水銀ノ性微細ニ分裂メ走漏竄行スルニ因リ。一ニハ些少ノ煖氣ニテ升化飛散スルニ因リ。一ニハ水銀ト黄金ト相吸引スルニ因ル。

流動原由 水銀ハ至微至細ノ圓體ナルニ因テ相抵觸メ滑脱シ固著スルヲ能ハズノ轉動スルナリ。或云水銀ハ微細ニ剖析スルヲ究極ナク故ニ是ニ觸テノ圓體相重累メ接聚スル者ナリ。

遠西名物考

卷三十三

三

風雲堂藏

逆流碎分シ。又些少ノ火氣ニテ速ニ揮散蒸升ス。他ノ諸金類ヲ成ス體質ハ其形種々ニノ圓體ナラズ。故ニ凝聚スレバ相附著スル。固密堅牢ニノ火力ヲ用ルニ非レバ焔化セザルナリ。

重量 水銀ハ黃金ニ次テ重シ。水銀ヲ器ニ盛リ是ニ黃金ヲ投スレバ沈ミ他ノ諸金類ヲ投スレバ浮ムヲ以テ知ルベシ。○黃金四十錢ヲ容ル器ニ水銀ヲ充テ衡レバ三十錢ニ足ラズ。○水銀ハ水ヨリ重キ。十三倍。○冬ハ其量重シ夏月十一乃至七。水銀冬ニ至テ十一乃至十二。凡アリ。

噲引力 水銀ヲ平滑ナル盤上ニ瀉セバ逆動走散ス。ト雖モ微窪キ處アレバ忽チ相聚リ。或其區分セル細珠相近ケバ速ニ合和ノ一體トナル。是ヲ噲引力ト曰フ。一切流動物。水漿類亦此噲引力アレバ水銀殊ニ甚シ。○金石類一切堅實ナル者ノ重キ所以ハ其形體ヲ造成セル物質ノ噲引力多キニ因ル。又此勢力ノ多少ニ隨テ物體ノ肌理ニ疎密ヲ爲スナリ。凡萬物中。肌理ノ極テ固密ニノ氣眼ナキニ至ル者ナシ。黃金ハ肌理最密ニノ其量最重シト雖モ氣眼アル故ニ水銀ヨク透漏ス。○水銀ハ噲引力多クノ

重量ナレハ其體微細ニ分析ノ轉動奔流スル故ニ
凝固ノ堅剛ノ體ヲ成スヲ能ハザルナリ

寒熱過甚 諸流動物中ニ於テ水銀最モ寒冷ナリハ水

燒酒ヨリ冷水然レハ火ニ上テ熱勢最モ烈ク且速カニ

銀ハ水ヨリ冷熱ス。但火ニ上テ煮沸ノ度ト爲セバ烟氣トナリテ
速ニ飛散ス

極寒凝固 極寒ノ地ニ於テハ水銀凝固シ柔撓ノ打

展スベク又線ト爲スベシ伯多琛勃爾孤魯西亞ノ

地五十九度五ニ於テ一十七百五十九年本朝寶ノ

十六分ノ地嚴寒ニ水銀石ノ如ク凝固ス。爾後此理ヲ推究シ雪

ヲ取テ發烟消石精ニ加ヘ水銀ヲ硝子管ニ充テ是

ニ浸ヒバ水銀凝固ノ鉛ノ如ク打展スベク又線ト

爲ニ堪タリ。流動ノ水銀ニ比スレバ其量重シ是ヲ

以テ觀レバ水銀ノ流動スルハ太陽ノ暖氣ヲ假ル

者ナリ

暗室現光 水銀ノ精製純粹ニモ毫モ水氣ナキ者ヲ

取テ乾ケル補驗氣器九ニ内レ倒置シテ暗室内ニテ

振掉スレバ水銀升降メ光輝閃發スル越列幾的

爾ノ如シ但管中ノ水銀降ル片其光殊ニ多シ此理

ヲ考究スルニ是水銀ノ所爲ニ非ズ唯其振掉ノ水

銀ノ升降スルニ隨ヒ管中無氣ノ處一種ノ激迫ヲ生メ光ヲ現スルナリ水銀ニ非ト雖無氣激迫スレバ光ヲ現スルヲ猶越列幾的爾ノ如シ

溶解消化 凡酸性ノ諸液ハ水銀ヲ溶化ス即消石精。海鹽精。綠礬精。醋其他草木類ヨリ製スル酸味ノ液ハ皆ヨク水銀ト混和ノ溶化スルガ如シ消石精ハ比スレバ水銀溶化シ難シ ○消石。綠礬及ビ亞兒加利鹽ハ水銀ト合和セズ ○硫黃ハ殊ニヨク水銀ト合和ス又硫黃氣アル諸品及海鹽ハ稍水銀ヲ凝固ノ消化ス

汞毒

坑戸ハ天稟壯實ナル人ト雖ト四年無病ノ者

ナシ。水銀毒ハ殊ニ神經ヲ侵襲シ頭面手足ノ諸筋顫振掣引シ痒ヲ發メ慘酷ノ死ヲ致ス故ニ二週毎ニ其人ヲ更代セシムベシ ○或云坑戸ハ水銀ト硫黃ノ毒氣ヲ被リ病ヲ發ス此猶酒客ハ酒ノ炭酸氣神經ニ侵襲メ痒ヲ發スルガ如シ或云鍍金匠。鏡匠等常ニ水銀ニ觸ル人ハ多ク痒ヲ患フ ○或云水銀ヲ内服スレバ直ニ大便ニ通シ其量少モ減セズ故ニ大害ナシ。坑戸ハ水銀ヲ吞テ腹ニ竊ニ大便ニ通スレバ是ヲ淘汰シ販ク者多シト然レ水銀ハ實ニ神經ノ仇敵トス即坑戸ハ必ズ神經ヲ傷損メ病ヲ

ナシ。水銀毒ハ殊ニ神經ヲ侵襲シ頭面手足ノ諸筋顫振掣引シ痒ヲ發メ慘酷ノ死ヲ致ス故ニ二週毎ニ其人ヲ更代セシムベシ ○或云坑戸ハ水銀ト硫黃ノ毒氣ヲ被リ病ヲ發ス此猶酒客ハ酒ノ炭酸氣神經ニ侵襲メ痒ヲ發スルガ如シ或云鍍金匠。鏡匠等常ニ水銀ニ觸ル人ハ多ク痒ヲ患フ ○或云水銀ヲ内服スレバ直ニ大便ニ通シ其量少モ減セズ故ニ大害ナシ。坑戸ハ水銀ヲ吞テ腹ニ竊ニ大便ニ通スレバ是ヲ淘汰シ販ク者多シト然レ水銀ハ實ニ神經ノ仇敵トス即坑戸ハ必ズ神經ヲ傷損メ病ヲ

發スルカ如シ○水銀ヲ服スレバ諸脉神經ヲ刺戟
 ノ一種ノ熱ヲ發シ血液ヲ焔解稀釋ノ壞液トナリ
 諸竅ニ漏泄ス。殊ニ唾管ニ滿溢ノ吐涎シ斷頸腫痛
 腐爛シ死モ失苟兒陪苦ノ如キ腐敗ノ諸症ヲ發ス
 ○水銀ハ内服外敷ヲ論セズ誤用スレバ神經ヲ毀
 損シ諸筋攣縮掣引ノ肢節顫振拘強麻痺ノ痲ヲ發
 シ或血液ヲ溶解崩壞ノ漏汗及危篤ノ下利等驚異
 スベキ惡症ヲ發シ或其餘ノ良血液モ崩壞ノ諸液
 ニ驅逐セラレテ細絡ニ壓行シ漸ク壅滯ノ驅除シ
 難ク終ニ諸管ノ充張力衰弊ノ復健輸セズ頑固不

治ノ病ヲ發スルニ至ル

禁戒凡血液ノ稀涼酷厲ナル者或壞液及腐敗病ア
 ル者ニ水銀劑ヲ用レバ血液逾焔解崩壞ノ死ス○
 凡血液虚損ノ補充スベキ症或失血脫液ノ病アリ
 テ虚憊シ體稟脆弱ニモ感動甚キ者或神經病失苟
 兒陪苦癌瘡等ノ血液焔解崩壞ノ諸症ヲ兼ル者ハ
 皆水銀劑ヲ用テ害アリ老人孕婦及效嗽アル者ハ
 戒懼ノ是ヲ用ベシ○徽毒ノ患者右ノ諸症アル片
 ハ先ヅ對症ノ藥劑ヲ投メ是ヲ治シ水銀劑ノ害ナ
 キヲ察メ用ルヲ肝要ナリ○水銀劑ハ殊ニ失苟兒

遠西名物考 卷三十三 風雲堂藏

陪苦ガイクニ大害アリ服量少許ト雖モ大ニ吐涎シ劇症ヲ發スルヲ恰モ猛烈ナル毒ノ如シ或云一患者黴毒ニ因テ水銀劑ヲ用フ。失苟兒陪苦シタールガイクノ一患者是ニ同居シ伏枕スルヲ數日ニ大ニ吐涎シ頭面腫起口中腐爛ノ終ニ寒壞疽トナリ死ス。是水銀ノ蒸氣一室ニ薰メ失苟兒陪苦シタールガイクノ患者ニ侵襲スルナリ。或云一徭卒黴毒ニ失苟兒陪苦シタールガイクヲ兼ヌ。因テ一夜規吉撒爾弗キザールフ後出ソヲ擦ルヲ僅ニ一錢許翌朝吐涎シ連綿歇マザルヲ十日餘斷頸唇舌大ニ腫起シ腐穢ノ血ニ斷肉ヲ雜テ吐キ臭氣堪難ク齒牙殆ト脱落セ

ントス小便粘稠ニ臭氣甚ダシ數昏眩シ危殆ニノ纒マシニ死ヲ免ル。頑固ノ堅硬腫ニ水銀劑ヲ施セバ變ノ瘰癧トナリ或瘰癧ニ水銀劑ヲ施メ速ニ潰爛シ諸症増劇セル者アリ

性功原由 古來水銀ノ効用ヲ爲ス原由ヲ研究スレ

凡確實切當ニ適從スベキ說ナシ。或云水銀ハ血液ノミナラズ凝體モ亦焔解ノ壅結潛滯セル病毒ヲ分利變化シ涎唾ト爲テ排泄スルヲ恰モ製煉術ニテ諸物ヲ焔解變化シ其液ヲ分泌シ出スか如

シト 譬ハ消石ニ酸液ナシト雖モ製煉術ニテ其質ヲ焔解ノ變化シ酷烈ナル酸精ヲ出スか如シ

然_レ凡_レ是_レ唯吐涎ニ因テ徽毒ヲ治スル効カヲ推索ス
ルノミ未_レ水銀ノ全能ヲ覈知スルニ足ラズ。其故ハ
水銀劑ヲ用_テ必_シモ吐涎セザレ_レ凡_レ其効カヨク凝流
ニ體ニ普達シ徽毒ヲ消化ノ治スレバナリ○或云。
徽毒ハ一種ノ酸性毒ニメ酒石様ノ粘稠液ナリ此
毒血液ヲ沸釀ノ侵蝕腐壞シ諸惡症ヲ發ス。水銀ノ
性ヨク酸收ト合和ス。故ニ水銀ト徽毒ノ酸收ト合
和スル_レ恰モ水銀ヲ消石精ニ加_レハ忽チ相和ノ
溶解スルカ如シ。是ニ由テ水銀ト徽毒ノ酸收ト合
和スレバ即_チ升汞様ノ毒トナリ體中ノ温煖ト血液

循環ノ勢ニ因テ速ニ頭腦ニ升騰スル_レ恰モ水銀
ノ消石精ニ消化セル白末ヲ硝子壘ニ内_テ升煖シ
升汞ト作_スガ如シ。故ニ水銀劑ヲ過用スレバ患者
頭面腫起シ其升汞様ノ酷厲液頭腦ヨリ唾管ニ下_リ
テ吐涎シ斷頸ヲ侵蝕ノ熾痛スル_レ恰モ升汞ヲ肌
膚ニ貼スルカ如シト。然_レ凡_レ水銀劑ヲ施セバ徽毒ノ
有無ニ因ラズ吐涎スル故ニ此說モ亦妥當ナラズ
○或云水銀ハ亞兒加利性ナルヲ以テ徽毒ノ酸收
ヲ制刻ノ治スト。然_レ凡_レ徽毒ハ亞兒加利性トス。其故
ハ徽毒ノ吐涎ニ莖菜舍利別ヲ加_レバ綠色トナリ

酸味ノ品ヲ加レバ沸騰シ銅ニ塗レバ腐蝕スル
 亞兒加利鹽ノ如シ此皆亞兒加利性ノ微ナリ又水
 銀ハ亞兒加利性ノ効力ナシ水銀ニ酸性若ハ亞兒
 加利性ノ藥品ヲ加テ製劑トシ用ヒ或添加ノ品ナ
 ク一味用レバ皆微毒ニ効驗ヲ奏ス然ハ水銀ハ酸
 性或亞兒加利性ナルニ由テ効驗ヲ致スニ非ル
 明白ナリ○水銀ニ首稱スベキ兩個ノ主能アリ即
 無究微細ニ分析スルト究竟圓體ヲ爲ストナリ是
 ヲ以テ此物ヨク凝流二體ニ滑利竄行ノ鬆解疏釋
 スルヲ猶金銀鉛錫ニ水銀ヲ加レバ其氣眼ニ滲漏

ノ溶化シ泥トナルカ如シ故ニ水銀劑ヲ用レバ
 ニハ竄透侵刺ノ諸脉管ノ運動ヲ増發セシメ一ニ
 ハ微毒等ノ敗液汚血ノ脉管口ニ粘結凝滯スルヲ
 溶解疏釋ス是ヲ以テ動脈健輸ノ精力ト血液充灌
 ノ活運トニ由テ是ヲ推盪轉移シ細管ニ分排ノ水
 銀ト共ニ諸竅ニ攘除ス但其膠粘稠厚ノ液ハ多ク
 腸腺ト唾腺トノ輸泄管ニ出ツ此兩管ハ尤粗大ナ
 レバナリ大便ト涎唾ニ出ルヲ云唾腺ハ觸知殊ニ銳敏ニ其
 流溢セル酷厲液ノ刺戟ニ堪ヘズ自牽縮ノ其液ヲ
 搾出ス腎ト皮ノ輸泄管ハ甚微細ニ稀薄ノ液ノ

ニ排出スルナリ

性功括套 水銀劑ヲ用レバ脉管ヲ刺戟ノ其運動ヲ
増進シ粘稠凝固ノ諸液ヲ溶解稀釋ノ諸竅ニ分排
ス故ニ涎唾ヲ湧起シ汗ヲ發シ大小便ヲ利ス○一
切動物植物ノ發生長育ノ機ヲ壞滅ス故ニ諸蟲ヲ
殺シ黴毒瘡疥類ノ根芽ヲ剷絶スル効アリ又黴毒
ノミナラズ審ニ病性ヲ察ノ活用スレバ頑固險重
ノ諸病ニ大効アリ即膠粘凝固ノ惡液ヲ稀釋シ内
藏諸器ノ壅塞ヲ開達ノ腺及水脉ニ關ル諸病頑固
ノ水腫肝脾腸間膜等ノ塊腫經久ノ流走痛或關節

痛ノ患者粘液質ニ傷冷毒様ノ焮衝ヲ兼ル症或
肝焮衝或惡厲ノ瘡疥類頑癬等經久ノ皮膚病虻蟲
犬咬傷眼疾等ノ諸病ニ殊効アルト他藥ノ比スベ
キ者ナシ左ニ略其病患ヲ舉グ

内藏壅塞腺腫 水銀劑ハ諸腺ノ細管ヲ疏通シ膠粘
液ヲ溶解シ殊ニ遠未諸部ノ細管水脉ニ普達ノ粘
稠ノ水液ヲ稀釋ス故ニ肝脾腸間膜等ノ諸腺壅塞
ノ硬結塊腫シ或頸項等ノ腺壅塞ノ瘰癧腫トナル
ヲ治スル一良藥トス

水腫 水銀劑ハ峻効アル解凝藥トス凝體纖維ヲ刺

戟衝動ノ壅滯ヲ疏開シ粘液ヲ稀釋シ大小便ヲ利
 ス。故ニ水腫ニ用テ恰モ利水ノ峻藥ノ如シ或、海葱
 等ノ驅水藥ヲ加テ殊ニ捷効アリ○水腫ニ後方治
 驗多シヨク小便ヲ利シ兼テ大便ヲ通ス

按爾撒謨驅水丸

水銀精製者
三錢

按爾撒謨バハルサハム的列レ並シ底那ナ適宜

右研和ノ星ナキニ至リ漿粉ヲ適宜ニ加ヘ三仏ヲ
 一丸トシ夜分二丸ヨリ七丸マデ與ヘ翌朝大黃末
 ヲ用フ或、金雀花根、杜松實、白芥子ノ水煎モシ若クハ浸
 劑ヲ兼用ノ殊ニ良

皮膚病 水銀劑ハ肺管ヲ刺戟ノ其運動ヲ增進シ皮

表ノ細管ニ膠粘ノ惡液壅塞セルヲ溶解ノ排除シ
 血液ノ酷厲毒ヲ消化スル殊能アリ。故ニ黴毒ノ瘡
 瘍ノミナラズ頑固惡厲ノ瘡疥、乾癬或、濕癬ノ膿潰
 糜爛ノ浸淫スル症或、惡性ノ頭瘡、經久ノ潰瘍等内
 服外敷ノ良効アリ○然、左右ノ諸病ハ酷厲ニ粘
 稠ナル沕ク沕ク諸部ニ鬱聚壅滯ノ浸淫増展スル故ニ
 預メ刺絡ヲ施シ或、下劑ヲ用ヒ或、解疑稀釋ノ清血
 劑ヲ用テ血液ヲ稀渙シ脉管ヲ緩弛シ惡液ヲ導泄
 ノ後、水銀劑ヲ施スベシ否ラザレバ其毒内部ニ滿

溢ノ細絡支末ヨリ大管心藏ニ返流シ病毒内攻ノ
 惡症ヲ發スルヲアリ故ニ水銀劑ヲ用ル間モ時々
 下劑ヲ與ヘテ其鬱毒ヲ驅除シ且患人ヲノ煖室ニ
 保護シ表發ノ蒸氣ヲ抑遏スルヲ無ラシム

殺蟲水銀劑ハ殺蟲ノ殊効アリ往昔牧人畜類ノ蟲
 ヲ殺スニ始テ水銀ヲ外敷シ又内服セシメテ大効
 ヲ得タリ爾後水銀膏ヲ塗テ人ノ虱ヲ除ク蚤ハ効ナシ
 ○小兒ノ蟲症ニ水銀二瓦ヨリ一錢マデ内服セシ
 メテ良驗ヲ稱ス或水銀ニ沙糖ヲ加ヘ硝子白ニテ
 研和ノ星ナキニ至リ一月ヨリ一錢マデ用テ蛇蟲

ヲ驅除ス但甘扁挑油一二滴ヲ加テ研磨スレハ水
 銀復星ヲ見ハストナシ○或云水銀一弓半ヲ水三比
 ニ投シ磁罐ヲ以テ煎煮シ或水銀一比ヲ水六比ニ
 投シ煮ルト半時許其水ヲ日常ノ飲料トシ蛇蟲ヲ
 殺スニ大効ヲ稱ス或水銀一弓ヲ水十五弓ニ加ヘ
 煮ト四分時其水ヲ硝子壺ニ貯ヘ小兒ハ一匙大人
 ハ二三匙宛用ト日兩三次或水銀ヲ乳汁ニ煮ト前
 法ノ如クシ沙糖ヲ加朝午夜ニ一小碗宛温服セシ
 メテ殺蟲ノ良驗ヲ稱ス○然ト純粹ノ水銀ハ水ニ
 テ熟煮シ若トハ浸漬スレト秤量毫トモ減セズ其質少

モ水ニ融和セズ。氣味ナクノ白湯ニ異ナラス。故ニ其性能少モ出_レナシ。若シ其水ニ氣味染色アル者ハ水銀純粹ナラスノ其粘著セル鉛錫等ノ酸收質ノ溶解シ出ルナリ。故ニ其水古來殺蟲ノ効ヲ稱スレ_レモ功用ナシ又徽毒諸症ニ試用ルニ寸効ナシ

大便閉或云純粹ノ水銀ヲ内服スレバ其重量ト刺撃ノ性ニ由テ腸ヲ衝開シ直ニ大便ニ通利ノ其量少_シモ減セズ。故ニ二三比ヲ頻服スレ_レモ害ナシ。凡_レ結腸ニ焮衝ナク大便閉ヲ患ル者。是ヲ服スレバ直ニ腸ニ下テ滯屎ヲ導泄ス或云疝痛ニ頑固ノ大便閉

ヲ兼ル症ハ水銀六_三若_ハ一_比マデ服ノ速効アリ或云吐糞病ノ如キ腸室塞ノ大便緊閉スル病ハ水銀半_比若_ハ一_比ヲ頻服スレバ其重量ヲ以テ腸ノ穢積ヲ擠開シ服量減セズ盡ク通利ノ病治スト。然_レモ右ノ諸說皆信用シ難シ若シ水銀腸中ニ停止ノ大_ニ焮衝ヲ發スレバ壞疽トナリテ死ス或云腸ノ攣急甚_クノ緊縮セル症ニ是ヲ用テ腸焮腫ヲ發シ壞疽トナリテ死スル者アリ。

狂犬咬傷水銀劑ハ犬咬傷及諸獸咬傷ノ解毒藥ニノ奇効アル_ヲ明哲多ク試験セル所ナリ其毒劇盛

ニノ搗掣或發狂スト雖モ是ヲ内服外敷スル片ハ
 創口及血中ニ襲入スル毒モ共ニ排除シ治後再發
 スルナシ其法水ニ海鹽ヲ加ヘ創口ヲ摩擦ノ洗
 滌シ創處及其邊圍ニ規吉撒爾弗ヲ擦ル毎
 日一錢且技實栗膏ニ赤降汞ヲ加ヘ貼メ縛帶ヲ施シ大
 ニ膿潰セシムル半年許ニノ長ク其毒ヲ排泄シ
 又水銀劑ヲ内服メ其鬱蓄セル毒ヲ驅除スベシ○
 患者飲液ヲ服シ難ク瘞搗狂躁ヲ兼ル片ハ越謨規
 吉ニ麝香龍腦阿魏若ハ阿芙蓉ヲ加丸藥トシ用ベ
 シ斯ノ如キ鎮瘕藥ヲ加用レバ其神經ヲ襲撃スル

劇症ヲ鎮定シ奇効アル解毒藥トス○或ハ規吉撒
 爾弗ヲ擦テ吐涎スル三四週ニ至ルモ極テ驗ア
 リ擦法後其創ハ一月許モ膿潰セシムベシ○蝮蛇
 咬ニ越謨規吉ヲ用テ奇効ヲ稱ス或云越謨規吉ヲ
 健質亞那ノ越幾斯劑ニ研和シ内服セシメテ此危
 症ヲ救活セル經驗甚ダ多シ或攝爾扁答阿利磯油
 扁挑油揮發鹽類沙糖等ヲ用テ皆危篤ノ諸症ヲ挽
 回スル說多シ

吐涎法 吐涎法ハ徽毒及幾多ノ病ニ捷効ヲ稱ス其
 法水銀劑ヲ内服シ或外敷シ或朱砂ヲ薰スルナリ

是ニ由テ水銀。血中ニ滲入シ大ニ刺戟ノ汞熱ヲ發シ血液溶解ノ壞液様ノ涎唾湧出ス。○此法ヲ施ス片ハ預メ土茯苓。薩撒弗刺斯。朴窟福烏篤等ノ煎湯及下劑ヲ數日用ヒ。多血家ハ刺絡ヲ施シ且數温湯ニ浴スベシ。是ニ由テ脉管ノ強硬ヲ緩弛シ血液ノ粘稠ヲ疏釋ス又飲食ヲ節慎スルヲ緊要タリ

内服劑吐涎法 内服劑ハ甘汞尤切實ニノ害ナシ丸藥散劑。煉膏等ニ和シ患者ノ強弱ニ隨ヒ甘汞ノ量五匁ヨリ十匁マデ日兩三次用ベシ。是ニ由テ斷顎。焮痛。齒牙浮搖。氣息臭氣アリテ吐涎スル片ハ此劑

ヲ休テ大麥煎等ヲ與ヘ患者ノ強弱ニ隨ヒ吐涎ノ量。一晝夜ニ二比若ハ三四比ニノ三四週ヨリ五六週許連綿シ各部疼痛腫起潰瘍等ノ顯著ノ症治スルニ至ルベシ若シ吐涎歇ク或ハ少クノ諸症減セザル片ハ復前法ノ如ク甘汞ヲ服シ或毎夜更ニ一匁宛用ヒ是ニ由テ仍吐涎少キ者ハ黃降汞後出ツニ二匁若ハ三匁ヲ加フベシヨク吐涎ス。毒深キ者ハ吐涎速ニ歇ムヤアリ。總テ長ク吐涎スルニ非レバ一旦治スト雖モ再發シ患症更ニ險惡ナリ。○此法ハ外敷及薰烟法ニ比スレバ惡症ヲ發セズ且吐涎ノ多少

諸症ノ輕重ニ隨ヒ服量ヲ加減スルヲ得。又吐涎
モ緩慢ナル故ニ虛人ハ此法ヲ良トス

外敷吐涎法此法ハ吐涎スルヲ速ナリ是ハ腓。踝。跗。

ヲ爐ニ温メ規吉撒爾弗一ヲ取テ毎日一頓ニ擦

リ或分テ兩三次ニ擦リ布片ヲ温テ纏縛スベシ。若

兩三日ヲ經テ吐涎ナキ片ハ撒爾弗ノ量ヲ増シ肘

ト耳腺耳下ニ在リヲ温メ擦リ適宜ニ吐涎スル片ハ擦

法ヲ休ムベシ。但吐涎減スル片ハ夜分殊ニ多ク擦

スベシ。○又法。初日ハ脛。膝。鼠蹊ニ擦リ第二日ハ臀

肘。肩ニ擦リ第三日ハ復初日ノ如シ。初日吐涎スル

者アリ或二三日ニモ吐涎スル者アリ

内外兼施吐涎法内服劑ニテ吐涎少キ者ハ外敷擦

法ヲ兼施ノ適宜ニ吐涎セシムベシ。擦法ニテ吐涎

少キ者ハ内服劑ヲ兼用スベシ。○或擦法ヲ脊椎ニ

施ス者アレハ間惡症ヲ發スル故ニ是ヲ禁スベシ

薰烟吐涎法是ハ朱砂ヲ取テ炭火ニ投シ其烟氣ヲ

患者ニ薰メ吐涎セシムルナリ其法後ノ朱砂ノ條ニ舉

吐涎調護法吐涎中ハ毎日温湯或大麥乾葡萄或苗

杏。甘草等ノ煎湯ニテ數合漱シ且多服スルヲ肝要

トス。又土茯苓。薩撒弗刺斯等ノ煎劑ヲ朝。午。夜ニ用

テ尤^モ良○精力虚憊セル者ハ壯神ノ露水。乳劑。滋養ノ傑^ゲ列^レ乙^イ鹿角膠類^{鹿角}乳汁等ヲ毎日用ヒ若ハ右ノ飲劑ニ加用ヒ或滋養良性ノ肉羹汁及雞卵等ヲ與ハ食料ハ淡薄軟脆ニ消化シ易キ物ヲ用ベシ○鹽藏酸味辛熱香竄粘稠ノ品。總テ硬韌ニ消化シ難ク停滯シ易キ物ヲ禁シ飽食冷飲ヲ戒メ起卧温煖ニ冷氣ヲ避ケ表發ノ蒸氣ヲ扶クベシ○吐涎過盛ニ咽喉斷舌大ニ腫痛シ呼吸ヲ妨ケ飲食下リ難ク或下利腸痛等ヲ發スル者ハ數緩和ノ吉利詞^キ參^ス兒^テヲ施シ或下劑ヲ與テ上湧セル涎唾ヲ導泄ノ劇症

減スルニ至ルベシ○數日吐涎ノ諸症減セザレバ患者厭倦ニ堪ズノ全功ヲ收ル^レ能^ズ斯ノ如キ者ハ暫ク是ヲ休^ズテ患者ノ氣力復スルヲ候ヒ再施スベシ○微毒ニ勞瘵熱ヲ兼子或血液甚ダ稀薄ニ自汗多ク精力虚損スル者ハ吐涎法ヲ禁ズベシ水銀劑ハ血液ヲ溶解ノ稀釋スレバナリ殊^ニ失^シ苟^ク兒^ル陪^ガ苦^クノ病アル人ハ縱^トへ血液膠粘稠厚ナル者モ是ヲ施セバ血液崩壞ノ虚脱シ死ス

吐涎法試効吐涎法ハ微瘡潰瘍下疳便毒淋疾骨疼骨腫腐骨疽等其他頑固險惡ノ諸症ヲ速ニ治ス○

徽毒ノ硬腫。久キヲ經ザル者ハ吐涎中ニ消散ス。是
 ニ規吉撒爾弗ヲ擦テ殊ニ良。若シ消散セザルハ
 是ヲ截斷シ赤降汞ヲ軟膏ニ加ヘ貼メ排膿淨掃シ
 治スル。他ノ潰瘍ノ如シ。○諸液甚膠粘凝滯セル
 頑固ノ諸病。假令ハ惡厲ノ疥癬類。經久ノ傷冷毒痛。
 水腫。胸水。粘液腫。腺腫。瘰癧。或血液甚ダ酷厲ナラズ
 ノ疏解スベキ内藏硬腫。或黑障。灰白障ノ初發。或經
 久潰瘍。諸獸咬傷等ニ施メ治驗多シ。○往古始テ徽
 毒潰瘍ニ規吉撒爾弗ヲ擦テ齒牙浮搖口中腐爛メ
 大ニ吐涎ス。因テ大ニ恐怖シ以爲水銀ノ中毒ナリ

ト。然レ其病回復スルニ由テ吐涎ノ捷効アルヲ
 發明シ爾後久ク世ニ行ル。然レ吐涎ノ諸症劇盛ニ
 ノ間死スル者アル故ニ先哲製煉術ノ智巧ヲ究テ
 升汞。甘汞。赤白降汞等ノ水銀劑ヲ製造シ少許宛用
 テ瞑眩ナク治スルヲ稱シ吐涎法ヲ廢セリ。然レ其
 製劑モ或猛烈ノ毒アリトノ危懼シ或惡症ヲ發シ
 或吐涎セザレバ根治シ難シトスル故ニ吐涎法復
 近來マデ世ニ行ル

吐涎患害 水銀劑ヲ用テ吐涎スレバ一種ノ蓄留熱
 ヲ發シ口中焮熱。齒牙浮搖。或脱落シ咽喉斷頸唇舌

腫痛潰爛。口臭甚^ク。面部腫起シ或一匙ノ稀粥モ咽
ニ下^リ難ク。一啜ノ水漿モ嘔噎ノ苦悶シ或瞬息ノ間
モ涎沫湧溢ノ睡難ク稍^ヤ睡レバ膠粘ノ涎沫喉間ニ
梗阻ノ氣息ヲ妨^ゲ或^ハ口舌拘強言語艱澁呼吸不利
促迫或^ハ下利赤痢腸痛吐血ヲ發シ或^ハ吐涎連綿數週
ニ至レバ患者疲瘁困倦ノ舉動シ難ク或^ハ羸瘦骨立
ノ經年起^ズ。或^ハ乾效勞熱ヲ發シ或^ハ肢節彊硬不
遂顫振麻痺ノ瘵トナリ。或^ハ吐涎法ヲ施ス^ト一兩次
ニノ諸症脫然暫ク快復ヲ得レ^ル凡舊痼宿毒再^ビ萌
發ノ險症前^ニ倍シ終^ニ廢痼トナル者少^クヲ^ズ是

吐涎法ハ水銀速^ニ吐涎ニ隨テ漏泄スル故ニ其性
力ヲ逞^メノ盡ク徽毒ヲ驅除スル^ト能ハズ。唯多ク體
中ノ粘液ヲ吐泄シ或^ハ水銀體中各部ニ懸留滯著ノ
遍ク血液ニ融和セザレバナリ其故ハ吐涎ノ初^ニ
於テハ患者ノ掌中ニ黃金ヲ握ル^ト四分時ニ淡
白色トナル。其涎中ニ黃金ヲ投スル^モ亦然リ。既ニ
數日吐涎スル^ニ至テハ其色少^シモ變スル^トナシ。是
水銀既ニ初^ノ流涎ニ隨テ盡ク體中ヲ脫去シ或^ハ諸
部ニ凝聚潛滯ノ吐涎ニ交ラス唯粘液ノ^ニ溶解シ
出レバナリ○或^ハ以^ハ爲^ク徽毒徑^ニ其粘液ニ混^メ排

出スル故ニ吐涎饒多ニノ累日連綿スル者ハ病毒一掃淨盡ノ諸症根治スト。然レ水銀劑ヲ用テ毫モ吐涎セシメズ療スルキハ微毒根治スルテ殊_ニ的實ニノ再發セズ是日常歷試スル所ナリ然ハ吐涎法ハ確實妥當ノ療法ニ非ルヲ知ベシ又孕婦小兒老年及高貴人或胸病アリ或體稟薄弱虛羸ノ者痲痺等ノ患者ハ絶テ此法ヲ施スヲ能ハズ○從來吐涎セル患者ヲ診視スルニ或險重ナル骨病ヲ發シ或水銀筋肉中ニ滯溜ノ惡症ヲ發スル者アリ或云水銀劑ヲ内服シ或外敷ノ吐涎セル患者ノ屍ヲ數剖

觀スルニ腦蓋中或頭蓋骨ノ二襲ノ間ニ水銀多ク瀦留シ或肺藏中水銀六弓許凝聚ノ其部大ニ焮腫シ或冠血脉ヨリ水銀一弓餘ヲ搾出シ且心藏大ニ焮腫セリ或關節ノ靱帶中或脛骨中ニ水銀瀦留セル者アリ其人生前骨疼焮腫シ或肢節顫振觸動シ或拘攣不遂ノ痲ヲ發シ或卒倒痲痺ヲ發セリ○或云水銀劑ヲ過用スレバ平人ト雖モ臭穢ノ涎ヲ吐テ微毒ノ患者ト全同シ故ニ微毒ノ患者吐涎スト雖モ微毒排泄ノ候ト言難シ又諸病ニ於テ自然ニ多ク痰唾ヲ吐テ病毒排泄シ治スル者甚ダ多シ微

毒ニ於テハ自然ニ多ク涎唾ヲ吐テ其毒排泄シ治
スル者ナシ是唾管ハ微毒ノ自然ニ排泄スル順路
ニ非レハナリト

微毒擦膏治法 往昔以爲オモヘラク微毒ハ吐涎法ヲ施シ酷

厲腐敗ノ惡液ヲ吐泄シ治スト然レ吐涎ニ由テ危
劇ノ諸症ヲ發シ或治スレレ再險惡ノ病ニ陷ル者
アル故ニ晚近ニ至テ明哲ノ經驗ニ隨ヒ規吉撒爾
弗ノ擦法ヲ以テ吐涎セズノ治スル一ヲ發明ス法
ノ如ク是ヲ施セバ水銀吐涎ニ漏泄セズ暫ク體中
ニ留テ遍ク血液ニ融和シ漸ク蒸氣ト大小便ニ排

泄ス故ニ患者憊勞セズ危懼スベキ惡症ヲ發セズ
治ノ後再發ノ患ナシ胃虛弱ニシ飲食消化シ難キ
人及水銀劑ヲ内服シ難キ者ニ是ヲ的當トス○其
法先ヅ下劑ヲ與ル四五日ニシ胃腸ヲ淨掃シ多
血家ハ刺絡ヲ爲シ擦法ヲ施ス四五日以前ヨリ擦
法中毎日朝夕半浴湯半身以下温ヲ施シ長ク湯中
ニ坐スルヲ佳トス但患者疲勞ノ浴湯ニ堪サル片
ハ毎日一次浴シ諸症劇キ者ハ一兩日浴ノ擦法ヲ
施スベシ孕婦ハ浴湯害アル者多シ○規吉撒爾弗
製法 水銀ヲ家猪脂ニ加ヘ研磨スル一三日許ニ
後出

ノヨク混和スルヲ肝要トス。否、サレバ水銀血中ニ
 入テ復相聚テ唾腺ニ滯滞シ刺撃ノ吐涎ヲ發スレ
 ハナリ。但、熟研スト雖モ水銀多ク其底ニ沈ム故ニ
 時々研和スベシ。○擦法ハ患者ノ室ヲ温煖ニシ病
 ノ輕重ニ隨撒爾弗一錢半ヨリ二錢ヲ取り。初日ハ
 遍ク左脚ニ擦リ二日或三日ヲ間テ又遍ク右脚ニ
 擦リ。又以後兩三日宛間テ左腰ニ擦リ次ニ右腰。次
 ニ左膝鼠蹊。次ニ右膝鼠蹊。次ニ左腕肘臂。次ニ右腕
 肘臂ニ擦リ終テ復初日ノ部ニ還リ。逐次ニ擦テ大
 抵七八個月ニ至リ諸症全治スルヲ度トシ休ム。○

骨腫等ノ外症アル部ハ常法ヨリハ數擦ルベシ。○
 預其部ヲヨク摩シ手ヲ温テ撒爾弗ヲ擦ルベシ。○
 擦テ後半時或一時許モ卧蓐ニ温覆ノ冷氣ヲ避ク
 ベシ。○晚間ニハ温湯ニ石鹼ヲ溶シ燒酒少許加テ
 其擦リタル部ノ皮膚毛竅ニ粘著セル撒爾弗ヲ洗
 去ルベシ。是ニ由テ皮表ノ蒸氣管開通ノ蒸氣ヨク
 發泄シ。且、翌日擦ル撒爾弗ノ水銀ヨク滲入ス。○每
 日前說ノ浴湯ヲ施ス。一大緊要トス蒸氣及汗ヲ
 發スルガ爲ナリ故ニ此療法ハ夏月尤効多シ。○虚
 人孕婦小兒等ハ常法ヨリハ間日ヲ多クスベシ。速

効ヲ要ノ毎日是ヲ擦レバ吐涎ノ水銀速ニ漏泄シ
 病毒根治セズ。故ニ間日多キヲ佳トス。多ク時日ヲ
 經レ正全愈ノ功確實ナレバナリ。但毒淺キ者ハ三
 個月ニメ治スベシ。或五六日若ハ七日ニ一次是ヲ
 擦テ七個月ニメ全治スル者アリ。或徽毒ニテ頭蓋
 骨ニ一孔ヲ生スル者ハ箇月中ニ撒爾弗五弓ヲ擦
 テ全治セリ。或徽毒ノ諸症劇盛ナル者。四十五日ニ
 撒爾弗ヲ擦ルヲ十五次。毎日半浴湯ヲ施シ時々下
 劑ヲ與テ全愈セリ。○或云。二日ニ一次撒爾弗ヲ擦
 リ三日ニ一次下劑ヲ用ヒ毎日半浴湯ヲ施ス。一

次。是ニ由テ吐涎セズ徽毒ヲ治スルヲ確實ナリ。或
 云輕症ハ撒爾弗半錢宛。毎夜脚ニ擦リ。虚人ハ二日
 ニ一次擦テ治ス。或云下劑及發汗劑ヲ數與レバ劑
 中ノ水銀大便ト發汗ヨリ漏泄スル故ニ効驗少シ
 ト。○飲料ハ大麥煎ニ乳汁ヲ加ヘ。或大麥蘆根。蒲公英
 英根。甘草。或朴窟福烏篤。薩撒弗刺斯ノ煎湯ヲ與ベ
 シ。○食料ハ穀類乳汁雞卵及消化シ易キ蔬菜ヲ良
 トス。○過食ヲ戒メ鹽藏酸味。炮炙肉。厚脂油膩。辛熱
 香竄ノ品。硬韌ニシ難キ物。酒類ヲ禁スベシ。○
 諸症全治シ擦法ヲ休ル片ハ數下劑ヲ用ヒ漸ク平

常ノ飲食ニ復スベシ。愈後過食シ或食禁ヲ慎マス
 ノ死スル者多シ。○孕婦徽毒ヲ患レバ墮胎シ或死
 胎トナリ或娩後育セズ或母子共ニ死ス。故早ク此
 療法ヲ施シ其毒ヲ除クベシ。一婦人徽毒アリ。數懷
 孕スレモ皆墮胎ス。其後孕テ既ニ六個月ニ至リ此
 療法ヲ施シ徽毒ヲ治スルニ因テ安産ノ母子共ニ
 恙ナシ。爾後數受胎ノ皆長育セリ。○初生兒遺毒ア
 ル者ハ生母或乳母ニ此療法ヲ施セバ其兒ヨク長
 育ス。但十歳以上ノ兒ハ直ニ擦法ヲ施シ或護謨規
 吉キ後ツ一錢死日一兩次與フベシ。○小兒水銀劑ヲ

服ノ下利腹痛吐涎等アル者ハ此擦法ヲ佳トス。但
 是モ亦施シ難キ症ハ加羅蔑兒カ後ツ久服セシム
 ベシ。○水銀ニ感觸シ易キ人ハ動モスレバ吐涎ス
 ル故ニ數患者ノ口中ヲ診ヒ。若シ口中焮熱斷腫痛
 津唾多ク面部赤色。睡眠多キハ是水銀一頓ニ多ク
 血中ニ滲入セル症ニノ吐涎ノ候トス。速ニ擦法ヲ
 休メ一兩次下劑ヲ與テ瀉下セシメ或云便秘スレ
 皮膚ニ粘著セル撒爾弗ヲ洗淨シ汗衫汗ヲ更ヘ脉強
 盛ナル者ハ刺絡ヲ行ヒ半浴湯ヲ施シ毫モ吐涎ノ
 候ナキニ至テ常法ヨリハ一兩日間日ヲ多クシ再

擦法ヲ施スベシ○或云。右ノ擦法ハ吐涎ナクノ微毒ヲ療スト雖モ悠々タル日月ヲ消リテ毎日擦法浴湯ヲ怠ラス嚴ニ食禁調攝ヲ守持スルニ非レバ全功ヲ成シ難キガ故ニ患者煩勞ニ堪ヘズノ終ニ怠棄シ或諸症荏苒トノ回復セズ或吐涎スル者アリ或水銀必内部ニ潛滯停瀦セズト言ベカラズ。故ニ是モ亦最勝十全ノ療法ト稱シ難シ

叔福 依伍羅 國

遠西醫方名物考卷三十三終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 林鶴亭用先生著 全三冊 入門 植學啓原 宇田川格庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 每篇三冊完

增補和蘭藥鏡 同上 全七冊 醫療正始 中書外學先生著 每篇三冊完

遠西醫方名物考 同上 全八冊 泰西名醫彙講 藤川其作先生著 全八冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 大槻玄幹先生著 全三冊


瘍醫新書 玄澤大龜先生著 全四冊 醫方研幾 保羅足立先生著 每篇三冊完

蘭學階梯 同上 全三冊 同方劑篇 同上 全二冊

蘭學佩觿 同上 全一帖 西音發微 大槻玄幹先生著 全二冊

幼幼精義 素堂堀内先生著 每篇三冊完 病學通論 此書精方先生譯述 初篇三冊完

濟世 杉田成翁先生譯 全四冊 青藜閣 江戸漢草書局三月 須原屋伊八



榛齋字田川先生著

十一篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

天澤氏