



武門  
號 857  
卷 45-34

榛齋宇田川先生著



# 遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



遠西醫方名物考標目

卷三十四

水銀 目

水銀劑治法括套

升汞 升汞毒

亞括扒瓦埕尼加

升汞水

甘汞 驅蟲甘汞錠

加羅蔑兒

白降汞 治癩蕃薇膏

大正九年九月十日  
內田素子氏贈



遠西醫方名物考 卷三十四 標目

風雲堂藏

赤降汞

赤汞消毒丸  
驚心驚密堊兒

安質赤汞散

黃降汞

黃汞驅蟲散

越扶屋布斯密涅刺列

越扶屋布斯安質沒扭

斯微甸藥酒方

溶汞舍利別

銀香水

升汞丸

鹼汞丸

溶汞水

過爾託亞溶汞水

赤汞水

溶汞丸



遠西醫方名物考卷三十四

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補

水銀 三

水銀劑治法活套

往古以爲オセハラ徽毒ハ水銀劑ノ吐涎法

ヲ施スニ非レバ根治セズト。晩近ニ至テハ諸明哲

ノ經驗ニ隨ヒ水銀劑ヲ施メ吐涎セザレバ殆スル

ト逾捷クスイヤカニノ効驗更ニ確實ナルトヲ發明セリ。是吐

涎セズノ水銀速ニ體中ヲ謝去ラズ十分ノ性功ヲ

逞發スレバナリ故ニ水銀劑中ノ吐涎セザル者ヲ

遠西名物考

卷三十四

風雲堂

擇用ベシ。然レ凡動モスレバ吐涎スル故ニ時々患者ノ口中ヲ診シ齒牙浮搖。斷腫痛。津唾多キ片ハ速ニ其劑ヲ休ムベシ。○然レ凡水銀劑ハ初メ少許死用ヒ。漸次ニ服量ヲ加テ稍吐涎ノ候ヲ見スニ至ラザレバ切實ノ効ナシ。是ニ於テ速ニ其劑ヲ休メ其症盡ク去テ後復用ヒ數斯ノ如クノ竟ニ全治ニ至ルベシ。是ヲ一大要鍵トス。○諸症平愈スト雖モ一點ノ惡液遺滯スレバ鬱毒復滋息ノ根治シ難キ故ニ數月ノ間。四日或六日ニ一次前劑ヲ與ベシ。○水銀劑ハ内服シ或外敷ノ吐涎セズ大ニ瀉下セズ總テ劇

キ瞑眩ナクノ其毒ヲ驅除スルコト肝要ナリ。効力確實ナル劑ハ甘汞。升汞。華涅滿溶汞散等ナリ。其毒經久頑滯セル症ハ升汞劑効多シ升汞丸。升汞水。斯微旬藥酒方ノ如シ病新ニ發スル者ハ甘汞。華涅滿溶汞散効多シ。○外敷劑亦効用多シ假令バ腫瘍潰瘍ニハ規吉撒爾弗ヲ施シ咽喉口中ノ諸症ニハ規吉斯麗謨ヲ含漱劑トシ淋疾ニハ規吉撒爾弗ヲ紙捻子ニ塗テ尿道ニ挿スカ如シ。○水銀劑ノニテ治セザル症アリ假令バ腐骨疽。骨腫。癌樣潰瘍。水棉樣息肉。堅硬腫。久淋等ハ各對症ノ藥劑ニ水銀劑ヲ兼

用スルガ如シ○水銀劑ヲ施シハ飲食ヲ節慎シ殊  
 酸味。鹽藏ノ品。消化シ難キ食物ヲ禁シ起居温煖ニ  
 ノ冷氣ヲ避數温湯ニ浴シ時々下劑ヲ用多血家ハ  
 刺絡ヲ施シ日常緩和ノ飲劑ヲ用ベシ○患者虚憊  
 ノ水銀劑ヲ長服シ難ク或體力充張セスノ病毒排  
 出シ難ク荏苒潛滯ノ治セザル症ハ幾那等ノ強壯  
 劑ヲ投シ滋養ノ飲食ヲ與テ内托補充シ精力旺盛  
 スルヲ須テ水銀劑ヲ用ベシ○古今名哲從來經驗  
 シ効用彰著ニノ日常通用セル水銀劑ヲ左ニ舉グ  
 〔升汞〕  
 〔メルキルス〕  
 〔ボフゲヘヘン〕  
 〔デグリス〕  
 〔ソットシユレ〕  
 〔多イク〕  
 〔蘭〕

〔製法〕

水銀

精製者  
四弓

消石精

適宜

海鹽

炒乾淨白  
者細末

綠礬

陶器内煨過ノ白  
色者各五弓

右水銀ヲ硝子壘ニ内レ消石精ヲ滴メ水銀盡ク消  
 化スルヲ度トシ〔匣〕水銀十六弓ニ消石精十八弓ヨ  
 置バ水銀ヨク消〔火〕沙火ニ上セ〔火〕徐々ニ水氣ヲ蒸  
 化メ清水ノ如シ〔火〕散ノ乾白ノ鹽塊トナルニ至リ海鹽ト綠礬ヲ加ヘ  
 硝子臼ニテ研和シ頸長ク腹潤キ硝子壘ノ半ニ充  
 テ沙鍋ニ内其末アル際マデ沙ヲ被ヒ其壘ノ口ヲ  
 塞メナク文火ニ上テ水氣及酸收ノ蒸氣少モ升ラ  
 サルニ至リ上尖リ下潤キ紙袋ヲ造テ其硝子壘ノ

口ヲ覆ヒ 一 五 水氣蒸升スルヲ漸武火トシ。壘底通紅トナリ。ヨク升煨シ了リテ放冷シ 三 四 大抵三時或ハ其壘ヲ毀テ其底ノ赤色ノ渣塊ヲ除キ上部ニ著所ノ潔白光澤アル晶ヲ取り貯フ 按

**升汞毒** 性極テ酷烈ニノ内服外敷共ニ觸ル處穿蝕腐爛シ劇痛ヲ發ス。即チ一二日ヲ服スレバ忽チ咽喉口舌ヲ傷爛シ。胃腸ヲ侵蝕ノ腹痛悶亂シ。速ニ救療セザレバ死スルヲ礬石毒ヨリ猛烈ナリ。故ニ感觸甚キ人ハ瞑眩少キ水銀劑ヲ用ベシ

**主治** 頑固ノ微毒其他經久ノ諸病ヲ治ス。内服劑ハ

斯微ス旬藥酒方ノ條ニ舉グ○外敷ノ腐藥トシ息肉。頑硬胼胝様肉。疣贅。水棉様肉ヲ消メ結痂セシム○無花果狀ノ息肉ハ升汞ニ枯礬ヲ加水煮テ其液ヲ取り棉布ニ蘸シ數貼メ消散ス○額ニ惡性ノ腫瘍ヲ發シ經久治セズ諸水銀劑モ効ナキ症ニ升汞ヲ軟膏ニ和シ貼メ全治セリ○升汞ニ芙蓉少許ヲ加ヘ軟膏ニ和シ貼スレバ劇痛ヲ發セズ○腐藥ト爲スニハ硬膏ヲ攤テ正中ニ一孔ヲ穿チ其孔ヲ腐蝕スベキ處ニ當テ貼シ升汞末ヲ糊ニ加ヘ丸藥トメ其孔ニ容レ蓋膏ヲ貼シ置バ五時許ニ腐蝕ス

○升汞礬石等ノ侵蝕毒ヲ内服ノ危劇ノ諸症ヲ發スル者ハ速ニ油脂類家猪脂或乳汁ヲ多ク用テ吐セシメ且其酷厲毒ヲ包攝甘和シ又下劑ヲ用ヒ瀉下ノ後數日乳汁ヲ温服スベシ

亞搗拔瓦埏尼加 羅 べイテンデウトル 蘭

製法 升汞 半錢 石灰水 一匕

右研和スレバ黄色トナル。是ヲ硝子壘ニ内貯フ一升汞一匁或二十五匁ヲ取リ石灰水一匕ニ溶化ス。○一方升汞一匁ヲ蒸餾水一匁ニ研和シ石灰水一匕ヲ攪勻ス

主治 是ヲ棉撒絲ニ浸シ外敷ノ膿ヲ排ヒ腐穢ヲ祛

テ乾愈スル峻藥トス。故ニ膿腫潰瘍穿蝕腐爛惡厲臭穢ノ瘡瘍ヲ治シ殊ニ汚液敗膿多ク出ルヲ乾愈ス。○徽毒潰瘍ヲ治スル良藥トス。龜頭潰爛疳蝕等ノ膿ヲ排ヒ腐壞ヲ過テ乾シ或咽喉腐爛ニ漱藥トシ施ス。一ニ二週。眼眩ノ害ナク全愈ス。○洗藥トシ施メ頑固ノ傳染瘡瘍及疥癬ヲ乾愈シ蟲ヲ殺ス。○輕キ侵蝕藥トシ外敷メ息肉潰瘍中ノ贅肉ヲ除キ腺腫骨腫ヲ消ス。悍キ侵蝕藥ト爲スニハ升汞ノ量ヲ増シ蒸餾水ニ溶シ或硃砂ヲ加ヘ施メ峻効アリ。○此劑ハ乾愈ノ効多キ故ニ潰瘍等ノ病毒惡液多

ク體中ニ蘊蓄セル症ニ過用スレバ其毒潜伏内攻  
 ノ險症ヲ發スルアリ故ニ對症ノ藥劑ヲ用テヨ  
 ク鬱毒ヲ驅除ノ是ヲ施スベシ○升汞半錢ヲ蓄薇  
 露ニ溶化シ洗藥或塗藥トシ疥癬侵蝕瘡等ヲ治ス  
 此劑羅甸名「ア多ヂヒノヘル子リ」和蘭 斷國 伍庚  
 名「ゴッテレイキ」 字「トル」 ヘル子リウス

升汞水

ア多ヂヒノヘル子リウス

製法

升汞 一錢

蒸餾水

二比

右研和ス「技」ノ一方「硃砂」 此劑ヲ以テ亞括「バ」瓦埵「ガ」尼  
 加「カ」ニ代用ス石灰水ニ溶「トカ」セバ升汞多ク壘底ニ沈ム  
 故ニ水ニ溶スヲ尤良トス「モ」 批「技」取「福」埵「云」尼「此」加「劑」ト「ヲ」名「ア」ク「括」

主治

外敷ノ水棉様潰瘍ヲ輕ク侵蝕ノ消化ス○惡  
 厲潰瘍頑固ノ腺腫骨腫諸傳染瘡瘍ニ洗藥トシ施  
 ノ捷効アリ○此劑ニ水ヲ加「ソ」テシテ潰瘍ヲ淨  
 掃シ腐爛ヲ過メ乾愈ス○潰瘍ノ汚液敗膿多ク漏  
 泄スル症ニ此劑ヲ棉撒絲ニ浸シ温貼ノ膿ヲ排「ハ」ヒ  
 乾ノ肉ヲ生ス○徽毒ノ咽喉腐爛ニ玫瑰蜜ヲ是ニ  
 加ヘ漱藥トシ殊効アリ○頑癬及癩ノ洗藥トシ乾  
 愈ス○頑固ノ焮腫眼或臉焮腫赤爛或角膜星翳斑  
 點翹肉努肉等ヲ除クニ升汞一「ハ」ヲ蒸餾水四「マ」ニ  
 溶「トカ」シ數患處ニ點スレバ凝固ノ惡液ヲ溶解ノ消散



ス○眼瞼攀急ノ緊閉シ開クヲ能ハザル症ハ此劑  
ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ布片ニ蘸シ貼メ治ス○升汞  
一匁ヲ大麥煎一匁ニ溶シ玫瑰蜜ヲ加ヘ外敷スレ  
ハ刺撃セズ疼痛ヲ發セズ其効升汞水ト同シ

甘汞

メルキリウス・ドルシス・シブリ  
マホス・フロル・ステクウク・クラン

製法

升汞 一匁 水銀 精製者 九匁

右升汞ヲ硝子臼或ハニ内硝子杵或ハニテ研磨ノ  
極細末ト爲シ水銀ヲ加亞爾箇兒ト許宛滴ノ是ノ  
飛散セザル研和スレバ水銀星ナク黒灰色トナリ  
漸熟研スルニ隨白色ヲ帶ビ性緩和トナルナリ研但

磨中其氣ヲ口鼻ニ引ク勿レ是ヲ頸潤ク短キ硝子壘ニ内テ三  
分一ニ充其口ヲ紙ニテ塞シ鍋ニ内其末アル際文火

上一茶頃後磁器ニテ其口ヲ蓋閉シ漸火ヲ加一

半時餘ニ更ニ武火トシ其劑盡升煨ノ上部ニ著

ニ至テ放冷シ或云武火ト爲テ四分時其壘ヲ毀テ

升煨セル堅固ノ晶ヲ取細末トシ或其壘底ニ赤末

銀ノ細珠ヲ雜テ頭ニ著一アリ俱是ヲ除是ニ其一

去レベシ但此劑ヲ研磨スルニ銅器ヲ忌ム是ニ其一

倍ノ蒸餾水ト二十分一ノ硝砂ヲ加テ研和シ磁鍋

ニテ煮一八分時ニ其水ヲ傾去又蒸餾水ノ沸湯

ニテ淘洗スル一二三次ニ其末少許ヲ取石

遠西名物考 卷三十四 六 風雲堂

灰水ニ投ノ黄色若<sup>モ</sup>ハ白色ノ塗ヲ見ス<sup>ナキニ至</sup>  
 テ其末ヲ取<sup>リ</sup>微火ニ乾<sup>カ</sup>シ硝子壘ニ内<sup>レ</sup>固封シ暗處ニ  
 貯<sup>ル</sup>是升汞ニ水銀ヲ加<sup>テ</sup>研磨シ升煨スルニ由<sup>テ</sup>其  
 質ノ銛利ノ鋒尖鈍挫ノ柔滑トナル故ニ升汞ノ酷  
 烈侵刺ノ味盡消スルナリ<sup>技</sup> ○右ノ如ク升煨スレ  
 氏或水銀全然トノ升化セズ細珠トナリテ其晶中  
 ニ間錯スル<sup>コト</sup>アリ是ハ破碎ノ其水銀ヲ分<sup>テ</sup>去<sup>ル</sup>ヘシ  
 ○升汞ハ水銀升化ノ峻酸質トナル者ナリ<sup>甘汞ハ</sup>  
 升汞ニ水銀ヲ加<sup>テ</sup>再升煨ノ半酸質トナル者ナリ<sup>往</sup>  
 昔ハ<sup>オモシク</sup>以爲甘汞ハ數回升煨スルニ隨<sup>テ</sup>甘和シ良性

ニノ危懼ナキ藥トナル<sup>即升煨三回ニノ甘汞ト名</sup>  
 ケ六回ニノ<sup>カ</sup>羅<sup>ロ</sup>兒<sup>ル</sup>ト名<sup>ケ</sup>叔<sup>ハ</sup>九<sup>回</sup>ニ<sup>ノ</sup>九<sup>回</sup>ニ  
 ノ<sup>バ</sup>那<sup>ナ</sup>設<sup>セ</sup>亞<sup>ア</sup>ト名<sup>ク</sup>或云升汞ニ水銀一倍ヲ加<sup>テ</sup>研和  
 アル堅固晶塊ヲ成ス數回升煨セ<sup>レ</sup>ガレ<sup>バ</sup>性甘和ナ  
 ラズ<sup>ノ</sup>升汞ノ酷厲ナル味アリ<sup>若</sup>嘗<sup>テ</sup>舌ヲ侵刺ス  
 ル者ハ尚一兩次升煨ス<sup>ベシ</sup>但數回升煨然<sup>レ</sup>氏右ノ  
 スルニ隨<sup>ヒ</sup>瀉下ノ効減<sup>メ</sup>發汗ノ効多<sup>シ</sup>然<sup>レ</sup>氏右ノ  
 如ク數回升煨スルニ隨<sup>ヒ</sup>升汞ノ質減損スルノ<sup>ニ</sup>  
 ニテ其性<sup>必</sup>モ變化セザル<sup>コト</sup>近世製煉家ノ發明ス  
 ル所ナリ故ニ唯一回升煨ノ沸湯ニテ其粘著セル  
 酷烈ノ酸收質ヲ洗淨スル<sup>コト</sup>最良法トス  
 主治 升汞ニ比スレバ性緩和ナリ輕<sup>ク</sup>瀉下シ膠粘液

ヲ溶解稀釋ノ驅泄シ。微毒ヲ治スル良劑トス。一切  
 微毒諸症ニ通用ノ瞑眩少ク劇症ヲ發セズノ良効  
 ヲ奏ス。○頑固ノ瘡瘍疥癬頭瘡等皮膚病ヲ治スル  
 ニ多用フ。發汗劑ヲ兼用ノ殊良。或、其毒潛伏内攻セ  
 ルヲ驅發ス。○諸獸咬傷ニ因テ痙攣發狂スルニ殊  
 効アリ。○咽喉ノ粘液腫瘰癧諸腺ノ硬腫及關節痛  
 ヲ治ス。○蛇蟲ヲ殺シ驅泄ス大人ハ一二匁ヨリ五  
 六匁ニ至ル。但、時々下劑ヲ用テ吐涎ヲ防ベシ小兒  
 ハ半匁若ハ一匁ヲ苦味ノ越幾斯ニ加丸藥トシ每  
 日一服宛兩次用フ。○蟲症ニ後方捷効アリ

驅蟲甘汞錠

甘汞 細末

沙糖 二匁

蘇甘沒扭謨 細末 各一匁半

右調勻シ亞刺比亞趨謨漿ヲ適宜ニ加テ研和シ甘  
 汞二匁ヲ含ル量ヲ一錠ト爲シ風乾ス。一二歳ノ兒  
 ハ毎日一錠ヲ與フ。大人ハ日二三錠宛用フ。○甘汞  
 ハ癩症ニ良効アリ殊ニ蟲ヨリ起ル癩ニ良。幾那ヲ  
 加ヘ煉膏トシ用フ。○下劑ニ加テ粘液停水ヲ驅泄  
 ス。故ニ粘液質ノ人ニ用テ粘液壅滯ノ諸症ヲ治シ。  
 水腫粘液腫留飲病ニ偉効アリ。○水腫ニ朝夕三匁

宛用<sup>レ</sup>テ微吐涎ノ候ヲ見<sup>ハ</sup>スニ至<sup>レ</sup>バ粘稠液ヲ稀釋  
シ小便ヲ利<sup>ス</sup>。但吐涎スルキハ此藥ヲ止<sup>テ</sup>下劑ヲ  
用<sup>ヒ</sup>停水ヲ滌除スベシ○水腫ニ後方殊効アリ

驅水甘汞散

甘汞 十二匁

沙糖 四匁

右研和シ分テ三服トシ一時ニ一服宛飲液ニテ送  
下ス。大便秘スル者ハ葯刺巴ノ華爾斯一二匁ヲ加  
○粘液腐敗液アリテ肢體瘦削スル症其他膠粘ノ  
病毒惡液内部ニ頑結セル經久沈滯ノ諸病ヲ治ス  
○黑障眼ニ甘汞ヲ内服シ或一匁ヨリ六匁マテ沙

糖ニ研和シ鼻中ニ吹テ嚏藥トシ間奇効アリ○此  
藥ハ蜜或沙糖ニ研和シ或煉膏散劑丸藥トシ或適  
宜ノ飲液ニ和シ用フ。過用スレバ吐涎スル故時々  
下劑ヲ與<sup>ベ</sup>シ○服量一二匁ヨリ六七匁ニ至ル。或  
十五匁マテ用<sup>テ</sup>アリ小兒ハ四分匁ノ一ヲ沙糖ニ  
加用フ。或一錢ヲ八九丸トシ小兒ハ三四日毎ニ年  
數許宛用フ。但殺蟲ニハ毎日二丸宛用フ○或丸藥  
トシ甘汞量三匁宛朝夕用<sup>テ</sup>吐涎ノ候アルキハ是  
ヲ休<sup>テ</sup>下劑ヲ用<sup>フ</sup>或甘汞一二匁ヲ蝸蝓石ノ末ニ  
加適宜ノ服量トシ日一服宛用<sup>テ</sup>徽毒諸症ヲ治ス

○吐涎セシムルニハ五六分ヨリ十分マデ一服ト  
 シ日二三服用フ或ニ分ヲ取玫瑰昆設爾弗一錢ニ  
 研和シ一服トシ日二三服用フ○或甘汞一分ヲ沙  
 糖十分ニ研和シ一分ヲ取テ數鼻中ニ吹テ嚏藥ト  
 シ微毒等ノ頭痛ヲ治ス○瀉下スベキ症ハ下劑ニ  
 加或其症ニ隨ヒ阿芙蓉龍腦幾那金硫黃ヲ加用ヒ  
 或失鳩答雙鸞菊等ノ越幾斯劑ニ加用フ○微毒淋  
 ハ甘汞ノ末ヲ大麥煎ニ溶化シ水碗ニテ尿道ニ注  
 入スル一日一兩次甚驗アリ○疥癬等一切瘡瘍惡  
 性ノ潰瘍ヲ乾愈スルニハ甘汞ヲ軟膏或脂油類ニ

研和ノ外敷シ或大麥煎ニ溶化シ洗藥トシ施スベシ  
 但預メ内服劑ヲ用ヒ其毒ヲ驅除ノ後乾愈スルニ  
 非ザレバ内攻ノ險症ヲ發ス○高燥ノ地ニ住人ハ  
 水銀劑ノ瞑眩少シ卑濕ノ地ニ住者ハ是ニ反ス○  
 甘汞ハ性緩ナル故ニ微毒深重痼滯シ諸症險惡頑  
 結セル者ハ全功ヲ收メ難シ○或云甘汞ヲ用テ大  
 ニ吐涎シ或烈キ下利腹痛ヲ發スル者アリ或膽液  
 腐敗ノ酷厲毒ヨリ發スル吐瀉病或神經熱等ニ奇  
 効ヲ稱スレ凡皆効ナクノ害アル者多シ

加羅薩兒 蘭 カロメラス 羅

**製法** 甘草ヲ取、細末トシ硝子壘ニ内レ沙火ニテ升煨スル一六七回或十回ニ至ル或云、八九回其質微透亮潔白或黄色ヲ帶ビ毫毛モ鹽様侵蝕ノ味ナク舌ヲ刺戟セズ。石灰水或酒石液ニ溶スト雖モ黄色トナラス或云、上好ノ甘草亦然リ是ヲ加羅蔑兒トス○右ノ如ク數升煨スルニ隨ヒ其性逾、緩和トナリ瀉下ノ効減メ發汗ノ効多シ

**主治** 此劑ハ性最緩ニメ微毒諸症ヲ治ス。故ニ患者虚弱ニメ峻攻ノ水銀劑ヲ投シ難キ症ニ的當トス○膠粘液、水様液ヲ稀釋シ諸管ノ壅塞ヲ開通シ微

毒ヨリ發スル腺ノ壅結硬腫瘰癧、便毒淋疾ヲ治シ其他總テ腺ノ壅塞硬腫ヲ疏解シ殊ニ肝ノ硬腫ヲ消散ス○疥癬、惡性頭瘡、經久潰瘍ヲ治シ虻蟲條蟲ヲ殺ス○解凝稀釋ノ峻効アルヲ以テ服量少許宛用テ内藏諸器ノ壅塞ヨリ發スル頑固經久ノ諸病ヲ治ス○飲食多ク噎塞シ或咽ニ下レバ必ズ吐スル症膈ニ是ヲ用テ間奇効アリ此症ハ胃管若ハ胃ノ諸腺、壅塞ノ頑硬結腫スル故ニ此藥ヲ用テ漸、其硬結ヲ溶解疏散スレバ嚙下ノ機轉故ニ復メ飲食梗阻セズ○經久ノ眼疾、内障殊ニ黑障ニ此藥少許

宛用<sup>レ</sup>テ奇効アリ。是<sup>レ</sup>眼中ノ筋膜細管ニ壅塞ノ凝結セル惡液ヲ稀釋ノ疏散スルニ因ル。○頑固ノ痛風。傷冷毒痛ニ此藥或甘汞少許宛用<sup>テ</sup>患部ニ凝結セル惡液ヲ疏解排泄ノ大効アリ或蘇甘沒扭<sup>ス</sup>或藥刺巴華爾斯<sup>ル</sup>ヲ加用<sup>テ</sup>殊捷効ヲ稱ス。○痙攣ノ運動ヨリ發スル疝腹痛ニ此藥少許宛用<sup>テ</sup>効多シ。○此藥二三<sup>ニ</sup>龍腦少許ヲ加用<sup>レ</sup>バ其揮發精微ノ氣ヨク此藥ヲ啓導ノ微細ノ脉管ニ竄行スル<sup>ト</sup>恰モ翅ヲ添ルガ如シ故ニ前說ノ諸病ニ殊効アリ。○此藥ハ利水ノ一良劑トス。水腫ニ少許宛用<sup>テ</sup>ヨク粘

衣停水ヲ溶解稀釋ノ小便ニ驅泄ス。下利多キ症ハ阿芙蓉少許ヲ加<sup>ベ</sup>シ但患者ノ天質病性起因ヲ考究ノ施<sup>ス</sup>肝要ナリ。○頭水ニ此藥ヲ内服シ規吉撒爾弗<sup>ヲ</sup>擦<sup>リ</sup>ニ<sup>ニ</sup>出<sup>ツ</sup>吐涎セシメテ大効アリ。水腫及腹水モ亦吐涎ニ因テ大効ヲ得ル<sup>ト</sup>近來名哲發明スル所ナリ。○服量六<sup>ニ</sup>五<sup>ヨリ</sup>半錢ニ至ル。或云十<sup>ニ</sup>五<sup>ヨリ</sup>若ハ十二<sup>ニ</sup>五<sup>ヨリ</sup>煉膏ニ和シ夜中臨卧ニ與翌日下劑ヲ用フ。○此藥金硫黃ヲ等分ニ加<sup>テ</sup>研和シ用<sup>テ</sup>血中ノ鬱毒惡液ヲ除キ峻効アル清血劑トス。依<sup>レ</sup>過<sup>ル</sup>矣<sup>ハ</sup>羅<sup>ハ</sup>白降汞<sup>ハ</sup>ウ<sup>イ</sup>テ<sup>テ</sup>子<sup>ノ</sup>デ<sup>ル</sup>ゲ<sup>ア</sup>ロ<sup>フ</sup>テ<sup>ク</sup>ウ<sup>イ</sup>ク<sup>蘭</sup>

製法

升汞

硃砂

各等分

右蒸餾水ヲ適宜ニ加テ溶化シ剝篤ハツト亞斯ノ灰汁製精  
 剝篤ハツト亞斯一ヲ蒸餾ヲ滴ノ其底ニ白末沈ニ微黃色  
 水十ヲニ溶ス汁  
 ヲ帶ルニ至テ其末ヲ取り蒸餾水ニテ淘洗シ紙上  
 ニ撒シ陰乾シ硝子壘ニ收ノ貯フ

又法

水銀

精製者

消石精

適宜〇國水銀六ヲ消石精

蒸餾水

二十ヲ

右水銀ヲ硝子器ニ内消石精ヲ滴シ加テ水銀盡溶  
 化シ澄清ノ液トナルヲ度トシ國煖處ニ置テ溶化  
國沙火ニ上セ溶

化ス水ヲ加テ攪和シ紙ニテ濾テ渣ヲ去リ別ニ蒸餾  
 水ヲ取十分一ノ海鹽ヲ加ヘ是ヲ右ノ液ニ滴シ加  
 レバ忽チ濁テ水銀其底ニ沈ニ白末トナル。逾其水  
 ヲ滴ノ水銀少モ沈マズ其液澄清トナルニ至テ徐  
 ヲニ其液ヲ傾ケ去リ其白末ヲ取テ水ニテ數洗ヒ  
 其水少モ鹹酸味ナキニ至テ其末ヲ取り紙上ニ撒  
 シ陰乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。〇此藥偽品  
 アリ。此未少許ヲ取テ炭火ニ投シ其質盡ク消散ノ  
 少モ殘ル者ナキハ眞品トス

主治

赤降汞ニ比スレバ性緩ニノ酷厲毒少シ。然レ



瀉下及湧吐ノ効アリ。微毒及粘液病ニ良驗アリ。長服スレバ吐涎ス。○此藥二匁ヨリ十匁マテ丸薬トシ用フ。或三匁ヲ砂糖九匁ニ研和シ毎日用レハ瀉利シ。或稍吐涎ノ細管及諸腺ノ壅塞ヲ開達シ粘稠液ヲ溶解シ疥癬類淋疾其他微毒ノ諸症ヲ治シ。蛇蟲ヲ殺ス。○此藥一錢ヲ取軟膏一匁ニ和シ外敷メ微侵蝕シ乾燥ス。疥癬類頭瘡疥瘡惡厲ノ潰瘍小胞癢痒等一切皮膚病ヲ消散ス。但頑固ノ疥癬類ハ内服劑ヲ用テ其毒ヲ驅除メ後外敷劑ヲ施スベシ。○面部鼻耳等ノ小胞膿腫乾癬汚斑汗皰等ハ此藥ヲ

糝顏料ニ加擦テ消散ス。○瘡疥乾癬等一切皮膚病ニ後方ヲ擦テ捷効アリ

治癬蕃薇膏

白降汞 一錢

家猪脂 二十匁

蕃薇露 五匁

蕃薇油 適宜

右研和ス

〔亞〕〔叔〕〔揭〕〔戾〕

赤降汞

メルキリウス。ペレシヒタ。タス。リュブリ。ロ。デ。子。デル。ゲ。プロ。フ。テ。ク。ウ。ク。蘭。

製法

水銀 精製者 消石精 各適宜

右水銀ヲ磁器ニ内徐々ニ消石精ヲ滴メ水銀盡ク消化シ澄清ノ液トナルヲ候ヒ硝子格兒弗ニ内兜ヲ

覆ヒ接際ヲ塗封シ承餾壘ニ水一二勺許ヲ内格兒  
 弗ニ接合シ其合際ヲ塗封セズメ爐ニ上初文火ト  
 シ漸火ヲ加煮沸ノ火候ト爲キハ其液乾固メ白色  
 トナル。是ニ於テ漸火ヲ増キハ消石精ノ蒸氣ニテ  
 曇タル格兒弗漸清澄ニメ透見シ其裏ノ藥料盡黯  
 赤色ノ光彩アル疑塊トナルニ至テ放冷シ格兒弗  
 ヲ毀テ其塊ヲ取出シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ此  
 卽赤降汞ナリ但火候極テ烈ケレバ復流動ノ故ノ  
 水銀トナル故ニ是ニ意ヲ用ベシ○此藥ハ消石精  
 ノ酸臭アル故ニ是ヲ陶埴ニ内煨過ノ絶テ消石精

ノ氣ナキニ至是ニ十倍ノ蒸餾水ヲ加暫煮テ終ニ  
 火上ニ於テ斃ヘイ甸テシ羅ロ僂ラ少許ヲ加へ微火ニ上セ  
 置フ一二時ニメ消石精ノ臭氣盡消スルニ至リ其  
 末ヲ取數温湯ヲ注テ淘洗シ陰乾ノ硝子壘ニ收固  
 封シ暗處ニ貯フ羅甸名「ヘイ」ダラルゲイル、スカル  
 シナチ、ス和蘭名「グウ」クオキセ  
 此劑ハ溶解スベキ酸收ヲ脫除スレ厄固ヨリ侵  
 蝕藥ナレバ多ク外敷ニ用フ○大抵水銀六勺ヲ以  
 テ赤降汞七勺許ヲ製ス技

又法

水銀精製者

消石精

各適宜

右水銀ニ消石精ヲ滴メ盡消化スルヲ度トシ磁鍋

ニ内<sup>レ</sup>煮熬ノ乾白ノ鹽塊トナルニ至リ研末シ硝子  
 ノ格<sup>コ</sup>兒弗<sup>フ</sup>ニ内<sup>レ</sup>爐ニ上セ漸<sup>ク</sup>火ヲ増<sup>ス</sup>キハ初<sup>メ</sup>蒸氣升テ  
 格<sup>コ</sup>兒弗<sup>フ</sup>曇ル者漸<sup>ク</sup>清澄ニメ透見シ殷紅ノ光澤アル  
 塊トナルニ至テ是ヲ取り硝子曇ニ收貯フ<sup>亞</sup>○此  
 藥ニ鉛丹ヲ加ヘ降<sup>レ</sup>煖ノ偽造スル者アリ其試法此  
 藥少許ヲ鐵匙ニ内<sup>レ</sup>火ニ上セ通紅ト爲セバ盡<sup>ク</sup>消散  
 ノ殘ル者ナキヲ真品トス。否ラザル者ヲ偽品トス。  
 或此藥ニ醋ヲ加ヘ微温火上ニ置テ其醋ニ甘味生  
 スルハ鉛丹ヲ加ヘテ偽造スル者ナリ

〔主治〕白降汞ニ比スレバ性峻ニメ多<sup>ク</sup>侵蝕シ酸收ヲ

含<sup>ム</sup>ト多<sup>ク</sup>ノ甚<sup>ク</sup>乾燥ス○<sup>亞</sup>徽毒諸症ニ毎日一二<sup>ニ</sup>瓦宛<sup>ク</sup>内  
 服ノ良驗ヲ稱ス○毎日四<sup>ニ</sup>瓦マデ用<sup>テ</sup>吐涎藥トス。  
 然<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>動<sup>カ</sup>モスレバ瞑眩甚キ故ニ是<sup>レ</sup>ニ燒酒ヲ加<sup>フ</sup>入<sup>ル</sup>ヲ  
 點<sup>シ</sup>焚<sup>ス</sup>ト三四次ニメ用<sup>レ</sup>レバ瞑眩セス○或一晝  
 夜ニ五<sup>ニ</sup>瓦マデ用<sup>テ</sup>良効ヲ稱スル說アレ<sup>バ</sup>間<sup>ク</sup>劇症  
 ヲ發スル故ニ多<sup>ク</sup>服スル<sup>ト</sup>稀<sup>ナリ</sup>○近來ハ服量少  
 許宛<sup>ク</sup>内服ノ經久<sup>ク</sup>徽毒諸症ニ峻効アル一藥トス○  
 半<sup>ニ</sup>瓦ヨリ二<sup>ニ</sup>瓦マデ制酸藥<sup>蝸</sup>蛸<sup>石</sup>ニ調和シ龍腦少  
 許ヲ加<sup>フ</sup>煉藥トシ用<sup>テ</sup>徽毒ノ咽喉腐爛ニ大効アリ  
 ○經久頑滯ノ徽毒諸症ニ左ノ丸藥殊効アリ

赤汞消毒丸

赤降汞 五匁 蒸餅心 沙糖 各二錢

右研和ノ九十丸トシ甘草末ヲ衣トシ三丸宛服ス  
ル一日三次九丸ニ赤降汞半匁ヲ含メリ。失苟兒陪  
苦ノ病ナキ人ハ右ノ服量ニテ害ナシ。若シ吐涎ノ  
候ヲ見ス片ハ此藥ヲ止メ下劑ヲ用ル一兩度吐  
涎ノ候ナキニ至テ服量ヲ減シ復用ベシ但水銀劑  
ノ瞑眩少キ人ハ右ノ服量ヲ倍シ或其餘モ用ベシ  
○頑固ノ黴毒ニ因テ肢體疼痛關節腫痛黴瘡潰  
瘍等ヲ發スル者ハ扶歇蘭度名後方大効ヲ稱ス

安質赤汞散

安質アツテモ沒扭ム護 二錢 赤降汞 一匁

右研合ノ細末トシ分テ八服トシ朝夕一服宛用漸  
服量ヲ加テ吐涎ノ候ヲ見スニ至リ。此劑ヲ休テ下  
劑ヲ用其候ナキニ至テ復用ベシ。又土茯苓サツサフ薩撒弗  
刺斯等ノ煎劑ヲ兼用スベシ○此藥外敷ノ侵蝕乾  
燥ノ功アレヒ升汞ニ比スレバ性緩ニシテ必モ疹ヲ  
發セズ黴毒潰瘍ヲ溶解シ化膿ノ藥トス。息肉水棉  
様ノ腐肉硬腫及瘡邊胼胝様ノ硬肉ヲ徐々ニ侵蝕  
消化ノ結痂スル輕キ腐藥トス○此末ヲ硬膏ニ摻

ケ貼シ或枯礬ヲ加テ摻貼シ或軟膏ニ和シ或蜜ニ  
 研合シ貼ス○此藥ハ峻腐ノ効ナシ多ハ拔實栗格  
 謨膏ニ加貼ノ黴毒潰瘍其他汚穢腐爛ノ潰瘍腐肉  
 惡厲ノ瘡瘍ヲ稍<sup>ヤ</sup>侵蝕ノ淨掃シ良膿ヲ釀<sup>ユ</sup>ノ治ス○  
 黴毒ノ脂肉様ノ潰瘍其他經久潰瘍ニ是ヲ摻<sup>カ</sup>ケ或  
 軟膏ニ和シ貼ノ淨刷シ治ス○此藥ヲ<sup>エ</sup>日多膏ニ  
 和シ枯礬少許ヲ加腺腫ニ貼ノ凝結ヲ溶解シ潰破  
 セシム○此藥ニ<sup>マ</sup>ヲ取蜜或軟膏一<sup>マ</sup>ニ研和シ瘰  
 癧腫其他腺ノ硬腫ニ擦<sup>ス</sup>バヨク溶化ノ焮腫シ終<sup>ニ</sup>膿  
 ヲ釀<sup>ス</sup>凡腺ノ焮腫ノ化膿シ難キ症ニ殊効アリ是

腺ノ凝固セルヲ溶解軟化スレバナリ鼻痔等ノ息  
 肉ハ日一次此膏ヲ塗<sup>ハ</sup>息肉少許死碎<sup>テ</sup>膿ヲ成シ  
 流<sup>テ</sup>治ス或惡厲頭瘡ニ毎夜此膏ヲ塗テ治ス但水  
 銀劑及下劑ヲ内服ノ其毒ヲ驅除ノ後外敷<sup>ヲ</sup>ベシ  
 或經久疥癬瘡疹類ニ塗テ治スル<sup>ト</sup>白降汞ニ勝<sup>リ</sup>  
 ○此藥ニ枯礬ト蜜ヲ和シ貼ノ潰瘍ノ胼胝様肉ヲ  
 消ス○頑固ノ焮腫眼及其膿流泄スル症或眼瞼赤  
 爛焮腫或角膜星翳膜翳等ニ此末ヲ患處ニ點シ或  
 家猪脂若ハ乳汁研和シ點ノ焮腫ヲ消シ翳膜ヲ咬  
 斷ノ治ス○赤降汞枯礬等分ニ研和ス是ヲ<sup>楚</sup>ヒ<sup>篤</sup>

**密瑤兒**

ト名ク疣贅息肉ニ摻テヨク消化ス但甚々惡厲ニノ癌性ノ息肉硬腫ニハ害アリ

**黃降汞**

「左ルベチム。ミ子ライレ羅」  
「ミ子ライル」  
「チルビト」又「ゲレペレ」シヒタイト蘭

**製法**

水銀 精製者 二弓  
綠礬油 四弓

右水銀ヲ硝子壘ニ内綠礬油ヲ加テ爐ニ上セ漸次ニ火ヲ加テ水氣ヲ蒸散スレバニ品自混和ノ白色トナル。終ニ武火トシ盡ク乾固シ少モ烟氣蒸升セザルニ至レバ雪白色トナル。是ニ多ク蒸餾水ノ沸湯ヲ加レバ「医」二十倍餘忽チ黄色ノ粉末トナル。是ヲ硝子白ニ寫シ湯ト共ニ熟研シ靜定ノ上清ヲ傾

ケ去リ數蒸餾水ニテ淘洗シ其水少モ味ナキニ至テ紙上ニ撒シ陰乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ「亞」此劑ハ右ノ如クヨク淘洗セザレバ綠礬油ヲ含ム故ニ腐蝕ノ性峻ニノ内服ニ用難シ

**主治**吐下ノ峻劑トス血中ニ入バ吐涎ス故吐下或吐涎ノ微毒ヲ治スルニ用フ○服量少許宛用レバ吐下吐涎ノ瞑眩ナク其効大抵白降汞ノ如シ○微毒頑固ノ諸症殊骨ニ侵襲スル症ニ用テ其毒ヲ變化シ治スル峻効アリ此藥ニ阿芙蓉等分ヲ加二丸ヲ一丸トシ日一丸宛用ヒ或日兩次用フ○微毒畢

丸腫ノ毒ヲ除クニ俾効アル一藥トス○壯實ノ人  
 微毒瘡瘍皮膚ノ諸症或腺ノ頑固ノ壅塞硬腫ニ奇  
 効アル藥トス又微毒淋疾ノ汚液流泄スル症ヲ治  
 ス○水腫其他經久沈滯ノ病ニ用テ間大効アリ○  
 服量一匁ヨリ二匁ニ至ル或六匁マデ用テ瞑眩ナ  
 キ者アリ然レ過用スレバ劇症ヲ發ス○此藥殺蟲  
 ノ峻効アリ後方ヨク蛇蟲ヲ殺シ大便ニ下ス

黃汞驅蟲散

黃降汞 五匁

葯刺巴末 二匁

沙糖 淨白者 一匁

右硝子臼内ニ研和シ散劑トシ分テ五服トシ朝夕  
 一服宛用フ(疾) (亞) (揭)

越揆屋布斯密涅刺列

羅ニ子ラールヒルヲ左レビト  
又クウクシルフルモル藪

製法 水銀 精製者

硫黃華 各等分

右硝子臼或石臼ニ内水少許ヲ加硝子杵ニテ熟研  
 シ水銀星ナクノ黑色トナルニ至ル(技) (亞)其他火氣ヲ  
 用テ製スル方アレレ皆良法トセズ

主治 性酷烈ナラズ臭味ナク内服ノ乳糜管吸收管  
 等ニ滲入セズ血中ニ運輸セズ故ニ吐涎セズ唯下  
 劑ニ加レバヨク瀉下ス發汗劑ニ加レバ汗及蒸氣

ヲ發ス○殺蟲ノ峻効アリ四匁ヨリ八匁マデ日兩  
次用テ蛇蟲ヲ大便ニ下ス或攝絲施那ト沙糖ヲ加  
用テ殊捷効アリ小兒ハ一匁宛用フ或云二三匁宛  
毎夜六七日モ用ヒ四日毎ニ下劑ヲ用レバヨク蟲  
ヲ下ス○惡厲ノ疥癬類頑癬腺ノ壅塞結腫惡性潰  
瘍等諸頑固ノ皮膚病ヲ治ス四匁ヨリ十匁若ハ二  
匁マデ沙糖ヲ加用フ○或云痛風傷冷毒痛痔痛ニ  
良驗アリ蒸氣ヲ發シ大便ヲ利ス日十五匁ヨリ二  
匁マデ用ヒ四日毎ニ朝夕下劑ヲ用ベシ○服量大  
人ハ六匁ヨリ十匁餘ニ至ル小兒ハ毎夜臨臥ニ三

匁ヲ與ヘ翌朝下劑ヲ用ベシ○下疳便毒等ノ水棉  
様ノ潰瘍ニ此末ヲ摻ケ或軟膏ニ和シ貼ノ乾愈ス  
○此藥一匁ヲ家猪脂三匁ニ研和シ疥癬乾癬禿瘡  
腺腫徽毒ノ結腫痔痛ニ擦リ或下疳惡性潰瘍水棉  
様ノ腐肉ニ貼ノ消散ス○或云此劑ハ内服ノ消化  
セズ大便ニ瀉下スル故ニ良驗ナシ或云吐涎スル  
トアル故ニ外敷藥トシ施スベシ布揭 依  
**越扶屋布斯安質沒扭**  
**製法** 安質沒扭三匁 硫黃二匁  
水銀精製者 四匁



右石臼内研和シ黒末トナリ水銀星ナキニ至ル  
主治 越扶屋布斯密涅刺列ト同シ

斯微旬藥酒方

製法 升汞 十二匁 燒酒 或麥酒 二比

右研和シ硝子壘ニ内レ固封シ升汞盡ク烱化スルニ至テ聽用ス

主治 斯微旬スワイエン名此劑ヲ製シ一切微毒諸症ニ用テ奇効ヲ見シ人ヲ救テ算ヘ難シ獨シ都ド國ノ病院ニテ此劑ヲ施ス一八年其間ニ微毒全治セル者四千八百八十人ニ及ベリ皆是ヲ用テ吐涎セズ治ス

ル一吐涎スル者ニ勝レリ是ヲ用テ効ナキ者ハ吐涎法モ効ナシ○此劑朝夕一匙宛用フ是ニ由テ升汞ノ量毎日半匁ヲ服ス虚羸ノ人及失苟兒シケルボーク陪苦病アル者ハ此服量ニ堪ザル一アリ○患者壯實ニノ其毒頑固諸症險重ナルハ朝夕一匙半宛用ベシ是ニ由テ惡症仍減セザル者ハ二匙宛與ベシ或升汞ノ量毎日三匁ヲ用テ瞑眩セザル者アリ○此劑ヲ服ノ後每次大麥煎一匕ニ乳汁四匁ヲ加テ用ヒ且是ヲ日常ノ飲料トスベシ乳汁ナキ片ハ葵根二匁ヲ取、水八匁ニ煎ノ半ヲ減シ甘草屑一匁ヲ加、濃テ

服スベシ又土茯苓サツサフラス薩撒弗刺斯ホツクホウ朴窟福烏篤トノ煎劑  
ヲ兼用スベシ○徽毒ノ諸症險重ナラザル者ハ此  
劑ヲ用テ三週ミマニシテ治ス沈痼頑滯ノ症ハ久服ノ漸  
治ス一兩年連服スト雖モ害ナシ○徽毒既ニ血脉  
神經骨節ニ侵襲ノ惡症ヲ發スル者モ此劑ヲ用レ  
バ吐涎セズノ全治ス但製法服度法ノ如クナラズ  
飲食ヲ節慎セザレバ吐涎スルコトアリ若吐涎ノ候  
アルキハ速ニ此劑ヲ止隔日ニ下劑ヲ與ヘ十日許  
ヲ經テ吐涎ノ候ナキキハ復マタ此劑ヲ用ベシ○此藥  
ハ汗ト小便ヨリ病毒ヲ排泄ノ治ス瀉下スル者ア

レ稀レナリ○多ク蒸氣ヲ發セント欲セバ此劑ニ  
龍腦六分ヲ研和シ用ベシ甘味ヲ好者ハ麗春花舎  
利別一弓ヲ和スベシ○患者食禁ヲ守リ起居冷氣  
ヲ避ケ温煖ニ保護スレバ治スルコト速ナリ○癩瘡  
腐骨疽ヲ兼ル潰瘍ハ此劑ヲ布片ニ蘸ヒタメ貼シ縛帶  
ヲ施スベシ○燒酒ニ堪タガル人ハ適宜ニ水ヲ加用  
ベシ服シ易クノ瞑眩セズ小兒婦人及孕婦ト雖モ  
害ナシ或前説ノ煎劑ニ加服シ或葡萄酒或麥酒ニ  
テ此劑ヲ製シ用ヒ或升汞一分ヲ適宜ノ藥露ニ弓  
ニ研和シ右ノ藥酒方ノ如ク用ベシ○升汞ノ氣ヲ

惡ム人ハ升汞ヲ蜜或舎利別ニ研和シ用フベシ或  
此劑ノ味ニ堪ズノ久服スルヲ能ハザル者ハ左ノ  
方ヲ用ベシ

溶汞舎利別

ソルチヲメル  
モリアリス蘭

升汞

患者ノ體質感動ノ多少ニ隨ヒ  
六分ヨリ十二分ニ至ル

水

二比

覆盆舎利別

適宜

右升汞ヲ硝子臼ニ内水少許ヲ滴シ研和ノ溶シ硝  
子壘ニ内水二比ヲ加能攪和ノ紙ニテ漉シ其液ニ  
覆盆舎利別少許ヲ調和シ貯此劑朝夕二錢宛取大  
麥煎一茶碗ニ和シ服ス三日許用テ患者其味ヲ惡

マズ胃ヲ妨ザル片ハ朝夕四錢宛三日服シ是モ亦  
妨ザル者ハ四錢宛日三次服シ七日ニ一兩次下劑  
ヲ與毎日大麥煎土茯苓煎等ヲ飲料トシ多服スベ  
シ羸瘦スル者ハ大麥煎ニ乳汁ヲ加用ヒ或雞肉煮  
汁ヲ與ベシヨク蒸氣及小便ヨリ病毒ヲ排泄ス又  
時々下劑ヲ用吐涎ヲ防ベシ小兒ハ升汞ノ量半ヲ  
減シ此劑半錢宛乳汁ニ和シ朝夕用時々下劑ヲ兼  
用スベシ是ヲ用テ諸症荏苒タル者ハ尚服量ヲ加  
ベシ但諸症漸快復スト雖モ數日此劑ヲ服セザレ  
バ再發ス徵毒頑固深重ノ症或徵瘡潰瘍等此劑ニ

テ治シ難キ者ハ吐涎ナキ擦膏法前ニヲ兼用スベシ  
 骨腫。腐骨疽。骨痛。頑滯ノ便毒等。擦膏法ヲ施ノ効  
 ナキ症ハ此溶汞劑ヲ兼用スレバ治ス羅此劑ヲ用  
 テ眩運ヲ發スル者ハ斯微旬藥酒方ヲ用ベシ○或  
 云。斯微旬藥酒方ハ升汞ノ性酷厲ニノ燒酒亦悍烈  
 ナル故ニ調製ノ宜ヲ得ズ。且升汞多ク器底ニ沈テ  
 渣脚甚酷烈ナル故ニ舍利別少許ヲ研和シ用テ尤  
 効アリ或後方ヲ用ルモ亦良

銀香水

升汞

三匁

苗香水

六匁

過爾託亞舍利別

一匁

右研和シ朝夕一匙宛飲液一盞ニ加ヘ服ス。又土茯苓。  
 薩撒弗刺斯。朴窟福烏篤等ノ煎劑ヲ多ク兼用シ  
 冷氣ヲ避ケ温煖ニ保護スベシ○扶歇蘭度名左ノ  
 丸藥ヲ製メ斯微旬藥酒方ニ代用シ大効ヲ稱セリ

升汞丸

升汞

六匁

蒸餅心

沙糖

各適宜

右升汞ニ蒸餾水ノ沸湯少許ヲ濕メ泥ト爲シ蒸餅  
 心ト沙糖ヲ適宜ニ加搗和メ百八十九丸ト爲ス。三十  
 丸ニテ升汞一匁ヲ含リ此丸藥ハ内服メ速ニ溶化ス。

尋常ノ糊丸ハ乾固スレバ内服ノ速ニ溶化セズ直ニ  
大便ニ通泄スル故ニ十分ノ功ヲ爲シ難ク或胃腸  
ニ停滯ノ一頓ニ溶化スレバ劇諸症ヲ發ス○微毒  
諸症ニ左ノ丸藥効驗切實ニノ少モ損害ナシ

鹼汞丸

升汞 十八分 白石鹼 四錢

大黃 二錢 麗春花舍利別 適宜

右研和シ三分ヲ一丸トシ朝夕三丸宛服ス。每次大  
麥煎或沙糖湯一碗宛用ベシ此劑ハ石鹼ニ含ル亞  
兒加利鹽ヲ以テ升汞酸性ノ酷厲毒ヲ剋制スル故

ニ服量稍多シト雖モ惡症ヲ發セズ○升汞劑ハ  
潛結頑滯セル微毒及瘡瘍類ニ少許宛用テ殊効ア  
リ服量初ハ十六分分ノ一ヨリ八分分ノ一マデ日  
一服宛用ヒ漸加テ半分若ハ其餘ニ至ル若吐瀉腹  
痛ヲ發スル片ハ桂橙皮龍腦阿芙蓉等ヲ擇加ベシ  
○或升汞四分分ノ一ヲ一服トシ乳汁ニ研合シ每  
日兩次一服宛用テ微毒諸症ニ良驗ヲ稱ス。又乳汁  
ヲ兼用スベシ是滋養内托ノ功アルノミナラズ腹  
痛等ヲ發スル害ナシ○升汞劑ハ表裏諸器ニ頑凝  
潛結セル病毒ヲ疏解ノ轉移變化シ表發ノ蒸氣ヲ

開達シ津唾大小便等ヲ進輸スル故ニ經久頑固ノ病ニ間奇効アリ但服量少許ニメ久服スルヲ佳トス假令バ升汞二匁ヲ接骨木子昆設爾弗三匁ニ研和シ分テ二十服トシ日一服宛用ルカ如シ或升汞一匁ヲ水一匁ニ研和シ此水一錢ニ舍利別少許ヲ加分テ三服トシ日三次ニ服スル等ナリ○或云升汞ハ極テ酷烈ニメ害多キ故ニ妄ニ内服スルト勿レ但微毒ノ諸症劇盛ニ至リ或其毒深ク根抵ヲ結テ滋蔓增長セル症ニ尋常ノ緩劑ヲ投スレバ逾増劇ノ撲滅スベカラズ故ニ少許宛升汞ヲ用テ侵刺

衝動シ其頑結セル毒ヲ轉移變化ノ捷効ヲ得ベシ然レ一旦効驗ヲ得ルハ是ヲ休テ緩性ノ水銀劑ヲ與全功ヲ收ベシ○或云升汞劑ヲ用テ間惡症ヲ發シ或一旦治スレレ再發ノ險症トナル者アリ故溶汞水ノ諸劑ヲ用ベシ升汞劑ニ比スレバ甚侵蝕セズ惡症ヲ發セズノ良驗アリ即後方ノ如シ

溶汞水

水銀 精製者 消石精 各適宜

右水銀ニ消石精ヲ滴シ加テ溶化シ澄清ノ液トナルヲ度トシ此液二十四滴ヲ取テ蒸餾水一匁ニ和

勻シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ○服量患者ノ強弱ニ隨ヒ定メ難シト雖モ大抵毎日朝午後夜分ニ二十一滴宛服ス若シ下利腹痛等胃腸ノ症ヲ發スル者ハ服量ヲ減スベシ壯實ニモ感動必キ人ハ三十滴ヨリ漸ク加テ八十滴マデ服メ害ナシ又毎日多ク大麥煎ヲ服スベシ(依)○左ノ方モ亦良驗アリ

**暹爾託亞溶汞水**

溶汞水 上ニ出 十四滴

接骨木花水

半北

暹爾託亞舍利別

一弓

右調勻ス感動甚キ人ハ半匙宛日三次服ス是ニ由

テ毎日溶汞水一滴半ヲ服ス感動少キ人ハ毎日一匙宛三次服ス其餘ハ患者ノ堪ルニ隨加ベシ。虚弱ニノ感觸甚キ人ハ嘔吐或下利スルヲアリ。此症ハ緩和劑驅風劑或阿芙蓉劑ヲ加用ベシ(依)○左ノ方簡易ニノ且殊効アリ溶汞水ノ諸劑ニ代用ノ良

**赤汞水**

メルモリウスニットラチス羅 アルト  
イエンデサルペートルシユレクウイク蘭

赤降汞

三弓

消石精

四弓

右赤降汞ヲ取徐ニ消石精ニ加硝子壘ニ内固封シ慢火ニ上能溶化ノ硝子壘ニ收メ貯フ服法溶汞水ノ如シ○此液ニ蒸餾水一北ヲ調和シ徽毒ノ無

花果狀ノ息肉等ニ外敷ノヨク消散ス〔依〕○感動甚  
メ溶汞劑ノ衝動ニ堪ヘザル者ハ左ノ丸藥ヲ用テ  
良驗アリ

〔溶汞丸〕

溶汞水

八十滴

蒸餅心

沙糖

各二錢

右研和ノ八十九トシ朝夕一丸宛用〔依〕フ感動少キ人  
ハ漸加テ三四丸マデ與ベシ。此劑ハ沙糖アル故ニ  
乾固ノ溶化シ難キ等ノ患ナシ〔依〕

遠西醫方名物考卷三十四終



