




麻疹約説

全

ヤ 9
877



明中武
447
卷877

角洲加古先生著



麻疹約說

復生館藏

麻疹約說引外語曰

享和癸亥夏四月麻毒稍行于
京畿時余在京數年兵適歸省
於鄉里後五六日遂發疹而吾
妹亦繼焉是為近邑麻疹之嚆
矢後十數日復發於西隣月餘



麻疹約說

而延蔓于四方土人以余新自
京歸與麻之先痊也舍邑鑿而
請治于余者蓋數百人矣夫麻
毒之流行也大率間二十有餘
年以故青年之醫身先羅此邪
毒則何遑救佗諺曰老鑿善治

麻非虛語也往者余之遇此毒
也時齒僅二十有五就使學博
伎精而識膽未壯况質性愚鈍
學術淺短奚能望人之信我乎
然而獲治麻疹如斯之多不亦
竒遇乎古人有言曰遇與不遇

者天之命也夫天既已假過於
我吾豈得默然而止乎故嘗命
門人田中君實使錄往日一得
之愚名曰麻疹約說頃君實將
謀上之梓請余一言焉余曰舍
旃誓二之言以示塾子云爾豈

敢取笑於大方生曰否也運逼
期迫災疹之發近在目前救之
之術宜急講而預備焉且也秀
安向與浦山六甲謀既屬之於
剗剗氏不可中輟也六甲亦憊
漚而不止余不能拒也遂援筆

而書焉
文政辛巳仲冬上浣
阿波 加古壽君齡甫識于
浪速僑居雲松菴



麻疹約說序

君實田中君吉備板倉
君實負如篤志力學以備其
業有年小茲矣君實不自
假滿唐辰去來此土受業
於角洲加古先生門蓋以弘

其道也余素與角洲親善
因以屢乞君實故悉之平生
與君實一日携麻疹論說書
一編來示余曰是吾角洲
先生嘗取口授而秀安之師
受也余取而閱之確乎其論

粹乎其方博取精擇言之
益于後進不少矣余亦嘗
在江都治疹子百數人而
不見其竊取有所論著而未果
覽其編與余之舊見如合符
節而君實之功亦勤矣皆可

喜也田劬君實刻而問諸世
君子其必多首肯余言者矣
文政辛巳仲秋既望

浪美曾生浦山信重俊菴謹
撰于博勞第三街六甲堂



附言九則

凡藥方體用備ル者多々ハコレ聖代ノ遺方ニメ一方能
百病ニ活用スベシ其體モナク用モナキ者皆コレ俗
方取ルニ足ルナシ此編ニ載ル所ノ方多クハ聖方ニメ
機用神出能百病ニ應ズ讀者一傷寒ヲ治スルノ方
トナシテ見過ルヲ勿レ

方藥皆君佐ノ序アリ本ヨリ古來相傳ノ事ナリ知サ
ル者ハ安リニ云フ麻杏甘石湯方ハ麻黃湯方中ニ
桂枝ヲ去石膏半兩ヲ加フト是古ノ方意ヲ解セ
ガレハナリ夫麻黃湯ノ麻黃杏仁ト麻杏甘石湯

麻疹終論

ノ麻黄杏仁トハ分量自ラ異ニメ君依體用各差別アリ。豈翅ユレノミナランヤ凡テノ聖方モ亦復然リ。思ハサレバ有ベカラス。

分量水率ハ其大概ヲ示スノモ若病重ケレバ則チ藥量モ亦重ルベシ夫小兒ノ如キハ藥量大抵大人ノ半ナルベシ水率モ亦之ニ準ス但シ病重キ者ハ時ニ臨テ宜シク處置スベシ。

紫丸ヲ用フル小兒二三歳大抵二三厘ヨリ五六厘五七歳ナレハ五六厘ヨリ七八厘十歳内外ヨリ十三五歳迄八九厘ヨリ一分五七厘或ハ二分ニ至ルコレハ

是平常ノ論ナリ其危急ノ時ニ當テハ臨機應變人處置其人ニ在ンノ

凡ソ丸藥皆丸吞ニスベシ控涎丹ハ峻下ノ藥小兒ハ一二分ヨリ三四分大人ハ五分ヨリ一錢ニ至ル

是モ亦其機ニ臨ンテ斟酌アルベシ

俗医大黃芒硝ヲ目メ峻藥ト稱スユレ墨ミタル本艸ノ浮説ニ感ヘルヲ妄言ナリ夫硝黄ハ瀉藥中ノ最平穩ナル者ニメ内熱秘結ヲ苦シム者平生之ヲ長服メ可ナリ況ヤ石膏性頑鈍何ゾ之ヲ忍レ且尊一ン世間ノ医礬石礬石ノ良能ヲ舍テ徒ニ頑鈍

ノ石膏ヲ。且恐レ且尊ム者一向謂レナキニ似タリ蓋
 シ石膏頑鈍ノ物。雖レ能伏熱ヲ解ス譬ハ大青龍ノ
 表ノ鬱熱白虎ノ裏ノ伏熱ノ類ノ如キ各分量ノ體用
 ニ因テ之カ能ヲ異ニス冀クハ幼學ノ徒此理ヲ意
 ニ會メ季世ノ弊風ニ偃テ勿レ。
 虛名無實ノ藥トハ譬ヘハ勞カ感寒ノ証ニ益氣湯ヲ
 用ユルハ蓋シ人參黃芪柴胡等カヲ合セテ虛氣ヲ
 鼓舞シ邪熱ヲ解セン意ナルベシ然ルヲ補中益氣
 ノ四字ニ眩シテ諸般ノ病悉ク先元氣ヲ補ヒ榮衛
 ヲ調フル時ハ則チ邪自ラ去ン者ソト想像メ之ヲ
 想像メ之ヲ

信用スル類ヲ云フ其餘四君大補歸脾滋陰等皆
 方名ニ眩メ真實ノ方術ニ疎ク或ハ葛根黃表ノ
 能アル者ト心得テ外麻葛根芍藥ノ三味ヲ以テ
 邪毒ヲ升提發散セン一ヲ廢幾スルノ徒之ヲ盲
 医ト云フ此盲医ノ押テヘテ信用スル體モナク用
 モナキ方劑之ヲ虛名無實ノ藥ト云フ本ヨリ葛
 根外麻黃芪人參芍藥等之ヲ目メ云フニハ非ス但
 妄リニ臆ニ斷メ組ミ合セタル一方藥ヲ云フノミ
 此編多クハ方ヲ傷寒論ニ取ル夫傷寒論中ノ方多ク
 ハ是聖代ノ遺方ニメ医藥コレヨリ尊キハナン唐宋

本草綱目

付三

ヨリノ以降唐山モ倭モ一般ニ只仲景ヲ尊テ其
本来ノ尊ムベキヲ知ラスコレ方藥ノ體用ヲ知サル
カ為ノ故ノミ蓋シ仲景氏ハ古代ノ遺方ヲ集テ
一傷寒ヲ治スルニ取レリ故ニ論中大半其用ヲ説
ノミ吾邦六十年來古方ヲ主張スル者之シカ
ラスト雖也而モ其末用ニ眩シテ其本體ヲ曉テス
故ニ其方用モ亦尺附會妄誕ニワタル獨リ吾角洲
先生ノ聖方ヲ御スル其本體ヲ明徴ス故ニ枝用
隨テ自在ナリ其委曲ヲ知ント欲セハ則先生著ス
所ノ醫方體用及ヒ傷寒論系傳ニ就テ之ヲ求ノ

ハ自ラ彰クタラン

愚俗ノ言ニ安永年中麻疹流行ノ時天下一般升麻
ヲ推重シ之カ聖藥須臾モ闕ベカラザル者トノ初
中後單ニ之ヲ頻服セシメシ故ヲ以テ病者之ガ為
ニ警音トナリシ者勝テ數ヘ難シトコレ野人ノ鄙
語本ヨリ論ナシ然レモ亦以テ愚医ノ心ヲ翻スニ
足レ夫医聖ノ升麻ヲ使用スルヤ必ス上部ノ毒
ニ於テス然ルヲ后世班疹ヲ見レハ則チ必ス之ヲ
主用シ且殊ニ痘麻ノ二病ニ於ル升麻ナケレバ治
方ナキガ如ク思ヒ惑フ一愚ノ甚シキ哉是ニ由テ

之ヲ觀レバ所謂升麻ヲ類服メ盲目トナリレ者
多シトノ妄誕モ亦以テ彼カ偏執ヲ矯ルニ足ン夫
麻毒ノ初起ノ治法タル專ラ透達齊ヲ主
トス然ルヲ反テ上部ノ毒ヲ制スル事ヲノミ事ト
メ以テ之カ透達ヲ望ム氏豈得可ンヤ故ニ其毒
荏苒トメ除キ去テ能ハス遂ニ餘毒口眼ニ滲シテ
走馬疳ヲ發シ或ハ失明トナリ或ハ耳聾トナル
者壹ニコレ皆治術ノ粗ナルト藥方ノ難ナルトニ由
ルノミニメ升麻コノ毒ヲ上部ニ升提メ然ラシムル
ニハ非ルナリ

麻疹約説

角洲加古先生口授

友人浪速浦山信重交甫校閱

門人吉備田中秀安君實編輯

夫麻疹ヲ論スルノ方書前哲往々著述アリ雖トモ
只其一端ヲ舉ルノミ獨薛氏カ證治準繩及張氏
カ醫通ニ至ツテ其論預ジメ爰ニ備ル然リト雖トモ
亦只季世ノ弊風ニ偃シテ正治ノ方術ニ疎ク白
虎兼氣ノ要タルヲ知レ而モ五行ノ空理ニ泥ミ

テ更ニ又虚名無實ノ方劑ニ溜スルニ至ル往昔ニ
 吾角洲先生門人小子ヲ會メ麻疹ノ治方ヲ論
 ス凡ソ疹子ヲ舉ルノ書悉ク取テ以テ之ヲ講究シ
 其違ヘルヲ辨シ其誤レルヲ正メ以テ之ヲ面命口授ス
 秀安モ亦興ル因テ其說ヲ悉ク筆記シ遂ニ積テ一
 卷トナシ題メ麻疹約說ト名ヅクコハ彼前哲ノ長ヲ
 取り短ヲ舍テ且私見ヲ加テ其論說ヲ簡約ニメ
 以テ正治ノ方術ニ便ナラシメント欲スレハナリ往昔
 享和壬戌春ヨリ夏ヲカケテ風魔海内ニ行ハル其
 翌季春ヨリ仲秋ニ至テ糠瘡天下ニ流行ス今

歳仲春ヨリ初夏ニ至ル迄風魔行ル一宛モ往昔
 ノ壬戌ノ時ト同證一致ス是ニ由テ之ヲ想ハハ麻
 毒ノ流行亦遠キニ在シ夫麻疹ノ流行スルニ當テ
 ヤ老醫大家諸先生數百ノ診治ニ奔走メ寸隙分
 間ナキ時ハ則チ窮人貧民ノ徒之ガ診治ヲムニ
 由ナク而モ人情醫藥セザルヲ能ハス己ヲ得ヌメ
 導引家鍼醫及ヒ藥老店ノ奴僕等ニ藥ヲ乞彼其
 措所ヲ恣ニニメ妄リニ參獲敗毒化斑解肌瀉白
 導赤三豆益元等虚名無實ノ鈍藥ヲ暗投シ揚ミ
 トメ罪ヲ冥々ノ中ニ作テ終ニ自ラ之ヲ諭ラサルニ

至ル故ニ古傳ニ曰ク。天下^{イツサイ}一齊^{マドク}麻毒^{リウカウ}流行^メノ死^シ殤^{マク}スル者^{イクミン}幾^イ萬人^トトコレ此^{コノ}三人^ノ者^テノ手^ニ殤^シスルニ非^{アラズ}メ何^{ナニ}ゾ以^{コノ}故^ニ遷^ニカニ此^{コノ}書^ヲ梓^ニ彫^テ之^ヲ世^ニ公^ニニセシト欲^{ホク}ス本^{ヨリ}哲^テ匠^シ名^マ師^イ諸^シ先生^ニ告^ツントニハ非^{アラ}ズ只カ^ノ醫^イ理^リニ暗^クキガ妄^ミリニ人^ノ虚^キニ乘^ジメ刀^ヲ圭^ヲ糊^シ口^ノ為^ニ弄^シ或^ハ虚^ニ名^無實^ノ方^劑ニ淫^イ惑^スルノ徒^ニ且^ツ論^シ且^ツ誨^テ以^テ其^弊ヲ矯^ン一^ヲ度^シ幾^キスルノミ。

允^{オヨ}ソ醫^イ其^年五十^{以外}ノ者^ハ往^昔享^和三年^麻疹^{流行}ノ時^ニ當^テ其^年三十^有餘^{ナル}バ則^チ親^シク

術^チニ試^テ其^治理^ノ大^抵ヲ會^得セン然^レハ則^チ再^度流行^{セン}時^ニ當^テ其^治術^且精^シカルベシ五^十以^内ノ輩^ハ親^シク之^ヲ術^ニ試^ミシ者^世ニ稀^ナルベシ况^ンヤ四十^{内外}ノ徒^{其實}地^ヲ踏^ミ其^真面^ヲ知^シ者^殊テ鮮^{カル}ベシ蓋^コノ病^{二十}有^餘年ヲ間^テ流行^{スル}者^{ナレ}バ假^令其^實地^ヲ踏^ミ者^ト余^レ亦^只今^ニ於^テ夢^ノ如^ク幻^ノ如^クナランモ知^ルベカラズ何^ニ况^ヤ其^實ヲ踏^ムス真^ヲ知^{ザル}輩^ニ於^テヲヤ然^リ而^レ其^真實^ヲ知^リ得^ルニ道^{アリ}苟^モ之^ヲ得^ル

時ハ則萬病ノ治機悉ク我ニ備ルツレ悉ク我ニ備
ハル時ハ則心術コ、ニ明カナリ苟モ治機我ニ備
ハリ心術ユ、ニ明カナル時ハ則將何ヲカ求メ
曰歌人ハ居ナカラ名所ヲ量ルト是ナリ曰ク其道
ヲ得ルノ法如何曰ク學問ナリ古ニ曰ク人トモ恒
ナクンバ以テ巫医ヲナスベカラスト恒トハ則子學問
ナリツレ苟モ恒アラシ人ハ群書ニ涉リテ常ニ之
ヲ心ニ印シ以テ預シメ不虞ノ備トナス故ニ其術
煉レ其方中ツテ衆庶ノ疾災ヲ救フニ足ル何ニ
況ヤ一麻疹ノ治術ニ於テヲヤ然レ氏其道ヲ得

ルニ術アリ其術ニ從フ時ハ則之ヲ得從ハサレハ則
違フ術トハ何ゾ曰ク學問ノ序ナリ其序トハ先
傷寒論ヲ研究シ後次々茅々ニ古方書ヨリ以テ
晩近ノ書ニ至ル追之ヲ論定シ且餘カアル時ハ
聖經及ヒ百家ノ書ヲサヘニ窺ヒ得テ專ラ裁道
ノ羽翼トナルヘキ事ヲ記臆シ卓爾トメ一家ノ見
ヲ建ツコル之ヲ道ヲ得ル者ト云フ如斯ナル時ハ凡百
千萬ノ病未ダ其實地ヲ履ズト雖一ハ心目ノ
間ニ瞭然タラン詩曰不怨不怠率由舊章ナリト
抑夫之ヲ謂フカ若夫恒ナキノ輩ハ居恒只嗜欲ニ

蘇參約說

曰

耽^{フケ}リ奮^{キウシヤウ}章^{コト}ニ志^シナク。三^{サン}折^{セツ}ニ慮^{オモカ}リナク。一旦^{イツタン}麻^マ毒^{ドク}流^{リウ}
 行^{カフ}ノ時^{アタリ}ニ當^{アツ}テ。一^{イツ}ノ方^{ホウ}書^{ショ}ヲ袖^{ソデ}ニシ懷^{フトコロ}ニメ。其^{コノ}本^{ホン}ヲ
 審^シカニセズ。其^{コノ}末^{マツ}ヲ察^{サツ}セス。徒^ムニ無^ム實^{ジツ}ノ鈍^{ドン}藥^{ヤク}ヲ以^リテ
 之^ノヲ治^シセン。一^{イツ}ヲ庶^シ幾^クシ。偶^ニ一旦^{イツタン}目前^{メゼン}ノ快^{クワイ}ヲ取^ル
 モ。餘^{ヨドク}毒^{ドク}暗^{アン}ニ經^{ケイ}絡^{ラク}臟^{サウ}腑^ブニ瀰^ミ淪^{リン}メ。遂^{ツヒ}ニ虛^{キヨ}勞^{ロウ}骨^{コツ}蒸^{シヤウ}
 痲^{カン}瘡^{サイ}等^{トウ}ノ後^{ノチ}患^ヰヲ釀^{カモ}シテ。終^{ツウ}ニ救^{クウ}ハレザルニ至^ル者。
 少^{シク}シトセズ。豈^{オア}慎^{シツ}マザル可^クケンヤ。古^コ人^{ジン}曰^ク。中^{チュウ}醫^イヲ得^{ドク}
 ルハ藥^{ヤク}セザルニサルト。况^{イハ}ヤ下^ゲ医^イタルヲモ得^{ドク}ザル
 ノ輩^{ハイ}ヲヤ冀^キハクハ青^{セイ}年^{ネン}未^ミ熟^{ジュク}ノ医^イ能^ネ心^{シン}ヲコ、ニ潜^{ヒツ}
 メテ。古^コノ聖^{セイ}哲^{テツ}ノ真^{マコト}ノ道^{ミチ}ニ本^{ホン}ツキテ。蒼^{ソウ}生^{セイ}ヲメ。此^{コノ}殃^{ガハヒ}

二^ニ殤^{シヤウ}セシムルヲ勿^ナレ。豈^ア翅^{タテ}麻^マノミナランヤ。凡^{ソク}ソ千^{セン}
 般^{ハン}ノ痲^マ難^{ナン}ニ大^{ダイ}補^ポ保^ボ元^{ゲン}等^{トウ}ノ。虚^{ソク}名^{メイ}無^ム實^{ジツ}ノ俗^{ソク}方^{ホウ}ヲ妄^{モウ}
 用^{ヤウ}メ。罪^{ツミ}ノ冥^{メイ}々^{トク}ノ中^{チュウ}ニ作^{ツク}ル事^{コト}勿^ナレ
 麻^マ疹^シハ是^{コレ}天地^{テンチ}時^ジ運^{ウン}ノ。疹^シ氣^キ熒^{ケイ}惑^{ワク}乱^{ラン}行^{カウ}ノ火^カ毒^{ドク}ナリ。而^{シテ}
 メ此^{コノ}氣^キ時^ジアツテ發^{ハツ}起^キスルヤ。先^マツノ人^{ジン}ニツク。而^{シテ}メ人^{ジン}
 ヨリ人^{ジン}一^{イツ}傳^{デン}ヘ家^カヨリ家^カニ染^シテ。天^{テン}下^ゲ一^{イツ}齊^{サイ}悉^{シツク}ク之^ノヲ
 病^{ヤム}ニ至^{イダ}ル。其^{コノ}猛^{モウ}烈^{レツ}ナル火^カノ原^{ゲン}ヲ燒^{ヤク}ガ如^ニク嚮^{カウ}ヒ近^{チカク}ツ
 クベカラズ。然^{シテ}レ氏^シ本^{ホン}ユレ外^{ガイ}感^{カン}傳^{デン}染^{セン}ノ病^{ヤム}ナレバ。其^{コノ}
 染^シサルニ先^マタチテ。之^ノヲ避^{サバ}レハ。道^{ミチ}レテ病^{ヤム}ザル者^{モノ}往^{イキ}
 コレアリ。痘^{トウ}瘡^{ソウ}モ亦^{モトク}復^{フク}然^{シカ}リ傳^{デン}ヘ云^フ。往^{イキ}昔^{セキ}

敏達天皇十四年。麻疹流行。後三十四年。百五十年。或ハ七十八年。六十二年。或ハ二十八。五十八年等ヲ經テ。此病海内ニ流行スト。近クハ寶曆癸酉春ヨリ夏ヲカケテ流行シ。後二十四年ヲ經テ。安永丙申春ヨリ夏ニ至テ流行シ。後二十八年ヲ經テ。享和癸亥春ヨリ秋ニ至ル。連流行ス。其年間定期ナシト。虫凡ツノ流行スルヤ一ナリ。是ニ由テ之ヲ見レバ。疹ハコレ非常熒惑疹乱ノ氣毒時運ニ由テ發起スルヤ著シ。

夫人ハ天地精醇ノ氣ヲ稟テ生ス。故ニ知覺運動萬

類ニ異ニメ。四端自然ニ其性中ニ備リ。而メ其感ニ從テ見ル。是乃チ所謂萬物ノ靈ニメ。人ノ人タル所以ノ者ナリ。蓋シ天地ノ廣漠ナル數種ノ異氣ヲ氣中ニ含蓄ス。人モ亦一小天地ヲ身ニ具メ。同シク數種ノ異氣ヲ天ニ稟ク。コレ乃チ天稟ノ毒ニメ。紅毛人ノ所謂丹馨氣ノ類ノ如キ。是ナリ。此毒ヤ常ニ深ク潜ミ匿レテ其所在ヲ知ラス。其一且天行疹乱メ。熒惑ノ妖毒外ヨリ之ヲ襲フ寸ハ。則チ天稟ノ固毒忽チ感應騷動スルニ至ル。譬ヘハ痘瘡麻疹。瘰癧胎毒ノ類ノ如キ。各ソノ毒ニ區別アリテ。痘ハ自ラ痘

ニメ麻ハ自ラ麻ナリ。今コ、ニ見アラシ。其胎毒甚シク。頭面及ヒ肢體ニ腐瘡有テ臭氣近ブク可ラサル者。時ニ偶痘瘡ヲ病ニ紅活稀女ノ輕証世ニ多シ。又徽毒ニ苦シメル者偶コノ麻疹ヲ病ニ順證至テ輕キモ多シ。是其毒自ラ彼ハ彼ニメ此ハ此ナル其區別ノ有バナリ。凡ソ病一發メ已者アリ更ニ再三病ムモノアリ。其一發メ已者ハ痘麻徽癰等ノ類ノ如キ。有形ノ毒ユレナリ。而メ癰ヤ徽ヤ其始漸次ヲ以テ主母ヲ積ナス。故ニ遲蔓日ヲ引症テ復發ス。コレ其毒ノ動靜ニ因テ然ラシム更ニ新ニ之ヲ病ニハ非ルニリ。

傷寒痢疾霍乱等ノ類ノゴトキ。其一旦本ニ復シ後又年月ヲ經テ再三之ヲ病者ハコレ乃チ無形ノ瘡癘更ニ復新ニ之ヲ傷冒スナリ。是モ亦一發ニメ已ト云フ者ハ妄ナリ。夫痘麻ノ如キハ其固有ノ毒ニ自ラ厚薄有テ人々各其輕重ノ差等有ト雖也。侷シクコレ有形疹乱ノ火毒一旦倏忽トメ人身ヲ襲ヒ侵スヤ直ニ天稟ノ固毒内應感發シテ目前ニ死生ヲ決ス精氣コレニ勝チ医藥之ヲ扶助スル時ハ則チ病毒瘡去テ再ヒ之ヲ病ナク若毒勢猛烈ニメ精氣之ガ為ニ敗レ潰一医藥モ亦差

誤スル時ハ則チ忽諸トメ斃ルニ至ルコレ瘧麻再
ビ病ガル所以ナリ。

麻疹ノ初テ起ルヤ必ス發熱煩悶大渴シ身杖ヲ被ル
カ如ク面腫目赤ク涕淚タタク屢咳嗽ス其輕キ者
ハ三四日或ハ五六日其重キ者ハ八九日ヨリ十三四
日ニ至テ發ス間コノ熱中昏睡メ人事ヲ知サル者
アリコレ危證ナリ又疹子悉ク透出シテ後熱仍
退カズ反テ煩躁スル者モ危證ナリ又正出ノ時煩
躁轉甚シキ者ハ邪毒内攻ノ患ヲ慮カルベシ又疹子
退キ身涼シク六七日ヲ經テ復壯熱スル者ハ餘毒

未ダ盡ガルナリ

疹子面部四肢ニ多ク出ル者ハ順ナリ腰腹胸背ニ多

ク出ル者ハ險ナリ其發スル胸腹ノ暖カナル処ヨリ

起リ漸ク胸腹腰背ニ及フ者

色ハ紅活ナルヲ喜ヒ形ハ尖リ聳タルヲ貴ブ若色黯黒

ニ又起リ聳ス大便秘結唇舌焦赤キ者ハ毒内ニ鬱

スルナリ若色白ク又肉地ヲ分タス但粘クトメ高ク

聳ヘ晬時ニ没スル者ハ輕毒ナリ又紅活忽チ變メ

白色トトリ煩躁腹痛喘咳氣急ノ者ハ内攻ナリ

甚シキ者ハ色黯黒ニ變メ救ハレザルニ至ル若紫赤

色ニメ黯ナルハ是酷毒熾盛ナルナリ。其項粒起スル者ハ猶生路ヲ疲幾スベシ。初發ノ間常ニ宜シク微汗スベシ。然ル時ハ肌腠疎豁ニメ邪毒透達シ易シ。但シ大汗セシムルヲ勿レ。恐ラクハ津液ヲ脱メ後患ヲ生セン。若シ熱シテ汗ナキ者ハ外邪壅滯メ透達シ難カラン。宜シク之ヲ峻發スベシ。然ラザレバ則毒内ニ蓄留メ遂ニ驚瀉瀉利咳血喘促痔瘻等ノ後患ヲ生メ救ハレザルニ至シ。

凡麻疹ヲ療ズル其初專ラ其毒ヲ肌表ニ透達スベシ。

乃チ葛根麻黃越脾大青龍最之ガ要藥タリ。然ルニ宋後ノ諸先生反テ之ヲ忌ミ憚カリ親シク之ヲ試ミズ。妄リニ曰。疹子初起專ラ升發スベシト雖氏亦大ニ汗スルヲ恐ル。若シ汗過多メ陽ヲ亡ス時ハ忽チ不測ノ變ヲ生セント。因テ此良方ヲ顧ミズ。妄リニ升麻玄參午房子檉葉蟬退殭蚕大青燈心竹茹石斛等ヲ一味配劑シテ。其毒ヲ盡サニ一ヲ度幾シ其輕証自ラ治スル者ハ已皆之ヲ痊セリト思フ。豈愚ナラズヤ。夫發汗ノ過多ヲ忌何ゾ。コノ麻疹ニノミ限ラン。蓋シ古人發汗ノ法ニ

於ル。覆フテ微シク汗ニ似タルヲ取ル。一時ハカリ。敢テ水ノ流漓スルガ如クナラシメサルハ是ソノ病ヲ治スルヲ事トメ。發汗ヲノミ事トセザレバナリ。然ラハ此發汗ノ過多ナルト否ラザルトハ唯医ノ方寸ニ在テ。藥方ノ與ル所ニ非ザルナリ。コレ葛根麻黄越脾大青龍等ノ方。本ヨリ古來相傳ノ聖劑ナリ。然レ氏此藥ヲ服スル法ニ隨ハバ則チ驗アリ。隨ハザレバ則チ益ナシ。法トハ乃チ覆フテ温メ粥ヲ啜ル等ヲ云フ若コノ法ニ從ガハス温メ覆ヒ或ハ熱粥ヲ啜リテ藥カラ助クルノ手段ヲ用ヒザル時ハ何ノ發汗

スル。之アラシク請看ヨ以上ノ劑ヲ服シ而モコノ法ニヨラザレハ一滴ノ汗スル。ナク。人參黄芪大黃芒硝等ノ劑ヲ服シ須臾ニ熱粥一升餘ヲ啜リ。温覆スル。一時ハカリナラシメバ發汗衣ヲ沾サン。心ズナリ。冀クハ初學ノ徒ヨク此實理ヲ明悟メ昧者ノ妄誕ニ惑フコト勿レ。

治方

麻疹初熱ノ時專發散ヲ要ス。苟モ發出シ盡ス時ハ則後患ナケン。其平易ノ證ハ葛根湯。浮萍湯。及ヒ敗毒劑等通用スベシ。發熱ノ時或ハ嘔吐シ

或ハ下利スル者ハ是毒内ニ逼ルナリ下利ニ論ナク葛根湯ヲ以テ其毒ヲ肌表ニ發スレバ則チ下利自ラ止ム若嘔スル者ハ葛根加半夏湯ヲ與フ可シ

葛根湯

麻疹初起發熱脈浮數ニメ鼻フサガリ汗無メ項背及ヒ身體強痛スル者主之○初起發熱咳嗽身乍チ涼シク乍チ熱スル者○咽痛テ發起シ難キ者葛根加桔梗湯至之葛根湯方内ニ

- 葛根 一匁
- 麻黄 九分
- 桂枝 六分
- 芍藥 六分
- 甘草 三分
- 大枣 六分
- 生薑 六分

右七味水ニ合ヲ以テ煮テハ勺ヲ取滓ヲ去温服ス覆テ微シク汗ニ似タルヲ取水ノ流ルカ如ク大ニ汗ヲ取コトヲ忌生冷粘滑五辛ヲ禁ス

麻黄湯

麻疹初起發熱頭痛身疼腰痛骨節疼痛惡風汗無メ喘スル者○初發壯熱汗ナク皮膚乾燥ノ喘咳スル者○初發風湿ニ感シ出ント欲メ出ル丁能ハス身煩疼スル者麻黄加蒼朮湯主之

- 麻黄 一匁
- 桂枝 六分
- 甘草 三分
- 杏仁 七分

右四味水ニ合ヲ以テ煮テハ勺ヲ取滓ヲ去温メ服ス温覆將息及ヒ禁忌一ニ葛根湯ノ法ニ同シ

大青龍湯

麻疹初起

頭痛壯熱身體疼痛汗出

煩躁スル者。○初起頭痛發熱身忽チ重ク乍チ輕キ

者。○發熱欬嗽渾身脹痛目赤ク淚多ク嘔吐メ大

便溏スル者。是麻疹ノ候ナリ。氣粗ク喘息シ。或ハ煩

躁寧カラズメ。疹子透スルヲ得サル者。コノ方毒

發スルノ神劑ナリ。宜シク

麻黃 一匁 桂枝 六分 杏仁 四分 生薑 六分

大棗 六分 甘草 三分 石膏 一匁

右七味。水ニ合ヲ以テ。煮テ八分ヲ取。滓ヲ去。温服

ス。服後一ニ葛根湯ノ法ニ準ス。○庸医妄リニ云

以上三方。傷寒外邪ニ宜シク。痘麻ニ宜シカラズト。コ

レ方意ヲ知サル者。ノ言ナリ。蓋シコノ三方ノ能タル

能肌肉中ノ邪毒ヲ發散ス。コレ古來相傳萬代不

易ノ良劑ナリ。医者其邪毒ノ輕重ヲハカリ。其宜シ

キニ處シテ。以テ病ヲ治ス。是古ノ道ナリ。然ルヲ徒

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻疹起發メ出テス。壯熱

咳嗽メ。渾身脹痛スル者。大青龍湯主之。若氣粗ク

喘息煩擾メ安カラサル者ハ。麻杏甘石湯主之。若

喘促劇シク。大便秘スル者ハ。滾痰丸三五分ヲ魚

用ス。若氣急息迫煩躁メ如何氏シ難キ者ハ先紫
 九ヲ權用メ其大熱ヲ奪ヒ去後此方ヲ與フル時ハ
 則安シ。○初起發散ノ藥ヲ服シ後喘咳甚シクメ
 汗出ル者ハ伏熱未夕解セザルナリ。此方主之。○
 初熱ノ時。咳嗽甚シクメ不止。上氣喘急。面浮目胞
 腫ル者。或ハ壯熱メ渴スル者。○編身青紫熱痛シ
 テ喘急スル者ハ危證ナリ。此方ヲ主トシ控涎丹滾
 痰丸ノ類ヲ兼用スベシ。或ハ紫丸ヲ以テ其急勢ヲ
 制スベシ。

麻黄 一匁

杏仁 五分

甘草 四分

石膏 二匁

右四藥水ニ合ヲ以テ煮テハ白ヲ取滓ヲ去温服ス
 麻出ント欲スル時ハ。則編身發熱或ハ頭眩シ或ハ煩

躁ス。其既ニ出ルニ及テハ。則チ身涼シク心爽ヤカニ
 メ。諸患悉ク解メ。是頃証ナリ。若疹子既ニ出テ熱
 退カス。煩躁仍止サル者ハ。コレ熱毒壅鬱スルナリ。
 先葛根湯青龍湯。及薄荷湯等ヲ選ビ用ヒテ。後白
 虎涼膈黃連解毒。大小柴胡湯等。證ヲ審カニ之
 ヲ選用シ。以テ其裏ヲ解ス

麻疹出沒大抵六時ヲ以テ準トス。假令ハ子ノ後夜九
 ニ出ル者ハ。午ノ時昏九ニ收ツサムル。午ノ後昏九ニ出ル

麻疹論

十三

者ハ子ノ時夜九時ニ収ヲサテル。是順證ナリ。其重キ者ハ出テ三四日モ収ヲサラザル者アリ。淳萍湯ヲ以テ之ヲ發シ盡スベシ

疹子ハシカ必ス五七日ニメ乃チ没ス。又三四日ニ不過スキズシテ化スルアリ。若三四日後點爛テンランメ色白ク。肌肉ノ間ニ隱シクトメ没シ難キ者ハ宜シク淳萍湯ヲ以テ之ヲ發解スヘシ。犀角消毒飲モ亦主之。

淳萍湯 發熱ノ初カイリク咳嗽噴嚏ハナセ鼻清涕ヲ流シ眼胞腫或ハ泄利。或ハ手ヲ以テ眉目鼻面ヲ搯オモモノコレヲ疹ノ候トス。此方主之。○麻出テ後一日或ハ半日ニメ

即チ没シ。周身ノ煖ダン所レタエテ紅影ニヤナキ者ハ終ニ危變シラ生ゼン。若早ク没スレ。周身處ニ尙未ナタ全ク没シ盡ツサハル者ハ此方主之。犀角消毒飲モ亦主之。○麻没メ後五七日ニメ發スルレ前ノ如ク。兩三次ニメ愈ユル者アリ。終始此方ニ宜シ。若咽痛ト者ニハ桔梗甘草ヲ加フ。

- 淳萍 一匁
- 麻黃 八分
- 荊芥 四分
- 防風 六分
- 川芎 四分

右五味水ニ合ヲ以テ煮テハ夕ヲ取。○此方痘麻癰瘍初起ヒツヤク必用ノ要藥ニメ。其能ヨク肉膜中ノ癩毒ヲ肌膜ニ運輸ス張子和曰ク癰風ヲ治スト其發

毒ノ能^ク豈^フ哉^レヲ^{子ム}欺^{カシ}ヤ。然^ルニ世^イ医^ノ之^ヲコ^ニ試^ス
ミ^ガル^者ハ蓋^シ不^レ知^ラナリ。

排毒劑 麻疹輕證通^シ用^ニ。

- 羌活 ^{ハカ}
- 茯苓 ^{ハカ}
- 枳實 ^{ハカ}
- 川芎 ^{ハカ}
- 桔梗 ^{ハカ}
- 甘草 ^{ハカ}
- 生薑 ^{ハカ}

荊芥防風ヲ加ヘテ。荊防排毒劑ト名ツル。

右水ニ合^テ以^テ煮^テ一合ヲ取^ル。○后世敗毒ノ名起^テヨリ諸^ノ腫毒ヲ見^レハ即チ必ズ敗毒散ヲ用^ユ。其方獨活ト羌活ト柴胡ト前胡ト枳實ト枳殼ト等ヲ重用^シ或ハ人參ヲ加^フ其煩碎突^フベシ往昔艮山後藤先生其猥雜ヲ除^テ更ニ此方ヲ製^ス。

凡毒腫斑疹之ヲ排發スベキ證ニナ之ヲ用ユベシ。

麻毒本ヨリ外来ノ冷氣其初人身ヲ襲^リマ邪毒駢^然トメ胸肺ニ侵入ス。故ニ咳嗽連声断^ガルニ至^ル夫咳スル時ハ毛竅開^ヒテ疹出易^ク毒發シ易^クユノ故ニ其末出^ザルノ前咳嗽ノ甚^シキ者ヲ善^トス。疹子透達シ火毒發散^メ效自^ラ止^ム。治方單ニ毒ヲ肌膜ニ驅出^シ盡^サン^テ要^トス。不知^者ハ每^リニ杏仁麥門五味子貝母桑白蘊子ノ類ヲ以^テ之ヲ止^ンテ^テ度幾^ス。是誤^リナリ。若疹子出盡^メ後咳嗽上逆^或ハ倚息^{スル}者ハ小青龍加石膏湯主^之。

小青龍湯 疹子已ニ出テ仍頭痛發熱メ效シ或ハ
 噎シ或ハ利スル者。○麻疹未ダ發セス熱甚シク乾
 咳連声或ハ煩悶メ渴スル者。小青龍加石膏湯主
 之。○麻後餘熱退カズメ喘咳シ或ハ瘡啞スル者
 此方主之。且痰痰丸三五分或一匙ヲ兼用スベシ。
 麻黃 六分 芍藥 六分 五味子 四分 乾薑 四分
 桂枝 六分 甘草 三分 半夏 六分 細辛 四分
 右八味水ニ合ヲ以テ煮ニ八分ヲ取。滓ヲ去温服
 ス。
 消毒飲 疹未ダ出ス或ハ已ニ出テ未ダ徧カラズ或ハ

咽痛ム者主之。若毒熾ニ咽痛甚シキ者ハ犀角
 消毒飲主之。本方ハ内ニ於テ犀角ヲ加フル。三五分ヨリ一匙ニ至。
 荊芥 八分 防風 一分 惡實 七分 甘草 二分
 右四味水ニ合ヲ以テ煮テ八分ヲ取。
 麻毒肌表ニ透出シ盡ス時ハ則チ後患ナカルベシ一
 種匾濁赤腫ヲナシ塊上平塌ニメ起發セサル者ア
 リ。又一序風毒ノ加チ徧高赤腫頭粒尖ヲサル者
 アリ。コレ毒ノ疑滯ナリ犀角消毒飲ヲ與ヘテ之ヲ
 涣散ス可シ其甚シキ者ハ時ニ紫丸ヲ以テ其大
 勢ヲ奪フベシ。

紅花湯 小兒血脈壅塞ヨウソク之臟腑熱チヤクハヲ蓄ホウへ煩赤カクク渴カクヲナシ或ハ煩熱睡臥安カラズ四肢驚掣キヤウシ大小便淡シリ或ハ驚痛オウツクヲ發シ或ハ熱毒核オクヲ結ビ或ハ頭面瘡ウケヲ生ジ目赤シトイタク咽痛イタハ者ヲ主治ス

紅花 五分

鬱金 三分

大黃 四分

黃連 三分

甘州 二分

右五味水一合ヲ以テ煮テ六勺ヲ取此方蓋山伊月先生ノ試驗スル處ニメ小兒胎毒タイドク諸般ノ實証シツシヤウニ用テ大ニ效ヲ奏ス角洲先生小兒ノ胎毒ヲ治スル十二七八此方ヲ使用ス

越脾湯

麻毒癩水オスサニ溜シ思寒オウカン發熱ホウチウ一身面目悉ク

腫脉浮ニメ自オツカラ汗ナゲ出ル者

麻黃 一匁

石膏 一匁

甘州 三分

大棗 六分

生薑 六分

右五味水二合ヲ以テ煮テ八勺ヲ取○麻出テ皮膚枯燥コサカワシ毛竅モウケウ竦慄ソウリョウメ全ク表ニ透出スルアタハサアサル者越脾加朮湯主之若表虛キヨメ疎透ソトウスルハサハル者越脾加朮附子湯主之葛根加朮附子湯モ亦主之○宋後ノ医附子ヲ指サシテ大熱ダイネツノ品トス故ニ之ヲ麻瘡ニ用ユルキンヲ禁ス是モ亦誤アヤリナリ

夫附子ノ銚タル。虚氣ヲ運動シ凝毒ヲ融化スルニ在ノミ。徒ニ温補ノ聖藥ト思ヘル者ハ蒙ナリ。然レ氏此說ヤ。明者ト論スベクメ。昧者ト言ベカラス。發熱煩悶ノ安カラス。蛇ノ灰中ニ在カ如ク。蝮ノ塵中ニ在カ如キ状ノ者ハコレ毒壅過メ透出スルヲ能ハサルノ致ス所ナリ。黃連解毒湯ヲ用之。或ハ犀角三五分ヲ加フ。若煩渴スル者ハ石膏ニ芩ヲ加フ。若嘔泄スル者ハ小柴胡湯ヲ與フベシ。或ハ石膏ヲ加小柴胡湯 疹子既ニ出テ發熱退カ不飲食進マザル者。○麻疹中後寒熱往来シ。黙トメ食味ナク。或

ハ身熱頸項強バル者。コレ邪毒胸脇ニ鬱スルナリ。

- 柴胡 一匙
- 黃芩 五分
- 半夏 七分
- 甘艸 三分
- 人參 四分
- 大棗 六分
- 生薑 六分

右七味。水ニ合ヲ以テ煮テハ勺ヲ取。○再煎法。水ニ合半ヲ以テ。一合三勺ヲ取。渣ヲ去再ヒ煎メ。ハ勺ヲ取。

身熱飲食ヲ欲セス唇赤ク。大便秘閉シ。或ハ嘔メ胸下滿痛スル者。小柴胡湯ヲ與フ。若瘥ズメ大便秘閉シ。或ハ胸腹時々痛ム者ハ大柴胡湯主之。
大柴胡湯 目胞腫テ面部青筋ヲ起シ。頭額腹肚

最熱甚シク。或ハ嘔吐腹痛スル者。

柴胡 八分 黄芩 四分 芍藥 五分 半夏 五分

枳實 三分 大黃 四分 甘草 三分 大棗 五分

生薑 五分

右八味。水二合ヲ以テ。煮テ八勺ヲ取。○再煎ノ法。小

柴胡湯ノ法ニ同ジ。

柴胡加龍骨牡蠣湯 面色青紅時々驚惕シテ手ノ

絡脈微動シテ發熱スル者。○己ニ發汗シ。或ハ已ニ下

メ。胸滿煩驚臥起安カラザル者主之。

柴胡 八分 龍骨 三分 牡蠣 三分 芍藥 四分

枳實 三分 大黃 四分 甘草 三分 大棗 五分

生薑 五分

右十一味。水一合六勺ヲ以テ。煮テ八勺ヲ取。滓ヲ去

温服ス。或ハ先十味ヲ煮テ。八勺ヲ取。更ニ大黃ヲ入

一ニ沸。滓ヲ去。温服ス。或ハ辰砂ヲ以テ。鉛丹ニ代フ。

但シ煎法前ノ如クニメ。跡ヨリ辰砂二三勺ヲ内攪セ

服ス。

麻疹ノ初。必發熱ニ由ル。其輕キ者ハ二三日。稍重キ者ハ

五七日。其最重キ者ハ十餘日ニメ。乃チ出。其證必ス

面赤ク。眼腫滄淚多ク。咳嗽甚シ。疹出テ熱退カサル

疹疹論

疹疹論

疹疹論

疹疹論

者ハ重シオモ仍ナホ大青龍湯ヲ以テ其毒ヲ透ダシ盡ツクヘシ悉コトクク出透シテシテ壯熱サウネフ仍退ナホゾカサル者ハ白虎加人參湯。竹葉石膏湯等ヲ選エラミ用ユ疹没ホツメ後熱仍退ナホカサル者ハ危證ナリ。黃連解毒湯ヲ與フ。

疹出ノ時。咽喉腫痛ハシスル者ハコレ火毒薰上クンシヤメ然ラシム。

黃連解毒湯ニ甘桔湯ヲ合方トナシ用ユ犀角消毒

飲モ亦用ユベシ。

疹子發熱ノ時。連翹ビシクスル者ハ晏ミダリニ之ヲ止トムルナカ勿レ是

紅汗コウカンノ義ギニメ。則チ毒コレヨリ解ゲス。但シ大過ダイシクワニ至ラ

サラシフヲ要トス若其大過タイシクワニ至ラントスルノ機キヲ見バ。

乃チ先餘証ヲ舍オイテ犀角地黄湯及涼膈散ヲ選セン用スベシ。

黃連解毒湯 主治前後ニ見ユ。

- 黃連 六分
- 黃芩 五分
- 黃柏 三分
- 山梔子 三分
- 柴胡 六分
- 連翹 四分
- 一方柴胡連翹ナシ

右六味水一合六勺ヲ以テ煮テハ勺ヲ取○大便秘スル者ハ大黃ヲ加フ。○既ニ出未ダ出サルノ時。壯熱口渴カウキ小便淡リ。煩躁メ安カラズ。或ハ已ステニ出テ後其色紫焦シヤウ或ハ紅斑コウハンノ者。石膏ヲ加フ。○發熱六七日以後明カニコレ疹子ハシカ而モ反テ出現

セザル者。葶苈湯主之。一向ニ更衣セザル者ハ毒裏ニ伏スルナリ。黄連解毒加大黄湯主之。

白虎湯 麻疹初中壯熱シテ煩渴スル者ヲ主治ス。○

壯熱舌乾キ大渴メ背惡寒スル者。白虎加入參湯主之。熱毒甚シク驚狂譫語煩渴飲ヲ引者。白虎加

參連湯主之。○粒頭隱々其色紅紫ニメ出透セザル

者ハ火毒熾ナルナリ。白虎解毒湯主之。乃白虎湯黄連解毒湯合

方ナ

石膏 三錢 知母 一錢 粳米 一錢 甘草 二分

右四味水ニ合ヲ以テ煮テ八分ヲ取。滓ヲ去温服ス。

涼膈散 表裏實熱目赤ク便秘ニ或ハ吐血衄血或

ハ咽喉腫痛スル者主之。○熱極火鬱皮膚乾燥メ

出難キ者必唇舌燥裂ニ便秘瀟シ。壯熱沈昏或

ハ身體疼痛喘促痰鳴ヲ致ス。此方ヲ以テ快利ヲ

取レバ則チ疹隨テ出諸患忽然トメ寧シ

大黄 一錢 黄芩 六分 薄荷 四分 山梔子 五分

甘草 四分 連翹 五分 芒硝 八分

右七味水ニ合ヲ以テ先六味ヲ煮テ一合ヲ取。滓ヲ去。芒硝ヲ内更ニ火ニ上シ。消解メ頓服ス。

初發必ス效ス。治方只其鬱塞ノ毒ヲ肌腠ニ逐シノ

ミ麻後ノ咳喘モ亦多クハ其熱毒ノ餘燼ヲ消スルニ
在假令其毒表ニ在テ内心下ノ水氣ニ感淫スル者
ハ小青龍湯主之。其餘焰裏ニ伏スル者ハ竹葉石
膏陽主之。

竹葉石膏湯

疹子出盡メ後壯熱退ゾカサル者主
之。○内外熱メ煩躁シ渴メ痰逆上氣スル者。○
衄血メ煩渴スル者。○喘急氣促火毒亢劇ニメ
腹脹煩躁人事ヲ知サル者。或ハ紫九ヲ魚用メ。○
疹後髮枯毛豎肉消シ骨立漸々羸瘦スル者。

竹葉 八分

麥門 六分

石膏 一分

半夏 六分

粳米 六分

人參 六分

甘草 三分

右七味水ニ合ヲ以テ煮テ八クヲ取。○疹収テ後
煩熱メ渴シ及ヒ喘嗽スル者。餘燼未ダ盡サルナリ
此方主之。

疹子初發一ニ其毒ヲ肌表ニ達センコトヲ要トス。若其
毒ヲ出透シ盡サル時ハ則チ内瘀血ヲ貯ヘ遂ニ
鼻衄吐血大便血等ノ證ヲナスニ至ル乃チ犀角
地黄湯ヲ用ヒテ瘀ヲ化シ血ヲ行ルベシ。若其人
喜忘狂ノ如ク下腹滿テ小便自ラ調フ者ハ抵當
丸ヲ魚用スベシ。

犀角地黄湯

一應汗メ汗ヲ得ス内瘀血ヲ蓄ヘ

血証ヲ見ハシオモテキ面黄ニ或ハ中脘痛ヲナス者主之

犀角 五分

地黄 一匁

芍藥 一匁

牡丹皮 五分

右四味水ニ合ヲ以テ八勺ヲ取滓ヲ去温服ス

初中衄血スル者多クハコレ毒隨テ解スコレ紅汗ノ

義速テ之ヲ止ムルヲ勿レ只其証ニ隨テ毒ヲ解

シ熱ヲ清クスルヲ主トス若血流レテ不止者ハ恐ラ

クハ変ヲ生ゼン宜シク犀角地黄湯三黃瀉心湯

黄土湯等ヲ選テ用フベシ

三黃瀉心湯

三焦實熱煩躁メ便秘スル者○吐血

衄血心氣不定ノ者○熱甚メ血胸中ニ積モノハ犀

角瀉心湯主之乃ヤ三黃瀉心湯方中地黄一匁犀角五分ヲ加フ

大黃 八分

黃連 四分

黃芩 四分

右三味水一合ヲ以テ煮テ一二沸シ八勺ヲ取○犀

角瀉心湯煎方水ニ合ヲ以テ先犀角地黄ヲ煮テ一合

ヲ取更ニ三藥ヲ内レ再ビ煮ル一ニ沸ノ八勺ヲ

取

麻毒内ヲ傷テ吐血下血色瘀晦ノ者黄土湯主之

黃連解毒犀角地黄湯モ亦主之

黄土湯 先大便メ後下血スル者○心ヲ遠血ト云フ

此方主之。○吐血下血。上衝シテ心氣定マラス。或ハ時々寒熱往來シ。或ハ心煩メ取眠ヲ得ズ。或ハ短氣或咳スル者。

地黄 八分 木 六分 附子 三分 阿膠 四分

甘草 三分 黄芩 六分 龍中黄土 七分

右七味。水ニ合ヲ以テ。煮テ八分ヲ取。滓ヲ去。阿膠ヲ内洋消シ温メ服ス。

疹家瀉ヲ忌マズ。故ニ其瀉スル者慎テ之ヲ止シ。洪スルヲ勿レ。譬ヘハ大陽ト陽明トノ合病ニメ。下利スル者。其下利ニ論ナク。葛根湯ヲ主トスルガ如ク。下利

ヲ事トセズ。其病ヲ治スルヲ事トス。是乃チ古ノ良医ノ術ナリ。夫泄瀉ハ麻疹ノ常候ニメ。邪毒コレニ由テ開泄ス。治方固ヨリ瀉利ニ泥マズ。只其毒ヲメ内ニ遺サラン。コトヲ要スルノミ。然レモ又停食ニ因テ泄瀉スル者アリ。コレ常候ニ非ス。宜レク先コレヲ治スベシ。理中湯桂枝人參湯及ビ五苓散ノ類ヲ以テ之ヲ分利シ。後疹ヲ治スベシ。理中湯 論ニ曰ク。理中ハ中焦ヲ理ムト。乃チ胃中不和メ泄瀉スル者。何ノ病ヲ向ス。之ヲ用ユベシ。○心下痞鞭メ下利スル者。○大病後喜唾了々々ラ

サル者

人参 九分 白朮 九分 乾薑 九分 甘草 八分

右四味水二合ヲ以テ煮テ八勺ヲ取

桂枝人參湯 理中湯ノ方内ニ桂枝ハ不入加フ 此方諸般熱ヲ殺ミテ

泄瀉腹痛スル者ヲ主治ス

五苓散 霍乱頭痛身疼痛之熱メ水ヲ飲ント欲ス

ル者○下メ後渴メ口燥渴小便不利微熱消渴ス

ル者○諸泄瀉メ小便不利スル者

猪苓 茯苓 白朮 澤瀉 九分

桂枝 六分

右五味細末トナシ白飲ニテ一匙目ヲ服ス日ニ三々

ビス○俗医イツノ頃ヨリカ此散ヲ湯液トナシテ用ユ

是方意ヲ知ザルノ誤ナリ其甚シキ者ニ至テハ之ヲ

本方トナシテ且他ノ丸散ヲ兼用スルニ至ル嗚呼何ゾ

杜撰ノ如是ナル詳カナル説ハ先生著スル所ノ傷寒

論系傳ヲ見テ知ベシ

疹子壯熱吐利スル者ハ火毒内ニ通ルナリ黄芩加半

夏生薑湯主之生薑瀉心湯モ亦主之若心下痛ミ

嘔吐ノ下利スル者ハ大柴胡湯主之九ツ火毒内ニ通

必裏急後重或赤白下利ス

黄芩湯 口苦^{ニガ}咽乾^{ノドカラ}キ自^{オホカ}ラ下利^シ臌^ウ拘急^{ウキウ}メ痛^{イタ}ム者^モヲ治ス。

黄芩 一钱 芍藥 一钱 甘草 四分 大枣 六分

右四味水ニ合ヲ以テ煮テ八勺ヲ取。○若^{モシ}嘔^{オウ}スル者ハ。加半夏生薑湯主之。若^{モシ}赤白下利。窘迫^{クニ}裏急^{ウラキウ}腹痛^{ウツ}不止者。兼氣丸五七分ヲ兼用スル。晝夜一兩度。

兼氣丸 一切内熱。秘結^{ヒツ}ヲ苦^クシム者。之ヲ常服スベシ。

大黄 四钱 芒硝 二钱

右二味。末トナシ。糊ニテ丸トナス。

半夏瀉心湯 嘔^{オウ}シテ腸鳴^{チウメイ}心下痞^ヒ鞅^{ウツ}スル者。○此方

一切心下ノ鬱痞^{ウツヒ}ヲ開^{ヒラ}キ通^{ツウ}ス。

半夏 八分 黄连 三分 黄芩 六分 干薑 六分

甘草 六分 大枣 六分

右七味水ニ合ヲ以テ煮テ八勺ヲ取。滓ヲ去頓服ス。

生薑瀉心湯 疹子^シ中後毒^{トク}胃ヲ犯^{オホ}シ。胃中不和^{ウチウチ}メ腹

中雷^{ライ}嘔吐^{オウ}メ下利^{ゲリ}スル者主之。方ハ乃^ハ子半夏瀉心

湯ノ方内ニ於テ干薑四分ヲ減シ。生薑八分ヲ加フ。

甘草瀉心湯 下利日二十餘行。穀化^{コクカ}セス。心下痞鞅^{ヒウツ}

メ滿^ミシ。乾嘔^{ケンオウ}心煩^{シンバン}安カラサル者主之。方ハ乃^ハ子半夏

瀉心湯ノ方内ニ於テ甘州四分ヲ増シ加フ。
 初起吐瀉交起ル者ハ順ナリ。若乾霍乱ノ証ヲナス者ハ
 逆ナリ。邪毒胃中ニ結滯シ不吐不下心煩スル者ハ
 調胃承氣湯主之。嘔吐劇シク水藥口ニ入ハ必ス吐シ
 心中憤々奈何氏シ難キ者ハ先小半夏加茯苓湯
 ヲ與ヘテ吐ヲ定ムベシ。疹没メ後餘毒胸脇ニ鬱メ發
 熱嘔吐スル者多クハコレ大小柴胡湯ノ証ナリ。宜シ
 ク之ヲ選用スベシ。水飲ニ属スル者ハ茯苓澤瀉湯主
 之。蛔虫ニ属スル者ハ艾莖湯主之。
 茯苓澤瀉湯 湯シテ小便不利。心下悸シ胸滿スル者。

○水藥咽ニ下レハ則チ吐シ。吐メ後渴メ水ヲ飲ント欲
 スル者。若大便秘閉メ吐劇シク。或ハ時々心腹痛ム者ハ
 先紫丸ヲ用テ其大勢ヲ奪ヒ後此方ヲ與フ。
 茯苓 一匁 蒼朮 六分 澤瀉 八分 甘州 三分
 桂枝 四分 生薑 一匁
 右三味。水一合六勺ヲ以テ。煮テ八勺ヲ取。
 小半夏加茯苓湯 卒カニ嘔吐シ。心下痞メ眩悸スル
 者。○先渴シテ後嘔吐スル者。
 半夏 二匁 茯苓 九分 生薑 一匁
 右三味。水一合六勺ヲ以テ。煮テ八勺ヲ取。○凡ソ諸
 般ノ病。嘔吐劇シクシテ。水藥ヲ受サル者。先此方ヲ

與一テ其嘔ヲ治メ後証ニ隨テ方ヲ處ス是固ヨリ
病ヲ後ノ方ニ非ス只一時ノ標証ヲ治スルノミ○此
方ヲ用ヒテ驗ナキ者ハ黄土一塊ヲ末トナシ水數合
ヲ以テ之ヲ煎シ土器ニ入冷シ其上澄ヲ取テコノ
方ヲ煎ジ用ラレバ則チ速功アリ若氣ヲ惡ム者ハ
冷服セシメテ佳ナリ
芫荽湯 蛔虫ヲ下ス方

海人州 一匙 苦棟皮 四分 蜀椒 二分
大黃 四分 甘州 三分 大便溏スル者ハ
大黃ヲ去ル
右五味水一合半ヲ以テ煮テ八勺ヲ取

同丸方

海人州 十匙 大黃 四匙 苦棟皮 四匙

右細末ニメ糊丸トナシ諸病ノ蛔虫ヲ兼ヌル者其
證ニ應メ方ヲ處シ此丸ヲ兼用スル毎服三五分
疹後 蚘ヲ吐テ厥冷スル者コレ蚘厥ナリ芫荽湯主之
蛔厥若吐利セス内臟腑ヲ蝕スル者コレヲ狐惑ト
ス其証好テ睡リ黙マトメ飲食ヲ欲セス是惡候ニメ
疹後最多シ甘州瀉心湯ヲ主トシ芫荽丸ヲ兼用ス
調胃承氣湯 胃氣不和ニメ大便不通ノ者○心下
温々吐セント欲メ胸中痛大便反澀澀シ腹微滿鬱

鬱トメ微煩スル者。

大黃一匙 芒硝一匙 甘草四分

右三味水一合半ヲ以テ先ニ物ヲ煮テ八勺ヲ取。滓ヲ去更ニ芒硝ヲ内消解メ之ヲ頓服ス。

挑按承氣湯 疹毒内ニ腐蝕メ内癰ヲナス者。○善

忘善饑身黄ニ腹滿メ狂ノ如ク或ハ少腹急結スル者。コレ血氣凝結メ然ラシム長幼男女ニ論ナク皆

主之。

桃仁一匙 桂枝四分 甘草三分 大黃八分
芒硝六分

右五味水一合六勺ヲ以テ煮テ八勺ヲ取滓ヲ去。

硝ヲ内更ニ火ニ上微沸メ火ヲ下温服ス。

麻後眼目紅赤或ハ開テ開カサル者コレ火毒ノ餘焰未

上部ニ盡サルナリ。排毒加大黃。滓滓加大黃湯等ヲ選テ用フベシ。或ハ時ニ紫丸ヲ用テ之ヲ奪ヒ去

可シ。若眼中翳ヲ生スル者ハ凉膈散ヲ與フ。

餘毒内ニ伏シ。遂ニ丹毒赤腫ヲ作テ遍體ニ植之スル者。或ハ胸膈滿悶シ。或ハ咽喉腫痛スル者凉膈散ヲ

主トシ。旦時ニ紫丸ヲ用テ其勢ヲ奪ヒ旦其毒盡ノ處ニ三稜鍼ヲ以テ之ヲ刺メ紫血ヲ出スヘシ。若

遲引スル時ニハ。則チ毒周身ニ流注メ救ハレサルニ至ル。此時ニ先タツテ犀角瀉心犀角消毒及ヒ紅花湯等證ヲ審カニシ法ヲ照メ用フベシ。

丹毒敷藥

硫黄 一钱 大黄 五分

右ニ味各末トナシ合セ白へ水ニテ解屢患處ニ塗ル餘毒心胸ニ結滯メ逐ニ龜胸龜背ヲ作有小陷胸湯ヲ主トメ時々桔梗白散紫丸滾痰丸等ヲ選用スベシ。瓜蒂散モ亦證ヲ審カニメ之ヲ與スベシ。

小陷胸湯 小結胸ノ病正ニ心下ニアリ之ヲ按セハ

則痛ミ。脉浮滑ナル者。○寒實結胸熱證ナキ者。

黃連 六分 半夏 一钱 瓜蒌實 五分 千金方大黃廿

右三味水一合半ヲ以テ煮テハ夕ヲ取。○疹後餘毒胸ニ凝結シテ色出ザル者。此湯ヲ主トシ。控涎丹及紫丸ヲ兼用スレバ即効神ノ如シ。又瘖啞スル者ニ瓜蒂散ヲ用テ神効アリ。知サレバ有ベカラス。麻毒口中ニ溜メ走馬疔ヲ發シ齒齦腐爛シ血出テ臭氣人ヲ衝者。涼膈散黃連解毒等ヲ用ユ。或ハ紫丸ヲ兼用メ速カニ之ヲ奪瀉スベシ。

口中敷藥方

枯礬 青黛 五倍子 各等分

右三味各末トナシ。米泔水ニテ解患処ニ塗ル。

升麻湯 傷寒陽毒或ハ發汗吐下ノ後毒氣解セス。

身重ク背強リ煩躁狂言或ハ走リ或ハ鬼ヲ見赤

ク班々錦文ノ如ク咽喉痛及ヒ膿血ヲ唾スル者。

升麻 或 當歸 犀角 射干 各五分 黃芩

黃連 甘草 地骨皮 各三分 此方聖惠方ニ見ニ金匱升麻

右八味水一合六夕ヲ以テ煮テ八夕ヲ取頓服ス

口中吹藥方

辰砂 硼砂 各等分

右二味末トナシ合セ勺一管ヲ以テ咽喉ノ患処ニ吹入。

葶藶湯 疹後鼻塞テ香臭ヲ聞ガル者ヲ治ス。

葶藶 八分 細辛 三分 防風 八分 白芷 四分

川芎 四分

右五味水ニ合ヲ以テ煮テ一合ヲ取或ハ大黃甘草

ヲ加フ。

疹出初遅トメ透齊シ又遅トメ収マル者ハ其勢

ト輕シト雖凡熱尚平解セス復内陷ノ患ヲ慮ハ

カルベシ疹退テ後咳嗽スル者ハ餘毒未タ盡サル

ナリ。小青龍湯ヲ以テ之ヲ發汗スベシ。若咳甚シク
飲食湯水等俱ニ嘔出スル者ハ是毒胸肺ニ乘スル
ナリ。証ニ應メ方ヲ處シ旦控涎丹。滾痰丸ヲ選用スベシ。
石蜜湯 疹後餘毒悉ク除キ去リ。只咳嗽劇シクメ
日久シキ者。恐ラクハ變メ遂ニ勞效ノ証ヲ發セン。
則チ速ニ此方ヲ與ヘテ以テ之ヲ止ムベシ。

嬰續穀 一錢
石長生 一錢
甘艸 一錢

石蜜 二錢

右四味。水ニ合ヲ以テ。先三物ヲ煮テ一合ヲ取。滓
ヲ去。石蜜ノ末ヲ内レ攪セ。頓服ス。此方ヨク久效

ヲ治ス。若近日邪熱ニ由テ咳嗽シ。或ハ毒ニヨリテ喘咳
スル者ハ與ル所ニ非ルナリ。

紫丸 丸。麻初中後毒腸胃ニ鬱閉メ諸證ヲナス者。
必用ノ良藥ナリ。千金方ニ曰ク。此方速カニ毒ヲ去
丸ノ小兒ノ萬病治セサル所ナク。下スト雖凡人ヲメ
虚セシメズ。

巴豆 五錢
代赭石 四錢
赤石脂 四錢
杏仁 七錢

右ニ物ヲ末トシ。杏仁巴豆ヲ研合セ。調へ糊丸トナス。
○麻毒壅塞メ出難キ者。先此方ヲ用テ其毒ノ勢ヲ
下シ奪ヒ。後透發ノ藥ヲ與フ。○丹毒游走ノ者。最此

藥ヲ闕ベカラス。疹後毒耳目ニ滲シ。失明アルハ耳
鳴アルハ聾ル者。毒胸肺ニ迫リテ喘咳甚シキ者。麻
中腹痛毒ニヨリ。或ハ停食ニヨル等ノ者。悉ク之ヲ用フ
ベシ。

瓜蒂散 搗初散ニ見ル、者ハ專ラ其毒ヲ透達スレバ
則搗自ラ止若没後ニ見ル、者ハ危証ナリ。搗搗シテ
痰喘壅盛ノ者ハ瓜蒂散ヲ以テ之ヲ湧吐セバ一線ノ
生路ヲ得ン。○麻毒胸中ニ鬱滯シ。咽中痰喘涎潮
鋸ヲ拽ガ如キ者。方ハ傷寒論ニ見ユ。且先生杜歲ノ
時著ス所ノ吐方撮要ノ中ニ於テ之ヲ求メハ吐方ヲ使

用スルヲ思半ニ過ン。○夫瓜蒂散ノ良能アルヤ廣ク
大ナリ。古人之ヲ運用メ死ヲ起シ生ヲ回スノ妙應勝
テ數ヘカクシ。怪シイ哉。晩近ノ医反テ之ノ懼ル、事
蛇蝎ヨリモ甚シク偶之ヲ行フ者アレバ。則姤忌シテ
止メズ。遂ニ衆口金ヲ爍スニ至ル。是故ニ凡病ノ吐ヲ以
テ瘥ベキ者ハ皆愈ル。能ハス。其生ベキ者ハ悉ク以
テ死スルニ至ル。コレ誰カ過ソヤ苟モ志アラシ者ハ宣
シク思ヒコトニ致スベシ。

控涎丹 胸膈ノ間ニ痰アリテ喜テ涎沫ヲ吐喘咳メ
掣痛スル者ヲ主治ス。

甘遂 四錢 大戟 三錢 白芥子 三錢

右三味各細末トナシ煉蜜テ丹トナス。

滾痰丸 心胸間ニ痰飲ヲ結ビテ喘咳スル者ヲ主治ス。

大黃 黃芩 各五錢 甘遂 一錢 青礞石 燒二錢

沉香 二錢

右五味細末トナシ糊ニテ丸トナス。

抵當丸 瘀蓄ノ毒血ヲ下ス。

水蛭 六錢 蟅蟲 六錢 桃仁 四錢 大黃 五錢

右四味各末トナシ糊ニテ丸トナス。○角洲先生曰。

本エノ方經水利下セサル者ヲ治スコレ則チ方ノ體

ナリ。仲景氏之ヲ活用メ傷寒有熱少腹滿云云ノ

証ヲ治スコレ則チ用ナリ。因テ知ベシ凡瘀滯

証ヲ見ス者長幼男女ニ論ナク皆之ヲ用ユベキコ

麻毒ヨク胎ヲ墮故ニ妊婦ノ治方其初速カニ清熱

透達セシメンヲ要ス其胎ノ未ダ動カサル其毒ノ

未ダ犯サル時ニ當テ早ク之ガ所ヲナス時ハ安然

トメ墮胎ノ患ナカルベシ。後ニ茫然トメ無實ノ方

藥ニ安スル時ハ忽然トメ變ヲ生セン之ヲ慎メ之

ヲ慎メ若シレ治術粗ニメ此變ヲ引出サバ其變ニ

應シテ之ヲ医治セヨ。世医妊家ニ下劑ヲ用ユル

一ヲ憚ル者多シ暗愚ノ甚シキ哉。妊ハコレ子宮
 胞膜中ノ事豈下劑ヲ以テ之ヲ大便道ニ墮スノ
 理アラシヤ古ニ曰ク事アレハ損ナシト請之ヲオモヘ
 又當飯地黄。人參白朮芍藥川芎ノ類ヲ以テ滋血
 安胎ノ品トスル者ハ不識ノ甚シキ哉世ノ疹科ノ
 書ニ皆記ス妊婦ノ治方亦只調血補氣シテ以テ墮
 胎ノ患ヲ免カレントテ殊テ知ズ一ニコレ邪毒ノ胎ヲ
 動シ犯スモノニメ血ト氣ノ逆乱ニヨルニ非ルヲ故ニ
 先生ノ疹子ヲ治スル其妊婦ニ於ル唯速ニ毒ヲ消
 シ熱ヲ清クシテ悉ク疹子ヲメ表ニ浮出シ盡スヲ

要トスルノ事

麻疹疹後更ニ種々ノ壞證ヲナス者アリ是其初
 治方ノ差誤スルト又其人平質ノ宿疾之カ虚ニ乘メ
 起ルトノニツニ由ル治方其證ニ隨ヒ變ニ應センノ
 ミ假令疹後急慢驚ヲ發セバ則チ常ノ驚ヲ治ス
 ル法ニ隨ヒ疹中墮胎セバ常ノ産後ノ治方ニ從
 フベシコレ其初メ麻毒ニ因テ然ルト雖モ其壞證
 ニ至テハ只何ノ部ノ利セサルヲ知リ證ニ從フテ方
 ヲ處センノ事

疹初中後難治必斃ノ証候數種アリ而レ此之ヲ要

スルニ。傷寒時疫及ヒ諸雜病ノ難治危篤ノ者ト。其証狀異ナルヲナク。徧身冷汗。脈微細。數息扇長。日咽痛。數日絶穀等ノ例ヲ推テ。病者臨一ハ。自ラ默識スベシ。

禁忌。古人藥ヲ服スル時。生冷粘滑肉麪酒酪五辛ヲ禁ズ。況ンヤ酥油一切膏梁ノ毒ヲ犯胃ヲ損スル等ノ物ヲ禁スルヲ辨ヲ待ズ。著明ナレバコレモ亦免ニ畧シツ。

麻疹約說畢

麻疹約說後序

經曰升已而降ニ者謂天降已而升升者謂地天氣下降氣流於地ニ氣上升氣騰於天故高下相召升降相因而變矣蓋天地之為體也陽位于上以火為之態以燥煥為之用陰位于下以水為之態以濕寒為之用而

麻疹論言
陽常喻陰於外陰亦招陽於內感應
無窮運行無端輪轉環周其感動幹
旋之際氣中自釀一箇穢淫之毒而
此毒也月積年累其濁者先潰而為
痘其清者滋凝而後遂發麻也而其
於常也無影可求無形可見而至其
一旦倏然變亂也影可以證形可以

象也余自束髮之時潛心於刀圭五
十年于今兵常竊怪古人之論麻疹
特以腑臟五行立之說或以心火慾
淫為之論要之皆妄誕而已矣獨吾
友加古君角洲素精方伎以著書為
樂嘗掇經立說著麻疹約說一編今
也刻既就而命後序於余二受讀稍

喜再讀數十遍益歎其說之凜乎不
可拔遂至不覺手之足之舞蹈兵因
更標經旨于此以徵君之說之不苟
云爾

文政辛巳季冬

河內竹島附鳳于翼謹撰

卷之三

