金匱要略註解

五

ヤ g
883
5 止

金匱要略註解卷之十九

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病脉證治第

十九　論一首　脉證一條　方四首

師曰病跌蹶其人但能前不能却刺腨入二寸此太陽經傷也病人常以手指臂腫動此人身體瞤瞤者

藜蘆甘艸湯主之

此段未詳

藜蘆甘艸湯方　未見

轉筋之爲病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹者雞屎白散主之

脉上下行言如相引狀

雞屎白散方

雞屎白

右一味爲散取方寸匕以水六合和温服

別錄云雞屎白治轉筋雄雞屎乃有白臘月收之

陰狐疝氣者偏有小大時時上下蜘蛛散主之

丹溪纂要曰言之狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中狐則晝出穴而溺夜則入穴而不通此疝與狐相類

蜘蛛散方

蜘蛛十四枚熬焦　桂枝半兩

右二味爲散取八分一匕飲和服日再服蜜丸亦可

別錄云蜘蛛治大人小兒瘰癧癩疝也故加桂枝引少陰厥陰

問曰病腹痛有蟲其脉何以別之師曰腹中痛其脉當沉若弦反洪大故有蚘蟲

凡腹痛者多寒實故脉必沉弦反洪大以蟲動也蚘蟲之爲病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止甘草粉蜜湯主之

毒藥者苦辛殺蟲之藥也毒藥不應則爲虛蟲可

知故甘劑主之○醫學六要曰風字從虫虫風化也濕熱鬱久則生蟲腐草爲螢陳麥爲蛾之類菓實外殼完整虫生于內人之腸胃無物不受豈得無虫三戶九遁理或有之其猶狂尅腸胃爲痛爲嘔爲噦爲嗜種種煩苦須伏匿藥至蛔蟲乃人之消化搬運者偶爲食傷則或吐或瀉出和中自安不可攻伐脉者不知妄用雷丸史君之類禍不旋踵

甘艸粉蜜湯方

甘艸二兩　粉一兩　蜜四兩

右三味以水三升先煮甘艸取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差卽止

蛔厥者當吐蛔令病者靜而復時煩此爲臟寒蛔上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蛔聞食臭出其人常自吐蛔

蛔厥者烏梅丸主之

烏梅丸方

烏梅三百枚　細辛六兩　乾姜十兩　黃連一斤

當歸四兩　附子六兩炮　川椒四兩去汗　桂枝六兩

人參六兩　黃蘗六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核

蒸之五升米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中
蜜杵二千下丸如梧子大先食飲服十丸三服
稍加至二十丸禁生冷滑臭等食

景昆曰胃虛臟寒得食而嘔蚘從口出者此方
主之烏梅味酸蜱得之而軟連柏味苦蜱得之
而伏椒細味辛蜱得之而死乾姜附桂温臟寒
也人參當歸補胃虛也

金匱要略註解卷之十九　終

金匱要略註解卷之二十

婦人妊娠病脉證并治第二十

方八首

證三條

師曰婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒熱
名妊娠桂枝湯主之方見中於法六十日當有此證設
有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

脉經曰腎名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按
之不絕法妊娠也然其脉小弱渴不能食者血弱
而然故當以桂枝湯温之蓋月水已絕一月而有
此證醫不知誤治之却又一月而加吐下者與治

吐下之藥宜斷絶之六十日卽是二月也

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥痼害

經斷得胎也胎動在臍上者胎不墮爲癥瘕痼疾也

妊娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月不血也所以血不止者其癥不去故也當下其癥

桂枝茯苓丸主之

此因有癥而胎動也雖後三月不下血以前三月胎未固之時下血之故及至六月亦胎動血不止也

桂枝茯苓丸方

桂枝　茯苓　牡丹去心　桃仁去皮尖熬　芍藥各等分

右五味末之煉蜜和丸如兒菽大每日食前服一丸不知加至三丸

桂枝芍藥牡丹桃仁共皆破瘀血茯苓引以陰下降所以其癥去也

婦人懷娠六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子臟開故也當以附子湯温其臟方未見

此證疑寒破子宮乎然惜乎方未見

師曰婦人有漏下者有半産後因續下血都不絶者有妊娠腹中痛爲胞阻膠艾湯主之

胞中因瘀血而阻絶是即半産而胎未隨盡之故也

芎歸膠艾湯方 一方加乾姜一兩胡氏治婦人胞動無乾姜

芎藭二兩 阿膠二兩 甘草二兩 艾葉三兩

當歸三兩 芍藥四兩 乾地黃

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡温服一升日三服不差更作

芎藭當歸地黃芍藥四物湯也以治血病不可缺艾葉止胎動阿膠能止漏血甘草和諸藥

婦人懷妊腹中疠痛當歸芍藥散方

當歸芍藥散 一斤 茯苓 四兩

當歸三兩 芍藥 半斤一作三兩

白朮四兩 澤瀉半斤 芎藭半斤

右六味杵爲散取方寸匕酒和日三服

當歸芍藥芎藭四物湯也白朮能利血補脾蓋腹痛胎動恐脾虛胎即隨故用之茯苓澤瀉利膀胱膀胱與胞同其氣通則胎定腹痛止

妊娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸方

乾姜人參半夏丸

乾姜一兩　人參二兩　半夏一兩

右三味末之以生姜汁糊爲丸如梧子大飲服十丸日三服

半夏止嘔乾姜温胃嘔吐不止恐元氣虛乏之而胎墮故用人參以補元氣

妊娠小便難飲食如故歸母苦參丸主之

當歸貝母苦參丸方　男子加滑石半兩

當歸　貝母　苦參　各四兩

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸

當歸治血貝母本草曰治淋瀝亦肺經氣分藥也能散心胸鬱結之氣苦參本草曰治溺有餘瀝逐水二味能共逼小便非如淡滲之劑瀉利膀胱有妨子宮也

妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

洒淅惡寒頭眩皆因有水氣然

葵子茯苓散方

葵子一斤　茯苓三兩

右二味杵爲散飲服方寸匕日三服小便利則愈

茯苓淡利小便葵子滑滑治五癃利小便能入

子宮故妊婦之所宜用又所宜忌也

婦人妊娠宜常服當歸散主之

當歸散方

當歸　黃芩　芍藥　芎藭各一斤　白朮半斤

右五味杵爲散酒飲服方寸匕日再服妊娠常服即易産胎無苦疾産後百痛悉主之

醫學原理有人參曰治胎婦一切諸症蓋妊娠之婦氣血凝聚胎元濕熱易於壅滯法當調養氣血清理濕熱是以用川歸芍藥川芎白朮人

參養血益氣黃芩清熱又曰一本無人參有香附亦妙

妊娠養胎白朮散主之

白朮散方 見外臺

白朮　芎窮　蜀椒三分汗　牡蠣

右四味杵爲散酒服一錢匕日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芍藥心煩吐痛不能食飲加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之復不解者小麥汁漿水服之若嘔以醋漿水服之病雖愈服之勿置

妊婦脾虛弱則胎必墮故白朮以補脾氣牡蠣

能固胎芎窮散氣滯運血蜀椒以加温子宮是
所以能養胎也
婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水
氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當瀉勞
宮及關元小便微利則愈（見玉函）
脉經云婦人懷胎一月之時足厥陰脉養二月足
少陽脉養三月手心主脉養四月手少陽脉養五
月足太陰脉養六月足陽明脉養九月足少陰脉
養十月足太陽脉養
金匱要略註解卷之二十終

金匱要略註解卷之二十一
婦人産後病脉證治第二十一
論一首　證六條　方七首
問曰新産婦人有三病一者病痙二者病鬱冒三者
大便難何謂也○師曰新産血虚多汗出喜中風故
令病痙亡血復汗寒多故令鬱冒
痙身躰反張也血虚筋燥又得風則痙必起亡血
後復得汗經絡虚竭津液胃燥故大便難
胃者六腑長也胃燥則腸亦燥大便堅

產婦臂冒其脉微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出

血脉衰弱故其脉微弱也不能食者寒冒表也冒寒欲解則必大汗出此其證也

所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出

陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之 方見嘔吐中

陰陽乃復厥逆氣復也 已言下厥孤陽上出頃而陽氣降陰氣上厥逆自已也

小柴胡湯治肝鬱止嘔

病解能食七八日更發熱者此爲胃實大承氣湯主之方見中

病解表證已解而却發熱者熱邪在裏也故大承氣湯宜之

產後腹中疠痛當歸生姜羊肉湯主之并治腹中寒亦虛勞不足

產後腹中疠痛者寒傷血然此同於寒亦不足之證

當歸生姜羊肉湯方 見寒病中

產後腹痛煩滿不得臥枳實芍藥散方

枳實芍藥散主之

枳實燒令黑勿大過 芍藥等分

右二味杵爲散服方寸匕日三服并主雞膿以麥粥下之

芍藥治血止腹痛枳實破敗血又推食故主治產後腹痛兼癰膿

師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此爲腹中有乾血着臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

乾血着臍下則非毒藥不能去故大黃蠐螬酷毒主之

下瘀血湯方

大黃二兩 桃仁二十枚 蠐螬二十枚 熬去足

右三味末之煉蜜和爲四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚肝

產後七八日無大陽證小腹堅痛此惡露不盡不大便煩燥發熱切脉微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱也方見痙病中

詳審斯證因血窮陽邪入裏若陰虛而發熱者誤爲此證則有反掌之患焉至夜即愈者至陰氣深

時陽火暫衰也

産後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在耳可與陽旦湯即桂枝湯方見下利中

陽旦名義未詳或曰服之陰邪散氣爽狀如朝日初出

産後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之

此即太陽陽明太陰合病也

竹葉湯方

竹葉一把　葛根三兩　防風　桔梗

桂枝　人參　甘州各一兩　附子一枚炮

大棗十五枚　生姜五兩

右十味以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆使汗出○頸項强用大附子一枚破之如豆大煎藥揚去沫嘔者加半夏半升洗

葛根防風桂枝生姜四味偕能去表邪竹葉桔梗除肺熱人參大棗能助元氣甘州以和諸藥而又非附子力則不能去太邪故用之以急治之實産後可懼之證矣

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

竹皮大丸方

生竹茹二分　石膏二分　桂枝一分

甘州七分　白薇一分

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一丸日二夜二服有熱者倍白薇煩喘者加柏實一分

乳房陽明經是也因陽明熱煩乳中虛故石膏白薇涼清陽明熱竹茹薇寒止煩熱兼治崩中

凡婦人熱逆證不可缺之藥也桂枝甘州甘辛以去風緩邪治嘔逆○李時珍曰白薇古人多用後世罕能知之按仲景治婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸方中用白薇同桂枝一分竹皮石膏二分甘草七分棗肉爲丸方每以飲化一丸服云有熱者倍白薇則白薇性寒乃陽明經藥也徐之才藥對言白薇惡大棗而此方又以棗肉爲丸蓋恐諸藥寒涼傷脾胃爾

產後下利虛極白頭翁加甘草阿膠湯方

白頭翁　甘州　阿膠各二兩

秦皮　黃連　蘗皮各三兩

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡分溫

三服

白頭翁湯治下利下利虛極則恐血竭行故用阿膠止血甘草甘緩

附方

千金三物黃芩湯治婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

蓐草蓐之蓐吳昆曰產中之名也產婦肝血虛發露得風邪在厥陰故當與小柴胡湯煩熱多者三物湯皆苦寒益陰

黃芩一兩　苦參二兩　乾地黃四兩

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

千金內補當歸建中湯治婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸吸少氣或苦小腹中急摩痛引腰背皆不能食飲產後一月日得服四五劑爲善今入強壯宜

當歸四兩　桂枝三兩　芍藥六兩

生姜三兩　甘草二兩　大棗十二枚

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日人盡若大虛加飴糖六兩湯成內之攪火上煖令飴消若去血過多崩傷內竭不止加地黃六兩阿膠二

兩合八味湯成內阿膠若無當歸以芎藭代之
無生姜以乾姜代之

金匱要略註解卷之二十一 終

金匱要略註解卷之二十二

婦人雜病脉證并治第二十二

論一首 脉證合十四條 方十六首

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方見嘔吐中

産婦血虛風邪侵厥陰熱入血室厥陰與少陽爲表裏故爲寒熱

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必

自愈

熱侵肝故曰無犯胃氣及上二焦血者身之神也熱邪亂血故如見鬼狀〇成氏曰傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室虛空邪熱乘虛入於血室若晝自讝語為邪客於府與陽爭也此晝自明了暮則讝語如見鬼狀是邪不入腑入於血室與陰爭也陽盛讝語則宜下此熱入血室不可與下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴胡湯散邪發汗此雖熱入血室而不可與發汗藥犯其上焦熱入血室胸脇滿如結胸狀者可刺期門

此雖熱入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦必自愈者以經行則熱隨血去血下也已則邪悉除而愈矣所以發汗為犯上焦者發汗則動衛氣衛氣出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門則動中氣營氣出中焦故也〇王宇泰曰無犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也王說是也

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼和胸脇滿如結胸狀讝語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之

已曰無犯胃氣及上二焦必自愈今其實無以妄藥取之故刺期

門泄其實〇許學士曰婦人平居水當養于木血
當養於肝方未受孕則下行以爲月水既娠則中
畜以養胎及已産則上蓬以爲乳皆此血也今邪
氣畜血併歸肝經聚于膻中結於乳下故手觸之
則痛非湯劑可及故當刺期門
陽明病下血讝語者此爲熱入血室但頭汗出當刺
期門隨其實而瀉之濈然汗出者愈
陽明病未解而入傷血室也濈然汗出貌
婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之
手太陰脉經咽故藥皆太陰之劑也

半夏厚朴湯方 千金作胸滿心下堅咽中怫怫
半夏 一升
生姜 五兩
乾蘇葉 二兩
厚朴 三兩
茯苓 二兩
右五味以水七升煮取四升分温四服日三夜一
服
婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥
大棗湯主之
此心脾虛神不安甘草甘緩神躁小麥素問云心
之穀也思遠日養心氣故除煩收心氣大棗以補
脾

甘艸小麥大棗湯方

甘艸 二兩　小麥 一升　大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升温分三服亦補脾氣

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫

小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

此亦以傷寒法可考之

小青龍湯方　見肺癰中

瀉心湯方　見驚悸中

婦人之病因虛積冷結氣爲諸經水斷絶至有歷年

血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成

肺癰形躰損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與

臟相連或結熱中痛在關元脉數無瘡肌若魚鱗時

着男子非此女身在下未多經候不勻冷陰制寒痛小

腹惡寒或引腰脊下根氣衝急痛膝脛疼煩奄

忽眩冒狀如厥癲或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非

有鬼神久則羸瘦脉虛多寒三十六病千變萬端審

脉陰陽虛實緊弦行其鍼藥治危得安其雖同病脉

各異源予當辨記勿謂不然

此言癥血在中在下也冷陰之陰言陰戶腰

脊下根瑣跳際是也非言男子也三十六病見前

問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮即發熱
小腹重急腹滿手掌煩熱脣口乾燥何也師曰此病
屬滯下何以故曾經半產瘀血在小腹不去何以知
之其證脣口乾燥故知之當以溫經湯主之

下利以脣口乾燥不可必爲滯下一意當月必有所
見然非瘀痢至數十月之久脣口乾燥是即非瘀
血何

溫經湯方

吳茱萸三兩　當歸二兩　芎藭二兩　芍藥二兩
人參二兩　桂枝二兩　阿膠二兩　生姜二兩
牡丹皮二兩去心　甘艸二兩　半夏半升　麥門冬一升去心

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服○亦主
婦人小腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來
過多及至期不來

當歸芍藥川芎四物湯也能治血虛茱萸下肝
邪桂枝牡丹皮破瘀血生姜半夏治痰開胃醒
脾人參阿膠甘艸補元氣久利必津液竭麥
門冬能生津液故非專治久痢無不治崩中去
血月水來過多及至期不來
帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者土瓜根散

主之

土瓜根散方　陰癪腫　亦主之

土瓜根　芍藥　桂枝　蠐螬各三兩

右四味杵爲散酒服方寸匕日三服

土瓜根本草云治瘀血月閉蠐螬亦破瘀血兼芍藥桂枝去瘀血則此方主此證可知蓋此證因瘀血而然也

寸口脈弦而大弦則爲臧大則爲乳臧則爲寒乳則爲虛虛寒相搏此名曰革婦人則半産漏下旋覆花湯主之

此註見前第六卷血痺虛勞病脈条

旋覆花湯方

旋覆花三兩　葱十四莖　新絳少許

右三味以水三升煮取一升頓服之

已言虛寒相搏半産漏下而其藥但治寒何曰風寒傷人其猛烈疾速傷經絡則中風塞傷風寒是也傷包絡則半産漏下是也故但治其風寒則其證自愈

婦人陷經漏下黑不解膠姜湯主之　臣億等按諸本是前妊娠屯膠艾湯無膠姜湯方想

黑言血色也

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此爲水與血俱結在血室也大黃甘遂湯主之

敦敦阜也謂脹滿也脉經註云生後字疑恐有鈇文誤字矣

大黃甘遂湯方

大黃四兩　甘遂二兩　阿膠二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下

水與血結在血室故大黃甘遂下之然二味酷毒破好血故阿膠以風本

婦人經水不利下抵當湯主之亦治男子膀胱滿急有瘀血者

抵當湯方

水蛭三十箇熬　虻蟲三十枚熬去翅足　桃仁二十箇去皮尖

大黃三兩酒浸

右四味爲末以水五升煮取三升去滓溫服一升

成氏曰苦走血鹹勝血虻蟲水蛭之鹹苦以除畜血甘緩結昔泄熱桃仁大黃之昔以下結熱與血也氣爲陽氣留而不行者則人之所有氣與血也氣爲陽氣留而不行者則易散以陽病易治故也血爲陰血畜而不行者則難散以陰病難治故也血畜于下非大毒駛

劑則不能抵當故治蓄血目抵當湯

婦人經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白物礬石丸主之

臟堅癖痰癖也故礬石杏仁去痰也

礬石丸方

礬石三分燒　杏仁一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內臟中劇者再內之

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之

六十二種風其數未詳

紅藍花酒方　疑非仲景方

紅藍花一兩

右一味以酒一大升煎減半頓服一半未止再服

紅花能破癥血生新血酒以通經絡

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

胞不安也故當歸芍藥散主之

當歸芍藥散方　見前妊娠中

婦人腹中痛小建中湯主之

婦人腹中痛寒傷血故小建中湯主之

小建中湯方　見前虛勞中

問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之

飲食如故非脾虛之水也煩熱不得臥而倚息者水在上也胞系了戾爲轉胞者素腎虛產後胞中津液燥竭故胞皺系了戾不得溺故腎氣丸主之然此間諸書所引有同異姑記之俟後哲朱丹溪格致餘論云仲景曰婦人本肥盛且舉自滿全羸瘦且舉空減胞系了戾亦致胞轉其義未詳必有能知之者愚謂舉猶勿舉也之舉史記孟嘗君傳曰初田嬰有子四十余人其賤妾有子名文文以五月五日生嬰告其母曰勿舉也其母竊舉生之索隱曰上舉謂初誕而舉之下舉謂浴而乳之生謂長養之也言胎孕也蓋婦人本肥盛者胎孕則胞中滿盛而無轉胞之患若羸瘦者胎孕則胞中空減而爲轉胞之患矣舉字爲胎孕之義略見軒岐救正論又天民醫學正傳云婦人本肌肉肥盛頭舉自滿今反羸瘦頭舉中隆胞系了戾亦多致此病但利小便即愈宜服腎氣丸蓋藥中有茯苓故也地黃爲君功在補胞疑正傳多有誤字

蛇床子散方溫陰中坐藥

蛇床子仁

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹內之自然溫

坐剉通細末之義也蛇床子本草云治婦人陰中腫痛

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之

外科百効云如因婦人子宮有敗精帶濁或月水未淨與之交合後又未洗男子腎虛邪穢滯氣遂令陰莖連睪丸腫痛小便如淋名陰蝕瘡然婦人亦有之故曰陰中蝕瘡中字可見

狼牙湯方

狼牙 三兩

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯瀝陰中日四遍

狼牙本艸云治疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲甄權云洗惡瘡

胃氣下泄陰吹而正宣此穀氣之實也膏髮煎道之吹鼓吹之吹鳴也

膏髮煎方 見黃疸中

小兒疳蟲蝕齒方　疑非仲景方

雄黃　葶藶

右二味末之取臘月猪脂鎔以槐枝綿裹頭四五枚點藥烙之

金匱要略註解卷之二十二　終

金匱要略註解卷之二十三

雜療方第二十三

論一首　證一條　方二十三首

退五臟虛熱四時加減柴胡飲子方

冬三月加　柴胡八分　白朮八分　陳皮五分

大腹檳郎四枚并皮子用　生姜五分　桔梗七分

春三月加　枳實　減　白朮共六味

夏三月加　生姜三分　枳實五分　甘艸三分共八味

秋三月加　陳皮三分共六味

右各㕮咀分為三貼一貼以水三升煮取一升分

温三服如人行四五里進一服如四體壅添甘草少許每貼分作三小貼每小貼以水一升煮取七合温服再合滓爲一服重煮都成四服 疑非仲景方

柴胡飲子柴胡白朮陳皮檳榔生姜桔梗六味也春三月加枳實去白朮六味也夏三月加生姜枳實甘草依本方數多甘艸枳實二味故八味也秋三月倍陳皮本方數依然故六味也然此方誠宜去五臟熱而四時之減增其理未詳故疑非仲景方

長服訶梨勒丸方 疑非仲景方

訶梨勒 煨　陳皮　厚朴 各三兩

右三味末之煉蜜丸如梧子大酒飲服二十丸加至三十丸

但言長服不言何證恐去脾痺固大腸之用矣

三物備急丸方 見千金司空裴秀爲散用亦可先和成汁乃傾口中令從齒間得入至良驗

大黃 一兩　乾姜 一兩　巴豆 一兩去皮心熬外研如脂

右藥各須精新先擣大黃乾姜爲末研巴豆內之莫令歇○主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口禁停尸卒死者以緩水若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令下咽

須臾當差如未差更與二丸當腹中鳴即吐下便
差若口噤亦須折齒灌之
吳昆曰脾胃以飲食而養亦以飲食而傷故飲
食自倍填塞至陰上焦不行下脘不通則令人
腹痛欲死經曰外降息則氣立孤危是也以平
藥與之性緩無益於治故用大黃巴豆奪門之
將軍以主之佐以辛利之乾薑則其性益速而
效益捷矣○從是以下諸方未詳其義略述其
宇義耳
治傷寒令愈不復紫石寒食散方 見千金翼

紫石英 白石英 赤石脂 鍾乳碓錬
栝蔞根 防風 桔梗 文蛤
鬼臼各 太一餘粮十分燒 乾姜
附子炮去皮 桂枝去皮各四分

右十三味杵爲散酒服方寸匕
醫按巢元方病源候論卷之六服寒食散之法
雖甚詳後世用之者稀矣故予亦且措之
又方
救卒死方
薤搗汁灌鼻中

雄雞冠割取血管吹內鼻中

豬脂如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中雞肝及血塗面上以灰圍四旁立起太豆二七粒以雞子白并酒和盡以吞之

救卒死而壯熱者方

礬石半片以水一斗半煮消以漬脚令沒踝

救卒死而目閉者方

騎牛臨面搗薤汁灌耳中吹皂莢末鼻中立効

騎牛臨面如前千金方治卒死方云牽牛臨鼻上二百息牛舐必瘥又治魘死方云慎燈火勿令人手動牽牛臨其上一頭覺之類○皂莢千金方作皂莢是矣

救卒死而張口反折者方

炙手足兩爪後十四壯了飲以五毒諸膏散有豆者

五毒諸膏散未詳

救卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取一斗以洗之又取牛洞稀糞一升外溫酒灌口中炙心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯差

救小兒卒死而吐利不知是何病方

狗屎一丸絞取汁以灌之無濕者水煮乾者取汁

尸厥脉動而無氣氣閉不通故靜而死也治方脉證見上卷二

菖蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑着舌下

又方

剔取左角髮方寸燒末酒和灌令入喉立起

素問繆刺論云邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡

俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥髣髴其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已張介賓註曰五絡俱竭陰陽離散也身脉皆動筋惕肉瞤也上下離竭厥逆氣亂情無知故名尸厥髣髴同左角之髮五絡之血餘也燔治燒製爲末也飲以美酒助藥力行血氣也補以其類故可使尸厥立已

救卒死客忤死還魂湯主之千金方云主卒忤鬼擊覺或已無脉口噤拘不開去齒下湯湯下口不下者分病人髮左右捉搖肩引之藥下復增取一升須臾

立甦

麻黃三兩去節一方四兩　杏仁七十箇去皮尖　甘草一兩炙

千金用桂心二兩

右三味以水八升煮取三升去滓分令咽之通治諸感忤

又方

韮根一把　烏梅二十枚　吳茱萸半升炒

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沈者死煮取三升去滓分飲之

救自縊死且至暮雖已冷必可治暮至且小難也恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日以上猶可治之方

徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手以挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胸上數動之一人摩捋臂脛屈伸之若已殭但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦勞之須臾可以桂湯及粥清含與之令濡喉漸漸能嚥及稍止若向令兩人以管吹其兩耳深好此法最善無不活也

宗音釋云莫兮切深入也

凡中暍死不可使得冷得冷便死療之方

屈草帶繞暍人臍使三四人溺其中令溫亦可用熱泥和屈草亦可扣尾椀底按及車釭以着暍人取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當令溺其中欲使多人溺取令溫若湯便可與之不可泥及車釭恐此物冷暍既在夏月得熱泥土煖車釭亦可用也

喻昌曰暍者中暑之稱左傳蔭暍人於樾下其名久矣後世以動而得之爲中熱靜而得之爲中暑然則道途中暍之人可謂靜而得之耶動靜二字只可分外感內傷動而得之爲外感天日之暑熱靜而得之因避天日之暑熱而反受陰濕風露瓜果生冷所傷則有之矣時令小寒大寒而人受之者爲傷寒時令小暑大暑而人受之者即爲傷暑勞苦之人凌寒觸暑故多病寒暑安養之人非有飲食房勞爲之招寒引暑則寒暑無繇入也所以膏粱藜藿東南西北治不同也愚謂此說破千古之疑紛紛論不足用○屈草本艸云

味苦微寒無毒主胸脇下痛邪氣腸間寒熱
陰痺久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月
采

救溺死方

取鼈中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔
即活

右療自縊溺腸之法並出自張仲景爲之其意殊
絶殆非常情所及本艸所能關實救人之太術矣
傷寒家數有腸病非此過熱之腸見外臺肘後方
治馬墜及一切筋骨損方見肘後方

大黃一兩切浸湯成下
亂髮如雞子大燒灰用
敗蒲一握三寸
甘州如中指節炙剉
緋帛如手大燒灰
久用炊竈布一尺燒灰
桃仁四十九枚去皮尖熬

右七味以童子小便量多小煎湯成內酒一大盞
次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯
浴衣被蓋覆斯須通利數行痛楚立差利及浴水
赤勿怪即瘀血也

金匱要略註解卷之二十三大尾

元祿丁丑孟夏吉日

姉小路通堀川東江入町
書林　中川茂兵衛板

金匱要略註解後序

上古之醫者以割皮浣胃導筳抉膜能知病之肯綮矣後世之業醫者按脉處方次之以案杌針灸而不知察于四肢百骸病之所在攻之試用古方而後知疾病之深淺也故方誤則謬治然刓不研究方

書而復何為哉夫内經難經固不
言才伊尹制湯液方劑未知其傳
而漢張機著金匱要略一以藥石
治病實為群才之祖矣蓋永嘉之
喪亂存於灰燼之餘者醫卜也耳
也然晋唐之間數百年未聞有知
此書者迨宋王洙獲之于蠹簡中

或爛碎或闕略魯魚虎虎不死躋
駮高保衡林億等又從而是正諸
雖然醇疵渾淆群疑未渙讀者難
孚衆君潛心于此者殆六十年
每有得于心則操觚記之日積月
累為之註解嗚乎我家之敝帚蓋
之久矣第慮其言之不朽屬若俾

鏁之梓以廣其傳庶乎厥切愾于
涎寓也歟
元祿丙子春洛澨名古屋玄笥
謹跋

禮經軒