

賜板

訂正東醫寶鑑

十九

小兒

雜病篇十一

ヤ 9

905

21



門ヤ9
號905
卷21

653

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚 奉 教撰

小兒

小兒病難治

古語曰寧醫一丈夫莫醫一婦人寧醫一婦人莫醫一小兒蓋小兒難問證難察脉絡如絲脉息如毫易虛易實易冷易熱兼之口不能言手不能指疾痛之莫知其非觀形察色聽聲切脈究其病源詳其陰陽表裏虛實而能療之者蓋亦寡矣 得效

臟腑生成

夫一月之孕有白露之稱二月之胚有桃花也先生左腎則為女陽包陰也其次腎生脾脾生肝肝生肺肺生心以生其勝已者腎屬水故五藏

東醫寶鑑雜病篇十一

由是為陰其次心生小腸小腸生大腸大腸生膽
膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其勝已者小
腸屬火六府由是為陽其次三焦生八脉八脉生
十一經十一經生十二絡十二絡生一百八十絡
絡絲絡生一百八十纏絡纏絡生三萬四千孫絡
孫絡生三百六十五骨節骨節生三百六十五大
穴大穴生八萬四千毛竅則耳
目口鼻百骸之身皆備矣 醫鑑

初生解毒法

嬰兒在胎口中惡物兒纔生不候聲出
坐婆急用軟帛裹手指蘸黃連甘艸濃煎
汁拭去口中惡物若嘔入腹中必生諸疾。更以
煉蜜少許調朱砂末一字抹入口中令其嘔下則一
生免瘡痘之患 得效。朱蜜嘔下然後乃餵乳酌
量與之勿令大飽恐成吐乳良方。既縹裹了取
黃連甘艸煎汁以綿纏于口入兒口中令其嘔之
三日以來退惡物於大便謂之臍屎良方

初生洗浴法

三朝洗兒用虎頭骨桃枝猪膽金銀卷煎
湯洗之則兒少驚。尋常澡洗用猪膽汁
入湯中洗之即不生瘡疥良方。世俗以為小兒
體熱或遇澡浴即與久坐湯水之中風冷外傷本
溼內滲變成風搐可
不戒之直指小兒

初生斷臍法

子在腹中胞胎十月止於臍中與母通氣
雖出胞胎其臍中所通之氣猶未盡絕
臍之後招風致病者有之其法初生小兒綿裹臍
帶離肚五六寸先用軟綿纏住臍於線外將臍咬
斷片時去線待血流盡以手輕輕揉散艾灸臍頭
二三壯或五壯結作統絡軟帛裹切不可常時揭
看待臍根落去自然無事丹心。初生即將軟綿
貼臍根纏住待第三日離肚二指許將臍剪斷用
生薑自然汁或香油和麪裹臍四圍於臍頭以艾
灸二三壯謂之熏臍後不招風丹心。先斷兒臍帶
可只雷一寸許以線繫定然後洗浴不
然則溼氣入腹必作臍風之疾良方

擇乳母法

凡擇乳母須精神爽慧性情和悅肌肉充肥
無諸疾病知寒溫之宜能調節乳食乳汁濃

白則可以飼兒不得與姤母大段酸鹹飲食仍忌
纔衝寒暑來便餒兒如如此則必成痲癩或驚疳
瀉痢之疾良方。如陰陽交接之際切不可餒兒
姤此正謂之交姤必生癩良方。姤母不可頻飲
酒恐兒作痰嗽驚熱昏眩之疾良方。乳母宜謹
節飲食飲下咽乳汁便通情慾動中乳脉便應
病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則
瀉不瀉則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為
腹痛病之初來其尿必甚少便須詢問隨證調治
母安子安可消患於未形也東垣。夫飲食之擇
猶是小可乳母稟受之厚薄情性之緩急骨相
之堅脆德行之善惡兒能速肖尤為關係東垣
小兒乳哺法 人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如
道不可不謹東垣。凡初乳先須捏去宿乳後與
之。母欲寐即奪其乳恐睡困不知飽足也。兒
啼未定乳母勿遽以乳飲之恐停滯胃膈而成嘔
吐也。乳後不與食哺後不與乳乳食相併則難

以刻化結於腹中作痛大抵成癩成積成疳皆自
此始得效。小兒血氣俱盛食物易消故食無時
然腸胃尚脆而窄一切發熱難化之物皆宜禁絕
只與乾柿熟菜白粥非惟無病可以養德此外生
栗味鹹乾柿性涼可為養陰之助
然栗大補柿大瀉亦宜少與東垣

小兒保護法

凡嬰兒肌膚未實若厚衣過煖則傷皮膚
損血脉發瘡瘍汗出腠理不閉風邪易入
若天氣和暖抱之使見風日則氣血堅剛可耐風
寒不致疾病今人懷抱小兒不著地氣致令筋骨
緩弱疾病易生非愛護之道得效。夜間不得令
兒枕臂須作一二豆袋令兒枕兼左右附之可近
乳母之側蓋覆衣衾須露兒頭面若一向仰臥恐
成驚疾須時時回動之良方。天寒時兒用父母
常著舊衣作衣服不可用新綿絹只用舊者若太
溫煖則筋骨軟弱易致疾病良方。宜用七八十
歲老人舊襪舊襪改作小兒衣衫真氣相滋令兒
有壽富貴之家切不可宜新製紵絲綾羅之類與小

兒穿不惟生痲痲且折福回春。○初生三五月宜
糊縛令臥勿豎頭抱出六箇月方可與稀粥亦不
可與乳同
喫入門

養子十法

一、要背暖。二、要肚暖。三、要足暖。四、
要頭涼。五、要心胃涼。六、要勿見怪物。
○七、脾胃常要溫。八、啼未定勿便飲乳。
○九、勿服輕粉朱砂。○十、少洗浴入門。

調護歌

養子須調護看承莫縱弛。○乳多終損胃食
壅則傷脾胃。○被厚非為益本單正所宜。○無
風頻見日寒暑
順天時入門

變蒸候

小兒變蒸俗謂之牙生骨長比之如蠶之有眠龍
之蛻骨虎之轉爪皆同此類變生而長也 醫林
○小兒變蒸是胎毒散也 丹心 ○變蒸者陰陽水
火蒸於血氣而使形體成就是五藏之變氣而七
情之所由生也 蓋兒生之日至三十二日一變每
變蒸畢即覺性情有異於前何者長生藏府意氣

故也何謂三十二日長骨脈添精神人有三二百六
十五骨以象天數以應期歲以分子十二經絡故初
生至三十二日一變生腎六十四日二變一蒸生
膀胱九十六日三變生心一百二十八日四變二
蒸生小腸一百六十日五變生肝一百九十二日
六變三蒸生膽二百二十四日七變生肺二百五
十六日八變四蒸生大腸二百八十八日九變生
脾三百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手
少陽三焦無形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天
地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始
全也大倉公云氣入四肢長碎骨於十變是矣 錢
乙 ○變蒸既畢兒乃成人也 變者變生五藏也蒸
者蒸養六府也又云變者上氣蒸者體熱每經一
變一蒸輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂
而數或吐或汗或煩啼躁渴輕者五日解重者七
八日解其候與傷寒相似但變蒸則耳冷尻冷上
脣中心發白疱狀如魚目珠者是也治法和平之
劑微表之宜用惺惺散方見下 熱實則微利之宜

用紫霜丸方見下或不治亦自愈
切不可安投藥餌及鍼灸錢也

小兒繼病魘病

母有娠乳兒有病如瘵痢他日亦相繼

腹大或發或去取百勞鳥毛帶之一名

鷓即博勞也又以紅紗袋盛夜明砂與兒佩之

小兒生十餘月後母又有娠命前兒精神不

爽身體痿痺名為魘病魘音忌小兒鬼病也用伏

翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五次炙令香

熟嚼哺兒亦效伏翼即蝙蝠也聖惠婦人先有

小兒未幾能行而母更有娠使兒飲此乳則作鬼病

命兒黃瘦骨立發熱髮落千金論小兒魘病者是

也妊婦被惡神導其腹中如嫉小兒令生此病魘

亦小鬼也其證微微下利寒熱往來毛

髮鬢鬢不悅者是也宜服龍膽湯三因

龍膽湯 大黃煨二錢龍膽草柴胡黃芩桔梗鈞藤皮

赤芍藥赤茯苓甘草各一錢蛻蜋二箇右剉

作一貼水一升煮取五合去滓一月內兒服

一合十歲以下服二三合得下利即止千金

相兒命長短法

凡兒三歲以上十歲以下視其性氣高

過入者多夭○預知人意回旋敏速者亦夭○兒

骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神彫琢者壽

○初生叫聲連延相鬻者壽○聲絕而復揚急者

不壽○啼聲散啼聲淡汗不流頭四破小復凝如

脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人○臍中

無血者好○臍小者偏身軟弱如無骨者汗血者

多厄並不壽○鮮白長大卵縫通達黑者並壽○

目視不正數動者大非佳兆○早坐早行早齒早

語皆惡性非佳人○髮稀少者性強不聽人○額

上有旋毛妨父母或早貴○初生枕骨不成能言

而灰○尻骨不成能踞而灰○掌骨不成能匍匐

而灰○踵骨不成能行而灰○臑骨不成能立而

灰○身不收者灰○股間無生肉者灰○人中深


長者壽○陰不起者灰○陰囊下白者灰赤者亦

灰得效

虎口三關脉法

初生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子
 至五歲六歲曰嬰孩察三關脉三關在小兒男左手
 手女右手次指內有紅紋似線者為驗第一節名
 曰風關無脉則無病有脉則病輕○第二節名曰
 氣關脉見則病重尚可治○第三節名曰命關脉
 見則病極乃九死一生若直射三關青黑紋者死
 入門○第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋微乃
 火驚黑紋水驚青紋乃天雷四足驚內隱青紋微
 屈則是急風候○第二節紫色紋乃驚疳青色紋
 乃疳傳肝白色紋乃疳傳肺黃色紋乃疳傳脾黑
 色紋難安○第三節青黑紋三關通度斜歸指甲
 則不治得效○五色之中紅黃易安紅盛作紫紫
 盛作青青盛作黑青黑之色至純黑則不可治入
 門○歌曰紫風紅傷寒青驚白色
 疳黑時因中惡黃則困脾端本事

三關圖




三關在虎口次指
 之側第一風關第
 二氣關第三命關
 也決病輕重死生

診小兒脉法

小兒三歲至五歲以一指按掌後人迎氣
 口之脉常以一指六七至為常入門○七
 歲八歲曰齒九歲十歲曰齠始可以一指按三部
 脉而以一指息七八至為平十一至十四歲曰童卵
 以一指息五六至為常入門○小兒之脉以一指息六
 七至為平和八九至為發熱五至為內寒細目
 小兒脉亂不須治不須治藥也○弦急氣不和錢
 沈緩傷食○促急虛驚○浮為風○沈細為冷錢

觀形察色圖

乙。浮緩傷風洪緊傷寒數則為熱遲則為寒入門



左頰為肝右頰為肺天庭為心地閣為腎準頭為脾胃凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛。天庭為火色紅主大熱青乃肝風。印堂青者人驚紅白者水火驚紅者痰熱。印堂連準頭紅者三焦積熱。印堂至山根紅者心小腸熱山根至鼻柱紅者心胃熱。鼻居面中為脾紅黃色者無病。脾應唇

額上屬心火居南
左頰屬肝木居東
鼻準屬脾土居中
右頰屬肺金居西
頰下屬腎水居北

紅主渴。黃主傷食吐利。左太陽青色驚重紅色風搖眼目黑者。右太陽青色驚輕紅色傷寒黑者。地閣為腎色青食時驚或煩躁夜啼黃多吐逆紅者腎中氣病兩頰赤者肺熱。山根青黑頻見災厄必死。黑色痢疾赤黑色吐瀉黃色霍亂紅色夜啼紫色傷飲食。中庭天庭司空印堂額角方廣皆命門部位青黑為驚風惡候亦忌損陷入門

面上形證歌

痢疾眉頭皺驚風面頰紅渴來唇帶赤
毒熱眼朦朧。山根若見脈橫青此病
明知兩度驚赤黑困疲時吐瀉色紅啼夜不
曾停。青脈生於左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒
微燥熱黑青知是乳多傷。右邊青脈不須多
有。則頻驚怎奈何紅赤為風抽眼自黑青三日見聞
羅正傳

五體以頭為尊一面惟神可恃

目睫無鋒芒如魚目狀或兩眼閉而黑睛無運轉者或外若昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿輪睛明者少病眼白多睛珠或黃或赤者稟弱多病目證內赤者心熱淡紅者心虛熱青者肝熱淡者肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱也 入門

聲有輕重啼有乾溼

神驚也聲塞者痰也聲戰者寒也聲噎者氣不順也喘者氣促也噴嚏者傷風也驚哭聲沈不響者重也聲濁沈靜者疳積也如生來不大啼哭聲啾啾者天○火之大發忽然驚叫乃火動氣虛必於夜半發者多有口瘡宜看之 入門 ○睡中驚啼聲浮者易治聲沈不響者難痊或聲如鴉中彈者不治得效 ○直聲往來而無淚者是痛也連聲不絕而多淚者是驚也慈煎聲煩躁者難愈躁促聲音

小兒初生救急

有治法十八條 詳見婦人門

噤口撮口臍風證

皆通此胎中熱毒流於心脾一名鴉口瘡○鴉口瘡小兒初生有白屑滿口如鴉之口鼻外亦有不能吮乳由心脾熱也以亂髮纏指頭蘸薄荷汁拭淨如不脫用保命散朱礬散 入門 ○又法用一捻金散又亂髮纏指頭蘸井花水搽拭之又蘸粟扶煮汁 栗皮也 拭之湯氏 ○辰砂膏最妙方見下 ○又地雞搗水塗之 妙即鼠婦蟲也 ○又白楊樹枝燒取瀝付之神效 正傳

撮口

者面目黃赤氣喘啼聲不出乃胎熱流毒心脾則舌強唇青撮口聚面飲乳有妨用白僵蠶二枚略炒為末蜜調付唇口即差或用蝎梢散 入門 ○撮口者初生一臘內之篤疾 一臘三七日也 命

兒氣促口撮如囊而不乳也 直指小兒。治法牛黃一錢竹歷一合調和時抹口中即差宜風散亦可。用丹心撮口證若口出自沫四肢冰冷最為惡候一臘見之尤急得效。初生七日內患撮口臍風不得飲乳急看兒齒齦上若有小泡子如粟米狀急以手指蘸溫水輕輕擦破即開口。便安不用服藥。入門。小兒口撮不開南星末一錢腦子少許研勻調薑汁以指蘸擦兒牙齦上開口立開。綱目

臍風 者小兒斷臍後為風溼所乘或尿溼襁褓遂成臍風面赤喘急啼聲不出其證臍腫突腹脹滿日夜多啼不能飲乳甚則發搐撮口撮口宜用調氣益黃散甚者用金烏散或宜風散。入門。亦有熱在胃堂伸引努氣亦命臍腫發風宜千金龍膽湯。入門。臍風撮口不得飲乳宜蝎梢餅宜風散。入門。凡臍邊青黑爪甲黑者死。得效。初生七日內見撮口撮口臍風三證者危百日內見此證手足踈者亦不治。入門。

臍腫臍瘡治法

臍腫以荊芥煎湯洗淨後取蔥葉火便消方服通心飲。入門。斷臍後為水溼所傷或入風冷致冷四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜用柏墨散五通膏香螺膏。錢。臍中血水汁出或赤腫痛當歸日石脂末乾蝦蟆燒灰油髮灰皆可。行。入門。斷臍作瘡日瘡枯龍骨煨當歸末皆可。糝。上。或油調。付。之。妙。綱目。

保命散

治鵝口瘡不能吮乳枯白瘡朱砂各一錢馬牙硝五錢右為末每取一字用白鵝糞搗水調塗舌上及口內。日三次即效。入門。

朱礬散

治同上朱砂白礬枯右等分。為細末付口舌上。日三次。局方。

一捻金散

治同上雄黃三錢鵬砂一錢甘草半錢龍腦少許右為末乾糝或蜜調塗之。丹心。

蝎梢散

治撮口風及一切胎風臍風蝎梢四十九枚每箇用生薄荷葉卷定以線扎之砂鍋內滾

炒以薄荷乾酥為度再入白蠟蚕四十九箇薑汁炒乾入腦麝各少許右為細末調勻以紫雄雞肝二片煎湯調下一字入門

宣風散

治臍風撮口多啼不乳口出白沫全蝎二十箇全者酒炙為末入麝香末一字和勻每煎湯調下丹心

調氣益黃散

治噤口撮口臍風三證金頭赤足蜈蚣一條酒浸炙蜈蚣四箇白蠟蚕七箇炒瞿麥五分右為末每一字以鵝翎管吹入鼻中噴嚏啼哭則可治仍用薄荷煎湯調一字服之錢乙

金烏散

治臍風金頭赤脚蜈蚣半條酒浸炙川烏尖三箇生麝香少許右為末每取半字以金銀器煎湯調下入門一名麝香散得效丹心

通心飲

治旋螺風赤腫而痛清心火通小便退潮熱連翹木通瞿麥梔子仁黃芩日州各四分右

栢墨散

治臍風臍腫多啼不能乳哺黃栢末釜下墨亂髮灰各等分為末乾糝之或油調付之錢乙

五通膏

治臍風撮口生地黄生薑蔥白蘿蔔子田螺肉右共搗爛搭臍上四圍一指厚抱住下尻泄而愈醫鑿

香螺膏

治臍風腫硬如盤田螺三箇入麝香少許右搗爛搭臍上須臾再易腫痛立消醫鑿

客忤中惡

客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未識見之人觸之或經神廟佛寺與鬼神氣相忤也故謂之客忤其狀口吐青黃白沫或下水穀鮮雜面變五色腹痛反側痰涎狀似驚癇但眼不

上鼠耳其口中懸雍左右若有小小種核即以竹鐵刺瀉之或以指爪摘破急作醋炭皂角燒烟熏之卻服蘇合香丸方見氣門薑湯調化頻與服之次服雄麝散兼用黃土散得效中惡者其狀卒

東醫寶鑑雜病篇十一

然心腹刺痛悶亂欲死人中青黑即服蘇合香丸未醒以皂角末吹鼻兼用辟邪膏又以唾和麝香一錢重研和醋一合服之即差錢乙○客忤取豉三合水溼搗為丸雞子大摩兒顙上及足心各五六遍次摩臍心及上下良久中自有毛於路上即擲之得效○中馬汗氣或馬鳴驚忤取馬尾燒烟熏兒面以差為度入門

雄麝散

治客忤雄黃一錢乳香五分麝香一字右為末每一字刺雄雞冠血調灌之仍以母衣覆

兒身即愈入門

黃土散

治小兒卒客忤竈心黃土蚯蚓糞各等分右研細水調塗兒頭上及五心良得效

辟邪膏

治小兒中惡降真香白膠香沈香虎頭骨人參鬼箭羽州龍膽各五錢右為末入雄黃五錢麝香一錢煉蜜和勻作膏取少許以乳香湯化下兒口中又冷兒帶及燒臥內尤妙錢氏

夜啼

小兒夜啼有四證一日寒二日熱三日口瘡重舌四日客忤○寒則腹痛而啼面青白口有冷氣手足冷腹亦冷曲腰而啼又曰下半夜啼者蓋夜則陰盛寒則作痛所以夜半後啼也宜用六神散益黃散方見下○熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹煖或有汗仰身而啼又曰上半夜仰身有汗而啼面赤身熱者必痰熱也到曉方息導赤散方見五下○加黃芩煎服通心飲方見上亦可○口瘡重舌則吮乳不得口到乳上即啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡則舌必重也照口瘡重舌類治之其啼自止○客忤者犯客忤夜啼或觸生人氣忤犯而啼有日啼驚夜必黃昏前後尤甚者乃客忤中惡也錢氏安神丸主之方見下○依客忤法治之○月內夜啼驚搖者乃胎中受驚所致宜用猪乳膏鎮驚散有痰者抱龍丸方見下○小兒夜啼作心經有熱有虛治之宜用燈心散黃連飲蟬花散綱目○夜啼不止蟬蛻二七枚去足為末入朱砂末一字蜜調送下綱目○又法潛取雞窠卵一

握置小兒臥席下即止丹心○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾入門

六神散 治腹冷痛夜啼白茯苓白扁豆炒各二錢人參白朮山藥炒各一錢甘草炙七分右為鹿末每取一錢入薑三棗一二水煎服得效

猪乳膏 治胎驚夜啼琥珀防風各一錢朱砂五分分為末猪乳汁調二字抹兒口中入門

鎮驚散 治同上朱砂牛黃麝香各少許右合細研猪乳汁調稀抹入口金嘔下回春

燈心散 治小兒心燥夜啼燈花三四顆研細以燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三四次一方燈花七枚鵬砂一字朱砂少許研細蜜調抹唇上立止三四因一名花火膏正傳

黃連飲 治心經有熱夜啼人參二錢黃連一錢甘草取汁灌口中

蟬花散 治小兒夜啼狀若鬼祟蟬殼下半截為末初生兒抄一字薄荷湯入酒少許調下即止或以上半截為末依湯調用叩復如初古人格物之妙如此永類

五臟所主虛實證 虛則補其母實則瀉其子必先實母後瀉子也○凡五臟各至本位即氣盛不可更補到所剋位不可更瀉如肝病到春不可補到秋不可瀉餘倣此錢乙

心主驚 實則叫哭發熱飲水而搐○心氣熱則合面而臥實則仰臥也益實則氣上下澁若合面而臥則氣不得通故喜仰臥使氣得上下通也○心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水○心主熱實則煩熱錢乙○心實發搐難言合面而臥煩熱故上竄舌強故欲言不能而叫哭胃熱故欲合面而臥就涼宜瀉心湯導赤散見五藏○虛則困臥悸動不安生犀散方見下主之錢乙

肝主風 實則目直視大叫呵欠項急煩悶○實則兩皆俱緊不轉直視凡目青必發驚咬牙甚者

亦發驚，手循衣領，亂捻物，甚則身強，反張，宜瀉青丸。方見五藏。○虛則咬牙，呵欠，目連劄，不搖，宜地黃丸。方見五藏。○肝病，風搖，拘急，實則風搖，力大，瀉青丸主之。虛則風搖，力小，六味地黃丸主之。錢
脾主困 實則困，睡身熱，飲水。○脾病，困，睡，泄，瀉，不思飲食。○實則多，睡，體重，昏倦，困，睡，不露睛，身熱，渴，欲飲水，泄瀉，赤黃色，宜瀉黃散。方見五藏。○虛則吐瀉，生風，或泄瀉，白色，睡，露睛，或有痰，宜錢氏白朮散。方見下。

肺主喘

實則悶，亂，喘，促，有飲水者，有不飲水者。○肺主燥，自病，則喘，嗽，實則喘，而氣盛，或渴，宜瀉白散。方見五藏。○虛則哽，氣長，出氣短。○肺病，悶，亂，哽，氣長，出氣短，虛則唇，白色，喘，而少氣，先服益黃散，後用阿膠散。二方並見五藏。○肺藏怯，則唇，白色，當補肺，阿膠散主之。若悶，亂，氣，喘，促，哽，氣者，難治。肺虛損，故也。○脾肺病久，則虛，而唇，白，脾者，肺之母也。母子皆虛，不能相營，故曰怯。此以唇診肺之法也。唇，白色者，肺藏怯也。錢乙。

腎主虛

無實。○腎病，目無精光，畏明，體骨重。○腎虛證者，兒本虛怯，由胎氣不盛，則神氣不足，目，中，白，睛，多，顫，解，顫，開，面色，既白者，皆為難養，雖長，不過八八之數，若恣色慾，則不及四旬，而亡，或有因病而致腎虛者，非此類也。○又腎不足，下竄，蓋骨重，惟欲墜下，而身縮也。腎者，陰也，腎氣虛，則畏明，皆宜補腎，六味地黃丸主之。方見五藏。○腎主寒，自病，則足脛寒，而逆入之五藏，惟腎無實，但小兒瘡疹，變黑，陷，則是腎實，水剋心火也。錢乙。○腎虛者，下竄，足熱，下竄者，骨重，惟欲墜下，而縮身也。足熱者，不喜覆衣也。○心氣熱，則上竄，宜導赤散，腎氣虛，則下竄，宜地黃丸。入門。

五臟相乘

凡五藏自病者，為正邪。○妻乘夫，為微邪。○乘妻，為賊邪。錢乙。○所謂乘者，猶乘車之乘，五藏相乘，莫測，如肝病，必先治肺，補腎，然後審肝，藏虛。

實而調之。餘藏微此。入門。○從前來者為實邪。即子乘母也。○從後來者為虛邪。即母乘子也。○從所勝者為微邪。即妻乘夫也。○從所不勝者為賊邪。即夫乘妻也。又詳見審病門。難經。○五藏傳變皆痰為患。益痰乃風苗。火靜則伏於脾。火動則壅於肺。痰火交作。則為急驚。或成嗽。痰火結滯。則為痼。鈞或為咳嗽。痰火來去。則為瀉。青皆由脾滯而成。所以驚風忌純用風藥。宜以養血藥為使。古方保元湯。加白芍藥。為慢驚美劑也。入門。

驚風證

小兒之病急慢驚風與夫痘疹等證最為酷疾。以其急凶反掌。生死須臾。故也。正傳。○小兒驚風三發則為痼。乃惡證也。入門。○小兒疾之最危者無越驚風之證。驚有急驚慢驚脾風三者之異。醫鑿。

驚風先見之證

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青積漸而生風也。得效。○驚邪入

心則面紅臉赤惕惕夜啼。○驚邪入肝則面目俱青眼睛竄視。○驚邪入腎則面黑惡叫啞姦咬牙。○驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏。○驚邪入脾則面色淡黃嘔吐不食。直小。○凡乳兒欲發驚風者先神志不定恍惚懼人。劄眼上視左顧右盼伸手握拳悶鬱努氣情態不如尋常皆驚風先證也。直小。○咬牙甚者發驚。○目直視面色青身反折者生驚。○呵欠面青者驚風。○呵欠面黃者脾虛驚。○目赤兼青者發搐。○肝藏實熱手尋衣領亂捻物目直視必發驚。○肝有風目連劄不搐有熱則目直視亦不搐得。心熱則搐。○肝主風風動而上於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不定兒不任故目連劄也。若熱入於目牽其筋脉兩皆皆緊不能轉視故目直視也。若得心熱則搐其子母俱有實熱風火相搏故也。錢乙。○王氏曰木能勝土熱動心神而生驚。○錢氏曰肝風心火二藏交爭而致。稽也。正傳。

驚有四證八候

四證者驚風痰熱也小兒熱盛生痰

急而八候生焉直小○其肝主風其脾生痰其肺作熱其心發驚四證相臨重者先發直小○八候者一搐二掣三掣四顛五反六引七竄八視也搐者兩手伸縮掣者十指開合掣者勢如相撲顛者頭偏不正反者身仰向後引者臂若開弓竄者目直似怒視者睛露不活直小○又云一搐者臂肘搐縮○二掣者十指開合掣之不巳即成握拳男子看大姆指其指握在外為順在裏為逆女子反看之○三掣者肩膊搐掣或連身跳起○四顛者或手或脚或頭或身四體顛動○五反者身百反張○六引者以手有如挽弓狀男左手直右手曲為順右直左曲為逆女子反看之○七竄者眼上竄視高男子上竄為順下竄為逆女子反看之○八視者男子斜目視左為順視右為逆視女子反看之直小

驚風大抵熱論虛實證別逆順治有後先

蓋實熱為急驚虛熱為慢

驚慢驚本無熱所以熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也○男搐左視左女搐右視右○男眼上竄女眼下竄○男握姆指出外女握姆指入裏○男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難痊故曰證別逆順者此也○熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也○凡搐痰因氣鬱氣順則痰化而搐自止先以蘇合香丸方見下以薄荷湯入薑汁化下或星香散方見下入門

驚搖之證有五

驚搖一也而有晨夕之分表裏之異身
熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚
仆地作聲醒時吐沫者為癇頭自仰視者為天吊
角弓反張者為瘥治各不同也。因潮熱變為搖
在早晨寅卯辰時者肝旺也當補腎治肝補腎地
黃丸治肝瀉青丸。因潮熱發搖在巳午未時者
心旺也當補肝治心補肝地黃丸治心導赤散亦
驚丸方見下。因潮熱發搖在申酉戌時者此肺
用事之時也是肝旺當補脾益黃散治肝瀉青丸
治心導赤散益脾病肝強法當補脾恐木賊害故
先瀉心肝以挫其強而後補脾。因潮熱發搖在
亥子丑時者此腎用事之時也當補脾治心補脾
益黃散治心導赤
散亦驚丸錢乙

搐搦瘈瘲輕重

百日內發搐真者不過兩三次必成假
者頻發不為重真者內生驚癇假者外
傷風冷益氣血未實不能勝任乃發搐也欲知假
者口中氣出熱治之可發散大青膏主之方見下

○錢乙。其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無
痰涎者多是外感或內傷夾驚而成謂之假搐非
內生驚癇也宜參蘇飲方見寒門人參羌活散方
見下。○搐搦者手足牽引一伸一縮即瘈瘲之
甚者也。河間。○閻孝忠曰以搐而不甚搐此名瘈
瘲。○凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難
治。○急驚初則搐搦俱作久而搐住只搦有急有
緩但只肩動瘈瘲瘈瘲者候之輕也搐則盛也極
又重也
直小

驚搖有聲無聲

驚癇發搐男發搐目左視無聲石視有
聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝
故也更有發時證。○又曰男反右視女反左視亦
皆有聲錢氏。○男為木故左視木位無聲右視金
位相擊則有聲女為金故右視金位無聲左視木
位有聲相擊故也。易。○一童子三歲發搐自卯至
巳目右視大叫哭錢氏曰此逆也男為陽木發左
視無聲則順右視有聲則逆所以然者左肝木也

右肺金也逆則二藏相戰金木相擊而有聲也治
空瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝
不能任故叫哭也當瀉其肺
後治其心續治其肝

驚風發搐不可把捉

小兒急驚方搐時不用驚擾此不
足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方
搐時但扶持之不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋
脉或至手足成拘攣也細目○小兒搐搦時切勿
把捉手足握持太急必半身不遂也當其搐時置
一竹簞鋪之涼地使兒臥其上其任其搐風力行遍
經絡勢極自止不至傷人子○一小兒病手足
搐搦戴人曰心火勝也勿持捉其手任其搐搦此
由乳母保護太過所致乃令淨掃地以水洒之令
極溼臥兒于地上良久渾身轉側泥漿皆滿仍以
井水洗之
即差子和

胎驚癇風

者乃孕婦嗜慾忿怒驚撲或傷風邪兒初生
下即嘔吐搐掣口眼喎斜驚啼聲短眼縮顛

開或煩赤或面青噤口咬牙眼合涎潮筋骨拘攣
身腰強直臍腹腫起與噤口撮口同證視其眉間
氣色紅赤者生青黑者死辰砂膏最妙
乳膏鎮驚散
見上方
太乙散亦佳
入門

辰砂膏

治胎驚癇風及噤口風辰砂三錢玄明粉二
錢鵬砂馬牙硝各一錢半全蝎真珠末各一
錢麝香一字右為末油紙封裹自然成膏每取一
豆許薄荷湯調下或乳汁調塗乳頭上念兒吮之
入門

太乙散

治胎驚天漿子天南星白附子天麻防風白
茯苓各二錢全蝎朱砂各一錢麝香一字右
為末每取五分
乳汁化下入門

急驚風

急驚者因聞大聲或大驚而發搐過則如故此
無陰也當下之宜利驚丸○急驚者內有熱即
生風或因驚而發涎潮搐搦身體與口中氣皆熱
及其發定或睡起即了了如故用藥利下痰熱心

神安寧即愈 錢乙 ○急驚乃卒然得之心受驚肝
主風致筋脉搖擗肝又主筋宜通心飲 方見上瀉
青丸涼驚丸大青膏得效 ○急驚者因聞不常之
聲或遇禽獸之吼以致牙關緊急壯熱涎潮竄視
反張搐搦顛動口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤
其脉浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受
熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二臟交爭
血亂氣併痰涎壅塞所以百脉凝滯關竅不通風
氣蕃盛而無所泄故暴烈也 直小 ○治法通關截
風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已後急須
和胃鎮心 ○截風定搐先與開關散嚏驚散次與
驅風膏鎮心丸鎮肝丸錢氏安神丸鎮驚丸保幼
化風丹靈神膏痰盛宜抱龍丸截風丸鎮安心神
宜金箔鎮心丸寧心膏 ○所謂溫驚丸利驚丸涼
驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則涼之是謂活
法 直小 ○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫
若作陽證則又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫
膽湯下大驚丸小驚丸得效 ○急驚先當定搐搐

由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚驚熱若
不引退驚亦不散 ○急驚截風定搐為要風搐既定
次與下熱熱去則無
風風散則不搐 直小

利驚丸

治急驚身熱面赤口中氣熱大小便黃赤宜
下用此黑丑頭末五錢天竺黃青黛輕粉各
一錢右為末蜜丸豌豆大一歲
兒用一丸薄荷湯化下 錢乙

溫驚丸

治急驚虛證牛膽南星四兩天竺黃一兩朱
砂一錢半胭脂胚半錢龍腦五分右末牛膽
汁和丸芡實大砂糖水化
下 ○一名粉紅丸 錢乙

涼驚丸

治急驚風黃連一兩州龍膽防風青黛各三
錢龍腦五分牛黃麝香各一字右為末麪糊
和丸粟米大每取一二
十丸金銀泡湯下 錢乙

瀉青丸

治肝熱急驚搐搦 方見五截 ○一名涼肝
丸緣肝主風宜先涼肝而風自退得效

大青膏

治急驚風，用此發散，白附子一錢，半天麻青黛各一錢，烏蛇肉，蝎梢各半錢，朱砂天竺黃麝香各一字，右細末，生蜜和成膏，月內兒，糝米大半歲兒，半皂子，大一歲兒，一皂子，大以薄荷竹葉煎湯化下，得效。

開關散

治驚風口噤不開，蜈蚣一條炙，白殭，蚕，南星炮各一錢，麝香一字，猪牙皂角三錠，略燒存性，右為末，以手點薑汁，蘸藥少許，擦牙，或用物引滴入藥三兩點於口中，涎出自開，得效。

嚏驚散

治急驚慢驚昏迷不省，半夏生一錢，皂角半錢，右為末，取豆許吹入鼻中，即醒，得效。

驅風膏

治肝風發驚，搐及胎風，辰砂，蝎梢，當歸，川龍膽，川芎，梔子，大黃，羌活，防風，甘州各一錢，右為末，入麝香少許，砂糖和丸，艾實大，每二丸，薄荷竹葉蜜湯化下，丹心。

鎮心丸

治急驚風，安心，止驚散，邪涼，隔山藥，白茯苓，朱砂各五錢，人參一錢，半龍腦，麝香各五分，右為末，蜜和，每二兩作五十丸，金箔為衣，薄荷湯下，一丸，錢一。

鎮肝丸

治急驚風，熱天竺黃，生乾地，黃當歸，竹葉，川龍膽，川芎，大黃，煨羌活，防風各一錢，半右為末，蜜丸，艾實大，每二丸，砂糖水化下，綱目。

錢氏安神丸

治急驚風及心熱驚啼，麥門冬，馬牙硝，白茯苓，山藥，寒水石，甘州各五錢，朱砂三錢，龍腦二字，右為末，蜜和，兩作三十丸，每服一丸，砂糖水化下，得效。

鎮驚丸

治急驚風，鎮驚，寧神，退熱，化痰，牛膽，南星，五錢，朱砂三錢，半琥珀，天竺黃，雄黃各五錢，牛黃二錢，真珠一錢，麝香半錢，金箔十片，右為末，麝糊和丸，梧子，大金箔為衣，薄荷薑蜜湯下，五六十丸，正傳。

保幼化風丹

治驚風四證八候去風痰驚熱兩星半
夏川烏白附子各一兩鬱金五錢右為
末裝入臘月黃牛膽內陰乾百日取出研為末每
一兩入雄黃朱砂鵬砂煇研各一錢片腦麝香各
少許共為末蜜丸豌豆大燈心
薄荷湯研化下入一二丸醫整

靈神膏

赤茯神朱砂各一兩麥門冬五錢麝香一錢
半石為末蜜和作小餅子每一餅臨睡以薄
荷湯化下神效○一老醫乃三世小兒科家傳只
有四五藥愈病無數如小兒驚搐多是熱證不宜
便用驚風藥只以導赤散方見五藏加防風竹葉
同煎用二三貼導去心經邪熱其搐便止次服靈
神膏
集驗

抱龍丸

治驚風潮搐身熱昏睡能下痰熱乃心肺用
藥也牛膽製南星一兩無膽星則只取生者
剉炒熟用之天竺黃五錢雄黃朱砂各二錢半麝
香一錢右為末煮甘州膏和丸皂莢子大一云

實大溫水化下百日內兒一丸作三次服五歲
一二丸服臘雪水煮甘州和藥尤佳錢乙○抱者
保也龍者肝也肝為母心為子母安則子安
況心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生丹心

截風丸

治驚風痰搐天麻白僵蚕南星炮各二錢蜈
蚣一條白附子防風朱砂全蝎各一錢麝香
一字右為末蜜丸梧子大
每丸薄荷湯化下入門

金箔鎮心丸

治驚風鎮安心神至蝎七箇以薄荷葉
包裹慢火炙乾天麻防風羌活牛黃赤
茯苓犀角朱砂麝香甘州各一錢右為末蜜丸
子大金箔為衣每取一二丸薄荷湯化下入門

寧心膏

治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭睡中
驚魘朱砂二錢人參白朮白茯苓茯神山藥
羌活甘州各一錢龍腦麝香各一字右為
末蜜丸大以薄荷湯化下丸丹心

防風溫膽湯

治驚風消痰順氣半夏枳殼赤茯
苓各五分陳皮防風各二分半人參二

分甘州一分半右到作一貼入生薑一片紫蘇二葉煎水調下大驚丸小驚丸服之得效

大驚丸

治驚風安神定驚又治心熱夜啼酸棗仁去

朱砂麥門冬木香代赭石醋煮各二錢半白僵蚕

桔梗尾各一錢二分半全蝎三箇金銀箔各三片

小驚丸

治驚風鬱金皂角水浸煮黃連馬牙硝木香

糊和丸梧子大以雄黃朱砂麝香金銀箔為衣薄荷湯化下一二丸得效

急驚風不治證

眼睛翻轉口中出血兩足擺跳肚腹極動摸體尋衣神昏氣促噴藥不下通關

不噤心中熱痛忽大

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼慢騰騰或露睛手足瘰癧面色青白

益

渾身四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃

散加防風冬瓜仁煎服得效○慢驚者因吐瀉日久中氣太虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便

白昏睡露睛目上視手足瘰癧益脾虛則生風風盛則筋急宜用黃芪湯溫白丸正傳○陰證慢驚

自急驚陽證傳來纔經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開

半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有時牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉

或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病因吐瀉得者宜加味水附湯醒脾散養乳方虛風痰多

宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方傳慢候而尚有陽證八候尚在不必回陽

但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽用硫黃附子如腦麝銀粉巴硝輩一切禁

斷入門○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚直小○瀉滑青者宜防慢驚益瀉青色者乃夾驚

木剋土也。○凡兒瀉出青色者，由脾土受肝木剋勝而見本色，由其藏之虛寒，黃芪益黃散主之。○小兒慢驚或吐利不止，變成虛風搐搦者，非風也，胃氣欲絕，故也用來復丹。方見寒門。五粒研碎，水飲送下，即效。得效。○慢驚宜用溫驚丸，神效。散觀音散，全蝎觀音散，三味天漿子散，補脾湯，保生丹，延生丹，參朮半夏湯，防風丸，銀白散。諸方。○涎盛宜奪命散。方見下。雙金丸，南星飲。諸方。

白朮散 治吐瀉日久不止，津液枯竭，煩渴引飲，欲成慢驚，風葛根二錢，人參白朮白茯苓木香藿香甘艸各一錢，右鹿末每二錢水煎，任意服。○泄瀉加山藥白扁豆肉豆蔻已成慢驚，加天麻細辛全蝎白附子。○驚風泄瀉煩渴，皆津液內耗也，不問陰陽，多煎滿意，取足飲之，彌多彌好。○一名錢氏白朮散。錢乙。○一名清寧散。得效。

益黃散 治慢驚風，黃芪二錢，人參陳皮各一錢，白芍藥七分，生甘艸炙甘艸各五分，白茯苓四分。

黃連二分，右麤末，水煎時時服。○一名黃芪益黃散。凡驚兒瀉，青色大禁，涼驚丸。益風木旺，必剋脾土。當先實其土，後瀉其木也。當於心經中以甘溫補土之源，更於脾土中瀉火，以甘寒補金，以酸涼使脾土中金旺，火衰，則風木自虛矣。東垣。

黃芪湯 治慢驚風，大便泄，青色，黃芪二錢，人參一錢，甘艸炙五分，右作一貼，水煎服。加白芍藥一錢尤效。○此證風木旺，必剋脾土，宜先實其土，後瀉其木，是為神治之法。○一名保元湯。東垣。

溫白丸 治慢驚風，白僵蚕炒，白附子生，南星炮，各一兩，天麻生五錢，全蝎一錢，右為末，麪糊和丸。菜豆大，生薑米飲下，五七丸至二十丸。錢乙。

加味朮附湯 治吐瀉後變成慢驚，或因藏寒洞泄，得木香甘艸炙各五錢，右鹿末每二錢，薑上二棗二水煎服。入門。

醒脾散

治脾困昏沈吐瀉不止漸成慢驚人參白朮白茯苓白附子白僵蚕天麻木香甘艸各五分全蝎二分半右鹿末每二錢薑二棗一水煎漸漸服不可頓服綱目

釀乳方

治慢驚風人參木香藿香沈香陳皮神麴麥芽各一錢丁香五分右剉作一貼入薑五片紫蘇五葉棗三枚同煎乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥霎時次命兒吮數口不可過飽如嘔定急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散此良法也如此調理無不愈者湯氏

八仙散

治慢驚虛風天麻白附子白花蛇肉防風南星半夏麴冬瓜仁全蝎各二分半加川烏一分右剉作一貼入薑二棗一薄荷二葉同煎服湯氏

烏蝎散

治慢驚純陰證吐瀉不止四君子湯方見氣門加川烏全蝎南星各一錢右剉入薑三棗一水煎服

蟬蝎散

慢驚風陽證尚在宜用此藥全蝎七箇蟬退二十箇南星一箇甘艸二分半右鹿末每錢入薑三片棗二枚水煎服入門

神效散

治慢驚風歌曰一粒丁香一箇蝎一字辰砂一點血○右三味俱為末男用男左手中指血女用女右手中指血蘸藥末擦兒唇上即愈綱目

觀音散

治脾困多瀉不思乳食精神昏困四肢冷欲成慢驚人參一錢蓮肉神麴各二分白茯苓一分半白朮黃芪木香白扁豆甘草各一分右剉入薑二棗一藿香三葉同煎服入門

全蝎觀音散

治吐瀉後成慢驚風亦治慢脾風即前方加羌活防風天麻全蝎也入門

三味天漿子散

治慢驚風天漿子白僵蚕全蝎各三枚右為末每一字薄荷湯調下直小

補脾湯

治慢驚風白朮一錢三分白芍藥酒炒一錢白茯苓半夏各七分陳皮黃芪蜜水炒人參

當歸川芎肉豆蔻煨乾葛神麴炒各五分黃連炒
甘艸炙各三分右剉作一貼水煎稍稍服醫鑿

保生丹

治慢驚風朱砂天麻白附子炮白僵蚕炒全
蝎微炒各二錢乾薑炮牛黃麝香各一錢右
為末蜜丸麻子大薄
荷湯下三丸直小

延生丹

治同上南星炮二錢半朱砂牛黃羌活各一
錢二分半麝香六分蝎梢七枚白僵蚕三枚
右為末棗肉和丸棗豆大
薄荷湯化兩丸服之直小

參朮半夏湯

治慢驚風子母俱服人參白朮各二錢
半夏天麻各七分白茯苓陳皮各五分
細辛薄荷甘艸各二分全蝎炒一
枚右剉作一貼薑三水煎服正傳

防風丸

治慢驚風天麻防風人參各五錢全蝎白僵
蚕甘艸各二錢半朱砂雄黃各一錢七分半
右為末蜜丸芡實大人參
湯或冬瓜仁湯化下得效

銀白散

治慢驚風祛風助胃蓮肉白扁豆白茯苓各
二錢白附子炮人參天麻全蝎炒木香藿香
甘艸炒各一錢陳米炒三錢右鹿末每二
錢入薑二片冬瓜仁七粒同煎服得效

南星飲

治慢驚脾困涎盛不思乳食大南星一箇炒
赤冬瓜仁白扁豆薑汁炒各三錢右為末每
二錢以薑二片防風
少許同煎服得效

雙金丸

治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞
多睡露睛口鼻氣冷欲成慢驚風金液丹
見寒門與青州白丸子方見風門等分同碎生薑
米飲調灌之惟多服乃效雖至危者往往灰中得
生十數八九沈存中云金液丹治吐利垂絕服之
得活須多服方驗綱目○一云金液丹真小兒吐
瀉之妙劑也入門

驚風治驗

一小兒吐瀉諸醫以藥下之至虛變成慢
驚其候昏睡露睛手足瘳痠而身冷錢氏

身冷... 錢曰... 脾已實... 腎尚虛... 慢驚風不治證

慢驚風不治證

與瓜蒌湯... 錢曰此因涼藥利小便致脾腎俱虛... 慢驚風四肢厥冷吐瀉咳嗽面黯神慘... 搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎頭軟大小便不禁手足... 一慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸鹿大... 此不識覆燈將絕之候雖不下藥亦無生意矣

急慢驚風通治

宜備急丸牛黃抱龍丸保命丹至聖保命丹千金散星香散朱粉散奪命散探生散

備急丸

治急慢驚風五月五日取白頸蚯蚓不拘多少去泥焙乾為末加朱砂等分糊丸菜豆大... 金箔為衣每一丸白湯下... 中斷之看取急跳者治急驚慢跳者治慢驚各另... 研爛和朱砂末作丸菜豆大分... 二器貯之記而用之神妙丹心

牛黃抱龍丸

治急慢驚風痰嗽潮搐能鎮驚安神牛... 膽南星一兩天竺黃五錢雄黃辰砂各... 二錢半麝香真珠琥珀各一錢牛黃五分金箔十... 片右細末水煎甘草膏和丸艾實大金箔為衣每... 三歲兒服一丸五歲二丸十歲服三五丸薄荷湯... 化下醫鑒○此方與上鎮驚丸同而錢數異醫鑒

保命丹

治急慢驚風尚有陽證者常服安神化痰全... 蝎十四箇防風南星蟬退白僵蚕天麻琥珀... 各二錢白附子辰砂各一錢麝香五分有熱加牛... 黃片腦各五分右為末粳米飯搗丸皂子大金箔

為衣乳汁或薄荷湯化下丸入門

千金散

治急慢驚風痰喘雖至灰但灌藥下咽即活黃連天麻朱砂各四分全蝎白僵蚕各三分牛膽南星甘州各二分牛黃龍腦各六釐右為末每用五七釐薄荷燈心湯調下回春

星香散

治急慢驚風搐搦視涎潮南星炮二錢半木香橘紅各一錢全蝎二箇右剉作二貼薑四片水煎頻灌大便去涎即愈得效

朱粉散

治急慢驚風歌曰一粒朱砂一片雪輕粉也七箇僵蚕三箇蠅不問驚風與慢風服時須用生人血乳汁也○右先將蠅微炒燥取出待冷同砂粉研為細末卻以母乳汁調抹於兒口內立效十三方

奪命散

大能控風痰不問急慢驚風痰寒咽喉其響如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但

用此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也青礞石一兩同煇硝一兩入鍋內火煇待硝盡候礞石如金色取用右細末急驚風身熱用薄荷汁入蜜調微溫服其藥自裏痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服去風退熱截驚等藥慢驚極危者用此藥以青州白丸子再研為末薑汁調煎如糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服蛇蝎蜈蚣川烏等藥○此藥治急慢驚利痰之聖藥以器盛水吐痰水上以藥少許擦之痰隨藥而下須用木香湯調下湯氏○礞石雖利痰非胃家所好故以木香佐之能暴痰從大便出而無糞來不動藏府始知藥妙入門

探生散

治急慢驚風諸藥不效用此吹鼻定其伏生雄黃沒藥各一錢乳香五分麝香一字右為末吹少許入鼻如眼淚鼻涕俱出者可治醫鑿

至聖保命丹

治急慢驚風及胎驚天吊南星炮三錢膽星尤佳白附子防風天麻蟬殼白僵

蚕炒各二錢麝香半錢全蝎十四箇右為末飯丸梧子大朱砂為衣每一丸薄荷湯化下直小

慢脾風

慢脾風由慢驚後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間痰涎凝滯虛熱往來其眼合者乃脾困氣乏神迷也世所謂慢風難療者是也直小。若見眼合即是脾風。慢驚察視為要眼睛昏定為重竄視為重四肢厥冷為重睛定不取為重雖取不左右顧亦重汗出如流亦重口面忽作懸顰色至重眼在半合半開之間乃知陰氣所盛傳入藏間陽氣已微脾經屬陰夫第入脾故言慢脾風候。慢驚其眼半開半合則當預作慢脾風調理之。慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沈微陰氣極盛胃氣極虛救一二蓋由慢驚風而傳變宜用黑附湯救之又生附四君子湯蝎附散皆可直小。慢脾風用藥乃不得已也其危如

燈無油漸見昏滅錢氏用金液丹與青州白丸子各半研勻飯飲薄荷湯下一錢半此截風回陽也直小。小兒頭雖熱眼珠青白而足冷。頭雖熱或腹脹而足冷。頭雖熱或泄瀉而足冷。頭雖熱或嘔吐而足冷。頭雖熱或渴而足冷已上五證作搐者名曰慢脾風速與補脾益真湯加全蝎一枚或全蝎觀音散方見上直小

黑附湯

治慢脾風危急者附子炮三錢木香一錢半白附子一錢甘草炙半錢右剉分一貼入薑五水煎以匙灌下若手足煖而甦省即止得效

生附四君子湯

治慢脾助胃回陽四君子湯料加生附子末等分右剉二錢入薑五片水煎以是灌口中手足煖即止方見氣門錢氏

蝎附散

治慢脾風回陽豁痰附子炮二錢南星炮白附子炮木香各一錢全蝎七箇右剉取一錢

薑五煎
服得效

補脾益真湯

治慢脾風，丁香、木香、訶子、皮、陳皮、厚朴、

夏附子、炮甘、艸、炙、各二分、全蝎、炒、一枚、右、剉、入、薑、

慢脾風不治證

身冷、粘汗、直臥、如尸、喘嗽、頭軟、背直、

如牽繩之聲者，不治。直小。○慢脾風若也。一藏絕，

即不可用藥。如眼無光、指甲黑、四肢垂、驛五體俱、

天吊驚風

孫真人曰：乘馬遠行，當沐浴更衣，然後方可。

近於嬰兒，否則多為天吊。急驚之疾，錢仲陽、

曰：步履、蠶穢之氣，無使近於嬰兒。金兒急驚風，搗、

也。類聚。○天吊亦驚風之證，但天吊發時，頭自仰、

視驚風則無也。綱目。○小兒瘈瘲不定，翻眼戴睛、

狀若神祟，頭目仰視，手足抽掣，如魚之上釣，故曰、

九龍控涎散

治天吊、蜈蚣一條、酒塗、炙、臘茶、雄黃、

各一錢、菉豆半生半炒、一百粒、右為末、每半錢、人參、薄荷湯調下。醫林。

釣藤散

治同上。人參、犀角各五分、全蝎、天麻各二分、

有釣藤一、味甘、艸、一分、右剉、水煎服。入門。

釣藤膏

治驚風內釣。木香、薑黃各一錢、乳香、沒藥各、

一錢半、木鼈子肉、五箇、右為末、蜜調成膏。收、

罐內，以釣藤煎湯或薄荷湯化下。少許。入門。

瘧

瘧與瘧亦驚風之類。瘧者手足冰冷瘧者舉身強直瘧瘧本一病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗其證肢體強直腰身反張甚於風癇太抵不治直小。身軟時醒者為瘧身反張強直如弓不時醒者為瘧十無一生

癩

驚風三發則為癩癩者小兒惡病也大人日癩小兒日癩其實一也又日十歲以上為癩十歲以下為癩人門。驚癩即急驚之證但驚癩發時仆地作聲醒時吐涎沫急慢驚則不作聲不吐沫也。綱目。癩者卒然暈倒日瞪流涎神氣鬱勃四肢搐搦沈默昏憤似死似生其聲惡叫過後惺惺直小。錢氏方有五癩病關五藏用五色丸方見神門。○治法惟以驚風食三種陰陽二證別而治之。○驚癩者恐師積驚而發啼叫恍惚宜定魄丸沈香天麻湯。○風癩者風邪外襲先屈手指如數物乃發宜追風祛痰丸方見神門。○食癩者乳食時遇驚停積或成癖或大便酸臭宜紫霜丸。○始也身

熱神掣手啼叫是為陽癩易治宜龍腦安神丸清心滾痰丸二方並見神門。○始也身無熱手足清冷

不抽掣不啼叫是為陰癩難治宜五生丸引神歸舍丹二方並見神門。○因急驚為癩宜三癩丹。○

因慢驚成癩取來復丹方見寒門。薄荷泡湯化下。一二丸得利即愈入門。○又有胎中受驚成癩宜

燒丹丸方見神門。○癩病左煎耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急用爪破須令血出啼叫尤

得氣通易效也直小

定魄丸

治因驚發癩人參琥珀茯神遠志朱砂天麻石菖蒲天門冬酸棗仁甘艸各等分右為末

蜜丸皂子大朱砂為衣每下丸燈心薄荷煎湯化下人門

沈香天麻湯

治小兒因驚成癩發搐痰涎壅塞目多活五分獨活四分防風天麻半夏附子炮各三分

沈香益智川烏炮各二分薑屑當歸甘艸各一分

半右剉作一貼入薑三片水煎服先灸兩臍脉各二十七壯寶鑒

紫霜丸

治食癩及腹中有食積痰癖吐乳音顯不

巴豆三十粒去皮油杏仁五十箇去皮尖右先將杏仁泥巴豆霜入二石末相和搗千杵若硬入少蜜貯密器中月內兒服麻子大一粒乳汁化下百日內服小豆大○食癩用此取積並不虛人凡兒有熱不欲飲乳眠睡不寧常常驚悸此皆發癩之漸即以此藥導之減其盛勢則無驚風釣癩之患矣入門○一方楮石二錢巴豆二十一粒去皮油杏仁二十一箇右末飯丸粟米大二錢乙

二三癩丹

治急驚為癩蜈蚣一條牛膽南星二錢全蝎麝香一字金銀箔各三片右為末糊丸梧子

疳病

疳者乾也瘦瘁少血也兒童二十歲以下日疳十歲以上日勞皆由氣血虛憊藏府受傷故有五

藏疳外有蛔疳脊疳腦疳乾疳疳渴疳瀉疳痢腫脹疳無辜疳丁奚疳露疳治之各有方其病多因乳哺失常肥甘不節腸胃積滯而得之故其為證頭皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口淡唇白兩眼昏爛揉鼻得日脊聳體重聞甲咬牙焦渴自汗漩白瀉酸肚脹腸鳴結癖潮熱或身多瘡疥嗜啜瓜果酸鹹炭木泥土多飲水者是也惟腎疳害人最速蓋腎虛受邪疳奔上焦故以走馬為驗初作口臭次傳齒黑齲爛熱血迸出甚則齒脫宜急治之縱得全活齒不復生矣得效○疳乾疳渴疳勞疳瀉疳痢疳腫皆五疳之危證日蛔疳腦疳香疳無辜疳丁奚疳疳露疳皆五疳之證所以然者五藏俱病故也入門○大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疳久病者為瘦冷疳冷熱交作者為冷熱疳當分治之錢乙○疳病因多食肥甘所致故命名曰疳正傳○凡兒大便色白小便濁如米泔此疳病也同春○諸疳皆依本藏補其母假令日中發潮熱是心虛熱也肝為心母法當先補肝母肝

實而後瀉。心得其氣，則
內平而潮熱自愈矣。錢乙

五臟疔

一曰肝疔。其證搖頭揉目，白膜遮睛，合面而臥，
肉色青黃，髮立筋青，腹中積聚，下痢頻多，轉甚
羸瘦。又曰肝疔，一名風疔。白膜遮睛，或雀目昏暗。
○二曰心疔。其證渾身壯熱，吐利無常，頰赤面黃，
口舌生瘡，痢久不痊，多下膿血。有時虛驚，又曰心
疔，一名驚疔。苦要驚啼，常與水。○三曰脾疔。其證
腹多青筋，乳食不多，心腹脹滿，面色萎黃，骨立毛
焦，乳食不消，好與泥土，痢多酸臭。又曰脾疔，亦曰
食疔。面黃腹大好，食泥土，身有瘡疥。○四曰肺疔。
其證咳嗽氣逆，皮毛乾焦，鼻甲壯熱，憎寒口
鼻生瘡，頰頰泄利，糞中米出，皮上粟生。又曰肺疔，
亦曰氣疔。咳嗽氣急，口鼻生瘡。○五曰腎疔。其證
肌肉消瘦，齒齲生瘡，寒熱時作，腦熱如火，腳冷如
冰，乳食減少，瀉痢頻作。又曰腎疔，又名急疔。言五
疔中惟腎疔為最急，即走馬牙疔也。亦曰骨疔。喜
臥冷地。○五疔通用五疔保童丸疔積餅消疔丸

○心疔 舌乾 肝疔 疔疔 乾肺疔 口乾肺
疔 聲乾 腎疔 尿乾 通用 連膽丸 入門

五疔保童丸

治五藏疔黃連白鱈頭 無則蕪蕪代之
雄黃麝香青黛天漿子熊膽蘆薈胡黃連各二錢
半 蟾頭一枚炙黃色 右為末 飯丸 麻子大一歲兒
米飲下 一
二丸 局方

疔積餅

治五疔諸積使君子肉一兩白朮黃連各三
錢 青皮陳皮山楂肉神麩炒麥芽炒三錢 煨
蓬朮煨木香各二錢 半縮砂檳榔肉豆蔻訶子肉
甘艸炙各二錢 茴香炒川線肉夜明砂炒各一錢
半 乾蟾一箇右為末 白麩三斤炒黃以砂糖五兩
水煮化 和勻得所印作餅子 每重一錢 每服二三
餅 任意嚼吃 米
飲送下 醫鑿

連膽丸

治五乾疔黃連五錢 猪膽汁浸瓜萐根烏梅
肉蓮肉杏仁各二錢 右為末 牛膽汁浸糕和

丸麻子大每十五丸烏梅薑蜜煎湯下入門

消疳丸

治五疳蒼朮陳皮厚朴枳殼檳榔神麩炒山查肉麥芽炒三稜煨蓬朮煨縮砂茯苓黃連

炒胡黃連蕪荑使君子蘆薈各等分右爲末蒸餅和丸彈子大茶飲化下一丸同春

諸疳

疳有熱疳冷疳熱疳蛇疳腦疳脊疳走馬疳無辜疳丁奚疳哺露疳又有疳渴疳勞疳瀉疳痢疳腫疳瘡洗藥諸方

熱疳

疳病初起臉赤唇焦潮熱如火大便秘澀者爲熱疳宜胡黃連丸入門○熱疳黃瘦雀自夜不見物或生瘡宜五福化毒丹局方龍膽丸入門

冷疳

疳病久則目腫面鰲腹脹滑泄或青或白或如垢膩者爲冷疳宜至聖丸入門○冷疳多渴好臥冷地煩躁啼叫大便滑泄漸成羸瘦宜木香丸使君子丸疳在內目腫腹脹痢色青白無常漸瘦

弱此冷證也錢乙

冷熱疳

冷熱交互非新非久宜消積和胃滋血調氣用如聖丸錢乙

蛔疳

因缺乳喫粥飯肉食太早或甘肥過多化爲蛔虫多啼嘔沫腹痛唇紫蛔雖食虫卻不可動動從口鼻出者難治凡疳積久莫不有虫宜服下虫丸入門

腦疳

腦疳者鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦聖惠○頭皮尤急頭髮作穗或有頭瘡腫至顛顛腫則多損眼頂軟倒肥而不瘦附子生天南星右爲末薑汁調攤貼患處又鯽魚膽滴於鼻中三五日效湯氏

○腦疳滿頭餅瘡腦熱如火顛腫顛高遍身多汗宜龍膽丸

脊疳

小兒疳積漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如錐宜服蘆薈丸露星膏湯氏○脊疳者虫蝕脊骨如錐齒拍背如鼓鳴十指背生瘡煩咬爪甲煩熱黃瘦下利宜蘆薈丸入門

走馬疔

腎疔又名急疔多因痘後餘毒更加乳食不調甘味入脾而生虫上蝕齒齦則口瘡出血臭氣甚則齒根潰爛齒黑脫落顯有穴者名曰走馬疔言陽明熱氣上奔如馬然下蝕腸胃則下痢肛爛其證腦熱肌削手足如冰爪黑面鰲甚者天柱骨倒宜腎氣丸方見虛勞加使君子川練肉入門○走馬牙疔宜用乳香丸立效散銅青散尿白散綱目

無辜疔

無辜疔者其候面黃髮直時時世熱飲食不生肌膚積經日月遂至於死言天有鳥名曰無辜晝伏夜遊兒家洗浣衣襦露天經宿或遇此鳥飛過落羽所汚而與兒穿臥使令有此疾也又腦後有核初生軟而不覺痛其中有虫如米粉不速破去則熱氣漸長虫隨氣血流散侵蝕藏府肌肉作瘡或大便泄膿血漸漸黃瘦頭大髮豎手足細弱宜用月蟾丸十全丹連丸綱目

丁奚疔

丁奚者腹大頸細黃瘦是也丁者手足與項極小伶仃也奚者腹大也甚者尻高肉削臍

突胃滿或生穀癥愛喫生米土炭等物服十全丹布袋丸入門

哺露疔

虛熱往來頭骨分解反食吐虫煩渴嘔噦骨瘦稜層露形蓋丁奚哺露皆因脾胃久虛形體瘦削亦由胎稟所成盡皆無辜種類並難治大體相似宜用十全丹布袋丸入門

疔渴

疔病日則煩渴引飲乳食不進夜則渴止宜用連膽丸入門

疔勞

骨蒸潮熱盜汗咳嗽泄瀉肚硬如石面色如銀斷不可治宜連膽丸加蝦蟆灰救之入門

疔瀉

身瘦面黃有瘡疥或食泥土瀉青白黃沫或如垢膩或所瀉爛如泥宜至聖丸入門

疔痢

疔在內則目胞腫腹脹痢色無常錢乙○疔癩黃白積或見五色下無時度漸加瘦瘠宜使君

子丸木香錢乙

疔腫

小兒疔病虛中有積身面浮腫肚腹脹大宜肥兒丸脹甚者宜褐丸子錢乙

疔瘡

脾疔腎疔皆身有瘡疥無辜疔虫氣流散肌肉
作瘡肺疔鼻下生瘡○疔病遍體生瘡乃虫蝕
皮膚宜服蘆薈丸月蟾丸化蠶丸猪
肚黃連丸玉蟾散洗疔瘡藥 入門

胡黃連丸

治熱疔胡黃連黃連各五錢朱砂二錢半
右細末填入猪膽內用淡漿水於砂鉢內
懸胎煮一飯時許取出入蘆薈青黛蝦蟆灰各二
錢麝香一分右為末飯丸麻子大米飲下三五丸
至一二十
丸 入門

五福化毒丹

治熱疔多生瘡癤及痘瘡餘毒口齒出
涎血臭氣或雀目夜不見物玄參一兩
桔梗八錢人參赤茯苓馬牙硝各五錢青黛二錢
半甘艸一錢麝香五分金箔銀箔各八片右為末
蜜和每兩作十二丸金銀箔為衣一歲兒一丸分
四服薄荷水化下雀目陳粟米泔水化下 丹心

龍膽丸

治熱疔龍膽艸黃連青皮使君子各等分右
為末猪膽汁和丸蘿蔔子大熟水下 一二十

丸局方

至聖丸

治冷疔木香厚朴使君子陳皮肉豆蔻各二
錢丁香香丁香皮各一錢右為末神麴糊和丸
麻子大米飲下七丸
至一十九十五丸 入門

木香丸

治冷疔木香青黛檳榔肉豆蔻各二錢半麝
香一錢半干金子去皮炒一兩蝦蟆晒乾燒
存性右為末蜜丸茶豆大每三五丸至一二十丸
薄荷湯下○一女子得疔疾百藥無效與此藥不
數服而愈後用
無不獲效 錢乙

使君子丸

治冷疔使君子麩裹煨去殼一兩厚朴訶
子皮半生半煨甘艸炙各五錢陳皮去白
一二錢半右為末蜜丸芡實大每九米飲
化下三歲以下服半丸乳汁化下 錢乙

如聖丸

治冷熱疔黃連胡黃連蕪荑使君子肉各一
兩麝香五分乾蝦蟆五箇酒浸煮成膏右五

味爲末和膏丸如麻子大人參湯下二三歲兒五七丸錢匕

下蟲丸

治蛔疳乾蝦蟆灰三錢苦練根皮貫衆木香桃仁蕪荑檳榔各二錢鶴虱一錢輕粉半錢使君子肉五十箇右爲末糊丸麻子大每二二十九丸肉汁下得效

龍膽丸

治腦疳龍膽升麻苦練根防風赤茯苓蘆薈油髮灰青黛黃連各等分右爲末猪膽汁浸糕和丸麻子大薄荷紫蘇湯下一二十九丸入門

蘆薈丸

治脊疳龍膽升麻黃連蕪荑各一兩先炒蕪荑黃色次入一味同炒赤色右爲末別入蘆薈二錢半和勻爛飯和丸黍米大一歲兒二十九丸二歲兒二十一丸米飲下湯氏

露星膏

治同上黃芪蜜水炒胡黃連地骨皮柴胡各等分右爲末蜜丸芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去酒薄荷湯浸服之湯氏

乳香丸

治走馬牙疳如神乳香輕粉砒礪各五分麝香少許和丸如黃米大臨臥將藥填患處至明即愈忌食醬鹽醋網目

立效散

治走馬牙疳青黛黃柏白礬枯五倍子各一錢右爲末先以米泔漱口糝之丹心治同上白芷五錢銅綠二錢半馬牙疳一錢麝香一字右爲末乾糝之得效

尿白散

治走馬牙疳雖遍口齒落唇穿者亦效人中白火煨白礬枯白梅肉燒存性各二錢右爲末先用韭菜根陳艾煎濃汁以雞翎蘸汁刷去腐肉洗去鮮血然後付藥日二三次入門

月蟾丸

治無辜疳蝦蟆一箇打殺置桶中以尿浸之卻取糞蛆一杓入內任蛆食一日夜取出以布袋繫之於急流水中浸一宿瓦上焙乾入麝香一字爲末飯丸麻子大每二十九丸米飲下一服虛煩退再服湯止二三服瀉任入門

十全丹

治丁寒喘露無辜壞證陳皮青皮蓬朮川芎五靈脂白豆蔻檳榔蘆薈各五錢木香使君子蝦蟆灰各三錢右為末以猪膽汁浸

二連丸

治無辜疔黃連胡黃連蕪荑青黛各五錢乾蝦蟆一箇酒浸去骨焙右為末糊丸粟米大

布袋丸

治丁寒喘露無辜疔夜明砂蕪荑使君子各二兩蘆薈人參白朮白茯苓甘艸各五錢右為末湯浸蒸餅和丸彈子大每一丸用絹袋盛之次用精猪肉二兩同煮候肉爛熟提起藥掛風扇陰乾只用肉和汁與兒食之次

褐丸子

治疔腫腹脹蘿蔔子一兩黑丑頭末半生半炒七錢半青皮陳皮三稜蓬朮五靈脂赤茯苓檳榔各五錢胡椒二錢半木香一錢半右為末麪糊和丸茶豆大每取十五丸蘿蔔煎湯下治五

疔入痢肌瘦腹大者如神丹心

化膿丸

治肺疔鼻流臭汁汁流處隨即成瘡名曰疔膿宜用此蕪荑蘆薈青黛川芎白芷胡黃連黃連蝦蟆灰各等分右為末猪膽汁浸糕和丸麻子大杏仁湯下

玉蟾散

治諸般疔瘡乾蟾燒灰三錢黃連二錢青黛一錢麝香一字右為末先以甘艸湯洗後塗之妙

猪肚黃連丸

治疔瘡自發提至弱冠潮熱發瘡乃疔氣使然疔虫食其肌膚肌膚空虛疔熱流注遍身熱瘡發歇無已雄猪肚一具洗淨黃連七兩剉右黃連入猪肚中線縫密頓在五升米上蒸十分爛取入臼中入些飯擣干杵衆手丸如茶豆大米飲下二三十丸冠者倍之

木香丸

治疔瘡黃連三錢木香厚朴縮砂夜明砂炒各二錢訶子肉一錢右末飯丸麻子大薑湯

下十五
丸得效

洗疳瘡藥

得效

甘艸黃柏馬鞭艸連根蔥荊芥穗煎湯溫洗後訶子燒灰人麝香輕粉各少許糝之

諸疳通治藥

通治宜用肥兒丸疳積餅方見上五疳消食丸消疳丸方見上十味蘆薈丸五

疳保童丸方見上

肥兒丸

凡疳病以肥兒丸疳積餅為主此藥消疳化積磨癥清熱伐肝補脾進食殺虫胡黃連五

錢使君子肉四錢半人參黃連薑汁炒神麴炒麥芽炒山楂肉各三錢半白朮白茯苓甘艸炙各三錢蘆薈碗盛泥裹糠灰火煨透一錢半右為末黃米糊和丸菜菔大末飲下醫鑿

五疳消食丸

通治諸疳殺虫退熱磨積進食使君子草龍膽麥芽陳皮蕪荑神麴黃連山楂

肉各等分右為末陳米飯和丸人門

十味蘆薈丸

治諸疳殺虫和胃止瀉退熱胡黃連雷

錢蟬退十箇麝香五分右為末猪膽汁浸人門

疳眼

小兒疳眼雀目或昏膜不見物或流膿宜煮肝丸龍膽飲子綱目

煮肝丸

治疳眼昏膜不見物夜明砂青蛤粉穀精艸各等分右細末小兒一錢七歲以上二三錢猪

肝一大片批開糝藥麻線縛定米泔半碗煮肝熟取出肝湯則傾碗內熏眼取肝分三次嚼訖祀以肝湯下綱目一日三服十日必退如大人雀目空心服至夜便見物綱目

龍膽飲子

治疳眼流膿神效青蛤粉蛇脫皮穀精艸各五錢羌活艸龍膽各三錢麻黃二錢半

黃芩炒升麻各二錢鬱金甘艸各半錢右末每二錢茶清調下綱目

東坡醫寶 疳積病 卷一

三十七

諸疳不治證

肝疳目帶青左脇下硬多吐沫眼頭黑者
不治。心疳耳邊有青脉舌上有焦點者
不治。脾疳肚大青筋唇口無血色人中平下痢
不止者不治。肺疳咳逆氣急瀉白水身上黑癩
者不治。腎疳要喫鹹醋喫水不住小兒如粉汁
齒黑有瘡骨出耳乾腦焦不治。網日。如五乾俱
見身上粟生斑黑者必死。入門。如疳勞疳瀉面
槁色天骨露齒張腹硬不食皆危篤證也。得效。○
疳渴飲水不止舌黑者死。○疳勞氣促
者死。○疳瀉痢脫肛咳逆者不治。入門。
有肝熱心熱脾熱肺熱腎虛熱潮熱驚熱痘熱變
蒸熱疳熱驚痘變疳四熱見上積熱見下胎熱骨
蒸熱痰熱癰熱風寒熱壯熱實熱虛熱。○面上左
腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎赤色者
熱也隨證治之。○身熱不飲水者熱在外身熱飲
水者熱在內也。○小兒熱病六一散。方見暑門。妙
藥也寒水石散亦佳。○凡熱證疎利後或和解後
無虛證勿溫補熱必隨生。錢乙。○諸熱通用小兒

諸熱

清心丸天
乙丸入門

肝熱

肝熱者手尋衣領亂搥物左腮
赤瀉青丸。方見五藏。主之。入門。

心熱

心熱者口中氣溫或合面臥及眼上竄額
赤搖頭咬牙導赤散。方見五藏。主之。入門。

脾熱

脾熱者面黃肚大怠惰嗜臥身熱飲水
鼻赤色瀉黃散。方見五藏。主之。入門。

肺熱

肺熱者咳嗽寒熱壯熱飲水喘悶右
腮赤色瀉白散。方見五藏。主之。入門。

腎熱

腎虛熱者下竄長明頰赤色
地黃丸。方見五藏。主之。入門。

潮熱

潮熱者似潮有信每日應時而發過時即
止宜用通心飲。方見上。甘露飲梨漿。飲。入門。

胎熱

胎熱者胎中受熱生下而面赤眼閉大便秘小
便赤黃不飲乳宜用生地黃湯及釀乳方以喂
之。湯氏。

骨蒸熱

骨蒸熱者肌瘦頰赤口乾潮熱盜汗五心煩躁宜用地仙散方見火門生犀散錢乙

痰熱

痰熱者面赤身熱喘咳胃膈不利咽喉有痰聲宜抱龍丸方見上○錢乙

瘧熱

瘧熱者一日一發或二三日一發寒熱往來宜梨漿飲入門

風寒熱

風寒熱者發熱不歇身熱口中氣壯熱者遍身發熱一向熱而不已其則發驚搐宜通心飲方見上人參羌活散入門

實熱

實熱者身熱飲水大小便祕澀宜清涼飲子方見火門○入門

虛熱

虛熱者身熱不飲水大小便如常宜服地骨皮散入門

寒水石散

治小兒諸熱利小腸去心熱下驚涎寒水石滑石各一兩甘州二錢半右為末每錢暑月冷水調下寒月溫湯調下得效

甘露飲

治潮熱寒水石石膏鬱金薄荷甘州各等分右為末每一錢薄荷湯調下得效

梨漿飲

治同上青蒿童便浸一宿曬乾柴胡人參黃葉生地黃一寸右剉作一貼水煎服入門

生地黃湯

治胎熱生地黃赤芍藥川芎當歸瓜蒌根各一錢半右剉作一貼水煎乳母食後服以飼乳並畧與小兒服之湯氏

釀乳方

治同上澤瀉二錢生地黃一錢半猪苓赤茯苓茵陳天花粉甘州各一錢右剉作一貼乳母食後煎

生犀散

治骨蒸熱犀角地骨皮赤芍藥柴胡乾葛日各三分右鹿末入薄荷五葉水煎服之得效

人參羌活散

治傷風寒發熱羌活獨活柴胡前胡枳殼桔梗人參赤茯苓川芎甘州各二分

天麻地骨皮各一分右剉作二

地骨皮散

服錢乙

治虛熱知母半夏柴胡人參地骨皮赤茯苓甘艸各三分右為鹿末入薑三片水煎

小兒清心丸

治諸熱及驚熱煩躁人參茯苓神防風朱砂柴胡各二錢金箔三十片右為末蜜

丸梧子大每一丸竹瀝調下直小

天乙丸

凡小兒生理今天一生水之妙凡冷病以水

道通利為捷徑此方清心利小便所以散火也凡小兒蘊熱丹毒驚風痰熱變蒸發熱之病用之最當而嘔吐瀉利無不冷也燈心一兩六錢以朱粉漿水洗晒乾為末入水澄之浮者為燈心取二錢半入赤茯苓白茯苓神各一錢七分滑石猪苓各二錢半澤瀉三錢右為末用人參一兩煎膏和丸如櫻桃大朱砂為衣金箔裹之每一丸以

燈心麥門冬湯或

薄荷湯化下入門

積癖

食積者凡小兒失乳以食餉之未有食腸不能消化致成食積腹脹瘦弱痢色無常東垣積證有傷乳傷食而身體熱者惟肚熱為甚晝夜間有熱者傷積之明驗也永類小兒積證面黃腫腹脹多嘔小腹如油小腹黃小腹內虛鳴多睡亦白痢下多瀉凡有積滯須辨虛實實者可服進食丸消食丸虛而有疳瘦者宜服肥兒丸方見上小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疳寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之以其有癥癖故金兒不食脾胃虛而發熱故引飲也錢乙癖塊者僻於兩脇痞結者否於中脘皆因乳哺失節飲食停滯邪氣相搏而成也回春乳食積宜用七聖丸厚腸丸白餅子方見上癖塊宜用紫霜丸方見上六味三稜丸廣朮化癖丸千金消癖丸化癖如神散愛與泥土宜清胃

養脾湯治不喫

泥方 細目

進食丸

消癖積木香枳殼當歸代赭石朱砂各三錢
巴豆霜一錢麝香五分右為末麪糊和丸黍

米大一歲兒取一二三

丸米飲吞下 局方

消食丸

治宿食不消消乳積食積香附子炒五錢
砂陳皮三稜蓬朮神麪麥芽各二錢半右為

末神麪糊和丸麻子大一依上法

服之 湯氏 一名消乳丸 回春

七聖丸

治乳食積三稜蓬朮川練子青皮陳皮芫花
杏仁泥各等分右先用醋浸芫花一宿炒漸

乾次入蓬朮同炒赤色又入陳練再炒令微焦取

出為末入杏仁泥和勻醋糊和丸黍米大一歲兒

常服二丸臨臥溫湯送下使日間所食之物一夜

而化永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒 湯氏

厚腸丸

治乳食積腹脹瘦弱枳實麥芽神麪末各五
分橘紅半夏蒼朮人參各三分厚朴青皮各

二一分右為末麪糊和丸麻子
大溫水下 二二三 東垣

白餅子

腹中有癖則不食但飲乳此主之滑石輕粉
白附子南星炮各一錢為末巴豆二十四粒

去皮膜水一升煮水盡為度右研勻糯米飯和丸

如菘豆大捏作餅子三歲以下一二餅三歲以上

三五餅蔥白湯下 錢氏 一名玉餅子一名白丰

餅入門 人乳味甘戀膈易於停積小兒之病多

繫於此此方南星以酸痰輕粉滑石

以瀉溼熱巴豆去積所以為妙 丹心

六味三稜丸

治未喫食小兒有癖積者蓬朮三稜並
煨神麪麥芽並炒青皮陳皮各等分右

為末麪糊和丸菘豆大

白湯下 二二三 丹心

廣朮化癖丸

治乳癖食癥木香五錢代赭石煨醋座
當歸炒朱砂研枳殼炒蓬朮三稜並炮

各二錢半麝香巴豆霜各一錢二分半右為末

麪糊和丸麻子大一歲兒米飲下 二二三 丹心

千金消癖丸

治小兒癖塊，水缸花字微炒，神麩炒，麥芽炒，各四錢。人參、白朮、白茯苓各三錢。使君子、胡黃連、山楂肉、香附子、三稜、蓬朮、醋炒，各二錢。蘆薈、阿魏、青黛、木香、檳榔、厚朴、陳皮、甘州，各一錢。右將阿魏研水，和麩打糊，和丸。菜豆、大白湯下，三四十九丸。回春。

化癖如神散

治痞塊積聚，蟾酥、黃蠟各二錢，巴豆肉一錢，粉、龍腦各一分。右為末，丸如菜字，大每用一丸，以鍼刺破患處，用藥貼上一伏，時揭起，其痞化膿，血出盡而愈。回春。

清胃養脾湯

治小兒愛喫泥土及脾虛胃熱所致，石膏一錢，陳皮、白朮、赤茯苓、甘州、黃芩各二分。右剉作一貼水，煎時時服之。回春。

治喫泥方

治小兒喫泥土及腹肚，腰音讓，服一也。賦粉一分，砂糖、棗和丸。麻子、大空心、米飲下。

吐瀉

丸瀉出，土即差。綱目。小兒食土，取好土，濃煎黃連，取清汁，搜和，日乾，與眼即止。名曰黃金餅。回春。
小兒吐瀉，泄黃傷熱乳也。吐瀉，泄青傷冷乳也。皆當下白餅子主之。方見上。下後傷熱乳者，玉露散。傷冷乳者，益黃散。方見五藏。服之。正傳。初生月內吐瀉，宜朱砂丸。後以朱沈煎調之。初生吐瀉，大便色白，停乳也。紫霜丸下，後用香橈餅。吐瀉昏睡，露睛者，胃虛熱也。宜白朮散。方見上。和中散。吐瀉昏睡，不露睛者，胃實熱也。宜益元散。方見暑門。玉露散。暑月吐瀉，身熱，宜玉露散。或五苓散。方見寒門。益元散。各半調服。寒月吐瀉，身冷，宜益黃散。方見五藏。理中湯。方見寒門。吐瀉有寒，痰半粟散主之。小兒初生，拭口中穢惡，不盡，噉入喉中，故吐不止。宜用木瓜丸。如吐驟，或瀉完，穀者，傷風甚也。凡傷風，多作吐瀉者，風木好侵脾土，故也。宜大青膏。方見上。吐瀉不止，危甚者，用燒鍼丸。經年吐乳，眼慢，糞穢，有筋膜者，乃父母交感時，喫乳所致。名曰交精吐，宜用益黃散。五

疳保童丸方見上。吐瀉久將成慢驚風互用和胃丸雙金丸方見上。錢乙。小兒吐瀉通用助胃膏最妙湯氏

玉露散

治暑月吐瀉身熱或煩渴石膏寒水右各五錢生甘艸一錢右細末或半錢或一錢溫水涼水任下錢乙

朱砂丸

治初生兒吐瀉此因穢惡入胃中所致朱砂南星巴豆霜各等分右為末糊丸黍米大以薄荷湯化下一二九後

朱沈煎

朱砂二錢藿香三錢滑石五錢丁香十四粒右為末以新波水一盞入麻油滴成花抄藥五分在須臾墜下澄去水別用溫水下一月內生嘔先用朱砂丸下之次用朱沈煎墜其邪氣使穢物自下而不為嘔也綱目

香橘餅

治初生停乳吐瀉木香橘皮青皮各二錢半厚朴神麩麥芽縮砂各五錢右為末蜜丸茶實大每一丸以紫蘇煎湯或米飲任下入門

和中散

和胃止吐瀉定煩渴人參白朮白茯苓甘艸炙乾葛黃芪白扁豆炒藿香各二分半右鹿末作一貼入薑五片棗二枚水煎服錢乙。一方治腹痛泄瀉厚朴一錢白朮五分乾薑甘艸各三分水煎服亦名和中散正傳

半粟散

治吐瀉沫或白綠水者胃冷宜用此半夏薑製二錢陳粟米一錢右作一貼入薑十片水煎服正傳

木瓜丸

治初生吐不止木瓜麝香木香檳榔膩粉各一字右為末麪糊和丸如黍米大甘艸湯下一二九

良醫寶鑑卷之十一

燒鍼丸

治內傷乳食吐瀉不止危甚者黃丹朱砂白礬各等分右為末棗肉和丸芡實大每一丸用燒鍼於燈焰上燒存性乳汁或米飲化下此藥清鎮專主吐瀉醫鑿

和胃丸

治吐瀉不止欲吐慢驚丁香白朮各一兩半夏五錢藿香蝎尾各一錢右為末薑汁糊和丸小豆大一歲兒十丸薑湯化下細目

助胃膏

治小兒吐瀉和脾胃進乳食最妙山藥五錢人參白朮白茯苓陳皮甘州各二錢半木香一錢縮砂二十箇白豆蔻七箇肉豆蔻一箇右為末蜜丸皂子大每一丸木飲化下或為木瓜湯調下錢湯氏

吐瀉論證

十五歲兒吐瀉壯熱不思飲食錢氏見日此兒目中黑睛少而白睛多面色眊白必多病夫面色眊白者神怯也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯

不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯受不可縱恣酒色若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但以消積丸磨化之為微有食積也錢乙

感冒風寒

貪睡口中氣熱呵欠煩悶者傷風證也頭目疼痛而畏人畏寒者傷寒證也錢乙頭痛體痛鼻塞流涕咳嗽噴嚏頰赤眼澀山根青色皆傷風寒也湯氏傷風宜用大青膏方見上雄黃膏感冒風寒通用人參羌活散方見上參蘇飲方見寒門惺惺散綱目

雄黃膏

治傷風溫壯熱引飲寒水石五錢甜硝甘州末各三錢龍腦一字朱砂五分雄黃小棗大研蘿蔔根木並醋一大盞煮令盡右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大錢乙

惺惺散

治傷風發熱痰嗽煩渴人參白朮白茯苓白芍藥瓜蒌根甘州各二分半細辛

薄荷各一分石到作一
貼薑二水煎服錢乙

痰涎喘嗽

痰乃風苗火翳則伏於脾火動則壅於肺痰
火交作則咳嗽喘急宜瀉白散方見五卷合

導痰湯方見痰飲煎服人門○寒嗽宜華蓋散熱
嗽宜清金降火湯二方並見咳嗽○脾肺母子也

二藏俱虛則生煩涎煩涎者脾肺所出也涎則流
溢在於咽喉如水雞之聲喘嗽煩悶宜抱龍丸奪

命散二方見上○馬脾風宜用馬脾風散牛黃

奪命散保命丹方見上○人門

馬脾風散

治寒邪入肺寒鬱為熱痰喘上氣肺脹胸
膈若不速治立見危亡辰砂二錢半甘遂

一錢半輕粉五分右為末每取一字以溫漿水以
許上滴香油一點抄藥在油花上待沈下卻去漿

水灌之神

效人門

牛黃奪命散

治小兒肺脹胃滿喘急氣急兩脇扇動
兩鼻竅張痰涎潮塞悶亂喘喘次在朝

夕白五半生半熟黑五半生半熟取頭末各五錢
大黃一兩檳榔一錢半木香一錢半右為末入輕

粉一字和勻每取一錢或二錢蜜水調
下微利為度丹心一名一捻金醫鑿

泄痢

小兒疳痢瀉青白黃沫水痢色變易無常○疳即
膿瀉膿即脹也其證目胞腫腹脹痢色無常好飲

水漸加瘦瘠○赤痢宜黃芩芍藥湯虛滑宜固腸
丸二方並見大便○白痢宜益元散方見暑門瀉

六九方見大便○赤白痢宜黃連阿膠丸六神丸
二方並見大便○疳痢腹痛宜蘇感丸方見大便

○八痢危證一日赤痢二日白痢三日赤白痢四
日食積痢五日驚痢六日脾虛痢七日時行痢八

日疳痢通宜小駐車丸真人養藏湯二方並見大便
得效○小兒痢穀道不閉黃汁長流者不治

得效

一方

治瀉痢五倍子炒黃為末烏梅肉水浸和丸彈
子大每丸一丸白痢米飲下赤痢薑湯下水瀉茶

水手下
同春

腹痛腹脹

小兒腹痛曲腰乾啼無淚面青白唇黑肢冷
或大便色青不實為盤腸內吊急煎蔥湯淋
洗其腹揉蔥白熨臍腹間良久尿自出其痛立止
續用乳香散湯氏。小兒腹痛多是乳食所傷宜
用消食散消積丸。面青白身冷水瀉為冷痛宜
理中湯。積痛食痛虛痛虫痛大同小異惟虫痛
小兒多有之其證心腹痛叫哭倒身撲手嘔吐清
水涎沫面色青黃時作時止口唇紫黑色者是蛇
厥也宜用安虫散安虫丸錢乙。腹脹者由脾胃
虛氣攻作也宜用楊氣丸消積丸十全丹方見上
○正傳

乳香散

治盤腸內吊腹痛乳香沒藥各少許細研別
取木香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調
乳沒末服之只
一服即效湯氏

消食散

治食積腹痛白朮陳壁土炒一錢半麥芽縮
砂山查肉各一錢橘紅香附末神麴青皮各
七分甘草五分右為末每一錢米飲調下
或到取一錢入薑三片煎服亦可醫鑿

消積丸

治乳食傷積腹脹氣急丁香縮砂各十二箇
烏梅肉巴豆肉各三箇使君子肉五箇右為
末飯丸麻子大每二三丸
或五丸橘皮湯下入門

安蟲散

治虫痛胡粉炒黃檳榔苦練根鶴虱白礬半
生半枯各二錢右為末每服一字大兒五分
米飲調下。或以米糊和丸麻子大一歲兒
五丸溫漿水入清油打勻送下名曰安虫丸

楊氣丸

治小兒腹虛脹胡椒全蝎各四十九箇右末
麩糊和丸粟米大米飲下五七丸至一二十
丸如腹大者加
蘿蔔子炒正傳

五軟五硬

五軟者頭項軟。手軟。脚軟。身軟。口
軟是也。頭項軟者天柱骨倒也。通用健骨散

東醫圖書集成醫部全錄卷一百一十一

四十一

外貼生筋散。○手軟者無力以動也。宜薏苡丸。○
脚軟者行遲也。治法見下。○身軟者肉少皮膚自
離或遍身筋軟者鹿茸四斤丸。加當歸青鹽服之。
○口軟者語遲也。治法見下。已上五軟皆稟受不
足或因吐瀉若不治必成篤疾。入門。○五硬者頭
項硬。○手硬。○脚硬。○身硬。○口硬也。硬者強直
水。冷乃肝受風邪宜用烏藥
順氣散。方見風門。○入門。

健骨散

治頭軟頭不能正也。項軟者天柱骨倒也。白
僵蚕炒為末。每服五分。或一錢。薄荷泡酒調

下。日三。
綱目

生筋散

外貼之。木鼈子三箇。草麻子二十粒。俱去殼
右研勻。先抱起兒頭。摩項上。令熟。作片貼之。

綱目

薏苡丸

治手軟。薏苡仁當歸秦艽酸棗仁防風羌活
各五錢。右為末。蜜丸。艾實大。荆芥湯化。綱目

鹿茸四斤丸

治身軟。筋骨痿弱。肉菘。蓉牛膝木瓜兔
絲子熟地黃鹿茸天麻杜仲五味子各

等。分。為末。蜜丸。梧子大。溫酒或米飲下。二
五。十。丸。方。○一名加減四斤丸。綱目

解顛

年大小兒頭縫不合。如開解。故曰解顛。此由腎氣
不成。故也。腎主骨髓。而腦為髓海。腎氣不成。則腦
髓不足。故不能合也。凡得此疾者。不過十日。其間
亦有數歲者。乃成廢人也。湯氏。○生下而顛。不合
者。腎氣不成。故也。長必少。笑。更有目白睛多。面
色。瘦者。多愁少喜也。錢乙。○解顛。即小兒頭縫
不合也。宜服六味地黃丸。方見虛勞。或八物湯。方
見虛勞。加酒炒。芩連煎服。外貼三辛散。天南星散。
且以頭巾裹。遮護之。
自合亦良法也。錢乙。

三辛散

治解顛。乾薑七錢。半細辛桂心各五錢。右
為末。薑汁和付。顛上。小兒面赤。即愈。三。因

天南星散

治同上。大夫南星微炮。為末。醋調塗。
緋帛上貼。顛上。灸手。頗。立效。錢乙。

東醫寶鑑卷之十一

四十七

顛填顛陷

顛填者，顛門腫起也。因乳哺失常，或寒熱來，脾其氣上衝，則顛高而突。又有肝盛風熱，交攻亦致顛填突起。汗出毛髮黃而短，是也。若寒氣上衝，則年硬熱氣上衝，則柔軟。當瀉風熱，宜用瀉青丸。方見五藏。入門。顛陷者，顛門成坑也。因藏府有熱，渴引水漿，致成泄利，則氣血虛弱，不能上交，腦髓故顛陷如坑，不得平滿。宜用黃狗頭骨炙黃為末，雞子清調付。入門。

語遲行遲

語遲者，五軟中口軟是也。兒在胎時，母有驚怖，驚氣入於心包絡，使心神不足，舌本不通。宜服菖蒲丸。錢乙。小兒諸病後不能言，宜雞頭丸。錢乙。一、小兒五歲不能言，咸以為廢人，用六味地黃丸。方見虛癆。加五味子、鹿茸及補中益氣湯。方見內傷。將半羊始發，一、二言至一、二年始言，語如常。同春。行遲者，脾軟是也。氣血不充，骨髓不滿，軟弱不能行。或肝腎俱虛，肝主筋，筋弱不能束骨。宜六味地黃丸加鹿茸、牛膝、五、味子、五加皮。久服之，虎骨丸亦佳。或用五加皮散。得效。○凡小兒

行遲齒遲，解顛五軟，鶴膝，睛白多愁，皆因稟受腎氣不足。宜以六味地黃丸加鹿茸補之。或用調元散。同春。○小兒鶴膝者，由稟受不足，血氣不充，故肌肉瘦瘠，骨節呈露如鶴之膝，乃腎虛得之。宜六味地黃丸加當歸、牛膝、鹿茸，久服，仍以天南星炮為末，醋調烘熱貼之。甚良。同春。

菖蒲丸

治心氣不足。五六歲不能言，石菖蒲、人參、麥門冬、遠志、川芎、當歸各一錢，乳香、朱砂各一錢。右為末，蜜丸。麻子大，米飲下。

雞頭丸

治小兒諸病後不能言，雄雞頭炙，一箇，鳴蟬炙，三箇，大黃煨，甘艸炙，各一兩，當歸、川芎、遠志、麥門冬各七錢，半木通、黃芪各五錢。右為末，蜜丸。菽豆大，空心米飲下。五、九日，三四服。錢氏。

虎骨丸

治行遲、虎脛骨生，乾地黃、酸棗仁、白茯苓、肉桂、防風、當歸、川芎、牛膝、黃芪各等分。右為末，蜜丸。麻子大，木瓜湯下。五、九日，或十、九日，得效。

五加皮散

治三歲不能行五加皮二錢半牛膝木瓜各一錢二分半右末每錢米飲調下得效

調元散

治行遲山藥五分白朮白芍藥熟地黃當歸川芎黃芪蜜炒各二分半人參白茯苓茯神各二分甘州一分半石菖蒲一分右

剉作一貼薑三棗二水煎服同春

髮不生齒不生

髮不生者因稟受血氣不足不能榮於髮或服從蓉丸齒不生者由齒者骨

之所終髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生宜服芎黃散得效○齒久不生用雄雞

散方見齒門○長齒生牙頰雄鼠之骨末取大老鼠去肉取脊骨為末擦牙齦上日二次效本脚

從蓉丸

當歸生乾地黃肉從蓉白芍藥各一兩胡粉五錢右為末蜜丸黍米大每十丸黑豆湯吞

下兼禁化二二二十丸塗擦頭上得效

芎黃散

川芎生乾地黃當歸山藥白芍藥各一兩沈香五錢甘州三錢右為末白湯調服半錢內

將乾末糝擦齒齦上日二次得效

龜背龜骨

龜背者初生不能護背風入於脊骨或坐入早亦致偃僂背高如龜多成痼疾宜服松葉

丹枳殼丸且取龜屎點脊骨節上即平○龜骨者胃高脹滿其狀如龜此肺藏受熱所致也或乳母

多食五辛及酒麪過度或夏月多飲熱乳宜服百合丹得效○龜骨乃肺熱脹滿攻於胃膈而成宜

瀉白散方見五藏加片苓梔子煎服正傳

松葉丹

治龜背松花枳殼防風獨活各一兩麻黃大黃前胡桂心各五錢右為末蜜丸黍米大鴉

飲下十丸得效

枳殼丸

治同上枳殼防風獨活大黃前胡當歸麻黃各三錢右為末麪糊和丸黍米大吞下

一二二十九丸丹心一名龜背丸同春

百合丹 治龜胸大黃七錢半天門冬杏仁百合木通桑白皮枳殼甜葶藶石膏各五錢右末蜜丸

某豆大白湯下五七丸至十丸得效一名龜胸丸 回春

滯頤 小兒滯頤者口角流涎是也涎者脾之液流出積於頤上此由脾胃虛冷不能制其津液故也法當

溫脾○內經論舌縱涎下皆屬於熱可辨冷熱而治之熱涎者胃火炎上宜用通心散方見上冷涎者胃虛也宜用木香半夏丸入門

○滯頤冷證宜用溫脾丹湯氏

木香半夏丸 木香半夏麴丁香各五錢白薑白朮青皮陳皮各二錢半右末蒸餅和丸麻子

大宋湯灌下入門

溫脾丹 半夏麴丁香各五錢白朮青皮乾薑各二錢半右為末糊丸黍米大末飲下二十丸湯

丹毒 小兒丹毒乃熱毒之氣與血相搏而風乘之故赤腫其遊走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺人

也湯氏○小兒丹毒百日內發者必死急急救之湯氏○金絲瘡一名紅絲瘡其狀如線巨細不一

經謂丹毒是也保命○丹毒自腹內生出四肢則易愈自四肢入腹則難治三四○毒氣入裏腹脹則成毒氣所走之處截經刺之出血一云急以細

鍼刺出惡血即消入門○丹毒宜服犀角地黃湯方見血門

四順清涼飲方見火門外用拔毒散冰黃散泥金膏塗之○又溝渠中小鰕搗付之又伏

龍肝和雞子清塗之又鯉魚血鱖魚血芭蕉根汁藍葉汁水中苔塗之皆可○蟬鍼吸出惡血最效諸方

拔毒散 治丹毒遊走爛熱寒水石二兩三錢石膏一兩黃柏甘艸各二錢右為末水調塗之芭蕉

汁調丸

妙入門

冰黃散 治同上煅硝大黃末各五錢右井水調勻雞羽掃塗 回春

泥金膏

治丹毒熱癰無名腫毒蛇蝎糞二分
焰硝一分右新汲水濃調敷上同春

諸瘡

小兒初生月裏諸疾乃胎毒之淺者若一二歲後
所生之疾乃胎毒之深者宜按法治之綱目○小

兒惡瘡天氣溫和時頻與澡洗夏用棗葉槐枝秋用苦
不須服藥春用柳條荊芥夏用棗葉槐枝秋用苦
參煎湯溫洗湯氏○一二歲生瘡遍身先服五福
化毒丹方見上犀角地黃湯方見血門外用父親

熱小兒雞羽蘸洗青黛末搽之效入門○小兒面
瘡通面壞爛無全膚流膿水百藥不效臘猪脂付
之神效白楊木枝燒取瀝付之亦效丹心○小兒
癩頭瘡以防風通聖散方見風門酒製為末每一
錢水煎服二十貼見效又詳見諸瘡門可參考丹
心○小兒口中百病及口瘡重舌重脣喉痺腫塞
宜用牛黃散醫鑿○胎熱血熱風熱諸瘡遍
身疼痛宜用大連翹飲生料四物湯醫鑿

牛黃散

牛黃片腦鵬砂各一分辰砂雄黃青黛各二
分黃連黃栢末各八分焰硝一錢半右末每

少許糝
之醫鑿



大連翹飲

治諸瘡甘艸四分柴胡黃芩荊芥各三分
連翹車前子瞿麥滑石惡實赤芍藥梔子

木通當歸防風各二分蟬殼二分半右剉作
一貼入竹葉二片燈心十莖水煎服醫鑿

生料四物湯

治同上生地黃赤芍藥川芎當歸防風
各三分黃芩薄荷各二分右剉作一貼

水煎服
得效

紅絲瘡

一人生子遍身生紅絲瘡不救後生三四子
皆然東垣曰汝腎中伏火精中多有紅絲以

氣相傳生子故有此疾俗名胎瘡是也令視之果
如其言遂以滋腎丸數服瀉腎中火邪忌酒肉辛
熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血後受胎五
月以黃芩白朮作散與服而生子前疾不復作矣
東垣

藥毒成淋

一童子自初生患淋五七日必一發發則必多服下部藥積毒在胎留於子之命門而然以紫雪和黃柏末丸梧子大晒極乾熱湯下百丸又半日痛大作連腰腹乃下如黍粟者一椀許病減十分之八又與陳皮一兩桔梗木通各五錢作貼與之又下如黍粟者一合而安父得燥熱且能病子况母得之者乎書此以證東垣紅絲癰之事

斷乳

小兒二三歲時欲斷乳宜用盡眉膏入門

盡眉膏

山梔子炒黑二箇雄黃朱砂輕粉各少許爲末清油調勻候兒睡着濃抹盡兒兩肩 upper 醒來自不喫乳未效再盡仍用墨搽乳頭入

小兒諸病外證

眼上赤脉下貫瞳人水火困絕 鼻乾黑燥 腫起兼及作坑心絕 目多直視觀不轉睛 肚大青筋 指甲黑色 肝絕 忽作鴉聲 脈絕 虛舌出

痘疹二證專由胎毒

太古無痘疹周末秦初乃有之夫胎在腹中至六七月

則已成形食母腹中穢液入兒五藏食至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連甘州水下其臍糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒藏中遇風寒邪氣相搏而成痘疹也 錢乙 子在母腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢渴皆食母血兒隨月長筋骨皮肉血脉形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻于一隅隱伏而不發直至兒因內傷乳食溼熱之氣下陷合于腎中二火交攻榮

氣不從逆於肉理惡血乃發諸瘰疹皆出於腎水其瘍後聚肉理歸於陽明故三番斑始見之證皆疔太陽王膀胱剋丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也東垣○瘰之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢而海藏成毒皆太陰溼土壅滯君相二火之所作也○內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火蓋因胎毒藏於命門遇少陰少陽司天君相二火太過熱毒流行之至則發作矣正傳

稀痘方

稀痘方有服朱砂法延生第一方稀痘兔紅丸滌穢免痘湯獨聖丹百壽散服梅花方秘傳稀

痘湯
諸方

服朱砂法

如米細光明朱砂水飛為末每五分作三次煉蜜調量兒大小加減溫水送下不稠痘出未出首尾可服密者可稀稀者可無黑陷者可起痘癰者可消但性微寒不可多服入門○一

法蜜少許調朱砂末一字用得效

延生第一方

小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用炭火四圍燒至煙將盡放土地上用瓦蓋之類蓋之存性研為末預將朱砂透明者為極細末水飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五釐生地黄當歸身濃煎汁一二碗殼調和煎兩味抹兒上臍間及乳母乳頭上一日之內用盡次日大便遺下汚穢濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生一子得一子十分妙法也醫鑿

稀痘兔紅丸

一名太極丸臘月初八日取採生兔一分候乾成餅凡初生小兒二三日後與某豆大者二三丸乳汁送下一歲兒五丸或七丸二三歲後十五丸服久則遍身發出紅癍是其驗也有終身不出痘疹者雖出亦稀小兒已長會飲食者就以兔血啖之尤妙或云不必八月但臘月免亦可用然終不若八月但醫鑿

滌穢免痘湯

五六月間取絲瓜小小蔓藤絲陰乾約二兩半重收起至正月初一日子時父母只命一人知將前絲瓜藤煎湯待溫洗兒全身頭面上下以去其胎毒洗後不生痘也如出亦輕只三五顆而已醫鑿

獨聖丹

絲瓜近蒂取三寸連皮子納於固濟砂瓶內以桑柴火燒存性為末以如數配入砂糖搗成餅時時與兒吃盡為佳小兒痘疹服此則少或全然只燒蒸二三兩日不出者或每遇作熱時則與食之出痘必少醫鑿○凡痘疹初出或未出時服此藥則多者可少少者可無重者可全輕也又云入朱砂少許尤妙正傳

百壽散

初生月內用之老無瘡疹黃連一兩朱砂二錢右水煎先拭去口中涎淨灌下少許令燕之卻以餘藥傾盆中浴兒身令遍海藏

服梅花方

服梅花可免出痘十二月收梅花不拘多少陰乾為末煉蜜丸如茶實大每丸好酒化下念太乙救苦天尊一百遍妙不可言種杏

秘傳稀痘湯

六月上伏日採葫蘆嫩蔓數十根陰乾遇正月初一日五更勿令人知將葫蘆蔓安鍋內燒湯一盆洗未出痘小孩兒渾身頭面上下無處不洗到方可此後即不出痘唐人秘傳

痘疹預防法

每遇冬月溫煖恐春發痘宜預服三豆飲油飲子入門○天行痘疹鄉隣有此證預服之能活血解毒則不洩宜獨聖丹免紅丸見坊並龍鳳膏醫鑿

三豆飲

赤小豆黑豆菉豆各一升甘艸五錢右水煮熟逐日飲汁喫豆任意服已涼則輕解去染者服之過七日永不出得效

油飲子

小兒陽盛無陰以制令頭髮豎直飲食減少此伏熱之兆鄉隣有痘證取真麻油一升逐

日飲之令盡則
永不不出痘正傳

龍鳳膏

烏雞卵一箇地龍細小活者一條右雞卵開
一小窠入地龍在內皮紙糊其窠飯鍋上蒸

熟去地龍與兒食之每歲立春日食一枚終身不
出痘疹覺御隣有此證流行食一二枚亦效正傳

辨痘證

傷寒傷食瘡疹證皆相似○傷寒則增寒壯熱
口中氣熱呵欠煩悶項急○傷食則口熱口中

醋氣姦辨不消腹中疼痛○瘡疹則腮赤燥多噴
嚏悸動昏倦四肢冷○昏睡喜嚏悸者將發瘡疹

也○瘡疹候者面燥腮赤目胞赤呵欠煩悶乍
涼乍熱咳嗽噴嚏足稍冷夜臥驚悸多睡

發瘡證呵欠噴嚏睡中急驚耳尖冷眼澁
痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩燥臉赤唇紅身痛

頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有
因感傷風寒而得有因時氣傳染而得有因傷食

發熱嘔吐而得有因跌撲驚恐畜血而得或為目
鼠口禁驚橋如風之證或口舌咽喉肚腹疼痛或

煩燥狂悶昏睡譫語或自汗或下利或發熱或不
發熱證候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷驗之
蓋瘡疹屬陽腎熱無證其耳與尻俱屬腎故腎之
所部獨冷又不若視其耳後有紅脈赤縷為中之真
也正傳○痘疹證以耳冷尻冷足下冷及耳後有
紅縷赤脈驗之然須見心胃間細點如粟起則為
真也
得效

痘瘡亦時氣之一端

凡傷寒時氣熱毒內盛多發脫瘡

瘡其色或白或赤若頭作癩癩戴白膿者其毒則
輕若紫黑色作根隱隱在肌肉裏者其毒則重甚

則周匝遍身五內
七竅皆有也類聚

痘有五般證

五藏各有一證○肝藏水疱色或青○肺

藏膿疱色或白○心藏癰其色赤○脾藏
疹或如玃糠色○腎變黑此為五色凡痘疹一
色者善或一二色二三色相合而作者凶第大小不等

為疔 海藏。○小兒在胎十月食五藏穢血生下則其毒當出故瘡疹之狀皆五藏之液肝主淚肺主涕心主血脾為裹血其瘡出有五名肝為水疱以淚出如水其色青而小肺為膿疱以涕稠濁如膿其色白而大心為癰主血其色赤而小次於水疱脾為疹其色赤黃而小涕淚出多故膿疱水疱皆大血榮於內所出不多故瘡疹皆小 海藏。○病水疱膿疱者涕淚俱少以液從瘡出故也譬如泡中容水水去則泡瘦矣 海藏。○水泡者俗謂之痘子也痘之也膿疱俗謂之痘子也癰者俗謂之瘡子也痘之形狀最大水痘次之瘡瘡又次之麻子最小隱隱如麻子也 海藏

痘疹諸證

初熱三日類傷寒初證。○自初熱至報痘類傷寒六經證。○六日以後謂之雜證。○報痘次至收靨謂之常證。○異常謂之變證。○水痘瘡疹謂之類證。○不治謂之壞證。○餘毒謂之瘡證

痘疹治法

凡痘疹治法或發或瀉或解肌或化毒涼血清肺調其藏府平其飲食謹其禁忌嚴其攝養適其寒溫使無不快之經成無不痂之潰既愈之後不致遺毒流汗虛糜目疾腎膜瘡癰癰瘡喉閉隘腫潮熱汗泄此治法之大畧也 海藏。○痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢決無陷伏之患。○諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱則不能起發比之種痘值天時暄暖則易生 直指。○凡見出遲發慢者根窠欠紅活者便當憂慮調治切勿袖手待斃 正傳。○瘡疹惟用溫平藥治之不可安下及安攻發受風冷。○瘡疹始終未有不他證不可下當用平和藥頻與乳食不受風冷可也 錢氏。○溫平者非熱劑如荊芥薄荷防風惡實甘艸之類活人書鼠粘子湯潔古解毒防風湯選而用之 方見下。○海藏。○惡實連翹山楂甘艸乃痘疹終始必用之藥也 丹心。○首尾俱不可安下但用溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已 正傳。○有大熱者當利小便宜導赤散四苓散

有小熱者當解毒宜消毒飲
四聖散 四方見下。錢氏

痘瘡日限

聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則平
復如舊矣 得效。除初熱三日不第蓋有熱

發三五日或十餘日故也自報痘至收靨首尾一
十二日中間有不守禁戒以至淹纏又有氣血相
者不及一十二日而愈入門。痘瘡屬虛寒者可
延至十數日後方收屬毒盛轉紫色者不過七八
日收蓋痘是胎毒自內出外一二三日方出齊毒氣
尚在內出至六日則當盡發於表七八九日成膿
而結痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入
藏府故須於六日以前急服涼血解毒之藥以驅
出之六日以後醫無及矣故其收最急若虛弱毒
氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日
久而後收矣丹心。發熱三朝出痘三朝起脹三
朝貫膿三朝收靨三朝自出痘至收靨要十一日
可保平安 醫鑒

發熱三朝

痘瘡亦時氣之一端大抵與傷寒相類得效

眼澀。睡中急驚。卒暴壯熱。肌膚緜急。又
日昏睡喜噫悸者將發瘡疹也。錢乙。痘疹欲出
之時熱動五臟則五臟之證俱見其呵欠煩悶者
肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也
面與頰頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在腑
下不能食穢故也。錢乙。或發驚搐渾身熱甚下
向發熱者是也。局方。發熱似傷寒未辨疑似間
且與升麻葛根湯參蘇飲二方並見寒門。加味敗
毒散解毒表丹心。熱盛發驚搐為吉候用紅線散
調加味六一散表之痰涎壅盛者薄荷湯化下抱
龍丸方見上。發熱欲出痘作腰痛者急服神解
湯出汗以痛止為度免出腎經之痘。發熱之初
急宜表汗使藏府胎毒及外感之邪盡從汗散則
痘出稀少然表藥必在紅點未見之前也。醫鑒。
傷寒瘡疹疫癘潮熱五日已衰疑似未辨者宜用
四物解肌湯五日已裏發出即出五日已外無者

非癰也。發熱三日未見形跡宜以生酒塗

身上時時看之狀如發痕者是癰也綱目

發熱時吉凶證

發熱時身無大熱腹痛腰不痛過三日後熱生紅點堅硬得手者吉勿藥

有喜。發熱時不時發驚者痘在心經而出也乃為吉兆。發熱時一日遍身即生紅點稠密如蠶種樣摸過不礙手者凶。發熱時腹中大痛腰如被杖出痘乾燥者凶。發熱時頭面上有一片色如烟脂者凶已上皆失矣醫鑑

加味敗毒散

柴胡前胡羌活獨活防風荆芥薄荷枳殼桔梗川芎天麻地骨皮各三分右煎服一貼宜加紫艸蟬殼紫蘇麻黃蔥白煎服表汗之本方除參苓恐助火也

紅線散

全蝎麻黃荆芥穗天麻甘艸各五分右剉作一貼夏加薄荷紫艸蟬殼水煎服醫鑑

加味六一散

治熱毒太盛狂言煩渴及痘瘡紅紫滑石六兩研水飛甘艸細末六錢辰砂水飛三錢片腦二分別研別入右和勻春秋以燈心煎湯調下夏月以新汲水調下三五歲兒服一錢十歲服二錢發熱之初用加味敗毒散調下能解毒稀痘出痘紅紫者亦效醫鑑

神解湯

治發熱欲出痘而腰痛者柴胡一錢半乾葛一錢麻黃白茯苓升麻防風各八分甘艸五分右剉作一貼水煎服溫覆出汗不汗再進一服免出腎經之痘此法甚奇醫鑑

四物解肌湯

即升麻葛根湯去甘艸代黃芩也。凡傷寒瘡疹疑似未辨者以辛涼之劑調之即此湯也綱目

出痘二朝

發熱一日即出痘者太重二日即出痘者亦重微微發熱三日後乃出痘者為輕四五日身涼乃見痘者尤輕自出痘一日起至二三日方齊凡痘出至足謂之出齊醫鑑。痘瘡初出與麻疹瘳瘡略相似若根窠紅頂圓突堅實捫之得手者痘也若根不紅頂虛軟畧有清水模過不礙手者

麻疹癩瘡也 醫鑿 ○如發熱過二三日瘡不出或不快出即微發之 用消毒飲化毒湯犀角消毒飲如瘡發後不多出即加藥發之 如一日二服如藥發後不多出即瘡本稀不可更發也 錢乙 ○痘先出者為母後出者為子孫母好子孫多則自然有不等者然亦無害 ○出速且密皆尤多此乃毒盛宜服消毒飲解毒防風湯以防後日青乾黑陷 ○出盛而內外壅熱煩渴謔在宜用猪尾膏方見下 ○年壯皮厚痘難快出宜用透肌湯 ○痘出而被風寒復入者宜用加味四聖散或快癩散 ○頭面上忽生三五箇或只一箇高大紫黑儼似疔痘者名曰飛痘此最輕或只此一痘再不生痘門 ○凡發熱一日即見紅點此由毒氣太盛故出速宜用化毒湯加紫艸紅花蟬殼涼血解毒 醫鑿 ○凡痘出不快宜四聖散加味四聖散紫艸飲及絲瓜湯之類 醫鑿 ○一發便密如鍼頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹升麻湯主之 ○瘡癩瘡密身表熱急與鼠粘子湯以防青乾黑陷 綱目

痘出太盛恐入眼為害宜消毒飲加酒炒芥連外用護眼膏入眼 ○痘出不快宜樺皮飲子胡荽酒正傳

出痘時吉凶證

痘瘡始出如粟米大或如黍米大或如菉豆大似水珠光澤明淨者吉 ○痘一出即變黑者腎證也此為惡候保元湯 方見下加紫艸紅花收之 ○痘出紅赤以手摸過皮軟不得指者名曰賊痘過二三日變成水疱甚至紫黑此危證也保元湯加紫艸蟬殼紅花解之 方已成水疱則保元湯加四苓散 方見寒門利之 此妙法也不然則遍身爪破赤爛而灰 ○發熱出痘時頭面上有一片色如胭脂者凶 ○出痘時發紅癩如錦紋者六七日後決灰急用化毒湯加紅花黃芩升麻收之 變黑癩則即灰 醫鑿

消毒飲

治痘不快出及曾前稠密急用二四服快透解毒神效鼠粘子二錢荊芥穗一錢生甘草

防風各五分右剉作一貼水煎服或加山楂
子酒芥紫艸服或和犀角磨汁服尤佳醫監

化毒湯

治痘出不快且金稀少紫艸一錢升麻甘
艸各五分右剉作一貼入糯米五十粒同煎
服神效

犀角消毒飲

治痘疹未透或已出熱尚未解急
服此藥鼠粘子二錢荆芥穗防風黃芩
各一錢犀角屑甘艸各五分
右剉作一貼水煎服入門

解毒防風湯

凡痘出速且密或七日後壯熱毒盛氣
弱聲啞此藥主之防風一錢地骨皮黃
芪白芍藥枳殼荆芥穗鼠粘子各
五分右剉作一貼水煎服易老

透肌湯

治痘不快透紫艸白芍藥升麻各一錢
糯米五十粒右剉作一貼水煎服網目
治痘瘡出不快及倒靨紫草草木通枳殼甘
艸各等分右為鹿末每一錢水煎服錢

四聖散

疹痘最要大小分解錢氏四
聖散用木通枳殼極好網目

加味四聖散

治痘出不快或陷伏倒靨一切惡候紫
艸草木通木香黃芪川芎人參甘艸各
四分蟬殼二分右剉作一貼入糯米
米百粒水煎服能養而發之入門

快癩散

治痘出不快或被風復入紫草草蟬殼人參
白芍藥各六分木通三分半甘艸三分半右
剉水煎服入門

紫艸飲

治痘瘡出不快三四日隱隱將出未出紫艸
二兩細剉以百沸湯一大碗沃之以物蓋定
勿令氣出候溫服半合或一合痘即出本艸
虛紫艸皆當用其有發出之功令人用根反利太
便大便泄者
勿用辨疑

絲瓜湯

發痘疹最妙取絲瓜連皮子燒存性為末砂
糖溫水調下半匙許或以紫艸茸甘艸煎湯

康醫金錄卷十一

六十一

調服之藥今人水煎服亦得

連翹升麻湯

治瘡疹一發便密如蚕種或如糠粃毒盛者即升麻葛根湯方見寒門加連翹

一珠也
正傳

鼠粘子湯

治痘疹稠密身表熱急用此以防後患地骨皮五分柴胡連翹黃芩黃芪各二分半鼠粘子當歸身甘州各二分半右剉作一貼水煎服東垣

樺皮飲子

治痘不快出樺皮剉濃煎汁飲之正傳

胡荽酒

治同上胡荽莖剉二兩以清酒二升同煎令沸便以物蓋定勿泄氣候溫去滓噴一身令遍勿噴頭面以衣溫覆須臾痘子快出神效無莖則用子本州

又方

治痘出不快蒲萄研酒飲之又食之盡出無生則用乾者。蟬殼二七箇水煮取汁服之本州

○山查子取肉爲末湯熱服之得效

起脹三朝

起脹三朝毒盡浮於表蓋痘出二三日後當潮起脹先出者先起後出者後起至五六日毒氣盡發於表觀痘虛實變毒淺深全在此關。觀上氣者終不起脹。觀臉乃一身之主若觀上先脹者四肢必順觀上不脹遍體皆不脹。上體已脹下體緩慢者無害下體已脹上體緩慢者逆。起體時漿滯不行頂陷不起或風寒所刺俱宜。水楊湯浴之方見下。入門。凡起脹時毒盡在表須賴裏實則無虞苟畧有瀉則內氣虛脫毒乘虛內攻而瘡陷伏矣宜用固真湯方見下。痘不起脹灰白頂陷者虛寒也宜內托散加丁香或酒調紫艸膏若紫黑陷伏不起乃火盛宜紫艸湯調四齒散或獨聖散方並見下。起脹時有痘長大而紫黑名曰痘疔把住痘瘡令不起失治則外急用保元湯方見下。加鼠粘子荆芥穗芥連並酒炒外用銀簪挑破疔頭令父母吮去惡血或繡暴指

甲搗去惡血蓋痘破而毒氣發泄故也仍用雄黃末一錢調胭脂汁全濃點疔瘡上立見紅活雄黃拔毒胭脂活血也醫鑑

起脹時吉凶證

五六日頂尖滿起如鼓釘捫之得指直待氣脹時陸續出如粟米於痘空隙處圓淨者吉入門。起脹時根窠全不起頭面紅腫如瓠瓜之狀者凶。起脹時頂皆黑其中有眼如鍼孔者凶。起脹時遍身陷伏不起腹脹不食氣促神昏者凶醫鑑

內托散

活血均氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出余易收易屬即癰疽門十宣散加白芍藥一味也精義。若紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫艸紅花黃芩若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香當歸膿而不貫膿者倍參芪當歸煎熟入人乳好酒溫服醫鑑

紫艸膏

治痘疹不起脹白附子麻黃紫艸茸甘艸各五錢蟾酥一錢全蝎二十箇白蠟蜜炒八箇布細末別將紫艸一兩剉熬成膏又用蜜二兩入酒半盞煉過同紫艸膏攪勻調藥末丸如皂角子大一歲兒半丸三歲兒一丸用之紅紫黑陷者紫艸湯化下淡白灰陷者好酒化熱服醫鑑

又方

痘不起脹黃狗蟬四五枚溫酒研服未綻再服冬月蠅在狗耳內可取用海藏。老桑樹內蠹虫二三箇溫酒研服未起再服。烹鼠水治不起脹雄鼠大者一放去腸肚洗淨以水煮熟取汁服臘月者尤佳俗方。母酒能令痘肥腹取母酒和水猛煮以殺酒毒乃服之亦能補氣俗方。蕎麥麩能發起痘疹取細末作粥和砂糖服俗方。糯米能解痘毒令發起可作粥和砂糖服又云極好養胃氣本州。痘不起脹煮黍穰汁煮共薑汁煮兔皮汁臘猪肉煮汁並洗之本州。胡葵酒噴身能起脹方見上

貫膿三朝

貫膿三朝 胃氣升也痘以胃氣為本胃之氣升騰化毒成膿自肌肉上貫起漸至頂尖充滿光潤者順。氣血大振毒漿已滿將欲收斂之時也。當結膿窠而不結由血熱相薄毒氣內久灌注必復入心宜用猪尾膏方見下。貫膿時九竅慎宜封閉飲食藥餌極忌寒涼淡之物若傷脾胃則清氣下陷不能貫膿也入門。出痘歷七日當貫膿之時外若起脹而中空乾燥無膿血者或若略有清水根窠紅活猶有生意用內托散方見上倍人參黃芪當歸煎入好酒人乳各半蒸溫服此貫膿之巧法也醫鑿。九日十日即水時元氣熏蒸真陽運化其水自然消燦此循環之妙理也若未嘗解毒則至此時水不能化反歸于胃胃病則不能貫膿成就或致吐瀉陷伏宜用定中湯方見下。回春。痘七日後壯熱毒盛氣弱聲啞宜用解毒防風湯方見上

貫膿時吉凶證

漿行胞裏肥滿黃色或蒼蠟色或黃綠色者吉若色淡者虛也保元湯方

見下 加乾薑肉桂糯米煎服。頭面先回漿四肢方纔起脹者吉。貫膿時或吐瀉不食乳食不化腹脹聲啞寒戰咬牙痘爛無膿肌肉黑者凶入門。貫膿純是清水皮白薄如水胞三四日遍身抓破而灰。貫膿時遍身抓破痘中乾枯全無血水皮白乾如豆殼者凶醫鑿

收靨三朝

收靨三朝 漿老痂結如果熟蒂落氣收血平光色始斂自上而下按之堅硬蒼蠟色或黃黑色或似紫紅蒲萄色者佳。當靨不靨謂之慢有毒盛不結痂者猪心龍腦膏最效方見下有痂穢不收靨者異功散調四糞散最妙二方並見下。寒戰咬牙足膝如冰耳尻反熱於起脹貫膿收靨時極忌乃氣血虛極宜保元湯方見下加桂其者異功散救之方見下。入門。痘痂不焦是肉熱蒸於外散漫而行故也宜宣風散方見下導之生犀磨汁解之必著痂矣錢乙。當靨不靨發熱蒸蒸用甘露回天飲即時熱退痘靨。外潰不結痂頸陶散糝之方見下。回春。發膿窠不肯靨

但調砂糖糖水與粟即結痂細目。痘疹膿而不焦此失清涼之氣也如五穀得陽氣而成熟非涼風一至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與痘疹何異須察證候而清涼之則瘡必即癒當時清涼飲子下之

猪尾膏龍腦膏並佳海藏

收靨時吉凶證

痂落從頭上至曾脛手腹腰足節節白無血色者過後亦必急用消毒飲一二貼方見上後用補氣血養脾胃藥預防之。陰囊及足上先靨起者凶入門。將靨時其痘一時盡黑非靨也火極攻裏即凶翻。當靨時遍身臭爛如餅搭不可近目中無神者凶

甘露回天飲

砂糖屑半盞入百沸湯一椀調服醫鑿

通治

痘疹首尾宜保元湯為主治。不快出不起脹不實膿不收靨通用猪尾膏救之方見下。凡出痘

起脹回漿貫膿頂陷不起漿滯不行俱以水楊湯浴之方見下

保元湯

人參二錢嫩黃芪廿艸各一錢右剉作一貼入薑一片水煎服醫鑿。二二日初出乾紅

少潤此毒尚淺宜用活血勻氣兼解毒之藥加白芍藥一錢當歸五分以活血加陳皮五分以勻氣加玄參鼠粘子各七分以解毒。二三日根窠雖圓而頂陷者為氣虛弱血亦難聚宜加川芎官桂。四五日根窠雖起色不光澤為氣弱血盛宜加白芍藥官桂糯米。五六日氣盈血弱色昏紅紫宜加水香當歸川芎。六七日不能成漿為氣血少寒不能制宜加官桂糯米。七八日毒雖化漿而不滿宜加官桂糯米發陽助漿。八九日漿不沖滿氣弱而險宜加糯米以成漿。十一日十二日血盡漿足溼潤不斂者肉虛也加白朮白茯苓助其收斂。十三十四十五日毒雖盡解或有雜證相仍只以此藥隨證加減不可用。太寒太熱之劑恐致內損之患醫鑿

解毒

疎則無毒密則有毒急用涼藥解之雖數十貼不
妨無害眼之患。密則毒甚宜以清涼之劑解之
酒炒芩連之類是也酒炒芩連能解瘡毒丹心。
痘初出如曾前稠密急服消毒飲方見上。加山查
子酒黃芩紫草芫。痘出太多以犀角地黃湯方
見血門。加味犀角消毒飲加山楂子紫艸茸糯米
解之丹心。痘毒攻脾則泄瀉浮腫攻肝則眼生
腎膜攻腎則耳痛膿出攻肺則咳嗽痰盛。細目。
初出狀如蚊咬色黑者毒氣與熱相薄也宜用人
齒散猪尾膏方見下。毒鬱藏燥痰盛狂。丹宜四
齒散方見上。或紫艸燈心煎湯磨犀角玳瑁汁調服
失治則不自聲啞而厥。毒入胃則腹上痘多青
紅紫色外證口角流涎者入胃。痘初出如蚊
咬如蚕種或血紅一片不分地界毒氣太盛宜神功
散解之。回春。解毒湯黑散子三。飲
絲瓜湯服米砂
法三三方見上

加味犀角消毒飲

治痘疹毒氣壅遏未能透及口
舌生瘡不能吮乳鼠粘子一錢二
分甘艸五分防風升麻各三分荊芥穗麥門冬
犀角屑桔梗各二分石州作一貼水煎服丹心

神功散

治痘毒太盛以此解之毒氣即散陷者即起
取東流水煎三次每次用水三椀文武火煎至一
椀半濾下又煎一次共藥水四椀半聽用又用好
朱砂四兩以絹袋懸入磁罐加煎藥水封固水者
盡為度取出焙乾為末以紙羅過聽用再以引經
散用糯米二三合以紙包緊外用黃泥固濟入火
煉紅冷定打碎取米黃色者用之白色者不用每
服以砂末一錢米末一錢煉蜜二匙好酒二匙百
沸湯一小鐘共一處調勻用茶匙喂盡取效醫監
黑子散 解痘毒初出服此便消不出臘月猪糞瓶字
盛瓦片蓋口火煨在性放冷研細每二錢新
水調下
類聚

辨痘吉凶

痘者痘也大小不一無妨惟欲圓滿硬實不
宜虛軟陷伏。痘自頂額上陽位起且稠者
固凶然遍身變壞獨頂額上不變則吉貫臙時變
成水疱惟額上不破者可治收靨時敗證悉具惟
頂額上未靨如舊者可生入門。頭粒大而自根
穿紅潤譬如一顆真珠放在胭脂上故曰生頭粒
紅紫地界不分譬如呷血指肝故曰死。凡
痘疹只出一般者善或二色三色相合而作者凶
謂痘癰疹相合也。痘腳稀疎。根窠紅活
。不瀉不渴。乳食不減。四肢溫和。身無大
熱已上六證並不服藥自愈正傳。痘不治證有
七。一者憂齒痘黑陷喉中涎喘。二者憎寒困
倦痘子縮伏。三者瘡作坑內無膿血或作黑色
癩。四者痘癰癩疔口臭齩爛牙落。五者聲啞
氣噎或噤寒腹中鳴。六者痘初出十在皮膚帶
紫黑色不出。七者誤於踈轉氣啞者。凡痘出
前後心窩及兩手心兩足心者皆不治。不治
證又有五。一日痒場寒戰咬牙煩躁。二日紫

辨痘輕重順逆

黑色喘鳴不寧。二日頭溫足冷悶亂欲飲。四
日灰白色頂陷腹脹喘渴。五日目上視氣促泄
瀉不止。綱目。不治證又有六。一者初出湧吐
。二者出如蚕種。三者隨出隨沒。四者如咬
虫咬。五者倒出。六者飲水如促鼻。鼻
。鼻燥有黑氣以手枕鼻孔者心死。入門
。眼中無。臙中無。重者一齊並出。窠如蚕
種。稠密無縫。身熱腹脹。頭溫足冷。渴瀉
不止。耳中有。臙中有。輕變重者犯房室。
不思口。先曾渴。飲冷水。傷涼藥。重變輕
者避風寒。常和煖。大便秘。不燥渴。忌生
冷。忌外人。綱目。凡出痘收靨從頭至足為順
從足至頭為逆頭脚齊出齊靨者險。輕者靨出
俱從頭至足痘亦稀。重者稠密頭上未出未靨
脚上先出先靨。入門。身體溫煖者順寒涼者逆
。能食大便實者順不能食大便利者逆。正傳。

瘡疹屬陽出則為順故春夏為順秋冬為逆冬月
腎旺又盛寒故病多歸腎變黑海賦。痘疹惟腎
無候但見平證耳涼尻涼為順若痘黑陷耳及尻
反熱者為逆。痘黑而忽瀉便膿血並痂皮者順
水穀不消者逆蓋瀉出痂皮根在內病出而安也
水穀化者脾實故順木穀不化者脾虛故逆錢乙
○一發出便密如鍼頭如蚕種如糠粃者重如浮
萍不化箇數者逆。一發便出盡者必重痘核疹
者半輕半重瘡黧黑
如鍼孔者熱劇海藏

辨痘形色善惡

色者五藏精華紅黃綠者為佳黃綠乃
脾胃正色毒將出也淡紅者毒始出也
鮮紅則為血熱初起紫者大熱也全白者氣虛也
灰白者血衰而氣滯也黑者毒滯而血乾也。痘
色初出淡紅紅變白白變黃者吉初出鮮紅紅變
紫紫變黑者逆。痘出色不紅潤者毒盛壅塞故
也宜用紫艸飲方見上外用芥子末塗臍心方見
下。入門。黑屬血熱涼血為主四物湯方見血

門加黃芩黃連紅花。白屬氣虛補氣為
主保元湯方見上去甘艸加紫艸丹心

照燈影法

凡痘形色雖險若燈光影與痘根圓暈相
為周旋根窠紅活漿影淺厚則皆可調治
若根窠不紅不起血外不活漿無影者雖輕難治
故白且亦必用麻油紙燃照之眼法神巧全在於
此入門

辨痘虛實

吐瀉少食為裏虛陷伏倒靨灰白色為表虛
二證俱見為表裏俱虛並用異功散救之方
見下。不吐瀉能食為裏實紅活凸綻無汗為表
實涼膈散方見入門加升麻乾葛紫艸荊芥解之
綱目。身熱無汗為表實身涼多汗為表虛便祕
能食為裏實吐瀉少食為裏虛入門。表裏俱實
者難出易靨表裏俱虛者易出難靨表實難出裏
虛難靨入門。肺主氣氣不足則致三證。白汗
○聲不出。瘡頂陷塌宜保元湯方見上四君子
湯方見氣門。心主血血不足則致三證。灰白

色。根。窠。不。紅。不。光。澤。宜。芎。歸。湯。方見婦人

辨痘陰陽證。足脛冷。腹虛冷。糞青色。面眇白。不可服冷藥。足脛熱。兩腮紅。大便秘。小便赤。渴不止。上氣急。脈洪數。已上屬陽證。不可服熱藥。疔瘡虛寒用異功散。方見下

保護

痘瘡常念衣服適中。溫涼處坐臥。海藏。痘瘡宜善加調護。使房室溫。益。正傳。痘瘡宜謹避風寒。蓋內外熱蒸。毛孔俱開。易於感襲。一有觸冒。諸證隨作。且屬落之後。氣血大虛。尤當謹於防避也。醫痘以脾胃為主。自始至終。少能食。為順。又曰。淡食為佳。貫膿時宜食者。雞補氣。收靨時宜食雄鷄。收毒。或精肥猪肉。惟終始忌魚。鯉。以助痰滯氣。故也。痘瘡忌食生冷。肥膩。鹽鹹。茶醋。酒。蔥。蒜。魚。羊。

飲食

肉猪肝血。柿。棗。節。糖。特忌。雞。鴨。鵝。卵。烹食。命兒。目。直。入。門。勿食酸辣五辛。慈。蒜。薑。韭。薤。有。毒。之。物。恐熱毒重。肝生眼中。醫障。綱目。痘瘡首尾。切不可飲冷水。少與滾熟水。則可。自發熱至收靨。諸般血肉。皆不宜食。益助火邪。滋熱毒。故也。若脾胃虛弱。則止用鱖魚。即石首魚。及精猪肉。去盡脂肪。淡煮。少食。以助滋味。醫鑑。乳母當慎口。不可食飢。及受風寒。必變黑。歸腎難治。海藏。嬰兒未能服藥。則當兼治乳母。令服藥。釀乳。以飼之。俾其氣血。清和。飲食有節。投以調氣通榮之劑。則瘡心肥滿。光澤無陷。伏之憂矣。正傳。乳母食後。須捏去宿乳。令盡。乃服藥。即仰臥。霎時。乃令兒吮。其乳。汗。

痘疹宜食物

宜食。菓。豆。赤小豆。黑豆。雄猪肉。薯蕷。海松子。蒲萄。梨子。鱈魚。鰻魚。蘿蔔。瓜。菹。軟白飯。糯米粥。泄瀉可食。蕎

東醫寶鑑卷之丙篇十一

六十八

禁忌

麥麩 起脹可食。母酒 起脹可食。雪糕。砂糖俗方。痘瘡切忌諸般臭穢煎炒油煙父母行房梳頭等觸犯未發而觸則毒氣入心悶亂而外已發而觸則瘡痛如割以至黑爛切宜深戒得效。痘瘡勿親近狐臭漏腋房中淫慾及婦人月候醉酒葷穢硫黃蚊藥一切腥臊燒頭髮等氣綱目。痘瘡最怕穢惡之氣切忌外人及僧道看經往來蓋人之氣聞香則行聞臭則止故也。房內勿燒沈檀降真龍腦麝香恐燥血正傳。痘自初至終父母切忌房事。痘瘡落肌肉尚嫩不可澡浴大宜綱目。痘瘡因氣血虛弱或為風寒所剋不能起脹成漿貫膿或枯燥陷伏俱宜水楊湯浴之入門。痘不起脹或陷伏宜用黍穰煮湯。胡荽煎湯湯。芸薹煎湯。兔皮毛煎湯。臘猪肉煮湯。馬肉煮湯。猪馬無生肉則乾。肺亦得皆可浴本州。

浴法

水楊湯

楊柳五斤春冬用枝夏秋用葉洗淨搗碎取長流水一大釜煎六七沸去渣將三分之一注盆中先用保元湯方見上加川芎桂皮糯米煎服乃寒熱洗浴良久以油紙燃點燈照之纍纍然有起勢陷處有圓暈紅絲此漿影也漿必滿足如不滿又如前浴弱者只浴頭面手足勿浴背如燈照而無起勢則必添湯久添使透徹肌肉疎通內外命毒氣隨煖氣而發也此藥升提開豁萬竅枯者轉潤白者轉紅陷伏者自起矣冬寒則溫房內浴之入門

穢法

痘瘡觸穢汚痒痛者焚辟穢散熏之受以胡荽酒方見上化下蘇合香丸方見氣門。正傳。痘兒左右常令有胡荽氣能辟去穢惡之氣綱目。懸胡荽於房中且以胡荽酒噴床帳及衣被。常燒蒼朮猪蹄甲乳香以辟惡氣。穢汚毒氣入內成黑陷宜用再懸散入門

辟穢散

一名祛穢散亦名辟穢丹蒼朮細辛甘松川芎乳香降真香右等分為鹿未烈火焚之正傳

再甦散

一名再甦丹。明白礬地龍炒各等分。右為末。每取五分。以小豬尾血一椀。斗許同新汲水。

調下
入門

痘瘡諸證

有聲音咽喉痛腰腹痛驚搐嘔吐泄瀉痰喘。煩渴腹脹自汗痒痛斑爛寒戰咬牙失血尿。澀便祕倒靨黑陷護。

眼滅滅凡二十一條

聲音

瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲先變者氣病也。正傳。○聲出肺與心或感風寒或多啼氣。噎不開痘已出未出失聲者身溫則解毒防風湯。方見上。身冷則內托散倍桔梗。方見上。○如漿滿聲啞者肺氣絕也不治。○痘出不好聲啞者亦入門。

咽喉痛

痘出咽喉痛宜消毒飲。方見上。如聖飲。得效。○咽乾濕痛口爛齙腫乃心胃熱也宜如聖飲。若水漿不入宜用紫雪。方見火門。○咽喉有毒飲食如鑷挫喉水漿不入或吐或常乾嘔者危惟黃。

膿時見此證。一便閉者反苦。○痘毒入藏府咽喉閉塞宜用猪尾膏。方見下。○入門。○痘生於口舌瘡爛不能吮乳宜加味犀角消毒飲。方見上。○得效。

如聖飲

麥門冬桔梗各一錢鼠粘子甘州各五分。分右剉入竹葉三片同水煎服。得效。

腰痛

凡發熱欲出痘腰痛急服神解湯。方見上。出汗以痛止為度免出腎經之痘。○發熱時腹中大痛腰如被杖及出痘乾燥者。○痘初出便作腰痛見紫黑點者多。○痘瘡腹痛多是痘毒當臨證消息。○痘疹必先腹痛蓋痘子先自腸胃中出然後發於外宜升麻葛根湯。方見寒門。加減紅綿散。方見下。○細目。○發熱時腹痛或腹脹者由毒氣與外邪相薄欲出而不得出宜參蘇飲。方見寒門。去人參茯苓加縮砂表之。醫鑒。○收。

屬時腹痛不屬痛在中腕乃熱毒凝滯瘀血作痛宜手捻散。○痘疹出不透腹痛甚或黑陷宜蟬退湯。得效。

手捻散

鼠粘子白芍藥大黃桃仁各六分紅花四分桂枝二分半右剉作一貼水煎服四春

蟬退湯

蟬殼二十一箇甘艸一錢半右剉水煎服或為末每一錢白湯調下腹痛立止而出透神效得效

驚搖

欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦非驚風也服發散藥加減紅綿散是也丹心○痘毒驚搐心肝熱也瀉

肝則風自去宜瀉青丸方見五藏○先驚後痘者輕先痘後驚者逆入門○發熱時發驚者痘在心經而出也

乃為吉兆醫鑒○痘未出先發搐是兼外邪宜加減紅綿散如痘發稠容毒熱內熾或倒靨黑陷時

作搐搦宜用猪心龍腦膏子方見黑陷○正傳

加減紅綿散

麻黃荊芥穗全蝎天麻薄荷紫艸茸蟬殼各五分右剉作一貼入葱白一莖同煎服入門

嘔吐

凡顯痘疹若自吐瀉者不可妄瀉而多吉謂邪氣上下皆出也易老○痘初熱吐瀉無妨痘出後忌

入門○吐瀉喘渴蚊虫已出目直視大傻流腸垢者上吐瀉此作宜用定中湯同春○寒甚腹痛嘔逆

下利宜理中湯方見寒門加木香丁香肉豆蔻煨醫鑒

定中湯

收斂胃氣止吐瀉神效取真正黃色土不雜沙石者一塊置塊內以百沸湯泡之以蓋合

定候溫右用兩酒盞和水飛朱砂末五分水飛雄黃末一錢少加砂糖溫服一服立止四春

泄瀉

痘出後極忌泄瀉起脹時尤忌○痘瀉急用保元湯方見上

加肉桂白芍藥煎服腸滑者肉豆蔻煨一箇乳香一豆大為末糯米飲調下入門○痘出不光澤不起發根窠不紅或瀉而渴或腹脹或氣

促是表裏俱虛宜異功散煎水吞下肉豆蔻丸○腹脹瀉渴乃胃中津液少也宜用木香散綱目○

泄瀉頻多，津液內耗，血氣不榮，其痘惟起發，必不能屬。宜木香散救之。丹心。起脹時泄瀉，則內氣虛脫，瘡必陷伏，宜

用固真湯醫鑒

異功散

治痘磨之際，頭溫足冷，腹脹渴瀉，如寒戰咬牙，腹脹足冷，過膝者，用此救之。木香當歸各三分，半桂皮、白朮、白茯苓各二分，陳皮厚朴人參肉豆蔻煨丁香各二分，半附子炮半夏各一分，半右剉作一貼，入薑三棗二水煎服。此等證亦多，屬熱不可不察，有熱則不可用。

木香散

治痘瘡腹脹渴瀉，木香丁香桂枝陳皮半夏赤茯苓人參訶子皮大腹皮前胡甘艸各三分，右剉作一貼，薑三片水煎服。冷證可用，有熱則不可用。

肉豆蔻丸

治痘疹泄瀉，赤右脂白礬枯各七錢，半白龍骨肉豆蔻煨訶子肉各五錢，木香縮砂各三錢，右為末，麪糊和丸，黍米大溫米飲吞下。一歲兒二十丸，三歲兒百丸。

固真湯

治痘瘡泄瀉，黃芪人參白朮白茯苓白芍藥煨木香陳皮訶子皮肉豆蔻煨甘艸各三分，右剉作一貼，入糯米五十粒，同水煎服。糯米止泄瀉，養胃氣，最好。

痰喘

前胡枳殼湯。治咳嗽逆，痘出後痰盛喘急，宜人參清膈散。龍丸方見上降痰醫鑒。痘痰用白附子杏仁煎水磨服，切不可用陳湯。方見痰門。燥胃中津液。貫膿時咳逆，乃胃氣上越，欲絕故也。以真黃土鼻邊聞之，立止。春。痘疹咳，氣喘乃毒攻肺，脹也。胃高聲啞者，久。凡無痰而喘急，不得臥者，亦久入門。

人參清膈散

白朮黃芪紫苑地骨皮滑石各三分，石膏桔梗甘草各二分，人參黃芩桑白皮前胡當歸白芍藥知母赤茯苓各一分，右剉作一貼，水煎服。

前胡枳殼湯

前胡枳殼大黃赤茯苓甘艸各六分，右剉作一貼，水煎服。

痘疹醫鑒卷第十一

七十一

煩渴

痘瘡煩渴飲水渴轉甚者乃脾胃虛津液少也宜木香散方見上。一云脹渴瀉渴驚悸渴寒戰渴咬牙渴亦多屬熱不可不察若誤用則禍如反掌。○當壓而不壓煩渴腹脹泄瀉頭溫足冷速與木香散救之。○痘瘡煩渴切不可與冷水喫亦不宜與蜜水紅柿西瓜梨橘等冷物若冷毒內攻腹脹喘悶寒戰咬牙則難治。綱目。○痘瘡首尾不可飲冷水少與滾熟水則可若飲水過多溼損脾胃則氣血凝滯不散故瘡痂遲落而生癰腫也。○痘瘡發渴乃氣弱而津液枯竭也宜保元湯方見上加麥門冬五味子煎服若不止參苓白朮散方見內傷加乾葛天花粉五味子煎服即止。醫鑿。○痘渴宜紅花子湯加鼠粘子煎服。口中和烟起即解。切不可用棗湯若大渴者定中湯方見上和砂糖服立止。回春。○痘瘡煩渴乃毒火炎上也宜烏梅湯甘州湯。○飲水過多而尿少恐溼漬脾土成癰腫宜益元散方見暑門。滲之。○血虛痘黑火動發渴者難治凡虛證見渴者皆灰入門。

紅花子湯

治痘渴及痘不快出紅花子一合水煎服之。正傳。

烏梅湯

治同上。黑豆茶豆各一合烏梅三箇右水煎服之。入門。

甘州湯

治同上。甘州瓜萸根各二錢右剉水煎服之。入門。

腹脹

腹脹由脾胃虛氣攻作也。又脾虛則腹脹飲水多則亦作腹脹。錢乙。○痘瘡泄瀉毒陷腹脹酒調人齒散服之。方見下。○醫鑿。○痘病腹脹有二傷生冷而脹宜木香散方見上。毒氣內陷而脹宜人齒散。○腹脹不食神昏者灰入門。

自汗

痘瘡初起自汗不妨蓋溼熱熏蒸而起故也。甚者當以參芪止之。妨其難屬丹心。○痘出後切忌汗多必難貫膿收靨急用保元湯方見上。止之。入門。

痒痛

血不榮肌腠所以痒血和肌潤痒自不作。丹心。○手足常搖動者將發痒也因食毒物及食鹽而痒。

小活血散

白芍藥為細末每錢淡酒調下正傳

四君子湯 方見氣門 加酒炒芩連大黃微潤之
痘疹出多身痛叫喚及煩躁脹痛宜小活血散
痘痒通用蟬退湯痒甚水楊湯浴之方見上
法鹽和百州霜水拌略炒燒烟熏之痒立止又密
水調滑石末雞羽潤瘡上亦止○痛乃痘之善證
初出時宜參蘇飲方見寒門 輕者消毒飲方見上
起脹貫膿時作痛不妨入門 ○凡痘痛不為外寒
所折而痛則必皮腠厚密難出為痛寒折宜參蘇
飲肉腠密宜小活血散 ○因食毒物作痒宜蟬退
湯方見上 百花香膏正傳 ○痘痒難任宜參敗州散
方見下 蕎麥粉亦好綱目 ○因虛發痒遍身爪破
宜內托散方見上 去桂倍白芷當歸木香氣行血
運其痒自止醫鑿 ○痘瘡煩痛宜硝膽膏方見仍
用真黃土細末糝之良○痘將靨乾硬而痛宜塗
酥油潤之猪脂亦好海藏 ○收靨時遍
身發痒爪破無膿如豆殼者成醫鑿

百花膏

白蜜略用湯和時時以雞羽刷身上正傳

斑爛

痘毒出盛表虛難靨以致肌肉壞爛名曰斑爛膿
不乾作痛宜敗州散或黃土細末糝之○暑月痘
爛生蛆以帶葉柳枝鋪地上臥之或糞以芭蕉葉
又以水楊湯方見上浴之入門 ○痘瘡斑爛煩痛
或臭爛深坑不收口宜用硝膽膏海藏 ○痘瘡斑
爛成片膿水不乾宜白龍散正傳 ○穢氣衝觸發
痒爪破斑爛宜服內托散方見上外用祛穢散方
見上 焚熏醫鑿 ○擦破周身不能回水或痘靨溼
爛淋漓粘淖宜甄陶散糝之最妙回春
○遍身臭爛如餅搭目中無神者死入門

敗州散

多年蓋屋上爛州晒乾細末糝之若渾身瘡
爛則攤於席上令坐臥其上此神經霜雪雨
露感天地陰陽之
氣善解瘡毒入門

硝膽膏

硝為末調猪膽汁塗之
無硝則煇硝亦可綱目

白龍散

黃牛糞晒乾火煨成灰取中
心白者綿裹撲傳之正傳
新瓦研為細末羅過絹包裹撲患處若乾
痂堆積內有窠膿以鴨卵清調付四春

寒戰

痘瘡黑陷必寒戰蓋黑者歸腎水惡證也腎旺勝
脾土不剋水故脾虛寒戰則難治錢乙○七日前
寒戰者表虛也咬牙者內虛也七日後寒戰者氣
虛也咬牙者血虛也氣虛用保元湯方見加桂血
虛用保元湯加川芎當歸醫鑑○當歸不

咬牙

屬泄瀉寒戰此屬虛寒宜異功散方見○醫鑑
上下齒相磨切有聲謂之斷齒即咬牙也亦曰憂
齒類聚○傷寒論曰熱極口噤咬牙以承氣湯
方見寒門下之此熱入胃府也錢仲陽曰痘黑陷
口噤咬牙以百祥丸下之此毒入腎藏也然則咬
牙一證乃熱毒入藏府也百祥丸治墮齒甚

失血

痘疹熱盛吐衄便尿失血並宜犀角地黃湯方見
血門○出痘時口鼻及耳血不止者或吐利不止
一便下血者亦或入醫鑑○痘爛煩痛小便澀而下
血者中壞也不治海藏○起脹貫膿時便血而痘
壞無膿者或又九竅
流血者亦或入門

尿澀

痘疹小便澀者宜導赤散方見○痘毒內鬱
當消息大小便如何如小便澀則通小便宜大連
翹飲方見上大便澀則通大便宜四順清涼飲方
見火門○痘瘡不快煩躁咬牙尿澀宜用人參蟬
蛻散紫艸木
通湯綱目

人參蟬蛻散

人參蟬殼木通白芍藥赤茯苓紫艸草
甘艸各五分右剉作二貼水煎服綱目

紫艸木通湯

紫艸草木通人參赤茯苓糯米各
四分甘艸二分右剉水煎服入門

便祕

痘疹用藥固有权度大小二便不可不通一有祕
結則腸胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄日閉聲
啞肌肉鰲黑不旋踵而變矣正傳○大便二日一
便者為順三四日不便為祕一日三四便為利入

門 ○錢氏雖云云瘡疹始終不可下。若有裏證及大便結者安得不下。當歸丸棗變百祥丸 友見下四

順清涼飲 友見火門選而用之。海藏 ○痘熱壅盛便閉不通蜜皂丸導之。或用油醬法潤之。醫鑿

當歸丸

治痘瘡大便祕結。當歸五錢甘州二錢半黃連大黃各一錢半右各為末先將當歸熬膏

蜜皂丸

子乃入三味末和勻作丸。菜豆大米飲吞下五七丸漸加服以利為度。海藏

油醬法

治大便久不通香油清醬各一合攪令十分和勻以小竹筒插入肛門內取油醬灌入竹筒內令人吹之令漸入或

倒靨

痘形陷伏倒靨者自其內傷氣虛而不能起發謂之陷伏。當溫中托裏。宜內托散保元湯 二方見上。自其外感及觸穢而言謂之倒靨。當溫散寒邪。宜調解散。若觸穢則碎穢散 友見上。熏解之。○當出不出當脹不脹當貫不貫當靨不靨。勻謂之陷伏。倒靨。○痘出或為風冷所折致水硬宜調解散。入門。○痘白色將靨時如豆殼者因初起時飲水多其靨不齊俗呼為倒靨。但服實表之劑宜保元湯。方見上。痘出不快及倒靨。宜四聖散加味。四聖散 二方見上。

調解散

青皮陳皮桔梗枳殼當歸紫蘇葉半夏川芎紫艸草木通乾葛甘艸各三分人參一分半

水楊湯

治陷伏倒靨不起。浴之神效。方見上。痘變不過陷伏倒靨黑陷斑爛四者而黑陷最危。可不究。○諸痘黑陷毒氣入裏心神昏悶宜猪尾

黑陷

東醫圖書集成痘疹病篇十一

七十六

膏○痘瘡黑陷毒鬱煩躁痰盛在胃宜四齒散○
 觸犯穢汚毒入內黑陷者服再避散焚辟穢散○
 方見上○入門○痘疹重者十二清四五黑者十二難
 救○其候寒戰咬牙或身黃腫紫急以百祥丸或
 棗變百祥丸下之身熱氣溫欲飲水者可治如惡
 寒不已身冷出汗耳尻反熱者必益脾能勝腎故
 身熱欲飲水脾不勝腎故惡寒身冷腎土黑陷故
 也○未綻一齊黑者為黑陷已綻而不齊黑者為
 將屬錢○青乾黑陷身不大熱大小便澀則是
 熱在內也宜用宜風散加味宜風散○痘瘡
 初出光壯忽然黑陷心煩狂躁氣喘妄語或見鬼
 神不速治則毒入藏必死宜回生散龍腦膏子
 目○痘瘡黑陷宜加味四聖散更以胡荽酒噴其
 身二方見上若未效則用獨聖散甚則宜加味宜
 風散丹心○痘黑倒陷猪尾膏龍腦膏子無比散
 無不驗活人○痘黑陷危惡至死宜四真散海藏
 上○黑陷狂躁煩渴熱毒太盛宜加味六一散方見
 上○醫鑒○痘焦乾黑陷身熱如火宜用二角飲

種杏 ○黑陷發搐目直喘急宜用周天散入門○
 痘瘡倒靨黑陷宜用麻黃湯本州 ○痘黑陷悶亂
 神昏者灰又目閉無
 魂者灰不治入門

猪尾膏

治痘瘡陷伏倒靨不起發或毒氣入裏黑陷
 危惡者龍腦一錢刺取小猪尾尖血和丸小
 豆大淡酒或紫艸飲化下熱盛則新汲水化下神
 驗蓋猪尾無一特休息取振掉發揚之意也活人

四齒散

治痘不紅不起發或黑陷焦枯人齒猫齒狗
 齒猪齒各等分盛砂鍋內火煨候冷研為細
 末每取五分熱酒調下一二歲兒服一二三分五六
 歲兒服四五分取效如神蓋黑證屬腎四齒亦屬
 腎故能發腎毒又猫齒能解熱毒若無猫
 齒只用人齒亦可但不如四齒全方入門

百祥丸

治痘紫黑陷伏寒戰口噤憂齒危證紅芽太
 載不以多少陰乾漿水煮軟去骨晒乾復納
 汁中煮汁盡焙乾為末右水丸黍米大每二十
 丸研脂麻湯下此方太峻五代以棗變百祥丸加

味宜風散錢

棗變百祥丸

治痘黑陷及大便祕結紅芽大戟去骨

水盡為度去大戟不用將棗肉作丸如上海法服之蓋大戟性峻以棗變者緩其性也

宣風散

治痘青乾黑陷煩渴腹脹而喘二便赤澀乃熱蓄於內宜服黑丑四兩取頭末一兩半生

半炒陳皮甘州各二錢半檳榔兩箇右細末二三歲兒服五分四五歲已上兒一錢蜜湯下錢氏

加味宣風散

治同上即宣風散加青皮二錢半也依上法服之先下黑糞次下襖糞後以四

君子湯方見氣門加厚朴木香糯米煎服和胃良久糞黃瘡自微出又以胡荽酒方見上噴身即發起得效

回生散

生人齒小兒齒自落者佳火煨研為細末每齒一箇作一服淡酒調下入麝香少許尤妙

黑陷甚則用八齒五分羌活一錢穿山甲炮麝香各少許為末每一錢麻黃薄荷湯調下一服便起凡人齒不可過用一錢過則陽盡出表急以四君子湯方見氣門加芎歸救之綱目一名人齒散治痘出不快或倒靨黑陷入門○錢氏方用溫酒調下雲岐方用升麻紫艸湯調下凡痘瘡最怕麝香與酒氣然則只用紫艸湯自好虞世

龍腦膏子

治痘瘡未透心煩狂躁氣喘安語或見鬼神或已發而倒靨黑陷不速治則毒入藏

必灰梅花腦子一錢研細滴猪心血和丸如豆子大每服一丸井華水化下心煩狂躁紫艸湯化下黑陷溫淡酒化下服畢少時心神便定得睡瘡復透活○一名猪心龍腦膏活人

獨聖散

治黑陷氣欲絕穿山甲取前足及背上者炒研為末木香煎湯入酒少許調五分服入麝

香少許尤妙入門

無比散

治黑陷焦枯熱毒內爛惡候朱砂一錢半牛黃麝香龍腦膩粉各二分半右為細末新汲水入小豬尾血三五點同調服小兒二分半大兒五分得睡後利下惡物便安活人

四糞散

治倒靨黑陷危惡者童男黑猫黑犬黑猪各一俱取未破陽雄者先於重九日各置淨室中勿雜食收其屎陰乾至臘月初八日日未出時火煨存性為細末每用一錢蜜水調下入門一下方倉卒無此藥只取無病小兒糞燒灰以蜜水調下正傳一名無價散一名捷效化毒散丹心一名萬金散正傳

二角飲

治痘焦乾黑陷身熱如火犀角羚羊角各等分并水濃磨取汁服有回生之功種杏

周天散

治黑陷發搐目直啼急蟬殼五錢地龍一兩為末每二錢研乳香湯調下入門

麻黃湯

治倒靨黑陷麻黃去節五錢煎沸去上沫再煎去三分之一去滓乘熱服神效本州

一方

治黑陷牛黃清心圓半丸井水調下入門見風門一京鼠水溫服俗方

護眼

痘瘡盛發先用此藥則痘不入眼面亦稀少宜用黃柏膏錢一痘出太盛恐入眼為害宜消毒飲

方見上加酒炒苧連桑白皮州龍膽煎服外塗脂膏○回漿時眼腫不能開者以水溼絹中拭去膿尿略用手指攀開眼皮透一點風則不致生醫膜○眼角出膿大甚必損雙目宜清解內毒以預防用消毒飲犀角地黃湯二方見上

黃柏膏

一名護眼膏一名神應膏黃柏一兩甘州四兩紅花二兩菘豆粉一兩半右為末清油調從耳前至于兩眼四畔厚塗之錢一

胭脂膏

乾胭脂蜜調塗兩眼

一方

痘初出鼠粘子為末水調貼額門上則痘不入眼蕭氏

東坡書局影印

三十一

滅癩

痘纔看赤卽用菜子油卽蔓菁子不在潤之可搗
 則搗若不潤及遲搗則瘡痂硬必隱成癩痕錢乙
 ○痘成赤頻以酥油或白蜜潤之可搗卽搗血出
 無妨若乾硬必成癩痕○痘將屬乾硬而痛宜以
 真酥潤之無酥則猪脂煎汁代之得效○痘痂雖
 落其癩猶黯肉起而或凹或凸當用滅癩散錢乙
 水細目○痘落後宜用滅癩散錢乙兩
 煉一二沸輕粉一錢右研如膏每日塗瘡上○或
 用稀痘湯細目○密陀僧末
 臨臥塗面明朝洗去本州

滅癩散

韶粉一兩卽鉛粉輕粉二分半右研
 細煉猪油調和塗癩上日三次細目

蜆子水

痘後以此洗面漸生肌肉無癩痕取活蜆子
 不以多少以水養五日每日取此水常洗手
 面入門

稀痘湯

卽祕傳稀痘湯也凡痘收靨時取此湯微溫
 洗面則無癩痕洗半面則半面無癩痕神效

痘後雜病

方見上
俗方

痘疹愈而再發或氣虛稟弱坐臥振搖者宜
 用保元湯方見上○愈後忽遍身青黑口噤
 搖擗此氣虛感風宜用消風散方見頭部○愈後
 非時發搐目窺面赤乃心熱挾痰宜用抱龍丸方
 見上○入門○愈後餘瘡塞鼻中不得臥宜用
 木筆花散得效○痘愈後心痛不可忍此餘毒歸
 心急服乳香散丹心○痘愈後失音宜用天花散
 正傳○痘愈後餘毒成走馬疳牙齦腐爛宜付搽
 牙散○痘愈後咽喉腫痛宜服七味甘桔湯醫鑒
 ○痘餘毒肝虛則入眼自肺虛則爲疥癬或爲癰
 瘡而發在骨節腎之虛也發在肌肉脾之虛也或
 在筋或在頭或在面或牙齒疳蝕或咽喉腫痛宜
 服解毒藥消毒飲三豆飲
 之類二方見上○海藏

木筆花散

辛夷花爲細末加麝香少許以
 蔥白蘸入鼻中數次卽通得效

乳香散

乳香二錢水一盞煎服丹心

天花散

天花粉桔梗白茯苓訶子肉石菖蒲甘艸各等分右為末用水調半匙在碗內外以小竹

七莖黃荊七條縛作一束點天在碗內煎服正傳

搽牙散

白梅肉燒存性白礬枯各二錢半人中白煨五錢右為細末先以韭菜根老茶濃煎水雞

羽蘸洗去腐爛惡肉至見鮮血乃付藥日三次爛至喉中者用小竹筒吹藥入雖牙齒爛落口唇穿破付藥皆愈但鼻梁發毒點則不可治醫鑿

七味甘桔湯

甘艸桔梗各五分防風玄參鼠粘子升麻射干各三分右剉水煎服醫鑿

痘後諸疾

有痘後腎膜痘後癰瘡痘後痢疾凡二三條

痘後腎膜

痘後餘毒入眼生腎膜遮睛用瀉青丸方見五歲大效初覺易治每取一二丸或三丸以竹

葉煎湯和砂糖化下微利神效東垣痘疹入眼生腎膜宜用蟬猪散半年內者一月取效一年者不治錢乙○痘後日生腎膜但活血解毒則疼痛自止腎膜自去○不效點藥益毒氣自藏達外點藥攻逼反以為害○無腎但眼自無光者過百日氣血復則自明○痘後眼腫痛或生赤脉或白膜遮睛四邊散漫者易治若點遮黑睛多致失明宜用地黃散○食毒物睛凸出宜二仙散○眼腫突如桃者貼護眼膏○見上眼腫不開黃連末調雞子清貼兩太陽穴及兩足心入門○痘瘡入眼雖赤白障腎膜遮漫黑睛但瞳子不陷者可治宜用決明丸○痘後生腎障宜用蟬菊散羌菊散得效○痘後生腎膜宜服通明散兼用吹雲散入耳又宜兔尿湯四皮飲諸方

蜜蒙花散

蜜蒙花青箱子決明子車前子各等分右為末取一二錢用羊肝一大片薄批糝藥末

溼紙裹煨熟空心
以米泔下活人

通聖散

食之日
二三活人

白菊花 菘菜 豆皮 穀精 州各等分 右為末 取一
錢 乾柿 一箇 米泔 一盞 同煎 候泔盡 只取柿

蟬猪散

取三分三歲兒五分漿
水調服日三夜一錢乙

蟬殼 一兩 猪懸蹄 中二兩 入罐內 鹽泥固濟
燒存性 羚羊角 屑二錢 半右為細末 一歲兒

地黃散

通甘艸各二分 半右為末 每取
五分 以羊肝煮汁調服 入門

生地黄 熟地 黃當歸 防風 羌活 蟬殼 犀角 木
賊 穀精 州白 蒺藜 大黃 各一錢 玄參 五分 木

二仙散

劉作一貼水煎服 入門
石決明 煨川芎 黃柏 各一兩 蒼朮 五錢 右為

末 以兔肝和丸 菘菜 豆大 米泔下 三十九丸 無兔

決明丸

肝代以羊
肝得效

蟬菊散

蟬殼 白菊花 各一錢 右入
蜜少許 水煎服之 得效

治痘後生 醫膜 疼痛 羞明 羌活 蟬殼 蛇蛻 防

羌菊散

甘艸 各等分 右為末 每
一錢 清米泔調下 得效

風甘菊 穀精 州白 木賊 梔子 白蒺藜 大黃 黃連

通明散

貼水煎
服醫鑿

當歸 川芎 赤芍 藥生 地黃 防風 乾葛 甘菊 天
花粉 蟬殼 各二分 半 穀精 州五分 右劉作一

吹雲散

黃丹 水飛 一錢 輕粉 三分 龍腦 一釐 右為末
以鵝翎管吹入耳內 如左眼病吹入右耳 右
眼病吹入左耳 一日三次 兼服通
明散 宜早治之 久則難治 醫鑿

治痘後生 醫障 兔屎 焙為末

兔屎湯

每一錢 茶清調下 最妙 入門

治痘後生 醫障 兔屎 焙為末

四皮飲

治痘後生醫菘豆黑豆赤小豆水浸取皮各半錢新採桑白皮一錢右剉煎水調下蟬菊散最妙俗方○生桑白皮能瀉肺膜不生醫便退入門

點法

治痘後醫膜生鱗魚剉懸刺項下取血點醫上最妙直○痘後醫雖云不疔點藥惟此最妙直

痘後癰瘡

凡痘癰必先手足及脈絡之處或有紅腫或有硬痛處皆發癰之兆也痘未愈則不須治○痘毒流注脈絡輕者結核瘡瘡瘡而已甚者頭面胃脇手足肢節焮腫作痛宜用消毒湯○痘癰膿血不收宜用欽肌散○痘後生疔瘡疥癬宜用金華散入門○痘疹餘毒未殄頭面身體多生癰瘡宜用犀角化毒丹醫鑑○痘癰成疔蝕瘡濃水不止若不治則多潰爛筋骨終成廢人宜用雄黃散綿蠻散綱目○痘癰初起紅腫時黑菘赤三豆醋浸研取汁以雞羽蘸刷上隨手退消神效○痘後癰毒腫痛宜消毒飲方見上必勝膏正傳○痘癰落後餘毒不盡變成癩癬苦洋臘猪油塗之

神效
綱目

消毒湯

赤芍藥連翹各一錢甘州節桔梗各五分貝母忍冬州白芷瓜蔓根各三分右剉作一貼水煎服○此即丹溪消痘癰方也入門

欽肌散

黃連黃柏地骨皮五倍子甘州各等分右為細末乾糝之入門

金華散

黃丹黃柏黃連大黃黃芪各三錢輕粉麝香各一錢右為末乾糝或以猪脂調塗之入門

犀角化毒丹

治痘疹餘毒未解頭面身體多生癰瘡或唇口腫破生瘡牙齦出血口臭桔梗一兩連翹玄參各六錢生乾地黃酒洗赤芍苓鼠粘子微炒各五錢焰硝犀角鎊甘州各三錢青黛二錢右為末蜜和每二兩分作二下醫鑑十九丸每丸薄荷湯化下

雄黃散

石雄黃一錢銅綠二錢右為末乾糝綱目

綿蠶散

綿蠶一箇須用出蛾空者以生白礬末填滿其虫炭火燒令礬汁盡取出研細乾糝之

心勝膏

馬齒莧搗取汁猪脂白蜜右等分合和熬膏塗之

痘後痢疾

痘後下痢膿血或下腸垢宜用犀角地黃湯方見血門黃連阿膠丸方見大便

薤白湯

薤白切半盞豆豉一盞山梔子十枚去皮右水煮薤白爛去滓溫服入門

附孕婦痘瘡

孕婦發痘瘡宜單胎散熱甚宜參蘇飲方見寒門

單胎散

赤茯苓白朮當歸赤芍藥柴胡乾葛人參桔梗條芩防風陳皮荊芥枳殼紫州阿膠白芷川芎縮砂甘州各三分右剉作一貼入糯米百粒柿蒂七箇苧根七寸瓜蒂一箇以銀器用荷葉蓋

覆水煎空心服無銀器以砂罐煎之荷葉雖無不妨

安胎散

人參陳皮大腹皮白朮當歸川芎白芍藥香附子童便炒縮砂紫蘇葉赤茯苓甘州各三分右剉作一貼入燈心七

附痘疹

有色點而無顆粒者曰癩浮小而有顆粒者曰疹疹者如粟米微紅隱隱皮膚不出作痒全無腫痛○麻子最小隱隱如麻子頂平軟不碍指即有清水痘多挾疹同出麻亦多挾疹同出故曰痘疹麻疹○痘屬五藏為陰難出難屬麻屬六府為陽易出易屬○麻毒原來只肺胃紅癩五六日方出狀如麻子遍身無空處初熱二三日發出起脹共三日出而又沒沒而又出沒一周時許重者遍身滿脹眼亦封閉有赤白微黃色不同仍要紅活最嫌黑胎○麻疹雜證與痘瘡大同但始終藥宜清涼○麻疹以升麻葛根湯方見寒門加蔥白紫蘇葉

乃麻疹初起之神方也。或用蘇葛湯亦佳。或以加味敗毒散方見上表之汗後身涼紅痕自滅。麻不出而喘者灰燻成黑癩者亦灰燻。麻沒後餘毒內攻循衣摸床譫語神昏者亦灰燻入門。○麻疹當以蔥白湯飲之。其麻自出如渴只宜蔥白湯以滋其渴。使毛竅中常微汗潤澤可也。過二三日不沒者內有實熱犀角地黃湯方見血門解之。醫鑑。○癩疥疥毒之病是肺胃熱毒熏發於皮膚狀如蚊蚤所咬故謂之疥癩。今俗謂之紅癩。毒疫宜用葛根麥門冬散丹心。

蘇葛湯

紫蘇葉乾葛甘艸各二錢白芍藥一錢半陳皮縮砂研各五分右剉入蔥白二莖生薑三片水煎服醫鑑

蔥白湯

生蔥去青葉取白根連鬚不拘多少水煎取汁服醫鑑

葛根夾門冬散

石膏一錢葛根麥門冬各六分人參升麻赤茯苓芍藥甘艸各三分右

剉水煎服丹心

單方

凡七十種

白礬

小兒臍瘡及臍中汁出不止枯白礬末糝之。初生兒有皮膜如石榴膜暴舌可以指爪刺破令血出以枯白礬末敷之若不滴去兒必癩木州

伏龍肝

治小兒赤遊丹毒行於身上下至心即灰取為細末芭蕉汁或雞子白或井水調塗本州

胡粉

小兒卒患肚皮青黑不急治即灰酒和胡粉塗腹上乾則再塗又用灸法養生

臘雪水

治小兒熱癩狂啼小溫飲之赤遊丹毒取水塗之木州

焰硝

治小兒火丹毒取硝納湯中雞羽頻頻塗上木州

地龍汁

治小兒熱病癩癩取少許飲之本州

藍葉汁

殺疳虫治小兒壯熱疳取飲之亦治丹毒入內本州

黃連

殺疳虫猪肚蒸鴉為丸服。亦治鼻疳鼻下作瘡取為末付自本州

蒲黃

治小兒虛熱蜜和作果食之甚益小兒本州

酸漿

小兒食之能除熱有益本州

王瓜

封臍治小兒痢疾良方王瓜藤經霜晒乾燒存性為末香油調納臍中立效醫聖

使君子

殺小兒疳虫及蛔虫寸白取中仁食之虫即下本州

天南星

治驚風聲啞不能言及諸病後不能言南星一箇去皮臍泡為末三歲兒半錢或一字以猪膽汁調下即能言神效醫鑑

篇蓄

治小兒蚘虫痛煮汁令濃飲之虫即下取汁煮粥服亦佳本州

苧根

治小兒惡毒瘡五色無常苧根煮湯浴日三四本州

五加皮

治小兒三歲不能行取皮細末每取一錢粥飲調次入好酒少許服日三服行本州

竹葉

治小兒驚熱煎湯飲之竹瀝尤好溫服本州

柳絮

多積可作種極柔軟宜與小兒臥極佳以其性涼故也本州

龜尿

治小兒龜背取尿摩背上即差本州

鯽魚

小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦取膽滴鼻中三五日差。頭瘡口瘡取頭燒灰為末塗之本州

露蜂房

治小兒赤白痢燒為末和飲服。大小便不通蜂房燒為末酒和服一錢日三服本州

鼈

小兒骨蒸勞瘦取肉作臍食之。小兒脫肛鼈頭燒為灰付之本州

蟹 小兒解顛不合取蟹螯並白芨末爛搗貼顛上顛即合 本州

蟬殼 主小兒驚癇夜啼身熱為末和飲服。取殼水煎服出痘疹甚快 本州

蟾蜍 丹走皮中浸淫取蟾。蟾汁塗之良 本州

烏賊魚骨 治小兒痢為末以茶采飲調下 本州

白僵蠶 治小兒客忤及臍風撮口口噤取二枚為末蜜和付唇內即差 本州

蝸牛 入嬰兒驚風藥最勝。細研入藥和用 本州

蟾蜍 治小兒疳殺虫燒為灰和米飲服。疳瘡臍瘡口瘡燒為末付之 本州

牡鼠肉 主小兒疳丁突哺露以黃泥裹燒去骨取肉和五味作羹與食之勿食骨甚瘦人 本州

雄鼠糞 治小兒齒不生取三七粒每日常用一粒搗齒齦上二十一日齒當出其兩頭尖者是雄糞 本州

也本州

小鰕 小兒赤白遊疹丹毒取溝渠中小鰕生搗碎付之 本州

蛇蛻 主小兒一百二十種驚癇燒灰服。身上諸瘡燒末猪脂調付 本州

蜘蛛 能行者燒熟啖之 本州

蚯蚓 治小兒丹毒流腫及月蝕瘡。取地龍糞水和塗之妙 本州

蜈蚣 初生小兒口噤不開不吮乳蜈蚣炙為末猪乳二合調半錢灌服 本州

水蛭 小兒丹毒及赤白遊疹用蜈蚣法取水蛭吮出惡血最妙 本州

雀瓮 治小兒慢驚天漿子即雀瓮。白僵蠶全蝎各三枚為末麻黃煎湯調服一字神效。驚癇取汁灌口中常服命兒無疾。撮。口病取汁塗口傍即差 本州

蛙 治小兒熱瘡，搗碎付之。○赤白痢及泄瀉，煩熱或煮或燒食之，妙。本艸。

壁錢 治小兒吐逆，取一二枚，煮汁飲之。本艸。

栗毛殼 主小兒火丹及五色丹，栗殼煮汁洗之。本艸。

蒲萄 主痘疹不出，食之盡出。或研酒服之，亦佳。本艸。

乾柿 和米粉作餅與小兒。治心藏風熱昏憒，燥悶生梨，取汁入米煮粥食之。本艸。

梨 治痰嗽喘，梨去核入蜜煨食之。醫鑿。生嚼付小兒頭瘡，良。亦治軟瘡。本艸。

脂麻 若客熱，搗取汁飲之。本艸。

赤小豆 治小兒丹毒及詐肥軟瘡，搗為末和雞子白塗之。逐手即消。本艸。

蓼實 治小兒頭瘡，搗為末和雞子白塗之。本艸。

冬瓜仁 主慢驚風，或未服或煎服，皆效。得效。

薄荷 主小兒驚風壯熱，又治風涎為切要之藥。水煮熟取汁飲之。本艸。

馬齒莧 主小兒疳痢，煮熟和五味空心食之。○痘後癩痕及白禿瘡，馬齒莧汁熬膏塗之。妙。本艸。

芥子 治痘出不快，色不紅潤，宜內服。紫艸飲。方見。上外用芥子為末，白湯調如膏塗兒腳心，乾則再塗，即快出。紅活入門。

雞腸艸 治小兒赤白痢，搗取汁下。合和蜜服之。甚良。本艸。

水芹 治小兒暴熱及霍亂吐利，搗取汁服之。或者煮取汁飲之。本艸。

人爪甲 小兒初生，便多驚，剪取父母兩手爪甲，燒為灰，麩糊和丸。麻子大，井水下，一丸。千金。

亂髮灰 治小兒熱瘡，取亂髮雞子大，於銚上熬令汁出，塗之。甚妙。本艸。

雞子

治小兒疳痢及休息痢雞子和黃蠟作餅煎與食。頭身諸瘡雞子殼末和猪脂付之。本州

白鴨

主小兒熱驚癇頭生瘡腫取肉和蔥豉煮汁飲之。本州

鵝毛

取輕茸細毛夾布為褥偏安覆小兒兼辟驚癇蓋柔而性冷故也。類聚

夜明砂

治小兒無辜疳及諸疳夜明砂炒為末入飲食中任意與食。本州

鷓鴣尿

主小兒疳痢取尿研為末炙猪肉點與咬有奇效。本州

鶴鶉

治小兒疳痢下五色取鶴鶉炙熟朝朝食之甚補下止痢。本州

百舌鳥

治小兒久不語取肉炙食之。本州。即今之鸞也一名反舌。綱目

麝香

主小兒驚癇及客忤取當門子一粒朱砂相似細研熟水和灌下。本州

牛黃

治小兒驚癇迷悶日直口禁取牛黃大豆許研和蜜水灌之。本州

熊膽

主小兒五疳殺蟲療疳瘡取兩大豆許和乳汁或竹瀝服之。本州

阿膠

能育神凡小兒驚風後眼中瞳子不正者阿膠一倍人參半倍煎與服之。本州

虎骨

水煮作湯浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇。虎爪懸小兒臂上辟惡鬼。驚啼客忤虎眼睛為末竹瀝調下。本州

兔肉

臘月取兔肉作醬食去小兒碗豆瘡雖發亦稀少。本州

猪乳汁

主小兒驚癇天弔取乳三合以綿纏浸入兒口令嚙之或和朱砂牛黃各少許尤效。小兒頭瘡猪膽汁付之。頭生白禿瘡臘猪屎燒末付之。本州

狐陰莖

主小兒陰積卵腫取得煮炙任令食之。本州

鍼灸法

小兒初生臍風撮口諸藥不效然谷鍼入二分或灸三壯立效。因。癩癇驚風神庭灸七壯

鼻上入髮際三分宛宛中灸三壯炷如小麥大又
取百會瘰脈綱目 ○癩癩瘰瘰兩躡主之男陽女
陰晝發治陽躡申脈夜發治陰躡照海各灸一七
壯易老 ○急慢驚灸印堂 ○急慢驚風危極不可
灸者先當兩乳頭黑肉上男左女右灸三壯 ○次
灸髮際眉心顙會各三壯 ○手足大指當甲角以
物縛兩手作一處以艾騎縫灸男近左邊女近右
邊半申半肉之間灸三壯先腕後手亦可治陰陽
諸癩艾炷如小麥大得效 ○慢驚慢脾逆惡證候
諸藥不效者如有大衝脈則取百會穴灸之神效
直小 ○小兒卒然腹皮青黑而厥灸臍上下左右
去臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸五壯
仍酒和胡粉塗腹上乾則易得效 ○小兒龜背灸
肺俞膈俞各三五壯止炷如小麥得效 ○小兒龜
背取兩乳前各二寸五分上兩行三骨罅間凡六
處各灸三壯炷如小麥春夏從下灸上秋冬從上
灸下若不依此法灸之無效綱目 ○顙門不合臍
上臍下各五分二穴各灸三壯灸瘡未發先合臍

目 ○小兒癰氣中腕章門各灸七壯綱目 ○灸癰
法穴在小兒背脊脊中自尾骶骨將手梳摸脊骨兩
傍有血筋發動處兩穴每一穴用銅錢三文壓上
穴上以艾炷安孔中各灸七壯此是癰之根貫血
之所也回春 ○小兒癰久不愈內庭灸一壯大傾
百會各灸隨半壯綱目 ○小兒霍亂男左女右第
二腳指上灸三壯即愈得效 ○小兒雀目灸兩手
大指甲後一寸內廉橫文頭白肉際各一壯 ○疳
眼灸合谷一壯綱目 ○小兒脫肛灸尾骶骨
尖上一壯又灸臍中三壯百會七壯綱目

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十一

