

門 九  
號 921  
卷

人無不識也... 門 九

野之... 號 921

或... 卷

手... 門 九

皇... 號 921

或... 卷

神... 門 九

此... 號 921

自... 卷


日... 門 九

人... 號 921

其... 卷

其... 門 九

其... 號 921



昭和二十七年  
二月二十七日  
購求



凡人ノ身体ノ部位ニ依テ治法ヲ教示編輯ス然レモ檢閲時ニ至ツテ  
 病因繁雜日常搜索スルニ條理ヲ失フ故ニ簡易明白ノ要領ヲ表  
 掲シ諸般ノ疾患種類同シキハ凡ク各部ニ連屬ス猶草木ノ形容花  
 実同類ハ皆一ニ係屬スルト同シ故ニ編中ニ諸病ヲ凡ク十病因鑿法証候  
 治法養生ヲ明ニ區別記載シ初學輩ノ搜索スルニ當テ其編ヲ求メ  
 是ヲ便ニメ學ニ得易ク連ニ諸病ノ條理ヲ辨別シ歸趣ヲ得テ法術  
 ヲ施シ易シ又人身究理論ノ如キハ其精要ヲ撮ミ理會シ易キヲ撰  
 述ス尤モ年月ヲ曆ルノ久キニ數々徵用試驗シ未タ及テ明セサルモ究  
 理ノ要法ニ依テ確定シ得テテニ於テハ毫モ疑ヒ無シトス

學子流ノ原據

人身ノ意識自然ノ良能ヲ主トシ皆此ヨリ究明理會シテ医術ノ學

法ヲ教諭又身体ノ家宅城郭ノ如シ未タ生レサル以前母体ニ在ルヨリ主  
 公タリ生産ヨリ生ニ育營養ヲ生リ常ニ平人ニ先恙ヲ要シ生命ヲ  
 保護ル自然ノ運化ヲ生ス若シ害ヲ為ス病毒アルハ諸部ノ精カヲ  
 張出シテ患害ヲ預メ計リ便利ノ順路ヨリ体外ニ驅出傾写ス即チ  
 嘔吐兩便汗ヲ平常ヨリニ格別ニ夥シ泄除ス或ハ鼻血咳血吐血尿  
 血痔血等ノ瘀滯ノ害ヲ泄シ善良ニ至ラシム又曰各部ニ血液アル  
 中ハ瘧疾ヲ絞縮ノ運動劇痛ヲ発シ病毒ヲ他ノ部ニ驅逐シテ且部  
 ノ危篤ヲ免ル寒冒咳嗽喘息ノ類ハ病毒ヲ變化シ鼻涕粘痰トシ  
 燃熱腫瘍ハ膿ニ化ス

人身諸具ノ究理  
 人身中全物ナシ皆諸筋脉管腺連綴シテ神魂ヲ人官ニ骨節ニ懸  
 接扶助シ便利自由作用ヲ致ス血ノ運動ヲ究明理會スルニ脉管ニ

濃

運動ノ健カヲ備ヘ脈絡細線組織衣膜ハ動脈血脈ニ附着シ支分岐  
 別シ胸中肺藏ニ鼓動ヲ生シ宛モ運水術ノ如シ心藏ハ凹空竅出スル  
 筋膜肉様ノ脈絡細線スル物ニ宛モ絞壓ノ器水氣ノ如キ精カヲ以テ  
 血ヲ動脈管中へ通射シ不斷蔓延シテ微細ノ脈絡ニ注キ惣身ニ通  
 行シ終リニ血脈ニ還流スルハ運行遲緩ニテ皆膜様半月ノ瓣ヲ具シ  
 血ノ逆戻ヲ防止シ又心藏ニ歸納ス動脈ノ血ハ血脈ニ反シ心藏ヨリ諸  
 部へ騰升輕拳ス血脈モ此勢ニ押サレテヨリ運行ス故ニ二脈共ニ相乱シ  
 ス行ルニ水銃ノ作用ノ如ク出入吐納吸氣呼氣ノ勢ニ從テ繁繁白  
 ヲ吸張閉塞縮收吹出隔膜諸筋ノ諸具備リ廣濶收縮狹窄照助提  
 拳下低等ノ作用順調シテ常ニ全身ヲ終成ス奇功也  
 視聽ノ具ハ神意ノ欲ニ從シ微細精妙ヲ知覺ス腺内藏ハ篩ノ如ク稀  
 濃混濁ヲ濾過シテ清澄ニ泌別ス心藏ノ三稜半月様ノ瓣ハ血ノ逆

戻ヲ防止シ胃膀胱膽精管ハ各具内ノ液汁化原ヲ異ニス上下顎  
 骨齒牙ノ合スルハ絞剪ノ如ク食物ヲ切割シテ臼キ杵ノ用ヲ具ヘ搗  
 キ碎キ粉ト為ス會厭ハ自然ノ漏斗也氣管肺ニ連リテ音聲意ニ  
 隨テ発スルノ樂器也加シ胃害ナク健全ナルハ食物ノ多量ナルニヨ  
 リ容シテ須臾ニ煮熟消化シ乳糜ニ變化ス次第順度ノ整齊ナルヲ  
 自鳴鐘ノ作用ノ如シ又食物ノ消化スルハ口中ニテ噉哺シ許多ノ唾腺  
 口内咽喉ヲ滋潤ス無用ノ廢液ハ蒸升発散ス此ノ常ニ神経血脈内藏  
 ヲリ出ツ(註)ニル石具他ノ堅キ物ヲ引キ切シ断ハス鋸ノ上ヨリ水ヲ  
 注キ切ルカ如シ

大野...

欽伊私的兒内科要略卷之一

大坦医官 天倪室 江澤養樹成大校正

多血病

蓋シ多血ヨリ起スル病ハ痛風脚氣痔疾脾病大肥滿膨盈惡液腫  
病呼吸短促喘息石淋諸般ノ荏苒頑固長病及消瘦勞瘵熱病等  
ヨリ或ハ各部腫起疼痛瘰癧病牽引諸般ノ泄血癰腫熱病頭眩暈  
卒中癱病等

見症

顔面赤色 血脉膨腫 眩暈ヲ欲ス然レニ膽汁敗黑 神志沈重ノ多血ハ睡中  
安カラス多夢紛擾身體倦重懈惰作業歩行ノ後大ニ勞倦シ短  
息心悸動急ニ屈折スレハ頭旋眩暈ノ數々強キ頭痛ヲ発シ胸中苦  
悶又自己正面ノ症ハ膈膜以上ノ諸症ヲ頭ニ唯血喘急頭痛頭眩卒中

眼目癰腫

病因

常ニ勞動セヌ安逸懈惰厚味飽食苦學靜坐或ハ自然通血ノ閉塞  
及氣阻遏等ハ老少共ニ此患ニ嬰ルニ血々增長スルハ他ノ病原ヨリ多ク  
トス故ニ動モスレハ危篤ノ脱血ヲ発ス

預防法

第一刺絡療法下刺由テ腹中鬱留ノ物世シ時々毎朝卧養ニ於テ発  
汗肝要シ然レニ富貴ノ徒ハ勤勞勉強ニ堪ヘヌ美味厚味ヲ禁テ  
飽カス故ニ尽ク根治スルヲ決シテナキ

治法

分利疏解ノ劑 苦味大陽煎ノ類胃中空虛時早晨日中夕夜ニ用ニ然  
レニ危篤ノ病症ハ此劑ニ非ス數々用ニ

多血ヨリ腹痛病肺焮腫痛呼吸促迫喘急ハ血ヲ減スルニ刺絡下利利  
尿発汗腸胃ニ汚物滯満スルハ水銃吐下利ニ因テ血ヲ導テ散分利稀薄  
ニスヘシ葶利ハ分利劑 和鮮鎮清劑 清稀酸收ノ飲湯 耐蒸  
茶等ニテ凝血ヲ速ニ分利スルノ飲料ハ金石性ノ藥泉灰塩水銀劑ニテ  
驅除スヘシ○血液満漲ノ症ハ水液切断法ニ因ルヘシ○諸液稀凉ノ症  
ハ濃厚ナラシムルニ乳汁肉汁煉熬劑粉麵ノ食物脂類○塩鹹液乳  
汁及清稀ノ飲料ニテ月解スヘシ○酸收液ハカリス茶ヲ用ユヘシカリ  
川ノ液アル症ハ再ニ酸收茶及清稀ノ劑ニテ和鮮スヘシ○諸液ノ壯熱ハ  
沸涌大過スルニ焮硝酸收茶丹砂清稀ノ飲料○運動微弱陽氣  
不足ハ精烈芳香ノ酒桂皮橙佛手相等ノ露水剛鉄劑消熱皮樹脂  
ノ類

血中騒擾ヨリ壯熱ヲ兼ヌルハ酷烈走竄ノ塩油茶ヲ用ユ悪液ヨリ

及元ル症ハ和鮮清涼散ノ類ヲ良トス譬言ハ

方 蝦石 醋製 蛎類一種 各一錢 廿一号 苗藻塩

淨白焰硝 丹砂 銀朱 各三錢 右調勻ス每服四錢

刺絡少壯ノ人腕行ニ五十以上高年ノ人ハ足ニ施ニテ効アリ然レ必

此例ニ拘ラス機臨ニテ活用スヘシ

養生諸粘質物厚脂堅硬粉麩ノ類大食ヲ禁シ身体相應ノ運動

ヲ務メ作業ヲ出精スルニ最モ良ナリ

此例ニ拘ラス機臨ニテ活用スヘシ  
養生諸粘質物厚脂堅硬粉麩ノ類大食ヲ禁シ  
身體相應ノ運動ヲ務メ作業ヲ出精スルニ最モ良ナリ

寒熱病第二

凡諸熱尋常起於病之諸病ノ内熱病ヲ三分一ニ相配ス(諸病  
ヲ三分二トシ熱病ヲ三分下云)外傷ニ因テ暴ニ死亡スルニ非レバ諸病ニ熱  
ヲ及セサルハ無シ故ニ諸病ニ勝レテ精密ニ研求明弁スヘシ

大較

惡寒振慄忽身異常ノ壯熱ヲ発シ疲弱勞倦心藏動脈ノ運行大  
過急疾脈強ク煩渴頭痛心腹痛惡心乾嘔譫語苦悶咳嗽噎氣下  
利大便閉昏眩不寐尚患者ノ病性ニ因テ各異アリト雖凡病原ハ一般  
ナリト知ヘシ小便濁リ赤色不食諸部作用官能ヲ失フ如此大過劇盛  
ノ運動ニ因テ病毒ヲ變化シ良液ト為シ体外へ馳泄スル由

病因

多血汚敗粘穢壞液心藏ノ運動ニ抵衝シ萬支微細脈絡ヨリ皮表腠  
理ニ及其所在腸胃ニアリ升騰シテ血中ニ轉輸ス以上ノ病毒ヲ為ス  
起原ハ養生飲食ヲ慎ニス饑飽勞役風寒濕ニ冒觸シ蒸発氣ヲ  
渴閉シ或ハ発汗アルヲ凉閉シ麤惡ノ飲食生冷等此ヲ譬ルニ刺透ス  
ヘキ物眼中ニ入ルハ刺痛シ胃中ニ在レバ嘔吐シ腸ニ在テハ下利シ除クカ  
如ク細脈皮表ニ在テハ発除セシカ為ニ諸血液大過強盛ノ運動ヲ進  
発シ初ノ惡寒ヲ發シテ壯熱ヲ發シ凝固ノ液ヲ分利疏解ス  
諸般ノ病因ニ就テ大畧概知スヘキヲアリ日発熱ハ痰飲留飲多シト知  
ルヘシ間日熱ハ膽汁惡液多シト知ヘシ三日熱ハ酸味稠固粘結液多シ  
ト知ヘシ○間日熱ハ治シ易シ三日熱ハ治シ難シ春時ニ發スルニハ秋時ニ  
發スルヨリ治シ易シトス○老人此病ヲ患ル時強ク腫リ三四度發作スル  
内ニ不意ニ卒中ヲ發シ死スルヲアリ又此病ヨリ惡液腫病ニ發スルモノ

是々多し深し考案スヘシ

治法

第一腸胃ノ汚滯ヲ疏解シ血ヲ清除シ運化ヲ失フ胃ヲ健ニシ飲  
食消化ノカヲ助ケ終リニ困難ノ諸症ヲ緩和減消スヘシ

○悪液ヲ変移シ良液ト為スヘシ 苦味ノ塩菜及八十号 十八号

第二号 百三号 九十五号 九十七号 四十九号 百十六号 等ヲ五十滴

ヨリ六十滴毎朝温湯其他ニテ服シ日中ノ酒ニテ服ス○凡テ寒性ノ

人ハ苦味ノ茶ニ宜シ熱性ノ人ハ塩菜酸收ノ茶ニ宜シ○悪液ヲ胃ヨ

リ泄除スルニ吐茶ヲ用スヘシ最初ニ用テ尤モ良効アリ分量漸入ニ

至スモヨリ三重壯實ノ人ハ三重ニモヨリ五重ニ至ル吐茶の候口中苦シ思

心衝逆頸眩胃中絞痛痞脹拘急苦悶ノ覺ス此劑ヲ施スニ熱ノ発作セ

ントスル前ニ用ユ此劑ハ吐シ且ツ利ス此法ヲ行フテ後尚飲食嘔逆等アラハ

再ニ行フヘシ用法ハ塩菜ニ文ヘ或ハ霍香露水ノ類舍利別ニ文ヘ或百十

二号劑ヲ八匙十六匙或廿四匙ヲ服ス尤モイペカコアシ根ヲ良トス吐茶ヲ

用ユル前ニ瀕リニ温湯ヲ子スヘシ此ニ由テ粘凝液早ク溶化シ吐出ニ苦

迫ラス

吐劑利益アラズ腹痛脹拘滿牽痛アルモノハ和カニ下利スニ便ケ

大黃 旋那葉 梅膏ヲ湯劑トシ或ハ散劑トシ大人ハ一匙ヲ度トス

日美ノ清涼飲等ヲ意ニ隨テ用ユ強烈ノ劑ハ用ユカラス又水鏡法肝要

ナリ刺絡此病ニ認ル稀シ多血家血ノ沸騰諸血閉塞ニ是ヲ肝要シ

リ間静ノ時ニ施スヲ良トス又時々胃ノ部脊椎ノ辺ニ此劑ヲ塗リ

或ハ燒酒温石タニボ等ヲ足蹠ニ當ラシ異常茶劑截瘧劑ハ虛弱ノ人

ヨリハ強實ノ人ハ丈夫ニ用ユヘシ

諸茶劑ハ渴ノ多少ニ隨テ多ク飲服スヲ要トス飲料ハ稀クシテ温ナル



ヲ良トス故ニ寒ヲ冷ナラス熱飲セス又一度ニ頓服セス徐々ニ与ヘ足ル程ニスヘシ急キテ用ルレ勿レ初メ頓ニ用レハ杜熱及諸症ヲ増劇ス

○大渴血ノ壯熱ヲ鎮止スルニ

脂硝 仙手相ヲ麦酒ニ浸シ用ユ尋常ノ温湯多服スルレ勿レ

(註) 大麦一握仙手相適宜水百匁ニテ煮麦花ヲ度トス尚好ニ

隨テ砂糖ヲ加ヘ日美ニス

此ニ少ク丹丸精硫黃精或ハ仙手相覆盆子小葉櫻實ノ舍利

別チシヲ加ヘテ酸收ト為シ用ユ又和カナル汗ノ露水清涼茶ハ

蝦石仙手相汁及四八号或ハ脂硝等ニテ病毒汚物及汗ニテ消除

ス大抵春時ハ十四日ノ間ニ快復又次ノ劑稱用ス

方 白丸 肉豆寇 各三分三厘

右ノ劑甚ク強キ收瀰ノ切アラハ害アルトモアルヘシ次ノ方共ニ異常ノ節ニ

又方 没食子 一匁

フランクスノ學校ニ於テ丸ニ稱譽言ス

又方 鴨菊花細末煉熬汁舍利別此病ヲ速ニ驅除ス

(註) 接骨木花 杜松子舍利別ニ合シ用ユ聲ハハ 飲汁八匁

ニニ匁ヲ交ヘ細末ハ茶ヒニ一ツヲ度トス

以上ノ劑ニテ効ナク在苒タルモハ機那ヲ与フヘシ最良効驗明白ナリ

細末三六カニ重クハ六カ六厘ヲ接骨木ノ煎汁ニ加ヘ間日ニ於テ數度

續ニテ服シ或ハ第二号劑良シ

結法

食時ニ於テ少ク酒ヲ服スヘシ諸寒冷ノ物ハ程久ク嚴ク禁スヘシ然ラ

サレハ再ス元シ頑強ニ退キ難シ○病退リノ後三七日ノ間毎日二

度消熱皮ヲ服シ逍遙間行シ諸養生ヲ慎ミ守ルヘシ若誤テ冥ク

冷氣ヲ受クルハ速ニ險惡ニ進ミ休止セサレハ勞ノ瘵内伏熱ニ變  
シ或ハ惡液腫病水腫呼吸短促喘急ヲ免ス正固ノ治法ニ非スト愈  
凡尚數々機那ヲ用ユ

養生ハ全快ニ至ルテ多少汗ヲ程好クシ飽食スカラス○此病  
早ク閉澁スルハ惡症ヲ免ス肥滿ノ人ハ腹脹大便秘結スルハ和カ  
ハ下利丸ヲ用ユ○汗ヲ過止シ或ハ夥多服藥スルニヨリ足腫起  
スルアリ勉テ摩擦シ運動スル服藥ノ間ニ剛毅劑下利通尿  
ノ劑ヲ用ユ

元寒熱病第三

証候

初ノ惡寒振慄脈疾數飲食ヲ吐シ煩渴頭痛不寐支節懈倦  
重擡シルカ加シ小便赤濁口舌乾燥黑黃白胎時々譫妄狂躁心中  
苦悶煩腦等ノ徵是多少ニ因テ名稱ヲ異ニス凡テ身體異常ノ大  
壯熱ヲ免シ危篤險惡ノ諸症ヲ免シ數日誓留持久し曾テ間歇  
体止ナシ

病因

大抵實ノ發熱ノ如ク走竄苛惡ノ毒油ノ如キ粘着スル質ノ物アリテ  
血中ニ伏留腐敗シテ大過劇盛ノ運動ヲ免ス然レハ腸胃ニ於テハ是  
シカラス惣テ非常瘴厲ノ異氣ヲ感受シ陰易變化百出一般ナラ  
ス此因實ニ吾輩ノ如キハ學習シテ如此惡氣ヲ傳染スルニ徹底シテ

究明スル一能ハス

如此異常過盛ノ運動ハ自然良能ニ因テ病毒ヲ汗尿ヨリ驅泄  
シ故ニ復セシム是レ諸病ニ於テ一箇ノ良醫ナリトス何者常ニ  
勉厲シテ平全健康ヲ守リ疾患アル時ハ怠ラス病毒汚物ヲ体  
外へ驅逐セシム要ス然レ格別ニ惡性ノ熱病ハ自然ノ扶ケ少ク  
療劑ヲ肝要トス

區別

此病善性ナルモノハ尽ク衰弱虚脱セス煩悶苦悩少ナシ○惡性ハ甚  
ク精力奪脱疲倦脉微弱ニ至リ遲滯沈伏譫妄錯乱心中煩悶苦悩  
昏眩氣急短息不寐小便初メ濁リ濃キモノカ急ニ灰白稀澄火  
熱浮空ナシ頭髮ヲ摘撮シ肌肉顫動支節振搖手ニ於テ是レ  
精神恍惚昏亂衣被ヲ脱キ眼目昏暗大小便自利等ノ惡候ヲ

ス元スルハ死症トス然レ凡如此諸症ヲ治スルニハ効力強キ藥劑寒熱病  
ヲ治スルカ如ク用ルモノアリ然レ凡吾輩ハ必ス誤ルコト多シ

治療ヲ為スニ大ナル危誤ナク能ク親切ニ意ヲ用テ適治スト虫凡  
養生ヲ誤ラ者守ノ人念ヲ入レス夕抱ニ怠リ死スル者ハ醫師ノ罪ニ  
非ス

病毒分離

体中ヨリ幸ニ各泄スル諸物アリ譬ハ  
衄血汗濃濁ノ尿ニ等  
逆或ハ霧ノ如ク雲ノ如キ物見ハルハ病毒発汗ヨリ泄除セス尿ヨリ消  
化スト知レハ又大便唾涎ニ由テ腸胃中ニ伏留ノ汚物ヲ通泄シ速ニ復  
セシム若シ此ニ反スレハ病險惡ニ進ミ死ニ至ル○此ニ就テ常ニ標的トシ  
心得ヘキコトアリ譬ハ  
感冒熱創傷熱乳熱痘瘡麻疹等ハ幸ニ  
自ラ能ク順行通泄シ身体ノ精力ニ因テ其ニ相和シ変移シテ体外へ

驅除之藥劑ヲ用ルル無ク唯養生第一ニ意ヲ用穩靜安卧シ厚子  
味ノ強キ食物ヲ禁シ稀キ煮汁ニ非ルモノハ禁止シ寒氣ヲ避ケ  
シ若シ美良生ニ反スレハ忽チ險惡ニ進ミ死ニ瀕ヲ回ラサス

險症治法

最初ニ先ツ壯熱ヲ和解鎮靜シ粘稠酷烈ノ毒物ヲ變化シ良液ト為  
スヲ最要トス○凝液ヲ稀流スルニ譬之ハ 清水ニ麦飢皮及炮麥飢ヲ  
投シ或ハ大麦 燕麥煮此ニ鹿角 仏手柑ヲ加或ハ酸收ノ藥精及  
櫻實 梅膏 牛酪清其他日美ナル液汁及舍利別ヲ数滴加ヘ或ハ  
和解鎮靜劑ヲ用ユ

露水ハ螢草 黑櫻實 薊

ルナキイ 効能大便ヲ滑シ咽喉胸肺下利 咳嗽心氣ヲ強クシ性清潤熱ヲ解 辟之ハ

飲劑ノ方

九三号

四八号

牡蛎 各五分

ルナキイ水

黑櫻實水

○ 右調勻シ一匕宛服スヘシ方中ノ散葉ヲ除キ用ルモアリ或ハ散葉五

○ 八カヲ取テ右飲劑ニテ服ス一日三四回

酸收劑

覆盆子 酸櫻實 桑椹 大陽煎 玫瑰花 罌粟花

五毒菊花或ハ強キ酸收精類ハ 丹元 煇硝 硫黃

百十三号 百十四号 丹元精ヲ加ヘ前ノ大陽煎或ハ大麦鹿

角煎ニ數滴ヲ交ヘ服スヘシ

咳嗽ノ症小兒ニ劇酷スレハ乳汁劑ハ醋屬液ヲ緩解シ培養滋益ス

汗ハ終ニ於テ病毒ヲ消除シ皮膚潤沢ス此時ニ於テ諸ノ和カナル一号

ノ汗和解清涼散及酸收汗劑ノ燒酒浸ノ類ヲ要トシ毎朝三四

十滴茶湯ニ滴服シ汗ヲ期スレハ然レテ大便自ラ下利スルモノハ汗

利ヲ用ユヘカラス尤モ此利寒性ノ人及病漸退カントスル時殊ニ良効アリ尚此上ニ和解鎮清利ヲ用ユ

刺絡標的ハ咽喉焮腫頭痛或ハ最初病増進ノ時大ニ壯熱シ脈強盛疾數多血家酒客ハ腕頰舌下ニ施セハ諸症頓ニ消除ス然レモ流行ノ日寒惡性傳染熱脈弱ハ虛脱ス故ニ忌メ害アリ

吐利ハ實ニ熱ト一般ナリ○下利強キハ惣テ害アリテ虛脱セシメ津液ヲ七竭シ惡キ世泻ヲ免ヌ知カナル下利ハ肝要トス○腸胃中ニ許多汚穢ノ物伏留スヨリ下利ヲ免シ絞急窘迫胃痞脹等ヲ見スモノ

○小兒發熱ノ初尤モ必用トス其故ハ畜積ノ汚物ヲ去シ諸症緩解ス○久ク便秘スルモノハ水鏡法ヲ施スレ下利ヨリ勝レテ要用トス○心中強ク煩悩熱ヲ兼ル者ハ酸製免汗劑自竜腦鮮苓ヲ加用ス○持久熱ニ外症ヲ兼ル時ハ十四日程續ヒテ休マサルモノナリ時々茶

劑ヲ變化シ用ユルコアリ此レ至其ノ同シト雖モ送下ノ飲物ニ因テ患者退屈セス然レモ下利秘結等ハ至茶ヲ変更スヘシ

○蘇州養生補劑

其室溫蒸スルヨリ爽涼新清ノ氣ヲ受テ隱靜安眠セシム汗ヲ催ス程ニ至ル○飲科ハ清稀水ノ如ク酸收日味ヲ帯ヒテ称スヘク煩渴鎮清ヲ要ス寒冷ハ害アリ精力ヲ活揚シ煩熱粘凝液ヲ和解スヘシ

病勢減シ患者衰弱セハ醇酒赤酒ヲ單用ス○食物性良淡薄ノ團菜ニ宜シ諸肉類ニテ製スル堅硬消化シ難キ物皆害アリ又食進マサルニ強テ進ムルカレ消化惡ク養ヲ為サヌ却テ胃ニ重滯ス程好ク少シ宛照フルハ諸般ノ熱病ニ於テ最上ノ治法トス又寒冷氣濕氣

早朝暮氣ヲ避ケサレハ再ニ惡性必死重キ諸症ヲ免ヌ

活法

大便通利、最初宜之酸收清稀ノ飲料ハ、砂糖ヲ加フヘシ

○悪症熱ニ最良ハ杜松子 接骨子、煉熬砂糖煎汁劑トシ、或ハ九号

劑ニ少ク酢ヲ加ヘ、殊ニ芸香醋ヲ加フ又四八号劑

○赤斑熱ハ心中煩悶ス初ニ吐劑ヲ用ル後発汗ノ乳汁劑ヲ用ニ紫斑

粟疱急ニ潜伏内攻スレハ、熱ルハキ悪症ヲ発ス急ニ焼酒発汗劑ヲ

服シ温覆シ芫菁膏ヲ腕脚ニ貼スヘシ

○疫熱腫ヲ発セハ早ク軟化排膿スヘシ

○辛熱走竄ノ阿尼竜腦是々温暖セシムル等ハ害アリ

○熱性多血ヲ和解清凉劑

○声嘶嘔咳、薑芍菜舎劑別蒔蘿水ヲ單用シ酷烈悪液胎

中ニ深く留結セハ七五号及胸肺茶水等ハカニ合セテ服スヘシ

○諸催熱シ又汗劑ハ号劑、精烈ノ塩菜精、大陽煎等ハ熱劑

トシ、由テ皆害アリ、動モスレハ壯熱煩悶昏眩ヲ増劇ス故ニ諸般純清

生質劑良トス

○如焚大熱胃中ニ生シ内藏ニ浸淫スルモハ温布ニ竜腦精或鴨菊

ヲ乳汁ニ煮囊ニ盛リ頻々其部ニ貼スヘシ

○咽喉痛、喉腫、飲食苦腦、頻リニ含漱劑刺絡芫菁膏水氣法或ハ

最初ニ和カノ下劑ヲ用ニ悪症熱病ニ發口瘡ヲ発スルモノハ甚々危険ナ

リ早ク分利消散ノ焼酒劑ヲ用ユヘシ

○鼻衄ヲ早ク閉止スレハ大熱煩悶、毒ヲ発スルニ百支程ノ出血スト

至凡危キナシ然レハ久ク止ニサルモノハ外ヨリ綿布ニ醋或ハ白卷水

ヲ浸シ鼻中ニ刺亮シ又内服スニ、磁硝ノ末ニ阿片少シ交ヘ良効アリ

○如焚大熱、渴、嘔吐ヲ催発スルハ良兆ニメ、病毒泄除ノ徵トス、閉止セス

尚温湯ヲ飲ニシテ或ハ方ノイヘカコアリヲ与ニ酷烈胆汁様ノ惡液ヲ  
催進スヘシ然レモ是ヲ強ク止ニケルモノハ底野並加或ハ九号劑五ハカ  
肉桂水ニテ一二度与ヘ鎮止スヘシ

○下利モ速ニ止セス尚害ヲ為人汚物ヲ和カナル下劑ヲ用テ疏除スヘ  
シ大抵ハ自ラ止ナリ若シ効ナリ烈キモノハ九号劑一匙底野加ヲ霍  
香水ニテ服シ或ハ上好水晶ニ二三厘ノ焰硝カスカラ皮ヲ如文シ用ユ  
強キ下利ニ効アリ此劑ヨク汗ヲ催進ス又ハ下利鎮止劑ヲ用ユ或乳  
汁ニ底野加ヲ合シ水銃トス大効アリ

○呃逆六百十四号ヲ十八号ニ二三滴加ヘ四半時ニ一度露水茶湯交ヘ  
服スヘシ

不寐頭痛ニ早ツ阿片劑ヲ用ユ血ノ運行ヲ凝注シ動モスレハ陰惡ニ進  
ム此病一度退ケハ諸症モ隨テ除リ故ニ稀キ酸收劑ヲ用ユ

大頭痛外用ニ良ナルハ 竜腦精ニ少ク四号五号劑ヲ加ヘ布ニ浸シ頭  
ニ卷キ或ハ薔薇醋汗醋ヲ單用シ或ハ醋收糊葉ヲ貼ス便秘ヨリ発  
セハ水銃ヲ良トス

狂躁譫志ハ頭顛身後足腓ニ水輕或ハ発泡方ヲ施シ惡液ヲ下降ス内  
服ハ清涼和解散ヲ毎ニ服スヘシ

熱ニ日寒ヲ兼ル者ハ大抵咳嗽ヲ強ク発ス宜ク胸肺乳汁劑或ハ胸肺  
飲ヲ良トス強キ金石ノ酸收劑ヲ禁ス

発汗劇キ症ハ清涼ノ室ニ居キ被服ヲ薄クシ清熱酸收ノ飲劑ヲ服スヘシ

○精力大ニ虚脱スルモノハ強壯補益ノ飲湯ヲ良トス若シ外用セテ布  
貼セント欲セス動脈心藏ノ部ニ 卅六号 百一号 六号劑 薔薇醋  
ニシテ醋 芸香醋等ノ烈香ヲ數々鼻中ニ挿入スヘシ  
寒熱脱疽ヲ内部ニ生スルモノハ機那ヨリ良ナルハナシ

諸熱病体止スルノ後ハ 十八号 健胃劑ヲ用ヒ四日ヲ健ニシ飲食ヲ  
進メ精力ヲ復シ不日ニ全愈スヘシ  
兎猛熱ヲ患ルノ後ハ精力復シ難シ初ニ下劑ヲ用ヒ後健胃劑ヲ用ユ  
何者ハ汚物胃中ニ伏留ス

痘疹發斑第四

大較

熱ニ瘡ヲ発スルモノハ痘瘡麻疹其他赤斑白疱粟粒及発斑赤斑等  
ナリ此流行病ハ小兒普ク患ヒ他病ニ混セス一箇ノ病ニ他病ニ勝ルテ  
尤モ危険シ

變更次序四件ノハカアリ 初発熱 見点 灌膿 結痂ニ意ヲ用テヨク  
症状ヲ察スヘシ ○初熱ハ時氣ニ感シ輕熱ヲ发シ解憎疲弱頭痛ニ  
三日止ニス後ニ増熱戰慄搐搦ヲ発シ赤斑惣身ニ見ル格別面部阜  
ヲ發見ス ○見点徐々ニ起腫シ灌膿一般ニ膿ヲ醸シ結痂十五日ニ至ルハ  
凡テ喜痘ナリ又類痘水痘ハ見タ速ニ八九日ノ内ニ入テ癒ニ患痘ハ  
十七日或ハ九日ニ至ル ○麻疹ハ九日十日ノ間ニ徐々ニ消散結痂ス動モス  
レハ劇キ咳嗽荏苒ト治シ難シ痘瘡ハ咳嗽稀シ



病因

血ノ運行ト争障セス血中一箇ノ毒ヲ長ク血中ニ容ルルヲ得ス自然ニ  
排斥ノ力ヲ催シ皮表ニ除キ棄ルル也 ○瘧毒ノ母体ヨリ稟ルル必セリ  
但排出ニ遲速アリ ○強キ熱劑ヲ散劑温室重褥スルハ善瘧ヲ  
ナシ惡瘧ニ変シ是夕危症トナル若シ誤テ如此ナラハ速ニ清涼鎮靜スヘ  
シ ○搗搦ハ凡テ害ナシ ○再ヒ内陷シ或ハ程好ク乾痲セサルハ皆危險惡  
症トス

治法

瘧毒見シ唯ク大熱苦悶煩燥セハ和鮮劑ヲ肝要トス此ニテ大熱ヲ減  
シ惡液瘧毒ヲ消ス或ハ清鮮大陽煎ニ煇硝精四分一ヲ加ヘ又ハ乳汁劑  
或ハ酸收飲等ニテ清涼ニシ熱ヲ和半ニス劑ヲ兼用ス  
起脹スル心胸ヲ苦悶スルモノハ和力ニ発出セシムル劑ヲ用テ救フヘシ即

八号劑ヲ隨宜ノ飲料ニ加ヘ温服シ或ハ胸膈和鮮ノ露水ニテ服スヘシ

○咳嗽ニハ無花果及胸膈和利水高危險ノ疾腕脚ニ元膏膏ヲ貼ス

○輕重ヲ論セス快ク発出シ唯キハ和力ノ元汗ノ粉飲劑壯實ノ人ハ  
仏手相汁ヲ加フ

眩暈胃中拘滿心ニ當テ痛ム初ニ吐劑ヲ用ユ多血ノ人ハ害ナシ又腸

中ニ惡液刺攻セハ消雪丸ヲ用ユ或ハ大黃日露蜜元本ニテ或ハ水ト

乳汁ヲ交ヘ用ユハ腸中汚物及瘧毒ヲ驅除ス或ハ和鮮発汗劑ニテ

発出スヘシ尚見急ヨリ灌膿ニ至ニテ勉テ用ユヘシ

虛乏シテ見急ノ時ヨリ灌膿ノ間ニ急ニ内陷セハ早ク元散劑強壯ニテ劑

ヲ用ユ而後項及腕脚ニ元膏膏ヲ貼シ温暖ニシ頻リニ元汗スヘシ此症

ハ急ニ死ス

瘧疾共ニ劇キ咳嗽ヲ及元スル症ハ初メヨリ酸渋スル金石類ノ劑ヲ禁シ

胸膈和飲劑 乳汁劑 已且杏油 癸汗 露水 燒酒 浸劑 後ニ至テ用  
コトモ効アリ

眼目ニ膿瘡 翳膜 斑點ヲ生シ 全ク盲シ 或ハ昏暗 諸症等ハ 苗香胡  
蒜ヲ噉テ 其氣ヲ服シ 而シテ 竜腦 洎夫藍 燒酒ヲ片布ニ浸シ  
不斷 眼胞ニ貼シ 啼泣ヲ摩日 光火炎ヲ禁戒シ 乳汁ニ洎夫藍ヲ  
浸シ 沾滴スヘシ ○眼胞 焮腫 合着ハ 強テ開クハ 甚タ害アリ 自然ニ開  
クヲ 待ツヘシ 然レハ 痛痒 強ク 苦難堪ヘサルモノハ 健康ノ人 唾 或ハ 温  
乳汁ニ 竜腦 洎夫藍ヲ 文ヘ 或ハ 雞卵油ニ 少ク 竜腦ヲ 文ヘ 塗ルヘシ  
尤モ良効アリ

咽喉腫痛 飲食ヲ妨ス 燒酒ニ 洎夫藍ト 竜腦ヲ 布片ニ 沾シ 頸  
吭ヲ 卷キ 或ハ 胸部ヘ 敷テ 貼シ 又ハ 洎夫藍 底野加 竜腦ヲ 塗ルモ 良  
ナリ 嫩葉ハ 薔薇 拳參根 冬 葵葉ニ 少ク 焮硝 精ヲ 朱槿

汁ヲ 合ス

便秘ハ 見点ヨリ 渣膿ノ 時ニテモ 水鏡法 或ハ 泻利劑ニテモ 少ク 癰閉  
ヲ 開クヘシ 八日程 通セサルハ 害ナシ 且余ニテハ 熱痛アリ  
下利ハ 甚タ 危險シ 早ク 止ムヘシ 九号 十号 或ハ 水晶 赤珊瑚  
角石ノ 末ヲ 霍香水 桂水 等ニテ 用ヒ 或ハ 水鏡ニテ 乳汁ト 底野加ヲ 射  
入スヘシ

鼻血ハ 甚タ 善兆 止ルヲ 勿レ 久ク 泄スルハ 疲勞ス 治法ハ 前ノ 三篇ニ 見ヘタリ  
譫言 搐搦ハ 初熱 見点ノ 時ニ 奏ス 和カク 全散劑ニ 丹砂 及 神經劑ヲ 加ヘ  
或ハ 鹿精 精 五二号 或ハ 焮硝 丹砂 竜腦ニ 少ク 底野加ヲ 加ヘ 或ハ  
巴旦杏 乳汁ニ 竜腦 他ノ 酸收ノ 飲汁 (大麥汁 類ノ 飲料 皆 酸收シ) 又  
脚腫 項ニ 芫菁膏ヲ 貼シ 又 温乳汁 蜜 焮硝 砂糖ヲ 水鏡法ニ 出テ 毒  
ヲ 驅出シ 且ツ 分利 和解ス

舌唇裂ルアアハ容ニ浸ス茶或相植汁等

鼻竅大ニ腫ルハ木綿ノホウシニ雞卵油ヲ塗り鼻中ニ挿スハ然ラ  
ナレハ鼻孔合着シ言語呼吸ヲ妨ク

痘相密灌膿十日頃ニ再ニ熱ヲ発シ劇キ悪症心苦煩燥ヲ発ス  
是ヲ危症トシ和カノ下劑ヲ用ユ速ニ治効アラハ度々下劑ヲ十ハカニ下  
ヘシ若シ此ヲ誤治スハ邪毒腸中ニ聚リ以前ノ変症ヲ発シ死スル一疑  
ナシ

痘痕面部ヲ防クニ初メヨリ熱劑ヲ過用スルナクハ動モスレハ醜惡ノ痘痕  
ヲ遺ス灌膿ノ終リニ針ヲ以テ能ク膿熟シ痘ヲ刺シ膿ヲ出セハ毒流出  
シ侵蝕スルナシ又乾痂ノ跡ニ巴且香油鶏卵油ヲ塗り全治シ落痂及  
シテ温乳汁或ハ燕麦汁ヲ頻々ニ治スハ皮膚滑平美艶ナラシム  
痘後暫ノ間皮下清掃肝要ナリ即 甘汞丹少シク用ユ然ラサレハ

痘毒残リテ惡瘡ヲ生シ腺腫起硬結潰瘍等

痘毒眼ニ残リ赤爛嫩腫ヲ為スハ 伊吹コノ草 野薺 小茴香

洎夫ニ藍沸湯浸甚タ良シ尚其他藥劑ヲ推用スヘシ

惡痘ヲ禦キ避ケ免ルニ小兒ノ精力年數ヲ許リ消雪丸及酸收大  
陽煎ヲ諸ノ飲料ニ和シ服スレハ害ナク惡痘ニ解ルルナシ

### 麻疹

前章ニ説ク如ク治法モ異ナレトナシ咳嗽荏苒トシテ止マサルモハ第十  
号及十二号劑ヲ他ノ藥劑中ニ加ヘ尤モ効アリ尚痘ノ如ク下劑ヲ用ユ

### 粟粒及紫斑熱

其症狀ハ異ナリト魚尾前ニ舉ル治法ニ同シ程好ク発汗セシメ清稀飲料  
酸收飲麦酒ニ麦饒大麦三七草仁手相皮ヲ加ヘ温服シ或ハ発散燒  
酒浸和鮮ノ粉菜等

○惡症ヲ扱ヒ眩暈煩悶ヒハ吐劑ヲ與ヘ後和解劑

○産婦惡露滯セサルニ此病ヲ免セハ刺絡ヲ脚ニ施シ夜ニ至テペーセン丸ヲ用ユヘシ

○癍斑熱モ和鮮汗劑竜腦浸ヲ主トス強テ汗スルノ勿レ程好ク溼下アルハ是ノ宜シ自然ノ便秘ハ和カノ下劑ヲ与フヘシ

○刺絡ハ稀ニ用ユ多血大熱強壯者ヲ過服シテ腐壞ヲ為スニ用ユ  
○大束<sup>シハルヲイハレシ</sup>色ノ斑大サ黎豆ノ如シ此症大抵危キナシ多クハ少壯ノ人ニ免ス凡テ惡症ナシ唯攝養ヲ能ク守レハ茶劑ニ及ハス若シ危險ヲ見サハ前ニ拳

ルカク瘡スヘシ

○前症ニ保護ヲ謀ルハ水腫腹脹腺腫壯熱不便濃稠シ多クハ終ニ死スル

○此症初発シ症ヨリ変シ別ニ一證トナリ及ヒ大束ニ斑熱ヲ離シ別症トナルハ汚毒体ニ残リ免ス治法ハ便利ヨキ路ニ隨テ除キ去ルニ和カノ下劑或利

尿劑ニ効アルハ酒石太陽煎十滴ヨリ九滴年數ニ隨テ増減スヘシ  
第百十号及燭硝精小兒ハ下利ノ水執法免汗劑ハ害アリ

○腫脹ノ部ヲ温ニスヘシ患部冷ルハ死兆トス

○養生ハ風寒ヲ防キ寒暖好キ程ノ室中ニ安卧シ時々床ヲ離シ意ニ隨テ逍遙シ蒸発氣ヲ升免シ諸肉ヲ禁シ野菜果類ノ煮汁或ハ清稀麥酒大麥汁又ハ水三部ニ乳汁一部ヲ交ヘ且他身常ノ扱ニ用ルカクスヘシ肝要トス

腸胃熱病第五

疫利 熱利 瘧利ノ類ヲ云

此病尋常ノ熱病ト相混スヘカラス別ニ一箇ノ病シ他ノ見症ヲ悉スル者ハ此病ニ非ス

區別

大抵下利ヲ兼スレハ必ス害ナク反テ利益アリテ危症ニ非ス故ニ全ク閉止スルヲ勿シ他ノ熱病ニ用テ効アルモノハ効ナシ尚強キ熱利悉汗蒸ハ必ス害アリテ險惡ニ進ム危甚ニエル和カノ下利吐利症ニ應シテ施セハ甚ク効アリ故ニ諸般ノ元冥熱病ニ皆悉汗利ヲ用テ治スニ由テ學者者多ク惑フナリ

病因

腸胃ニ粘穢腐敗ノ毒物鬱留シ大便ニ泄ス他ノ熱病ヲ如ク血中ニ伏留セス且毒惡性ナラカル時ハ寒冒ニ因テ鼻咽肺藏ニ邪液懸リ咳嗽痰喘鼻涕等ハ病毒自ラ分離シ退キ或近キ道路ノ自然ニ催泄スル通利ニ隨テ泄除シ去ル此恰ニ熱病ニ下利ヲ兼テ赤痢ヲ兼ル症ノ如シ且毒酷烈ナラハ薄腸厚子腸ヲ攻衝浸蝕シテ且部瘡亦手拘急ヲ生シ遂ニ神經ニ傳流シ諸患ヲ生ス

症候

熱間日全作定斯ナク不意ニ振寒戰慄壯熱ノ多クアリテ同シカラス心胃ニ當テ苦悶疼痛虛人ハ眩暈昏冒上腹脇肋嫩痛小腹ニ及ヒ強キ咳嗽齒牙舌上咽喉臭穢ノ粘液黃色黒暗色ノ汚垢布着シ惡臭傍人ニ薰シ食味見タ惡ク汚穢ヲ食フカ如シ下利ノ汚物惡臭向ヒ近シヘカラス腫中安カラス騷擾性素虛弱ハ無寐躁悶起立ホシク拳動スル忽チ驚悸手及諸筋胸動尤モ腫中起立ハ惡兆トス精

力大ニ疲脱シ内部大熱外表寒冷精神昏乏胃疼呃逆摸床撮  
空躁擾悶乱冷汗身必死ノ症トス惡症熱ハ初メヨリ險惡ノ諸  
症ヲ発シ大ニ煩悶諸ノ発斑ヲ発ス又自然ニ因テ水ノ如ク膽汁様  
ノ大便ヲ利シ小便初ハ平常ノ如ク見エ此ハ病毒血中ニ浸淫セズ尔後  
濃濁滓渣ナルハ病退リ候トス

変症

正面ノ症ヲ発セズ此ハ治療ヲ怠リ誤リ発汗劑ヲ用ニ調損度ニ中ラズ  
傍者惡ク熱蒸温暖ニ過キ毒液腸ヨリ諸藏ニ轉移反流シ血中ニ  
侵入シ内部焮熱痛ヲ生シ凝滯通道ヨリ発泄セズ赤斑青斑紫斑  
ヲ発シ耳聾耳後腺頸骨腺焮腫惡瘡ヲ発シ或ハ頭腦脇肋焮痛  
精神錯乱譫妄或ハ消耗熱熱脫疽等毒ノ多少ニ隨テ種々見症  
アルハ病原ハ皆一般ト知ルヘシ

治法

唾涎発汗大便快通セズハ速ニ泄利スヘシ此宛モ熱病ニ蛇虫ヲ兼テ腸  
中ニアル治法ニ同シ且邪液甚粘結スルニ由テ精力虚乏スレハ排出スル  
一能ハス此レヨリ寒熱更々発ス如此症ハ自然ノ技ヲ微少ナルヲ以テ醫  
術ヲ以テ和カナル驅泄劑ヲ以テ勉テ病毒ヲ泄利スヘシ然レハ順路ニ向  
ハス邪液盛ニシテ自然ノ運動ト相拒ミテ從ハサルモノハ能ク見合セ  
順路ニ向テ得テ驅泄スヘシ必ス先理ニ攻戦スルトナリ又急ニ驅泄ス  
ルニ勿レ吐法下利法利益アリテ損害ナリ功ヲ得

梅膏 旋那葉 日露蜜或ハ大黃末五分ニ煇硝一分ニ重或ハ十二  
号劑其他粘滑ナル劑ヲ更々用ユ譬ハ 牛酪清 鹿角屑  
仙手相 大麥 砂糖 燕麦 乾葡萄或ハ諸ノ甘美ノ果  
類發汁ニ砂糖或ハ巴旦杏及性凉新鮮ノ胡瓜胡瓜瓢仁等

むも良ナリ

○下利劇キ其津液ヲ亡シ虚脱シ下部虚冷其他惡症ヲ見ス  
九号劑 一匙 肉桂露水ニ投シ服ス

此劑強壯健補シ下利疼痛ヲ頓止シ精神ヲ調和シ安睡セシム  
吐劑ハイカコフナヲ用ユキハ惡症熱疹斑粟斑紫斑熱小兒産

婦共ニ数々大効アリ巴且杏油ヲ嫌ハサル人多ク用ユキ能ク酷烈  
液ヲ緩和シ滑利泄除スルニ良シ又大麦煎ノ味功力コソビニ同シ

○稀薄ニスル清涼和鮮ノ露水ニ酸收ノ物ヲ加或ハ甘ニ表ノ含利別ヲ加  
ヘテ腐敗苛烈ノ毒ヲ日和緩解シ再ニ故ノ如ク自然平和ノ運動ニ

回復スヘシ  
土質劑ニテハ 煅石 煇硝 丹砂  
右ノ劑ハ発汗ニス専ラ酷厲液ヲ和鮮シ瘧疾牽痛ヲ緩解ス

○水鏡法ハ以上ノ劑相應ニス頭痛心中煩悶困腦胃ニ當テ痛ニ服助功  
痛スルヲ和消シ滑利緩解ス且法碎言ハ  
燕麦粉 胆八油 乳汁 鴨菊花或ハ油類蜜砂糖

以上ノ療劑ハ他ノ藥劑ニ勝レテ危篤ノ諸惡症ヲ救フ簡便ノ良法ナ  
リ必ス辛熱ノ藥ニテ劑表スルヲ勿レ軟和スル劑ヲ用ユ然レヒ水鏡法ヲ

嫌フ人ハ 正ニゲルセ泻利鹽 四匙或ハ八匙 ヲ服スレハ大熱ヲ除キ速ニ汚  
物ヲ清除ス

方 旋那葉 四匙 ニ煇硝ヲ加フルモ良ナリトス  
○頭痛項痛ハ腸胃ニ係連スル神經カ痙攣シ或ハ病毒衝逆ス且症面色

赤シ瘧疾ハ足脚ヲ温メ清涼ニシ厚被セス温熱発汗劑ヲ禁シ此  
菁膏或ハ白芥子ニ醋塩ヲ交ヒ足腓ニ貼シ久ク発泡セシム

○呃逆ハ泻利鹽 四匙 十二号劑 二匙 或ハ大麦汁 〇 胃中熾熱痛ヨリ発

スルモノハ焔硝 三重三毛 竜腦ヲ加ヘ又外ヨリハ竜腦精ヲ温布ニ浸シ胃  
部ニ貼スヘシ

○刺絡ハ多血殊ニ酒客ニ施スナリ尤モ病ノ初ニ施ス良トス此ニテ効ヲ得ハ  
速ニ水銃ヲ施シ又刺絡ニテ煩燥苦悶腹痛消除セハ速ニ止ムヘシ且  
諸症再ヒ発モハ水銃ニテ諸症ヲ退ケ後解シ喉痛ニ過ス初メヨリ  
三四日メニ施セハ凡テ害アリ

○調護宜温中等飲食淡薄ニ適シハ進ロク養化ナリ精力虚乏シ動  
モスレハ秘音留シ勞症ニ変シ易シ○最初多ク食セシムル勿レ徐々  
ニ滯ラス消化シ易ク軟カノモノヲ与フヘシ酒ハ与シハ消化ノ力  
ヲ扶テ強ク健運セシム

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*



勞瘵篇第六

大較

此熱急烈ナリ漫然執留鬱蒸ニ脈細弱疾數具熱數月執留留莖再  
退カス食前ハ顔色灰白食後諸症増盛新熱ヲ発シ頰赤多血ノ  
人ノ如ク精力飲食漸々減損瘦消シ清涼ノ飲食ヲ好ミ不新煩渴  
氣急短息煩悶苦惱口中乾燥津唾稠リ急ニ白沫ニ変シ睡中安  
カラス季夏下痞絞急頭眩回尿赤ク油ノ如ク粘脂滓望浮膜アリ  
リ下利消耗汗粘リ惡臭服目頰肉落テ隔ニ骨立等ハ皆危症トス

病因

近因ハ諸藏閉塞或ハ瘵歷膿瘍肺痿肺癆硬結腫或ハ血中一箇ノ壯  
熱酷烈毒アリテ精力虚損盜汗等ヲ根元トシ逐ニ此病ヲ誘発ス  
遠因ハ諸熱病及其他諸病ヲ根治セス又ハ洪瀉藥ヲ以テ閉塞シ粘  
結惡液被此ニ散漫伏留シ膿ニ変シ腐敗酷烈ノ毒液トナリ或ハ母体  
乳母ノ疾病清潔ナラサルヨリ受テ或ハ飲食ヲ慎ニス酒及燒酒其他  
熱烈ノ飲料芳香辛烈鹽酸ヲ過飲シ房事過度失血下利嘔吐熱  
病ノ後発汗休マス憂苦悲愁寒凉ノ飲物過度  
小兒ハ飲食消化ニ養液ニシ粘凝シ腸膈膜ノ腺ニ滯結凝泣閉塞  
腫脹衰弱シ榮養輸弁セズ

鑿法

此病久シキヲ経ス息夕險重ノ諸症ヲ見サス精力格別ニ缺損セズ強  
ク及運動セサルモノハ醫者ト患人ト一致シテ療術ヲ施サハ活命スヘシ諸  
泄血ヲ速ニ閉止スルハ臭ノ勞瘵トナリ易シ少年ハ高年ヨリ死スル  
速カナリ

(註) 此病大抵三十五歳以上ハ大ニ危シト知ルヘシ

治法

閉塞ヨリ発スル症ハ粘稠ノ血液ヲ稀薄分利疏解スル劑ト健胃燒酒劑  
ヲ稀キ温ナル飲湯ニ交ヘ或ハ百十五号ヲ五十滴程服シ夜分ニ和解毒清  
涼散ニ醋仁手相汁ヲ加ヘ尚又七十一号劑三三重ノ煇硝ヲ加ヘ又苦味  
ノハルサニ類ノ九茶或ハペーセル九藥白泉等大効アリ又十三号劑或  
ハ尚稍強ク苦キ分利驅泄劑ハ閉塞ノ邪液ヲ再ニ挽回シ或ハ苦味泻利  
鹽具他熱病ノ良劑ヲ用テ導通スヘシ

○壯熱煩渴ハ大陽煎ノ嬰粟 蕃薇或百十九号劑ヲ他ノ飲料ニテ  
滴服スヘシ

○諸池血アルキハ早ク閉止劑ヲ用テ了ラ勿シ清稀潤養ヲ飲湯ヲ  
用ユ

○下利ニハ剛鉄乳汁劑或ハ蕃薇ノ砂糖漬或ハ九号劑一錢ヲ薑香  
肉桂水ニテ服シ防止スヘシ

○強壯ニスル剛鉄劑四十九号劑鉄性茶泉  
○膽汁様汚穢惡液腸胃ニ浸籠スル症ハ吐下ノ劑ヲ良トス刺絡ハ多血或  
ハ血閉留ニ行フ若シ吐下ト刺絡ト一度ニ行ト要セハ刺絡ヲ先ニス  
ヘシ (註) 刺絡後ハ自然ニ大便通シ腸胃ヨリ汚液ヲ泄ス

○膿瘍隱伏シテ外見セサルアリ外部ニアルモノハ早ク開破清除シ瘡サ  
レハ治遲延シ若シ熟成セスハ内服スルニ消化熟膿ノ藥ヲ用テ内藏  
ヘ潜伏シ枯瘦セハ治法肺癆ノ如ク和カノ劑ハ 梅膏 大黃

○血中酷烈液ヨリ起ルモノハ辛熱劑ヲ禁シ和解毒稀薄日緩テ子  
仁ヲ以テ製スル乳汁劑 煉熬肉汁 牛酪清 牛乳汁 野羊驢  
馬ノ乳汁ヲ用テ此劑ハ小兒六七歳ヨリ十歳ニ至ルニ用テ數々死ヲ

日露蜜ヲ如キモノ良シ

○血中酷烈液ヨリ起ルモノハ辛熱劑ヲ禁シ和解毒稀薄日緩テ子  
仁ヲ以テ製スル乳汁劑 煉熬肉汁 牛酪清 牛乳汁 野羊驢  
馬ノ乳汁ヲ用テ此劑ハ小兒六七歳ヨリ十歳ニ至ルニ用テ數々死ヲ

救フ或ハ乳汁ニ砂糖ヲ加ヘ目クシ又ハ燕麦花莖莖ニ少ク焙硝  
ヲ加ヘ白麦飩大麦粉米粉巴旦杏等ヲ合シ用ユ

○眼脹便秘其他見症明カニシテ糖カナラハ前ノ下劑ヲ用ユ

○房吏過度或ハ漏精淋疾ヨリ発シ前ノ治法ニテ治セサルモノハ程好ク下  
劑セシメ後茶泉ニ乳汁ヲ加ヘ用ユ

○徽毒残りタルヨリ発スルモノハ其毒ヲ清除スルニ煎茶泉乳汁劑ヲ用

ユ終リニ茶末ノ飲湯ニ百十六号劑ヲ用ユ其間ニ夜ニ於テ剛柔丹  
ニ重ニ毛ヲ用ユ

○疥癬類ヲ外用茶ニテ内攻シ発スル症ハ発汗燒酒浸劑其間ニ四八号  
劑ニ二三重ノ硫黄劑柔丹ヲ文ヒ常ニ発汗保護ヲ要シ而後前治  
法ニ從フシ

○鬱怒憂愁ヨリ発スル症ハ初メニ益茶ヲ用テ凝結留飲ヲ溶化し涌

出し易キ様ニシ後吐劑ヲ用テ胆汁ヲ泄出し殊ニ口中著キハ胆汁  
溢滿ノ微ナリ吐茶用ヒ唯キ症ハ前ノ下劑ヲ用ユ後和解清涼ノ散  
葉流解ノ飲湯百十五号劑乳汁劑溫泉機那良功アリ

○多血滿張閉塞ヨリ発スル症ハ分利流解劑及清涼和解劑蒸氣発  
散劑ヲ用テ効驗ナキ症ハ宜ク考案シ刺絡シ剛鉄及鉄性酸泉

○徽瘡ヨリ根底スル症ハ前ノ下劑ニ剛柔丹ヲ最良トス此ニ就テ牛酪清  
或ハ凝核乳汁ヲ用ユハ苛烈ノ惡液ヲ日和滋潤導泄ス其間ニ和解

○清涼劑及和カク発汗劑胸肺飲燒酒浸茶泉等更々用ヒ若シ茶  
劑寸効ナキハ速ニ機那ヲ數度續ヒテ服スヘシ此劑經驗的實ノ

○良劑トス

○咳嗽劇キハ胸肺飲夜ニ於テ清涼解毒茶ノ内ニ二三重ノ阿片劑ヲ加ヒ數  
々良効アリ

○ 壯熱見シキハ清涼和解スルニ仏手柑汁 百十九号 百十三号 劑ヲ散

、滴飲料加へ服シ或ハ乳汁劑

○ 発汗劇キハ衰弱スト至テ強テ閉止スルヲ勿レ清涼和解鎮止劑ヲ引

ビヒゴム

○ 食ヲ催進スルニ苦味ノ浸劑健胃水醇酒ニ溶シ或ハ四部一ノ煇硝

精丹凡精ヲ加へ用之ハ食良ヲ進ムル良劑トス

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

燃熱第七

總論第一

凡ノ燃熱ト名ルモノハ身体各部一所ニ限リテ又ハ純留無寒熱病ヲ正  
ノ理會スルハ燃熱ノ治法モ亦知ス右兩症共ニ藏ノ運動太過急疾  
動脈諸血異常ニ壯熱ヲ生シ脈疾數具他諸症無寒熱ノ如シ

第二

粘凝血具部ニ留止シ血脈ヲ閉塞シテ通流スルヲ能ハサルヲ心藏健  
運ノ精カヲ起發シ血ノ流行激怒急數ヲ為スル水銃術ノ作用ノ  
如ク逆流シ此ヨリ壯熱腫起煩赤疼痛光滑ヲ顯ス

内外諸因ハ打撲損傷脫臼骨傷外割緊縛寒飲冒寒又以前壯  
熱アリ或ハ大酒燒酒辛熱ノ飲食過度調攝ヲ誤リ烈キ勞動等

第三

此症多端ニテ諸症一ナラス醫ハ赤遊丹毒此ハ皮上ニ處リ淺熱ヲ移延シ  
面部項背手足又一段強烈ナル深ク肉中ニ侵襲ス穴鼻ニ安知スハ  
キモノハ眼目齒斷耳孔懸壅耳後腺液下鼠鼯腺陰囊婦人ハ乳  
房具他ニ生ル

第四

内部ハ躁熱譫妄頭眩膜大頭痛面部顔日咽喉食道氣管會厭  
呼吸不利股肋膜肺藏ノ部刺痛咳嗽咳血腎肝膈膜胃脾腸膀  
胱子宮心藏等皆大熱疼痛ニ脈軟ニ疾數

第五变化

此病ノ終リニ变化スル症四種ニ別ツ一ハ自然ニ分利消散ニ増進シテ  
遂ニ潰瘍トナリ脈絡ノ内ニ凝結シ多少脂膜腐敗酷厉惡臭ノ膿ヲ  
釀スニハ熱脫疽ニ変シ疼痛患部大熱火紅後黯黑青色ノ線條及

斑點ヲ交へ具所ノ弛緩ナル上皮ニ小疱數々生じ此内ニ黃汁聚り  
速ニ腐壞シ寒脱疽ニ変スレハ炎熱急ニ休止シ灰枯蒼青黯黑色  
ニシテ寒冷痛痒ヲ觸知セズ終ニ患臭ヲ発シ屍ノ如ク肉軟弱  
皮緩ク浮ミテ全ク附着セズ或ハ黒ク燥キ枯焦ス此ニ於テ腐蝕  
ノ部ヲ能ク鑿察シ残ラズ除キ去ルニ否レハ治セズ四ニ堅硬ニシテ  
觸知セサル腫瘍ト爲ル此ハ腺ノ所在乳房唾腺耳頸腋下鼠鼯  
等ノ腺殊ニ乳房ハ徐々ニ患后ニ變シ尤モ危險乳癌ト名ク

### 第六 鑿法

諸症烈キ程險惡ニメ分利消散シ難ク具部ハカ多脂厚肉壯健  
人ハ害少ク程好ク膿熟スハ速ニ治ス此ニ反シテ腺ノ部汚穢惡液多  
キ又或ハ虛弱ノ人高年ノ人内部ハ肝藏尤モ險惡腎藏肺藏ハ數々  
治スルアリ○凡テ内部ノ寒熱脱疽容易ニ分利セズ傳深惡性熱ヲ兼

スルニ精力脱スルハ大抵危險ニメ死症トス何者ハ外部ノ加ク取扱シ難ク膿  
ヲ程好ク除キ去ルコトヲ得ス深ク穿透腐蝕シ又堅硬腫ト成リ遂ニ  
削瘦シ勞瘵トナル

### 治法

先ツ其部ヲ再々分利解散ノ運動ヲ復シ快行通散シ起居養生飲  
食ヲ慎ミ諸般ノ粘結ヲ稀散シ清涼和緩分利通散融化するノ藥劑  
无寒熱皆何種皆スルヲ撰用シ又殊ニ竜腦乳汁ヲ四半時ニレテ服ス  
レ異常ノ大効アリ

刺絡ハ初日良ナリ且標的ハ三篇ニ概見ス多血壯熱ハ多ク浮血スレ諸症  
減ス内部烈キ熾熱痛ハ最要シ赤遊丹ノ類ハ他ノ輕淺ノ症ハ肝要  
ナラス

外用藥ハ石灰水ニ四カ一ノ竜腦精ヲ加ヘ強クシ或ハ硝砂或ハ砒石ヲ刮

或ハ燒酒ニ碓砂竜腦或ハ分利通散劑ヲホトシ囊ニ入レ酒或ハ鹽水ニ煮  
或ハ絞汁ヲ綿布ニ浸シ温ニ乘シ患部ニ布貼ス

○鼠鼷腋下頰腺乳房腫等ハ分利消散スル膏日茶ニ竜腦ヲ交ヘ又ハ水  
飛粉劑ヲ單用シ或ハ官粉白里日草竜腦ヲ加ヘテ強クシ温テ布貼  
スルテ粘着凝滑ノ劑ハ此病ニ害アリ何者ハ腠理汗孔ヲ閉塞ス

○又接骨花煉濃汁及舍利別ニ少ク鉛白霜或ハ官粉ヲ加ヘ軟膏月ノ  
如ク貼スヘシ

○焮腫已ニ四日ヲ経シハ大抵ハ分利消散セズ膿ヲ為スニ至ラハ分利ヲ禁  
シ膿熟ヲ要スヘシ

○軟化スル患部酷厲液ニ因テ凝結スル片ハ早ク運動セシメ全ク膿化セ  
シムヘシ此藥劑ハ 煨苜蓿或ハ蜜ニ水飛粉ヲ加ヘ或ハ白麦飯及乳汁糊  
劑牛酪泊夫藍ヲ加ヘ温メ布貼スヘシ

○輕淺ナル焮腫ハ膏日茶ヲ貼シテ膿熟セシメ尚且候ハ浮軟焮赤消散  
押しテ觸知ス或ハ膿カ自然ニ白色ニ見ユ此ヲ膿花ト名ク

○焮腫遂ニ分利解散ヲ得ス終ニ寒熱脱疽ニ變シ險惡ノ症トナル機那  
ヲ内服スルヨリ良ナルハ十分量五分或ハ一匙宛服スヘシ凡テ寒熱脱  
疽ニ最良ノ奇藥効力強キ劑ナリ許多ノ名匠稱譽経験ス老人  
ハ且シカラス尚効力強キ外用日茶ヲ撰ミ施スヲ肝要トス

○内部ハ甚ク危險シト雖モ初ニ分利消散シ速ニ十分ニ刺絡ヲ施  
シ清涼スル飲湯ニ仏手相或ハ醋ヲ交ヘ和解清涼劑及酸收劑土  
質劑散藥等凡テ尤寒熱ノ如ク意ヲ用ユ

○腦焮腫初二三日ノ頃清涼劑蓄薇醋スレニデル醋ヲ綿布ニ浸シ  
温卷シ尔後退カサルモノハ分利劑泊夫藍竜腦ヲ加ヘ或ハ竜腦  
乳汁劑

○狂躁譫妄烈キモノハ身後頸顛ニ水蛭ヲ吸貼シ或ハ角法頰脈刺  
絡腕足難ニ灸泡茶又ハ酸收泥ヲ温ニシ足趾ニ貼スヘシ

○眼目ニ種アリ強烈ノ症ハ眼中白膜ノ血腫ト名ク尚又乾症湿症別  
ツ乾症ハ輕淺新灸ノ者ハ寒水蓄薇水其他ノ清涼ノ眼料水車前  
蘆蒿水ニ鉛白霜黃銅粉三分三厘ヲ茶水ハ棧ニ文ハ數々洗スヘシ

○湿爛焮腫ハ是夕復シ難シ思液腫病壞血病徽毒腺結腫ノ類ハ老  
人ニ多シ此ヨリ全ク省シ或ハ斑點翳膜等ノ諸症ヲ灸ス

○治法ハ性温熱ナラサル下劑ニテ思液ヲ導泄スヘシ熱性ノ人ハ清涼和  
解ニ及分利通散四八号九一号及硝磺或ハ汗茶ヲ用ユヘシ又粘  
液留飲多ク寒性ノ人ハ燒酒浸ノ布珀槐木ノツツワヲフス百十六号  
外用ハ上ニ説ク如シ尚又白丹凡龜腦泊夫藍精又燒酒石灰水小兒  
ハ乳汁ニ泊夫藍多血ハ刺絡角法湿汁アル症ハ下劑灸泡ヲ項窩

耳後頸顛頭頂脊脚是夕良効アリ

○徽毒ヨリ灸スル症ハ頑患ナリ鑿識法ハ領頰腺硬結ス藥水飲ニ  
目赤丹ヲ内服シ黃銅粉无名異ノ眼料水ニ三厘三毛ヲ加ヘ數々清  
洗スヘシ

○咽喉焮腫最初下劑水銃法險惡ニ進ムモノハ刺絡角法分利劑  
清涼和解劑四七号及灸汗劑〇飲食下ラカルモノハ外用茶燒酒  
龜腦精ニ泊夫藍ヲ加ヘ温射スシ漱茶劑ヲ水銃ニテ咽喉ハ灌射シ脚  
湯艾子汁ノ灸泡ヲ良トス

○脇肋膜肺藏膈膜ノ焮腫ハ大抵前ノ治法ニ異ナラス胃腸肝脾腎膀  
胱子宮ハ外用スルニ囊ニ温乳汁ヲ盛リタル劑前章ニ奉ル如クスヘシ  
或ハ水蛭ヲ直腸ニ吸貼ス

○潰瘍トナリ具膿咳ニ由テ气管ヨリ唾出スル様ニ催進セシメ内部ノ



膿瘍ヲ治スヘシ胸肺ヲ茶劑ヲ沸浸シ或ハ煎湯トシ數々服スル其  
間一二日ノ日已且杏油亞麻油ヲ服スヘシ或ハ胸肺強壯茶ヲ服スヘシ

諸血流泄第八

種類

鼻血咳血痔血吐血月經產血子宮崩漏血少年ハ衄血多シ中年ハ  
咳血吐血高年ハ痔血尿血此ニ反スルヲ不順泄血ト名ク其の候タルヤ  
多血少壯盛實面赤ノ常ニ敏速ナリ膽汁多キ多血ハ鬱憂スル性  
急ナリ中年以後高年ノ人ハ奉養過饒飽暖ヲ逞シ常ニ香竄精  
烈及催熱ノ食物飲酒過度性急ハ怒スル人ニ多ス

病因

血ノ運行大過強烈或ハ炎熱ノ時強ク勞動シ大酒沈醉発汗房吉又  
過度〇性素虚弱ハ血脉膨脹或ハ破裂ス此症ハ血中ニ酷烈液胆汁  
様壞血毒汚穢惡液ヲ混濁スルニ因ル皆自然ノ良能ニシテ害ヲ  
為ス毒液血中ニアルヲ泄血ヲ催シ除治スルヲ鼻血痔血月經等ノ如

ノ鼻中直腸子宮ハ害ナク益アリテ此ヨリ生ス諸病ヲ減消ス故ニ阻妨  
スルヲ勿レ虚脱見シカラウレハ閉止スルヲ勿レ○研究スルニ体中他ニ勝  
レテ缺損虚弱ナル部アルハ此ニ乘シテ他ニ先ツテ必ス泄血ス肺虚スレハ  
唾血咳血ヲ免シテ多少缺損ス○心藏ノ健力異常ニ強ク充張スレハ脉  
絡破裂ス肺胃腎膀胱妊婦崩血危険シ

泄血烈シク驚怖スレハ危険ニ至ル一無キ症アリ何者ハ血十ハカニ泄除スル  
中ハ脉管終ニ自ラ收缩鎮止スルヲ早ク閉止スル中ハ乍チ危篤ノ諸症  
ニ変シ泄血ヲ他ノ部ニ移シ焮熱ヲ免シ肺痿勞咳惡液腫病水腫ヲ  
免ス又泄血適宜ニ時々免スレハ疾病ヲ減除シ危篤ヲ免ル故ニ泄血危  
篤ノ至極ニ非レハ早ク滋瀉閉止劑ヲ用ルル勿レ

治法

先ツ初ニ酸透吸收劑ニ仏手相汁或ハ醋ヲ加ヘテ強クシ或ハ藥鹽及焰  
硝及和解毒清涼飲冷水

- 血ノ騷擾スル度ニ隨テ酸收ノ飲料水大麥煎ニ交ヘ或ハ下劑或ハ稀  
薄滋潤ノ飲料ヲ多服スレハ凡テ酸收ノ物ヲ悉ク標的トスレハ
- 藥泉ノ代リニ牛酪清凝固乳汁ヲ一二百支許ヲ服スレハ
- 辛熱精烈温熱硫黃様樹脂泊夫藍ノ類ヲ禁止スレハ
- 牛酪清清涼和解毒焰硝九号酸收ノ土質劑丹硝具起免スル時  
数々三分三厘ヨリ五分許ヲ水或ハ他ノ清涼飲ニテ服シ後冷水ヲ一盃  
服スレハ且間ニ子仁乳汁劑
- 劇盛ノ泄血速ニ退カス疲困脱カスルモノハ最初ニ和カノ收澀劑及阿片  
劑ヲハカ量程好ク清涼和解毒劑ニ交ヘ夜ニ至テ子ヲヘレ且ニ少ク用ユ  
和カノ良効アル收澀劑ハ百七号劑或ハ毒珊瑚血石八二号劑ヲ分量  
半分ヲ和解毒清涼散ニ交ヘ又一厘六毛ノ阿片ヲ加フ

○尚烈キモノハ白罌粟花 薔薇花ノ大陽煎ヲ稀キ飲料ニ滴シ又ハ  
赤珊瑚 阿仙藥 一ルチスリユトシ 血石等ノ大陽煎ヲ四五十滴許ヲ  
車前水 薔水ニ滴服スヘシ又ハ十五号劑ヲ四五分滴服スヘシ  
セ井ルヒウスノ人名 收法飲 主治虚脱疲困

薔水 廿四支

麻黄水

車前水 各十六支

桂水 八支

醋 八支

赤珊瑚

血石

阿片 各三厘三毛

柘榴子舍利別 八支

右調勻シ四半時ニ前ノ飲料ニテ冷飲シ程久ク用テ止ムニ至ラハ他  
ノ閉澁劑ヲ用ルコト勿レ以上ノ劑ニテ急ニ閉止スレハ諸惡症ヲ発セス  
損害ヲ生スルコトナシ而後快復ニ至ル迄ハ清涼和解劑 清稀清  
涼ノ劑ニテ終成スヘシ

又他ニ勝レテ稀養シ奇効アルモノハ白朮ヲ四五分飲劑ニ加テ単用

スレハ是夕藥力強キ異常ノ奇藥ナリト稀養シ諸般危篤ノ泄血  
ヲ救治ス又清稀滋潤ノ飲料ハ亜麻仁乳汁ニ加テ飲服スヘシ此藥ハ  
是夕烈キ澁瀰劑ナレハ危篤過盛ノ症ニ非レハ用ルコト勿レ

○尔後強壯滋補スルニハ肉羹汁 雞鷄仙手相香椽橙汁ヲ加テ酸  
收ト為シ或ハ燕麦大麦米糠牛脚鹿角象牙屑ヲ煉煮汁ニ製シ或  
ハ麦酒鷄卵赤酒等ハ以前ノ用テ澁瀰劑ノ体中ニアツテ酷烈ナルヲ再  
ニ減消シ除クカ為シ

○外用療法第一手足ノ踝骨ヲ緊縛シ第二大ナル血石ヲ一ツハ手ニ  
握リ一ツハ腋下ニ挟ム第三ニ百七号劑ヲ一二支ヲ温湯十支ニ溶化  
シ此内へ患者ノ血ヲ数滴落シ入シ微火ニ掛ケ箸ヲ以テ久ク攪動旋  
回スヘシ

○鼻血ハ精烈ノ燒酒或ハ竜腦精白朮丹九二味ヲ合シ水ニ和シ或ハ百七

一号或百十九号制ヲ車前水ニ溶化シ綿撒糸ニ浸シ鼻中ニ刺シ或ハ  
注キ容ルヘシ

○角法ヲ強ク股足脛ニ施シ血ヲ下降スヘシ婦人ハ速ニ鎮止ス老人ハ水輕  
ヲ直腸ニ貼スヘシ痔疾アリテ凝結シ患ルモノハ尤モ良シ又額ニ金  
銀銅鉄ノ寒涼ナルヲ貼シ縛結シ或ハ綿布ニ寒水又ハ醋ヲ浸シ頻  
リニ頂ニ置キ甲カ子ハ陰囊ニ置クヘシ或ハ患者ニ知ラセス不意ニ寒  
水ヲ項背ニ灌クヘシ毎ニ即効アリ

○唾血咳血ノ輕症ハ和鮮鎮清劑或ハ四七号制ヲ水或ハ清涼露水ヲ  
快復適用シ穩靜困勞ヲ戒メ爽涼ノ食料ヲ与フヘシ

○烈キモノハ和カノ阿片一厘六毛或ハ十号十五号百九号八二号制等ヲ  
前ニ拳ニ阿片制ヲ少ク交ヘ程久ク用テ閉止スルニ至ルヘシ或ハ百九号制

○刺絡角法股足脛足腓脛閉痔血ハ尤モ良トス

○大便秘閉ハ潤利滲滑ノ食物煮タル李櫻實林檎乾蒲桃菠菘菜  
又軟化清涼ノ水鏡法

○唾血休止セハ滋濡劑及阿片ヲ用ルヘシ勿レ續ヒテ清涼劑ニ乳汁劑ト水  
ヲ交ヘ或ハ寒水ヲ交ヘ又此ニ酸收ノ舍利別譬ハ 柘榴汁 垂麻仁汁  
ヲ加ヘテ酸收トシ終ニ全功ヲ收メ後肺藏ノ破裂脈絡ヲ瘥サシハ肺  
痿勞瘵ト為ルカ故ニ毎日二度百八号制或ハ鹿角精ト四九号制ヲ  
合シ胸肺茶劑及愈劑ノ飲劑或ハ九号制ニテ送下シ又ハ和鮮清涼ノ  
散茶ヲ時々兼用スヘシ

○吐血治法前ニ同シ此症ハ寒水ニ柘榴子汁ヲ多ク交ヘ多服スヘシ但シ劇  
急ノ時終リテ後大黃煎及燒酒浸ノ和カノ下劑ヲ用テ胃ヨリ吐出スル  
血ヲ大便ヨリ導クヘシ二三日又石竜胆アルニカ 蒙菴類ヲ沸湯煎燒酒

浸トレ又機那ハ凡テ唾血具他ノ泄血ニ是タ良効アリ  
 ○尿血ノ治法モ大抵一般ノ血ヲ導キ泄スルニ腕ニ於テ刺絡シ尤モ良トス  
 ○痔血崩漏産婦漏血劇烈前條ト一般ナリ崩漏過烈ハ子宮ノ血ヲ角  
 法ニ由テ乳房ニ引クヲ最要トス  
 ○裂シク止ミサルモノハ昼ハ騷擾妄行ノ血ヲ清涼和解シ夜ハ和カク阿片割ヲ  
 用ユ

諸血閉塞第九

起原

惣テ脱血危難ノ諸症ヲ発スト血モ又自然ニ通泄スル血壅閉スルハ此ニ  
 勝リテ危險ノ諸病ヲ発スト知ルヘシ

病因

血粘稠凝結シ或ハ泄血ヲ瘡スルニ閉塞或ハ寒涼飲料鹿葱ノ閉塞食  
 物ヲ過服シ或強ク心勞等

症候

鼻衄血徑閉痔血産後惡露  
 ○鼻衄閉ハ頭痛服耳口齒牙痛咽喉懸壅頭腦面部ニ丹毒類ノ焮腫  
 ヲ及ル  
 ○胸膈ニ在テハ心悸動煩燥呼吸不利或ハ吐血咳血眼痛肺焮腫勞瘵肺

痿諸大熱等ヲ灸ス

○月経閉ハ腹絞痛割衣引腸胃肝脾及こ頭痛心苦拘滿呼吸短促惡心嘔吐吐血咳血衄血支節困倦痿黃病此症ヲニ處サ病ト名ク見下驚痛搐搦瘳癢子宮衝逆或ハ子宮衰弱シテ突出シ脚膨脹水腫瘡瘍關節疼痛痛風脚氣痔漏尿血等シ

處女病ハ水腫ノ一種ニメ飲食ノ消化ヲ妨ケ腐敗シ黃色粘稠ノ惡液ニ變シ物身ニ布滿シ汗孔ニ流滯ス故ニ面色痿黃浮腫疼飲元氣虛損シテ乳糜ヲ化生スル機ヲ廢シ常ニ手指冷ハ脉定ラズ子宮ノ脉管閉塞ス

病因ハ粘液ヲ生ラ食物房勞過度飲食節ヲ失シ勞役平常憂悶スルヨリ元運ヲ虛廢ス

治法

初メニ粘稠惡液ヲ驅除スル劑ヲ用ユ吐利ハ酒石白丹凡百九二號劑下劑ハ日永丹大黃芦薈薑々菜ヲ燒酒ニ浸ル文火ヲ以テ煎煮ス且後血ヲ清除スル劑ハ利便散劑汗劑又ハ礬砂充ニ良トス

方

ゴムアムモニヤシ

阿魏

ガルバヌ

各二錢

廿一號劑

丹凡

各三分三厘

琥珀油

一分

右為丸○効能潰瘍ノ類ニテ血ノ腐敗或ハ血ニ膿ヲ交ル症肺瘍隱伏シテ表ニ見セス凡テ惡液病青眼牙疳ヲ治ス

○處女病情欲鬱結ヨリ來ルハ宜ク嫁セシメ刺絡シ酸味菜劑ヲ与フ又殊ニ効アルハ

牡荊仁 麻仁 馬齒莧仁 胡安子 芸香 藿香 竜腦 没薬ノ大陽煎或ハ燒酒浸ノ茵陳石竜旦琥珀或ハ五二號劑具

後血中腐壞惡液精水ノ腐壞ヲ治スルニ八三号劑艾盛酒石蓋白  
丹凡合劑劑酒石大陽煎或茵陳石竜且蘭菊迷迭香薊馬  
兜鈴花蒿苣根金雀花根地榆根大黃杜松子月桂子沒藥肉  
豆蔻膜等ヲ良トス

此病ニ奇効アル某酒方

剛鉄屑 八匁

松浦桂 二匁

肉桂

丁子 各一匁

燒酒 二百匁

右暖処ニ置テ茶精ヲ出シ八匁宛服シ其後下劑ニテ惡液ヲ下スヘシ  
○産後瘀血閉ニ心悸恐怖怔忡頭痛飲食ヲ吐シ安眠セス終夜睫ヲ接  
ヒス凡熱癩斑狂躁譫妄痛癩照助筋膜子宮焮熱疼痛

○痔血閉ノ候ハ大抵産後瘀血ト同シト孟氏殊ニ黃疸卒中疝積聚  
神志沈重腫脹吐血脚氣痛風腎痛尿血石淋喘急咳嗽脚腫

水腫其他癰血ノ諸症ヲ治ス

治法

種々アリ血ノ質ニ隨テ區別ス血中水氣粘液多ク且ツ寒冷ナルハ下  
劑ヲ良トス或ハ芦荟丸ノ如キ樹脂類或ハ下劑某酒方ト見或ハ粘液  
ヲ分利清澄稀散シ衰弱ヲ健運スル燒酒浸或ハ十八号劑其他斯  
ノ如キ類ヲ四五十滴其餘ニ用之

○血是ヲ粘凝ハ上ニ云某劑ニ香橙香椒皮ヲ加ヘ用ニ起居動作ヲ程好  
クシ少ク酒ヲ与ヘ鬱結ヲ開クヘシ必ス恥醉スルヲ无ク養生ヲ慎ムヘシ  
○血ノ運行大過急疾壯熱涌沸スルモノハ先ツ初ニ和カノ下劑後清涼和  
解ノ劑十九号劑ニ硝石ヲ加ヘテ清解鎮靜ニ後神經ヲ強クスル劑

鹿角精及大陽煎ヲ用ニ動作ヲ勉ムヘシ

○鼻血閉外ヨリ迷迭香 シルホリ云 此ニ神效ニ添 ヲ鼻孔ニ刺シ捻廻シ

流泄ヲ催誘スヘシ然レハ漏血ヲ為スヲ稀ニ上ニ云諸症ヲ免シテ頭腦  
ニ衝逆スルノ鼻衄ハ自然運用ノ努力ニ由テ勉求シ通進スモノ  
然レハ溢血ノ人ハ鼻中ノ脉管頑硬ニシテ容易ニ破綻セス或ハ他ノ  
因アツテ漏泄ヲ得サルモアリ

○刺絡ハ藥効ナク諸症盛ニシテ減セス危険ナレハ衝攻スル血ヲ頓脫除  
スル簡易便捷ノ治法ニ若クハナシ又其間ニ角法ヲ行フヘシ然ラサレハ忽  
チ上ニ云諸患症ヲ免シ易シ

○經閉ハ粘稠凝泣ノ血ヲ清稀稀散スル劑或ハ分利通解燒酒劑廿号  
劑或ハ每晚廿一号下劑散茶廿二号廿三号茵陳鹽等又樹脂類ノ

子宮劑ハゴムアニモヤシ、サカベニユ、草脂ガルハニユ、草實常春藤  
脂 沒茶 芦薈 巴ルサモ類 篤耨香或味苦キ類ニハ百廿四号  
ヲ久ク用ヒ候常ニ来リ過ル時ハ分メテ用ユヘシ

○常ニ通スル時分七八日前ヨリ強クハカ利驅出スルニ腰湯脚湯

カカニ三号ヲ為シ手摩シ血脉ヲ降下セシム或ハ前ニ茶ニ和カシ下劑スルヲ

摻ヒ此ニ旋那葉 大黃 梅景草 藜芦ノ一種 酒石鹽 九一號劑ヲ加ヘ服  
スルハ滯血ヲ子宮へ通泄ス

○子宮劑強ク驅出スル飲劑ヲ露水ト為シ用ユ又性素粘液留飲多

キ人ハ茶酒ヲ用ヒカカ別ニ譬ハ 沒茶 琥珀ヲ末トシ或ハ蓬砂ヲ加ヘ  
茶氣ヲ烈シシ冷温ヲ酒ニテ服シ又飲劑ト為スニハ 石溥苛 柳蘭

鈴蘭 蘭菊 肉桂等ヲ露水ニテ服スヘシ又沒茶錠 廿五号 沒茶  
燒酒浸ヲ單用シ或ハ 琥珀 枚木 泊夫藍燒酒浸或ハ硝砂精ヲ

加ヒテ茶力ヲ烈ニシ或ハ驅散通泄峻烈ノ油劑等ヲ考ヘテ与フヘシ終  
リニハバサモ類ヲ多服シ甚タ良効アリ

若シ以上ノ諸茶ヲ過服シ血ノ運行急疾ニシテ壯熱煎沸セハ速ニ禁



止し刺絡ヲ行し清稀油散ノ劑ニテ早ク血ヲ鎮靜セサレハ大熱升逆ノ惡症ヲ免ス

○茶劑効アリテ子宮當テ腹絞痛腰痛ノ為サハ尚烈ク通泄スル劑ヲ勉テ用ユ

○經行痛ナキモノハ駝池劑ヲ少婦ハ新月高年ハ滿月ニ用ユ之刺絡ヲ施サレト欲セハ定期三日ノ間ニ施ス之其知レ難キモノハ高年ハ滿月少婦ハ新月以後尚慎テ慮忽ニ為ス勿レ嫁スヘキ頃ノ處サハ妊娠スルアリ最初茶劑ノ治切ハ大抵十四日程モ續テ用ヒ毎日脚湯ヲ為スヘシ

○高年絶經ニ遲速アリ大抵五十歳以後ナリ動モスレハ經閉ノ如キ諸症ヲ免スルモノハ先ツ速ニ刺絡ヲ為スヘシ此ノ如キ婦ハ是ク多血ニシテ養生惡キヨリ免ス諸症烈キモノハ類リニ和解毒清涼散ノ類ニテ清解ス

○産後瘀血通泄是ク少ク熱无キモノハ駝散通泄燒酒劑ヲ單用シ或ハ他ノ飲料ニ和シ度々服スヘシ又此劑ノ代ニ七五号劑バルサモ類ヲ二カ五厘宛ニ度服スヘシ

○又一箇ノ壯熱ヲ兼免スルモノハ毒リニ和カノ通泄劑モ烈シキ劑ハ尚用ヒ唯此症ハ先ツ清涼和解毒ノ熱涌煎沸ヲ鎮止シ脚ニ刺絡ノ後和解毒清涼ノ散茶及燭硝或ハ発汗劑ノ飲湯ヲ擇ミ清稀ナル飲料ヲ用ユヘシ

○痔血閉ハ初ノ脚ニ刺絡シ後乳汁ノ水鏡法ニ野麴鴨菊ヲ交ヘ或ハ和カノ下劑ヲ用テ尔後血ヲ変移スヘシ

○大便秘滯ハ十九号劑ニ燭硝丹砂ヲ加ヘ或ハ清涼和解毒茶ニ酸收ヲ飲料ニ交ヘ用ユヘシ粘稠凝結ノ血ヨリスルモノハ經閉治法ト同シ  
○終リニ血ヲ清除シ瘀濁ヲ去ルハ和カノ駝散通泄劑或ハ七五号劑或

八帛珀蓬砂下利ノ薬酒等

○外用茶ハ芒蒼没芥ヲ肛門ニ挿入シ或ハ酷烈ノ水銃法或ハ肛門ヲ毛  
布无花葉菜ニテ手摩シ或ハ腰湯脚湯又諸茶一旦効アリ後ニ  
馴レテ驗ナク危険苦唯アル寸ハ水蛭 ニテ血ヲ吸ハシム即効

○血再ニ流泄スルヲ為サハ必又渴止スルヲ勿シ和カク強壯ニスル五一号劑  
或ハ鹿角精酒石大陽煎等

○養生ハ閑歩車馬ニ乘リ鬱結ノ血ヲ通流之時々少シ古酒ヲ服ス甚  
良劑シ

○凡ハ一石以上ノ血ヲ失フニ至ルハ必又補フニ宜シク血氣ハ人身ノ本也血氣衰ハ則チ病生ズ

○血氣衰ハ則チ病生ズ血氣衰ハ則チ病生ズ血氣衰ハ則チ病生ズ血氣衰ハ則チ病生ズ

醫方類聚卷之十

諸血聚攻疼痛第十

會湊論

蓋し此病ヲ妄察スルニ凡テ血ノ大過及血中ノ水液鹹味粘稠凝結平常ノ度ニ越ヘ各部ニ聚滿シテ壅滯スルハ通暢流利スルヲ能ハス諸藏脉絡患部衰弱ノ函件ヲ從ヒテ起原スル諸病甚ク夥シ是レヲ患部ニ由テハカツ

區別

頭腦ニ於テハ頭頸眼耳齒牙咽喉焮熱腫痛頭眩冒昏睡症不遂卒中○胸部ハ胸膈拘滿煩燥呼吸不利心悸動咳血○腹部肝脾ハ諸般ノ鬱滯腫起膨脹焮腫執大痛膿瘍脾ト子宮ハ因重ノ諸症ヲ凡テ腎門脉直腸痔脉ニ籠ヒ隱伏スル疼痛ノ開破セサレハ盲痔ヲ凡テ或ハ尿管腰股關節痛風手臂腫起疼痛婦人ハ子宮自余ノ諸

喉

症ヲ悉ス○年齡ニ因テ差別アリ少壯ハ大抵上部ニ衝逆シ鼻孔ヨリ洩除ヲ要シ感冒頭痛首頸眼耳齒齟咽嗽焮腫鼻衄スト齒疔消除セス○老人ハ胸膈ニ攻衝シ肺ヨリ浮出セト要スレ種々ニ變シ通暢セズ咳嗽呼吸不利喘急肺脹助焮焚刺痛終リニ肺痿勞瘵トナル

病因

富貴ニテ放肆勞動セズ自然運行ノ血壅閉シ刺絡ヲ急リ寒冷感冒カシ蒸氣ヲ遏閉シ居所催熱神思勉勞患部虛衰麻痺止痛劑等ヲ誤用スル等

治法

劇烈ト間靜ヲ別チ從事スヘシ間靜ハ預防ヲ行ヒ発動ノ時導泄分利驅散ニ通暢スヘシ性多血ハ刺絡ニ寒冷粘液多キハ害アリ下劑及六九号ノ類壯實軟化潤利スル水鏡茶 鬼菜利脂

寇

牛脂ヲ九三号制ニ製シ梅景草ヲ加ヘ烈ニシ用ユ又ハ汗散散茶及  
十九号制丹砂焰硝四八号制ヲ毎日小ヒニテ数々用ユヘシ

○疼痛烈シテ頑強ニ夜ニ於テ九六号制ヲ少ク或ハ蘇合香ヲ上ノ散  
葉ニ文ニ或ハ鎮痛乳汁制ニ文ニ用ユヘシ毎朝卧蓐ニ在テ分利通散  
及汗燒酒制ヲ温服シ及汗ヲ要シ走竄熱物ヲ禁スヘシ

九七号 九八号 九九号

○頭痛便秘ニ下制分利通散ノ散茶燒酒浸外用ハ燒酒ニ竜腦泊美  
藍ヲ温布浸シ頭ノ正頂額顙顙ニ貼シ脚ヲ摩循シ血ヲ下降  
スヘシ○痔脉径閉ハ水蛭ヲ貼シ多血刺絡利アリ小年ハ良ナラ  
ス運動勞使ハ治法ノ一ニシ茶制ニ勝リテ驗アリ

風化走竄ノ塩茶芳烈ノ精露頭腦ハルサモ 卒中ハルサモ 稱譽  
スレヒ鼻中ニ入レ保ツトキハ害アリ失気昏日ニ多ク用ユ又扁  
珀油迷迭香ヲ良トス

○耳痛ハ騷鳴声音通徹シ唯ク外傷ヨリ及スルモ一般ニハ焮腫ヲ第ヌ  
治法ハ血液ヲ通散シ及汗分利清澄稀散スルノ制頭痛ニ用ル  
制尤モ良シ

外用茶ハ竜腦精ヲ數滴綿布ニ浸シ温ニ乘シ耳孔ニ刺シ或耳  
後ニ塗擦スレハ痛ヲ分利通散シ耳痛瘡膿ヲ防クニハ苦巴旦油  
ニ少ク竜腦ヲ溶シ用ユ

焮腫熱痛速ニ分利セカシハ腫瘍ヲ生ス此軟和制ヲ貼シ用熟ス  
ヘシ初メハ通利制後清涼和解散茶分利通散スレ燒酒浸制十  
八号 四八号或ハ琥珀燒酒浸香狸布珀油或ハ竜腦射香ハルサモ  
九七号ニ 苗香薄荷羅防風鴨菊油等綿布ニ温メ蒸シ或ハ蒸氣ヲ薰  
シ耳中ニ容ルヘシ又脚湯頭部ヲ摩循スヘシ

○聽へ難キハ

鹿角塩 三分三厘

香狸一分 帛珀油二滴

右朝夕小豆程ノ大サニ身中ニ入レ又ハ前條ノ香狸油類ヲ摺用スヘシ

婦人ハ経閉男子ハ痔脉閉老人ハ元氣衰弱ヨリ及レシ外傷ニテ鼓膜破裂ハ速ニ治セス健運強壯ニスル藥劑殊ニ竜涎香ヲ合スルヲ劑頭腦強壯劑

刺絡角法下劑飲食節度運動使役夏月温泉ヲ服シ大酒諸飲劑過服ヲ禁シ調護ヲ專要トスルハ此劑ニ勝レリ三十歳ニテ過ル者ハ教々ニ經驗セリ

○齒牙疼痛腐蝕敗壞飲食脂膩ニ停止シ口熱ニ因テ汚臭ニ亦又シ齒齦神經ノ膜ヲ攻傷シ血ヲ凝泣セシムルヨリ及元ス

麻痺誤字

根治ハ稀ナリ腐敗ヲ防キ齦齒ヲ抜キ去リ酸味精汁峻烈ナル類ニテ齒牙ヲ麻痺收固洗淨スヘシ

痛少ク鎮止セハ此二号或ハ燭硝精丹丸精胡椒油丁子油ヲ用テ塗テリ或ハ点滴シ或ハ阿片竜腦ヲ丸トシ齦孔ニ入レ食時毎ニ入レ替テ或ハ帛珀槐木ノ燒酒浸或ハ燭硝塊ヲ良トス内服藥ハ前條ニ準キルト同シ

諸藥ニ抑シテ効ナクハ齦孔ニ烙鉄ヲ施シ齒ヲ燒キ而後乳香鉛等ヲ鎮充スルハ其ニ及スルナシ

齦孔无ク痛ノ及スルモノハ血熱鬱盛シ清涼和解ニ資汗ニ警馬痛鎮止劑或ハサツサフラス、槐木ノ煎湯良トス其間ニ含漱劑乳汁ニ鴨菊花ヲ加テ者或ハ竜腦ヲ加ヘ帛珀包ニ懸ニ貼シ分利清散スヘシ

甚夕多血、刺絡又ハ硝石苦味下利塩ヲ一二匙ヲ含ミ溶化セシム  
レハ血ノ會滲凝結ヲ入刀利消散シ疼痛ヲ鎮止ス

芫菁膏焯菜ヲ痛方ノ腕尺沢ニ貼シ瘀血ヲ降流セシム痛  
減少セハ時々少ク批三号ヲ割紫鉞本書百中槐木ノ燒酒浸ラ含

飲服スレハ齒齦ヲ強固シ痛急ニ再発セス批四号批五号割青  
眼牙疳ヲ治ス

○頭眩暈ハ多血ニシテ頭腦ハ升衝ス刺絡ヲ怠リ心勞シテ精神ヲ竭  
後ニ頭腦虛乏シ或ハ腐壞ノ胆汁諸液胃中ニ伏留シ怒リ易ク急  
争ス人ニ発ス初メニ吐下劑具機ニ應シ刺絡脚湯ニテ分利通散シ  
清涼和解散茶ニ焰硝丹砂ヲ加ヒ爵林ノ煎湯ニテ服スヘシ最良  
トス

外用ハ竜腦精鹿角精鹿角精ヲ加ヘテ烈ニシ具氣ヲ薰嗅スヘシ麝香精ヲ摩單用シ或ハ批七号ニ

○頭腦胃虛乏ヨリ発スル症ハ爵重セス上好ノ酒強壯健運劑ハ香  
料ヲ飲食ニ入ヘ元氣ヲ爽快スヘシ然レニ走竄芳烈ノ藥精批  
号批一号割ハ漫リニ用ル勿レ

頑固經久ノ者ハ鉄氣ノ漏泉批六号批七号割ヲ良トス

○肺痿ハ肺藏ノ脱血或會滲ノ血或ハ焮熱痛或ハ潰瘍ヲ生シ瘦削

勞咳ヲ発シ唾ニ膿血ヲ入ヘ勞熱呼吸短促ス経久ナラサルモノハ  
治スルト至ニ容易ナラス全ク肺痿ノ極ニ至ルハ不治ト知ル

○第一ノ治法ハ汚膿ヲ清除シ凝結ヲ分利通散シ咳嗽勞熱ヲ和  
利シ精力ヲ回復スルヲ要スルハ胸中溢滿ノ液ヲ和カニ下利スル

○第二ハ胸中汚穢ヲ唾出セシムルニ和解清涼ニシテ分利通散スル塩劑  
批一号第一号割ニ香櫞汁ノ類ヲ加ヘ藥氣ヲ烈ニシ胸肺劑及劑

傷三用ル本草根葉ノ劑或ハ世九号四十号劑ヲ加ヘ用ユ尤モ熱服ヲ忌ム

○第三四一號劑二十滴ヲ服スハ勞熱增長スルヲ減ス或ハ緩和強壯スル乳汁劑鹿角象牙ノ細屑ヲ煮熬シ蜜ノ加リシ服スヘシ

○第四二號劑咳嗽乳汁劑ニテ止スルハ和解毒清涼ノ散葉ニ阿片或ハ七六號劑ヲ二三厘仙手相蘇合香ヲ加ヘ丸トシ用ユ

○第五脚湯ニ因テ胸中ノ惡液ヲ下流シ患者ノ精力ヲ量ツテ昼夜平線ノ時脚ニ刺絡シ飲食ノ時ハ時藿藶苗香ヲ交ヘ是ハ鹹塩辛熱走氣醇賦金石酸收烈ノモノハ害アリ

○第六怪閉ヨリ至セハ通泄ノ策ヲ用ユ男子ト異リテ全快多シ

○第七速効ヲ得ヒト欲セハ遊歩道遠シ胸肺葉劑鉄氣ノ涌泉怪驗アリ寒性虛弱ノ人ハ胸肺ヲ害ス終リニ駢馬野羊牛乳人

乳是夕益アリハ世九号四十号劑ヲ加ヘ用ユ尤モ熱服ヲ忌ム

○脾病原因ハ凝固ノ血假肋下諸藏門脈痔脈ニ滯結シ流利セス諸之牽引拘急疼痛驚痛搐搦吹張上奔吐逆噎氣嘈雜便秘精神鬱憂恍惚健忘性急忿怒異疾奇病變動錯亂各状スヘカラス

治法

○発動ノ時便秘ハ通利スル水飡法或ハ下劑ニ硝磺類ヲ加ヘ快通シ而後粘液留飲ヲハ分利通散シ諸症ヲ減除スルノ塩平ハ世一號九二號九三號劑ニ酒石塩或ハ茵陳塩ニ丹砂蝦石或ハ酒石ニアルカリ塩ヲ加ヘ酸味赤色ト為スモノニ仙手柑汁ヲ加ヘ或ハ四七號劑ヲ毎日三四度他ノ適宜ノ煎湯ニ入シ又ハ百十五號劑ヲ毎日五六滴ヲ服ス若シ諸症効ナラハ燒酒浸ノ竜且及四七號四八號劑ヲ良トス

○同時治法ハ脚刺絡シ水蛭ヲ直腸ニ貼ス此疾痔血閉塞腰部ハ膠ニ於テ疼痛スルモノ

○第一ハ分利通散劑和カノ香料劑苦味燒酒浸劑又ハ毎夜通泄ノ散茶或ハ下利ノ煎湯或ハ下利益下利樹脂類及四九号劑

○危險ヲ防クニ虚衰ノ部ヲ再々健運シ精力ヲ挽回スルニ和カノ鉄劑五十号五十一号八十三号剛鉄板ヲ八厘ヨリ一分三厘ヲ單用シ或ハ四三号ヲ一分六厘程桂油苦味ノ浸劑ヲ加ヘ丸トシ朝夕服スヘシ

○鉄劑ノ代ニ鉄ニ觸ルニ涌泉ニ良トス當時鉄劑ヲ劇キ脾病ニ用テ大効ヲ奏ス和蘭人皆剛鉄治法ト名ク

○子宮衝逆ハ婦人ニ名ケ脾病ハ男子ニ名ク其實ハ一ツナリトス性素虛弱ハ此病ニ觸ルル劇ク胸膈苦悶刺攻急急走移煩躁惡心嘔吐嘈雜ノ諸症ヲ及ス

○病困會溱聚滿ノ瘀血門脈子宮痔脈ヲ籠養フテ通暢ヲ得ス此ヲ以テ治法脾病ノ如シ○月経節度ヨク通暢シテ此病ヲ免スルモノハ酷烈ノ惡液腸胃中ニ化生シテ及スト知ルヘシ

○治法第一惡臭風化走竄ノ品ヲ用ユ即チ鹿角精五二号五三号燒酒浸ノ香狸鳥羽革獸角獸毛ヲ燒テ烈臭ヲ臭ニ薰ニ或ハ茶精數滴ヲ單用シ或ハ他ノ液汁ニ加ヘ或ハ頭髮中臭耳手足等ニ塗ルヘシ

○病間靜ノ治法ハ脾病ニ論スル如シ然レ又燒酒浸劑或ハ硝石丹砂香狸婦人高羊ハ勉テ月経ヲ進ムヘシ羊久ク閉留スルモノ及諸症劇キ症ハ脚ニ刺絡下劑バシモ及子宮強壯ノ丸茶苦味ノ下利益

○強キ吐下劑熱劑露滴精油世七号等ヲ禁ス○土茶ノ類 白堊 赤石脂 珠母ハ全効ナシ凡テ酸味ノ惡液ヨリ起ルセサルモノハ用ル



勿レ又剛致利ニ害アリ何者ハ是々收斂シ消化ニ唯シ唯酸烈壞液ヲ標的トナセハ良効アリ

○虚症ハ鉄氣ノ涌泉是夕効アリ能ク粘凝ヲ稀散ス温飲セシムル血ヲ清稀通行セシム

○頑固容易ニ変移シ唯キハ時日ヲ待テ漸々ニ消除セシムヘシ

○肝脾壅閉ニ病因治法前ニ同シ日汞丹少シ上好石鹼ヲ他ノ薬劑ヲ用ル間ニ頻ニ多ク用ユ婦人ハ月経男子ハ痔血ヲ指のトシ

○此病速ニ復セズ増盛セハ刺絡水蛭ニテ路ヲ开通シ外用茶ヲ熨ニ水銀ヲ加ヘ茶氣ヲ強クシ温ニ貼シ和解清涼ノ飲劑清稀ノ飲食温泉ニ浴スヘシ

○肝脾硬結腫久ヲ任シハ難治ノ一症ニテ効驗アラヌ新発ハ最初ニ下劑ニテ开通シ手腕ニ刺絡シ後茶劑養生前條ト一般シハカ利通

散劑用池ノ塩サホ樹脂外傳内飲セシム

○瘦削枯燥病今テ時勞瘵ノ症ト為スモノノ一此ハ凡テ腸腸膜ノ腺閉塞ニ壞液凝滯腹硬滿乳鹿柴ヲ化生セサルヨリ起発ス此症少年小兒ニ多シ

治法 消雪丸 廿一号或ハ日汞丹ニ蜜漬ノ花萵苣苗香大黃舍利

別ヲ加ヘ和カニシテ分量少シシツ与フ大人ハ苦味下利塩硝石類ニ日汞丹諸々ノ分利通散劑脾病劑八九号劑良効アリ

經驗良方

泥苜根 四錢 半夏 廿一号 蝦石 各二錢 白砂糖 十錢

右細末ト為シ毎日數々服シ小兒ハ母子共ニ服スヘシ

身体是夕膨腫堅キモノハアムモニヤシ月桂油ヲ温メ惣身ニ擦貼シ雨水并水ニ草草ヲ加ヘ煎出シ溶シ手摩運動利益アリ

虫ヨリ死スルモノハ苦味殺虫劑ニテ驅消スヘシ  
ミリカニ蜜或ハ砂糖ヲ加ヘ或ハ蒲桃酒ヲ加ヒ服シ又菠菜狗脊月根茵陳穗青蒿花及仁ヲ麥酒蒲桃酒ニ浸シ又ハ水銀ノ諸劑ヲ用ユ

○佝僂病モ又前章ノ病因ニ異ナラス診察スルニ微毒ニ似タリ茶劑ハ四九号五十号或ハ下利塩硝石類半夏泥菖根ノ散茶前條ニ稱譽スル劑又搗キタル茴香蒟蒻八三号日永丹等ニテ通利スヘシ

外用茶ハ神經強壯ノ露水軟膏迷迭香薏苡精三六号劑類ヲ脊骨ニ塗ルヘシ

○諸ノ粗硬粘徑粉類ノ食物果瓜消磨シ准リ胃中ニ停滯スルモノヲ禁シ小兒ハ尚健運ヲ勉ムヘシ

浴湯數々シ手摩循導シ皮上污垢ヲ淨除スルハ蒸氣能ク升

○石淋疼痛腎膀胱ノ石小兒テ粘凝ノ血會積ニ徐々ニ固結シテ石ト成リ腎ヨリ膀胱ヘ増進シ諸劇症ヲ死シ疼痛惡心嘔逆尿閉掣

掣拘急焮熱痛ヲ催死ス  
○小年小兒ハ石膀胱ニ在リテ腎ニ化生スルナシ具物土ノ如ク凝結シテ脬中ニ留止シ石ト成ル

○治法劇死ノ時ト間靜ノ時ヲ分別シ從事スヘシ石膀胱腎ニ在ルモノハ初ニ和カノ水鏡法ニテ間通スヘシ

鴨菊野麩乳汁蜜砂糖ヲ交ヘ數度痛ヲ忍テ施セハ筋掣拘急疼痛大ニ緩解ス

○痛緩マリテ又劇死セトスル初ニ斤ノ麥酒ニ旋那葉四支ヲ入シ文火ニ煮シ少シ砂糖耳露蜜ヲ加ヘ數日毎朝ヒ服スヘシ

○水鏡法下劑ヲ用テ後ニ和鮮清涼劑驚痛鎮止劑廿一號劑ヲ他ノ飲劑ニテ服スルハ石自ラ脱出シ疼痛消散スル

○ 清稀淡潤劑中ニ重麻仁乳汁ニ砂糖ヲ加ヘ是ヲ妙トス強弱ニ隨テ  
増減スヘシ或ハ四号五号劑ヲ滑利滋潤劑胸肺劑ニテ用ユ

○ 劇痛ハ鎮痛劑ノ白罌粟乳汁或ハ七号百十号劑少シツテ子スヘシ  
白罌粟花ノ浸劑一匁百十五号劑四匁ヲ溶シ煎ノ如ク服スヘシ痛ミ

鎮止セハ徐々ニ石ヲ催訪セシム

○ 外用蒸温湯ニテ蒸シ硬結ヲ軟化スルニ蚯蚓油全鴨油及茶草子  
仁ノ蒸サテ葱ヲ煨シ疼痛スル処ニ貼スヘシ

○ 小ナル淋石ハ堅硬軟化スル劑ニテ危キナシ尚他ノ驅出劑ヲ加スニ  
百十五号四九号七号劑硃砂等四五分用ユ又子實ノ類ハ竜艾葉

セイノスバトス 覆盆子 杜松子 桃仁 苦巴旦杏七八箇ツ日三四度モ  
食シ又ハ乳汁劑ニ製スモ良シ別ノ乳汁劑ヲ摺用スヘシ尿閉ニ是ヲ  
効アリ或ハ茶草仁 薑々菜ヲ散トシ乳汁劑ニ入シ或ハ軟和緩解スル

藥湯ヲ浴スヘシ

○ 石大ナルモノハ 驅出劑ヲ止メ軟和緩解スル劑ヲ用ユ然ラレハ劇痛  
堪ヘ難シ全愈ノ後胃ヲ強壯ニスヘシ同時ノ治法養生大抵諸病同

○ 盲痔ハ過多ノ血凝固シテ虛衰スル直腸脈ニ留結シ疼痛ス此中ニ黒  
色ノ血充滿シ脈腫ノ如ク潰爛ス痛无キモアリ又堅硬焮熱腫瘍劇  
痛深蝕直腸内ニ隱伏シ漏瘡痔瘻身體疲困ス

○ 治法輕症ハ自然ニ潰破ス燒酒ハルワモヲ塗リ治スヘシ

○ 小囊開泄セス消散スルハ大便ニ苦難スル故ニ早ク開切シ或ハ水栓ヲ  
貼シ或ハ糸ニテ結ビ切り或ハ腐蝕炭具後ハルワモ類ニテ愈スヘシ

○ 肛内焮腫疼痛ハ初ニ分利通散シ血ノ多少強弱ニ隨テ腕脚ニ刺  
絡和カノ下劑或ハ軟化水鏡法ヲ良トス樹脂類辛熱ノ下劑ヲ禁示  
ス和解清涼淡稀ナル飲料乳汁劑

○外菜ハ竜腦燒酒石灰水ヲ温メ貼シ月巴且香油亞麻油鷄卵油龍葵油薔薇油ニ醋蜜陀僧ヲ加ヘ敷ク塗ルヘシ

○不塩牛酪蜜導ヲ茶ハ硬ヲ和ケ疼痛ヲ月緩スルニ甚ク妙シ

○痔膿瘍ハ早ク膿熟ヲ催シ開破スヘシ便ヲ堅硬ヲ軟化スル糊劑ニ乳

汁ヲ加ヘ貼スヘシ開破セサルハ内部深蝕シ惡屬ノ瘡瘡ヲ灸シ神

志沈重シ死症ヲ免ス

○痛風脚氣ハ初迄飲食ヲ嘔吐シ四肢關節困重疲倦ス此時於テ胃

中ノ汚穢ヲ吐下セシメ清稀潤散劑ヲ用ユ

○病因ハ平常奉養ニ過キ美味膏粱ヲ貪リ勞動セヌ大酒耽醉

過房痔脉閉塞等ハ血ノ粘稠凝結過メタヨリ惡液ヲ生ス

治法劇灸ハ骨碎補根 土伏苓 金剛刺 耳草 其他開竅劑

馬兜鈴燒酒浸和解毒清涼ノ散藥 鎮驚劑ヲ灸汗劑ニ投シ葶

中ニ於テ服シ微汗ヲ要シ患部ヲ温煖ニシハ利通散融解緩和劑

ヲ煎茶トシ邪毒内攻ニ意ヲ用ユヘシ

○堅硬ノ飲食起居養生ヲ守リ辛熱劑疲困苦勞過房ヲ禁シ

淡稀清潤ノ飲劑麦酒夏月ハ涌泉七日十四日程ノ間服スヘシ

○他人因ヨリ來ル症ハ虛弱瘦削血質酷厲苛烈胆汁惡液大酒催

熱劑辛辣鹹塩性急忿怒過房父母遺毒

刺絡下劑日緩滋潤培養清潤乳汁刺患部衰弱治ストモ再灸シ

易シ

惡液腫病第十一

區別

種類夥多ニテ皆血中ニ粘稠液腐敗惡液不潔ノ毒液ヲ醸生スルヨリ発ス此ヲ数ルニ第一ノ本病ハ瘰癧病脚腫水腫惣身皮肉ノ間ニ浸滲シ腹部膨脹頭胸陰囊婦人ハ卵巢等

起原

粘稠留飲多血痔脉月經間此反シテ老少年ノ脱血或寒発熱ヲ誤治シ病邪除カス養生惡ク或ハ疾癘ノ類ヲ早ク外傳ノ硫黄劑水銀劑ニテ内攻シ或ハ身体虚弱ヲ寒冷氣ヲ受テ或ハ常ニ睡卧過度粗惡飲食寒水大酒燒酒ヲ過服シ諸藏壅塞肺痿勞瘵喘急咳嗽等ヨリ来ル○老人酒客ハ是ヲ頑固ニテ危險難治ノ症トス外因ヨリ来リ内藏健全患諸病少壯ハ治シ易シ○腫物身ニ浸滿シ内藏ニ

襲ヒ虚衰堅硬潰瘍ハ治スル一希シ

治法

瘰癧病ハ血ヲ分利通散スルニ大陽煎燒酒浸ニテ健補スヘシ第一ニ開泄通利ノ塩菜第一ニ樹脂類及下利劑或苦味強壯其他香料ノ菜草或ハ壞血病ノ菜劑或ハ五種開泄根ヲ茶酒ニ煎衣シ煎劑トシ或ハ四種驅風劑或ハ五八号五九号六十号六十一号六十二号

泥苜根

羊貝

胡荽仁

各三錢

良姜

乾姜

各三錢

硝砂 一錢

丁子油ニ砂糖ヲ交ヘタルモノニ錢ヲ加フ

前ノ治法ニテ少ク良液ニ復サハ其分利シタル毒液ヲ導泄スルニ開泄下利ノ飲劑及茶酒九茶類ヲ用ユ性素壯實ハ 鬼茛菪 牽牛膏 六三号 六五号 ゴムキユツタ 芋ヲ加テ茶氣ヲ烈ニシ前ノ茶劑ト更

々用上或ハ百十二号ノ吐劑ヲ八支ヨリ十六支ヲ用テ粘液ヲ尽ク吐下セ  
シメ快復ニ至ラシムヘシ在モ強壯ノモノハ隔日ニ与ヘ強弱ヲ毎知シ多  
少スルヲ是夕肝要シ 六三号 六五号 六四号 六四号 六四号 六四号 四  
○ 决方ニ趣カハ強壯剛鉄劑及香料劑五十号 五十一号 七十一号 六七号 四  
二号ニ苦味浸劑ヲ加ヘ或ハ三号ニ神經強壯劑或ハ鹿角精四九号  
茵蔯機那ノ燒酒浸或ハ苦味ノ強壯茶酒ヲ加ヘ用ユ

○ 鉄氣涌泉ヲ服シ温泉ニ浴シテ是夕益アリ又内藏壯健ナラハ  
自ラ運動ヲ為ス元氣虚衰ハ怠惰シテ神意楽ニス

○ 外用法足ヲ頻リニ摩挲シ是夕腫脹スルモノハ綳縛ヲ施スヘシ此  
ヲ驅散ノ法ト名ケテ呼吸苦迫ニ堪ヘ易シ

○ 中等ノ性温芳香ノ食料上好ノ酒少シヲ食時ニ於テ服シ又症  
應ノ酒ヲ用テ製スル毎ニ運動使役ヲ肝要トスヘシ

○ 痿黃腫熱火病ヲ認治スルヨリ来ルモノハ先ツ惡液ヲ泄除スルニ和カノ

通泄劑ノ酒石塩ノ丸サホ六八号 霸塩丸而後熱治苦味塩劑及  
酒劑或ハ橙皮機那果壳ノ類ヲ合シ熱ト腫病ヲ治スヘシ

○ 血ノ壅閉ヨリ来ル症ハ分利驅泄劑水蛭刺絡等前ノ處女病同シ  
脱血ヨリ来ル症ハ清潤和解健補スル乳汁劑肉羹汁苦味ノ神經劑

上好大黃精機那赤酒ヲ良トス辛熱香竇鼠林示ス  
○ 痲癬小瘡認治内攻隱伏ヨリ発ス症ハ下利閉通ノ水銀劑ト発汗  
劑ト互ニ替ルヲ服シ後燒酒浸ノ木香 地錦苗 オウコウトノ煎

湯ニテ微汗ヲ要シ終リニ神經強壯ヲ用ユ  
○ 脚腫脹ハ粘凝液ヲ稀散シ苦味ノ分利劑ヨリ他ナシ外傳葉ノ寒冷

閉澁粘着膏散ハ害アリ何者ハ惡液ヲ内攻セシメ咳嗽喘急心肺  
焮熱腫水棉ノ如ク突起シ血ノ運行ヲ妨ケ痲卒中ヲ発ス

○治法ハ上ノ茶利ヲ用ヒ或ハ六六号ノ吐利是夕効アリ分量十六錢  
ヨリ廿四錢患者ノ精力ニ隨ヒ隔日ニ毎朝用ヒ具間ニ折ヘス苦味ノ強  
壯水氣ヲ驅散スル利ニ由テ腫起消除スルニテ續テ用ヒサレハ治驗  
ナシ若シ治効ナク吐利ニ堪サルモノハ手段ヲ替テ冷汗下利  
利尿ノ便ナル路ヨリ泄シ去ルヘシ

○水氣皮肉ニ在ルモノハ冷汗健補利利尿ノ効アル香料類ヲ撰  
用シ起卧ニ意ヲ用ヒテ冷汗ヲ要スヘシ尚六一号 地榆及十八  
号ヲ服スヘシ

○驅水利尿ノ塩菜ハ百十五号百十六号菜菔汁焯菜汁ニ砂  
糖及酒ヲ交ヘ毎日數度十六錢ヨリ廿四錢服スル是夕効アリヨク粘  
稠液ヲ分利溶化シ虚衰ヲ補ヒ水腫ヲ治ス或ハ下ノ灰汁セルヲ  
服スヘシ

方  
金雀花霜 九十六錢  
井口酒 四百錢

○或右一宿浸シ濃過シ廿四錢宛三度飲ムヘシ

○大熱煩渴ハ硝他ノ塩菜ヲ交ヘ用ヒ下利和カノ利ニテハ治シカクシ  
格別強キヲ用ヒ之即 野胡瓜汁樹脂類ハ六九号ヲ五分一錢  
ヲ用ヒ或ハ全ク用ヒサルヲヨク弁察スヘシ尤モ前ノ苦味強壯冷汗  
利ヲ棄ルヘナク或ハ又野葡萄根煎利鳶尾根汁又五九号  
法ニ製成シ一二錢ツ、毎朝酒ニテ服スヘシ

○熱病ヨリ水腫ニ交ヒ具執去ラス險症ニシテ精力耗脱スルモノハ機那  
ニ強壯健補利ヲ合シ用ヒ

○鼓脹ハ粘稠凝結ノ血アリテ諸藏尽ク虚衰シ空氣聚リ腹部緊  
シク脹滿セハ強壯健運シ空氣驅散利粘凝液ヲ分利通散スルニ

根 花萵苣根 牛尾 三七 金剛刺根 土伏苓 ワツカフラス  
ヲ飲利トシ程好ク用ユ発汗過度スレ勿シ其間ニ日汞丹ヲ与テ  
毒ヲ駆消スヘシ

微少ノ疥癬ハ養生ヲ慎守スルハ外傳ニテ用ルナク瘡ニ  
頑固險症ハ瘡カタシ外ヨリ硫黄水銀軟膏ヲ患処ヲ温メ毎  
日二度ツ塗り其間ニ石鹼糠若巴旦杏又ハ燕麦煎湯石灰水四  
八号ノ灰汁或ハ羊蹄根 土木香 濱ナテシヨ 玉球草ニ少ク此三  
号割ヲ文ヘ温洗シ内服菜ハ血ヲ清除シ瘡濁ヲ去ル利ヲ長ク  
大快復ニ至ルテ用ユヘシ

○浸淫惡屬毒瘡ハ内服菜水銀刮大効アリ第一日汞丹分量二重  
六毛硫黄製ノ鱗礬ヲ加ヘ用ユ然レモ青腿牙疳ノ毒血アルモノハ  
鱗礬製ノ鱗礬ヲ加ヘ用ユ然レモ青腿牙疳ノ毒血アルモノハ  
鱗礬製ノ鱗礬ヲ加ヘ用ユ然レモ青腿牙疳ノ毒血アルモノハ

○徽毒ノ疥癬浸淫瘡モ日汞丹ニ硫黄精ノ鱗礬ヲ加ヘ或ハ下劑  
ニ日汞丹ヲ加ヘ亦モ良シ其間ニ強ク発汗ノ燒酒浸刮ヲ瘡處  
ニ在テ用ユ

外用ハ水銀膏ヲ用テ快復ニ至ルヘシ毒烈惡性ヲ徽毒ノ症ヲ具  
ルモノハ徽毒篇ノ治療ヲ施スヘシ  
禁忌ハ寒冷氣 塩鹹香料辛辣塩藏肉過飽抓癢ヲ犯セハ病  
險惡ニ進ム

○疥癬浸淫瘡隱伏内攻ハ早ク瘡シ毒ヲ除キ尽サス或ハ虛弱ノ人ハ  
兎多ク外傳ノ水銀硫黄軟膏ヲ毒ニ用ヒ治スルハ凡テ險惡ノ死  
症ヲ峰起ス便チ水腫頭痛呼吸促迫心下苦悶怔忡発熱搐搦  
咳嗽喘急等



治法ハ温暖ニシテ汗劑。ホツクホウト等ノ飲劑酸製蝦石散  
茶四八号九二号日永丹或ハ硫黄花ヲ三分三厘ヲ加ヘ用ユ  
熱盛ハ焙硝ヲ以上ノ散茶ニ加フ凝血多ク血實ハ用法ニ因テ血  
中汚濁ヲ吸引シテ良効アリ

○壞血病ハ痿黃病ノ種類ニ体中血液見タ粘稠シテ殆ト凝塊スル  
ニ等リ運行快流セズ遂ニ腐壞シ一箇ノ酷厲毒ヲ起生ス此毒ヲ  
分ツニ熱壞毒寒壞毒塩鹹毒ノ三等ヲ分ツ其症疼痛患部  
青赤色ノ斑点或ハ惡屬ノ潰瘍齒牙齒斷浸蝕惡臭懈墮困  
重苦悶煩燥怔忡等ノ諸症ヲ兼ス

病原ハ熱壞塩血中ニ流滿ス此症大熱面部口中唇焮熱ス常ニ禁  
性ノ人或ハ熱國ニ赴キ新鮮清潔ノ食ヲ得サル等ニ多ク生ス  
寒壞血病ハ口中酸ク吞酸暖氣充汗シ口唇及物身灰白青  
色ヲ帯ヒ寒冷ス寒國ニ旅行渡海シ寒氣ヲ受ケ常ニ急墜  
シ運動セズ又ハ粗惡ノ飲食酸敗シテ酸辛ノ毒ヲ生ス

○塩壞血ノ症ハ常ニ口中鹹ク諸症輕キハ治シ易シ險症ヲ備ルハ唯  
治トス病原ハ塩鹹ノ食物ヲ過用シ徐々ニ血中尽ク滲浸シ口中  
及フ

治法ハ分利通散シ酷厉毒ヲ日解シ汚穢腐敗ノ物ヲ汗孔及尿  
ヨリ彙洩シ而清稀飲劑血ヲ清除シ疥癬浸淫瘡ニ稱用ス劑  
ヲ毎日常茶ニ代テ温服シ蒸発氣ヲ升散スヘシ

○服水ノ療法ト云フアリ涌泉或ハ清潔ノ淡水ヲ適宜ニ數日服ス  
諸般ノ壞血病ノ良薬トス何者ハ水ハ能ク粘稠液ヲ稀クシ酷厉  
毒ヲ甘解シ清涼和解ス尚洗滌シテ淨潔ニスルカ如シ  
○多血熱性壯實ハ刺絡鉄氣涌泉

○ 焚壞血病ノ酷烈毒ハ和鮮清涼劑粘凝ヲ清稀ニスル劑酸收ノ  
甘利諸ノ乳汁劑ヲ良トス或ハ精氣強烈ノ燒酒焊菜菜煎  
胡椒芥子等芳香強烈ヲ禁ホス

○ 寒壞血病ハ焊菜天芥菜白山ナテシコ嶺垂菜煎類或ハ葱  
蒜ヲ全キマニテ食ヒ或ハ割ミ又ハ砂糖ヲ加ヘ姜汁トシ日常  
蔬菜ノ食料トス

製造菜ハ燒酒浸ノカツラフス 地錦苗 焊菜精及苦味ノ諸  
飲劑酒水等ニテ製シ且菜ハ疥癬浸淫瘡ニ祿用スト同シ且  
間ニ和カニ下利セシムヘシ或ハ七号劑ニテ血中ノ粘凝汚物ヲ消除  
スヘシ大効アリ

○ 塩壞血病ハ服水法ヲ良トス或ハ精劑衣ノ石灰水ヲ多服シ以上ニ  
參ル劑ヲ選用シ鹽辛キ魚肉等ヲ禁ホスヘシ

口中齒斷浸蝕シ涎血腐壞スル症ハ内服外用並ニラツカ  
齒牙ニ塗リ或ハ食塩ヲ指擦シ或ハ没菜ヲ嚼ミ含ミ保子或ハ麟  
麟血拳參根肉豆蔻白荖蕃薇蜜等ニテ齒斷ヲ清潔ニシ或  
ハ紫蘇水没菜阿仙菜迷迭香ヲ赤酒ニ煮テ含漱劑トシ頻リ  
清除スヘシ

○ 斑點ハ内服菜煎ニ參ル汗劑或ハ十八号劑燒酒浸ノカツラフス  
七号劑及汗散菜等ニテ治シ唯キハ石灰水ニテ竜腦精白  
ペシロタートヲ合シ塗ルヘシ性素寒冷ハ溫暖乾燥スルニ生姜芥  
子桂皮益智丁子肉豆蔻胡椒焊菜ノ熱菜ヲ食料ニ交ユル  
良トス

○ 此病ニ黴毒合併スル症ヲ明矣スルハ肝要シ必ズ混雜ニ誤治ス  
ルヲ勿シ動モスルハ黴毒ニ壞血病ノ症ヲ見スモノシ故ニ診察示

ヲ誤レハ反テ險惡ニ進ム何者ハ水銀ノ攻劇ヲ行ヒ又ハ峻下利強  
ト死汗利危惡ノ症ヲ為ス若シ如此症ニ於テハ先ツ初ニ黴毒ヲ治  
シ後壞血病ヲ治スヘシ治法前ニ奉ク

○淋疾ハ黴毒ニヨク死スルモノヲ二般ニカツ善性惡性善性ナルモノハ精  
水ノ如ク尿管焮熱疼痛ナシ此ハ膀胱頸下卵形ノ腺寧丸精囊  
等ノ虛乏ニ因テ敗精留滯腐蝕シ又ハ房勞過度遺精惡性ノ  
淋疾ヲ患ル後遂ニ一箇ノ病ニ成ス

惡性ハ交接不潔ヨリ傳染シ不斷尿管中底焮熱劇痛シテ潰  
瘍ヲ生シ尿ニ帶黃液ノ膿血ヲ交ヘ龟头小潰瘍便毒頭皮焮  
腫熱痛陰囊ニ及ヒ勃起莖皮緊迫具余ノ諸症タタク兼弁ニ  
終リニ黴毒全身ニ滋蔓ス此最初ニ速ニ治療セサルニ因ル

善性ト云元久キハ經流ク浸淫スルハ黴毒傳染ノ症ヨリ反テ  
治シ難シ最初ハ患部衰弱スルニテナリ是ヲ以テ治法モ善惡凡ニ般  
ト知ルヘシ

治法ハ惡性黴毒ヲ指的一ニ導泄驅除スルニ即チ清稀清涼ノ大麥  
煎舍利別ノ甘緩劑ヲ加ヘ多服シ高強弱ヲ量リ下劑散葉或ハ六  
八号劑 五ノハカツシア、等ニ少々日采丹ヲ加用スルハ此症ニ稱譽スル  
第一ノ解毒劑ナリ又ハホツクホウト煎湯ニテ輕ク死汗ニ寒性久  
前ノ痲癬浸淫瘡及壞血病ニ稱スル燒酒浸或ハ九号一六号燒  
酒浸ノ白地榆瑞珀

熱性毒ヲ勃起焮痛通尿刺痛烈キハ日緩スルニ刺絡和解清涼散ニ  
日ヲ隔テ下利セシノ諸症退クニ用ユ終リニ至テ白キ薄膿少シク出  
ル毒退除スト知ヘシ和カノ用收劑ノガサニ類ヲ加ヘ良トス又平生ノ  
飲料ハ大麥煎燕麥類ニ舍利別ヲ加ヘ日クシ与フヘシ

○頑強瘡へ唯キハヲスシスセロハ散茶ニ鉛白霜ツツカリユマサキヲヒリテラブラニカルヂ  
ココレシ及乳香各ニ長阿仙茶一匁ヲ上ノ散茶ニ交ヘ用ユ又尿道緩  
解スル水銃法 大麦燕麥煎蕎麥蜜ヲ加ヘ灌射スヘシ終リニ流收強  
壯劑車前水石灰水ニサワカリ去サチテ丸五号劑ヲ溶化シ少ク龜  
腦精ヲ加ヘ用ユ

○便毒下疳陰囊潰瘍ハ惡性淋疾ノ治法ニ異ナリナシ然レモ龜頭皮  
腫起シ消散セサルハ温ナル燒酒ニ龜腦ヲ加ヘ頻ニ塗ルヘシモ瘡口ヲ  
除クヘシ然ラザレバ疼痛烈シ或ハ石灰水ニ龜腦管粉銀蜜陀ヲ加ヘ  
棉布ニ沾シ卷クヘシ若シ治効ナケレバカンフラ膏ニ水銀ヲ交ヘ塗リ温  
乳汁或ハ軟化緩解分利滲散ノ草茶ヲ煎シ温蒸シ又ハ其中ニ浸  
シ入ルヘシ

○龜頭潰爛ハ石灰水ニ日永丹或ハ白ペシヒソトトヲ加ヘ塗リテ清除シ  
後鷄卵油七二号劑ヲ等分ニ交ヒ貼スヘシ此劑ハ蝕肉水棉ノ如キヲ能  
ク防キ治ス或ハ水銀膏ニ篤耨油ヲ合シ用ユ

○便毒及囊腫ハ多ク淋疾ヲ誤治スヨリ癰故ニ汚滯ヲ通利スニ  
汞丹オウポウト煎劑類燒酒浸ノ帛珀白地榆十八号劑外用茶  
水銀軟膏ユムラネトテヤキロムニテ化熟ヲ催スヘシ

○囊腫ハ石灰水及龜腦精ヲ温メ卷キ表紙中心軟クテ取り乳汁  
泊夫ヲ塗リ交ヘ糊劑トシ貼シ後分利消散ノ膏ヲ搨用スヘシ

○徽毒ハ体中ノ血液腐敗シ酷烈ノ毒液トナレ此レ婦人ヨリ不潔ヲ受ケ血  
中ニ浸染シ漸次ニ蔓延シ血液粘凝腫起疼痛面部支節ニ侵襲シ夜ニ  
至テ増劇僂重焮熱諸部疹斑癬癩類ノ小瘡赤痒惡厲潰瘍軟肉  
薄肉ノ部及第一陰所口顎内咽喉鼻中ニ発見ス又一段発起スル時ハ再  
ニ快復ス然レモ患者ノ質ニ因テ病状異ナリトイヘ他病ニ混同スヘカラス

凡微候ヲ備フ若シ誤治シ毒ヲ内攻スレ浸淫弥蔓支節骨肉ヲ腐  
蝕ス

○區別スルニ淺症惡症ノ二般ニカクシ淺症ハ毒未ク血中ニ隱伏セズ懈墮  
困重劇キ頭痛支節疼痛面部灰白ニシテ青色ノ点アリ逆上シテ  
焮熱ス

○惡症ハ咽喉懸壅口顎鼻中陰莖ニ留結シ浸襲スル鼻隔頸骨  
腐蝕瘤塊ヲ生シ惡疔潰瘍等是ヲ瘡カクシ險症ト知ヘシ

○淺症治法ハ血中ノ毒ヲ驅除スルニ和カク方法ヲ施シ吐涎法ノ如キ劇  
劑ハ用ルレ勿レ分利通散シ血液ヲ清除シ汚濁ヲ去ルル劑ヲ多服

○其間ニ時々水銀劑ニテ下利セシメ又ハ七号六号燒酒浸地榆  
加ヘ温服シ臥蓐ニ在テ汗スヘシ合用也

○險症劇烈深ク根底ノ治法ハ容易ナラス許多ク法方ヲ十分施  
サレハ快復得難シ水銀劑ヲ強弱ニ隨テ丈夫ニ用ユヘシ吐涎法

○リ然レ諸症劇盛必ス吐涎ノ症ヲ察セハ行フヘシ此内服外用ニ  
途アリ又内外共ニ用ルヘシ又強和アリ症ニ隨テ多ク少ク別スヘシ

○在モ以前ヨリ和カク水銀下劑ヲ用ヒ而草木草根ノ飲劑ハ強弱  
ニ隨テ多服シ凝血ヲ稀流スルニ水銀劑大効アリ

○吐涎法他病ニ奇驗アルハ頑固沈滯癰腫ニ病ヲ治ス聲言ハ眼目  
内外障暗黒星白星或不治ノ惡瘡浸淫癩癬腺腫等ニ大効  
アリ

○婦人白帶下ハ淋疾ニ同シ尤モ二般ニカク善性ハ膿稀ク或ハ粘シク惡液ニ非  
ス惡性ハ膿色黄緑惡臭浸蝕スヘキ毒汁陰所腐蝕徽毒ノ症ヲ具シ月  
経ノ來ル時ニ止メス善性ハ泄セズ

○治法ハ性素多血刺絡シ惡液ヲ導泄ス留飲タラズ寒性質白色ハ害

アリ右ノ両症ハハルサモ類香烈子宮強壯藥劑酒ニ製成シ或ハ此類ノ代リニペーセルノハルサモ丸ヲ多服シ而後粘血ヲ分利シ衰弱不順ノ部ヲ強健ニスルニ剛毅劑ノ五十号 五十一号 八十二号 尚他ノ強壯劑ヲ加ヘ用ユ

○外用法ハ神經強壯劑收瀦スル子宮劑ヲ腰湯トスヘシ又惡症頑固ハ水ニ赤酒ヲ交ヘ陰中ニ灌射スヘシ且茶草効アズモノハ迷迭香アズグリーテ、 苦意、 藿香、 蘭菊、 ボシ井、 大麥、 黍、 冬、 蒼休根等ニ白器又ハ石灰水ヲ加ヘ施スヘシ或ハ陰中瘡アリ者ハ割傷水ヲ施スヘシ

此ノ藥劑ハ神經強壯劑收瀦スル子宮劑ヲ腰湯トスヘシ又惡症頑固ハ水ニ赤酒ヲ交ヘ陰中ニ灌射スヘシ且茶草効アズモノハ迷迭香アズグリーテ、 苦意、 藿香、 蘭菊、 ボシ井、 大麥、 黍、 冬、 蒼休根等ニ白器又ハ石灰水ヲ加ヘ施スヘシ或ハ陰中瘡アリ者ハ割傷水ヲ施スヘシ

壅閉病第十二

惣論

蓋一身中真有之血液脉絡諸管諸竅諸藏經閉痔血精神胆汁  
精水唾涎乳汁風氣大小便死胎胞衣汗等力流利快行常例違背  
之并忍之壅塞凝結之諸般ノ疾病ヲ生之起原ヲ數ルニ脉管狹  
窄或ハ虛衰緊迫スル質物脉管裏ハカニ粘着ス或ハ實日ニ因テハ  
鼻閉咳嗽氣息短急喘息拘急欬熱腫脹咽喉懸壅腺腫尿管  
ニ水棉腫息肉鼻痔陰門肛門ニ生ス

○虛衰ハ津液ノ缺損ニ因リ便チ脱血下利饑渴勞瘵神經痿縮精神  
缺乏ニ因テハ眩暈昏睡病卒中痲不遂極老精力衰瘵

○尿管閉ハ腺腫瘰癧頷塊腫膽管凝石耳孔疔聾豆粒砂石類ノ  
滲入尿管淋石凝血鼻痔果實誤入气管食道魚鯁刺核仁又ハ

尿管心藏大管脉ニ突入り生ス畢丸直腸ニ惡液壅結便秘凝血婦人  
ハ乳房ニ瘀血凝滯シ胎兒胞衣度ニ越テ大ナルモノ等

○脱臼創傷ヲ卷縛シ腫脹焮痛寔脱疽墜腫或ハ血脉外ニ溢出シ腦胸  
ニ支滿シ卒中肺痿神志昏重喘息眩暈卒倒

○又合着自然病ハ小兒肛門尿道陰門眼胞鼻竅○外症ニ閉ル者ハ瘡瘡  
火傷子宮陰莖難產ノ後誤治合着○元氣虛衰ヨリ諸ノ閉塞ヲ発

スル病多シ或麻沸藥ニ因テ運行ヲ廢止スル并昏睡病ヲ発スルヲ以テ  
考又ニ或炭火煙氣ニ冒觸シ密室ニ居住スル等皆然リ

治法

其壅閉ノ病原ヲ求メテ再ニ通利運行セシメ脉管虛乏ハ盈脹充實セ  
シメ押壓ハ弛緩シ合着ハ開切ス

○呼吸促迫粘稠液ノ喘急肺藏壅塞ハ痰飲ヲ唾出スヘシ胸肺軟劑ヲ微

温ニシ多服シ或ハ燒酒浸ノ土木香 地榆 烏珀 四一号 茴香合製  
ノ硝砂精 硫黄製ノバルサモヲ以上ノ飲劑ニテ服スヘシ或ハ七二号七  
四号劑 蝦石 鯨精 冰糖及茴香油ヲ加フハ尤モ効驗アルカ利劑  
シ或ハゴムアムモヤシ丸劑飲劑ニ牛膝水野麩水淳酒ニ溶化シ服  
スヘシ

喘息ニ称答スル煉茶ノ方

ゴムアムモヤシ 一匁五分 牛膝草露水 此ニ更ニ上好酒十匁 右合ス  
入時々下劑吐劑刺絡ホニテ子術 本書 打泡茶ヲ足肺ニ貼シ病毒ヲ  
下降シ脚湯運動涌泉七七号劑 澤花ノ末内服スヘシ

喘息多血空氣奔脹ハ刺絡第一ノ良術トス兼用スルニ胸肺飲劑空  
氣ヨリ空スル其病肺胃腸膈膜衝攻膨滿ニテ呼吸短促ス空氣分  
利劑ヲ用ユ七六号 七七号 七十号劑 茴香 防風 橙皮 水燒酒

浸ノ橙皮 硝砂精 橙ノ純黄皮末五分 温酒硝砂糖ヲ加ヘ或ハ麥酒  
ニ入シ露水ヲ取り服スヘシ 最モ能ク風氣聚結ヲ驅逐シ内藏ヲ  
健壮ニス終リニ驅風劑ノ水鏡法便秘ニ良カアリ

痰喘息氣管拘急驚痲鎮止劑和解清鎮劑脚湯打泡法是著  
ニテ救治スヘシ

肺藏頑硬ヨリ喘急疼痛急嗽絞迫肺重キ物ヲ容ルカ加シ覺  
エ治法ハ分利劑粘凝稀クスル劑及日永丹ヲ胸肺飲ニテ服シ刺絡  
スヘシ此症ニ黃疸ヲ完セハ十一篇ニ詳説スル治法ニ從フヘシ

大便秘結シ或ハ放屁スルモノハ精力諸腸ノ衰弱ナリ 強壯劑肝要  
トス即上好ノ苦酒茶精露水燒酒浸等ニテ聚結ノ空氣ヲ驅散ス  
ヘシ即チ硝砂精 七七号劑 或ハ水鏡法又ハ苦味ノ下劑塩梅膏旋  
那葉 蜜劑 砂糖劑ヲ服スヘシ



○大便腸内ニ壅塞スルモノハ滑利潤通ノ食物即チ煮タル李子櫻子大  
來禽乾蒲桃コッコロニ乳汁ヲ和シ服シ或ハ水鏡法下利塩

○腸痛病腸風病腹中壅閉ヨリ発スルモノハ是ノ頑固ニ劇ク嘔吐惡心  
疼痛便秘焮腫痔破腫鼠鼯破腫ヲ生ス

○便秘ハ軟化潤利ノ下劑乳汁劑ト石鹼ノ水鏡法

○焮腫ヨリ発スルハ大熱燒シカ如シ清稀飲劑熱病焮腫篇ノ劑驚  
痢鎮止劑外用茶ハ綿布ニ竜腦精ヲ浸シ或ハ鴨菊ニ乳汁ヲ浸シ  
布貼シ多血刺絡肝要トス

○腸破腫ハ軟化スル軟膏糊茶温乳汁ヲ温和布貼シ或ハ水鏡法トス

○焮熱尿閉病因夥多一ナラス故ニ患者ニ能ク質問シ鑿察スニ意ヲ用ヒ  
病原ヲ明シテ茶劑ヲ處シ證候ヲ格知スヘシ病因ヲ從跡スルニ尿酷烈  
痛焮腫腫瘍硬結頑固腺腫痔瘻痔瘻尿管腫起瘻肉突出シ尿惡

臭アリ或ハ衰弱シ多血徑閉痔瘻尿管腫起瘻肉突出シ尿惡  
鑿法ハ腎藏焮腫ヨリ発スル症ハ壯熱燒カ如ク疼痛ス淋石患部疼痛ト

奇久嘔吐ヲ発ス膀胱淋石ハ尿管ヨリ莖頭ニ至ル迄尺ノ疼痛ヲ覺ヘ小  
便灰白色粘稠濃汁ヲ帶ビ指ヲ以テ直腸ヨリ搜シハ太抵具石抵觸スル或

ハ導水管ヲ以テ膀胱ヲ試スルニ石ヲ撞リカ如シ淋石ハ尿管ニ在ルヲ以テ明  
白シ○膀胱頸ノ焮腫患部會陰疼痛腫起シ直腸内ヨリ指ヲ以テ試ス

ルニ焮熱刺痛シ導水管ニテ刺セハ会テ痛ニ入腸内空迫大便ヲ催セハ  
悸動怔忡四肢寒冷嘔吐脉熱病如シ○性素多血尿管ニ水綿塊

腫ヲ生スルハ血ノ攻衝シ或ハ壞血病ハ塩及石灰質ヲ醸生ス  
治法先ヨリ最初ニ小便驅出劑前ノ十篇ヲ摺用シ又薊類根ノ煎劑ニ

警痢鎮止劑 六カ三厘 蝦石 一八五厘 或ハ硝石類

膀胱ノ淋石稍大ナルモノハ驅出劑ヲ用テ劇盛險惡ヲ頭ニ動カサルモノハ切斷法ヲ行スルニ然レバ至弱老年ハ施シ難シ日後和解ノ藥劑ニテ痛ヲ堪ヘ忍バシムヘシ或ハ導尿管ニテ石ヲ後口ニ撞キ戻シ其時ヲ忍バシノ驚痛鎮止劑及緩解滑利スル油脂ノ類ヲ内服シ水銃法蒸浴湯十篇見ユ劇痛ノ日緩スル劑ヲ灌射スヘシ即チ胆八油亞麻油 罌粟油 日巴旦香油ヲ亞麻仁冬葵根煎劑乳汁牛酪ヲ加ヘ煮用ス

劇腫ヨリ発スル症ハ清涼和解劑ヲ換用シ尚仏手柑汁醋竜腦ヲ併加ヘ此ト共ニ粘稠ヲ淡稀ニスル劑ヲ兼用スヘシ或ハ蘭新ニリスゲスル藥劑類連錢草 地苺葉 金燈籠ノ煎劑露水紋汁製シ酸製蝦石四號 焰硝 莖之菜仁ヲ加ヘ用ユルハ西便共ニ通利ス或ハ同通分利劑ヲ肝藥トスルニ九二号 九二号百十五号

結核ニ月經痛血尿等ニテカニシテハ...

婦人ハ時々和カノ下劑即ペルセルノバルサモ丸等

尿管ニ水棉ノ如キ腫起ハ刺絡シ後導尿管ヲ以テ同潤スヘシ

膀胱疝ヨリ発スル症ハ鎮清劑驚痛鎮止劑ニ通尿ノ露水飲劑ニテ服シ前ニ拳ハ油劑乳汁等ト治法同シ若シ退キ難キハ阿片合製

ノ鎮痛劑或ハ壞血病毒ニ良効アリ下劑発汗劑ニテ病毒ヲ分利驅散スヘシ即チ酸收和解惡液ノ消化スル土質劑軟化飲劑

膀胱癰ハ老人ニ多シ輕易疼痛ナキハ腹部會陰ヲ手摩シ神經健壯劑風化滲透劑ノ水銃藥劑蒸氣蒸氣ハ葱根内服藥ハ癰病ニ効アル健

運劑或ハ上好ノ古酒ヲ用ヒテ快通セシハ導尿管ニテ吸引セシムル膀胱緊脹虛衰セス尔後ニ至テ平常ノ如クナラスニハ日ニ二三度モ行ヒ

膀胱ノ淋石稍大丸モハ驅出劑ヲ用テ劇盛險患ヲ頭ニ動カサルモハ切斷法ヲ行スル然レモ凡ク弱老年ハ施シ難シ日後和解ノ藥劑ニテ痛ヲ堪ヘ忍バシムヘシ或ハ導尿管ニテ石ヲ後口ニ撞キ戻シ其時ヲ忍バシノ驚痛鎮止劑及緩解滑利スル油脂ノ類ヲ内服シ水鏡法蒸浴湯十篇見ユ劇痛ノ日緩ル劑ヲ灌射スル即チ胆八油亞麻油 罌粟油 日巴旦香油ヲ亞麻仁冬葵根ノ煎劑乳汁牛酪ヲ加ヘ煮用ス

劇腫ヨリ発スル症ハ清涼和解劑ヲ換用シ尚仏子相汁醋竜腦ヲ併加ヘ此ト共ニ粘稠ヲ淡稀ニスル劑ヲ兼用スル或ハ蘭新ニリスゲスル藥劑類ヲ連

外用 煎蒸茶ハ温乳汁温或ハ軟化分利糊茶或ハ蒸浴湯多血刺絡殊ニ月經痔血閉ヨリ唯症ヲスル尚老人ニ多シ九篇ニ詳説ス 婦人ハ時々和カノ下劑即ペレシノバサモ丸等

尿管ニ水棉ノ如キ腫起ハ刺絡シ後導尿管ヲ以テ同潤スル

膀胱症ヨリ発スル症ハ鎮清劑驚痛鎮止劑ニ通尿ノ露水飲劑ニテ服シ前ニ拳ハ油劑乳汁等ト治法同シ若シ退キ難キハ阿片合製ノ鎮痛劑或ハ壞血病毒ニ良効見ル下劑発汗劑ニテ病毒ヲ分利驅散スル即チ酸收和鮮惡液ノ消化スル土質劑軟化飲劑

膀胱癱老人ニ多シ輕易疼痛ナキハ腹部會陰ヲ手摩シ神經健壯劑風化滲透劑水鏡茶煎蒸茶ハ葱根内服茶ハ癱病ニ効アル健運劑或ハ上好ノ古酒ヲ用ヒテ快通セシハ導尿管ニテ吸引セシレ膀胱緊脹虚衰セス尔後ニ至テ平常ノ如クナラスニハ日ニ二三度モ行ヒ

内飲外用十分ニ施セバ徐々ニ通利ノ精カヲ得テ全愈ス

○尿ニ凝血アリテ原因ト為ル症ハ温メテ分利驅出スヘシ即チ連錢艸

素吾 ケルル 野麴草 百十五号 四九号 七一号 酸製蝦石

鯨精 焰硝 丹砂等ヲ蘭芹ノ露水或ハ前ノ煎劑ニテ服シ而後陰

所會陰ヲ葱根ト麥粉牛乳酪乳汁洎夫藍等ヲ温熨スシ或ハ糊茶

トシ或ハ百合根 冬葵草 白蜀葵 鴨菊 草零陵菜花等ハ最

能ク瘥享ヲ軟化日解ス或ハ水鏡トスヘシ導水管モ用ユ

○膀胱潰瘍ハ尿ニ膿汨ノ如キヲ泄シ惡臭疼痛此ヨリ淋石ニ変スル

アリ老人小兒經久腐敗スルモノハ難治トス此症ハ前ニ舉ル收鎮和解毒

液ヲ消化スル油ノ如キ粘潤滑劑バシ類 四二号劑 水銀劑此ハ微

毒兼殺シ良トス或温泉浴湯寒尿ノ類ニ治驗アリ或ハ温酒飲劑

ヲ水鏡法ニ用ユ 竜牙菜 胭脂草 車前葉 石竜胆草 薑椒

蜜 乳汁 白蜀葵 舍利別 牛酪 胭脂草油等ヲ摺用スヘシ尤モ

○本病ヲ治スルハ肝要トス 妊婦終月ノ頃動モスハ此症ヲ免ス驅出劑用ルカ墮胎ノ恐レアリ此

ハ子宮盈脹スルヲ以テ膀胱ヲ縮迫ス手麻子循導術ヲ用ユ或ハ導水

管ヲ施スヘシ尤モ能ク臨産持久シ唯産尿因膀胱緊脹等ハ第一ノ

良法切實胎産ヲ催生ス

○膀胱頸下腺腫脹頑硬結腫通尿ヲ壅遏セバ意ヲ用テ内服外用

ノ尿劑ヲ施シテ良驗ヲ得サルモノハ吾外科書ニ因テ手術ヲ施スニ

○老人尿因疼痛ハ容易ニ治スルナシ軟化劑快爽亮揚劑心藏強

壯劑百十五号 四九号ニ焰硝精 薑々果仁乳汁 ケルル 蘭芹

地莓 肉桂水 酒桃仁 乳汁等ヲ酒ニ製シ數々服スヘシ

○外用菜菔葱 ケルル 全蝎 杜松 扁柏油ニテ患部ヲ健運スヘシ

○粘稠液壅閉ヨリ諸般ノ疾病ヲ生スルハ即チ腺腫頷塊腫呼吸息迫喘急  
心肺ノ粘液腫ハ分利ノ療法ヲ施スヘシ前条ホノ惡液壞液痿黃病ニ称スル  
劑ハ則其病ノ類ハ沈固頑強ノ頭痛眼目内外障ノ諸症癩癩癰疽病  
寒壞液徽毒傳染病浸淫瘡諸熱病惡厲經年ノ潰瘍腐骨疽  
惡性白帶下等シ

○瘰癧瘰癧類ハ他ニ異ナル一箇ノ身体ニ自然ニ化生ス故ニ直ニ療術從  
ヒ難シ尚復治スルナシ凡テ此類浸蝕劇痛瘡邊次第ニ蚕蝕ス然  
ラサレハ頑惡ノ膨腫ヲ免ス

○鑿法此レヲ抑シテ移揺シ痛ナキハ腺硬腫ハ速ニ分利消散セサ  
レハ潰瘍ニ至ル初ノ急リ治セヌ頑硬ナルヲ堅塊腫ト名シ婦人乳  
房ニ生シ漸々ニ裏ハ浸蝕疼痛スルヲ乳癌トス是ヲ治シ難シ全成ハ  
治スルヲ稀シシ必スキチヲ出スルヲ勿シ

○塊結ノ腺腫頷ニ至スルコト小兒ハ飲食ヲ繼ニニスルヨリ生ス惡液ヲ清除  
シ運動スヘシ容易ニ消散セサレハ大ニ至脹膨滿シ裏ハ蘊蓄シ惡液  
聚リ驚畏スヘキ膨大ノ塊腫トナリ遂ニ惡症ヲ生起ス

○醫師心得ヘキコトアリ外傳禁而巳ニテ愈セハ遂ニ再発シ險惡ニ變ス  
故ニ内服薬ニテ善良ノ液ニ為スヘシ

治法

軟化溶解分利消散ノ劑ヲ肝胃トス或ハホツクホツト一日草 迷迭香ヲ浸劑  
トスヘシ此劑ハ處々月経未タ来ラサルヲヨク催進スルニ効アリ或ハ百十六号六  
一号燒酒浸ノ帛珀ヲ共ニ服シ惡液ヲ良液ニ復スヘシ或ハ日汞丹ニ丹砂等分  
ニ交ヘ或ハ七号劑ニ日汞丹ヲ加ヘ強クシ用ユ此劑新発ナルモノ殊ニ小兒発  
スルモノ尤モ良トス或ハ蜈蚣ノ末ト日汞丹等分ニ合シ用ユハ外部内藏ノ  
腺腫硬結腫ニ是ヲ効アリ又三四日ヲ隔テ、下劑ニ日汞丹ヲ加ヘ利スヘシ

或ハ半夏ノ末ニ日永丹ヲ加ヘ或ハ  
用ニサレハ全効ナシ

外傳治法ハ初テ三分利消散スルニ綿布ニ燒酒竜腦精泊夫藍ヲ加ヘ  
温尉火スヘシ或ハ此類ノ膏草或ハ芳香透列ノ茅草花葉或ハ温灰温  
塩ヲ布ニ包ミ熨貼シ又稱譽スルニ海ノ砂ヲ用ユ今時ハヨ苧常ノ砂ニ塩  
ヲ入ヘ或ハ温醋ニ塩ヲ加ヘテ薰蒸融透シ或ハ七一号及硫黄製バルサモ  
蒸滴石鹼油石腦油又徽毒兼灸ハ水銀膏良効アリ若シ諸劑ヲ尽シ  
テ寸効ナキハ切斷法ヲ行フヘシ

内治法ハ疼痛烈シク漸次ニ脉絡腫起スルモノハ伏留瘰癧ニ変ス勉テ痛  
ヲ軟和緩解スヘシ然レモ尽クハ消セス婦人乳瘰ニ常ニ觸レ動スヘク静伏  
經久保持セシムルハ撫和順從ノ法ニ尚幸ニ良切アルニサレヨツテ疼痛  
緩解スルヘシ

敬馬痛鎮止劑

阿片鎮痛劑

神經強壯劑類

最初ニ用ユルヘク然レモ

尔後ニ至ラハ三厘三毛ヲ十号劑加ヘテ強クシ或ハ罌粟乳汁燒酒浸ノ  
泊夫藍ヲ二平滴具余モ用ユ或ハ阿片ヲ驚痛劑ニ入ヘ或ハ七六号劑ヲ用  
ユ此ハ前ノ諸劑良効アラヌ或ハ常ニ茶ニ馴レ効ナキモノニ用ユ又ハ此劑他  
ノ劑ト互ニ更々用ヒテ疼痛緩弱減消スヘシ其間ニ下劑ノ梅景草ノ浸劑  
ニ日永丹ヲ加ヘ兼用シ或ハ性素多血常ニ通泄ノ血壅閉スル等強弱ヲ量  
リテ刺絡スヘシ

外用法ホク潰伏留塊腫瘰癧瘡疼痛スルニ鉛ノ小匾ヲ造リ此ニ水銀ヲ  
塗テ附貼スヘシ凡テ此病ノ良劑ハ鉛製鉛丹丹砂ヲ加フル硬膏軟  
膏ヲ用ユ

開破潰爛ノ瘰癧ニ異常ノ劇痛惡臭ヲ發セハ綿撒糸ニ薑蒜香ヲ  
燒酒ニ浸シ不斷ニ布貼シ或ハ新鮮烟叶 蔓陀羅花生汁 蒼色



漏泄病第十三

總論

壅閉病ノ反對ニ諸ノ血液脱泄スルハ精力大ニ虚損シ諸般疾病ヲ発シ  
治セサレハ終ニ死亡ス○頭部ニ属スルモノハ淚眼寒冒鼻涕唾涎○胸部ニ  
属スル咳嗽痰飲呼吸促迫声音嘶哑咽喉洪迫○腹部ハ下利赤白痢  
疾清穀下利乳糜下利或ハ胃泄病下利嘔吐肝崩肉ノ如キ泄血スルヲ云  
○陰所ハ小便過多失禁漏精淋疾白帶下外表ハ発汗壞血病様ノ潰  
瘍等ヲ云

病因

凡テ諸液過多ニ汚濁清潔ナラサレハ酷烈毒ヲ生シ惡液ニ変シ終ニ運  
行ヲ妨ケ水ノ如ク膽汁ヲ交ル泄泻赤痢嘔吐等ノ如キ前ニ云諸病ヲ発ス  
ル原因ハ皆漏泄知セサル蒸発氣ヲ過閉スル胃寒傷冷飲酒過度ニ因テ発

諸液虚ニ元運精力衰弱スルヨリ発スルハ淚眼諸ノ下利多外遺尿  
遺精善性ノ淋疾漏精白帶下或ハ大便自利冷汗多汗漏脱勞瘵肺  
痿ニ発スルハ死症

酷厉液胆汁壞液ヨリ発スルモノハ惡心嘔吐下利赤痢胃泄病  
水ノ如キ清稀液ヨリ発スルモノハ以上ノ諸症ヲ発シ此レニ加フルニ咳嗽  
咽喉洪迫嘶哑感冒鼻涕壞血病毒ノ潰瘍

微毒ノ惡液ヨリ発スルモノハ惡性淋疾白帶下楊梅瘡漏瘡腐骨疽  
骨漏瘡等

諸液元運過止スルヨリ発スルモノハ驚悸忿怒諸般ノ泄血不時ニ兩便ヲ  
泄シ孕婦崩漏流產等

治法惣論

諸脉絡運行減損ヨリ発スル病ハ強壯健補芟劑○酷烈胆汁病ハ驅除掃



泄。諸液過多病ハ吐下ノ劑。下利泄瀉亦劑數ニ効リ。或ハ汗利尿劑。精神ノ過止ヨリ発スモノハ穩靜ニテシテ神經ヲ健壯スル劑鎮痛劑ニ補助ス。

○感冒鼻涕ノ輕症ハ自然ニ復ス劇症ハ初ニ下劑ヲ用テ泄除シ後汗劑ヲ用テ外用薰嗅スルニ芳香風化滲透ノ藥品。竜腦 迷迭香 山椒 露精塩草油茶ヲ鼻孔ニ塗ルヘシ然レバ嗅劑而已ニテ止ル害アリテ諸ノ惡症ヲ免ス。

○淚眼ハ淚腺ノ虛衰ヨリ発ス復治シ難シ初ニ強壯健運劑ヲ外用スヘシ即チ燒酒ニ茴香水ヲ加ヘ内服セシハハルヲ劑。燒酒浸琥珀六一号ニテ惡液ヲ消化シ導キ消散スヘシ陰症ハ斑猫膏打膿法ニテ外泄セシムヘシ此症老人ニ多シ。

○喉嚨過多咽喉腫起ハ大便ヨリ導泄スヘシ喉管虛衰ハ強壯劑後汗劑ニ向テ少シヲ交ヘ滋瀟強壯ノ含漱草ヲ用ユ。

○咳嗽痰飲声音嘶啞咽喉澁迫ハ初ニ通利ノ飲劑後汗劑胸肺和劑劑諸血因ヨリ発セハ刺絡脚湯熱性ハ涌泉乳汁飲劑或ハ接骨木花鴨菊花ヲ煮合漱草トシ或ハ漏斗ヲ以テ蒸氣ヲ吸引スヘシ咳ヲ兼ハ麦酒ニ鶏卵黄砂糖ヲ加ヘ或ハ鶏卵ノ乳汁ニ泊美藍砂糖ヲ加テ蛇虫ヲ兼ハ殺虫劑ヲ用ユ。

○痰飲醋屬是ヲ粘着スルモノハ滑潤ノ劑功アリ即チ大麥粉汁ニ冰糖日草桃膠ヲ加ヘ錠トシ含ムヘシ或ハ日巴旦香油ニ罌粟壳利別莖ニ菜舍利別ヲ合シ或ハ胸肺藥劑ト九号劑ヲ用ユ。

○咳嗽劇盛ハ阿片合劑表ノ鎮止劑蘇合香丸白罌粟仁ノ乳汁舍利別ヲ加ヘ日ク用ユ。

○咳嗽ニ粘痰ヲ吐シ呼吸短促スルモノハ甘和分利劑 清稀淡潤劑 胸胸

分利劑 鯨精 コツリ 蝦石 砂糖 茴香油 六十号ヲ散或ハ錠トシ或  
四号劑 燒酒浸ノ土木香 白地榆 硝砂精 鼠尾艸 舍利別等又  
時々肺ニアル過多ノ痰飲ヲ下利スヘシ

○ 經閉ニ因テ血胸肺ニ衝逆シ咳嗽ヲ為ス症ハ第九篇ニ答ル法方ヲ用テ  
脚湯刺絡スヘシ

○ 泄瀉ハ酷烈惡液其他害アル諸液過度腸中ニ妨害スルモノヲ自然ニ除キ去  
ニカ為ニスルガ故ニ是ヲ益アリ 精力飲食減損セス是ヲ以テ其症ヲ安セス  
ニ收因スルヲ勿シ唯飲食ニ意ヲ用ニ減少シ 濕ルハ清稀飲料大麥 コツリ  
稀キ肉羹汁或ハ和カノ大黃燒酒浸涌泉ヲ温服シ而後胃ヲ強壯ニスル劑  
ヲ与フヘシ昂チ

青葉霍香 楳榔 山桂等露露水ニ酒ヲ加ヘ或ハ底野加 九号ノ汗  
劑ヲ用フヘシ加ヘ或ハ燒酒浸ノ肉豆蔻 阿仙菜 他ノ果症ニ隨テ吐劑ヲ

塗リテ諸般ノ劇キ疼痛ヲ治ス凡チ芳香草木油ヲ良トス

○ 嘔吐ハ自然ノ良能ヲ胃ニ妨害アル液ヲ涌泄シ除カント為ス故ニ閉止劑ヲ  
ニ用ルルヲ勿シ唯微温湯ヲ多ク与ヘ或ハ清稀煮汁ニテ扶ケ催涌スヘシ或他  
ノ兼症ヲ考ヘ和カノ吐劑ヲ用テ治スルヲ古ヨリ為ス所ノ法ニシ而後胃ヲ  
強壯ニスル内飲外用草木前條ト同シ或ハ強キ吐下ノ劑ニテ劇キ吐瀉ヲ治  
スル療法アリ

○ 胃泄病ニ般アリ吐下劇ク患ルルト至死病因ハ一ニ速ニ閉塞劑ヲ用ルル  
勿シ温湯清稀ノ肉煮汁燕麥汁ヲ用テ酷厲胆汁ノ如キ惡液ヲ緩解導泄  
スヘシ吐下止後内飲外用ノ胃ヲ健壯ニスル劑ハ前條ト同シ

○ 泄瀉乳糜下利ハ飲食克化セス直チ下利ス此腸胃甚ク虛弱ヲ運動  
升灸ノ精氣衰萎機力ヲ失フニ因ル初ニ和カノ大黃劑ニテ通泄清除

レ後健胃強壯ノ散茶葉酒露水 肉桂 橙皮 七六号劑 燒酒浸八  
十号 良姜等ヲ消化ノ精力ヲ補フニシ

○ 乳糜運化セスレテ泄利ノ症、乳糜液道ノ閉塞ヨリ起ル前、諸劑効  
アリ用テ鹽劑ヲ兼用スヘシ

○ 赤白痢病因ハ八九月頃ニ患フ、昼ニ炎熱夜ハ冷涼天氣定ラス炎暑ヲ受  
ルノ後裸体ニシテ冷氣ヲ引キ果瓜漬瀧ノ麦酒等ハ泄利ヲ甚ニスル迄キ病  
原ナリト知レシ甘キニ從テ多食シ或ハ酸收ノ酒等ヨリ及テ此病是レ醋屬  
ニ変スレハ腸ヲ浸蝕シ腹痛腐爛ス故ニ治法和解日緩導泄スヘシ 其法左  
如シ

○ 漿ヲ兼ヌルニ和カニ通泄スニ大黃ニ少ク煇硝ヲ加ヘ或ハ大黃ヲ燒酒浸  
トシ合劑別トシ用テ惡液ヲ下泄シ能ク腸ヲ強壯シ疼痛緩解ス或ハ  
煎劑ニ液那葉 梅膏ヲ加ヘ良トス

○ 初ニ九ニ患心煩腦胸膈苦悶ハ速ニ吐劑ノイヘカコアンナヲ用テハ諸症大ニ  
緩解スレハ年行ニ隨テ分量ニ意ヲ用テ吐劑往キ治驗ヲ奏スルノ多  
シ初ニ九ニシナラス始終用テ精力耗脱ニ非レハ胃ニ害アラフ、壯年ハ五分  
ヲ用テ此ニ由テ綠色ノ惡液ヲ吐下シ不日ニ全快ス尚多ク温湯ヲ与ヘ  
吐下劑ヲ用テニ四時過テ醋屬液壯熱ヲ緩和スレハ清涼和解散茶類  
ニ透明水晶煇硝少シヲ加ヘ用テ三時許肉桂 霍香水 コロリニ投シ  
服ス若シ壯熱ヲ及セハ桃膠ヲ加ヘ用テ疼痛鎮止下利減消ス  
○ 赤痢腸中劇痛切カキ日和解利油劑ニ砂糖ヲ加ヘ用テハ能ク腸  
中ノ醋屬惡液ヲ制伏スル故ニ尋常ノ症モ此劑ニテ治ス尚前劑ノ代リ  
ニ手榴州 冬萎根 蜀葵根 鱉膠 無麻仁 檀植等ハ粘滑質  
ナリ右一莖ヲ細末トシ水六十四莖ヲ文和煎シ濾過シ暫ク置ク片ハ清亮  
ノ肉汁ノ加ク凝結スルヲ服スレハ劇痛速ニ消シ能ク腸ヲ和ラケ泄瀉ヲ止ム

前ノ散茶聖粟浸劑ヲ夜ニ於テ用ユ能ク疼痛ヲ鎮止シ下利ヲ止ム  
下利窘迫腸搔痒裏急後重 亞麻仁煎及油ヲ乳汁ト底野加或胆  
油ヲ又ハ水銃利トシ數度行フヘシ大効アリ或ハ外用製茶ニテ腹部ヲ  
温濕スヘシ

○常ノ飲料ヲ服スルコトハ大ニ害アリ宜ク大麦燕麦仙牛相討鹿角  
精ヲ加ヘ或ハ乳汁ニテ鯨膠ヲ煮涌泉ヲ微温ニシ用ユ若シ吐氣ナケシ  
ハ少ク乳汁ヲ加フ最初ハ能ク酷厲惡液ヲ緩解シ清除洗條スヘシ  
後續テ服スルハ益々快愈ヲ覺ユ○特牛肉 鷄卵羹汁 志村人參  
ヲ加ヘ煮テ服ス甚シ良シ○調護法ハ臥室ヲ温暖ニシ溷蓋ヲ備ヘ  
置キ外未ダ寒冷氣ヲ防カレハ速ニ險惡ニ進ム

○此病ヲ審ニ考ルニ皆驅出劑ヲ以テ泄除スヘカラス強壯收瀉劑良ナルアリ  
リ近世採用スル支麻兒披皮ニ裁ニ水二百錢ヲ以テ煎シ六十錢ニ至リ  
三度ニ服スルハ泄利止ム若シ止ムスハ又用ユ此劑散トシ用レハ胃ニ重滯  
ニ運化セス此劑用ニシテ症ヲ看取ルルハ肝胃ナリ第一酷厲病毒留滯  
シテ下利ヲ為シ此ヲ胃腸ヨリ條除セトスルモノニ害アリ

○此藥ノ功能烈シカラズ緩和強壯ニ具稱スヘキ苦味ニ因テ能ク治驗  
ヲ見スルハ若シ再発セハ十二時内ニ二劑ヲ尽スヘシ全治ス又味ニ尤モ收  
瀉ス故ニ鹽粟仁ヲ加ヘ舍利別トスルニ宜ナリ若シ的當セサル症ハ未ダ  
十分ニ泄除セス腸胃ニ留滯スモノハ大黃舍利別ヲ加合シ是ヲ効  
アリ然レニ愈ルノ後強壯劑ヲ多服シ養生ヲ守ラサレハ再発ス  
○以上ノ劑効ナキハ機那阿仙茶ヲ散トシ大陽煎トシ諸症ニ合シ用  
ユヘシ害アラズ實驗ヲ得ル

○小便過多ノ諸飲ヲ服スル分量ヨリハ多シ病因ハ精力腎藏是ノ虛弱ヨリ  
起ル最初ハ諸飲ヲ過服スルモノナリ治法第一強壯ニシ和カニ滋瀉スル劑



暴怒ノ後二三日過テ口中苦ク胃ニ當テ痞拘支満悪心嘔雜頭旋死  
熱スルモノハ吐劑是ク功アリ此ニ因テ膽汁惡液ヲ胃ヨリ泄除シ苦唯ノ  
症ヲ尽ク消スル

○多汗ハ單ニ発スル稀シ他病ニ就ヒテ兼発ス又自然ニ催発シテ過多  
留滞スル惡液病邪ヲ泄シ除ク一箇ノ善兆ナクモアリ便チ寒冒熱ノ  
如ク此ニ因テ病去リ快愈ヲ覺ユ又他病ニ就テ劇ク発汗シ是ク虚脱スル  
症ハ勞瘵惡性熱病ニ発スルヲ消乾汗ト名ク

○諸液過多ヨリ発スルハ閉澁スル勿シ此理ヲ考ニ無病健康ノ人ハ  
毎朝寢息寸ニ在テ多ク発汗ス此ニ由テ无病ニシテ元氣精力快爽ニ  
テ能ク天年ヲ終ル若シ病害アルハ快発セズ此具病原アルヲ升発  
ヲ遏止スル故ニ発汗時俄ニ冷涼ヲ取り或ハ汗ヲ收閉スル阿片劑等  
ハ宜シカラズ然レハ発汗夥多作業ヲ妨ル等ハ衣ヲ薄クシ通下劑

ニテ過多ノ諸液ヲ他ノ道ヨリ除去シ増盛ヲ減スルニ利尿劑ヲ良トス  
○勞瘵肺癆ノ盜汗ハ此ニテ病輕快スルハ決シテナク次第ニ損耗スル汗  
ハ病治之ニ非シハ退カス治法前ノ六篇ニ詳シ

○善性寒発熱无寒熱ノ終リニ離邪発汗スルアリ此ハ肝胃ノ汗ニ  
和解劑清稀飲料ニ和カシ発汗飲劑ヲ加ヘ催進スル

○惡性熱病内寄諸藏ノ熾熱痛寒熱胆疽等ニ夥ク冷汗ヲ発スル死症  
諸ノ潰瘍類過多聚満ノ酷厲液流泄スルモノハ下劑或ハ水銀劑ニサ  
シ類利尿劑發汗劑燒酒浸ノ諸劑或ハ分利ニ和緩シ惡液ヲ變化  
スル劑或ハ二号ハ三号劑ヲ良トス

五神病第十四

大教

五神トハ意識耳目口鼻ヲ云フ此運管生氣少シニモ機瘵妨害アルハ官能ヲ失ヒ一身ノ感觸識知ヲ瘵シ失氣卒倒卒中ノ如キ疾患ヲ生ス

○眼目ニ於テハ黑星眼ノ視力衰乏シ全ク視ヘズ外ヨリ見レハ仔細ナク諸症生レス其故ハ元運生氣瞳神經ニ灌入セズ

○尋常視力灰白星ハ水晶液曇リ白色或ハ眞珠色ニ変ス

○綠星ハ硝子様液中曇暗黒腫ノ後ハ見ユ

○斜視眼ハ眼筋ノ痙攣ヲ抽割ヲ搖擗瘳不遂

○嫩腫眼ハ黒腫外面白膜嫩赤熱痛スル

○眼翳障膜白点ハ凝固ノ液玲瓏角膜ニ生シ癍痕ヲ顯ス

○夜明眼ハ瞳子散大弛緩ス昼日ハ約收シ夜ハ光輝ヲ射受シテ反テ明カシ昂鵲巢ノ如シ

○近視眼ハ眼珠全圍凸出挺突ス則チ視術ヲ為ス時ノ視ヒニ回シ

○遠視眼ハ前症ニ反對ス老人ニ多シ

治法

視神之弱ノ新発昏暗黒星眼或ハ瞳神經ニ粘稠液留滯ヨリ元運之弱スル症ハ補益ハハ利脱泄スル久ク根底留結ハ治シ難シ先ツ症應ノ吐下ノ劑ヲ用ユ

(註)最初ニ頭腦ヨリ浮血シ後遍身ニ施シテ自然良好ノ運行常度ニ復レシムル

又其間ニ頭腦強壯ニスル香料ノ某劑風氣驅散劑沸浸トシ末トシ或ハ蛇ノ生汁水銀吐涎法大効アリ尚強弱兼症病因ヲ精ク察シ用ユル此劑ニテ數々奇驗ヲ得タリ

○諸血ノ固塞ヨリ発スルモノハ脚湯刺絡角法ヨリ良トス

○外用法ハ惡液ヲ泄除スルニ第一穿孔打膿法本書三百六十四頁斑猫膏ヲ頂

窩耳後ニ施セテ粘液留飲多キ人ハ最モ大効アリ眼水菜ハ伊吹コ、

ノ草 薔薇 燒酒 ホニガール水 卅七号利ニ強壯ニスル本草露

ヲ加ヘ滴入スヘシ

○惡液ヲ泄除スルニ良ナルハ 泥苜根 七葉樹子ノ末 鹿角精等ヲ

嗅引スヘシ是ヲヨリ惡液ヲ鼻中ヨリ流泄ス尚此ヲ顛頂ニ擦スヘシ

○灰白星新発シテ水晶液中ニ凝粘シ又発スルモノハ前ノ法ニテ治ス沈

滯径久ハ鍼術ニ宜シ

○烏星飛散眼ハ羅絞膜ノ脉絡ヲ覆ヒ壓迫スルシ此症ハ凡テ消除

シ唯新発ハ壅閉ヲ分利スヘシ治法前ニ同シ

○近視眼ハ四十ル眼鏡ヲ用テ改復スヘシ少年ハ老年ヨリ治速ナリ

○老視眼及遠眼ハ凸ノ鏡ヲ用テ故ニ復シ尚頭腦強壯ノカキヲ内服シ

外用露水ヲ用ユ

○聰神全ク癡缺ハ神經損敗鼓膜破裂潰瘍腐蝕或ハ聰骨ニ種々患

害アリ或ハ鼓膜頑硬乾燥或ハ湿粘弛緩此等ハ多ク老人若学虚弱、

人ニ発ス或ハ多血聚滿肝脾小石核仁陷没シ或ハ瘡瘍ヨリ發ル

○騷鳴ハ鼓膜脈管ノ壅閉或ハ運動劇キヨリ発ス尚詳説ハ十篇見ユ

○臭味失常ハ津唾質ヲ変シ淡稀粘稠膽汁過多塩鹹等ノ多少ニ

隨テ味ヲ変ス或ハ全ク味コヲ失フモノハ味神經ノ固塞トス

○香臭失常ニ鼻中裏底ニ布蔓スル神經缺乏シ

○口臭惡臭ハ体中ノ水液油様液汚壞シ或ハ齒齦及肺胃ノ腐敗飲食

ノ鬱敗腸胃ノ蛇虫或ハ水銀劑ノ流涎鼻中ノ汚穢潰瘍等

○記臆乏弱健忘ハ意識精神ノ缺損腦中ノ諸液元運生氣虛乏ニ運



行ノ次序ヲ失シ全ク知覺セザル症ニ非ス皆神識ニ係ル即チ卒中  
痲病失氣譫忘狂醉老人无寒熱過房苦学疲神打撲外創等  
ニ由テ夏物ヲ身知ズルナシ

○精神惑乱譫妄前ノ病因ト同シ此症ハ夏理ヲ身別知察スルノ精力乏缺  
スルニ微見アリ無寒熱ノ発狂ハ運行劇盛シ此反シテ神志沈重  
憂愁病ハ微弱ニナリテ壅迫粘留滞シ在苒々不寐僵厥支体  
急ニ強直頑拘屈伸セズ昏睡ス此ヲ静卧ニ置ケル自ラ醒覺ス此元  
運急ニ遏止スヨリ及ルズ寤語シテ後恍惚トシ痴ノ如シ且因昏睡ニ  
同シ

○不寐ハ腦中ノ元運生氣是ク紛擾ス大熱煩躁勞神驚怖疼痛胃  
中ニ飲食飽滿スルヨリ及ルズ

○昏睡ハ卒中ニ兼テ元運生氣ノ滯入ヲ壅遏スルヨリ及ルズ或ハ催  
睡麻沸茶毒麻酔セシムル硫黄制阿片制血中ニ伏留シ或ハ神經疲  
弱スハ諸部ニ分配セズ自ラ腦中ノ管ヲ闭塞シ或ハ腦中ニ粘稠  
液凝血重滞シ或ハ瘡瘍墜落打撲ニ因テ脱血シ或ハ腦中多夢  
紛擾ヲ睡覺ト名ク此ハ起立廻歩迷乱等ヲ夢中ニ為ス

治法物論

○以上ノ諸病治法ノ標的ハ其病原ヲ精密ニ研想シ神經元運生氣ノ缺  
乏ヲ回復セシメ次序ヲ失フ運動ヲ順調シ快行健運シ妨障壅遏スル  
モノヲ除去シ路ヲ開クヘシ

○香臭失常ノ起原ハ容易ニ探索曉知シ難シ前ニ称答スル導引世カ利  
強壯健運スル制殊ニ頭腦聖京健ニ効アル制ヲ良トス此ニ由テ壅閉  
スル尿管及神經ヲ共ニ開通暢スヘシ

○諸味失常ノ起原ハ明矣ト易シ諸病共ニ熱ヲ兼テスル症本病

退ケハ即愈ユ

○苦味ハ内熱外症共ニ胆汁過溢シテ胃中ニ布散スルハ熱ヲ治スル吐下ノ劑及酸收劑ヲ用テ消除スヘシ

○食味失常、飲食化熟セス汚穢腐敗ノ液汁胃中ニ留滯スル故ナリ下劑ヲ用テ通泄シ或酸收ノ劑ハ手相汁ノ如キ類ヲ用ユヘシ

○塩鹹味、稀薄菜劑涌泉石灰水酸味ハ土質劑ヲ良トス

○口中惡臭、汚穢腐壞ノ津液アリハルサモ劑壞血病劑通泄汗劑ノ燒酒浸熱性醋仙手相汁自余酸收劑

薑新ノ腐壞ヨリ免スルハラカ本草ニ糶斗菜花ノ大陽煎ヲ文へ薑新ニ類リニ塗リ或ハ沒薬及葱霜ヲ搗齒粉ニ交ヘ塗リ或ハ食鹽ヲ塗リテ漱之ハ是ヲ良クシ

劑或ハ剛柔丹少シテ石灰水ニ交ヘ塗ルヘシ

○麻痺木仁ハ皮膚ノ神經癱塞ヨリ免シ支節頑麻觸知セズ初メニ下利導泄ノ劑ヲ用テ血ヲ清除スルニ水銀劑百中ニ一ニ而後神經強壯劑精烈滲透ノ劑ヲ内服外用スヘシ

外用ハ蚯蚓精 硃砂精 苦意精ヲ塗リ手摩之白芥子菜

蕨 薺菜根 芫菁膏 葶麻生草浴湯温泉痲病ニ効アリ

○熱病狂躁譫妄ハ三才ニ詳説スト虫ハ具病ニ非スシテ免スルモノハ元運生氣、運行是ヲ劇盛ナルヨリ免スルヲ以テ治法專行錯乱ヲ整順緩和スヘシ

第一數々強ク刺絡シ第二吐下劑ニ藜芦ヲ加ヘ尤モ良トス第三ニ清稀清涼和解ノ飲劑殊ニ繁薑薑草ヲ清水ニ煮ハ手相汁ニ

竜腦焙硝ヲ加ヘ奇効ト稱ス或ハ鹽薑栗汁ニ竜腦ヲ加ヘ或ハ催睡茶  
ヲ清稀飲劑ニテ送下シ脚湯或ハ時々杖ニテ撐ツヘシ

以上ノ方法尚男女急疾ノ発狂ニ數々効アリ殊ニ清涼散ニ焙硝  
竜腦ヲ良トス高堅空際ニ意ヲ用ヒ聚壞セシノ是ト良シ殊ニ  
婦人ハ此ニテ數々治スル

○沈神驚憂病ハ元運生氣ノ淫發空揚セサレヨリ発ス治法初メニ下  
劑ヲ用テ通泄シ多血ハ刺絡ヲ施シ而後凝滯ヲ運行セシムルニ上好酒  
少シク与ヘ運動シハ利通散劑芳香ノ頭腦強健劑風化透烈ノ  
強壯劑ニ丹砂剛鉄劑其他痿黃病ノ劑ヲ加ヘ茶カヲ強クシ用ユ具  
回ニ意ニ適シテ下ヲ為シ飲慰ニ時日ヲ厭ハス音曲鼓舞遊樂逍遙  
回歩居処變更爾氣ヲ去リ新鮮快活ノ氣ヲ受テ神志ヲ活養  
レ再ニ生氣ヲ開発セシム

脾病ニ発スルハ胃腸腹中ノ血脈尽クシ難治ニ殊ニ門脈ニ於テ是シ  
○治法刺絡ニ上ニ奉ルハ利劑内飲外用ノ驚痛鎮止劑燒酒浸ノ  
類ヲ銀性涌泉飛送瀧水ニ運旋シ元運生氣ヲ活発開揚スヘシ  
良効アリ

腫中匱乏苦悶身体拘強知覺觸徹セス或ハ起立顛卧卒中ノ如  
ク支体拳動スルヲ能ハス前ノ病因ト一般ノ強弱兼症ニ隨テ下  
劑刺絡スヘシ

○狂犬咬傷ハ歲月ヲ曆ルノ後再発シ種々危篤ノ諸惡症ヲ発シ急ニ  
死ス恐水ノ症ニ至テハ快復シ難シ故ニ最初不意ニ水中ニ投シ後発汗  
劑ヲ用ユ殊ニ底野加ニ醋酒燒酒浸ノ臭香 丹蓉精 百十四号ヲ加  
強クシ此ヲ用ユルニ就テ多ク温湯ヲ与ヘ或ハ紫蘇臭香ノ沸湯浸  
ヲ与ヘ発汗スヘシ

外療法ハ創ヲ速ニ切り角法ヲ施シ毒血浸淫ヲ吸キ後温  
醋底野加塩水ニテ洗ヒ或ハ烙鉄ヲ施ス

○不寐ハ他病ニ兼発シ或ハ是レ而已患レアリ元運生氣是ヲ攪動騷  
擾スヨリ発ス治法ハ鎮止緩和スニ白罌粟乳汁刮燒酒浸ノ洎  
夫藍ニ少シツ酒ヲ子へ尔後加倍スヘシ或ハ阿片刮底野加罌粟花  
浸等

特発スルモノハ心カ思慮飽食ヲ禁テ少ク使運動スヘシ  
疼痛ヨリ発スルハ阿片合劑衣ノ鎮痛劑毎夜用ユ

老人ハ強壯健補劑精氣醇厚物酒竜涎香ノ劑八八號劑底  
野加ト酒ヲ加ヘ用ヒ神志ヲ穏静スヘシ

○記臆乏弱健忘ハ強壯健補劑驅風劑香料劑頭腦強壯劑ヲ用  
ニ便テ六十号 八八号 迷迭精 八五号 卅七号 等ヲ内服外用  
スヘシ

老人ハ桂油ニ丹砂砂糖ヲ加ヘ用ユ以上ノ諸劑ハ熱性多血症用  
ルナ勿シ諸惡症ヲ発スルニ忌ムル也

外用茶良効アルハ卒中ニ用ヒ茶水風化滲透ノ諸精露水塩  
茶或ハ頭巾内ニ芳香強壯ニ茶草ヲ入ルニ禁テ忌ム大酒房  
支夜卧セ入謀慮

卒中ハ神識知覺ノ失常第一ノ見症也故ニ危篤ノ疾病トス大  
抵精神身体挙動ノ精力過止ニ或ハ荏苒持久ニ耗散ス

第一輕症ハ頭旋疼痛倦惰乏弱或ハ一所癢シ言語蹇澁半身不  
遂頑麻ヲ偏枯ト名ク

第二劇症ハ以上ノ諸症ヲ氣子精神遍身全ク癢止シ動脈氣  
息ハ在リテ鼻声ヲ発ス

第三ハ急ニ卒倒シ諸部ノ運動邊ニ瘳絶シ一此症ハ治療手段  
ナシ宛モ電雷ノ一撃ヲスルカ如ク忽チ斃シ尺是拘強又其他堅  
法繁雜ニシテ記載スルハ反テ要領ヲ失ヒ弁別シ難シ

病因

精力元運生氣衰缺ヨリ腦中ノ脈管神經運送セズ或ハ水血脈  
破裂或ハ凝固ノ血多ク血ニ面部眼目赤色衝逆膨脹或ハ老人動  
モスル若神研搜ニ耽リ房支過度或ハ惡液留飲多ク腸胃ニ  
支滿シ血脈ニ水液多ク寒性ノ人及老年ニ在スル則根生節度  
ナク飲食克化ノ精力減スルヨリス

又實熱ノ二症アリ區別是ヲ肝胃ノ熱症ハ強烈ノ酒ヲ多飲  
スル酒愛口飽食暴怒謀慮竭心強ク動作使役スル等ニ由テ腦  
中ノ脈管暴烈ニ破裂スルヲアリテ在ス○寒症ハ飽食胃中ニ留

滯粘稠シ或ハ頭ニ寒ヲ受テ濕氣ニ中リ血液粘凝ニ逐ニ腦  
中運動ヲ瘳又

治法

最初醒覺セシメ諸般ノ風化透烈強壯健亮ノ劑ヲ頻ニ鼻中刺  
スルニ便チ 硃砂精 鹿角精 五ニ号 一ニニル精 迷迭精

其他風化ノ塩油精烈ノ水菜 ホンガシセ水 卅六号 九八号

又内服スルニ以上ノ劑ヲ強壯劑ノ煎湯ニテ適服スルニ而後頭部手  
足ヲ頻リニ手摩循導シ身体ヲ撞キ動カシ或ハ強人ノ背ニ搥  
ケ行歩セシムルニ此ニ由テ多ク醒解スルニ又熱症ハ刺絡ノ頭頸眼  
顫動脈腕脚ニ行ヒテ甦サレモノハ角法等ノ諸術ヲ注意セズ速カ

ナラサレハ益ナシ

強キ水鏡法ヲ直腸ニ施シ或ハ強キ斑猫膏ヲ頭頂背脊足腓

ニ貼スヘシ然レハ輕症ハ強烈ノ劑ヲ用スルカレ

寒症ハ強キ吐劑ヲ初ニ用ニ後諸劑ヲ与フヘシ多血及血液ノ壅閉

ヲ兼ルモノハ刺絡ヲ良トス或ハ諸術効ナケレハ足蹠頭頂ヲ燒クニ

○ 痲病ハ卒中ノ前兆或ハ発後ノ病シ故ニ卒中ニ續キテ論說ス正

面ノ症ハ半身不遂拳動スルノ能ハス或ハ所或諸処痲痺觸知セス

譬ハ眼目口舌手足等ニ発スルモノハ諸疼痛ノ諸病感冒ヲ加ヘ

及亮ス或ハ此症ヲ患シモノハ陰サ至直筋膀胱直腸括約筋舌筋又節震

搖不遂痲痺言語蹇澁ニ便失禁ニ保ツテ能ハス

病因 患部神經因塞衰弱シ故ニ治シ難シ老人ハ荏苒トシテ

愚ク唯ナリ新発少壯ハ治スルコトヲ得ヘシ

治法 壅閉衰缺ノ神經ヲ再ニ健運強壯ニスヘシ即チ 此紫蘇及花

ヲ毎日飲食ニ入ル或沸浸シ飲服シ或ハ 留附林 迷迭香及花

立浪草 菴菴 頭腦茶ハ 羅勒草 桂皮殊ニ寒性留飲ニ良ナリ或ハ九八号

八五号 卅七号ノ類或ハ燒酒浸大陽煎奇南香竜涎香

熱性ハ 鹿角精 五二号 四九号 此紫蘇ニ酒ヲ加ヘタル露水或

砂糖ニ肉桂油 丁子油 丹砂 真珠或ハ竜涎香ヲ加ヘ強クシ此

ヲ老年或ハ寒性ハ分量多服スヘシ此劑良驗ヲ頭腦散茶ニハ高

貴ノ人甚ク称用ス或ハ良効アルモノハ 八九号 九十号 九一号ハ称

譽スル神經強壯劑ニ尚此ニチクノ竜涎香 肉桂 丁子油ヲ兼用

スヘシ八八号劑ハ分利開発粘稠諸液ヨリ来リ壅閉ヲ治ス

壯熱ヲ及元スル症ハ和鮮鎮清シ 驚痲鎮止劑ヲ兼用シ血中ノ沸

熱ヲ鎮清分利ス

○ 神經頑固ヲ因塞スル症ハ微細ニ意ヲ用テ 日采丹ヲ用ユ是ク奇

レ此益々是キモノハ徳静ニシ百号水其他強烈ノ草精燒酒嚴醋ヲ  
鼻中ニ射シ或ハ冥ノ水ヲ面部ニ吹キ或ハ好酒内桂水蘭菊水ハ尤モ能  
ク活カテ催ス良驗アル強壯劑ニ尚此劑ハ刺絡ヲ施ス時ニ盃ヲ  
用ユレハ驚心シテ死スル症ニ言レシ或ハ刺絡シテ面色変シ昏冒ヲ催ス  
モノハ速ニ静カニ安卧セシムヘシ

劇症ハ強キ心藏強壯劑ヲ用テ後風化滲透ノ劑ニ硝砂精ニ水酒  
ヲ加ヘ鼻中ニ懸動脈ニ擦入シ又ハ毛髮ヲ撮ル或ハ七号劑ヲ四五  
十滴内服スヘシ元運生氣ヲ醒テ強壯ニス或ハ鹿角精五二号五三号  
劑ヲ鼻中ニ嗅引シ或ハ内飲セシムヘシ或ハ桂油ニ砂糖丹砂ヲ合ス  
今黃金散ト名ク強心劑ニ單用シ或ハ他ノ露水ニテ服スハ如此  
ノ劇症ヲ治ス或ハ八五号劑モ宜シ

子宮病 此病前十篇ニ詳ナリ回方子牌病ト同シ婦人ハ積取テ云ニ及ルモノハ

速ニ諸般ノ惡臭ノモノヲ鼻中ニ薰スヘシ殊ニ香狸 阿魏 烏科

皮草角等ヲ燒テ煙ヲ鼻中ニ嗅引シ或ハ惡臭ノ草藥劑甚ク劇  
症ハ鹿角精九二号ヲ鼻中ニ入シ終リニ於テハ以上ノ劑ヲ内服ス

ヘシ其他前ニ挙ルト同シ

○ 泄血損傷ヨリ死スルモノハ先ツ能ク漏滯止止血ノ法ヲ施シ後患者  
ノ症ニ隨テ血脉ノ空虛ヲ速ニ充實セシメ便チ薑汁乳汁也  
且杏仁汁刺煉茶等ニテ心藏ヲ強壯ニスル露水或上好酒ヲ用テ  
後此症ノ良劑ヲ擇用スヘシ

○ 痲病 凡テ輕易ノ搗搦ノ類ハ兎驚痲此病ニ屬スト知ヘシ  
蓋シ此病内ハ精神外ハ神具急俄ニ運動ヲ癢止シ卒然トシテ地ニ卧シ体  
中諸筋ノ運動劇烈ナルニ依テ彼此ニ搗搦抽掣手牽引震搖ヲ為ス則  
第一神經ノ部ヲ刺攻スル劇烈ノモノ侵襲スルヨリ及死ス具症タルヤ手

ノ拇指是夕拘屈シ筋急奇怪ノ呻声ヲ発シ口白沫ヲ吐シ眼目支体轉  
廻撥乱頭手臂足ニテ劇ク地ヲ撃チテ自ラ舌ヲ嚙ミ氣息悶乱野声  
等ノ微甚ハ病毒ノ多ク少ニ隨フ

○諸症持久セス甦復ノ後モ発作定ニラス数々発シ或ハ久ク経テ発ス  
小兒ハ大人ニ比スレハ弱シ

○劇ク甦復ス後ハ常人ノ深ク睡卧シテ覚メルカ如ク或ハ大醉沈醉  
シテ醒ノルト同シ頭痛重キヲ倒置スルカ如ク患人何ノ故タルヲ知  
ラズ醒復後ハ身体軟手レタルカ如ク意ヲ用テ坐立歩行スルニ発スル時  
劇ク動揺スル故ニ疲弱ヲ覺ル

病因種々アリ正面痲病ハ頭腦ニアリ類痲ハ他ノ諸部ニアリ此ヲ區別スル  
ニ新發沈固外表内部大人ハ腦中ノ造性惡ク小兒ハ齒牙生セスレテ  
発シ或ハ腸胃ノ蛇虫ヨリ発ス婦人ハ子宮ノ造性惡キモノ等

○正面ノ起原ハ銳利刺衝スヘキ骨屑ノ如キモノ腦中ヲ刺攻シ或腦  
中ニ過多ク凝血鼻衄月経閉塞液寒発熱痰癰浸淫瘡疥久  
潰瘍ヲ認治シ毒液腦中ニ内攻伏留シ刺傷侵蝕シ或ハ自然ニ  
及スル諸物ハ突内強キ心勞盛怒大ニ驚駭等  
○此病発スル時ハ神識自ラ逃潜シ害ヲ避ケ驚怪スヘキ運動ニ讓  
リテ此ヲ免ル知覺ナリ愚昧驚異スヘキ作用ヲ見シ烈シク死スヘキ  
程ノ運動ニ至レハ和緩シ意識精力再ニ復生ス

○正面ノ痲ハ類痲ヨリ数々発セス類痲ハ他病ニ兼発ス此又神經ヲ刺衝  
スレバ頭腦ニ於テセス他ノ部ニ在リ小兒ノ齒牙斷伏留シ或ハ蛇虫腸胃  
ニアリテ腸中ヲ蚕食シ神經ヲ刺攻ス

治法

正痲ハ頑固ニシテ是夕復シ難ク功ノ治法ナシ人皆異常奇策類ヲ用



レ无益シ 病原ヲ精ク安知セサレハ其利ヲ多ク費ス而已類痲ノ病原  
各異ニシテ腦ニ屬スルモノ稀シクヨク明矣ニ治スヘシ経久ハ治シ難ク新矣  
ハ治ヲ施スヘシ

○正痲閉血ヨリ及スルモノハ初メ刺絡下利ヲ良トス後血ヲ壅閉ヲ通暢  
スル劑トシテ神經強壯ノ散ヲ兼用スル或ハ瘡瘍類内攻ヨリ及スル症  
ハ再ニ頭部ヨリ外出スヘシ寒熱誤治モ此ト同シ

○外用法ハ角法芫菁膏打膿法ノ内服薬ハ日永丹下利多ク効  
アリ或ハ芫汗劑ニテ惡液ヲ外出スルハ治スルヘシ

○盛怒ヨリ及スル症ハ初メ刺絡シ後血ヲ運行過激胆汁酷烈ヲ鎮止清解  
スル劑ヲ用ユ即 煇硝 丹砂 鎮止驚痲散 八九号ニ煇硝ヲ加ヘ或  
ハ九十号ヲ單用スル或ハ鹿角精九二号其他神經強壯劑或ハ煇硝丹  
化ノ精ヲ用ヒ穩靜安逸セシムヘシ

○膽汁様惡液許多胃中ニ伏スル症ハ吐劑ヲ良トス  
○驚駭ヨリ及スル諸液腦中ニ凝滯スルハ刺絡ヲ施シ後分利劑驚痲痲  
鎮止散 鹿角精 九二号劑 頭腦強壯セシノ浸劑露水或ハ芫汗劑  
ニテ服シ或ハ菩提樹ノ寄生接骨木芽 櫻實 肉桂 香狸 孔雀  
ノ糞等是ノ良効アリ

○腦及其他ニ骨質等ノ刺攻ヨリ及スル症ハ抜き去ル手段ヨリ治法ナシ  
○輕淺ノ病因ニテ及スル症譬ハ驚駭暴怒善性ノ浸淫瘡齒牙難出  
虫病痘瘡等ヨリ来ルハ速ニ消除スヘシ此レ身體自然ノ精力ニ由テ復  
治ス然レヨ 凡庸愚昧ノ徒如此症ニ於テ異常奇策ト稱譽シ用テ快  
治スレハ大ニ信用スルノ輩多シ此レ全ク其力ニ非ス

○類痲ノ病毒頭腦ニ在ラス速ニ治療ヲ加フヘシ何者ハ痘瘡見魚ニ及セ  
ハ和解鎮靜劑ヲ用テ速ニ治ス尚他ノ熱病ニ兼及スルノ劑ニ同シ蛇虫



諸部運動失常第十五

總論

此病ハ大過増劇或ハ不及減少或ハ全ク瘵缺スルノ諸病ニ於テ是々多クシ  
是運行ノ諸血液元運生氣カ皮内筋膜神經脉絡諸藏諸骨等ノ運  
動常度ヲ失フヨリ起ル

大過増盛ノ病原ハ瘵病抽掣等急痲病等意識神經カ病邪ニ抗抵  
シ自ラ拒トシテ過盛ノ運動ヲ為スモノシ此則自然ノ運動ニ逆ノモ  
ノアリテ侵襲ス前ノ痲病ト一般ナリ○若シ元運生氣ノ運行ヲ妨碍  
スルヨリ発スルモノハ強ク神經ノ部ニ発シ瘵病支節抽掣等牽引痲病頭  
旋嘔吐下利陰莖勃起夢魘狂躁譫妄狂病或ハ過多凝血ヨリ発スル  
ハ心悸動失氣昏眩呼吸不利喘咳子宮衝逆○神經ニ酷烈刺衝スル  
ハ患部ニ隨ヒ一ツナラズ噴嚏咳嗽呃逆噫氣惡心嘔雜嘔吐支節牽引

急牽引痛急餓病大饑病其他是々多クシ

運動減少乏弱或ハ頑硬ヲ次序ヲ失ヒ精力諸血液及元運生氣神經  
衰弱ヨリ発スル病變ハ失氣昏厥卒中痲病顛振戰慄陰痿口舌  
ノ痲損傷脱臼創傷筋膜神經切斷等○不食ハ胃中ノ運動衰弱シ  
消磨化熟スルノ能ハルヨリ発ス○瘵病ノ類ハ拘攣搖蕩走歷節風  
諸筋ノ運動自由ニ屈伸拳動スルノ能ハズ疼痛ヲ加ヘ強張頑硬動搖不  
レ能ハズ或ハ前ヘ屈曲シ後背角ヲ反張シ或遍身全体尽ク瘵強亦手  
急ス或ハ口眼喎斜言笑ヲ妨ケ陰莖強硬等○病原ハ意識精神  
ニ關ル病ナリ猶痲ニ説クト一般ナリ

治法

運動微弱陽氣不足ナル者精烈芳香ノ物酒肉桂檜仙手相皮  
其他露氷剛鉄剉機那樹脂様ノ草ヲ用ユ此ハ自然良能ヲ本トス

故ニ心藏意識ノ精カヲ補フヲ要トス

痙病及類症ノ輕淺ハ具患部ヲ裸露シ類リテ手<sup>摩</sup>臂循導シ凝結  
酷烈ノ血ヲ分利退散シ血脉中ニ再ニ帰復セシムルニ空腹ノ唾<sup>燒</sup>酒  
迷迭香ヲ摩擦スヘシ良効アリ

劇症諸血壅閉ヨリ来ラハ刺絡ニ通利スヘシ此ニテ自ラ退久ヘシ尚頑  
強ヲ退キ難キ精烈ノ神経強壯劑痙病ニ用ルルト同シ

○外用法 神経強壯劑甚ク効アリ 蚯蚓精 鹿角精 牝馬膏等ノ  
内ヘ少ク石鹼ヲ溶化シ頂窩脊椎骨其他ヲ支節ニ塗ルヘシ患部甚

ク頑硬拘直軟化融用シ強壯ニル軟膏油茶類ハ 鷄油 鬼脂  
人脂 麝脂 香狸 牛骨脂 石腦油 犀珀油 紫蘇油 芸香油  
カニ油 迷迭油 酸性ノ涌泉等ヲ肝要トス 禁忌ハ心カ分念怒

驚恐憂愁

○下顎骨ニ強ク痙ヲ発スル症ハ大ナル外傷ヨリス此ハ神経ヲ害傷シ或ハ丹

允ノ如キ酷烈ノモノアリテ具劑ニ入り血ノ運行ヲ格止スルハ禁忌トシ  
緊急咬牙ス病因治法外科書ニ説トス

○此症小兒ニ発スルアリ驚痙鎮止劑ヲ内服外傳精ク意ヲ用ユヘシ  
口痙喎斜牽動ハ中毒或ハ芥葉鈎吻ヲ服スルニ因テ発スルアリ速ニ吐

劑ヲ以テ口中ヨリ泄除スヘシ若シ其毒寒涼ニシテ衰弱スルモノハ強壯  
精氣強キ劑或ハ温酒ニ少ク胡椒生姜ヲ加ヘ服スヘシ又他ノ内ヨリ発

スルモノハ驚痙鎮止劑及神經強壯劑ヲ服シ外用前ノ十四篇ノ方法  
ヲ撰用シ尚又月桂油 犀珀油 エムプラスト ベーニカ膏ヲ耳後顳

顳ニ布貼シ尤モ効アリ

○噴嚏甚ク劇ク発スルモノハ鼻中ノ神経膜ニ酷烈毒刺衝シ觸ルニ因  
ル緩和スルニ宜シ教々温湯ノ蒸氣ヲ吸引スルハ日後発スルニ因テ止ムヘシ

○咳嗽胸肺之症ノ如キ運動アルヨリ死スルハ最初ニ神経強壯劑胸肺和利劑ヲ沸浸温服シ或ハ九一号九二号劑驚痲鎮止散催睡阿片劑蘇合香ヲ加ヘ強クシ或ハ刺絡下劑症ニ隨テ弁別スヘシ

○心悸動ハ心藏ニ劇盛症ヲ如キ運動ヲ為スルハ是キニ至テハ鼓動ノ響キ傍人ニ見ユ或ハ惣身ノ運動劇盛ヨリ死スルアリ此症ハ多血脾病或ハ大ニ驚駭ニ外表運行ノ血急疾ニ心藏へ聚リ激行常度ニ越ヘ且過溢ノ血ヲ再ニ諸部へ流散セシムル良能ナレハ自ラ徐々ニ止ム然レモ是ノ劇キモノハ再死シ易ク殊ニ多血ノ人ハ断ヘス心動ヲ死ス

○或ハ心藏空間血脈ノ大幹中ニ凝血會結ス此ヲ心植或ハ心疝ト名ス死者ヲ解剖スルニ得ルアリ皆生前心鼓動アリ此症運行ノ血輕劇ノ大小微是ニ因リ或ハ脉腫胸部ノ大幹動脈或ハ心藏ニ附接シ或諸脈ニ生シ或ハ軟骨ノ如キモノカ動脈ニ生シテ此病ヲ起原スルモノハ大抵

治スルナシ多血ヨリ死スルモノハ刺絡ニテ愈ルモノ多シ諸ノ山崩血ヨリ死スルモノハ前ノ九篇ニ於テ治法ヲ施スヘシ

治法 和解鎮靜ノ劑驚痲鎮止劑ヲ以テ心藏劇盛ノ運動ヲ鎮止シ凝固ノ血ヲ分利稀流シ熱ヲ清解緩和スルニ 四七号劑ヲ茶葉蘭菊

野麴 櫻草花 仏手相皮ヲ煎劑ニテ用ユ或ハ燒酒浸ノ臭香 薊 橙皮ニ硝磺精九二号ヲ加ヘ服シ脚湯運動清稀ノ飲料乳汁牛酪涌

泉類皆良シ

呃逆ハ胃ノ神経ニ痙ノ如キ牽引ヲ死シ共ニ膈膜ニ刺衝ス輕症ハ飲食細抵シ死スルハ須臾ニ退リ劇症強ク胃ヲ妨害シ或ハ毒物ヲ吞ミテ毀傷燧腫腸胃膀胱膈膜諸藏ニ在ルヨリ死ス或ハ外部ノ燧腫手足寒熱脱疽等ノ无寒熱惡症ノ熱ニ死スルハ速ニ死スルノ前兆ニ或ハ老人虛弱ノ人ハ食消化セス胃ニ飽滿硬固シ或ハ風氣ヲ催ス食或ハ暴食等ヨリ死ス

治法ハ一孟ノ酒 燒酒 茴香水 薜蘿水 藿香水 橙皮水且  
他凡テ胃ヲ健運スル散葉露水ニテ大抵速ニ止ム或ハ五九号劑ニ少ク  
機那ヲ加ヘ温酒ニテ服スヘシ此劑ハ冒寒傷冷或ハ寒涼ノ食物諸飲  
ヨリ免スルニ効アリ

外用ハ腹部ニ蒸露滴ノ強壯油ヲ塗り或ハ茶草ヲ袋ニ入レ煎蒸シ  
或ハ温暖強壯ノ膏ヲ貼スヘシ

胃中ニ過溢ノ酸壞液アリテ嘔氣吞酸ヲ免スルテアリ土質劑ニテ酸  
液ヲ消化スヘシ蝦石 蛎壳 珠母 珊瑚

熱病ニテ胃中或ハ諸藏ノ熱ヨリ免スルハ危篤ノ症ナリ便チ 硝磺  
ノキニ電腦或ハ百十四号 十八号劑或燒酒浸ノ臭香ヲ加ヘ或ハ九号劑  
ヲ服スヘシ

寒熱脫疽内藏ノ創傷石淋ノ切斷ニ免スル者ハ前ニ説ク如ク必死ノ  
徵ナリ然レニ機那或ハ以上ノ燉熱劑ヲ用ユ

中毒ニ免スルモノハ多ク微温湯乳汁油類ヲ頻リニ飲テ酷烈毒ヲ緩  
解洗滌シ吐出スヘシ

○陰莖強硬直筋ニ強ク痙ヲ免ス此大抵微氣ノ毒ヨリ免スル多ク或  
ハ少年強壯多血ノ人多ク患フ故ニ先ツ初ニ腕ニ刺絡シ治セサレハ陰莖ニ  
刺絡シ多ク下劑清涼和解劑ヲ良トス

梅膏 硝磺ニ電腦ヲ加ヘサツサフス 蒿苳 藿香水ニテ服スヘシ  
飲料ハ清稀酸收清涼ノモノ良シ 微毒ヲ兼免スル以上ノ劑ニ水銀劑  
ヲ合シ用ユヘシ 禁忌ハ熱劑ノ樹脂芳香精烈ノ劑

○陰痿ノ徵甚ク皆盈張充實セシムル精力虚乏ニテ生息ノ用ヲ為サス  
此レ陰莖直筋衰弱麻痺不遂ヨリ勃起スルヲ能ハス此病ハ凡テ少年ニ早  
ク過房シ精力ヲ費耗シ其部ヘ元運精氣灌入セス或ハ學ヲ損傷燉

腫頑硬結腫瘍アリテ乾枯癆訣し或ハ寒性ニシテ血中ニ粘液留飲多ク或ハ  
憂愁勞神苦學ヨリ生ス

○治療 甚ク難ナリトス然レモ西學ヲ害ナリ精水缺脱セズ疾病ナキモノハ  
生息ヲ得ヘシヨク學ヲ診察弁知スヘシ

○無病新発ハ悲哀勞神疲勞寒冷ノ飲食ハ過房ヨリ生スルモノハ起居  
諸養生ヲ守ラサレハ治療益ナシ

○治療ハ滋補培養ノ飲食ヲ用ヒ鷄卵黃肉汁乳汁桂水ニテ諸筋ノ  
精力運動ヲ進スヘシ即チ 手榴草根 肉豆蔻 生姜 地榆根

ヲ砂糖漬紙茶トシ或ハ九四号九九号割具他ノ割ヲ加文ニ強クシ或ハ  
酸泉ニ乳汁ヲ加ヘ或ハ乳汁ニ已服シ或ハ強壯精烈ノ茶酒ヲ割衣ニ殊

機那ヲ良トス  
(註)乳汁治法日ニ百枚ヨリ二百枚ヲ三度ニ服ス乳汁ハ牛乳馬野羊

○留飲惡液ヨリ生スル症寒性身体肥滿膨大懈惰痿弱ニ此症ハ肉癆滲  
透ノ割ニテ精カヲ培養シ元運生氣ヲ増進スルニ精烈ノ酒ハ胡椒

白瓜子 砂糖漬ノ肉豆蔻 生姜 地榆根或ハ蓬砂守宮ヲホト  
越シ酒ニテ寢所ニ就クノ半時前ニ用ユ

○或ハ百号割具他杏烈ノ燒酒浸ノ竜涎香 附子 七七号ヲ單用シ  
加文ニ或ハ茶酒ニ機那ヲ加ユ

○外用割ハ神經強壯割ノ精烈ノ露滴油類ヲ塗擦シ或ハ蒸湯溫泉  
身体顫振動搖ハ手足頭部口舌心悸動老人ハ元運生氣ノ衰缺少年

ハ驚駭ヨリ生スルハ平常ノ元運生氣ノ諸筋ニ灌入セズ滯止シ或ハ多血  
酒客過房ヨリ生ス皆容易ニ治シ難シ

○治法ハ以上ヲ禁戒シ神經強壯割又ハ 蘭菊 紫蘇 機那 酒 麦酒  
燒酒浸ノ迷迭香 九二号ヲ服スルヲ良トス熱ヲ兼ヌルハ驚痛鎮止割或





桂油 丁子油 益智油ニ砂糖ヲ交ヒ口中ニ含ミ嚼ミ舌上ニ溶化シ  
飲ムヘシ

飲料ニ 蘇 迷迭香ノ浸刺ニ九二号ヲ加ヘ服シ或ハ酒ヲ加フル紫

蘇露ニテ数々口内ヲ漱洗シ服スレハ舌ノ衰弱ヲ復ス

○ 支節強直ハ舉動屈伸ヲ得サル是ヲ唯治ノ病ニ此レ諸骨損傷ニ

押壓外創等ヲ久ク舉動セス自然運行ノ液患部ヲ瘡ワシテ要シ

漸次ニ滯積凝固シ終ニ全ク瘡止スルニ至ル

治法ハ軟化溶解シ分利スル蒸氣及軟膏ヲ塗テ諸生類ノ油脂ヲ

温メ数々塗擦シ患部ヲ彼此ニ動搖シ平常ノ運動ノ如ク柔順

便利ニ至ラシムル茶湯温泉ニテ聚結ノ諸液ヲ再ニ分利スヘシニ

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

腸胃病第十六

惣論

胃熱泄瀉赤痢嘔吐泄血呃逆ハ皆前篇ニ論ス具余論說セサル腸胃  
險重ノ諸病重ク受ノ善悪ニ由テ諸症ヲ究シ變化一ツナラス明カニ的  
指シ難キ諸症ヲ集成一篇ト為シ各章ニ論ス

○不食ハ飲食消化ノ精力缺損ニテ食機敗絶病ト云食物ニ向ヘハ惡心  
ヲ催シ入テ思好セズ此養生起居飲食良饑飽消化ニ胃中ニ停滯シ痞  
悶胃重絞痛噎氣吞酸腐敗ノ粘痰苦汁酸烈液ヲ嘔逆シ惡心嘈雜  
等ノ見症アリ○老人ハ病ヲ患シ四肢困倦精力漸々ニ虛衰シ不寐安眠  
不能然ニ死スルヲ無病自然死ト名ク○氣急ノ症ハ本病退カサレハ治セズ

治法ハ驅逐導泄ノ劑ニ宜シ始メ吐劑後胃ヲ健運スル燒酒浸ヲ用ニ  
惡心嘔氣痞悶ナキハ先ツ粗疑ノ粘液留飲ヲ除クニ苦味ノ鹽劑及

茶劑 九一號 九二號ニテ分利スヘシ腹量ニ三分ヨリ五分ニ至ル又液汁劑

ハ百十五號ヲ十六滴ニ日ニ二度用ニ其間ニハ芒硝 下劑及硝石ノ類ニ

テ下劑シ清掃スル後ハ健胃劑ニテ惡液ヲ驅出し腸胃克化消磨

ノ精力ヲ強壯回復スルニ五九號 六十號 百二號 百三號 劑ヲ一ヒツ酒

及麥酒ニテ服スヘシ

○慄悍苛烈液膽汁過液アルモノハ 泥菖根生薑ノ砂糖漬八十號劑

香料菜酒茵陳酒露水ヲ良トス

○酸壞液ヨリ又元スル症ハ 蠣壳 蝦石 珠母 珊瑚 バルサモ丸 大黃

硝石ニテ消化下劑之後健胃劑 鉄性酸泉 剛鉄劑 五十號 五

一號 八三號 六七號 桂油ノ四三號劑ヲ加ヒ服急ラサレハ此症速ニ

治ス

○禁忌ハ 煙草 燒酒 饑飽 消化ニ難キ粘稠ノ食物風氣ヲ生スル物

苦学劳神等

○惡心ハ不食嘔逆ノ特発前章ノ病ニ甚ク近キ重症ナリ先ツ胃ヨリ惡液ヲ泄除スルニ捷徑ノ良方ハ吐劑ニ散テ兼症ニ拘ルヘカラス或ハ前章ノ下劑ヲ用テ後健胃ノ酒劑ヲ用テ高胃ノ部ニ強烈ノ肉豆蔻油麦錠及ヲ貼スヘシ他病兼発モ治法同シ

○犬餓病ハ甚ク餓テ食ヲ欲ス前章ニ相反ス若シ食ヲ与ヘサレハ乍チ昏眩シ惡心ヘカラス病原ハ胃中ニ酷烈液アリテ神經衣ヲ強ク刺衝シ筋膜ノ精力異常ニ強烈ニシテ飲食ヲ疾ク驅除ス

治法ハ緩弱ニシテ醇厚膏粱多脂ノ類豚肉猪肉麦錠ニ牛酪乳脂ヲ塗リ或ハ米粉ノ類ニテ造ル飲食菟豆稗豆巴旦杏ノ類ヲ油膩膏汁乳汁ヲ加ヘ煮テ凝糊ト為スモノヲ与ヘ置キ尙モ製メ底野加ヲ毎夜一匙ヲ用ユラトス若シ治効ナラハ土質劑ニテ酸液ヲ

消化スヘシ或ハ香酸アルハ酒石油温湯他ノ飲劑ニテ三十滴ヨリ六十滴曾テ与ヘ或ハ四九号ニ六七号劑ヲ二分ニ至ニ冰糖ヲ加ヘ日ニ三度尙モ且空心ニ燒酒ヲ服スレハ全愈ニ然ルモ胃ノ下口弛緩シ飲食ヲ保ツトヲ得サルハ治セストス

○大渴ノ特発ハ火熱多血酷烈塩鹹液膽汁様液咽喉其他胃中ニ在リ津唾凝固シ程好ク滋潤セサルヨリ発ス

治法ハ清稀飲劑ニ塩硝石手相汁吾妻菊花大陽煎酸味茶精等ニ砂糖ヲ加ヘ或ハ二三百匙ノ湯ニ醋ハ匙十ニ匙ニ砂糖ヲ程好ク交ヘ飲料トス或ハ制衣酒石塩ヲ溶化シ代用スルモ良シ或ハ乳汁飲劑ニ制衣酒石塩 酸橙 酸醬ヲ加ヘ煮テ一日ニ百匙ヨリ二百匙ヲ用テ全効アリ此ノ酸收ノ劑ノ標的ハ无寒熱病燉腫間日熱病其他大渴アルニ多ク服スヘシ

○飲食不化ハ不熟ノ液汁胃中ニ倍增シ変化シテ許多ノ疾病ヲ発スヘキ不食ニ非ヌ消化常ナラス痛ヲ覺ヘ痞悶噫氣放屁ノ病原ハ根生起居度ヲ失ヒ貪饕多脂膏梁ヲ過食靜坐シテ行歩セズ精力胃液衰缺スヨリヌス

治法ハ初ニ粘凝ノ液汁ヲ苦味塩菜ヲ数日用テ溶解シ後吐利ヲ与ヘ用ヒ唯キモノハ下劑ニテ通泄シ後健胃強壯劑不食ニ災キルヲ撰用シ或ハ穀泉酸泉ヲ用ヒ再ヒ胃ノ運動ヲ挽回スヘシ久ク脛臥ニ飲食節度ヲ守リ消化シ唯キヲ禁シ拳動使役ノ道遠用歩スヘシ

○胃火煩熱ハ鳩尾胃口ニ當テ火炎熱上衝シ此ヨリ咽喉口中煩熱懊懣嘈雜苦腦ヲ覺ヘ痞拘支脹欬急牽引休止増減アリ原因ハ百味油膩殊ニ羊肉ヲ食シ急ニ寒冷ヲ受ケ麥酒酸味辛辣甘芳香精烈ヲ多食シ或ハ膽汁様液胃中ニ過滿シ又性急盛怒スルニ就テヌス

治法 酸液過多ヨリ発スルモノハ 煖石 珠母 コシカ 鹿角 水晶 等ニ四分一ノ肉豆蔻末ヲ加テシ毎服五分單用シ或他ノ露水ニテ服ス

○賤人ハ白垩ト肉豆蔻ヲ用ユ多服スレハ胃ヲ害ヌ又七ニ号溶化シテ心酒石塩及油此症ヲ須臾ニ消散ス服量ハ九四五滴ヲ湯麥酒差夫汁ニテ服ヌ或四九号劑鹿角精ヲ單用シ合劑トシ用ユ

○苦味 惡液過多ヨリヌスル症ハ百十四号劑ヲコソコソ湯ニ滴服スシ厚味油膩寒飲ヨリ発スルモノハ燒酒ト八二号ヲ少シ飲ムヘシ即効アリ  
○消化セサル諸液胃中ニ在ラハ下劑ヲ用ユ多血胃ノ部ニ滯積煩熱スルモノハ刺絡ヲ良トス

○心腹痛

註心痛 心下痛 胃口痛 膈痛 胃脘痛 胃疼痛等 下血準ス

此病ニ輕重アリト雖凡皆心部胃口疼痛苦悶惡心眩暈悶乱嘔吐心  
悸動怔忡煩燥腸痛病ノ如キ症ヲ兼又腐敗液胃中ニ伏留スモハ  
心部胃口ヲ刺攻侵戟噬ムカカリ撞ソカカリ刺痛癉瘰抽製牽擗  
ヲ免ス此症ハ能ク諸熱病具他ノ病ニ多ク免ス○風氣 鬱滯痞塞  
不化ノ飲食 蛇虫等ヨリモ免ス

(註)一婦人此病ヲ患フ劇烈癉瘰搦シテ死ス此ヲ解剖スルニ夥ク  
蛇虫アリテ胃口ノ裏面ヲ噬咬侵蝕ス

脾病子宮病 積聚ノヨリ免スハ滯積ノ血胃辺門脈ノ枝別ハ流利  
セス或ハ前ニ詳説ス熱病及惡性ノ胃熱病ニ嘔吐惡心呃逆ヲ免スルハ  
自然ノ良能ニ害ヲ為ス惡液ヲ能ク湧泄シ胃中ヨリ除カカ為シ  
治法 酷烈液不化ノ食物氣滯痞塞ヨリ免スルハ先ツ空心ニ合ホ

湯 鴨菊 橙皮 滷夫 藍ヲ沸浸トシ 細末トシ 燒酒浸トシ 温酒ニ

補服ス患者ノ好ミニ隨テ少ク砂糖ヲ加フ或ハ健胃ノ燒酒液ヲ加

入服スハ輕症ハ容易ニ治ス

○或ハ健胃茶水 茴香 蒟蒻 橙皮 肉桂 八十号劑ヲ一二七ツ

服ス以上ノ症ノ胃瘕ヲ速ニ治スルニハ次ノ方甚タ良シ

方

薊蘭菊水 卅四錢 八十号劑 八錢 肉豆蔻油 橙皮油ヲ

四二号劑ニ製シ一錢 右合シ一二七ツ服ス

○胃ノ運化惡ク酷烈液厚脂ノ食物滯積シ強ク心勞疲弱ヨリ  
免シ或ハ自然ニ嘔吐シ吐物不足ナルモ初メニ多ク温湯ヲ与へ後和  
カノ吐劑ヲ用ユル能ク粘稠液ヲ溶化シ吐出シ易ク胃ヲ清掃シ  
苦悶止ム若シ効ナケレハ薊葉浸ニ苦味ノ塩茶 卅一ツ 卅二ツ

茵陳塩等ヲ五八程用テハ胃ノ粘液汁ヲヨク溶化シ快吐セシム後胃ヲ健壮ニスヘシ

○積聚痛 粘凝雍盛ノ血アルヨリ劇疼スルハ胃瘕抽掣手振揺擣擣拘急失気昏眩男子ハ脾病婦人ハ子宮病アリテ発ス若シ劇盛ノ極ニ至レハ死スルコトアリ病原胃ニアラス必ス吐利ヲ用エヘカラス

治法ハ先ツ凝血ヲ刺絡通泄シ後驚痛鎮止劑ニ和解毒鎮劑

分利劑 廿一號劑 煇硝 丹砂 コニカヲ茴香 蘭菊 藿香

等ノ露氷沸湯浸ニテ送下スヘシ其間ニ鹿角精 四九号ヲ加ヘ

強クシ或ハ鴨菊ノ燒酒浸ニ百十四号ヲ加ヘ五六十滴ヲ服シ其上

ニ軟和用浴ノ劑鎮痛劑ヲ水銃法トシ催射シ外用スルニ鴨菊ニ

握ヲ煮寒裏ニ盛リ或ハ温乳汁ニテ胃ノ部ヲ蒸スヘシ速ニ胃瘕ヲ

和テ消散ス然レニ経久疲弱ハ急ニ治シ難シ

○熱病 蛇虫心腹痛ハ五篇ノ无寒胃熱病ニ乘発シ惡心呃逆ス

治法 大黃ニテ下利シ或ハカコアチヲ用テ後清涼和解毒劑ニ

テ血ヲ清除シ瘀濁ヲ去ルヘシ 胃瘕ノ症ハ胃ノ部ニ

蛇虫ヨリ及発スルハ明白ニ診察シ難シ誤治スヘカラス鑿法證治下

ノ蛇虫ノ章ニ安ス凡テ此症ハ巴旦杏油即効アリハ棧ヨリ十六棧

ヲ温服スヘシ

○諸氣痞塞 噎氣ハ胃虛消化シ難キ食物拘滯ニ由テ発ス譬ハ大豆

黎豆ニ豌豆 菘類 蔓菁 蘿蔔 堅硬厚脂ノ肉等ヨリ粘稠ノ

痰飲ヲ生シ増進スルハ強ク拘脹シ滋蔓シハカ利ノ路ヲ求ルカ為ニ

遂ニ遍身ニ弥リ苦悶困腦呼吸短促喘急等ノ諸症ヲ発ス○病原

ハ男子脾病婦人ハ子宮病アレハ滯血門脈腸胃ノ脉絡ニアリテ肝藏

ハ通暢セス血路ヲ失ヒ漸々凝滯シテ腸胃ニ瘕拘亦チ急ヲ生スル且

部衰弱し氣舒散セズ膨脹痞滿膈腹肺藏ニ及ハス終ニ胸腹苦悶呼吸促迫喘急腸痛病腸風病心腹痛頭痛頭眩昏回不寐等ヲ治ス

治法ハ以上両件ノ病原ヲ區別セザレハ方法各異ナルニ因テ大ニ害アリ前章ニ因ヨリ悉スルモノハ下劑ヲ用テ泄除シ後健胃強壯苦

味芳香ノ驅風劑ヲ用テ辟言ハハ七十号百十四号七七号劑ヲ

燒酒浸ノ鴨菊 橙皮 茴香 蒺藜 防風子等ニテ用ヒ或ハ砂

糖ヲ加ヘ或ハ末ニシ酒ニテ服シ或ハ橙黃皮 志村人參 蒺藜

茴香 藿香ノ露水 八十号劑 健胃水 三テ服ス

○他ノ原因ヨリ來ルモノハ刺絡シテ消除セザレハ軟化ノ水銃法ヲ施シ

或ハ下劑ヲ用ヒ後ニ驚痲鎮止劑 胃瘕病ノ劑ヲ撰用スヘシ若シ

良効ヲ得ズハ 五十号 五五号 六七号劑ヲ用ヒ血ノ凝塞ヲ

通腸シ腸胃ノ虛弱ヲ健壯ニスルモ分量ハ一分三厘ヨリ一分六厘

許ニ桂油砂糖ヲ加ヘ或ハ苦味茶州ノ紙茶ヲ加ヘ強クスヘシ或ハ

鐵性酸泉飲食良起居養生運動大肝要トス

○腸痛病 俗ニ脚氣衝心 諸疝衝心 又腸痛病十二篇瘕閉ニ見ユ

此病ハ腸胃縮腸薄腸ニ於テ劇烈緩和ノ疼痛一ツナラヌ胃瘕病ノ症

ヲ見シ燃熱刺衝瘕瘡搗苦悶煩燥疲脱シ是シキニ至テハ呻吟テ

痛聲撩乱回躁起立等尔後疲弱癱不遂復蘇ス○原因消化セザ

ル粘凝液痞氣結塞逸居厚味飽暖醜腐胆汁過溢ノ人性多怒リ

易キ人或ハ多血脾病經閉痔血閉此ハ血脉門脈ニ壅滯ニ運行セス腸

胃欬熱ニ因テ寒飲シ或ハ胃寒踈ニテ寒石瓦礫上ヲ行キ又ハ夏月果

瓜ヲ多食シ蒸氣ヲ壅遏スルヨリ悉ス

治法 諸ノ瘕閉ヨリ悉シ嘔逆嚔下得サルモノハ軟化融解スル風氣

驅散スル水銃法 鴨菊油 煇硝ニ蜜ヲ加ヘ灌射スハ大抵速ニ復ス

内服スルニ 大黃 硝石 梅膏 日露蜜ニテ汚敗ノ液ヲ通利スヘシ  
嘔氣ヲラハ多ク温湯ヲ与ヘ殊ニ薊鴨菊花ノ沸浸ニテ酷烈液ヲ  
吐泄シ疼痛ヲ鎮止ス然レハ阿片ハ用ルル勿レ

外用茶囊法ハ 鴨菊 茴香 防風子 志村人參子ヲ温湯及  
乳汁ニ苦意ヲ煮留ニ貼スハ鎮痛ス又下ニ拳ニ刺テモ効アリ

方

茴香水 鴨菊水 各七匁 燒酒浸橙皮 百十四号 各一匁

橙皮舍利別 四匁 毎服一匁

疼痛鎮止シハ茴香ト硝石竜且ヲ燒酒ニ浸シ十八号刺ヲ加ヘ五  
六十滴ヲ用ニ寒冷ヲ能ク防ク一肝要シ

膽汁腸痛病ハ

胆汁過多ヨリ發ス甚タ險惡シ先ツ勉テ驅除スヘシ大黃ヲ舍利

別煎劑トシ又ハ數々水銃法ヲ施シ刺絡ヲ行ヒ驚痲鎮止散ヲ鴨

菊水ニテ服シ又時々百十四号刺日巴且香油ヲ用ユヨク絞急ヲ軟

和ス分量ハ七十六匁ヲ温姜汁ニ入レ二三度モ服スヘシ

滯血腸痛病ハ

諸雍閉血痔血徑閉ヨリ發ス第九篇ニ詳説スト至モ先ツ辛熱走

竄驅風ノ劑ハ甚タ害アリ刺絡水銃法前ノ腸痛病ニ拳ニ刺驚痲

鎮止劑外傳茶囊法尤モ良功アリ

焮熱腸痛病ハ

腹中火熱燒クカカク疼痛発渴脉急數シ此症ハ前章ニ比スレハ甚

タ險惡シ第一多ク刺絡スヘシ若シ急シハ其害内藏ニ浸淫シ動

モスレハ危篤ニ至リ寒脱疽ニ變ス涼血ノ後ハ内部諸焮熱ノ劑ニ同シ

前條ノ如ク日巴且香油亞麻油及胆汁腸痛病ニ拳ニ刺テ他ノ茶



刮加へ八支十六支許ニ服スヘシ

○吾怪テ諸家腸痛病ニ於テ此焮熱ノ一症ヲ闕遺シテ敢テ論筆セヌ

諸虫病 小兒蛔虫篇ト後者トヘシ 腸胃一箇ノ疾病ヲ劇シキ諸症ヲ悉見シ

烈痛嚙蝕搦拘挛ヲ元痼瘦削シ死セスルヲ多シ大人ヨリハ小兒ニ

多シ○見症ニ腹中刺咬烈痛顔色灰枯青白色一然レ尺ノ如ク此ナラ

ス動モスルハ无病ノ人ニ是ク相似タルモノシ 腔中驚悸飽食異食良ヲ

嗜ミ口中異臭倦惰昏聩津唾溢滿頭旋掉眩暈中搔痒

休メス腹堅硬脹滿大便粘液水ノ如クヲ泄シ或ハ此病痼病熱病ニ兼

発ス又明症ハ蛇虫ヲ吐下ス

諸虫形状ヲ三種ニ別ツハ蚯蚓ノ如ク長ク圓シニ二遍ク幅アリ片々

相接シ宛モ瓢瓢ニ一ノ如ク連續スル一丈許リニハ是細小ナリ直

腸中ニ生ス是ク困難苦痒裏急急君迫ス其他名稱スヘカラヌ尚ホ茶

劑ヲ用ルニ就テ飲食良常ニ反シ異候アルヲ察シ諸見症ヲ詳ニシ殺

虫驅除スヘシ 治法 苦味ノ劑ニハ茵陳穂 石竜胆 臭香 菁蒿仁 穢那

單用シ麦酒 酒燒酒ニ合シ或ハ石葶根 芦薈膏 没薬ヲ末トシ芦

根 地錦苗 臭香 茵陳水ニテ服シ又ハ蜜ヲ交ヘ煉茶トス

第二ニ鉄劑良効アリ六七号 鐵性酸泉

酸味劑ハ丹元精 硫黄精百三号 廿五号劑ヲ前ノ露水ニテ服ス食

時ニ少ノ酒ヲ用ユルヲ大人小兒共ニ良ク

○水銀劑神効アリ尤モ良ナルハ水銀四支或ハ八支ヲ芦根 茵陳

地錦苗 臭香露水一斤ニ入シ半時ノ間煮断ヘス攪動シ硝子ニ貯

ヘ小兒少年ハ一匕ヲ服シ大人ハ二三匕ヲ服スヘシ尚ホ強クスルニハ

花蒿首加大黄ノ舍利別ヲ八支十六支ヲ加フヘシ或ハ水銀ヲ以上ノ加フ

乳汁ニテ煮小兒ハ日ニ三度一盃ツ、砂糖ヲ加服スヘシ此劑ハ若クナ  
ラス食物ノ如クシテ好シテ食シ易シ

○ 虫病ノ痼病ヲ兼ヌルニハ薔薇蜜ニ機那水銀ヲ加テ不治ノ症ヲ治ス

○ 日赤丹稱譽スル良劑シ意ニ隨テ散茶苦味紙茶丸トシ用ユ諸般

ノ虫病ヲ擇ハズ大人小兒トニ用ユハ尽ク殺虫シ驅出ス

○ 下劑ハ治法ハ以上ノ劑ヲ用テ三四日過シハ虫ヲ驅出ス其後甘汞丹ニ

苧薈大黃ヲ加テ丸トシ分量年行強弱ニ因テ用ユ

○ 吾考察スルニ凡テ此劑ハ大人小兒共ニ他ノ諸病或ハ他ノ病因ニテモ月

求丹大黃トハ号ヲ合製スル數々用ユハ虫巢結聚ヲ尽ク絶ス

○ 外用治法小兒少年ハ内服茶ヲ十八カニ用ユ能ハズ故ニ先ツ牛膽

苦瓜仁油 茵陳油 青蒿仁油ヲ腹部臍ニヨク摩手擦スヘシ古ヨ

リ稱譽ス

○ 直腸細虫乾酥ニ生スル虫ノ如ク直腸ニ巢結シ苦痒ニ堪ヘ難シ寤迫

絞急時々大便ニ下ルテアリ前ノ諸劑効ナキハ 胆八油 巴旦杏油

茵陳煎及油 菁蒿子 沒茶 水銀等ヲ水ニ煮水鏡法トシ灌

射スハ諸虫尽ク油類ニ堪ヘス速ニ死ス

○ 大便絞迫裏急後重直腸細虫ヨリ発スルテアリ或ハ酷烈尿燥熱

尿寔尿 皆小便淋瀝膀胱系淋 及小便閉ニ數々発スルハ膀胱ト直腸ト是

ヲ相近ク疑泣淋滯スルカ故ニ

○ 痢疾赤痢ノ酷烈毒痔疾ニ発スルハ汚濁ノ凝血カ直腸ニ聚リ膨

脹シテ自ラ通泄セシテ欲ス故ニ大便ヲ泄スルニ諸疼痛苦難絞迫

○ 治法 虫ヨリ及セハ前ノ治法ニ從テ酷烈尿ヨリ及スルハ和解スヘシ即チ

第十二篇ニ從テ膀胱石淋内痔盲痔ヨリ及スルモノハ本病ヲ治スルニ

軟和スル緩和用融スル乳汁水鏡法ヲ行ヒ空導法塩ヲ入セサル牛



婦人諸病第十七

惣論

處女寡婦未孕ノ婦人月經壅塞シ節度順調セザレハ微少疼痛ス  
或ハ少シ宛久ク通シテ休ニス或ハ強ク崩壞スルハ許多ノ重症ヲ云ス前  
ノ九篇ニ從事シ驅出劑子宮健壯ノ劑ヲ用ヒ脚ニ刺絡脚湯ヲ摩手運  
動シ再々順調スヘシ

○不孕ハ婦人而已ナラス多クハ四カ子ニ缺損アルコトアリ已ニ十五篇ニ論説  
ス然レモ四カ子毫モ缺損ナク健康ナルモノハ是必ス婦人ニ由リテ明ナリ疾  
病多ク稟受健康ナラス月經失常崩血白帶下子宮病陰莖狭窄  
自肉腫瘍刺ハ管卵巢等ニ損害アリ

治法 月經失常ハ八篇九篇ニ從ヒ白帶下其他血中ニ病毒アルハ十一  
篇ニ從ヒ尚良ナルハペーセル丸 カツサラス、 ホクホウト、 燒酒浸シ布

珀 臭香

致性酸泉 良効アリ 陰莖中ノ息肉等ハ外療法ニ因ルハ

之子宮卵巢刺ハ管等ノ害ハ明カニ説明シ難シ然レモ涌泉温泉

ハ他藥ニ勝リテ効驗アリ 其他種々ノ指的一ニ難キ雜症ヲ治ス古ヨリ磨

試スルニ年歳ヲ經テ孕ニサルモ此ヲ用ルノ後壞妊スルモノ甚々多シ

○孕婦諸症初月經行絶ス性素多血ハ此ヨリ諸症ヲ云ス先ツ不食異  
常ノ物ヲ嗜フ好ス此ヲ惡阻ト云惡心嘔噦倦惰眩暈失氣呼吸短促喘  
急痔疾諸泄血流產等シ 終月ノ頃ハ胎子胞衣盈大包胎ノ水液ニ胎兒  
浮漾ス故ニ母体ノ運動ヲ壅遏スルニ由テ足脚腫起瘰癧亦脈腫腹部緊脹  
痞悶絞痛腹中壅閉痞氣放化而便不利等

治法 初ニ腕ニ刺絡ス(粘液留飲多キ人ハ害アリ) 後蒸氣ヲ散シ  
汗利尿劑ヲ用ヒ脚ヲ摩循シ運動シ養生ヲ守リ強壯健運劑ヲ  
用ヒ怠惰逸居ヲ禁ス

初月ノ燕、飲食ニ意ヲ用ヒ嗜好ス、物ト至凡必ス度ニ過テスルヲ勿シ  
養生ヲ程好クシ、清稀ノ飲料ヲ服シ、動作急ルヲ勿シ、和カノ心胃ヲ  
健壯スル、刺芳散、驅風劑ニ酸味ヲ加ヘテ強クシ、用ユ、即 燒酒浸ノ  
橙皮或ハ、竜腦ニ百十四号劑ヲ加ヘ、或ハ首ニ号劑ヲ三四十滴ヲ加テス、  
性素寒性、酸味ヲ禁シ、健胃燒酒浸劑百四号劑、肉桂水酒ヲ良  
トス

多血ヨリ失氣、眩目呼吸促迫等、腕ニ刺絡ヲ數々行フ、  
度ニ越テ、壯實胃中ニ生鹿壞液ヲ見サハ、下劑ヲ用ユ、初月ハ用ユ、  
一膽汁過溢、吐ヲ催サハ、吐劑良ナリ、後強壯劑ヲ用ユ  
偏ニ酸味ニ異味ヲ嗜シ、土壘土ノ類ヲ食フ、酸敗液アリ、微ナリ  
和カノ土質劑ヲ用ユ  
酸味ヲ好ミ及、酸味ノ劑ヲ用ユ  
又塩鹹味及香料ノ食物ヲ欲スル、酸味ノ劑ヲ用ユ  
和カノ下劑ヲ用ユ、便チ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
兼症ヲ量テ、和カノ吐劑ニテ、粘稠液ヲ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
利ニ飲食、養生ヲ守ル、酸味ノ劑ヲ用ユ

妊婦強キ泄瀉、腹痛スルモノ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
流産ノ兆、酸味ノ劑ヲ用ユ  
底野加九号劑、殊ニ早ク大  
黄ヲ用ユ  
腹閉ハ、清稀淡潤ノ飲劑、茶湯、酸味ノ劑ヲ用ユ  
コレ、湯、麦酒、潤滑多液ノ食物ヲ  
与フ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
茶劑効ナケレハ、軟和融固ノ水鏡法ヲ施シ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
梅膏、旋那葉  
日露蜜、飲劑及、酸味ノ劑ヲ用ユ  
同、酸味ノ劑ヲ用ユ  
丸、茶、苦味下利、酸味ノ劑ヲ用ユ  
諸氣痞滯、酸味ノ劑ヲ用ユ  
腹肚絞急、刺痛、苦悶、呼吸短促ヲ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
免スルモノ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
前、酸味ノ劑ヲ用ユ  
条、酸味ノ劑ヲ用ユ  
同、酸味ノ劑ヲ用ユ  
及、酸味ノ劑ヲ用ユ  
元  
劑、酸味ノ劑ヲ用ユ  
破氣、酸味ノ劑ヲ用ユ  
驅風ノ胃劑、酸味ノ劑ヲ用ユ  
殊ニ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
燒酒浸ノ、酸味ノ劑ヲ用ユ  
橙皮及、酸味ノ劑ヲ用ユ  
精七十号、酸味ノ劑ヲ用ユ  
百十四号、酸味ノ劑ヲ用ユ  
七六号  
等ヲ良トス

小便閉、子宮充脹スルニ由テ膀胱ノ頸ヲ壓縮ス治法ハ先ツ垂突スル  
腹ヲ手術ニ由テ徐々ニ扶揚提舉セシムルハ通暢ス大抵尋常ノ良法  
ナリ然レニ昂効ナキハ 防風煨葱ヲ温メ陰器ニ布貼シ或ハ百十五号  
ヲ五十滴或ハ蘭芥防風水ヲ一盃ツ服シ或ハ此ニ桃仁苦巴且杏乳汁  
ヲ加ヘ用ユヘシ凡テ強烈ノ利尿劑ハ血ヲ沸熱シ墮胎ノ恐レアリ頑強  
ハ導水管ヲ用ユ

○ 腹脹ハ皮膜諸筋強ク緊脹シ胎子子宮盈充シ緊急ニ牽痛スルモノハ外  
用スルニ縫日弛柔スル甘巴且香油百合油新牛酪鷄脂鷲脂牛骨髓  
ヲ温メ塗擦スヘシ

○ 痔痛ハ清涼和解劑 驚痛鎮止劑 清稀淡潤ノ飲料ヲ用ヒ刺絡  
及十篇ニ奉ル劑ヲ外用シ或ハ煙草葉亞麻乳汁ヲ温布ニ浸シ貼スヘ  
治法ニ從フヘシ

○ 崩漏ハ必ス墮胎ヒトヲ恐ル故ニ是ノ危重ノ一症ナリト知ヘシ此ハ多  
血沸熱嗅香鬱怒苦神或ハ胞衣ノ弛緩破烈ヨリシ或ハ墮落打撲飛  
走烈シキ動作ヨリ発ス此ニ因テ疲弱ス速ニ効力強キ劑ニテ扶助セサ  
レハ必死スルモノナリ

○ 治法 血中擾騷等ヨリ発スルハ刺絡シ清涼新鮮ノ氣ヲ受ケ清涼  
和解ノ劑ヲ服シ催熱精烈盛怒ノ方支ヲ禁テスヘシ諸症崩血見シキハ  
百五号及白卷ヲ用ユ尚且他閉法劑阿片劑八篇ニ奉ルヲ用ユ流産ヲ  
防ク

○ 胞衣破綻弛開ヨリ発スル兆ハ以上ノ茶劑ニテ止ニス須臾ニ虛脱シ母子  
共ニ暴卒ニ死ス故ニ胎子ニ胞衣ヲ加ヘ生活死殺ニカ、ハラス精ノ念ヲ入  
レ引キ出スヘシ速カナレハ益良シ此術吾外科書ニ安論ス此ニ從事スヘシ

○流産六月満成セス不時ニ胎子弛緩産出ス尚続テ崩血シ胞衣下ラス  
是ヲ虚脱シ死スル者アリ故ニ先ツ泄血ヲ閉止シ精カヲ再ニ回復シ後胞  
衣ヲ引キ出シ穩静ニ安卧セシメ諸般ノ強壯劑和カシ固澁劑ハ搥棹  
肉桂水 葡萄酒水 心藏健壯ノ巴旦杏乳汁劑 清涼和解散茶ニ珊  
瑚及ハニ号滋補養汁赤酒ヲ時々服スヘシ

○預防法ハ崩血ナシト雖種々ノ見症ヲ顯ハシテ墮胎ヲ恐レ驚ハハ劇  
痛拘急腰痛シ子宮閉口セス風氣痞滯ヨリ発スルモノハ強壯健神劑  
破氣驅風劑ヲ用シ外ヨリハ燒酒ヲ綿布ニ浸シ布貼シ破氣ノ水銃法  
ヲ施シ穩静安卧セシムヘシ

○多血ハ初月ニ刺絡スハ忍怒勞役ハ和解鎮清劑 神強壯劑子宮  
衝逆兼発ハ子宮強壯劑或ハ瘧疾手ニ効アル驚痾鎮止劑強キ咳嗽  
ハ和消スルニ蘇合香丸阿片劑分量一厘六毛

○元冥熱赤痢ハ防キ難キモノナリ動モスレハ母子共ニ死ス能ク意ヲ用  
テ的當ノ劑ヲ与フヘシ子宮ヨリ崩血ヲ兼ヌルモノハ崩血ノ治法ニ  
從ヒ良トス

○以前ニ三度流産スルモノアリ血ノ過多ナルモノ多シ此ハ自然良能ニ  
テ血ヲ泄除フ要シ血而已ナラス子胎胞衣共ニ此ニツレテ脱出スル症ヲ  
防クニ二三月以前ニ腕ニ刺絡シ和解清涼散和カシ澁止劑珊瑚赤  
二三月モ用ヒ諸養生ヲ慎ミ強キ動作催熱ノモノヲ禁スヘシ  
○母子共ニ虚弱ヨリ発スル症ハ上ニ挙ル強壯健補ノ食料諸茶劑ヲ用ヒ  
血中惡液ヨリ來ルハ腹泄劑他ノ効驗アル劑ヲ撰用シ酸泉涌泉温  
泉ニテ良液トシ大効アリ

○難産胎子分晩ニ難キ其原ハ母体ト産婆胎子ニ在リ母体ニ在ル者子  
宮閉キ胎子催出煩居スレハ催生ノ精力不足或ハ陰器病害アリ或ハ

大便秘結ヨリス

○治法 催生ノ精力虚弱ハ内服スルニ強壯茶和カノ駈出劑ヲ用ヒ或ハ酒ヲ單用シ或ハ肉桂 肉豆蔻ヲ加ヘ冷飲温服シ或ハホレ井、 蘭菊 百合 肉桂 柳蘭 鈴蘭ノ露水或ハ真珠 肉桂 丁子ヲ四二号及舍利別ニ製成シ或ハ九四号ヲ加ヘ又強キ駈出劑ハ 鰻鱧肝ノ末蓬砂少シ 肉桂 没薬 百合花ノ黄粉ヲ半時或ハ一時ノ間ニ數々用ユ又時々香烈ノサホ精頭腦強壯茶水ヲ嗅クヘシ然レ凡是夕辛熱ノ強烈カ馳出劑ハ禁テスヘシ

○大便秘結ハ滑利ノ水銃法肝要ニ必ス遺忘スルヲ加ヒ

○駈出劑ヲ用ヒサレ症ハ程久リ子宮口閉澗セス兒胎順居セス成熟セス

○真ノ催生痛ニ非ス此症ハ具生痛ヲ誘起セシメ兒胎ヲ順居セシメ功者ノ産産産産産産ノ手術ニ因テ陰門尾骶骨ヨリ徐々ニ催生痛ヲ

増進スヘシ

以上ノ論ヲ研究スルニ各微細ニ區別アリ説者其機要ヲ草草ニ省過スヘカニ駈出劑ハ即チ催生茶ニテ此劑ノ要ナキ症ハ陰門ニ手ヲ入テ出產ヲ催スヘシ何者ハ催生茶ハ他ニ妨害アリテ出脱セサルニ用テ益ナシ但順產ノ催生痛不足ニ効アリ其他子宮閉カス順居セス兒頭大陰器妨害大便秘等ハ催生劑預カレ所ニ非ス

○臨産ニ於テ産婦精力ヲ勉強セサルモノハ勸告教諭ニ尚徒ハサルモノハ

○眞實ヲ以テ苦ケ或ハ謀偽シテモ能ク勉強セシムヘシ

○陰処ノ病患ニ因ルモノハ子宮口狭窄強硬ハ九テ初孕高年ニテ塚スル

モノ或ハ乾燥スルモノハ軟化溶解ノ塗茶尉蒸茶ヲ施シ具部ニ牛酪

油茶ヲ頻リニ塗リ或ハ蒸氣ヲ以テ蒸シ軟ケ指ニテ徐々ニ廣瀾シ遂ニ兒胎ヲ産出スヘシ



陰莖合着縮小腫瘍突肉小膜圍屏等ハ手術外科法ニテ除之シ  
 産婆誤術ニ因ルモハオク子宮開口ニ假痛ヲ早ク出脱セシムルノ策  
 ヲ行ヒテ(此ハ指ヲ探リテ真假ヲ弁スヘシ)種々ノ无用ノ精力ヲ費シ  
 大ニ疲勞ヲ為ス是レ天生自然ニ逆戻シ安産スルノナキニ依テ母子共ニ  
 死ス然ラザレハ諸般ノ危険ヲ免ス故ニ精密ニ意ヲ用ヒ苟モ疏忽ノ誤  
 療ヲ施スレバ勿レ常度正順ノ時節ヲ俟テ緩和徐々ニ術ヲ行フシ  
 胞衣下リ難ク子宮ニ固着スルモノハ必ス無理ニ強ク離スレバ勿レ若シ破裂ス  
 ル中子宮膨腫シ熱脱疽ヲ生シ危険ノ紫斑粟斑熱ヲ免ス如此症ハ四半時  
 ノ間穏靜安徐ニシテ具間手ヲ以テ子宮中ニ容レ置ケハ子宮閉塞セス  
 此ニ由テ胞衣自ラ大ニ軟緩弛解シ終ニ容易ニ産ス  
 胞衣膜破裂シ具氣漏泄スルモノハ速ニ引キ出ワレバ勿レ諸惡症ヲ  
 免ス

産後甚ク疲弱スルノアリ先ツ姜汁強壯健補ノ茶水ヲ用テ稍復  
 養穩靜ニ血ニ精力ヲ復スル中胞衣産後痛ニツレテ脱去ス然ラサルモノハ  
 手指ヲ以テ徐々ニ動搖緩解スヘシ  
 子宮口閉合シテ下ラサルモノハ前ノ駆出劑ヲ用テ殊ニイセルヲ良トス  
 胞衣久ク留ツテ下ラザレハ腐敗シ危険ノ諸症无寒熱紫斑熱ニ変ス  
 児枕痛ハ全胞衣又ハ碎片或ハ惡露凝血留滯熱風急痞滯或ハ腹帶  
 ヲ速ニ固縛セス保護ヲ急リ冒寒スル等ヲナス  
 治法ハ清稀ノ温飲薑汁姜酒ニ泊夫益 鴨菊花 志村人參子 茵  
 陳穂 橙皮黃ヲ加ヘ服シ或ハ燒酒浸トシ單用ス或ハ百十四号劑ヲ加ヘテ  
 強クシ或ハ七十号劑 日也且杏油等  
 若シ壯熱ヲ兼発スルモノハ和解鎮清散 蝦石 仙手相汁 丹砂 煇硝  
 泊夫益 清涼和解ノ飲劑ヲ用ユ

諸症疼痛劇烈ノ軟和融解スルニ破氣驅風水銃法ヲ施シ風氣驅散劑 温乳汁 鴨菊ヲ茶囊ニ製シ腹部ニ布貼スヘシ

惡露雍塞滯便秘ハ程好シ和カナル下劑ペリル丸ハ害ナシ強キ下劑ハ禁スヘシ

胞衣ヲ強テ出スヨリ炊腫危險熱ニ至ルモノハ下ニ詳説ス

○産後熱病ハ惡露雍塞日冥心勞胞衣状産セラル等ヨリ起原ニ外部ハ糸斑粟斑熱内部炊腫熱ハ胎助肺藏頭腦咽喉肝胃子宮乳房等ニ発ス

治法ハ他ナラス无寒熱病炊腫熱ノ如シ或ハ子宮炊熱痛ヨリ熱脱

疽ニ変スモノハ 葎蕪根 白蜀葵根ヲ強キ一呎汁ニ酒ヲ交ヘ煮

温貼スヘシ或ハ鴨菊草 蔓後菜 梅骨花ヲ酒又ハ乳汁ニ煮ハツ

カ、貼茶ト為スモノ良シ多血惡露尽キカハ脚ニ刺絡シ後和カノ驅

○乳熱ハ産後三四日ノ内ニ発ス此ハ自然ノ精力ヲ假リテ蒸発スヨリ及ヒ

汗セシメ或ハ和カノ発汗劑凝固ヲ稀薄ニスル劑ニ手分利通散スヘシ或

稀キ食物少シツ与ヘ数々小兒ニ乳汁ヲ吸シシムヘシ乳汁与ヘサレ

婦人ハ食ヲ減シ発汗劑ヲ用ユ若シ乳汁過盛ハ徐々ニ絞り出シ此ニ

由テ凝固セス

○乳房炊腫ハ大抵乳汁凝泣實氣ニ觸レテ発スモノ也

治法ハ兒枕痛ニ拳ニ発汗劑ヲ搗用シ外用ハ分利劑 燒酒ニ竜腦ヲ良

トス尚乳汁ヲ数々小兒或ハ幼狗ニ吸ハシメ絞り出スヘシ然レバ潰瘍トナ

リタルモノハ速ニ軟化スル劑ヲ貼シ膿熟セシムヘシ速ナル程愈々良ナ

リ而排膿ノ劑ニテ淨刷シ終リニバルサニ劑ニテ癒スヘシ

○乳頭毀傷腫痛ハバルサニ劑 鷄卵油 蜜蠟 檀植汁ヲ塗リ桃



小兒諸病第十八

治法大意

古昔ヨリ小兒ハ最モ治療シ難キヲ歎ス何者ハ自身ニ詳ニ病状ヲ説クヲ能ハス且主意トシテ考ル所ノ患処何レニアリト云フヲ知ルキ様ナシ故ニ精密ニ診察シ膏灸並症ヲ考ヘテ勉テ推類思索シ切實ニ安知セサレハ治ヲ施スヘカラス

大便閉腹痛不寐黃疸痢病

初生ハ腸中ニ母体ヨリ持來ル所ノ汚物アリ此ヲ黑便ト名ク速ニ泄除セサレハ腹痛絞迫切痛啼叫休ニス呃逆黃疸不寐煩燥驚悸驚痲痛瀉等ヲ免ス速ニ救治セサレハ多ク死ス

諸初ノ症病原治法他更ナリ一ナリ腸胃ニ懸滯スル汚物ヲ和カノ下劑ニ依テ驅出清除スルシ

其母ノ初出ノ乳汁稀薄水ノ如キヲ嚥レシムレハ尤モ能ク泄利ス然レ

比高貴或ハ病患ニ因ルモノハ乳母ニ託シ六時ノ間乳ニ就テ且間ニ二

度日承丹ニ大黃ヲ交ヘ与テ下利スレモ尚兼症ニ隨テ末リニ蜜ヲ加ヘ

萬首根加大黃ノ各利別ヲ与フ或ハ乳汁ノ水銃法ニ燕麦粉ニ蜜石

鹼ヲ加ヘ或ハ月巴且水ヲ單用シ或ハ花糖ヲ加フ是ヲ良劑トシ

大便風氣痞滯腐敗乳汁及酸敗ヨリ及元スルモノハ土質利ニ天恩液ヲ

吸收消化スレ即チ牡蛎蝦石珍珠母茴香ヲ用ヒ諸症在萬トシ

退カス増進スルモノハ母体ヲ下利ニ諸酸味ヲ禁スレシ

證候ハ乳汁ヲ多ク飲ミ或ハ煉リモノ類胃中ニ停滯凝固シ及元スルニ

ノ六時々綠色ノ大便ヲ泄ス其香酸臭惡心嘔噦腹痛浮下痞氣心悸

驚怖冒寒喘息驚痲搐搦煩燥不寐夜啼睡中與寤終リニ反張

搐搦手竄

○治法ハ先ツ初ニ下劑ヲ用ヒ後消化セサルノ不熟ノ液ヲ去リ前ノ一篇ノ劑ヲ上ノ土質劑行氣驅風劑自巴且香油或ハ九一號八九號劑ニ天靈蓋ノ末其他酸壞液ヲ和鮮消化スル痲病瘧疾ニ大効アリ劑ヲ用ユ或ハ鉅蚓ノ末 鹿角精ヲ内服シ又時々外用スルニ鼻中ニ嗅キ顫顫ニ摩擦シ或ハ腹部ニ驅風ノ油ヲ貼スルニ

○睡中驚悸ハ瘧疾ヲ驚痲ヲ発スル前兆ト知ルニ此ハ酸烈ノ物アリテ睡中ハニ侵襲ス且夕惡症ナリ尚危惡ナルハ興寤ノ時ニモ発ス幼兒ハ前久ホノ因ヨリ発ス稍成長ハ此虫ヨリ発ス第十六篇ニ從ヒ治スル

○不寐夜啼ハ腹痛便秘風氣痞滯ノ病因治法ニ同シ下劑ヲ為スノ後ハ自巴且香油四錢ヲ用ユ尤モヨク絞急切痛ヲ緩解ス且夕良効アリ若シ諸藥劑ニテ鎮止セサレハ散馬廂搗搗ヲ発ス且ツ百八號 苗香白合製ノ磁砂 鹿角精 九二號ニシテ燒酒浸ノ香狸ヲ加ヘ五六滴ヲ用ユ

阿片 底野加ハ此病ノ至極ニ至ラサレハ毒リニ用ユエカラス 乳婦ハ酸味苦寒涼風氣ヲ生ユル食ヲ禁シ下劑破氣驅風劑七十號劑其他瘧病ニ効アリ劑ヲ用ユ

○呃逆ハ是夕衰弱シ及酷烈酸壞ノ物胃ノ上口ニ伏留シ此ヲ膈膜ニ加ヘテ瘧疾ヲ

治法ハ土質吸收劑良トス 珊瑚 鹿角霜 苗香末及油丁子油肉豆蔻油若シ治セサルハ夜ニ於テ底野加三重三毛ノカコアチヲ用ヒテ粘穢液ヲ涌泄スル

○鴛口瘡ヲ病原ハ委ク數明矣知シ難シ然レ凡諸液格別ノ汚濁アリテ發ス母体乳汁ヨリハ発即ス輕症ハ消除スルニ重症ハ舌ノ拳動ヲ妨ケ吸飲スルニ能ハス口内唇齒新頰ノ裏面舌頭咽喉胃管諸腸ニ至ル迄白色小泡ヲ漫生シ煩躁擾悶疼痛壯熱呼吸促迫ス故ニ是夕危險ニノ動モスル死ス

治法ハ先ツ其腐敗浸蝕スル酷厉毒壯熱ヲ和鮮驅除スニ花萵苣根  
加大黄ノ舍利四錢ニ三厘三毛ノ日永丹ヲ加ヘ和鮮清涼ノ散劑飲劑ヲ  
服シ内熱ヲ撲滅スニ

外用サレ者タル蔓菁絞汁 拒植汁ニ砂糖著薇蜜及水或ハ紫蘇  
水ヲ察ニ交ヘ或ハ桑椹汁ニ少シ丹丸精ヲ加ヘ或ハ没藥油ニ少シ砂糖  
蜜ヲ加ヘ數々口中ニ塞リ清洗スニ乳婦ニ下利セシニ大黄ノ舍利  
別吸收土質劑ニ仙手相汁醋茶湯稀キ麦酒ヲ服スニ

大人ニ灸スルニ大黄精 睡菜燒酒浸鱗礦ニ九三号水燒酒ヲ交ヘ  
或ハ和カノ灸汗劑及壞血病ニ効アル劑ヲ良トス其他外用菜前同  
皮膚目濕爛陰必鼠鼯頸頂腋ノ裂折ノ所尤多シ此ハ大抵汗尿ノ目也  
苛烈ナルヨリ汚敗浸蝕シテ搔痒摩傷ニ嫩痛啼叫不寐煩悶ス  
治法ハ温湯ヲ數々洗滌シ後チ 白聖 角石 官粉 鉛白霜

或ハ等ヲ撒シ或ハ竜腦膏或ハ白丹若 丸カ 清水又ハ車前水ナシ多シ洗滌  
時々洗ヘハ能ク乾燥シ癒ス良サ

鼻孔窒塞ハ粗凝粘滯ニ因リ是キハ呼吸蒸乳ヲ妨ケ煩燥啼叫休ニス  
又是ノ困難ス此氣息吐納ノ緊要ナルハ此ヨリ諸難症ヲ生ス  
治法ハ其粘固滯液ヲ下劑ニテ驅泄シ後ニヨリ水ハ麦 白丹丸 三厘  
合シ外用スヘシ又方 ニヨリ水ハ麦 白丹丸 野胡瓜 絞汁三厘三毛

右調勻シ鼻中ニ小羽ヲ以テ塗布ヘシ此劑ハ噴嚏セスヨリ粘液ヲ分利  
開通ス或ハ日巴旦香油 ニヨリシ滴油ヲ鼻孔及鼻根ニ塗シハヨク粘液  
ヲ分利シ鼻孔ヲ開通シ呼吸ヲ通利ス

頭瘡面部ニ浸淫スルモノハ血中汚濁酷厉毒アリテ自然ニ誘発ス此就テ  
諸惡瘡ヲ兼発シ搗搗瘡亦手喘息ス又一種母体乳母ノ病毒或ハ多年瘡  
惡消化セサル飲食忌林示忌ヲ故ニニシ養育惡ク或ハ的要セサル外傳菜

ニテ内攻シ黒色ニ変スレハ一箇ノ危篤ヲ覺スニ至ル

治法ハ自然通泄ノ道路ニ隨テ除去スニ先ツ血ヲ清除スルニ下利五劑

ヲ用テ腸胃ヲ清掃シ和鮮鎮清之後皮表熱氣ヨリ悉ク散ル内

服茶肝要ノ即チ母子共ニ毎朝二度十八号劑燒酒浸ノ地錦苗

六一号百十六号琥珀丹砂

癩毒毒并発ハ下劑ニ日求丹ヲ加ヘ用テ内伏階液ニ黒色ヲ催サハ速ニ

九二号劑ヲ温湯入シ頻リニ服シ毒ヲ再ニ驅出シ温暖保護ニ好キ乳

母ニ託スルニ

外用茶ハ好テ用ルニ非十分ニ内服茶ヲ施ス上至元頑固ノ症ハ患者

ニ醫師モ目退屈スルニ至テハ具瘡ヲ軟化シ潰爛ヲ癒スニ鶏卵油无

塩牛酪半髓液乳汁脂膜等ヲ良トス

咳嗽喘急促進ハ寒氣ニ日觸シ不正瘴氣ニ中リ蒸発氣ヲ遏止スル

ハ粘痰咽喉氣管ニ留結シ熱ヲ兼発ス

治法 最初ハ程好ク下利之後和カノ発汗劑ニテ血中ノ酷厉液ヲ分

利スルニ或ハ胸肺劑ニ冰糖ヲ加ヘ母子共ニ用ルニ或ハ十八号劑

茴香油 硝砂ヲ單用シ合製スルニ其間ニ蘇精 蘇荅 胸肺散等ニ或

九二号 花硫黄ニ重シモヲ加ヘ強クシ或ハ單ニ 日巴且杏油 蝦石 泥

苜蓿根 氷糖ヲ紙葉下シ或ハ胸肺茶水清涼飲ノ類ニテ用テ之

窮迫是キモハ硝砂精 九二号劑ヲ滴服スルニ粘痰胸中ニ溢滿スル

モノハ百十号 百廿七号ノ吐劑ヲ一重六毛許ヲ用テ数々死ヲ救フ終リ

ニ水鏡法ヲ効アリ

○泄瀉ハ乳汁停滯スレハ腐壞シテ酸烈ノ液ニ變シ或ハ胃寒スレハ蒸発氣

ヲ遏止鬱滯スルヨリ自然ニ催発シテ其過多ノ汚物腸中ニ刺攻スルヲ通

泄セシメテ大便ヨリ泄スルモノ

治法ニ大人ノ泄瀉ト同シ初ニ害ヲ為ス患液ヲ泄除催進シ後強壯  
健補助及程好キ收法利ヲ用ユ

○方 大黃ヲ燒酒浸トシ舍利別トシ分量程好ク用シ泄利止ムニハ  
又患液ヲ患液ニ復スルハ土質緩和收法ノ利ハ 珊瑚 鹿角霜  
山水晶水晶類ヲ用テハ能ク煎氣ヲ催進ス母子共ニ服スル良トス

○強烈ノ症ハ前ノ散茶ニカスカリカスカリ皮ニモ（性温暖收法ノ功アリ）  
ヲ交ヘ單服シ或ハ機那ノ沸浸ニ車前 茴香 肉桂 檀植水ヲ  
溶化シ隔服スヘシ

○外用腹部ニ肉豆蔻膜油 健胃油 驅風油ノ類ヲ塗ルハ  
利尿 生氣凝固ノ乳汁腎膀胱頭ニ瘰癧塞スル衰弱麻痺ニテ瘰癧  
ノ運動疼痛搐搦抽刺キノ症ヲ免ス

○治法ハ疑固ヲハカ利シ衰弱ヲ健運シ通利ヲ催進シ瘰癧キヲ軟化緩  
解スルニ瘰癧鎮止ノ劑ヲ良トス初ニ北一号 九二号 塩劑ヲ一厘六毛ニ益  
母子等ハカニ加ヘ單用シ或ハ苦巴且杏桃仁絞汁及蘭芹 防風 竜  
葵水ニテ服スル瘰癧キ驅尿ノ良劑

○外用腎部ニ滲透ノ油系ハ 全蝎 杜松 烏珀 茴香 皆油 煨葱  
蒜 防風 蘭芹ヲ煨シ腎部瘰癧處ノ辺ニ温貼摩擦スヘシ石淋ニモ効  
アリ若シ治驗ナキハ導水管ヲ用ユ幼女ハ尿道短廣ニテ男兒ヨリ  
施シ易シ尚此症十二篇ニ詳説ス参考スヘシ

○齒牙唯出ノ見症大抵七八月ヨリ経ルノ頃ニ発ス麻急数啼叫疼痛齒  
新腫起焮熱不寐腫中驚悸壯熱瘡瘡搐搦ヲ免シ數々斃スルモノア  
リト雖モ明カニ矢別シ唯シ何者ハ如此ノ見症他病多キヲ以テ是ヲ疑似  
錯誤ス故ニ初生ノ篇ニ大意ヲ述ルカ加リ區別シ難シ

○聖靈察スルニ強ク啼叫スルニ因テ痛ムヲ知或ハ頻リニ指ヲ口中ニ入テ瘰癧



乳頭他人ノ指ヲ入レハ顎ニテ強ク咬ミ唾涎糝ノ流池シ或ハ齒牙稍  
萌出し或ハ新稍隆起凸凹平等ナラス下利スルハ閉結ヨリ佳トス  
○治法ハ齒牙出脱ノ他ナシ故ニ齒斷ノ堅硬腫起ヲ軟化分利消散シ  
壯熱ヲ清解スルニ清涼和解ノ散ヲ

外用ハ鷄冠血 日巴旦香油ニ薑々菜汁 美人草ノ含利別ニホク丹各  
精ヲ加ヘ酸收トシ敷ニ塗リ徐々ニ摩擦スヘシ具間ニ堅滑琢磨シタル  
角牙 帛珀 珠母ノ類ヲ子へ常ニ嚥シムヘシ或ハ連ニ亮露セコトヲ  
要セハ銃利ノ小刀ヲ以テ潛伏ノ牙ニ向ヒテ斷ヲ損ニ切リ露スヘシ  
危險ノ症ヲ免ル

○搗搦 母体腸中黒便腐敗酸壞ノ乳汁前二篇 齒牙唯出前条 痘瘡見  
魚成長兒ハ蛇虫ヨリスモノハ牙十二篇ニ詳説ス  
治法 鹿角精 九二号劑ハ此病ヲ治スルノ最良神效強壯劑ニ時

々數滴ヲ内服シ或ハ頭部懸鬚皂孔ニ塗ルヘシ或ハ前ノ二章ニ參  
ル土質劑 五五号 九一号 八九号劑

○便秘ハ下利ノ水銃法或ハ吐劑ヲ泄除シ後茴香末大黃水内飲外  
用ノ行氣驅風劑健胃劑ヲ用ユ

○眼目嫩腫ヨリ膿爛シ玲瑯角膜昏暗ニ連ニ治セサレハ七日又故ニ尤モ危  
險ト知ヘシ母体乳汁ノ酪腐液壞血病或ハ癩毒ヨリ生スルモノハ母子共  
ニ諸養生ヲ守リテ導泄下利法又ハ血ヲ清掃スル劑ヲ良トス

治法 日赤丹 十八号 赤ツノホウト 赤ツサラス、ヲ燒酒浸トシ煎  
劑トス又亮汗劑ハ蝦石 帛珀 四八号 敗將四根 茴香 蒔蘿木  
外用眼科水ハ凝泣滯止ノ血ヲ分利スルニ良効アリ即チ 伊吹コシ  
草 蘆蒿 敗將四 蒔蘿 紫菀等ノ水ハ多ニ白丹凡或ハ鉛白霜  
三層三毛 竜腦 一層三毛 胎瓜仁絞汁或ハ竜腦精一匙ヲ入ヘ或ハ具菜水

ニライグウイツト 鑄物師ノ竈上ニ着ク薰烟凝固木粗皮 或ハ芦荻曾ヲ加ヘ吾ハ此

症ニ日永丹少シテ加フ若シ頑強ノ嫩腫ハ芫菁膏ヲ頭部及腕ニ貼ス

眼点ハ前ノ水ニ百九号 百十号 割リ少シ許交ヘ一宿浸シカキ

チ頻リニ洗滴スヘシ或ハ白点ニ嫩腫ヲ煎スルハ以上ニキル割リ施シ而シ毎

日二三度蠟蛇脂或ハ鯨精ノ稀キモノヲ点スヘシ新発ハ能ク消散ス瘡

毒新スル日永丹ヲ用テ下利スヘシ径久ハ容易ニ治シ唯シ

○蛔虫 十六高大人腸胃諸虫等ト係着スヘシ ハ鹿凝粉麵諸肉乾酥砂糖糖具他消化シ唯キヲ食

シ身体衰弱寒冷留飲多キヨリ腸胃ニ蛇虫ヲ生スルヨリ是又險惡ノ

諸症ヲ発ス形状大抵蚯蚓又ハ匾輪乾酥虫ノ如シ

症候ハ眼胞團青色深ク陥リ鼻中搔痒摘撮腔中驚悸口中惡臭

噉咬腹痛雷鳴惡心嘔逆下利泄瀉眩暈失氣顔面灰白脉軟弱

次序定ラス結促啼叫発熱瘦削摘撮或ハ乳糜輸化ノ精液ヲ大集

食スルニ由テ時々飢食飽カス懈惰疲倦便秘等ノ諸症ヲ発ス治法

大人ト一般ノ故ニ此ニ奉ケス

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

諸毒考十九

總論

蓋し諸毒ハ諸書ニ遺漏シテ載セス然レモ吾按スルニ諸毒ヲ堅識シテ  
病ヲ治スルノ大要系要ニ醫家タル者ハ預メ通知セサレハ危險ヲ誤テ性命  
ヲ失フニ至ル品類繁多ナリト雖モ常ニ性効作用ヲ究搜シテ的用途ハ  
是ヲ効驗ヲ美ス良薬トナリ又此ニ反シテ功アル良薬モ毒ニ投シ的  
當セサレハ毒害スルノ常ニ多シ

毒性ハ刺咬毒 創毒 烟毒 臭氣等ハ須臾ノ間或時日ヲ過キ驚異ス  
ヘキ惡症ヲ発シテ癡絶死ス

諸毒區別

第一 急死毒 漸死毒 死毒

第二 腐蝕穿壞毒 火熱腐爛毒

第三 酸毒 灰汁様毒

第四 閉塞毒

此ハ微細脉絡ヲ閉塞シ諸病ヲ発スル毒ノ各門ニ詳ク

第五 催腫毒 麻痺毒

第六 金石毒 生植毒 活物毒

第七 製成セリル自然毒 又銷煉術ニテ製スル毒 其他ハ金剛砂 水晶

硝子 小刀尖 針等ノ銳利ノ物誤テ吞ムアリ腸胃中ニ入ルハ害

傷ス成製スル内ニ於テ酸烈ナルモノハ 硫黄精 丹丸精 蝕銅水

剛汞 日汞 磷礦

植物毒

烏頭 黎芦 龍骨木 大戟 日逐等ハ浸蝕滲透穿入毒火

熱腐爛毒アリ

凝結閉塞ノ是キ睡麻毒

煙草 芥葉鈎吻 曼陀羅華 藜蘆 阿片等ノ解毒セシ  
廣ク求メ詳ニ考テ施用シ救フヘシ

以上ノ説ク毒類ヲ誤用スルハ初ニ咽喉腸胃ノ脈絡神経ニ附着シ息  
ヲ穿透腐蝕シ大熱燉腫劇痛惡心衝逆疼痛亦急嘔吐呃逆眩  
動水血膿ノ惡臭ヲ下利スル等ハ毒ノ形質強弱ノ次第ニ因テ一般  
ナラス或ハ血中ニ滲入シ沸騷スルハ諸藏ヲ刺透シ物身ニ布滿シ心  
動脈呼吸神氣ニ浸入シテ擾亂譫妄心煩悶亂寒熱脫疽ヲ生シ直  
チニ死ス

治法ハ一般ナラス酸毒ハアルカリス劑ヲ用ユアルカリス毒ハ酸收劑ヲ  
以テ緩解驅消スヘシ

酸毒、 硫黃 丹礬 白礬 焰硝 皆精シ 鈇銅水 磷礦  
諸剛柔丹ノ類 鉄 銅 銀

アルカリヲ實ノ毒ハ凡テ辛辣燉熱ノ味アルモノト知レシ便チ

斑猫 无血虫類ヲ内服或ハ虫獸ノ刺咬 烏頭 附子 藜蘆

梅景草 芥葉鈎吻 大戟 日逐 竜骨木 白前 野

胡氏類 毛茛 石竜芮 威灵仙 煙草 毒菌 綿束

兎球根 山慈姑 水仙類 南星 半夏 劇チ吐下劑 其他腐

壞シタル胆八油 巴旦杏油 牛酪 豚肉自余

閉塞毒ハ 石灰類 鉛製劑 銀蜜陀 无名異 錫製

諸物ノ煙蒸氣ヲ吸引シ未熟收斂浸瀋ノ諸果 亞麻仁等ヲ過服

シ毒ニ中ルモノハ治スルニ難シ然レハ急疾ナラス漸長遲緩シ

催腫麻木毒ハ 阿片 煙草 竜葵 曼陀羅華 ホンドストグ

節草 ホウフ草 天麻 燒酒自余諸催醉ノ物ハ皆其中ニアル

カリスノ悍烈風化走竄ノ塩硫氣アリ然レハ前ニ奉ル諸毒母ノ加ク強ク

。大

浸蝕穿壞セヌ血ノ運行ヲ過盛ニシ欣揚悅樂セシノ精力ヲ揮発ス然リニ至テハ腫脹ヲ嗜欲シ神意衰乏シ知覺ノ作用ヲ失シ諸毒瘡瘍如キヲ発シ其毒消スルハ再ニ故ニ復ス

治法 諸般酸收ノ類 醋 仏手柑汁 酒石塩ヲ良トス

活物毒 蝮蛇 蝎 蜘蛛 蜂 蛇 狂犬等ハ毒烈ノ唾涎カ齒ヲヨ

割口ニ穿蝕シ血中ニ傳流ス然レ種々アリ一ツナラス蝮蛇 狂犬等

ハ驚異スヘキ症ヲ発シ神志沈重晴明ヲ増シ水ヲ恐ルハ大危症ト

ス或ハ斑猫ヲ内服シ発泡茶ニ多ク用テハ膀胱火熱シ便血劇痛ス

其他无血虫ニ多クシ或ハ河豚害ナトト雖凡具子卵ヲ食スルハ腹痛吐

瀉ノ諸症ヲ発ス或ハ水蛭ヲ誤吞スルハ食道胃中ヲ害傷シ吐血ヲ発

シ死ス

○ 中毒見症ハ食後服薬ノ後俄ニ驚怪スヘキ胃脘腸痛烈シク吐瀉シ

テ霍乱ノ如キ諸症ヲ発シ諸部精力奪脱シ心中大ニ悶乱苦喘呼吸

促迫咽喉異常ニ烈キ火熱ヲ発シ失気昏眩心鼓動顫振腸胃劇

痛惡心嘔吐顔面死者如ク唇舌青蒼指爪黧黑頭搖上竄直視

シ譫妄躁乱冷汗額上顯顯ニ見シ

穿蝕火熱ノ毒以上ノ諸症ヲ兼テ終リニ水血ノ如キヲ下利シ腹肚

膨脹ス

アヒカリセ毒ハ前症ヲ兼テ舌上咽喉胃中烈シク炎熱シ腸中寒

熱脱疽ヲ生シ是ヲ惡臭アリ必死トス

烏頭 芹 藥 鉤 吻 曼陀羅 華 等ハ精神錯乱搐搦牽引ヲ発ス

諸般麻薬ヲ用ルノ後ハ狂笑飛躍痴漢ノ状体ヲ為シ終ニ昏睡シ

瘡強拘挛トス

○ 諸毒作用ハ面黄質ニ由テ具毒ノ觸ル一一般ナラス各異アリ故ニ毒傷

ヲ受ルニ多少微甚アリ急卒ニ死スルアリ或ハ中毒後病患ヲ残スリ  
但一二度嘔吐シテ止ムアリ或ハ同器ヨリハ分テ服スニ又口異不同アリ

治法毒ノ性質明矣スルハ肝要トス 銷鍊毒ニ強ク觸レテ胃ヲ劇ク穿  
蝕スルモノハ急ニタタク温湯ヲ服シ早ク吐泄セサレハ死症トナリ荏苒  
トシテ治セサルニ至ル

中毒モ胃中ニ油膩石子脂ノ食物飽満スルハ穿蝕害傷少ナシ空虛  
ナレハ急烈ク

○中毒明ニ知サルノ治法 諸毒品類是ヲタタシト雖凡古ヨリ烈キ毒ヲ緩  
解スニ温湯ヲ多ク服シ吐スルヲ最良トシ大ニ解毒ノ功アリト称ス速ニ涌  
催セサルモノハ咽ニ指ヲ入レ或ハ烏羽ヲ咽ニ摩手スレシ又殊ニ胃中刺蝕穿透  
切痛是ヲ劇キモノハ醋烈毒ヲ和解スニ凡テ粘滑脂油ノ類胆ハ麻  
罌粟仁 日已且香油 牛酪等ヲ四匙ヲ單服シ或ハ温湯ニ和シ或ハ大麦

燕麦ノ粘汁乳汁ヲ多ク服シ頻リニ吐下スレシ或ハ此劑ヲ水鏡法トスレ  
シ終リニ虛弱スル者ハ強壯健補劑滋補ノ飲食羹汁酒ヲ良トス

○中毒ハ明ノ治法ハ其毒ノ品質ヲ察シ腸胃中ニ留滞スルモノハ煎茶  
ノ吐法ヲ施シ後解毒劑ヲ用ユ

○酸毒治法ハ脂油ノ煮汁温湯ニ入レカリセ 劑ヲ交ユ即チ  
酒石塩及油 五ハ或一匙 ポツトアス 酒石塩燒法 山水晶 蝦石 牡蛎壳

珊瑚等ハ疼痛ヲ消ス 剛汞丹ノ毒ハ乳汁ト油類ヲ多服シ効アリ又下ノ方ハ嘔吐切痛諸惡症  
ヲ消除ス

方 白蜀葵根 松浦肉桂ノ煎汁 鴨菊水 各七四匙 赤石脂 下四匙  
大黃精 八匙 山薑末 舍利別 七匙 酒石油 二匙  
右温ニシ四半時ノ間ニ二碗ヲ服シ其間ニ乳汁 酒石油 二匙ヲ交ヘ

服し疼痛緩和セハ他ノ劑ニ底野加テ温燒酒竜腦等ヲ煎セテ  
シ腹部ニ貼スヘシ腸中劇痛ノ後和スル水鏡法ハ乳汁蜜油蒲桃  
汁 日露蜜等ノ下利劑ヲ用ユ

○アムカリス毒ノ見症ハ食道内藏ヲ浸蝕穿透焮腫シ見タシキニ至テハ  
意識ヲ攪乱ス

治法初ニ温湯ニ胆ハ油ヲ用ヒ其間ニ古ヨリ諸家稱譽スル解毒劑ハ酸  
收ヲ酢精好ノ醋ニ水ヲ交ヘ或ハ夏月ノ果類酸味液汁類ハ瓜  
相香椽橙 覆盆 小檗 酸櫻實 酸棗 柘榴ノ類ニ砂糖或ハ  
蜜ヲ加ヘ或ハ舍利別トシ數々多ク服スルハ醋烈ノ毒ヲ及ク消除ス

○蝕銅水百十三号ハ平全ノ人多ク服スルハ一箇ノ毒芽シ然ルニ多ク  
水ヲ交テ淡稀ニテ服スルハ最良ノ解毒劑ト古昔究理學者ノ  
說ニ就テ毒ヲ以テ他ノ毒ヲ殺ス理シ人必ス怪ル勿レ

芥菓鈎吻ノ毒ヲ解スルニ強キ吐下ノ効アル劑ヲ良トス吐吐ヲ催起  
セシムルニ油好酒 百十号劑或ハ丹丸精 梅膏 製酒石塩

牛酪 乳汁ヲ他ノ舍利別温湯ニテ多ク服スルニ諸症消除セハ強壯  
健補助ニ底野加テ用ユ

○閉塞毒ハ稀薄分利驅出スル劑温湯牛酪清涌泉開通溶化ノ塩菜  
鉛毒ハ水銀ヲ用ユルハヨク溶化ス

○水晶石類ハ凡テ粘滑油脂ノ糊類末蕎麥ノ煮汁 乳汁劑ヲ多ク  
服シ其毒ヲ包摂シ除クヘシ

○石灰類ノ毒ハ温湯油牛酪ニテ吐セシメ後粘滑劑ヲ用ヒ其間ニ下利  
ヲ与ルヘシ

○昏腫麻木毒ハ意識ヲ攪乱ス内服百十号劑及前ニ尖キル吐劑醋劑ヲ茶  
湯ニ用ヒ多血ハ刺絡ヲ行ヒ後醒覺劑ヲ用ヒテ効ナキハ昏腫篇ニ從事

スレ

外用ハ走竄揮発劑 温醋ヲ動脈頭顛額鼻中等ニ塗リ尔後  
久ク発汗スヘシ

諸毒血中ニ浸淫スレハ強ク心苦悶困慙怔忡悸動意識攪乱等ニハ  
コッロ温飲臭香白紫蘇

○酸毒ハアルカリセ劑ニ底野加礪砂精ヲ少シ加ヘ用ユ

○アルカリス主母諸ノ醋劑及発汗劑蒸浴湯ニテ血脉ヨリ泄スルニ是ノ  
良効アリ

○河豚ノ子卵貝類斑猫誤用スルキハ各條ノ吐劑ヲ良トス或ハ底野

加五分ヲ温湯或ハ肉桂薑香水或温酒ニ胡椒肉桂ヲ加ヘ服スヘシ

○斑猫毒モ内服外用共ニ異ナリナシト雖凡尚潭<sup>ハニ</sup>花醋 梅膏 酒

石塩 日露蜜 温湯 乳汁ヲ多ク服シ大便ヨリ泄除スヘシ此毒

ハ膀胱大ニ熱痛シ小便スルニ炎熱ス子<sup>シ</sup>乳汁劑胆ハ油其他油  
劑ヲ多ク服スレハ解毒疼痛ヲ緩解スル良劑ナリ

○水蛭及諸无血虫類ノ誤吞ハ痲病ノ如クナリテ死スルアリ治法ハ塩

水ニ芦荟 茴香 醋 蜜ヲ合シ吐劑ノ如クシ用ユ 前十二篇詳説ス

○蝮蛇ノ刺咬ニ簡便良法ハ初メ創口ヲ速ニ切り腐肉ヲ削法ニテ吸血

シ尔後創口ヲ塩水燒酒ニテ洗滌シ醋ト底野加ヲ交ヘ或ハ蝮蛇脂

胆ハ油ヲ塗リ具上ヲ卷キ日々数度更ユヘシ

内服ハ酒或ハ醋ニ底野加ヲ加ヘ発汗シ或ハ臭香 紫蘇ノ沸湯ニ

醋 仏手柑汁ヲ加ヘ数日久ク用ヒ諸症尽ク消除スルニ至テハ

ヲ用ヒ瘡スヘシ

○蝎ノ刺咬ハ蝎ヲ搗キ創口ニ貼スヘシ或ハ蝎油胆ハ油

○蜂虻蜘蛛ハ醋 芸香醋 底野加 赤石脂





藥泉論第二十

惣論

涌泉ハ疾患ヲ治シ健康ニ至リ効驗最要ノ物ナルヲ徹底シテ知察ス  
ヘシ性温ナルヲ温泉浴泉ト名フ此ニ剛鉄泉鉄泉鉄性丹峇等ノ泉中ニ  
於テ硫氣酸辛ノ精氣アルカレ質及塩氣ヲ含膏ス皆具性質ニ隨テ  
諸疾ニ効驗アルト損害アルヲ每知シ病ニ的當ニテ撰用スヘシ

泉効

沈滞ノ疾病酸壞酷厲ノ粘液留飲ヨリ起原ヲ為スニ異常ノ大効アリ  
此ヲ用ル時他ノ諸藥劑ト共ニ用ス尤モ剛鉄泉鉄泉ヲ稱譽ス自余ノ  
諸泉ト混雜スルヲ勿レ俗中尅スル諸症ニ意ヲ用ニ養生調護肝要トス

堅正試法

第一剛鉄泉涌井沸涌泉ノ新液ヲ速ニ攪定スルニ清澄透亮ニ見

ニ稍乳汁様色及微蒼色ヲ帯ヒ泡浮アリ此ニ由テ尋常ノ水ノ區別

ス人此ニ没食子ノ末ヲ投スルハ黯黒帶色及褐赤色ト為ル

第二涌泉一盞ヲ汲ミ白晁ニ當リ精烈ノ薰升佳氣香稱スル水泡

多ク精烈ノ酸收氣アルカリセ質アリテ礪砂精ノ如シ尚此ヲ明察スルニ

透明ノ硝子ニ盛リテ考スルニ若シ右ノ兩件ノ徵ナキハ他泉ト知ル

第三味辛キヲ帶ヒ佳味稱スル宛ニ酒ノ如シ故ニ古ノ土人酒泉ト名殊

ニ徴スルハ此泉ヲ多飲スルハ頭眩上衝シテ酒ニ酔スカ如シ

第四味ハニキト和蘭墨ノ如キハ是レ真ノ剛鉄泉ニ功益アリ蕪露露罐ニテ

文火ヲ以テ引クニ初メハ透清常ノ水ノ如ク臭味ヲ終リニ強ク煎熟ス

ハ臭味出ス又甕内ニ粘滑ノ薄膜着ク具色虹ノ如シ

第五稱譽スルハ精微ノ鉄物混合ス是自然鉄洎芙蓉蓋ノ此レ火氣ノ烈

ナルニ因テ真ノ鉄ヲ溶化シ成ルモノシ磁石ニテ吸引シ試テ正真ノ鉄ナ

ル一ツ知ル他ノ塩金石類ヲ文ル一ナシ  
第六他ノ涌泉丹若鉄氣ナシ微辛塩味アリ則チセルセル泉苦味  
泉ハアルカリ也オニシテ其氣ヲ含有ス塩茶ニ似タリ

第七剛鉄泉ハ火ニ温レハ直ニ佳香味消散シ彼食子ヲ投スルニ色変スル  
一ナシ

アルカリ也鑿法ハ罐底留止ノ土氣ニ丹若精ヲ注テ六忽ヲ相敵シテ沸  
騷シテ酸精忽チ消ス乳汁ヲ文レハ稀散シテ凝結セズ故ニ此土ハ酸味ノ敵  
茶ナル一明カナリ此泉性ハ害毒アル山物類塩硫黄等ナシ故ニ非直假  
性ノ鉄泉ト名シ

功能 粘稠凝固塩鹹ノ諸液酸收液ヲ変化シ軟和融解稀流シ強壯  
健亮シ諸般閉塞ヲ開亮ス過多溢余ノ諸液ヲ和カニ大小便ヨリ程  
好ク通利ス或ハ靜坐拳動ニサレヨリ腸胃ニ汚物液風氣痞滯多ク

血飲酒催熱劑ニ由テ穢敗スル壯熱ヲ清涼ニス

4

4

1. 凡欲求道者，必先求其心。心者，道之根也。心正則身正，身正則道成。此乃修道之第一要義。

2. 其次，則在於其行。行者，道之果也。行正則道成，道成則心正。此乃修道之第二要義。

3. 然則，心與行，孰先孰後？曰：心先而行後。心者，行之本也。行者，心之末也。本立而末歸，末歸而本固。此乃修道之第三要義。

4. 又，修道之法，不外乎靜與動。靜者，心之定也。動者，身之勤也。靜以養心，動以養身。心定而身勤，則道成矣。

5. 且，修道之人，不可不戒。戒者，道之防也。戒嚴則道清，道清則心明。此乃修道之第四要義。

6. 總之，修道之道，不外乎心、行、戒三者。心正、行正、戒嚴，則道成矣。此乃修道之五要義。

42/90

