



海馬錫氏方濟

心社道一樓也

神傳有... 此... 元

六... 堂... 知...

941
ヤ 9



明 79
號 941
卷

藏膏

鳩尾



臆前藏膏下五分 甲其骨垂下如鳩尾形故以為名
無藏膏者從歧骨下行一寸 聖濟

巨脈 鳩尾下一寸 甲

上院 巨脈下一寸 千 臆上五分 類 鳩尾下二寸 增注

孕婦禁灸 類不針 御藥集成

中院 上院下一寸 甲 鳩尾下三寸 千 孕婦禁灸 類

下院 臆上二寸 類 鳩尾下五寸 入 孕婦禁灸 外引甄

水分 下院下一寸 臆上一寸 甲 鳩尾下六寸 入 同上又禁刺 注 資生

神潤 外 古名稱中禁刺 甲

氣海 麻 一名丹田 本事 臆下一寸 五分 甲 忌不可灸 千

石門

孕婦禁灸 外引頸 本事方曰氣海一穴道家名曰丹田
甲 脐下三寸又名丹田女子禁刺灸中央不幸使人
絕子甲

元關

脐下三寸素資生又名丹田

○此門

甲 巨關兩傍各五分陷中

通谷

此門下一寸陷中甲

不容

此門傍于五分甲 對巨關類

承滿

不容下一寸甲 對上脘類

梁門

承滿下一寸甲 對中脘類 孕婦禁灸

闕門

梁門下一寸于

期門

承滿傍增注直兩乳舉臂取之甲

章門

類徑曰肘尖盡外是穴甲乙曰直季肋端

大椎

素第一推上陷者甲 身柱甲 第三節下間俛而取之甲

長強

靈脊骶端甲

大杼

素項第一推下兩傍各一寸五分陷者中甲 正坐取

之類禁灸 資生

風門

甲 第二推下 肺俞素 第三推下 肝俞推下

心俞

素第五推下 禁灸甲 膈俞素 第七推下甲

膽俞

素第十推下甲 脾俞素 第十一推下甲

胃俞

素第十二推下甲 三焦甲 第十三推下

腎俞

素 第十七推下甲

八竅

甲 第十七推者上竅入門曰上淵下秩次注曰飾三

膏肓

髀少斜下按之陷中是也 上次中下

肩井

千第四推下兩傍各三寸資生 甲 肩上陷中缺盃上大骨前 甲 前直乳中增注

肩髃

禁深刺 聖師孕婦禁刺類 骨外頭近後以手按之有解穴中千肩端兩

巨骨

骨間甲 缺盃素 肩上橫骨陷者中 素 肩端上行兩叉骨間陷者中 甲

絲竹空

甲 眉尾骨後入

攢竹

甲 眉頭又眉本素陷者中入

睛明

甲 內眥外 印堂兩眉中間大空

風府

素 頂上入髮際一寸甲 禁灸

腦戶

甲 百會下甲五分不可灸使人瘡 甲

玉枕

甲 俠腦戶傍一寸三分

神庭

甲 髮際本寸 上星 甲 額上直鼻中央入髮際一寸陷

者中可容豆 額會 甲 上星後一寸骨間陷者中 禁

百會

刺入廣鑑 前頂 甲 額會後一寸五分骨間陷者中

承溝

甲 前頂後一寸五分 直兩耳尖 禁押 甲 鼻柱下溝中央 神應

馬其易

△**夙池**

素夙府兩傍按微耳者
△**迎素** 候喉之動脈也
又頸側在嬰筋之前
△**頰車** 耳下曲頰筋也
者中用之有孔

△**少高**

△**手** 六指內側去端如韭葉素
△**禁** 禁 禁 禁
△**魚際** 素
大指本節後內側散脈中
△**禁** 禁 禁
△**尺澤** 素 臂 尺
橫紋中西筋骨罅陷者宛
中外引動 禁 禁 禁

△**谷谷**

△**大指** 虎口兩骨間陷者中
△**寸** 寸 寸 寸 寸
△**虎** 虎 虎 虎 虎
△**骨** 骨 骨 骨 骨
△**兩** 兩 兩 兩 兩
△**骨** 骨 骨 骨 骨
△**中** 中 中 中 中
△**次** 次 次 次 次
△**注** 注 注 注 注

△**曲池**

△**肘** 上三寸

△**清之淵**

△**掌** 掌中央動脈中

△**勞宮**

蘇齋 惟司

○**中風** ○**健忘** ○**麻木** ○**痿厥**

居 齊 坡

△**驚** 甲 湯 療 男 女 塊 癰 方
△**驚** 甲 桃 仁 各 一 棗 虎 杖 七 分 大 黃 二 分

右四味以水二合煮取一合二合
日後從大便去黑物毒垢
香膠散兼用甚良

△**甲** 字 湯 理 癩 血 本 方 桂 枝 花 卷 丸

△**花** 卷 一 棗 二 分 桃 仁 芍 藥 各 七 分

中風

桂枝六分 牡丹皮四分 甘草二分
 生姜二分 二方或加附子或加烏頭
 右六味以水二合煮取一合分服
 二方係瘀血之因者或桂枝加芍藥
 附湯或芍藥甘草湯或刺季中血
 三黃湯 後肢暈者
 大黃二兩 黃連 黃芩 各一兩
 或桂枝木甘湯
 熊冬湯 熱癰痈小兒慢驚風亦主之
 上好熊膽 人參 各等分

二方主治
 諸氣疾衝心
 直視煩悶或
 吐血不著

右二味煎服或三黃湯
 參連湯 治同上小兒驚風亦主之
 人參 黃連 各五分或一錢
 右二味以水二合煎取一合少加熊膽亦
 妙
 人參白虎湯 治同上
 白虎湯方中加人參
 參連白虎湯
 方詳勞瘵中
 黃連解毒湯

黃連一錢 黃柏 梔子各二錢
人中黃 右水煎四味

大青膏湯

麻黃六兩 桂枝二兩 甘草二兩 杏仁
四十 金姜三兩 大棗十二枚 石膏雞
子大 右七味

葛根加附子湯

八味腎氣丸

地黃八分 薯蕷四分 山萸四分 澤瀉
茯苓 牡丹皮各三分 桂枝 附子

各二分 右八味水煎

八味順氣散

烏藥 茯苓 白朮 陳皮 木香
人參各一錢 甘草二分 生姜
右八味

烏苓通氣湯四卷

烏藥 茵芎 芍藥 香附 山查
陳皮各一錢 茯苓 白朮 枳櫛
玄胡 澤瀉各五分 木香 甘草各
三分 生姜 右十四味

烏藥順氣散

烏藥 陳皮 姜蚕 乾姜 麻黃

川芎 白芷 桔梗 大棗 甘草

生薑 右十一味

沉香天麻湯

沉香 天麻 羌活 雷歸 附子

益智 半夏 僵蚕 烏頭 甘草

生薑

○脚氣

鯉魚湯 療脚氣上氣引湯脉大者又

治水腫 脚氣水腫以苜蓿者為的

生鯉魚一尺者去腸 老同

右以水六合煮至三合去鯉服一合

日二夜一凡服用漆器全柚皮獨治

茅山柰等隨好入之為透得真故也

九味栲栳湯 理脚氣微寒熱氣血凝

滯而腫者 本方小承氣湯

栲栳一莖橘皮 桂枝 各五分木香

脚氣

二分 大黃 三方或五方 紫蘇 厚朴

枳實 各四方 生薑 五方 右水煎

黑豆湯 治脚氣衝心 周身洪腫者

黑豆 八錢 去皮 桑白皮 一錢 五方

枳櫛 一錢 五方 郁李 一錢 去壳

右四味以水四合 先煮黑豆 減二合 內

諸藥 取一合 日三劑

藪胸湯 理脚氣衝心方 東郭記明

吳茱萸 桑白皮 茯苓 犀角

右四味以水二合 煮取一合 分服

一角 療毒內府而熱 自胸膈引脊背痛

者犀角上銜者一角

桃花散 下停飲方

桃花 未開者佳

右一味為末 空心白湯頓服 二錢 後溫酒

任性頃刻 雷瀉水患 喘酒者 立驗

桃花湯 治水腫逆滿方

桃花 二錢 未開者佳 大黃 二方

右二味以水二合 煮取一合 日二劑 瀉水如注

大承氣湯 腹滿

大黃六分厚朴一分二分枳實七分

五厚芒消九分

十棗湯 治胸膈痛者

芫花 甘遂 大戟 大棗

防己湯 手足無腫狀有異端不可者

防己六分石膏一分六分桂枝四分

人參八分 或加茯苓芒消去石膏

右四味水煎

越婢湯 帶微寒熱舌上有胎渴而小便不利咳喘脚弱身重咳湯加附子也

吐甚者
加半夏木

良足部濕散之意也又熱毒內停者

加犀角或加附子木各四分

麻黃九分或六分 石膏一分二分或八

分 生姜四分 芍藥或三分 大棗六分或四

分 甘草三分或二分

右五味謂者加木附子之分量

胃氣丸 羊、癰而腫者或小便如脂者屬

矣精家 方見中風中

六物附子湯 足部痿痺不如意者

附子 桂枝 防己各四分 甘草二

方白木 茯苓 各三分 今去甘草加

芍藥 本方三因方

平水丸 氣急衝心勢劇者三四五方

吳茱萸 硝石 芫花 各三兩 高陸

四兩 甘遂 一兩 右糊丸

紫圓

代赭石 赤石脂 巴豆 各一兩

杏仁 二兩 右四味糊丸

桂枝 加苓木附湯 腹寧急而痺者

相皮湯 理脚氣衝心一身洪腫皮膚

不光澤者或周身腫是重氣急不徐
平臥腫色無潤腫軟皮水而胸間腫
滿膚色如常者中脘有痛者吳茱萸
之石主治

栝栝 一兩 吳茱萸 紫蘇 木瓜

橋皮 各四分 生姜 六味水煎

甘遂丸 理心下水毒停蓄逆滿衝心

者劫与平水丸製同若再服者增方
量

甘遂 二錢 吳茱萸 大戟 芫花 各

三姜芒酒一炙

古方味細末糊丸銀箔為衣白湯送下方等
隨病勢緩急

防已黃耆湯 風水麻浮身重汗少惡
風者或周身軟腫呼吸平穩者

防已 黃耆 白朮 甘草 水煎服

艾山湯 小便如米泔者屬虫積屢如

沫燕脂 方見痢中

化毒丸 脚氣痿痺諸藥無効者少服
之 方見下疳中

栝椰子末 理脚氣衝心者重便服全
姜汁亦得

灸 風市 伏兔 膝眼 三里

上廉 下廉 絕骨 承山

三陰交 橫鼻

外臺栝椰子湯

栝椰子 蘇子 木瓜 吳茱 青皮

大黃 全姜

唐侍中脚氣方

栝柳 吳萸 木瓜 橋皮 蘇子
生姜

○水腫 ○諸瘰內攻

禹功湯 療水腫以洪腫無熱者或腫

或在右半身或在左半身者為的

赤小豆 四錢 商陸 三錢 木通 猪苓

冬葵子 各一錢

右五味以水二合煎取一合日二劑或三劑氣

急者先與甘遂丸備急圓輩而後用世湯

琥珀湯 理產後水腫或諸毒生腫者

方或瘀血凝滯意趣惡者或諸瘰內

攻小便不利者或貼巴豆膏

三 諸瘰內攻
水腫

琥珀一钱商陸 丁香三分及鼻五
分猪苓七分

右五味以水二合煎取一合去滓温服日二劑
三劑

搗藥

肥前瘰任冉者數搗肌表速乾

慎莫近眼胞及陰疔或諸瘰內攻諸

藥無効者亦主之或燒巴豆薰衣裏裏着之

巴豆 大黃 草麻子 黑胡麻各

等分

右四味細剉布袋盛兩漬數搗挾洗浴候

毒盡而浴

赤小豆湯

治諸結毒內攻腫高者又

諸瘰內攻者

赤小豆 五钱丁香 三分大黃 二分或

三分麻黃 八钱及鼻 五分猪苓 七分

商陸 二钱全用

右七味以水三合先煮赤豆減二合內諸藥煮取

一合去渣温服日二劑或三劑

導水養差湯

治遍身水腫喘滿小便

澀諸藥不効者肺氣水腫疑似之症

或加郁李仁加入他方亦得

茯苓 麥門 澤瀉 白朮 桑白

紫蘇 枳椇 木瓜 腹皮 陳皮

獨砂 木香 燈心草 右七味

銀丹膏 療一切赤眼及障翳不多日

者方或諸瘰癧內攻入眼赤痛或為醫者

巴豆極所銀丹 各等分

右二味以麻油及蜜少許和勻塗額會戴揆

之三日稍覺微痒隨棄却泡是其候不

過七日効

巫神湯 理婦人血暈發熱或振寒小

便不利煩渴脈浮上衝頭眩惡心或

吐或吐產後諸症婦人百病運用多

効

茯苓一圭木 猪苓 澤瀉 桂枝

各五方 乾姜四分 黃連三分 木香一

分 右八味煎服

本方立為散下血後浮腫微寒熱者似血症主

之或帶血熱而渴者或脈數者

仙受散 理產後水腫

梅師水腫便溺
黃牛屎研絞汁
飲之利痰勿食
鹽

大豆一兩半炒去皮 琥珀 茯苓 冬

一兩 為末濃煎茶蘇黑豆湯送下

治水散 理一切水腫小便不利兼用諸

湯 冬瓜 木 盈仙腹中

右二味燒存性為散配用諸湯每服半匙或一

匙

聖藥湯 理諸瘕內攻一身洪腫諸菜豆劫

者 牛糞 夏月放青者益佳曝乾二匙半

右一味煎服神驗

防已黃耆湯 治腰以下腫及陰腫者

方見脚氣中

十棗湯 膈間有水氣者 方見脚氣中

越婢湯 煩渴而咳者熱勢甚者加犀角

平水丸 甘遂丸 木防已湯 并見脚氣中

腎氣丸 腰以下腫腰以上骨立者主之方見

中風中 去壯原湯亦得

四君子加吳茱萸厚角湯 治水腫癰結

心下者

人參 白朮 茯苓 甘草 姜棗

水煎服

源氣湯

帶黑胎者

方見脚氣中

鐵砂湯

脫血後虛腫喘悸帶黃脾症

者方見存中兼用皇盤丸方見黃疸中

乙字湯

婦人產後痔瘻腫痛小便不利

者方見術中若係瘀血者甲字湯方見中風中

甘遂丸

紫圓

呼吸急迫心下結隔者

滾痰丸方見噎膈中柏花湯方見脚氣中按用

實脾飲治臨水腫宜先實脾土一名方消湯

白朮

蒼朮

甘草

草薢

厚朴

腹皮

木香

干姜

木瓜

附子

右十味煎服

桂枝去芍藥加麻黃附子湯

治氣方

心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

枳朮湯

主治同上或合調胃承氣湯

急

壯原湯治中焦虛滿中寒小水不利上氣喘息陰

人參

白朮

蒼朮

破骨根

桂枝

附子

乾姜

砂仁

陳皮

右九味。藥兩服皆腫或面有浮氣 赤水去珠

烏養通氣湯

腰以下腫魚瘦者方見生肌中

中口湯

停食惡心者方見霍亂中

消熱逐毒散 治唇赤腹甚堅熱者

有虫積候而長梅圓其大如湯并無効者淨
存湯主之方見驚風中

大黃 熱毒內停而腫者

附子 足甲有腫自後漸周身浮腫者

○轉胞

巴豆膏

巴豆 五分 田螺肉 一錢

在味共搗成膏和勻切紙團三寸許而傳膏
點臍下一寸五分別切紙團五寸許而蓋之
痛劇者在臍

又方 田螺 麝香少許共和點在巴

豆膏

腎氣丸 屬虛人方見中風中或桂枝加

苓木附湯方見脚氣中

四
轉胞

黑地藥

木防己去石膏加茯苓芒消湯方見脚氣中

寸逐丸 平水丸 兩一時之權通先點已

豆膏猶不利者服此丸方并見脚氣中

六保氣湯

鐵 丹田 氣海 水分

他終覺脹者盡刺之

○痢 ○泄瀉

青陽丸 理老少陳久下利不止方

黃柏 三色各二兩

若糊丸每服一錢數服以大便黑為知止

後服

烏梅圓 虫積見嘔吐症者疴痢亦用

交腹部五十壯或百壯

烏梅 細辛 乾姜 黃連 當歸

附子 芎藭 桂枝 人參 黃柏

右七味

五 瀉痢

更

桃花湯 膿血雜下者先与合璧使熱
退後服此湯

赤石脂 乾姜 粳米 右三味

赤石脂 血痢諸症兼用赤石脂或散服

黃芩湯 兼吐者禁之痢者毒盡下痢

減度者本方服之後用桂枝加芍藥湯

黃芩九分芍藥六分芍藥六分大棗

九分右四味或加半夏生薑

六物黃芩湯 主治同上

黃芩 人參 乾姜 桂枝 大棗

半夏 右兼瘧痢者

葛根湯 治夜痢諸痢在表為最上乘

葛根六分麻黃四分芍藥桂枝

芍藥各三分甘草三分大棗四分上煎

生薑 初起吐者加半夏

小柴胡湯 兼吐者兼瘧痢者加芍藥

柴胡 黃芩 半夏 人參 甘草

大棗 生薑 右七味

半夏瀉心湯 兼吐者禁口痢者

半夏九分黃芩 乾姜 各四分上煎

人參 四分 五厘 黃連 一分 五厘 大棗 甘草 各四分 五厘

艾山湯 下蛇虫穢物方 後重甚者

鷓鴣菜 二錢 大黃 二分 或 三分 蒲黃 二分 苦楝皮 二分

右四味以水一合半煎取一合空心頓服日夜

一小兒用意減之大便滑者去大黃

建理湯 小兒痢無熱清穀肉脫者

人參 甘草 白朮 乾姜 桂枝

芍藥 大棗 生姜 膠飴 古九味

合璧飲 理痢病下重者泄瀉并治之

芍藥 一錢 黃芩 七分 枳實 六分 厚朴 五分 大黃 四分 甘草 二分 大棗 一枚

右七味水煎若吐者加半夏生姜膠血

雜下者先服此湯後用桃花湯氣痢

去大黃加木香檳榔

乙字湯 理痔疾脫肛痛楚歎忍或下

血腸風或前陰痒痛者方又下利數

行脫肛者

柴胡 黃芩 各七分 周麻 大黃

六味 各四分 甘草 三分 生姜 二分
右六味水二合煎取一合

弄玉湯

理小兒疳症黃瘦腹痛又下

利或食不進者大人心中痞惡心虛
悸等可通用小兒痢後調和之劑也
茯苓 一錢 桂枝 白朮 各五分 檳皮
三分 黃連 木香 甘草 各一分
右七味煎服惡心者加烏梅屬冷者加附
子

補中益氣湯

痢止脫肛不愈者若脫

氣者去當歸加木香甚者更加附子
或四君子湯加附子梅柳方見水腫

人參

白朮

當歸

甘草

陳皮

柴胡

周麻

黃耆

右水煎

烏芥通氣湯

腹冷痛下痢一二行後

日不止者又五更瀉屬症者先与合

璧飲後用此湯方見中風中

益黃散

治疳痢屬冷者

陳皮

丁香

青皮

訶子

甘草

馬場

右五味

紫圓 小兒毒伏結者老厥回者葛根湯

小半夏加茯苓湯 諸藥不納者或伏

養肝汁若絲飲者加粳米或用氣尾

草方見霍亂中或五苓散方同上

鷄肝石一匙煎酒中嗅氣治吃逆

灸天樞 關元 不容 不同熱有無盡主之

○瘧

葛根湯 初起羸表方見痢中後服示

柴胡湯若渴者去半夏加栝蒌方見

痢中

柴胡四逆湯

柴胡 黃芩 半夏 茯苓 人參

甘草 大棗 乾姜 附子

右九味

柴胡姜桂湯 老瘧

柴胡 黃芩 半夏 甘草 生姜

人參 大棗 桂枝 乾姜
右九味

△ 藥後湯 截瘧方

蒿本 前胡 葛根 白朮 芍藥

右五味等分以水二合煮取一合瘧發日不用

一切瘧發後分服二劑次日服法如常藥

發日稍服不休即愈凡服六劑

五八霜為丸一錢發日早旦空心服

獨參湯 發日頓服

木一湯 濃煎一夜鎰早發日早旦空

心煩服

硫黃一味或多條釋一味發日平日空

心水服五分

△ 小柴胡加 薑 甲或 及 鼻或 附 子 五積之

人兼吐逆者加 鴉 胡

補中益氣湯 附 胃 久瘧誤治者或加 薑

甲氣母方見痢中

灸 天椎三四十壯

鍼 六關

霍乱

○霍乱 ○中暑

人考湯

先服此湯厥冷加附子

人考

白朮

甘草

乾姜

各七分五

厚

煎服四味或加茯苓

真武湯

茯苓

芍藥

白朮

附子

生薑

右五味

桂枝湯

桂枝

芍藥

各七分五

甘草

五分

生薑

七分五

大枣

七分五

水煎

四逆湯

甘草 乾姜 附子 煎服

五苓散 吐吐不止水藥不入口者

直吐者

茯苓 白朮 猪苓 各六分 澤瀉 八分 桂枝 四分 右水煎

小半夏加茯苓湯 五苓散 白朮散 共

不入口者或加附子

半夏 一钱 八分 生姜 一钱 六分 茯苓 四分 五厘 水煎或冷服

備急圓 心腹卒痛者

大黃 乾姜 巴豆 各等分

右三味 搗丸

紫圓 主治同上 方見脚氣中

增損白朮散 水藥不入口者 先与土

苓散 後服此湯

白朮 五钱 葛根 一钱 藿香 五钱 干姜 陈皮 甘草 五钱 生姜 木香 五钱

人参 三钱

古水煎 錢氏白朮散方中 去茯苓加陳

皮干姜生薑

中正湯

理食傷吐逆不安又主霍亂

中熱陳旧宿食方本方不換全正氣散

半夏五分白朮四分藿香橘皮

乾姜厚朴大黃各三分黃連二

分木香甘草各一分生薑

草味煎服下過者去大黃惡心吐逆不止

者加烏梅又盛暑之時不覺飢餓滿

飽者主之

藿香正氣散

馬場

腹皮紫蘇藿香白芷茯苓

各六分厚朴白朮陳皮桔梗

各四分甘草一分半夏生薑

大棗右水煎為散者去半夏

三黃湯

方見中風中

灸

天樞

神闕

關元

氣海

清冷淵

馬場

○淋病

毒騰酒肝湯 蕪後倍核脹起為患癰者

車前 木通 各五分 地黄 雷歸

桅子 黃芩 各七分 甘草 五分 澤瀉

毒騰 各二錢半

右水煎或加工茶苓或五物解毒湯或兼用

烏藤丸或化毒丸右三方見下病中

猪苓湯 久未血淋

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉

各六分

右水煎小便膠濁者多滑石之所主
 赤濁者五苓散黃濁者茵陳五苓散
 或五苓散加滑石方見霍亂中
 再造散 治厲風及諸血毒無療久淋
 方
 及鼻六分爵金二分半白牽牛六分
 皂角刺六分大黃五分
 右五味為末每服一匙空心白湯飲下隨性
 多少

滑石礬石散 兼用于丙字湯

滑石 礬石 各六分甘草三兩
 右三味為散每服五分日夜三四
 丙字湯 理諸淋方
 甘草六分枳子四分蒲歸 地黃
 滑石 黃芩 各五分澤瀉二分
 右七味水二合煎取一合 淋加阿膠又散
 服亂髮灰又土淋共主之甘草治淋
 毛玉葉又兼用再造散又婦人俗稱
 淋濁者或加附子或甲字湯方見中
 風中

馬其易藏

馬場

如意湯 主五淋疼痛方

桔梗 甘草 蓋草 各等分

右三味水二合煮取一合分服血淋加亂髮

乙痔湯 苦痛甚而不寐起卧兼患痔

疾脫肛者方見痛中

清心蓮子飲 治勞淋

蓮肉 人參 黃耆 麥門 地骨

車前 黃芩 茯苓 甘草

右九味

輕粉丸 多運用下疳藥久年淋并為

腫者方見下疳中

鐵砂湯 皇盤丸 淋病漸為黃胖者

方見痔中

艾山湯

方見痢中

雞子白和砂糖

胃氣丸

方見中風中

馬場

馬坊藏

灸 八膠 膠部 豆部

潤通湯

麻仁 木通 滑石 當歸 地黃

阿膠 車前 葵子

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

○痔 ○下血

朱明丸 治大人小兒大便秘閉

大黃 三兩 蕎麥 一兩

右二味丸梧子大每服十九丸白湯送下

礬石湯 治脫肛腫痛

礬石 一大握 水三升許煮一二沸棄熟入醬油樽用孔

蒸其肛出瘡而收

又燒石通紅包漉兩巾浸湯中煎之

洗痔枳殼湯 治痔瘻腫痛肛門下墜

馬坊藏

九 痔 下血

毋論新舊洗之腫自消

杖壳二兩 瘰癧 蟻 草二兩

右以河水三瓢煎膏時薰而後洗又毒間

而再熱薰洗者三次後傳土倍數

五倍數 治諸痔舉在里硬疼痛難忍

或臘毒肛門泛令腫硬不收亦効

五倍子大者一兩小孔搽乾癩蝦蟆

草納內以紙填孔包濕紙燥之去紙

袖末一丈加麩粉三丈水片土厚極

末煎薰薰洗後傳之安腫勿動此二

方外痔皆治洋正宗

大黃牡丹皮湯 難下膿血者尤實症

之人也

大黃四兩 牡丹皮一兩 枳仁五十箇

瓜子半斤 芒消三合 右五味

針砂湯 治虛悸短氣眩暈并黃胖方

針砂四錢 八分 牡蛎 茯苓各一錢

二分 桂枝四分 人參二分 甘草一分

白朮五分

下血後日如黃胖病者兼用皇盤丸

右七味水煎分服黃胖病者或服用
 皇盤丸或兼用鎮神丸方見黃疸中
 濁浪湯 洗痔瘡者痔或前陰腫婦人
 陰戶傷爛或生痒者一切下部諸毒
 主之若下疳瘡不可洗
 荆芥 銀花各二錢 蛇床子三錢
 周麻二錢 羊黃柏一錢 半桂兒一錢
 右六味水五合煮取三合半棄濕洗
 之
 弄玉湯 小兒脫肛屬疝者如疝法灸

腹背而世湯主之
 乙字湯 治一切痔疾痛甚者方見痢
 中
 三黃湯 下血暈倒者或神氣不定者
 方見中風中
 大柴胡湯 痔疾引兩脇或不能眠者
 方見黃胆中
 補中益氣湯 曰下血諸藥無効脈浮
 大而無力者或地榆槐花方見痢
 中

人參湯加茯苓 久下血方見霍亂中
腎氣丸 血俄而脫小便微澀者方見
中風中

九味栲栢湯 帶脚氣微腫者方見脚
氣中

葶菜 シワブキ 索苦荬葉 或無花果葉

或秋葉 或煙草煎中 或薤葉

或大田螺 一箇 龜腦上 產須臾吐水

者墜腫上 或熊膽 或艾葉煎法

如礬石湯法 或乾蘿蔔葉煎汁蒸

積聚 奔豚 伏梁 虫積

赤丸 治血瘕腹痛方

生漆 大黃 麩粉 各等分

右三味蜜和調為丸每服五分白湯

送下日二夜一丸赤瘕為知

桂枝加附子湯倍甘草 心下急迫者

方見霍亂中

令壽丸 療積塊氣逆欲吐小兒急慢

驚風并疳癖

當歸 川芎 地骨皮 各二錢半

積聚

丁香 枳殼 莪朮 桂枝 茯苓

各二錢 香附 橘皮 各一錢 甘草

懸膽 各七錢 黃連 二錢

右十三味 為丸 辰砂 為衣

奇應丸 積氣 俄而急痛者 懸膽 亦可

當歸湯 千金 療胸痺心痛 并陳曰腹痛

方 當歸 六分 芍藥 五錢 黃芩 桂枝

半夏 各四分 乾姜 厚朴 蜀椒 各

三分 人參 二錢 甘草 一錢

右十味 水煎 服寒症 加附子 或烏頭

工參散 治旧年腹痛 禁作者 或動悸

劇中 浣以上急痛 吞酸者 或痰痛

紅螺 十兩 甘草 一錢

右二味 合白湯 送下一 匕 入口 則暖

氣焦 臭痛 乍退 如失 若無 即効 者 非

其症 木香散 理心下 痞積 寒冷 腹痛 嘔吐

惡心者 或痰痛

木香 良姜 黃連 丁香 莪朮

骨 壯 骨
 不 糖 者 或
 加 干 桂 枝
 或 加 干 柴
 胡

各三钱 枳实 七钱 胡黄连 八钱 陷砂
 八钱 苦楝皮 四钱 甘草 一钱
 右十味 捣末 或糊丸 如梅子 大每服
 十九 白汤送下
 参连汤 能治 痢 并治 痞痛
 二方 见 中 风 中
 芍药 甘草汤 心下 急 痛 急 迫 者
 芍药 甘草 右二味 差服
 乾姜 黄连 茯苓 人参 汤 心下 痞 时
 作 福 者

乾姜 黄连 人参 四味
 柴胡 枳实 芍药 汤
 半夏 四分 大枣 二分 三钱 柴胡 六分
 人参 二钱 芍药 二钱 甘草 二钱 大枣 十二味
 柴胡 二钱 芍药 二钱 甘草 二钱 大枣 十二味
 桂枝 加 骨 牡蛎 汤 怔忡 驚悸 心忡
 不 暢 欲 乱 心 者
 桂枝 芍药 生姜 甘草 大枣
 骨 牡蛎 右七味

馬 葛 湯

桂枝白朮甘草湯 奔豚氣白鴛

佈自公邪自灸熱者

桂枝 白朮 甘草 四味

小柴胡湯 心下痞時時作痛吐者

方見前中

小建中湯 伏梁兩腹急痛者

桂枝 芍藥 炙甘草 四味

全姜 四兩 大棗 四兩 膠饴 三斤

右煎服

三黃湯 心氣不安者方見中風中

甲字湯 偏人血積 方見中風中

弄云湯 瘕不甚而痛者方見前中

艾西湯 兼用紫圓 方見前中

鐵砂湯 与桂枝木甘湯異同方見前中

兼用鎮神丸方見前中

驚甲湯 婦人血積或加及鼻或加附

子方見中風中

烏苓通氣湯

奔豚湯 与桂枝木甘異同

馬場藏

葛粉五兩半夏四兩甘草根皮一升

芍藥甘草 雷歸 黃芩各二兩

芍藥一兩生薑 右九味

桂枝加芍木湯 痰不甚而痛者方見

霍亂中

大柴胡湯 氣骨者方見瘧中

半夏西心湯 痰積心煩者方見痢中

治旧羊血痛腹痛方瘧或作桂

生漆五十錢味增酒一升

七日飲盡一身癢癢如癩癢乃外世有疾

頓愈

抑肝散 氣骨者

芍藥八分芍藥 柴胡 釣藤釣各

五分白朮五分雷歸四分甘草三分

右七味

人參 心氣食卒急者

枳木湯

方見水腫中

馬場藏

交二章門 不寒 天杞
脊 第二行 第三行

馬

○心痛

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌實 薤白 白酒

栝蒌薤白半夏湯

栝蒌實 薤白 半夏 白酒

薤白附子散

薤白 附子

烏頭赤石脂丸

烏頭 附子 乾姜 赤石脂

人參湯

馬

十一 心痛

方見霍亂中

枳實 薤白 桂枝 湯 胸中痞留氣結胸

滿逆振心者或人冬湯

栝蒌實 枳實 厚朴 薤白

桂枝 右五味

建中湯 急迫而痛者

方見續聚中

當歸湯 連日痛者或兼用烏頭赤石

脂丸或和附子方同上

桂枝附子湯加甘草或砂糖湯

桂枝 附子 生姜 甘草 大枣
右五味

甘草乾姜湯

甘草 乾姜

桂枝加芍藥附湯

本方見霍亂中

三和散

沈香 紫蘇 腹股 羌活 木香 白朮 檳榔 陳皮 甘草 川芎 木瓜 生薑 右十二味

○疝

○寸白

調中湯 治產後一切痢病 換醫抄

治寒疝腹痛

高良姜

雷煇

桂枝

芍藥

附子

川芎 各一兩

甘草 半兩

古七味 劉台 每服三錢 水三盞 煎取一盞

去查 溫服 無不効

五効湯

張璠 玉醫通方

山查子

苦楝子

枳實

白朮

香附子

青皮 各七錢

吳茱萸

三錢

馬其功

馬其功

延胡索五钱 古水煎服

为菜甘草附子汤 急痛者

为菜 甘草 附子

大建中 主治同上

蜀椒六分 乾姜一两二分 人参六分

膠饴 右四味

曼倩汤 治陈久腹痛 瘵作瘵 寒

在腹痛吐食者 兼用工象散

柴胡八分 牡蛎一两五分 芍药七分

枳实 吴茱萸 各六分 甘草一分

右六味煎服

小建中汤

方见积聚中

乌芍通氣湯

方见中風中

雷帰湯

似心痛者

方见積聚中

甲字湯 或加附子 或加烏頭

方见中風中

土象散 噎雜痛者 或無此症者

馬場藥

方見續聚中

桂枝加附子湯倍甘草

本方見霍亂中

桂枝加芍藥湯

合璧飲 亦酒先用此湯及身若逆氣

湯方見痢中

柴胡加芍藥湯 動悸欲亂心者

方見續聚中

橙 治疝之奇品

大黃附子湯

○勞瘵

翹去湯 療瘵瘵使瘵

連翹一錢玄參七分周麻 羌活

桅子各三分木通七分薑桂二分

甘草二分

右八味

水杓丸 療勞瘵初染諸症未具者又

小兒疳瘦開熱 水杓去皮隔曹燒存性

右一味細末糊丸每服三方日二夜一空心黃

馬場藥

著湯送下

義順丸 療疴勞初發咳嗽痰熱盜汗

黃瘦者

茶昆蟲煤 甘草 麝香

右三味糊丸空心黃著湯送下十五歲坐

每服七分日二夜一以下用意減之

酸枣仁湯 氣分用塞者

酸枣仁 二錢四分 甘草 一分 知母 二

分 茯苓 二分 川芎 二分 或生薑

六味煎服

大黃廔虫丸 去瘀血生新血

大黃 黃芩 甘草 桃仁 杏仁

芍藥 地黃 乾漆 壺虫 水蛭

蟪蟪 廔虫 右十二味

竹葉石膏湯 似勞者兼灸四花

竹葉 四方 石膏 一錢一分 半夏 四方

人參 二分 甘草 一分 五苓 散 米 七分

麥門冬 八分 右七味

肺癰湯 理咳唾臭口吐膿或如米粒

胸肋間隱痛或微背脊声枯氣急不

馬其藏

二 能卧者本方桔梗湯

甘草 桔梗六分貝母 栝蒌根各

五分杏仁四分白芥子三分生姜二

分 右七味煎服

皮弁散 治小兒咳嗽方所謂百日咳

者又咳嗽吐粘痰沫者兼用干諸方

燈臺草 初采莖葉相連燒存性紅

熟者不佳

右一味散服又大人痰咳吐白沫者

柴胡姜桂湯 似勞者或盜汗痰咳聲

寒急者

小建中湯

方見積聚

中

有潤者兼灸四花

柴胡 桂枝 乾姜 栝蒌根

黃芩 牡蛎 甘草 右七味煎服

冬連白虎湯 眩暈者注手只煩熱

者

知母六分石膏一圭六分甘草二分

粳米一圭二分人參 黃連 七味

柴胡加芍藥牡蛎湯 氣癰厥亂心癰

狂者兼用朱砂安神丸方見積聚中

半夏瀉心湯 心煩者方見痲中

△ 巫神湯 氣分閉塞者方見水腫中

△ 五物解毒湯 瘰癧欲作膿汁者又刺尺中

方見下疳中

△ 化毒丸兼用于翻玄湯方見下疳中

溫膽湯

酸枣仁 竹茹 陳皮 茯苓

半夏 枳實 甘草 右七味

△ 瓜蒂散 欲催狂者方見黃疸中

△ 烏苓通氣湯 氣癰形狀似疝者方見脚氣中

△ 小柴胡加石膏湯 治耳下頸邊累

結核者若背脊痠急者葛根湯若欲

作膿汁者五物解毒湯

△ 柴胡桂枝湯 往來寒熱往日不止者

或加蠶甲方見婦人經多四花

△ 白虎湯 竹葉石膏湯 主治同前似

勞者

△ 朱砂安神丸 東垣 理神氣不安虛煩不

寐方

黃連六分 生地黃一分 半 當歸

甘草各二分 朱砂五分

玄細末糊丸如櫻子大每服三十九丸配用于
三黃湯黃連解毒湯白虎加梔子黃柏
輩治神氣不寧或灸尾八髎等
解毒三黃二方見中風中

灸 四花 患門 久痰或氣癰

使脊椎自七椎際至十四椎

連原飲 輕疫誤治寒熱不除脉數者

枳橘二錢 厚朴 知母 黃芩

芍藥各一錢 草葉五方 甘草五方

右七味

○噎膈 ○又胃

治膈疰方 官部便方

大糞燒存性入辰砂少許蜜水調服

烏神散 治膈噎食不可

河豚一尾去腸胃以紅花填滿燒存

性白湯送下 天石為末白湯服亦良

利膈湯 治膈噎百藥百中之神方

半夏二錢 山梔子 附子各一錢

甘草少生薑三片 古五味溫服

藟歸湯 瘰癧背腹微痛者

十四 噎及胃

馬其切

方見積聚中

桂枝加附子湯或烏頭兼用香脂丸

方見下

大黃甘草湯 秘用者或加吳茱萸牡

蛎

安中散局方治痔瘻病甚者神驗

延胡索 茴香 桂枝 各五分 牡蛎

一錢四分 良姜 乾姜 各三分 甘草

九分 土產

右七味水二合煮取一合服忌酒肉麪餅

一切厚味鹽菜或赤丸或生漆二方并

見積聚中或半夏瀉心湯方見前中

或大建中湯方見本中或心建中湯方

見積聚中

香脂丸 治血枯腹痛 桂作積為正

阿魏 二錢 乳香 沒藥 丁香 各三

錢 右四味為末糊丸每服一錢日三空心白湯

送下

曼倩湯

方見本中

工篆散

方見續聚中

及急湯 治噎塞方

芍藥 附子 各四分 紫莖 烏頭

半夏 防風 桂枝 枳實 各二分

人參 遠志 乾姜 細辛

食茱萸 各一分 甘草 少許

右十四味煎服

丁字湯 理旧腹痛吐宿水得食痛劇

噎氣酸臭衝鼻移時吐者即是癖瘕

病也至之方

牡蛎 一钱六分 茯苓 一钱二分 枳實

木 各六分 吳茱萸 八分 橘皮 四分

人參 三分 甘草 二分 生薑 二分

古丸味煎服忌生啖精魚肉油膩第飲

食而調養一日米三合水一合菜一匙為

度若痛劇者二合或一合燒味增鹽梅

其他不許食之痛甚者方為四藥

本方後後使加吳茱萸牡蛎甘草而

已

菴羅果 治噎膈不利者

一味煎服

烏頭湯

黃耆 芍藥 麻黃 烏頭 甘草

○痰 ○喘息 ○咳嗽 ○哮喘

茶實丸 喘息急救方

茶實生熟者佳 百合根 礬石等分

重味研勻為丸 每服一錢 空心白湯送下

滾痰丸 留飲咳喘胸膈痞滯

大黃 八錢 黃芩 四錢 甘遂 二錢

青礬石 五錢 燒 右四味糊丸 或隔間

停痰帶平 覺痛者 萬病回春云一方

和朱砂二兩 極末為衣 而甘遂代沉香

燒青礬石法 礬石等分 入土罍 以見

黃金星為度或白胸胸起眩暈者

二母寧嗽湯 治咳嗽甚不能平卧只

起坐者帶竹葉石膏湯之意治諸咳

知母 貝母 陳皮 栝蒌實

桑白皮 茯苓 黃芩 枳子

石膏 五味子 枳實 甘草

生姜 右十三味

栝蒌枳實湯 喘息胸痛者

黃芩 橘皮 枳實 茯苓 桔梗

貝母 枳子 雷煇 香砂 木香

瓜蒌仁 甘草 右十二味

蘇子降氣湯 上氣甚者

蘇子 半夏 雷煇 前胡 竹茹

厚朴 橘皮 沉香 生姜 桂枝

右九味 甘草

葛根湯 頸背強急者方見痛中

甘草乾姜湯 心下急迫者方見心痛中

或兼用底野如或砂糖湯

補肺湯 喘息

人參 五味子 杏仁 前胡 麻黃

附子 乾姜 甘草 大枣
右九味

小青童湯 疾喘屬表症者若熱甚湯者大青童湯方見中風中

桂枝 芍藥 乾姜 半夏 細辛
麻黃 五味子 甘草 右八味

柴胡桂枝湯 往來寒熱咳者方見婦人中若吐白沫粘痰者皮弁散方見勞瘵中主治咳甚白沫粘痰者為的

柴胡姜桂湯 動悸甚呼吸不穩咳者

或盜汗小便不利者最聲有潤者方見勞瘵中

柴胡和童骨牡蛎湯去鉛丹大黃童骨水鐵砂 胸中煩熱驚悸怔忡百謂痰症者本方見積聚中

茯苓飲

茯苓 六分 人參 白朮 各六分 枳實 四分 橘皮 五分 生姜 八分 右六味

麻黃 咳嗽喘皆所主治勞咳者不聞

灸 肺俞 鬲俞 四花患门
二味湯

茯苓 半夏 陳皮各等分 甘草減半

薄荷煎 川芎 防風各二錢 縮砂五分

甘草一錢五分 桔梗三錢五分 薄荷

三錢 右壅煉四半斤

○肺癰 ○肺痿

桔梗湯 治肺癰

桔梗 甘草 右二味

白散 主治同上

桔梗 三分 巴豆 一分 貝母 三分

右三味

炙甘草湯

甘草 桂枝 生薑 麥門冬

麻子仁 人參 阿膠 大棗

地黃 右九味

十六 肺癰

馬場

馬
七
癰

肺癰湯 膿已成者又臭氣已成膿未

成者去甘草方見勞瘵中

甘草乾姜湯 治肺痿不飲者不渴者

方見心痛中此方溫之

生姜甘草湯 吐涎沫咳者

桔梗治肺癰之主藥

○腸癰

大黃牡丹皮湯

方見痔中

甲字湯加薏苡或膿已成者更加大黃

方見中風中

巫神湯加薏苡大黃桃仁

十七
腸癰

馬
七
癰

馬場

大黃
枳實
厚朴
甘草
芍藥
桂枝
茯苓
白朮
白芍
柴胡
黃芩
半夏
生姜
大棗
甘草

○鼓脹 ○脹滿

- 厚朴七物湯
- 厚朴八分 甘草三分 大黃三分 枳實五分 桂枝二分 大棗二分 生姜三分
- 調胃承氣湯
- 大黃 甘草 芒硝
- 小承氣湯
- 大黃一錢二分 枳實九分 厚朴六分
- 大承氣湯

馬場

六黃六分厚朴一分二分枳實七分

五厘芒消九分

桂枝加苓朮附湯

本方見霍亂中

鐵砂湯 有水氣之因者方見痔中或

鎮神丸方見黃胖中

驚甲湯 積聚

方見中風中

甲字湯

方同上

可遂丸

方見脚氣中

大柴胡湯 或柴胡加芒消

方見黃疸中

中風湯 酒客脹滿初起先用此湯方

見霍亂中後用枳朮湯方

黑瞳散 小兒疳瘕脹滿

方見小兒中

大都以厚朴為治脹之主葉後世以羅

葡子大腹皮為主葉附子在効

不及飲

茯苓 猪苓 澤瀉 橘皮 腹皮

葵子作甘草

又方 茯苓 炒赤豆 炒小麥 甘草

○痛風 ○鶴膝風

桂枝芍藥知母湯

桂枝 四分 芍藥 五方 甘草 麻黃 各

五分 生姜 五方 白朮 五方 防風 四方

附子 一分 五厘 知母 四方

右丸味或以烏頭代附子

六物附子湯 鶴膝風白脚氣者以烏

頭代附子本方見脚氣中

葛根亦附子湯 項背強急痛不能顧

眚者方見痛中

十九痛風

烏葛根

桂枝加附子湯 桂枝加芍藥木附湯

本方見霍亂中

甲字湯加附子 蠶甲湯

并見中風中

治痛風奇方

柴胡 桂枝 防風 羌活 芍藥

香附子 生地黄

右七味以水一合酒五勺煮取一合分服

蚯蚓油

蚯蚓十條漬燒耐一日夜去泥麻油一合

煎七分去渣塗痛處

蝸牛油

蝸牛去壳十五箇入麻油一合煎七八分

塗痛處二油合塗益良

大防風湯局方屬乾血者

防風一炙芍藥七分半當歸一炙

芍藥 地黄 黃芩 各一炙 附子七

分半人參五分羌活五分牛膝五分

白朮一炙甘草五分生薑

右十三味

乾粉丸

見下病中

生乳

詳竹栖葉錄第一卷

膝蓋風者刺膝眼令惡水

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

東

○黃疸

鎮神丸 治黃胖病氣上動胸短息不

得行步小便不利者

鐵砂七錢 蕎麥三錢

右三味糊丸每服八分日三空心白湯送下兼

療下血家腹痛生塊動氣不得行步手

只爪及裂者

仙露飲 治黃疸復發者

龍茶 陰干 昌陽各七分

右三味以水二合去渣日二劑

二黃疸

馬葛歲

茵蔯蒿湯

茵蔯蒿 梔子 大黃 右三味

茵蔯五苓散

茵蔯蒿末十分五苓散五分

方見霍亂中

大柴胡湯

柴胡八分黃芩三分芍藥三分半夏

六分枳實五分大黃三分生姜五分

右七味

小柴胡湯加大黃或墜甲方見痢中

大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣湯

并見鼓脹中

瓜蒂散

瓜蒂一分赤小豆一分香豉七合

古先以二味杵為散以香豉煮取汁和散一
夫七溫服之

漿

治黃胖方 蜆殼一味漬鈇醬三日夜

燒再漬鈇漿又燒又漬燒三度而

細末糊丸梧子大每服二三丸白湯送下

皇盤丸 療黃胖方

馬甘切

馬尾

白木 厚朴各三錢 橘皮 一錢半

綠礬 一兩 煨過者益佳

古四味共末 糊丸 每服五分 日二 錢砂湯送

下白湯亦可煎湯方見痔中

△ 芟山湯

方見痢中

○下疳 ○便毒 ○楊梅瘡

感亨丸 療癰毒方

薰陸 胡椒肉 妙令焦黑 細研 槐花

妙令焦黑 大棗 各十二錢 妙令焦黑

細末 乾粉 五錢

古五味 別妙 胡椒 槐花 大棗 等次 妙薰

陸 候其鏹 沸 變黑 內槐花 拌取 中 与

大棗 同搗 篩 胡椒 細研 与 乾粉 并 諸藥

合 調 糊丸 服後 方送 下土 茯苓 七錢

葶藶 二錢 以水 五合 煎取 三合 午 煎空

下疳

腹以湯一合送下丸藥五分餘湯二次服
盡病重者服八分或一錢數日後口
中欲齋爛者減服從前法東門曰此
藥必不拘常法用解毒劑送下亦惟
宜量其輕重來稟虛弱以左右收効
也

五物解毒湯

治諸結毒

假蘇五分 金銀花七分 芫花三分
葶菜五分 大黃二分

右五味以水二合煎取一合淹毒者加單蘇

一錢甚良或加辛荑合甘桔湯

輕粉丸

治諸結毒下疳骨疼淹不愈

者方

牽牛子二錢 大黃一錢 輕粉各一錢

鹽梅肉一箇

右四味為末糊丸茶末為衣每服三
分日三空心白湯送下不須嚼以六
日為一劑七日平旦空心服備急丸
三分穢物帶大下丸施劑不必盡劑
隨病者強弱輕重斟酌之後方亦從

之此藥在剛烈慎勿過用服後口中
爛者銀花煎方嚙之

丹霞條 理上部結毒頭痛瘰癧及咽

喉腐爛方

銀一錢八分水銀二錢朱砂一錢

沉香二錢人參五錢

右五味盛銀土盞上火鎔化內水銀
柳箸拌令相得傾注于紙上研候如
注入朱砂此香人參等末五味和調
二錢四方切紙幅一寸長八寸糊偏

把收植香梳中別以紙方幅五寸者
卷之令上稍孔窄下孔稍寬如筒形
以寬處冒覆於紙管上病人口中含
水以卷紙窄處挿入鼻孔以吸其烟
數吐其水更含新水日一夜一左右
各一管十日盡一副

銀花煎 療服輕粉後口中腐爛方

銀花 黃柏 甘草各一錢半青黛

石榴皮各一錢 古土味以水八合煎取

五合去渣數日嚙之日盡一副

草薺湯

治瘰癧上攻頭痛甚或結毒

經久或項背強急往來寒熱咳嗽虛

羸狀似勞瘵者兼用

草薺十八錢 銀花三錢 辛夷 防風

去冬 川芎 天麻 烏頭 蔓荊子

各五錢 燈心草 兩煎茶 各三錢

右十一味水煎服此法極妙不愈用

於瘰癧頭痛諸頭痛諸藥不効者皆

可用若頭痛甚者倍加辛夷

產胎真珠丸

治下疳便毒楊梅瘰癧

節疼痛日久腐爛臭敗不堪聞者或

咽喉唇鼻破爛諸藥不効者

大黃二錢 黃芩 兩煎茶 阿公藥

各一錢 龜尾六分 去腸胃填藥粉容

瓦罍鹽泥固濟燒存性 桂枝七分

乾粉二分 甘松一分半 真珠 產胎

各三分

右十味極末丸如梧桐子大白湯送

下若眼疾或小兒用此丸加葛根

二钱黄连 一钱川芎 一钱半丁香 六分古四味

填颞颥腹中 轻粉分量三钱 为法差 量少者二钱 五分 别用轻粉二分者 以少 炒为良 以七日 盡一副

逐毒散 治上部结毒 耳目或咽喉作

核痛 或上部结毒 面色者

香附子 一升 浸酒 廣東人卷 一两

雞 去翼 且 啄 腸 以水洗淨 以二味内

腹内收 繩 蒸之 大抵 雞肉汁 深着于

香附子 後取令 細末 服

烏藤丸 主癰毒 新久方

大黃 輕粉 各二钱 桂枝 以香

甘草 丁香 各一钱

右六味 糊丸 以七日 盡一副 無効者 更作

副

化毒丸 療癰毒 沈深 兼理 偏枯 及一切 瘡

毒 腹痛 等者 方又 水腫 噎膈 久瘡

薰陸 一钱 大黃 雞冠 雄黃

乳髮 霜 各三钱 生乳 一钱

古五味糊丸辰砂為衣每服一方日
二夜一食遠病冷湯服病重者日用
至五六分服法依前法後寒熱如感
風寒一身榮赤疼者大良蓋此藥酷
毒最甚得熱極得冷後若服覺四体
柔熱懈憊無力者煮綠豆冷飲立安
或服冷水亦佳但審察其虛實深淺
慎勿謾用切忌房勞怒悲酒酢及熱
飲生冷等若犯此者不止得為其害
亦不淺鮮矣

五寶散 治諸徒毒咽喉齋爛目赤耳

鳴頭眩不能行步者

鐘乳石六分虎珀三分鼈胆一分

辰砂二分飛白麴三錢

右五味極末土茯苓二十錢以水一
升二合煎取六合去渣三分取二合
內散二分空心頓服日三服忌鹽酢
等

毒膽酒肝湯 輕毒者

方見淋中

○ 日承一豕
水片卞
硝砂卞
大黃八豕
糊丸石砂豕
衣誤極研
力炒

○ 療癰毒方 名驅毒丸

人參一豕 大黃一豕 輕粉三分 卞重
黃柏三分 卞厚三色 沈香一豕
寸草五方 燒鹽二豕 七方 卞重 兩煎茶
五豕 三分 茶末為衣
右八味 糊丸 每服一豕 卞方 山歸末煎湯
送下 虎毛黑霜和津嚼
山功末 大黃各十兩 黃芩 川芎 杜仲
各三兩 生地黄 當歸 乾姜 種人參
各一兩 右九味 四十二日服 盡早且每服

○ 眼耳

淋雲湯 治風眼方 一切眼目 闔黑痛
等病 甚者 日服六七點 或兼用紫圓
車前子二豕 黃芩六分 黃連 細辛
大黃 甘草各二分 或加茯苓 或石
膏 右六味 以水二合 煎取一合

治雀目方

青箱子 黑燒細末 入雞卵中 燒用
雞肝丸 理小兒疳癉 虛羸 疳眼 生翳
赤子 一切眼目 方非特小兒 用之 大

二十眼耳

馬

人而眼目暗黑不明或翳障并老壯
雀目用而有異驗凡雀目黑瞳散亦
得外灸台灸五七壯亦可方見小兒
中

雞肝一具胡黃連五分肉豆蔻五分
芙蓉花六月花者佳二分

右四味取咀以水一合無灰酒半合
煮肝至水殆盡而令肝切片、解之
日三四次以藥查及煮汁和寒饑米
粉至可丸如度梧桐子大每服二三

十九

尚足飲 理舌唇生瘡牙痛一切口病
方

石膏一圭黃芩六分紅花五分玄參

大黃各四分黃連三分甘草二分

右七味水煎分服虫牙痛含之稍久
而吞下亦可口內諸病配用寔崙散
旁理乳後心下痞虛悸或心煩神氣
不定者又眼痛赤熱用之方見鼻口
中

洗塵散

礬石 黃蘗 各等分

細末 盥後 藥漬湯中

黑瞳散

方見小兒中

芟山湯

方見痢中

三黃湯

方見中風中

葛根湯方見痢中或合三黃湯

桂枝湯

方見霍亂中

紫圓

方見脚氣中

銀丹膏

方見小兒中

馬明湯

治眼疾屬先天遺毒者及結毒入眼或疳眼等諸症

海人草二錢 忍冬一錢 紅花四份

甘草五錢 石葛根二份 馬明退一份

右六味煎服

總氣霜 及鼻末 治竹刺傷目者

灸 手大指甲後一寸內廉橫紋頭白

肉際灸一壯治雀目

疔眼 灸合谷三壯又治雀目

青盲 灸系竹空每朝一壯年久者二

三壯必用小炷

芎黃散 治諸疔毒方

川芎 大黃 各等分

右二味為散每服一錢日二或三空

心溫酒或白湯飲下丸亦可

五物解毒湯或加辛夷 耳中痛鳴者

或聽耳 方見下疔中

耳中痛者

大蘗白花椒各取汁滴之耳中

葛根湯

方見痢中

三黃湯

方見中風中

馬場

防風通聖散

川芎 防風 羌活 芍藥 連翹

薄荷 麻黃 石膏 桔梗 黃芩

白朮 梔子 荆芥 滑石 芒消

大黃 甘草 生薑 右十八味

和味道選散

柴胡 芍藥 羌活 桂枝 白朮

甘草 生薑 梔子 牡丹皮

右九味

百虫入耳者紫金鈴和麻油滴耳中

灸 肩井 三里 肺俞 膏肓

艾連湯 洗藻

艾葉 黃柏 大黃連 車前 薄荷 右中

枯荅 右六味水煎

二 鼻口喉

○鼻口喉

代針散

巴豆三箇 桔槩四錢 朱砂少許
右二味內鍋燒之為末 加朱砂少許
其色令偏如包紅乃佳

桔槩湯

方見肺癰中

三黃湯

吐血衄血暈倒者 加犀角

方見中風中痰發三里

桃花散

大蒜塞鼻孔止衄血

Blank page with vertical lines for text.

茯苓一钱葛粉三钱辰砂少许
右三味槌末松花色为度

全地黄汁 藕汁 衄血并主之
半夏苦酒汤

半夏末 麩子一箇与酥同入茶椀
中煎候硬别加酥便饮下以手窒鼻
孔若不然香氣衝鼻殆不可饮

驅風解毒湯 見侵風火咽痛咽腫者
防風 荆芥 羌活 連翹 牛蒡
甘草各等分加石膏为炒

右七味水煎食後服

涼膈散

薄荷 甘草各八分連翹一钱大黃
一钱半芒消一钱桔梗八分栀子
黃芩各一钱 右八味

舌病

四物加周麻老葱湯或細辛或石膏
當歸三钱芍藥二钱川芎一钱半
地黃三钱 右水煎三黃湯是也切者

乳香散 理口中傷爛方
乳香一钱朱砂少

右二味細末敷患處

馬足飲 重舌或纏喉風或加桔梗末服

方見眼耳中或驅風解毒湯加桔梗石膏治服

翠鳳散 治金刃傷及蚊毒塗患處或

婦人脫血服之

蒿雀去翅豆穡填在疔燒存性

玄為散敷傷處或服之

防風通聖散

方見眼耳中

艾凶湯

方見痛中

丹霞條 或粉劑 方見下疳中

治鼻痔 瓜蒂末塗之

葛根湯 鼻淵腦漏者方見痛中或土物

解毒加辛芩方見下疳中

翻去湯 肥漏偏頭痛者方見牙齦中

或口鼻見血者黃柏末塗患處

寔齋散 理舌疔及一切口中生瘡并

翻毒痛方

昆布未經製造者佳燒存性枯礬二分

馬葛散

鹽梅連核燒存性二錢 巴豆為霜二錢

右四味研末傳瘡上甚良

○ 齶齒痛 人參 焦膽 杉木脂

三味并主之

△ 松節散 牙根動搖者

松木節燒 和鹽少許臨臥塗牙根

○ 走馬下疳 三黃湯方見中風中

○ 紫圓方見脚氣中 豈菴散

○ 馬足攸方見眼耳中

并皆主之

灸 巨骨三五壯 治齶齒

○ 頸項部結核處 咽喉盡去一切主

之

○ 纏喉風初起唇足大指第一節橫攸

盡處內外灸之二十壯若不覺痛者

以知為度

○ 血 一切口病刺少商穴 血則良毒深者

血不令宜再刺令谷

喉痺 騰紫蓬之則破潰

馬場

水研花 水片二分 硃砂六分 玄明粉

研砂 各五分 細末

神丹 龍腦一錢 芒消一錢 甘草一錢 土

辰砂三錢 蓬砂五錢 石膏十錢

煨末 蜜煉

○婦人

○孕胎 ○辨胎 ○惡阻 ○胎水

○轉胞 ○血暈 ○兒枕痛

○子痛 ○痔瘡 ○瘰

甲字湯 月經至前腹痛者

方見中風中 或產後腹痛

腎氣丸 無妊者

方見中風中

折衝飲 產後腹痛者 或血暈者

芍藥 桃仁 桂枝 各一錢 紅花五分

二十四 婦人

馬蹄炭

當歸 芍藥 牛膝 各八分 牡丹皮
玄胡 各五分 甘草 一分

右十味以水二合半煮取一合半服

溫經湯 手掌煩熱或婦人少腹寒久
不受胎兼崩中去血或月水來過多
及至期不來

吳茱萸 當歸 芍藥 芍藥
人參 桂枝 阿膠 牡丹皮
生姜 甘草 半夏 麥門冬
右十二味

芍藥湯 治產後下痢及經閉帶下上

氣足冷時發熱乾噫食臭心腹妨脹
雷鳴切痛下痢不已者方

芍藥 二兩 香附子 二兩 乾姜 五兩
丁香 四分 甘草 三分 礞砂 五兩

右六味以水二合煎取一合不過五六日下痢漸減

琥珀湯 產後腫氣

方見水腫中

增損白朮散 惡阻

方見霍亂中或加烏梅若食藥共不

納者小半夏和茯苓湯方見霍亂中
猶不納者伏毒肝煎汁煎小半夏加
茯苓湯服之或冷服諸吐者皆主之
若水逆者与五苓散無効者用前法
方見霍亂中

諸熱吐逆水藥不納者

葛粉一匙天靈蓋二匙牡蛎一匙半

右三味与散水服方寸匕

產後小便利者治同轉胞

葛根加烏頭或附子治瘧

其脉弦急或沉弦多脫血之因

時

瘧者破傷風是也其症牙關緊急不
能開口項頸強急惡寒發熱或渴脊
骨痛而一及展之象形也其急者或
咬舌尖見血最產後多有半產後最
多此湯主之方見痢中白朮六點連服
括毒桂枝湯症較者或乳癰
桂枝和括毒湯是也本方見霍亂中

大承氣湯

方見腹滿中諸藥不多服則無効
若有痲者灸其上以灸為度若病重

者不徹。壯數無度

羴羊角湯 治子痲

羴羊角 木通 橘皮 各二錢 厚朴

吳茱萸 乾姜 各三錢 烏頭 五枚

右水三合煮取一合分服水啞不可畧烏毒

甚猛若減分量別可或三黃湯方見中風中

化毒丸 乳岩

方見下疳中

乳房結核痛者煎湯括薯桂枝湯主之

水仙根 研如泥塗之

膿欲成者子
金內托散
方見雜治中

或 蚕砂細末水調塗

或 乾桑末水調塗即十鏤散

乳腫痛者

口子魚頭黑燒傳內服括薯桂枝湯

和貝母

五物解毒湯 乳癰

方見下疳中將不愈者韜玄湯方見

勞瘵中兼用化毒丸方見下疳中

葛根湯 產後外感寒熱咳嗽者方見

痢中或桂枝麻黃各半湯或大青毒

湯方見中風中或小青黃湯方見痰
喘中雖產後忌麻黃邪重者不用邪
氣輕者桂枝湯或桂枝加葛根湯方
見霍亂中

柴胡桂枝湯 薄荷

柴胡 黃芩 半夏 桂枝 芍藥

人參 甘草 大棗 生姜

右九味

甘竹葉湯 內虛煩熱短氣者

竹茹 一錢 黃芩 八分 茯苓 六分 人參

二分 甘草 一分 右五味

雷婦建中湯 產後伏梁

方建中湯加雷婦也本方見積聚中

芍藥甘草附子湯 產後痿痺者

方見衄中

贊夫藍 血熱甚者

一味五七分或一錢煎服或加于巫神湯方

見水腫中

翠鳳散 俗稱血道者

方見口鼻中

知母湯 產後乍寒乍熱胸心煩悶者

知母七分芍藥 黃芩 各七分 桂枝

五分甘草二分 右五味

酸枣仁湯 心煩者

酸枣仁 知母 川芎 茯苓

甘草 右五味若甚者半夏瀉心湯

方見前中若平素虛弱者歸脾湯或

至神湯方見水腫中或三黃湯方見

中風中或安神散或抽刀散

歸脾湯 心氣痿者

茯苓 十錢 白朮 六錢 雷煇 五錢 黃耆

五錢 遠志 二錢 酸枣仁 二錢 人參 一

錢 木香 一錢 甘草 一錢 薑 眼肉

右以薑意以仁代薑眼肉十味本方有生

姜六錢

安神散 治婦人血氣不夾頭痛寒熱

多欠伸眩悸產前後并主之

茯苓 十錢 直根人參 桔梗 各六錢

黃耆 薯蕷 遠志 各十錢 甘草 一

錢半 朱砂 三錢

右八味重羅篩散服

抽刀散 血暈者先服此散後至神湯

五靈脂

右一味細末白湯送下

和味溫膽湯 治驚悸屬疾而兼氣虛

驚惕不眠者 又心氣痞者

人參 白朮 茯苓 當歸 竹茹

旋子 地黃 黃連 麥門冬

酸棗仁 各等分 甘草 辰砂 各五分

右十二味

安神丸 心氣痞者

方見勞瘵中

朱明丸 妊身七八月之間常服

方見淋中

四苓散 小便不快利者

即五苓散去桂枝湯本方見霍亂中

乙字湯 產後帶痔夜腫者

方見痢中

至神湯 產後水腫 截腹痛 甲字湯 折

方見水腫中 衄飲差不止痛甚者

禹功湯 水腫左右不覺者

方見水腫中

桃花散 水氣滿腹部者

方脚氣中

胞衣不下者 折衝飲或至神湯方見

水腫中

仙受散 產後水腫諸藥無効者方見

水腫中

治水散 一身洪腫者

方水腫中

九味栲栳湯 氣血凝滯而腫者

方見脚氣中

寶脾飲 產後下痢後、浮腫者

方水腫中

第一和齋湯 苦心下迫者 又催生

附子 白朮 黃耆 芍藥各一圭

當歸 乾姜 川芎 茯苓各五分

桂枝一圭 甘草一分

右十味以水二合半取一合半服

加味逍遙散 或加香附子木香 方服耳中

二十
帶下

○赤白帶下

甲字湯

方見中風中

折衝飲

方見婦人雜病中

大黃牡丹皮湯

方見痔中

抵當丸

水蛭二十箇 蠶虫二十五箇 桃仁二

十箇 大黃三兩 芍药四味 糊丸

馬高

Blank page with vertical lines for text.

香姜湯 股間惡冷牽引者

乾姜六分芍藥一丈二分香附二丈

五分甘草二分 右四味

丁香飲 理婦人血積或滯下吐沫上

氣膠冷寒熱往來咳嗽者先逐瘀血

後用此湯

香附子一丈乾地黄八分當歸五方

川芎三分昌陽八分丁香三分紅花

甲三分 或加阿膠或加土茯苓

右七味以水二合煮取一合日二劑

或三劑服後發熱倍前者為知

膠艾四物湯

當歸 地黄各三丈芍藥二丈川芎

一丈五方艾葉三分阿膠三丈

右二味以水二合半煮取一合半服

腎氣丸

方見中風中

坐蕪

杏仁 甘草各二分丁香一分桂枝

大方片腦五厘

右為末盛筴葉納截中
人參湯

方見霍亂中

大柴胡湯

方見黃疸中

小柴胡湯

方見痢中

犀角地黄湯

主便血鼻衄吐血

犀角

地黄

各二兩芍藥七錢五分

牡丹皮一兩

右四味水煎

或加
當歸黃
連黃芩

桂枝湯

方見霍亂中

爾漏

三黃湯方見中風中或發夫蓋

或生地黄汁或藕汁或正神湯方見

水腫中若他傳不眠者酸棗仁湯方

見勞瘵中

耆蔞瀉肝湯或加土茯苓

帶下有臭

氣者方見淋中

化毒丸

粉丸

并見下痢中

馬其湯

廣東人參 血症之主藥

灸 六 膠

補血散

當歸 六分 乾姜 六分 香附子 六分
益母 四分 川芎 二分 胡枙 七分 甘草 二分

小兒

○驚口 ○臍風 ○撮口 ○夜啼

○臍中冷血 ○魘病 ○血毒暴熱

甘連大黃湯 初生兒先用此湯或紫圓

甘草 大黃 黃連 右三味煎服

紫圓 初生夜啼多係腹痛先用此丸

若不愈者 灸 不容 天樞

初生不能乳者多係驚口若不

以全葱白根塗舌上即能飲

○搗口瘡亦主之方見脚氣中

驚口瘡輕症者

天瓜粉和燕脂塗之又取藍沫和乾

燕脂塗之

一極散 疳小兒驚口方
糞虫土旺中取為霜稱尾長蛆者用生廁

中者
取一味白湯送下并和糊敷足心

治小兒胎毒諸病以紫圓為至治若驚
口瘡將痊者以紫圓一二重下之則愈
若不愈者再三服之只是赤子初生姓

一極散

息畏紫圓者此散与之方書皆言銀突

耳或生砂輕拭去此法亦可

弄玉湯 腹中絞痛者多為中水主之
方見痢中若屬冷者加附子若欲驚

風者 灸天樞

凡疳帶退後七日而浴之
三妙散 小兒疳中血者而死者帶

法也若二三日而不愈者

煑桐子 煑木 黃柏各等分
右三味共細末乾撒肚臍中水津塗

成片止痛溼濕又治濕癬以蘇合油調搽甚効

葛根湯 方見痲中

夏月無故微煩而柔熱煩渴吐乳微下痢似痲非痲半服而夢中驚噩非驚風似驚風似痲非痲似食傷非食傷而無辜暴熱也須以麻決去凶麻數急者難治也或沉伏或絕麻四支厥冷或妄語者凶候也初服此湯或三黃湯方見中風中或天竺胡湯方見黃疸中或小柴

胡湯方見痲中或柴胡四逆湯方見瘧中或熊膽或紫圓方見肺氣中臨時斟酌

腎氣丸方見中風中或美玉湯加附子方見痲中并治小兒尿床各効最多灸法 十三骨椎之左右紫拱之灸五十壯

香薷散 治遺溺方

及鼻十莖丁香二分

右二味細末臨卧白湯送下後溫酒任性九

馬其功

自七歲至十歲每服五分自十歲至十五歲
隨年壯每增一分至一錢十五歲以上每服
一錢溫河送下惡風者白湯亦可不過二十
日而痊

小兒患痢者難治也者十居七八烏梅
圓方見痢中建理湯方見痢中姜玉
湯方見痢中或水附子腹部分效最
驗痢如青菜汁者姜玉湯奇驗
姜玉湯加使君子主痢方見痢中
葛根湯主疫痢多難治方見痢中

瘧無異大人

艾山湯

出積

方見痢中

疳勞

姜玉湯加附子方見痢中

柴胡姜桂湯方見勞瘵中

柴胡桂枝湯方見婦人中

柴胡四逆湯方見瘧中

水灼丸方見勞瘵中

雞肝丸方見眼耳中

黑瞳散新柴丸左、羅丸

疳水

六味丸六味丸方見中風中

疳眼

葉國方見脚氣中

雞肝丸方見眼耳中

艾山湯方見痢中

林雲湯方見眼耳中

葛根湯加黃連黃芩大黃或去

黃芩方見痢中

咳嗽

麻黃杏仁甘草石膏湯

小青蘘湯方見痰喘中

二陳湯加鷓鴣

茯苓 半夏 陳皮 甘草 生姜

右五味水煎

久咳 阿片一味糊丸每服五六粒

或每鷓鴣皮并散方見勞瘵

右、羅丸 疳痢者

熊膽 麝香 牽腦 莖述 枳櫛

各等分朱砂為衣

新榮丸 理小兒疳疔黃瘦者

蟾頭一枚炙令金黃雞頭炙令焦黃

黃會各二支胡黃連 五倍子

苦楝皮 夜明砂 雀糞 一名天將水

馬其功

子五分 熊膽一分 雄黃二分 麝香五分 青黛三分

古十二味 細末 以糯米飯丸 麻子大一歲
兒每服七丸 日三次 米飲送下 隨年壯
用意增之

黑龍散

烏一隻 脫月 抽之 去翼 只留 并腸 換滿
紅花 車前子 漬之 廁內 糞中 三十日 入瓶中
燒存性 右細末

灸

梁門 肝俞

天樞 身柱

章門

高俞

馬場

馬牌風
驚風

○驚風○馬牌風

葛根湯若吐者加半夏方見痢中

紫圓

方見脚氣中

三黃湯

方見中風中

大柴胡湯

方見黃疸中

小柴胡湯

方見痢中

馬牌風

參連白虎湯

方見勞瘵中

熊參湯

方見中風中

熊膽

化毒丸一二分

治馬脾風

方見下疳中

黃連解毒湯

方見中風中

淨府湯 治小兒疳積癆痢

柴胡 茯苓 玄胡 三棱 莪朮

山查 澤瀉 白朮 半夏 人參

胡黃連 甘草 黃芩

右十三味

灸 章門 不容 天樞 上中脘

湧泉 勞宮 人中

○丹毒

夫丹毒者最暴卒之病也其初左右兩
耳及兩頰作赤黑色者是也治方左右
內臂祿力痛之處以心吸惡血者三四
口即愈若猶不愈者以平鍼輕刺之
心血猶不愈者按足大指爪際刺之
內服藥

三黃湯

方見中風中

白虎湯

馬葛

Blank page with vertical lines for text.

方見勞瘵中
犀角一味

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

○痘瘡

○初熱

初熱之形狀全類傷寒腰脚疼軟多難
起步惡寒漸去惟從熱而睡中驚悸鼻
息粗耳輪冷或面色赤可欠煩渴吐逆
或發驚或狂躁或衄血者皆難定法或
有古上帶黃白胎其熱甚其脈浮數者
或發驚熱甚者同為佳兆也內熱在散
之兆也雖然可裏實可毒壅可血熱同
察唇色以為用藥把握也或發驚熱後

者不論是驚風是痘難治也如慢驚風
一日十卷者屬虛難治也若陽志而在
躁者同色兆內熱在表之形也雖坐譫
語煩躁至四日以上者異例也

主方

葛根湯

方見痢中

桂枝加葛根湯

方見霍亂中

三黃湯

方見中風中

紫圓

方見脚氣中

參連湯

方中風中

熊參湯

方中風中

黃連解毒湯

方中風中

一角人中黃

參蘇飲局

半夏

柴胡

茯苓

葛根

紫蘇

陳皮

枳壳

桔梗

前胡

人參

木香

甘草

生姜

右十三味

敗毒散回

羌活

柴胡

薄荷

連翹

桔梗

枳壳

川芎

茯苓

忍冬

甘草

生姜

右十一味

周麻葛根湯

水痘

葛根

周麻

芍藥

甘草

生姜

右五味

○出痘

桂枝加葛根湯

本方見霍亂中或加防風

三黃湯方見中風中或加犀角

黃連解毒湯方見中風中

二方毒壅者

石膏 厚朴 煨黃白朮 煩渴者

人參 附子

見点色白或吐瀉或腹痛或自汗厥

冷大劑服之

馬場藏

馬場藏

温中益氣湯治血氣虛弱送毒氣不
令而驚搐狂躁者

人參 白朮 黃耆 雷歸 茯苓

甘草 川芎 白芷 防風 木香

桂枝 小查 生姜 大棗

右十四味 或加犀角

六連翹飲 灌膿潰爛臭氣撲鼻者

連翹 薤麥 滑石 車前 芍藥

施子 木通 雷歸 防風 柴胡

黃芩 荆芥 蟬退 甘草 竹葉

燈心草 牛蒡子 右十七味

△省法

稀疎 圓整 輕鬆 尖聳 凸起

如粟而肥滿 皆可膿化之兆也

△稠密 瑣屑 壅滯 平塌 陷下

如瘰 如疥 如疔子 如蚕種

如火刺 如湯泡 如蚤蚊班

皆不能成膿之兆也

△察色

紅活 蒼老 光澤 紅白兩分

紅如桃花 白如蠟色

皆可膿化之兆也

疔疔 焦枯 嬌嫩水疱毛刺

灰白不明 赤遍紫 氣血混一

白如膩粉枯骨 紅如紅米飯猪肝

黑紫 青藍 皆不能膿化之兆也

唇腫 口臭 斑痧 痘色不在

驚狂不止 脘腹痛不止 胸高氣喘

瀉不止 內攻外刺 空倉無膿 擦破無膿血 蒙頭瑣頂 折腰脚

皆惡候也

灸 關元

馬場藏

馬場藏

○起脹

葛根加反鼻湯 治內攻者不內攻者

用前方 本方見前中

伯州散 今癰疔潰膿方

石蟹 反鼻 鹿角各燒為霜 沈香

各一錢 右四味為末每服五分或一錢日

三服白湯送下溫酒亦佳若小兒不能

服者蜜煉亦得

馬場藥
 一、...
 二、...
 三、...
 四、...
 五、...
 六、...
 七、...
 八、...
 九、...
 十、...
 十一、...
 十二、...
 十三、...
 十四、...
 十五、...
 十六、...
 十七、...
 十八、...
 十九、...
 二十、...
 二十一、...
 二十二、...
 二十三、...
 二十四、...
 二十五、...
 二十六、...
 二十七、...
 二十八、...
 二十九、...
 三十、...
 三十一、...
 三十二、...
 三十三、...
 三十四、...
 三十五、...
 三十六、...
 三十七、...
 三十八、...
 三十九、...
 四十、...
 四十一、...
 四十二、...
 四十三、...
 四十四、...
 四十五、...
 四十六、...
 四十七、...
 四十八、...
 四十九、...
 五十、...
 五十一、...
 五十二、...
 五十三、...
 五十四、...
 五十五、...
 五十六、...
 五十七、...
 五十八、...
 五十九、...
 六十、...
 六十一、...
 六十二、...
 六十三、...
 六十四、...
 六十五、...
 六十六、...
 六十七、...
 六十八、...
 六十九、...
 七十、...
 七十一、...
 七十二、...
 七十三、...
 七十四、...
 七十五、...
 七十六、...
 七十七、...
 七十八、...
 七十九、...
 八十、...
 八十一、...
 八十二、...
 八十三、...
 八十四、...
 八十五、...
 八十六、...
 八十七、...
 八十八、...
 八十九、...
 九十、...
 九十一、...
 九十二、...
 九十三、...
 九十四、...
 九十五、...
 九十六、...
 九十七、...
 九十八、...
 九十九、...
 一百、...

○灌膿

小葉胡湯 或去半夏加連刺周麻或
 加大黃或去方見痛中
 伯州散

馬場藥

馬場藥

○結痂

小柴胡湯去半夏加桂葉中更加連翹
周麻 或兼用一角在王連翹

五物解毒湯

方見下疳中

通達散 帶微熱或盜汗者

方見眼耳中

桂枝去桂木連翹防風湯或加黃芩或
加大黃

本方黃芩去芍藥中
小柴胡湯去半夏加桂葉中更加連翹

此藥... 治... 功效... 宜... 忌... 宜... 忌... 宜... 忌...

○落痲

○落痲

六連翹飲 有寒熱而實者虛而寒者
加黃耆人參桂枝
桂枝去桂加防風連翹周麻湯
本方見霍亂中

○痘後雜治

銀丹膏 療一切赤眼及障翳不多日

者或痘毒入眼者七日内者極驗

巴豆 極研 銀丹 各等分

玄二味以麻油及蜜少許和勻塗眼會
乾換之二三日稍覺嫩痒隨乾細胞
是其驗不過七日効

雞肝丸

方見眼耳中

赤小豆湯

馬場

方見水腫中

聖靈湯

方見水腫中

此方見水腫中... 聖靈湯... 方見水腫中... 此方見水腫中... 聖靈湯... 方見水腫中...

○麻疹

周麻苦根湯

始終之主方、見痘中

咽喉甚痛者加桔梗大便秘者加大

黃芩逆甚者加半夏眼目赤痛者合

三黃湯毒在瞳子者麻聖湯方見眼

耳中兼用雞肝丸方見眼耳中肚心

腫痛脫肛者乙字湯方見痢中若婦

人月經通未者先治麻為要若墮胎

者折衝飲方見婦人中或甲字湯方

見中風中

麻疹

馬場

越婢加朮湯 麻痺後痿者

方見脚氣中或木防已湯方見脚氣

中或大物附子湯方見脚氣中或桂

枝朮羌朮附湯本方見霍亂中

葛根湯

方見痲中

桂枝加葛根湯

本方見霍亂中

麻杏石湯

麻中咳者

麻黃

杏仁

甘草

石膏

右四味若不愈者大青龍湯方見中風

中或柴胡姜桂湯方見勞瘵中

尚足飲

麻痺中牙痛或牙疳

方見服耳中

周麻葛根湯全人卷白虎湯方見勞瘵

中

○狂犬傷

其症口渴引飲喜譁狂躁如狗叫其症
奇怪不可名狀
凡狂犬咬人者須急以黃金漿若吐者
更与少且須用熱人尿洗去傷口者一
再次此時於傷口上宜細視之當有如
薄膜者是狗牙根之垢查也謹不可當
速洗去之流血脈不斷者為妙若血
不流溢者方將鋒針刺破之血止則与
紫金丹血止拭去傷口仍上艾火如法

馬場藏

馬場藏
此處有若干行非常模糊的竖排文字，可能是另一页或另一部分的记录。

而白玉湯送下紫金丹毒甚者連服
傷口未愈癩汗不禁山陽者難救宜先
刺足委中出血而與黃金漿兩三日紫
金丹主之服後無寸効者死
傷口報瘡五六十日若百條日其人惡
風口渴畢丸內吊二搜用徒行步動作
呼吸乃迫者將癩瘡宜急理之與紫圓
而取下二三日若四五日已癩瘡口噤咬
牙角弓反張口吐涎沫舌縮舌枯眼昏
無神水飲不下者死

成

九日毒再癩者難治

白玉湯 理糊大咬人

杏仁 三 棗根 白皮 二 炙

右二味以水二合煮取一合日二劑

別杏仁蔥白俱杵盪泥裏瘡口灸數

十壯令口不合甚妙

白壁散方 理回毒再癩狂躁亂者

天靈蓋 右一味研末水服

蝦蟆膏法

馬場散

黃金漿

生姜搗取汁

鐵漿

右二漿分

一合冷服

蝦蟆切取兩股去皮洗淨作臍橋芳
茅之類通其宜或灸食者効少如冬
月乾蝦蟆煎服以多為妙其効大男
灸傷口

熱人尿若新汲水洗去傷口令血冷
而灸上以一百灼為度以一百日為
期綿若紙封之其更灸時菲葉煎
汁洗去痕上而上艾火百日內不可
開也艾炷之大小隨傷口

又法

用胡桃壳半箇填人糞抵傷口而上
艾火以其壳燒去覺痛為度

又法

蒜若薤去兩頭切中間三分厚安瘡
頭上用艾炷於蒜上灸之每百壯蒜
敗乃易

又法

用人糞貼瘡口上灸之七日必至百壯
糞乾乃再換百日之內漸減至三五壯

刺尺中

紫金丹

山慈姑 去皮洗 川五倍子 洗各二兩

千金子仁 白者研 紙壓去油一兩

大戟粉者去毒兩 麝香 一錢五分

右五味重羅令勻 用糯米漿飲和之

木四杵子杵作一錢一錢病甚者連

服

主治湯火傷毒蛇惡犬一切虫傷並和

冷水藥塗仍服之

治之不拘毒食禁忌其法見咬之初先

諸虫

解以赤豆麻物川鱗海魚水禽林鳥一

切肥膩之類凡以過意不覺為妙咬處

未愈之際灸之且餌毒如吐則後身無

有所忌決無再瘥之患若既失理咬處

早愈者不在他例矣灸之法初日點人

糞瘰口焦馬火熱微為度次日洗去之

不復用糞直灸之若忌糞穢者不點亦

佳傷處爛潰者灸壯漸減至丁工十壯

而止若灸而不爛者點膽禁巴豆輩亦

良狼亦瘥狂与常狗同

〇

珊瑚膏 治毒蛇咬痛脹者方

乾枚 漬麝酥中以其爛漬為泥為度
右一味為膏塗咬處神驗急卒無膏
搗乾枚為泥和好酥塗之亦佳枚漆
塗之不及膏

翠鳳散 治蜈蚣蜂螫諸惡虫及毒蛇

咬方見口鼻中

白雪散 治蚊蚋小虫毒螫為腫痛者

礬石 枯遍

右一味為末和唾塗 又將散內於冷冰

浸傷處其毒浮水面而解

紫金丹

灸傷口

有紫斑隱見無常粟者鼠毒也

銀花飲 鼠毒之主藥

方五物解毒湯去葳菜加防風

紫金丹 二三方

灸傷口 七八壯悉為仄者為妙若根

礎有條燻或不覺痛熱者不在常數
須以燒盡艾形不遺知苦熱者為度

歷節疼痛虛
羸往來寒熱
作勞狀或偏頭
痛者鼠毒偶有
此症

〇

三十一
鼠毒

馬場

萬藏丸

烏蛇 白蛇 各一丈 大風子 三百枚
 苦辛 午膝 防風 周麻 各六丈
 麝香 二分 大黃 六丈 乳香 二丈 熊膽
 一分 麒麟血 五方 種人參 一分 童腦
 一分 金箔 十五張

右十五味 杵大風子 于下內 諸藥 合之 更杵
 之內 盡磨 令相得 丸 彈丸大

治 脈下 孤良方

白檀 枯礬 各二丈 輕粉 五方 右細末

千金內托散

黃耆 當歸 人參 各二錢 川芎

防風 桔梗 白芷 厚朴 桂枝

甘草 各一錢 木香 右十味

大補湯

茯苓 白朮 芍藥 當歸 川芎

地黃 人參 各一錢 甘草 五分 桂枝

黃耆 右十味

南極散 天南星 鹿角霜 黃柏

括萆 各等分 右四味 細末

○疫

桂枝湯 上衝頭痛 脈浮惡風 寒熱汗出

者 方見霍亂中或下後脈浮者

桂枝加葛根湯 項背強有汗者

葛根湯 項背強無汗者或熱結傍流邪

毒溢而下利者又自利者此症在初起

者并主之 方見痢症或大承氣湯

麻黃湯 脈浮緊熱發惡寒頭疼身痛喘

咳者 方見

麻黃 桂枝 甘草 杏仁

桂枝麻黃各半湯 寒熱數往來咳者

小青膏湯 咳者

方見痰喘中

大青膏湯 渴者

方見中風中

大柴胡湯 表熱不達解經數日柴瘧之

之變症熱毒內結成而腹痛者毒結也

宜下之又潮熱者黃身痛飲食少夜

而譫語自足浮腫及周身面目脈沈伏

○小便用塞諸藥無効者

無痰滿但高熱有痰者調胃承氣湯

時乾吐粘唾唇口皮卷者是失下也

方見黃疸中

大承氣湯 堅結者或粘膩極臭惡物多者大黃

方見脚氣中○得芒消有蕩滌之功

小承氣湯 邪熱傳裏中焦痰滿者

方見腹滿中

白虎湯 煩渴者兼解肌表散漫之熱或加人參

方見勞瘵中

小柴胡去半夏加桂枝湯 下後

方見痢中

外臺批核承氣
湯症云往來寒
熱胸腹逆滿

或

小柴胡加大黃湯 自汗大便秘舌上有
少胎者愈後微邪不除條熱猶在者或
愈後大便秘時、吐而食不進飲湯水
亦吐吐者是下格也此方主之或大柴
胡湯或痰血諸症頗具者此方主之

真武湯

血氣精神共疲循不摸床撮空

理線筋惕肉瞤振或者極虛也

方見霍亂中

柴胡四逆湯

陰陽相半耳聾煩躁紙熱

渴而好熱飲舌上黃胎離、乾燥舌卷

言語呶喃妄語脈細數無力飲食不進
前板齒振脫氣弱壯背動氣少微惡寒
或眼目無神口渴自汗脈浮大好熱飲
舌上如白砂胎呼吸促迫呼不應或潮
熱帶血熱而神虛譫語者或舌上如沫
淡墨者或虛脫而自汗多者或下後脈
反數似白虎湯症熱渴者
方見瘧中

朱明丸

愈後大便秘不通者又轉矢氣極

臭者

方見瘧中

桂枝加芍木附湯 愈後通身浮腫飲食
 如常身無熱難行步者 方見霍亂中
 歸脾湯 解後脈腹共復精神痿蹶如狂
 如狐祟或不寐者 方見婦人中
 和味通達散 婦人傷寒徑水通未或通
 斷或產後不可者按血熱或欠伸或下
 後餘熱不盡者大似散氣之症世方主
 之 方見服耳中
 龍骨 牡蛎 黃芩 盜汗者主之
 應下諸症

舌白胎滿黃胎 舌黑胎 舌芒刺
 舌裂 唇焦色 唇色皮起 口臭
 鼻孔如烟煤 口燥渴 自赤 咽乾
 氣噴如火 小便赤黑濁滴作痛
 小便極臭 揚手擲足 脈沈而數
 潮熱 喜大息 心下滿 腹脹滿
 心下高起如塊 腹脹滿之愈痛
 心下痛 心下脹痛 頭脹痛 小便閉
 大便閉 轉屎氣極臭 大便膠閉
 便熱下利 熱結傍流 血逆 脈厥

馬場藏

體厥 **△** 癡狂

以上三十五症

連原飲 輕夜誤治似大柴胡湯症者

方見勞瘵中

△ 陽旦湯

即桂枝湯加黃芩也或加葛根

竹葉石膏湯 解後虛羸少氣、逆欲

吐者方見勞瘵中

人參養榮湯 白朮 十三味 姜枣

人參 麥冬 遠志 地黃

雷煇 芍藥 知母 陳皮 甘草

右九味 遠志 黃芩 桂枝 茯苓

△ 柴胡清燥湯 下後間服復劑

柴胡 黃芩 陳皮 知母 花粉

甘草 姜枣煎服

隱白 素爪甲上去端如韭蒸 爪甲角外
 大都 掌大指本節內側赤白肉際 肘后
 三陰交 甲內踝上寸骨下陷者中 骨後筋前入
 大敦 雲足大指之端及三毛之中也為井 去爪甲如韭蒸 甲
 湧泉 雲足下中央之脈 素陷者中 足是捲指宛中 甲
 巨虛下廉 素上下廉三寸 巨虛上廉 素下三寸三寸
 三軍 素膝下三寸 雲附胫骨外邊捲之凹凹然也 肘后小兒
 禁安類 犢鼻 素膝頭眼外側入刺膝腹出液
 為政素 伏兔 素膝上六寸起肉間 甲
 承心 雲兌端陽下分肉間陷者中 甲

馬其陽

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

委中

素臍中央為合委取之聖約攸中動脈

腰眼

治腰痛令病人平臥以筆於兩腰腿穴中點二穴

痞根

專治痞塊十三椎下各開三寸半大約穴与膈齊平

膝眼

四穴于膝頭骨下兩傍陷者穴中是

尻市

兩髀外可平倚垂手直掩髀上當中指頭大筋上按自

臑

臑好肘后 絕骨上三寸動脈中 甲骨絕頭

陷中外

當骨尖頭類

四花

僂項向前齊鳩尾者翻向項後令其人合橫量而兩吻

患門

準足量者自鼻頭過髮中以別繩子至兩口吻自鼻

柱根下

...

五德湯 理數與肉毒頭痛寒熱面紅腫
或遍身癩疥方

荆芥 一錢半 橋皮 一錢

右二味以水二合煎取一合日三劑

甘豆湯 甘草 黑豆 右二味

橋皮竹茹湯 治吃逆 六味

橋皮 竹茹 大棗 人參 甘草 生姜

