



内科秘録  
三

ヤ 9  
954  
3





門 79  
號 954  
卷 3

冊 四十  
號 二 執  
函 九十



內科  
錄卷之三

錄

痢疾

泄瀉

中暑

霍亂

瘧疾

內科  
卷三  
目錄  
一  
日進  
高  
歲



痢疾  
 寒痢  
 疫痢  
 休息痢  
 氣痢  
 熱痢  
 久痢  
 滯下  
 痢疾

内科秘録卷之三

水戸 棗軒本間救和



痢疾

滯下

久痢

熱痢

氣痢

休息痢

疫痢

寒痢



赤痢

白痢

噤口痢

痢疾ハ外感ニテ夏ヨリ秋ノ間ニ多シ春冬ハ先ツ無  
 モノナリ此邪ハ腸へ著ラ病性ト為ス小兒ハ腸ノ  
 脆弱ナルモノユエ感シ易ク治シ難シ十人ニテ  
 七人ハ死スル者ナリ老人モ亦腸ノ衰弱ナルモノ  
 ユエ小兒ニ準ス少壯ノモノハ多クハ平愈スルモ  
 ノナリ稀ニ死スル者モアレ凡二十人中一人ナリ  
 傳染スル下傷寒ヨリモ速ニシテ一人之ヲ患ルキ

ハ數日ノ間ニ舉家皆病ムニ至ル者ナリ之ヲ避ル  
 ニハ病室ヲ異ニシ廁ヲモ別ニシ又傷寒ヲ避ルノ  
 法ノ如ク病室ヲ清淨ニシ時節モ夏秋ノ下ナレハ  
 戸障子ヲモ開キ屏風ヲモ去リ邪氣ノ鬱滯セヌヤ  
 ウニスルヲ專要トス小兒ハ同居シテハ逆モ免レ  
 ヌユエ親屬ノ家へ寄居シテ之ヲ避ルヲ良策トス  
 最初ハ惡寒發熱シテ脈浮數ニナリ腹中痛ミ水瀉  
 スル下五六行ニ及ヒ乍下裏急後重シテ快利セス  
 數廁ニ上レ凡大便ハ通セス唯腸垢トテ涕ノ如キ  
 物へ血ヲ交ヘテ下リ或ハ血ノミ下ルモ有リ舌上



白胎ヲ生シ或ハ渴シ或ハ嘔シ穀食ヲ思ハス小兒  
 ハ兩三日ニシテ腹カ脱シ易シ大人モ他病ニ比ス  
 レハ早ク疲勞スルモノナリ初ヨリ邪氣ノ腸へ著  
 モノナレハ發表ノ手段ニテ全效ヲ取ルヤウニハ  
 成リカヌル者ナレ氏惡寒脈浮數等ノ表證アル者  
 ニハ先ツ葛根湯ヲ頻服セシムヘシ次ニ黃芩湯加  
 葛根黃連ヲ與フヘシ即チ黃芩湯ト葛根黃連黃芩  
 湯ノ合方ナリ熱痢ヲ治スルニ奇効アリ下利次第  
 ニ多クナリ腹痛甚シク稍脱狀ヲ見ハス者ニハ桂  
 枝人參湯若シクハ逆挽湯ヲ撰用スヘシ

諸病下利ノアル者ハ胎ヲ生セヌモノナレ氏痢ハ白  
 胎或ハ黃胎ニナル者ナリ其毒深キモノハ黑胎ニ  
 ナリテ乾燥シ或ハ裂ル一モ有リ或ハ謔語腹微滿  
 シテ撮痛シ數廁ニ上リ裏急後重甚シク廁ヨリ歸  
 ル間モ無ク復行タクナリ或ハ廁ニ長ク居リテ歸  
 ル一ヲ欲セス下ル所ノモノハ皆膿血ニテ色<sub>鱗</sub>鱗<sub>鱗</sub>  
 ノ如ク腥キモノナリ遂ニ脱肛シテ納マラス強テ  
 納ルハモ復乍チ脱テ難儀ナルモノナリ此證ヲ世  
 ニ疫痢ト呼ヘ氏實ハ痢ノ重證ニシテ別ニ疫痢ノ  
 アルニ非ス傷寒論ニ下利謔語者宜小承氣湯トア



リテ一先ツ蕩滌スヘシ合璧飲ニ宜シ保命集及温  
疫論ニ載ル所ノ芍藥湯又感證集腋ノ檳榔順氣湯  
ヲモ撰用スヘシ裏急後重ニハ檳榔木香ヲ何方ヘ  
モ加フヘシ然レモ大黃ノ效ニハ若カス

小兒ハ忽チ疲勞シテ身體羸瘦シ腹ハ脊ニ附テ大黃  
ヲ用ユル時ノ無キ者ナリ四逆散若シクハ錢氏白  
朮散若シクハ紫苓湯ヲ撰用スヘシ疲勞極ルモハ  
脈沉微ニシテ四肢厥冷スレモ衣被ヲ發開シ輾轉  
反側搖頭弄舌シテ須臾モ安靜ナラス即煩躁ナリ  
或ハ上竄或ハ乾嘔或ハ冷汗出テ乳ヲ飲ムモ渴ス

ル故ニテ實ニ穀氣ノ有ルニアラス下利ノ減スル  
モ下ルモノハ盡タルニテ實ニ邪氣ノ退タルニ非  
ス肛門モ開テ洞洞トナリ閉肛ノ機ヲ失シ呼吸短  
促ナリ時ニ大息スルハ皆疲極ノ候ニテ必死ト  
為ス茯苓四逆湯若シクハ四逆加人參湯若シクハ  
附子理中湯ヲ撰用スヘシ  
小兒ハ前ニモ迷ル通リ療治ノシニクキ者ニテ第一  
ニ藥ヲ飲マズ又脱シ易キ者ナレハ必死ト定メテ  
モヨキ程ノ者ナリ嘔吐甚シキ者ハ藥ハ勿論少モ  
飲食セズ絶粒ニ至ル者アリ之ヲ噤口痢ト名ク熱



ノ胃口ニ鬱滯シタルナリ半夏瀉心湯ノ主治ナリ  
 又黄芩加半夏湯若シクハ黄連湯若シクハ參連湯  
 ノ類ヲ撰用スヘシ痢ハ本腸病ナレ氏胃及胃管ハ  
 咽喉ヨリ肛門マテ一條ノ膜管ニシテ同體ノ物ナ  
 レハ其毒胃及胃管へ波及シテ嘔吐ヲ發スルノ必  
 然ノ理ナリ

痢ヲ患ルノ日數過多ニシテ嘔吐止マス飲食ヲ欲セ  
 サル者ハ必ラス蛔蟲ノ所為ナリ予是等ノ證ニ臨  
 ンテ設綿施那ヲ與ヘテ奇驗ヲ得ルノ最多シ同藩  
 某ノ男痢ヲ患ルノ日十餘日ニシテ熱已ニ解シ下利

モ減シタル氏穀食ハ勿論梨子蜜柑ノ類モ口ヲ噤  
 シテ食セズ疲勞日ニ加ヘ死ニ垂トス先醫手段盡  
 テ手ヲ束タレ氏予ハ蛔蟲ノ見込ニテ驅蛔丸ヲ與  
 ヘタルニ果シテ蛔蟲ヲ下スノ十餘條ニシテ飲食  
 忽チ進ミ不日シテ全快セリ又同藩某ノ男痢ヲ患  
 ルノ十餘日熱解シ下利モ亦減シタル頃却テ飲食  
 ヲ欲セス父母強テ進ルルハ自ラ兩手ヲ以テ口ヲ  
 障蔽シテ之ヲ拒ミ幾ト絶穀ニ至レリ是モ驅蛔丸  
 ヲ投スルニ果シテ蛔蟲ヲ下シ立トコロニ飲食ス  
 ルノ數椀續テ飲食進ミ速ニ全愈セリ



毎日潮熱ヲ發シ渴シテ水ヲ飲ミ食ヲ思ハス或ハ乾  
 嘔又苦味ノ藥ヲ飲ム<sub>レ</sub>能ハス小便ハ大便ノ時ノ  
 ミニテ別ニ小便スル<sub>レ</sub>無ク且澁滯シテ快利セサ  
 ル者ハ紫苓湯ニ宜シ前件ノ諸證備ハリ且腹微滿  
 シテ急痛シ裏急後重ノ甚シキ者ハ大柴胡湯ヲ與  
 フヘシ

日數過多熱已ニ少ナク下利モ亦從テ減スレ<sub>レ</sub>膿血  
 多ク下リテ臟毒ニ似タル者ハ傷寒論ニ所謂便膿  
 血ニテ桃花湯ノ證ナリ千金大桃花湯若シクハ春  
 林赤石脂湯ヲ撰用スヘシ痢ヲ患ル<sub>レ</sub>數十日ニシ

テ熱既ニ解シ唯下利ノ止マサル者ハ真人養臟湯  
 ニ宜シ又補中益氣湯ヲ與ヘ阿芙蓉液ヲ間服ス又  
 天樞ニ灸スヘシ

痢疾ハ愈下リテ愈疲ル<sub>レ</sub>モノユエ病家早ク止メ  
 ン<sub>レ</sub>ヲ欲シテ世ニ賣ル調痢丸痢病丸活兒丸等ノ阿  
 片劑ヲ服シ下利ハ立トコロニ止メ<sub>レ</sub>氏卒ニ腹滿嘔  
 吐四肢逆冷等ノ證並起テ死スル者寡カラス續瘍  
 科秘錄ニ其害ヲ辨セリ痢毒ノ腸ニ著テ數下利ス  
 ルハ淋疾ニテ小便頻數ニナルト同シ其毒除カサ  
 ン<sub>レ</sub>ハ下利ノ止ム<sub>レ</sub>無シ此ヘ澁藥ヲ與ヘテ下利ヲ



止ルキハ大害ヲ為<sub>レ</sub>必然ナリ却テ下劑ヲ投スル  
 キハ毒ヲ除去ルユエ下利モ亦從テ減スルナリ  
 痢疾泄瀉ノ二病俱ニ腸病ニシテ同シク腹痛水瀉マ  
 レ者ナレハ最初ハ混シ易キ者ナレ氏愚按スルニ  
 痢病ハ腸ノ下部ニ在リ故ニ必ラス裏急後重ス泄  
 瀉ハ腸ノ上部ニ在リ故ニ必ラス雷鳴ス最初下ル  
 所ノ腸垢トテ涕洟ノ如キ者ハ腸ノ裏面ノ粘滑液  
 ナリ腸ノ裏面ハ毛茸アリテ天鵝絨ノ如クナル者  
 ナリ此上ニ粘滑ノ液一圓ニ布<sub>シ</sub>テ飲食硬軟寒熱ノ  
 諸品觸<sub>レ</sub>氏微モ害ヲ為<sub>レ</sub>サス今下利ニテ粘滑液及

毛茸様ノ物モ悉ク剝脱スルユエ知覺敏捷ニナリ  
 テ飲食ハ勿論藥ヲ飲<sub>テ</sub>モ乍チ腹痛シテ便心ヲ起  
 ス者ナリ  
 腸垢ノ出ル所ハ近ク大便ノ有ル所ハ遠クシテ自ラ  
 其處ヲ異ニス腸垢ノ下ルキハ腸垢ノミ出テ大便  
 ノ下ルキハ大便ノミ出テ、ニ物混淆セス痢疾ノ  
 療治ハ瀉藥ヲ禁シ下劑ヲ投シテ腸中ヲ蕩滌スル  
 ラ良法トス西洋ニ灌腸術アリ下劑ト同意ニシテ  
 藥煩等ナク効能下劑ニ勝ル其法大麥ノ煎汁ニ蜜  
 適宜ヲ和シ灌腸スル<sub>レ</sub>日ニ一次或ハ二三次ニ至



ルキハ穢物速ニ泄下シテ忽チ愉快ヲ覺ユ  
 痢ヲ患ル者疲勞シテモ帛フクハ勿論淨器ヲモ用ユル  
 ラ惡ミ強テ廁ニ上ルハ疲勞ヲ促スモノナリ得ト  
 利害ヲ諭シテ之ヲ嚴禁シ卧ナカラ帛フクニテ大便ヲ  
 取ヤウニスヘシ最初ハ快カラヌ者ナレ氏慣ル、  
 氏ハ廁モ同様ニナリテ大便モ自ラ出テ脱肛モヤ  
 ス疲勞モ少ナシ故ニ重證モ轉シテ輕證ニナリ難  
 治ノ者モ亦生路ヲ得ル一有リ  
 休息痢ハ實ハ痢病ニ非ス泄瀉ニ屬スヘシ其證但下  
 利スルノミニテ寒熱無ク腹痛下重等ノ證モ薄ク

一旦愈テ後八九日ニシテ再發シ或ハ半月一月ニ  
 シテ再發シ漸漸ニ疲勞スル者ナリ皆養生ヲ慎マ  
 スシテ食復勞復スルナリ真人養臟湯ニ宜シ

痢疾應用方

芍藥湯保命集

治熱痢裏急後重

芍藥 當歸 大黃 黃芩 黃連 木香

檳榔 甘草 枳實

右九味煎服

芍藥湯溫疫論

腹痛不止者欲作滯下也無論已見積未

見積宜芍藥湯



芍藥 當歸 枳榔 厚朴 甘草

右五味薑水煎服裏急後重加大黃三錢

檳榔順氣湯感證集腋主疫痢裏急後重

大黃 厚朴 檳榔 芍藥

右四味煎服

錢氏白朮散直訣治脾胃久虛嘔吐泄瀉頻作不止精液

苦竭煩渴燥但欲飲水乳食不進羸瘦困劣因而失治

變成驚癇不論陰陽虛實並宜服

人參 白朮 茯苓各五分 葛根一錢 藿香

木香 甘草各五分

右七味煎服附子理中湯治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂

轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆滿腹中雷鳴嘔吐不

解止飲食不進及一切沉寒痼冷並治之

附子理中湯加大附子一枚

大桃花湯千金治冷白滯痢腹痛

赤石脂 甘乾薑 當歸 龍骨 牡蠣各三兩

附子二兩 白朮一斤 人參半兩 甘草

芍藥各三兩半

右十味煎服



真人養臟湯局方治腸胃虛弱下利赤白或如魚腦諸藥不効

芍藥一兩二錢 當歸 人參 白朮 肉桂半兩

肉桂 甘草各八錢 木香一兩四錢 訶子皮一兩二錢

罌粟殼三兩六錢

右十味煎服

補中益氣湯脾胃論內外傷辨惑論曰治中氣不足或誤服尅伐四肢倦怠口乾發熱飲食失節勞倦身熱脈洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩脈微細軟弱自汗體倦或中氣虛弱而不能攝血或飲食勞

倦而患瘡痢等證

人參 白朮 當歸 甘草 陳皮各一錢 柴胡

升麻各二錢 黃芪一錢半

右八味薑棗煎服

逆挽湯名古治一二日微熱泄瀉數十行而後帶血裏急

後重

蒼朮 肉桂各一錢 茯苓 乾薑各八分 枳實五分

甘草 生薑各一錢 人參六分

右八味煎服

合璧飲叢桂亭治痢病赤白下重後急者泄瀉並治之



芍藥 一錢

黃芩 七分

枳實 十分

厚朴

大黃 各五分

甘草 二分

大棗 二枚

右七味煎服。若嘔者加半夏生薑。

赤石脂湯

春林

治臟毒脫肛。肛門下重。便膿血者。

益氣湯加赤石脂。

驅蛔丸

自準

下蛔蟲有神驗。

設綿施那 二分

大黃 四分

甘草 五厘

右三味研末糊丸。白湯送下。或煎服。

阿芙蓉液 治諸病劇痛。及瘰癧痢疾。不寐飢逆等。

鴉片 一錢

火酒 十錢

右二味調和入磁器。安暖所。浸漬至為色。去滓貯。

葛根湯

大柴胡湯

四逆加人參湯

茯苓四逆湯

四逆湯

黃芩湯加葛根黃連

半夏瀉心湯

黃芩加半夏湯

黃連湯

桂枝人參湯

柴苓湯

參連湯



凡泄瀉者，其來有因。或因飲食不節，或因暑濕內侵，或因脾胃虛弱，或因小腸虛冷。其症不一，其治亦異。凡治泄瀉，必先察其脈象，辨其病機。若脈象沉而遲者，為小腸虛冷，宜用溫中散寒之劑。若脈象沉而數者，為脾胃虛熱，宜用清熱利濕之劑。若脈象沉而滑者，為飲食不節，宜用消食導滯之劑。若脈象沉而弱者，為脾胃虛弱，宜用健脾補虛之劑。凡治泄瀉，不可見瀉而瀉，不可見瀉而止。

泄瀉

脾泄

飧泄

洞泄

酒泄

暑泄

寒泄

暴瀉

久瀉

五更瀉



泄瀉ハ傷寒論ニ所謂下利清穀ノ一ニテ虚寒ニ屬ス  
 ルユエ痢病ヨリモ療治ノ六箇敷モノナリ病人ノ  
 養生ノ得失ト醫者ノ療治ノ巧拙トニテ死生判然  
 トシテ二途ニ分ルナリ其病因多端ナレトシテ十ノ者  
 ナレハ七八ハ傷食ト傷冷トヨリ来ル者多シ故ニ  
 脾泄・食積泄・飧泄及濕泄・寒泄等ノ名アリ其邪初ハ  
 胃ニ著テ腸へ波及ス然レトモ腸ノ上部ニ在テ痢疾  
 ト自ラ異ナルナリ凡ソ下利病ハ腸ノ裏面ノ粘滑  
 液等剥脱シテ赤肌ニナリ知覺敏捷ニシテ飲食觸  
 ル、片ハ刺戟シテ非常ノ蠕動機ヲ起シ腹中雷鳴

シテ速ニ傳送スルユエ飲食ヲ消磨スルノ間ナク  
 完穀ニテ泄下スルナリ此理ヲ領會シテ飲食ハ直  
 ニ消化スルヤウニ少少ツ、食シ治法ハ先ツ水穀  
 ヲ分利シ胃冷ヲ温散シ脾胃ヲ補益シ又腸ヲ澁固  
 スル片ハ癒スト云フ一無シ

夏秋ノ間中暑或ハ食傷等ノ後下利續テ止マス下ル  
 前ニハ腹中雷鳴シテ益ヲ傾ルヤウニ下ルモノナ  
 リ永ク愈サル片ハ腹ハ反テ脹リ心下痞鞭シ噎氣  
 臭ク飲食ヲ思ハス漸漸ニ疲勞加ハリ此ニ驚テ俄  
 ニ粥ヲ食シ養生ヲ行フ片ハ乍チ下利モ減シ飲食



モ進ムユエ輕病ノヤウニ心得又過食シテ下ル  
 前日ノ如ク又傍ヨリモ鰻鱺ハ腹ノ藥ナリト云ヒ  
 或ハ菲雜炊ハ下利ヲ止ムルナト、云テ種種ノ物  
 ヲ進ルユエ又過食シテ却テ飲食ニ中リ下ル  
 日ノ如シ不養生再三重ナルハ脾胃愈虚シ身體  
 益疲勞シテ目上陷ミ顔色憔悴シテ遂ニ死スルモ  
 ノ少カラス此時其人飲食ヲ慎ミ養生ヲ得ルハ  
 決シテ死スルナシ其養生ノ法ハ三度共ニ粥ヲ  
 食シ味噌汁モ鰻節ノミヲ入レテ少シツ、啜ルヘ  
 シ又燒鹽鹽梅生姜味噌金山寺鼓等ヲ食シテ可ナ

リ此外ノモノハ一切食スヘカラス粥モウチバニ  
 食スヘシ若シ饑テ堪ヘカヌルハ食一次ニ兩三  
 ヒツ、加ヘ漸漸ニ増スヲ佳トス兎角腹ニ慣タル  
 モノヲ食シテ珍シキモノヲ食スヘカラス治法ハ  
 先ツ阿芙蓉液四十滴ヲ毎日一次ツ、服シ胃苓湯  
 ヲ與フヘシ若シ此方ニテ効ノナキ證ハ參苓白朮  
 散ヲ服スヘシ少シモ飲食ヲ思ハサル者ハ香砂六  
 君子湯ニ宜シ此通りニ飲食ヲ慎ミ療治ヲ加フル  
 片ハ下利必ス止ミ食氣モ必ス出ルモノナリ此證  
 ニ阿芙蓉液ヲ與ヘテ奇驗ヲ奏セシ一舉テ筭フヘ



カラス然シ下利止ミテモ十日二十日ノ間ハ油斷  
 ノナラヌモノナリ若シ禁ヲ敗リ珍シキ物ヲ食シ  
 或ハ食量ヲ過ス片ハ又腹中雷鳴シテ泄瀉スルモ  
 ノナリ故ニ前ニ言フ通り二十日モ三十日モ飲食  
 ヲ慎ミ愈下利ノ止タルヤウニ思ハ、大根乾瓢等  
 ノ類軟ニシテ腹ニ當リノ好キモノヲ少シツ、試  
 ニ食スヘシ菓瓜ノ類新漬ノ香ノ物脂多キ魚及油  
 臧麩類ハ愈テ後モ百日ノ間ハ禁スヘシ泄瀉ニ阿  
 芙蓉液ヲ用ユルト飲食ヲ慎ムトハ實ニ第一ノ緊  
 要ナリ下利ニ飲食ヲ慎ムトハ誰モ心得テ居レ

皆姑息ニシテ某ノ物ハ脾胃ヲ補フユエ食シテ宜  
 シト云ヒ又某ノ物ハ少シク食スレハ害ナシト云  
 テ食禁ヲ謹嚴ニ守ル者ホトシ幾鮮シ嘆息スヘキ事ナラ  
 スヤ

疝瀉ハ疝ヲ宿疾ニ持タル者飲食過傷或ハ冒寒傷冷  
 等ニテ腹ノ下ルナリ烏苓通氣湯ニ宜シ又桂枝加  
 苓朮湯加附子若シクハ桂枝人參湯ヲ撰用スヘシ  
 五更瀉ハ老人ニ多シ先輩ハ疝ニ屬シテ置キタレハ  
 是モ傷食ヨリ發スル者ナリ晝日ハ安靜ニシテ無  
 所苦夜ニ入ル寸ハ腹微滿スルヲ覺ハ一睡シテ五



更ノ頃ニ至レハ必ラス腹中雷鳴シテ泄下スル  
 盆ヲ傾ルカ如ク毎夜如此ニシテ久シク止マス飲  
 食日ニ減シ羸瘦稍加ヘテ遂ニ死地ニ墜ル者アリ  
 烏苓通氣湯加附子ニ宜シ又參苓白朮散及真武湯  
 ヲ撰用スヘシ此手段ニテ止サルキハ真人養臟湯  
 或ハ阿芙蓉液ヲ試用スヘシ  
 病因傷食傷冷ヨリ來ルモノハ如何程疲勞シテモ療  
 治ト調攝トニテ回春スルコト有レ氏産後或ハ水氣  
 病等ノ永クナリテ下利ノ出タルハ治シ難キモノ  
 ナリ

泄瀉應用方

參苓白朮散 治脾胃虛弱 飲食不進 多困少力 嘔吐  
 泄瀉

扁豆 一斤 人參 茯苓 白朮 甘草

山藥 各二斤 蓮肉 桔梗 薏苡 縮砂 各一斤

右十味 為細末 每二錢 棗湯調下

真武湯 烏苓通氣湯 真人養臟湯 胃苓湯

香砂六君子湯 參苓白朮散 桂枝加苓朮湯加附子

桂枝人參湯 阿芙蓉液







テ脾胃虚弱ニナリ暑邪ニ中リ易ク又飲食ニモ傷  
ラレ易シ暑氣ニ中ル者ハ即中暑ニシテ飲食ニ傷  
ラル、者ハ即霍亂ナリ其因判然トシテ兩途ナレ  
氏兩邪同シク脾胃ニ入テ必ラス吐瀉ヲ發シ其病  
狀ノ略相似タル者ナレハ混シ易シ第一ニ病因ヲ  
探索シテ誤認スヘカラス

中暑ト云フト雖氏惟過客耕夫等ノ炎天ヲ侵シテ暑  
氣ニ中ルノミナラス午睡若シクハ露卧等ニテ寐  
冷ラスルモ即テ中暑ナリ其初發ハ頭痛眩暈・四肢  
倦怠浙浙惡風腹痛吐瀉アリ吐瀉スルノ後發熱シ

テ脈浮數ニナリ舌胎白ク面目赤ク煩渴引飲スル  
モノハ不換金正氣散ヲ與フヘシ熱強クシテ彌渴  
スル者ハ五苓散ニ宜シ下利長ク止マサル者ハ胃  
苓湯ヲ用ユヘシ

小兒ハ痢疾門ニモ述ル通り腸胃脆弱ノ者ナレハ暑  
氣ニ感スルト大人ヨリモ一等深クシテ卒ニ大熱  
ヲ發シ中暑氏異ナルヤウニ見ユル者ナリ因テ先  
師南陽先生別ニ無辜暴熱ト名ツケタリ吾郷ニテ  
ハ之ニ因循シテ素人モ暴熱ト通稱スレ氏實ハ中  
暑ニシテ中暑ノ外ニ暴熱ト云フ病ノ有ルニ非ス



前ニ云フ通り多クハ寐冷ヨリ發スル者ユエ先ツ  
黎明ヨリ腹痛シ水瀉スル一盆ヲ傾ルカ如ク暴熱  
出テ、驚瀾ヲ發シ戴目噤口四肢搐搦ス參連湯熊  
參湯ノ類ヲ與ヘ或ハ鍼灸ヲ施シテ一旦鎮リテモ  
昏睡シテ人事ヲ省ミス脈ハ浮數ニナリ大汗淋漓  
シテ衣被ヲ濕シ虚里ノ悸動築築トシテ微ノ物音  
ニ驚キ幾回モ驚瀾ヲ發シ渴シテ絶ヘス乳ヲ吸ヘ  
氏粥ヲ與レハ口ヲ閉テ食セス遂ニ虚脱シテ目上  
陷ミ四肢逆冷シテ一二日或ハ四五日ニシテ死ス  
ル者ナリ迅速ノ病ニテ療治モ間ニ合ヌ者ナレ氏

先ツ辰砂五苓散ヲ與フヘシ吐瀉ノ止マサル者ハ  
錢氏白朮散ニ宜シ冷證ノ有モノハ茯苓四逆湯ナ  
リ四五歳以下ノモノハ必死ト為スヘシ六七歳以  
上ハ死ヲ免ル、一有リ日ヲ延キ熱解スルニ及テ  
モ下利長ク止マスシテ痢疾ノ如クニナル一有リ  
裏急後重スル者ハ大柴胡湯ニ宜シ  
夏月暑時ニ及テ養生ノ第一ト言フハ寐冷ヲセヌヤ  
ウニスルヲ緊要トス其法誰モ心得テ居ル一ナレ  
氏夜卧スルキハ具足腹掛トテ甲ノ胴ノ如ク製シ  
中へ綿ヲ入レテ用ヒ其上へモ綿衣ヲ横ニ載ヘシ



此通りニ用心スルキハ中暑痢疾等ヲ患ル<sub>レ</sub>無シ  
予常ニ此法ヲ家人及<sub>レ</sub>世人ヘモ教ヘテ用ユルニ  
果シテ驗アリ

中暑應用方

不換金正氣散 局方 治四時感冒傷寒温疫時行及山嵐  
瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下利赤白及出遠方不伏水  
土等

厚朴 陳皮 藿香 半夏 蒼朮 各一錢

甘草 半錢

右六味薑棗煎服

胃苓湯 婦人良方 治夏秋之間脾胃傷寒水穀不<sub>レ</sub>化泄瀉不止

平胃散合五苓散

辰砂五苓散 局方 治中暑作渴小便赤澀

五苓散加辰砂

大柴胡湯 茯苓四逆湯 五苓散

錢氏白朮散



霍亂ハ素問及金匱要略等ニ出テ、古名ナリ霍亂ノ  
 名義ハ始テ病原候論ニ揮霍撩亂ト見ヘテ揮霍ハ  
 疾ナル貌撩亂ハ擾亂ニテ急卒ニ腹痛吐瀉ヲ作シ  
 煩躁悶亂スルノ意ナリ或ハ霍ヲ懼ニ改メ肉羹ニ  
 中ラレタルナリト説キ或ハ霍ヲ國ノ名ト為シ霍  
 ヲ伐タル片初テ此病ヲ患ヒタル故霍亂ト名ツケ  
 タルナソト云フノ類ハ強解ニテ取ヘカラス名義

霍亂

乾霍亂

濕霍亂

霍亂ハ素問及金匱要略等ニ出テ、古名ナリ霍亂ノ  
 名義ハ始テ病原候論ニ揮霍撩亂ト見ヘテ揮霍ハ  
 疾ナル貌撩亂ハ擾亂ニテ急卒ニ腹痛吐瀉ヲ作シ  
 煩躁悶亂スルノ意ナリ或ハ霍ヲ懼ニ改メ肉羹ニ  
 中ラレタルナリト説キ或ハ霍ヲ國ノ名ト為シ霍  
 ヲ伐タル片初テ此病ヲ患ヒタル故霍亂ト名ツケ  
 タルナソト云フノ類ハ強解ニテ取ヘカラス名義



等ヲ穿鑿シテ別ニ僻說ヲ立ルハ余カ門ノ禁スル所ナリ霍亂ハ腹卒ニ滿痛シテ吐瀉スルヲ常トスレ氏中ニハ吐瀉セスシテ惟滿痛スルモノアリ乾霍亂ト名ク亦乾霍亂ニ對シテ吐瀉ノアルモノヲ濕霍亂トヨフ

霍亂ハ前漢書淮南王ノ傳ニモ夏月暑時嘔泄霍亂病多矣ト云ヒタル通り六七月ノ頃ニ多シ故ニ醫俗俱ニ中暑ノ重證ノヤウニ心得兒童ヲ教戒スルニ炎天ヲ犯セハ必ラス霍亂スルナリト云フヲ口實トス愚按スルニ暑時ニ多キ病ナレ氏冬春ニモ亦

稀ニハ患フルモノアリ決シテ暑氣ニ中リタルノニ非ス傷寒論中ニ痙濕暍篇アリテ中暍ノ事ヲ辨ス霍亂モ亦暑氣ニ中リタルナラハ中暍ノ内ニ入ヘシ別ニ霍亂篇ヲ設クルニ由テ觀レハ霍亂ハ中暍ノ類ニ非サルヲ辨ヲ待タスシテ明ナリ霍亂ノ病因ヲ諸書ニ述ル所ハ大槩食傷中暑ノ二證ヲ併病シタルヤウニ論ス肘後方云凡所以得霍亂者多起食飲或飲食生冷雜物以肥膩酒膾而當風履濕薄衣露坐或夜卧失覆之所致病源候論云霍亂者人温涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸



胃之間因遇飲食而變千金方云原夫霍亂之為病也皆因食飲非關鬼神飽食肥膾復食乳酪海陸百品無所不啖眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲降陰氣欲升陰陽乖隔變成吐利以上ノ諸說何レモ食傷中暑合病ノヤウニ說テ首鼠兩端ヲ免カレス香川太伸行餘醫言ニ斷然トシテ霍亂ヲ以テ傷食トナスハ卓見ナリ宜ク此說ニ從フヘシ然レモ舊染ヲ改メスシテ食傷中暑ノ合病ノヤウニ心得ルモ亦少ナカラス今確證ヲ擧テ辨セン金匱禽獸等禁忌云驢馬肉合猪肉食之

成霍亂又云兔肉著乾薑食之成霍亂此二條ニテ霍亂ノ傷食タルコト辨ヲ待タスシテ明ナリ菌毒ニ中リタルハ食傷ノ尤大ナルモノナリ其候霍亂ニ同シ是亦一徵トナスヘシ惟夏月暑時ノミ多キユエ外感ノ說ノ起リタルナルヘシ暑時ニノミ多キ所以ヲ考ルニ凡ソ萬物四時ノ氣候ニ從テ内外ニ盛衰アリ夏ハ外盛ニシテ内衰ノ禽獸ノ類毛ヲ生更テ皮毛盛ナレモ肉瘦セ脂少フシテ食用ニナラス故ニ食用ニハ必ス三冬ヲ期ス竹樹ノ類一林茂リテ枝葉盛ナレモ本幹ハ脆弱ニテ夏切リタル竹



夏剥タル杉ノ皮ハ蠹蝕朽チ易フシテ材用ニナラ  
ス故ニ竹ハ冬切タルヲ貴ヒ杉ノ皮ハ秋剥タルヲ  
貴ヒテ世ニ秋皮ト稱ス薯蕷百合ノ類蔓葉茂密ナ  
レ根莖瘦テ粘薄ク氣味モ亦淡フシテ食用ニナ  
ラス故ニ蔓葉枯レテ後ニ之ヲ採用ス此類枚舉ニ  
遑アラス人身モ亦同シニシテ夏暑ニ逢フハ外  
盛ニシテ陽氣發泄シ汗出ルト多ク内衰ヘテ胃氣  
不足ニナリ飲食ヲ消化スルト能ハス無病ノ人モ  
飲食自ラ減少ス又或ハ注夏病ヲ患ル者有リ又氣  
息モ冬ハ稠厚ニシテ見ルヘク夏ハ稀薄ニシテ見

身於時得ヌ小使モ冬ハ温熱ニシテ夏ハ清涼ナリ  
四時ニ從テ内外ニ盛衰ナルヲ知ルヘシ李東垣有  
言曰夏暑宜補氣人與天地同一橐籥子月一陽生寅  
月三陽生巳月六陽生陽盡出於上此氣之浮也人之  
腹屬地氣於是時浮於肌表散於皮毛腹中之陽虛也  
此言愚說ニ暗合セリ世人此理ヲ知ラス特ニ夏月  
ニ多キヲ以テ中暑食傷併病ノヤウニ心得タル者  
ナルヘシ此理ヲ通曉スルハ惟霍亂ノミナラス  
萬病ノ原由ヲ知ルニ足レリ夏秋ノ間ハ疾疫多ク  
シテ草醫モ寧處ニ遑アラス十月ニ至レバ疾疫皆



瘳テ諺ニ十月ノ閑戸醫師ト云フ一有り皆人身内  
外ノ盛衰ニ出ツ

前ニ述ル通り夏時ハ胃氣乏シク消化ノ職ヲ怠ルナ  
レ氏暑氣ニ堪スシテ風前ニ露卧シ或ハ水ニ浴シ  
テ快爽ヲ取り亦好シテ生冷ノ物ヲ食スルエ胃  
氣愈振ハス飲食胃中ニ停滯シテ潔滯之邪トナリ  
卒ニ霍亂ヲ發スルナリ總テ飲食ハ過飽スレハ害  
ヲナスモノナレ氏就中油ニテ煎タル物烹テ熟セ  
サル物宿煮ノ物生冷ノ物皆霍亂ノ因ト成ルナリ  
食後飽悶シテ快爽ナラス須臾ニシテ心腹疼痛脹滿

煩亂顛倒シテ暫クモ安セス脈沉伏シテ絶セント  
欲シ寒戰厥冷シテ自汗出テ胸中懊懣シ乍チニ嘔  
吐下利ヲ發シ吐下ノ後ハ煩渴引飲飲ムニ從テ吐  
キ吐クニ從テ飲ミ水藥俱ニ納ラサルモノ所謂水  
逆ナリ腹痛吐瀉俱ニ止マス目窵乍チ陷ミ顔色憔  
悴シ四肢轉筋シ厥冷モ回ラス脈モ復セサル者ハ  
難治ナリ吐瀉ノ後發熱シテ脈モ浮數ニナリ四肢  
モ温リ惟煩渴下利腹痛スル者ハ決シテ死スル  
ナシ此病ハ迅速ニテ危篤ニ至レ氏全ク食毒ヨリ  
起リテ一時ノ病ナレハ吐瀉シテ食毒除キ去レハ



從テ愈ルモノナリ劇證ハ死スル者アレ氏朝ニ吐  
瀉シテタニ愈ヘ或ハ五六日或ハ十餘日ニシテ愈  
ルモアリ若シ果シテ外感ナラハ危篤如此ニ至リ  
テハ速ニ愈ルノ理有ルヘカラス

腹痛シテ未タ吐瀉セサルモノハ備急圓紫圓及草兵  
丸ニ宜シ快下利ヲ得テ後ハ中正湯ヲ與フヘシ吐  
瀉ノ後脈沉伏手足厥冷スル者ハ四逆湯若シクハ  
四逆加人參湯若シクハ通脈四逆湯若シクハ附子  
理中湯ヲ撰用スヘシ煩躁スル者ハ茯苓四逆湯ニ  
宜シ又天樞神闕等ヘ灸スヘシ腹中疼痛ノ甚シキ

者ハ建理湯ヲ與ヘ阿芙蓉液ヲ兼用トス吐瀉ノ後  
發熱煩渴スル者ハ五苓散ニ宜シ水逆モ五苓散ノ  
的證ナリ若シ是ニテ止カヌルキハ小半夏加茯苓  
湯ヲ用ユヘシ亦伏龍肝水ニテ五苓散ヲ煎シ用ヒ  
テ納ルニアリ吐瀉ノ後飲食ヲ思ハス泄瀉永ク止  
マサル者ハ胃苓湯ニ宜シ

霍亂應用方

中正湯叢桂 治食傷吐逆不安又理霍亂中熱陳舊宿食

- 半夏五分 朮四分 藿香 橘皮 乾薑
- 厚朴 大黃各三分 黃連二分 木香 甘草各一分



右十味煎服

四逆湯 四逆加人參湯 通脈四逆湯 附子理中湯

茯苓四逆湯 五苓散 小半夏加茯苓湯 建理湯

胃苓湯 備急圓 紫圓 草兵丸 阿芙蓉液

灸熯 天樞 神闕

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

瘧疾 瘧疾之類

寒瘧 寒瘧之類

溫瘧 溫瘧之類

壯瘧 壯瘧之類

勞瘧 勞瘧之類

疫瘧 疫瘧之類

瘴瘧 瘴瘧之類

久瘧 久瘧之類

風瘧 風瘧之類



瘧疾ハ夏秋ノ間ニ行ハル、雜氣ニシテ直ニ肝臟ニ著モノナリ故ニ久シク愈サル寸ハ肝臟焮腫シテ塊ニナルナリ之ヲ瘧母ト云フ此塊左邊ニ限リタル者ノヤウナレト又右邊ニ發スルヲ有リ肋骨ノ下ニ塊ヲ結ビ硬クシテ稜角アリ根蒂ハ深クシテ脇中ニ在リ但苦滿ヲ覺ユルノミニテ思ノ外ニ痛ノ無キ者ナリ瘧斷ル寸ハ速ニ消散シテ失スルカ如シ是ニテ瘧ノ肝臟ニ著トヲ知ルニ足レリ初發瘧母ノ見ハレサル時モ肝臟痞塞シテ深キ處ニハ塊ニナリテアル者ナルヘシ此ノ塊邪魔ニナリテ

營衛此ニ來ルキハ行ト能ハス相分爭シテ戰慄シ遂ニ皮表ニ達シ發熱汗出テ、自ラ解散ス曾テ一老人ノ腋下ニ尖榮ヲ發スル者アリ大サ拳握ノ如ク硬キト石ニ似タリ毎日薄暮ニ至ルキハ必ラス寒慄鼓額須臾ニシテ發熱汗出煩渴引飲ニ時許ニシテ熱全ク解シ常ノ如ニナリ殆レト瘧疾ノ如シ瘧母ノ寒熱ヲ發スルハ此證ト同理ナリ瘧ノ病性ハ隔日ニ發スル者ナレト或ハ日發或ハ二日ヲ隔テ、發シ或ハ六日ヲ隔テ、發スル者アリ蓋シ瘧母ノ大小ニ由テ分爭ニ遲速アリ日數ニ異



同ノアル者ナルヘシ其寒熱傷寒ヨリ甚シクシテ  
其病ハ傷寒ヨリ輕シ傷寒ノ邪ハ必ラス腸胃ニ入  
リ或ハ心肺ニ入ル故ニ死スル者多シ瘧疾ノ邪ハ  
唯肝臟ニ入テ他臟ヘ傳ル<sub>レ</sub>無シ故ニ死スル者甚  
稀ナリ小兒ハ瘧ニ強クシテ治シ易ク老人ハ瘧ニ  
弱クシテ治シ難シ稀ニハ壞證ニナリテ死スル者  
有リ

瘧ハ脚氣ト同邪ニシテ瘧疾自ラ愈ヘ或ハ截瘧劑ニ  
テ忘ル<sub>レ</sub>ノ後脚氣ニ變スル者アリ或ハ脚氣ヲ患  
ル者瘧候ヲ併病スル者アリ二病ノ行ハル<sub>レ</sub>ハ時

節モ同シ又瘧疾大ニ行ハル<sub>レ</sub>ハ脚氣甚タ寡ク  
脚氣大ニ行ハル<sub>レ</sub>時ハ瘧疾多カラス隋唐ノ方書  
ニ脚氣寒熱如瘧ト載タルハ脚氣瘧疾ニ證ノ並發  
シタルナルヘシ

卒ニ惡寒發熱脈浮數或ハ身體疼痛シテ傷寒ノ如ク  
ニ見ヘ餘程ノ重證ニ見込タルモノ明日ニ至リ熱  
解シ身涼ニシテ平生ノヤウニナル者ハ多クハ瘧  
ニシテ明日復發作スル者ナリ傷寒モ瘧モ同ク是  
外感ニシテ脈證モ亦同様ナレハ一發ニテハ明辨  
シ難キ者ナリ然レ<sub>レ</sub>傷寒ハ自ラ傷寒瘧疾ハ自ラ



瘧疾ナレハ診法ニ熟スルキハ誤認ノ無キ者ナリ  
傷寒ノ邪ハ漸漸ニ發シ瘧疾ノ邪ハ迅速ニ發ス最  
初ハ日モ定マラス二三日ノ間ハ日發ニシテ後ニ  
隔日ニナル者アリ或ハ初メ隔日ニシテ後ニ日發  
ニナル者アリ或ハ刻限モ日日ニ早クナリテ昨日  
午ニ發スル者今日巳ニ發スルヤウニナリ或ハ今  
日巳ニ發スル者明日午ニ發スルヤウニナル者ア  
リ日日ニ後レテ發スル者ヲ邪氣減スルノ候ト為  
シ日日ニ早ク發スル者ヲ邪氣加フルノ候ト為セ  
凡是モ必然ト為シ難シ

發作スルノ初ハ膝頭及跗上ヨリ冷ハ顔及爪甲ノ色  
ヲ變シ卒ニ洒淅トシテ寒慄シ鼓頤股戰シテ止マ  
ス寢衾ノ上ヨリ壓スレトモ切レヌ程ニ振ハ胸  
脇苦滿シテ嘔吐甚シク飲食ハ勿論或ハ膽汁ヲ吐  
キ後ニハ吐ク物モ無クナリテ但乾嘔シ發熱スル  
ニ及テ身體灼熱骨節煩疼頭痛腰疼シ脈浮弦數ニ  
ナリ汗大ニ出テ蒲團ヲモ透シ煩渴シテ水數升  
ヲ飲ミ熱ニ比シテハ舌胎ヲ生セヌ者ニテ僅ニ白  
胎ニナル者多シ熱ノ尤強キ者ハ稀ニ黃胎黑胎ニ  
ナルト有リ是ハ所謂疫瘧ナリ大柴胡湯ニ宜シ最



初ハ桂枝ニ越婢一湯紫胡桂枝湯紫苓湯ヲ撰用ス  
 ヘシ煩渴スル者ハ白虎加桂湯ニ宜シ汗ノ多キハ  
 紫胡桂枝乾薑湯ニ宜シ諸方ヲ服シテ效ナクハ  
 九味清脾湯ヲ與フヘシ瘧母ヘハ緩痰湯若シクハ  
 解勞散ヲ撰用スヘシ寒熱既ニ減少スレハ尚荏苒  
 トシテ解セス疲勞シタル者ハ補中益氣湯ヲ用ユ  
 ヘシ

世ニ截瘧劑及咒法等多シト雖氏一旦ノ効ヲ取ノミ  
 ニテ全治スルコト能ハス市店ニ賣ル所ノ截瘧劑ハ  
 皆礬石ニシテ之ヲ服スレハ乍チ嘔吐ヲ發ス截瘧

ニハ効ノアル者ナレハ脾胃ヲ損傷シテ一切飲食  
 ノナラヌ様ニナルコト有リ亦人ヲ害スルコト無シト  
 言フヘカラス

瘧家皆病苦ヲ憂ヒテ早ク截瘧ノ劑ヲ服スルキハ一  
 旦截テモ必ス再發シ却テ永ク愈サル者多シ截瘧  
 ノ方ハ氣ヲ轉スルノミノコトニテ何方ニテモ腹ニ  
 ナレヌ藥ヲ服スルキハ截ル者ナリ嘗テ府下近村  
 ノ一農夫某ノ母瘧ヲ患ルコト日既ニ久シ某府下ヘ  
 出ル時母截瘧劑ヲ囑スルニ某醉テ藥ヲ購フコトヲ  
 忘却シ家ニ歸ルニ及テ貯置タル葛根湯ヲ偽テ截



瘧劑ト為シテ煎服セシムルニ斷然トシテ截タル  
一有り世ニ奇驗アリト言テ用ユル所ノ賣藥及呪  
法ハ皆此葛根等ノ類ナリ日數過多ニシテ愈サル  
者ハ截瘧方モ亦權道ナレト試用スヘシ柴胡去半  
夏加括萋湯へ新ニ鼈甲及鼻ヲ加へ藥二貼へ生薑  
六片ヲ加へ水三合ヲ以テ煮テ二合ヲ取り檐前ニ  
出シ露ヲ承ケ發作スルノ一時前ニ温メテ頓服ス  
ルキハ必ス斷ツ又阿芙蓉液三十滴ヲ一酒杯ノ水  
ニ點シ頓服スルキハ必ラス斷ツ截瘧ハ此ニ方ニ  
テ足レリトスレト此外ニモ亦良方アリ吐酒石五

厘白湯ヲ以テ頓服ス又方蝦蟆肺細剉二錢煎服ス  
又方幾那五分散服ス又方幾那鹽五厘葛粉五分白  
湯ヲ以テ送下ス又方四逆加人參湯煎服ス又方常  
山ノ末五分白湯送下スルノ類宜ク撰用スヘシ

瘧疾應用方

九味清脾湯濟生 治瘧發時熱多寒少口苦咽乾大小便  
赤澀者凡諸瘧通用之方也

- 青皮 厚朴 白朮 半夏 柴胡 黃芩
- 茯苓 草果 甘草

右九味生姜煎服



解勞散 楊氏家藏 治虛勞積氣堅硬噎塞脇胸引背微痛者。

芍藥 一兩 柴胡 鼈甲 枳殼 各一兩 甘草 半兩

茯苓 半兩

右六味姜棗煎服。

緩痰湯 求古 治脇下有痰癖按之即痛日晡寒熱盜汗咳

嗽神氣悒鬱不樂者。

柴胡桂薑湯加鼈甲芍藥

大柴胡湯 桂枝二越婢一湯 柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯 四逆加人參湯 五苓散 五苓散

柴胡去半夏加栝蒌湯新加鼈甲及鼻 二錢煎服

補中益氣湯 柴苓湯 阿芙蓉液 吐酒石

蝦蟆脯 幾那 幾那鹽 常山



內科秘錄卷之三

此處為正文內容，因字跡模糊，無法辨識。



