


内科秘録

十四

ヤ 9
954
14



門 9
號 954
卷 14

冊 四十
號 二 雜
函 九十



內科
錄卷之十四

種痘
目錄

種痘
總論

撰苗

發泡

點苗

發熱

感受候

見點

起脹

目錄

〇一

目錄

種痘ヲ行ハシメ天行痘ヲ防キ人ヲシテ天札ヲ免
レシム種痘ハ實ニ化育ヲ贊スルノ一ト謂フヘシ
此論已ニ清人徐靈胎ノ蘭臺軌範ニモ見ヘタリ予
此術ヲ施シ行フ^{ホトト}殆十餘年種ル所ノ嬰兒三千餘
人門弟子等ノ種ル所モ亦二千人ニ下ラス今眼前
ニ歴歷トシテ實驗スル所約スルニ五千餘人ニ及
フト雖^ト氏遂ニ一人モ逆痘ヲ患フルモノナシ因テ
嚮^{サキ}ニ種痘活人十全辨ヲ著シテ實ニ濟生ノ一大良
法ナルトヲ辨ス近世牛痘ヲ人身ニ種テ天行痘ヲ
防クノ法アリ其說西洋書中ニ載テ人ノ喧稱スル

ト亦已ニ久シ又清ノ嘉慶中ノ人邱浩川西洋ヨリ
牛痘法ヲ傳ヘ經驗スルト十三年ニ至リ保赤モ亦
千萬人ニ及ヒ萬舉萬全ノ良法ナルトヲ論定シテ
引痘新法ヲ著セリ其書モ近年渡リテ牛痘ノ効驗
靈妙ナルトヲ詳ニセリ然レ氏牛痘苗ヲ得ル^ト能
ハス常ニ深恨ヲ懷キシニ天ナル哉嘉永己酉ノ夏
荷蘭醫門^{イシ}扭^ニ缺^トト云ヘルモノ牛痘苗ヲ齎^ヒシ来リ崎
港ニテ衆兒ニ試ルニ果シテ奇效ヲ奏シ其苗諸國
ヘ傳播シ是年ノ冬ニ至テ牛痘初テ江戸ニ来リ友
人大槻俊齋都下ニテ牛痘ヲ種ル^ル嚙^{サキ}矢^{カキ}ナリ俊齋

予カ種痘ニ専心ナルヲ知リテ痘苗及ヒ牛痘書
牛痘針ヲ贈リ且ツ其方法ヲ縷縷教示セリ予欣躍
シテ直ニ第六兒ニ試ムルニ果シテ吉痘ヲ發シ日
アラスシテ全功ヲ成セリ實ニ嘉永庚戌春正月十
リ續テ牛痘ヲ種ルニ年年五六百人或ハ千餘人積
テ數萬人ニ及ヘリ其法ノ簡便ニシテ其痘ノ輕吉
ナル天行痘種ニ勝レルニ十倍ナリサレハ種痘ハ
牛痘ニ確定シテ千古不易ノ良法ト謂ツヘシ然リ
ト雖氏天行痘種法モ亦全ク廢スヘカラス如何ト
ナレハ牛痘ハ一種ノ痘ニテ舶來タルモノナレハ

若シ絶ルキハ復痘苗ヲ得ルニ難シ其時ハ又天然
痘ヲ種ルニ如ハナシ故ニ今先ツ天行痘種法ヲ此
ニ物語ルヘシ

種痘ニハ先ツ痘毒ノ源ヲ辨知スヘシ痘瘡ハ胎毒ナ
リト云フ論ニ古今確定シテ復異議ヲ容ル者ナ
シ或ハ一種ノ疫ノ様ニ發明シタル人モアレ其
患一生一度ニ限ルニ至テ其說窮シ終ニ胎毒ノ論
ヲ廢スルニ能ハス徒ニ首鼠兩端ヲ懷クモノ亦多
シ予熟思スルニ痘瘡ハ決シテ人身固有ノ胎毒ニ
非ス天行病ノ一種ニシテ雜氣ニ感シタルナリ唯

再感ノナキハ怪ムヘキニ似タレ氏痘瘡ノミニ非
 ス麻疹モ同ク是天行病ナレ氏一生一度ニ定リテ
 再感スルコトナシ痘瘡モ此類ニテ再感セヌ一奇病
 ト心得レハ少モ怪ムニ足ラス若シ痘瘡麻疹共ニ
 胎毒トナスハ胎毒ニ區別アリテ人身ニ二種ノ
 胎毒ヲ固有スルコト却テ疑フヘキニ似タリ今種痘
 ヲ施スル幾千人ニ至ルト雖氏逆痘アルコトナク只
 其術ノ巧拙ニ因テ輕重アレハ痘瘡ハ外ヨリ入ル
 モノニテ人身固有ノ毒ニアラサルコト辨ヲ待タス
 シテ明ナリ若シ人身固有ノ毒ナラハ胎毒ノ深キ

者ハ假令種痘ヲスルト雖氏逆痘ヲ免ルコト能ハ
 種痘モ本天行痘苗ヲ採テ種ルモ自ナク或ハ人ニ
 傳染スルコトアリ傳染スレハ天行痘ニ變スル故此
 蔓延シテ多キ中ニハ險痘モアリ或ハ逆痘ニテ
 死スルモノアリ又小兒ニ人アル家ニテ父母ノ姑息
 コト兄妹ニテ種テ弟ヲ遺スルハ適第ハ傳染シテ
 或ハ險痘ヲ患ヒ或ハ逆痘ニ嬰ルモ間アルコトナリ
 元來種痘ハ第一ニ佳苗ヲ撰其痘モ至テ稀疎ニ
 發スル故其毒薄ヲシテ容易ニ人ニ傳染セヌ然レ

氏萬一傳染スルキハ十全ノ功ヲ失スル故決シテ
 傳染セヌヤウニ工夫スルヲ種痘ノ一大緊要トス
 種痘ハ一家ニ小兒二人アレハ二人三人アレハ三人
 一同ニ種ヘシ必ス一人モ遺スヘカラス種痘中ハ
 近隣へ行クヲ禁シ又外ヨリモ小兒ノ来ルヲ
 禁スヘシ如此スルキハ決シテ外へ傳染セヌ初テ
 十全ノ功ヲ成スヘシ

種痘ハ總テ輕順ナレ氏其中ニ又自ラ輕重アリ痘五
 六顆發スル者ハ種痘ノ輕症ナリ六七十點發スル
 者ハ種痘ノ重症ナリ是ハ其人ノ稟賦ニ因テ輕重

ノ有ルナリ痘瘡ニ強キ者ハ感スルヲ淺フシテ輕
 シ痘瘡ニ弱キ者ハ感スルヲ深フシテ重シ漆液ニ
 強キ者弱キ者アルト同シ父母險痘ヲ患レハ其子
 モ亦險痘ヲ患ルモノ間アリ是モ痘瘡ニ弱キ父母
 ノ氣質ヲ稟テ生レタル故ナリ

種痘一度ニテ感セヌヲアリ是ハ痘瘡ニ強キ稟賦ノ
 者ニテ感セヌヲモアレ氏多クハ醫術ノ拙キ故ナ
 リ其儘ニ捨置キ後ニ天行痘ニ嬰テ死スルヲアリ
 故ニ感セヌ者へハ種痘スルヲ再三ニ至ルヘシ再
 三ニシテモ感セヌ者ハ至極痘瘡ニ強キ稟賦ニテ

多クハ天行痘ニモ感セズ假令天行痘ニ感スルモ
必ス輕吉ナリ

種痘ハ幼小程輕シ初生ハ身體モ脆弱ニテ知覺薄ク
感スル下淺キ故ナルヘシ是ヲ以テ一度種タル位
ニテハ感セズ二度モ三度モ種レハ感スルモノナ
リ西洋ノ書籍ニ初生六七日ヲ過タル小兒三十五
人ニ種痘シタルニ何レモ至極ノ輕痘ヲ發シタリ
ト見ユ予モ經驗スル下少カラス近クハ予カ女初
生七十日ニシテ種痘スルニ感セズ後百日ニ滿テ
種痘スルニ初テ感シ至テ輕痘ニテ總身ニ四ツ五

ツノミ發シタリ種痘ハ初生ヲ善トスレ氏若シ痘
熱ニテ驚癇ヲ發シタル時初生ニテ凌キカタキ下
千百人中ニ一二ハ無シト云フヘカラス予カ種痘
セシ中ニモ一初生ノ兒序熱ノ時驚癇搐搦ヲ發シ
慢驚風ノ如クニナリ六七日ノ間乳ヲ哺セズ啼モ
セズ只仰臥シタル儘ニテ疲勞日ニ加リ死地ニ入
ルニ似タリ手段ニ窮シタルユ丑灸ヲ天樞ヘ炷ル
下百餘壯ニ至テ始テ泣聲ヲ發シ乳ヲ飲ムヤウニ
ナリテ全快セリ畢竟輕痘ユヘ回春シタルナルヘ
シ天行痘ナラハ恐ラクハ生路ナシ種痘ハ元來輕

痘ナルモノユエ天行痘ニ比スレハ驚癩及ヒ他病ノ發スルトモ至テ少シ然レハ萬一他病ノ發スルトラ恐ル、ユエ三歳已上ヲ種痘ニ宜シトス三歳已上ナレハ假令他病ヲ發スルハ大害ナカルヘシ若シ天行痘近隣ニ流行スル時ハ逆モ免ル、ト能ハサルユエ初生ト雖モ種痘スルヲ宜シトス頭瘡・疥癬熱癩等ハ種痘ニ害アラズ魁病ニテ黃瘦シタルモノ或ハ五疳或ハ吐乳泄瀉ノ者ハ種痘ヲ忌ムヘシ凡ソ病兒或ハ初生等ノ種痘ヲ施シ兼ル者若シ天行痘ノ流行スルニ逢ハ一旦遠ク避ケ後ニ種

痘ニ宜キ時ヲ待テ施スヘシ天行痘種痘共ニ輕重ハ氣候ニ因ルニ非ス春ノ發生ノ時ハ輕ク秋ノ肅殺ノ節ハ重シト云フハ實ニ紙上ノ空論ナリ故ニ種痘ハ時ノ春秋ヲ論セス施シテ害ナシ然レハ時行病ノ多キ節及ヒ宿疾ノ發動シ易キ時ハ宜シカラス種痘中ニ若シ他病ヲ併病スルハ世人漫ニ罪ヲ種痘ニ歸スル故ナリ九月下旬ヨリ三月中旬迄ハ疾病ノ少キ時節ユエ此間ニ種痘スルヲ善トス撰苗ニ痘苗ハ吉痘ノ結痂ヲ收ムヘシ凡ソ痘瘡ニニ種ヲリ痘小粒ニシテ起脹易ク乍チ頂白ク根紅

外科秘録 卷十四 痘疹 〇七

ニナリ珠玉ヲ臙脂ノ盤ニ轉スルカ如ク灌膿スル
 間モナク乍チ收靨シ結痂厚フシテ釘頭ノ如クナ
 ルモノヲ名テ旱痘ト云フ此痘苗ヲ第一ノ佳品ト
 ス旱痘マテニハ無シトテモ小粒ニテ起脹シ易ク
 灌膿シ易ク少モ脂ヲ吹カス速ニ收靨スルモノハ
 皆旱痘ノ類ナリ種痘ノ苗ト為スヘシ痘粒壯大ニ
 シテ十分ニ灌膿スルモノハ吉痘ノ様ナレ氏實ハ
 善種ニ非ス此痘稀疎ニ發スレハ吉候ヲ見シ稠密
 ニ出レハ波薄漿清ニナリ痒塌内陷ニ變スルノ證
 ナリ此痘ハ輕順ニテモ收靨六頃ニ至テ脂ヲ軟出

シ松脂ノ凝リタル様ニナリ一旦結痂シテモ復膿
 カヘリ或ハ餘毒ニテ癰癤ヲ發スルモノナリ苗ト
 為ス可カラズ此苗ニテ種痘スレハ假令輕痘ニテ
 モ後ニ癰癤流注ヲ發スルコト有リ
 痘苗ハ面部ヲ上品トス四肢ハ其次ナリ痂厚ク飴色
 ニ透明ニシテ光澤アルヲ善トス永ク貯フルニハ
 錫ノ中次ノ中蓋ノアル器ヘ入レテ密封スヘシ尤
 モ新苗ホトヲ善トス半年或ハ一年ヲ經タル苗モ
 感スレ氏舊苗ハ菽麥ノ舊キ種ヲ時テ生キレノ有
 ルト同シニテ感染ノ力薄シ

發泡 種痘ノ部位ハ臍ナリ此處ノ赤肉ハ三稜ノ形
 ラ成ス故西説ニ三稜筋ト云フ漢ニテハ此ニ清冷
 淵消燼ノ二穴アル故ニ穴處ヲ目的ニ種レ氏心ス
 シモ拘泥スヘカラス大抵臍ノ前面ノ中央ト思フ
 所ニ種ユヘシ先ツ兩臍ニ發泡膏ヲ米粒ホト點シ
 其上ヲ遊奕ニテ蓋フヘシ絳棉布ヲ長サ一尺五寸
 幅一寸五分ニ裁シ一端ハ裂テ燕尾ノ如ク兩岐ト
 ナシ遊奕ノ上ヲ環纏シ裂キタル一端ニテ結束シ
 發泡遊奕等ノ移轉セヌヤウニスヘシ
 發泡ハ成ル丈ケ小クシテ瘡口ノ小キヲ善トス瘡口

潤大ナル寸ハ腫痛ツヨク痘後ニ及ヒテモ久シク
 愈エ難ク又其毒傍近及ヒ腋下へ流注シテ癰癤ヲ
 發スルアリ
 發泡膏ヲ點シテ水泡ヲ發スルキハ直ニ痘ヲ種ユヘ
 シ大抵今日ノ午後ニ膏ヲ點セシモノハ翌日ノ早
 朝ニ種ユヘシ若シ時ヲ後レテ種ル寸ハ感シ難シ
 予按スルニ發泡シテ直ニ皮ヲ剥去レハ赤肌ニテ
 知覺敏捷ユエ善ク感スルナリ時ノ後レタルハ水
 泡ノ中へ又薄皮ヲ生スルユエ知覺鈍クナリテ痘
 氣ヲ翕收セス故ニ發泡シテ二日モ過タル瘡口へ

種レハ決シテ感スル一無シ

點苗 發泡ヲ施シタル明朝ニ至リ急ニ爪ニテ水泡
ヲ剥去リ揉紙ニテ輕ク拭ヒ痘痂ヲ刀ニテ細ニ剝
ミ糠ノ如クニシ大豆許ヲ瘡口ニ點シ遊奕ニテ蓋
ヒ其上ヲ絳綿布ニテ前日ノ如ク繃縛スヘシ種痘
ハ接木ノ意ナレハ術ヲ施ス一敏速ニスルヲ專要
トス若シ遲緩ニスル寸ハ感シ難シ種タル後ハ消
毒散ヲ沸湯ニテ振出シ一日ニ一次ツ、七日ノ間
用フヘシ

種タル後ハ痘瘡ニナリタル心得ニテ第一ニ食禁ヲ

守リ臭穢ヲ避ケ風寒卑濕ノ氣ヲ冒スヘカラス剃
頭・浴湯等ヲ禁ス

種テ後三日ノ朝ニ絳綿布及ヒ膏藥ヲ去リ淤液ヲ拭
ヒ跡ハ遊奕ノミヲ毎日一次ツ、更換スヘシ

發熱 種テ後六日七日ニ至テ發熱スルヲ常トス又
稀ニ五日ノ夜ニ至テ發熱スル一アリ常ヨリヲク
レテ八九日或ハ十一二日ニ至リ發熱スル一ハア
レ氏常ヨリ早ク三日四日ニシテ發熱スル一ハ決
シテ無シ早ク發熱スルハ天行痘ノ流行スル時ハ
前日ニ天行痘ニ感シ居ル者モアレハ瘡口感受ノ

徴候ヲ熟視シテ嫌疑ヲ決スヘシ種痘ノ熱ハ天行
痘ニ較フレハ甚々輕シ夜ノミ發シテ晝ハ解シ游
嬉ニ紛レテ居ルモノ多シ第三日ハ少シ強クナリ
睡中驚悸等ノ證モアリテ第四日ノ朝ハ霍然トシ
テ解スモノナリ藥用ニ及ハス若シ強キ者ニハ矢
張葛根湯ヲ用フヘシ熱ノツヨキハ稀ニハ驚瀉ヲ
發スルモノアリ三黃湯參連湯ヲ撰用スヘシ又下
利ノ多キ者アリ懸念スルニ足ラス熱解スレハ自
然ニ止ムナリ腹痛腰痛ノ強キモノアリ天行痘ナ
レハ惡證トスレ氏種痘ニテハ害ナシ

四日五日ニ至テ熱ノ解サヌハ流注ヲ發スルノ候ナ
リ弓斷スヘカラス草兵丸ヲ十粒或ハ十四五粒モ
與テ下スヘシ
瘡口ノ焮衝甚シクシテ熱ノ永ク解シカ子ル者アリ
是ハ流注ノ催シニモ非ス又痘ノ多ク出シトスル
者ニモ非ス恐ルヘカラス
發熱スル時多ク疹ヲ發スルヲアリ速ニ發シテ又速
ニ消スルモノナリ誤テ痘ト為シテ驚クヘカラス
種痘ニテ惟恐ル、モノハ流注ナリ假令多ク流注シ
テモ死スルコトハナケレ氏或ハ附骨疽ニ變シテ永

ク愈エス或ハ後ニ筆磬ニナリテ屈伸ノチラヌモ
ノアリ實ニ千百中ノ一二ナレト種痘ハ我ヨリ求
テ行フモノナレハ流注ヲモ防キ萬舉萬全ノ功ヲ
要スヘシ

感受候 瘡口感受ノ候ヲ視ル一至テ緊要ナリ瘡口
ニ感受ノ候ヲ見セハ一點ノ痘ヲ發セスト定
メテ善シ假令身體ニ疹ヲ發スルモ瘡口ニ感受ノ
候ナキモノハ癩疹ノ類ニテ真痘ニ非ス世人種痘
ニ再感アリト云フハ徒ニ誹謗スルノミニモ非サ
ルヘシ種痘ニ未熟ノ醫感受ノ徵候ヲ辨ヘス癩疹

ノ類ヲ真痘ト定メテ後ニ再感シタル者モアルヘ
シ感受ノ候ハ種痘後六七日發熱ノ前後ニ至テ瘡
口灰白色或ハ錫色ニ變シ中央ニ針眼ホトノ孔ア
リテ焮熱赤腫シテ熱癰ノ如クニナリ腋下ニ核ヲ
結ヒ瘡孔漸漸ニ濶大ニナリ深ク腐蝕シ穢毒ノ形
ヲナシ初メハ黑色ノ臭水ヲ出シ日ヲ經ルニ從ヒ
粘膿流レ出ツ此ニ至リテハ破敵ヲ棉片ニ攤瘡中
ニ入レ其上ヲ遊奕ニテ蓋フヘシ瘡口ノ掃除能ク
ト、カサル寸ハ又流注ヲ發スルノ因トナルナリ
故ニ瘡中ヲ棉ニテ清ク拭ヒ膏藥モ一日ニ二次ツ

ツ更換ヘシ又種テ後四五日ニシテ瘡口ノ邊ニ小
瘡ヲ疣瘡ト生スルハ感受ノ兆ナリ蟲ノ咬ムカ如
ク微ニ痒痛スルモ感受ノ候ナリ瘡口ノ愈ルハ多
クハ感セス又一旦全愈シ發熱スルニ及テ焮熱腫
痛ヲ起スモノアリ是モ感シタルナリ多クハ兩臑
共ニ感スルモノナリ又偏臑ノミ感スルモアリ
見點 天行痘ハ見點ノ遲速ニテ疎密ヲ論スレト種
痘ハ發熱ニ日ヨリ既ニ發シ或ハ熱解シテ後ニ見
ハル、モアリ共ニ顆粒疎肥紅活尖圓ニ起勢勃勃
トシテ朝ト晩ニテハ異ナルホトニ起脹スルナリ

輕キ者ハ僅カニ五六顆或ハ十五六顆多キ者ト雖
凡五六十顆或ハ百二三十顆ニ過キス假令痘ノ出
ルト多キモ本佳苗ヲ種タルモノユエ吉痘ニシテ
死生ニ關係スルホトノトハ決シテ無キモノナリ
發熱解シテ後ハ收靨スルマテ飲食遊嬉常ノ如ク微
モ元氣ヲ妨ケル程ノトハ無キモノナリ若シ他疾
ニテ元氣ヲ妨クルモノアラハ熟察シテ藥ヲ投ス
ヘシ
起脹 出齊スルニ從テ速ニ起脹スルナリ痘纒一二
顆ニテモ起脹ノ形狀ニテ痘ノ真偽ヲ鑒定スヘシ

他ノ瘡疹ノ起脹シタルハ尖起スルナリ痘ノ起脹シタルハ圓滿ニシテ尖銳ナラス

顆粒ノ少キハ起脹シタルノミニテ回漿灌膿モセス速ニ收靨スルモノアリ

灌膿 起脹スルニ從ヒ回漿モ灌膿モ一時ニナリ速ニ充滿シテ又速ニ收靨ヲ催スナリ天行痘ニ比スレハ諸候皆輕ク經過速ニシテ事足ラスヤウニ見ユルモノナリ灌膿ノ時ハ瘡口モ灌膿ノ候アリテ膿多ク出ルナリ隨分ヨク掃除シテ膏ヲ貼シ更換スヘシ

灌膿ノ時瘡口ノ膿ヲ取り他兒ニ種ル寸ハ必ス感ス收靨ノ後ハ假令膿出テモ感受ノ力薄シ

收靨 起脹灌膿收靨等ノ轉移共ニ速ニシテ定法ノ日期ニ符合セサレハ怪ムニ足ラス種痘ノミナラス天行痘モ輕順ナレハ轉移速ナルト同シ收靨ノ後瘡口久シク愈エ兼ル者アリ掃除ノ行き届カサルユエナリ若シ贅肉ヲ生スル者ハ赤汞丹消疣水ノ類ヲ點スヘシ若穴ニナリタルニハ猛汞油ニテ穴ヲ破リ或ハ剪刀ニテ斷截スヘシ

收靨ノ後神思爽快ナラス微熱ノ退カサル者ハ流注

ヲ發スルノ候ナリ大柴胡湯ニ宜シ瘡口ノ邊モヨリへ流
 注シテ熱癰ノ如クニナリ或ハ腋下ノ結核ノ膿ニ
 化スルハ小流注ニテ愈エ易シトス肩髑及ヒ四肢
 ノ關節へ漫腫固結シテ消散モセス亦膿ニモナラ
 ス因循トシテ日ヲ延ク者アリ越婢加朮附湯ヲ用
 ヒ中黄ヲ貼スヘシ多クハ消散ス若シ膿ヲ催サハ
 先鋒ヲ貼シ千金内托散ヲ用フヘシ膿ニナラハ流
 注ノ治法ニ從フヘシ潰テ後附骨疽ニ變スル者有
 リ又愈テ後筆磬ニナルトアレ氏千百中ノ一二ナ
 リ是ハ痘癰ト云テ天行痘ニ多クアルトニテ種痘

ニ限リタルトニ非ス

收靨ノ後十四五日或ハ二十日三十日ニシテ午後潮
 熱ヲ發シ咳嗽喘急盜汗等ノ諸證並起リ胸下硬滿
 シ鬱鬱トシテ飲食ヲ思ハス疝勞ノ如クニ成リ因
 循トシテ日ヲ延クモノアリ消癖湯ニ宜シ予按ス
 ルニ痘毒ハ諸處へ流注シ易キ者ナレハ内臟へモ
 流注シテ前件ノ諸證ヲ見ハストモ亦無シト云フ
 へカラス或ハ種痘多キ中ニハ疝勞ノ催シアル兒
 痘熱ニテ疝勞ヲ誘ヒ出シタルモアルヘシ是モ至
 テ少ナルトナリ

常ノ小瘡ノ痕ハ年ヲ經レハ自ラ消スレ氏種痘ノ痕ハ終身消セス天行痘痕ノ終身消セサルニ同シ

種痘應用方

消癰湯 高階 治疔勞

淨府湯加鼈甲擯榔

痘瘡消毒散

- 防風 二錢
- 升麻 一錢半
- 蘓葉 一錢半
- 荊芥 二錢
- 連軛 一錢半
- 枳殼 二錢
- 桔梗 二錢
- 羌活 二錢
- 白芷 二錢
- 穿山甲 三錢
- 川芎 二錢
- 前胡 二錢
- 乾葛 二錢
- 牛蒡 五分
- 小木通 一錢
- 甘草 一錢

右十六味細ニ剉ミ絳棉布ニ盛リ沸湯ニテ振出シ
日ニ一次ツ、七日ノ間用フヘシ

發泡膏

- 芫青 五錢
- 左突 十錢

右二味調和シテ貯フ新ニ製シタルヨリハ久シク
貯ヘタルヲ佳トス

- 葛根湯
- 大柴胡湯
- 越婢加朮附湯
- 千金內托散
- 遊奕
- 先鋒
- 中黃
- 猛汞油
- 赤汞丹
- 消疣水

種牛痘總論

牛痘ノ原ハ牝牛ノ乳房ニ發スル痘疹ナリ天行痘ト
 一類ノモノニテ此痘ヲ人身ニ種ルキハ痘瘡ノ厄
 自ラ消除シ再ヒ天行痘ニ感スルコトナシ然レモ其
 性天行痘ト異ナルナリ何者二箇所ヘ種ルキハ痘
 ヲ發スルコト二顆十箇所ヘ種ルキハ痘ヲ發スルコ
 ト十顆種サル所ヘハ決シテ發スルコトナク痘ノ輕重
 意ノ如クニナルナリ又其毒他兒ヘ傳染スルコトナ
 シ幾百ノ嬰兒未タ痘瘡ヲ患ヒサルモノ牛痘ヲ種
 タル兒ト一室ノ内ニ同居スルモ決シテ傳染スル

一ナシ天行痘ト牛痘ト類ヲ同フシテ性ヲ異ニス
 ルハ扁豆牽牛ノ類蔓ノアルト蔓ノナキト二種ア
 ルニ同シ共ニ是一痘毒ナリ其毒最モ薄フシテ格
 別ノ熱モ出ス宿疾ヲ誘ヒ出ス程ノ一モナク假令
 他病ヲ併病スル氏牛痘ニテ他病ヲ増ス程ノ一モ
 ナシ少シク發熱スルモ夜ノミニテ晝ハ全ク解シ
 テ元氣好ク稀ニハ卧蓐スルモノモアレ氏一日カ
 二日ノ一ニテ聊モ懸念スルニ足ラス
 種痘小兒ノ年齢ハ初生三十日ヨリ一歳マテノ間ヲ
 最上ノ時ト云ヒ傳テアレ氏初生ハ知覺薄キユエ

感受シ難キモノナリ故ニ予ハ初生一百日ヲ過テ
 後ニ種ルナリ


牛痘ノ原ハ牛ヨリ取りタルモノナレ氏後ニハ人ヨ
 リ人ニ傳ヘテ今ニ相續シ幾千萬人ノ身體ヲ歴ル
 ト雖氏其性ヲ變セス

牛痘モ再感スルノ説ヲ喧唱スルモノ多シ是モ自然
 ノ勢ニテ少シモ怪シムニ足ラス何程聰明ノ人ニ
 テモ醫理ニ通セザレハ領會セザルモノ尤モナリ天
 行痘ノ種痘ヲモ頑愚無學ノ醫者ハ再感ノアルモ
 ノ、ヤウニ心得テ今ニ疑ヒノ解ケヌモアリ牛痘



ノ再感セヌトハ西洋ハ勿論唐山ニテモ定論ノアルナリ今予カ塾ニ遊學ノモノ二十餘人皆已ニ天行痘ヲ患ヘタルモノナリ試ニ一人毎ニ牛痘ヲ種ルニ一人モ感セス又予カ兒輩ニ先ツ牛痘ヲ種ヘ後試ニ天行痘ヲ種ルニ遂ニ感セス又天行痘ノ流行スル郷里ヘ牛痘ヲ種ルニ感深セシモノハ天行痘ヲ患ヘス遂ニ天行痘ハ半途ニシテ絶タリ

第一圖

硝子蠟
貯牛痘
痂



錫合中央微凹可以盛痘漿亦以解乾苗



以絳棉布製縹帶裁其末令可結卷為一束



種痘鍼約長寸許鍼鋒一面穿槽以盛痘漿輕插皮膚間



撰苗 牛痘ニモ吉凶ノ二症アリ痒ミ少ナク破レス
 ニ早ク收靨シ結痂厚ク釘頭ノ如クニ成リ中央微
 シク凹ニシテ鍼痕ヲ存シ焦黑色或ハ膠飴色ニナ
 ルモノハ吉痘ニテ種痘ノ苗ト為スヘシ又一證回
 漿灌膿ノ頃ニ至テ痒ミ甚シク抓破シテ灸瘡ノ如
 クニ成リ僅ニ結痂スレハ又抓破シテ永ク愈エ兼
 ルモノハ凶痘ニテ苗ト為スヘカラス
 凡ツ痘苗ハ最初ノ結痂ヲ用フヘシ一旦抓破シテ後
 ニ再々結痂シタルハ用フヘカラス若シ此痂ヲ種
 エレハ必ス假牛痘ヲ發ス痘痂ヲ貯フルニハ硝子


壘或ハ錫ノ合子ノ中へ成ル丈ケ多ク填テ密封ス
 ル片ハ二三十日位ハ効ノアルモノナリ
 痘苗ノ製法ハ櫻木板ノ上ニテ微塵ニ剉ミ細末ト為
 シ冷水ニテ解キ濃淡適宜ニ調勻シ小半時許置テ
 用フヘシ痘痂一顆ニテ大抵四五人ニ種ルニ足レ
 リ
 種法 先ツ价者ヲシテ膝上へ小兒ヲ載セシメ動カ
 スヤウニ両手ニテ緊シク抱キ醫左ノ手ニテ兒ノ
 臍ノ背面ヲ緊シク握リ五指ヲ進退シテ臍ノ前面
 ヲ露シ又一人ノ价者両手ノ大姆指ニテ鍼鋒ノ向

ク處へ皺ノヨラヌヤウニ皮膚ヲ緊張シ醫右ノ手
 ニ鍼ヲ取り鍼鋒ノ両面へ痘苗少許ヲ點シ槽ヲ表
 ニシ小兒ノ臍ノ前面ニ伏セ斜ニ當テ淺ク表皮ノ
 間ヲ刺ス一一分許鍼鋒ノ全テ没入セヌヤウニ消
 息スヘシ急ニ左ノ手ノ大拇指ノ腹ニテ輕ク鍼口
 ヲ按ヘ痘苗ヲ拭ヒ落ヌヤウニシテ鍼ヲ抜キ又大
 拇指ニテ鍼口ヲ壓シ微シク旋轉シ痘苗ヲ揉ミ込
 ミ其跡ヲハ价者ヲシテ代リテ壓セシメ其次へ種
 ル一前法ノ如ク都合三箇處種テ三隅形ニ成ルヤ
 ウニスヘシ又肘ノ横紋ノ下一寸許ノ處へ相並ヒ

テ種ル一二箇處偏手へ都合五箇處ナリ男ハ左ノ
 手ヨリ種へ初メ女ハ右ノ手ヨリ種へ初メ前法ノ
 通りニ左右共ニ種ルナリ一兒感スルハ第八日
 ニ至リ其漿ヲ採テ他ノ兒へ種へ兒兒互ニ相傳へ
 テ千百人ニ至ルヘシ


第二圖

价者以左右手緊張
兒臍醫左手握兒腕
右手執鍼挿入痘漿



第三圖

施繃帶以
止流血



種痘箇處多キ片ハ熱モ亦從テ多ク箇處少キ片ハ熱
 モ亦少シ故ニ小兒ノ長幼強弱ヲ料リテ増減スヘ
 シ大抵初生ハ左右ニテ五箇處三歳ヨリ六歳マテ
 ハ七箇處七歳ヨリ以上ハ十箇處或ハ十二箇處ニ
 至ルヘシ

種痘ノ後鍼口愈テ感セヌモノハ直ニ再ヒ種テ可ナ
 リ假令假牛痘ニテモ一旦感染スレハ其當分ハ再
 ヒ種ルモ決シテ感スルナシ所ヲ易テ股或ハ脚
 へ種ル片ハ感受スルモノナリ

種痘十箇處全ク感スルナリハ稀ナリ十二テ七ツ感シ

七ツニテ五ツ感スルモノ多シ

牛痘ヲ種ルハ時ヲ論セス春秋共ニ宜シ就中十月十

一月正月二月ヲ最上トス南風ノ吹テ驟暄ノ時節

ハ痒ミ出テ宜シカラス又頭瘡疥癬小疹等ノアル

モノモ宜シカラス若シ已上ノ病兒へ種ル片ハ牛

痘ノ餘毒宿瘡ノ邊へ併發シテ永ク愈へ兼ルモノ

ナリ

禁忌ハ第一ニ魚鳥油膩蕎麥蜀黍粟子青芋等ヲ禁ス

ヘシ又早ク風呂ニ入ルナラバ禁ス收靨ノ後ハ輕ク

腰湯ヲシテ可ナリ三十日ヲ過レハ風呂ニ入テ可


ナリ若シ食禁ヲ破リ又ハ早ク浴スルキハ必ス痘疹ヲ發シ遂ニ小瘡ニ變シテ永ク愈ヘ兼ルモノアリ

見點 牛痘ハ其性天行痘ト異ナルユエ特鍼痕ノミ痘瘡ニ成リテ外ハ一顆モ見點セス種タル翌日ハ何ノ變リタルトモナク反テ愈ント欲シ纔ニ瘡痒ヲ覺フルノミ第三日ハ鍼痕少シク紅色ヲ生ス第四日ハ鍼痕少シク起リテ顆粒ヲ成シ色モ亦漸加フ顆粒ヲ熟視スルニ瘡頂鍼ニテ突タル程陷ミテアリ是ハ後ニ凹陷ニナラントスルノ兆ナリ真

牛痘ノ證トナスヘシ便是牛痘ノ見點

第四圖

種後四五日。鍼痕血乾。色如點墨。稍帶微紅。僅成顆粒。便是痘之見點也。



回漿 第四日 第五日ノ夜必ス微ニ發熱ス熱出レハ

顆粒乍チ壯大ニナリ瘡心凹ニシテ瘡輪微ニ隆起

シ周圍ニ紅暈ヲ生スル一臙脂ヲ以テ畫クカ如シ

第六日第七日ニ至レハ顆粒漸漸ニ回漿シテ凹陷


モ亦起テ瘡頂扁平ニナリ淡白色ニ變ス便是回漿

充滿ノ候ナリ腋下へ核ヲ結テ微痛シ癢痒漸加フ

旁人意ヲ注シテ搔破セヌヤウニ戒ムヘシ

第五圖


種後六七日。痘頂扁平。變淡白色。而紅暈週圍。狀如紅線纏痘根。便是痘之回漿也。



痘漿ヲ取ルハ七日八日ノ間ヲ宜シトス灌膿ニ成リ
 テハ宜シカラス又弓斷ヲスレハ乍チニ收斂ヲ催
 漿ノ出無ルモハナリ漿ヲ取ルノ法鍼ニテ痘頂
 ヲ淺ク切り回セハ清澄ノ水出ルナリ初メハ些少
 ナレハ須臾見合セ居レハ多ク溜ルモノナリ若シ
 濁リタル膿ノ出ルハ用フヘカラス清漿ニテ種ル
 ノ法モ落痂ニテ種ルノ術ニ同シ是ヲ最モ善シト
 スレハ痘兒一旦種痘ニ懲リテ居ルユエ漿ヲ取ル
 ニ臨ンテ恐怖啼叫シテ取り難シ初生及ヒ七八歳
 已上ノ者ノ漿ヲ取ルヘシ

灌膿 第八日 第九日ノ夜必ス發熱ス最初ノ熱ヨリ
 モ一等強ケレハ心配スル程ノ一ニアラス第十日
 ニ至レハ痘脚乍チ焮腫シ熱癩ノ如クニ成リ痛痒
 竝ヒ起リ顆粒充滿シテ黃白色或ハ老蒼色ニ變シ
 又痘根紅暈輪ニ成リテ四文錢ノ大サニ生スルナ
 リ腋下ノ核モ愈痛シ癢痒モ愈甚シクナルモノナ
 レハ旁人意ヲ注テ搔破セヌヤウニスヘシ若シ搔
 破スレハ發瘡ノ如クニナリテ永ク愈ヘ兼ルモノ
 貧賤ノモノハ世話モ届キ兼テ搔破スルモノ多シ

第六圖



種後八九日必發熱痘顆壯脹痘心稍成焦
 黃色痘脚熱痛更帶紅輪便是痘之灌膿也

自準亭藏
 卷一四
 第六圖

收靨 第十日ノ午後ニ至レハ痘心一點焦黃色ニ變
ス便是收靨ノ催シナリ第十一日ニ至レハ痛痒退
キ紅暈モ亦散シ諸證減少シテ元氣モ出ルモノナ
リ第十二日ニ至レハ全ク收靨ス

結痂 第十三十四十五日ノ頃ニ至レハ結痂スルナ
リ焦黑色ニナルモアリ或ハ膠飴色ニ成ルモアリ
日ヲ經ルニ從テ厚クナルモノナリ痂ノ形狀ハ前
段ニ詳ニス

第七圖



種後十一日痘頂成焦硬腫痛漸止紅暈亦消便是
痘之收靨也以上諸候齊備可以收牛痘之全功矣

收靨結痂ノ頃ニ至テ微ニ發熱シ小疹ヲ發スルモノ
 アリ名テ痘疹ト云フ是ハ牛痘餘毒ノ發シタルナ
 ルヘシ其形狀モ扁平ニシテ牛痘ニ異ナラス或ハ
 灌膿シテ收靨スルモアリ或ハ發シタルマ、ニテ
 收靨スルモアリ禁忌ヲ謹マサルキハ或ハ愈ヘ或
 ハ發シ或ハ頭瘡ニ變シ或ハ小瘡ニ變シ永ク愈ヘ
 サルモノアリ然レ氏決シテ大害ヲナサス牛痘ニ
 感シタルノ確徴ナレハ及テ喜フヘキナリ
 落痂 落痂ハ定リタル日期ナシ保護ヲ大切ニスレ
 ハ永ク落ス麤末ニスレハ早ク落ルナリ強テ剥落

スレハ痘痕小瘡ニ變シテ宜シカラス牛痘痕モ天
 行痘ト同シニテ終身消セサルモノナリ是他ノ瘡
 瘍ト異ナル處ナリ又痘痕ヘ黒毛ヲ生スルモノ徃
 徃少カラス凡ソ黒毛ヲ生スルモノハ牛痘五顆發
 スレハ五箇所共ニ毛ヲ生シ十顆發スレハ十箇所
 共ニ毛ヲ生ス其毛牛毛ニ相似タリ然レハ牛痘ニ
 エ牛ノ氣質ヲ遺シタルモノナルヘシ
 牛痘經過ノ諸候大略ハ前件ニ舉ル通りナリ亦資質
 ニ因リ遲速緩急アリテ日期ニ符合セヌトモアレ
 氏大略前件ノ次第ヲ失ハサルモノハ必ス真牛痘

ナリ 牛痘瘡其フシテ残ラス 抓キ破リ 灸瘡ノ如クニ成
 リタルハ再感ノアルヤウニ西洋ノ書ニ見ヘタルレ
 氏清人邱浩川ノ引痘新法ニハ一旦感シタルモノ
 ハ假令抓キ破リテモ少シモ妨タルナシト云ヒ
 タルコソ實見ト為スヘシ予モ歴驗スルニ第四五
 日ト九十日ト兩度發熱スルモノハ如何程抓キ破
 リテモ決シテ再感スルナシト云ヒタルモノナリ
 假牛痘 牛痘ヲ種テ假牛痘ヲ發スルモノアリ實ニ
 牛痘ニ感シタルニ非ス其因牛痘ヲ種テ發スルコ

ト 假牛痘ト名ツクルナリ又偽牛痘氏云フ此痘ヲ
 發スル者ハ後天行痘ヲ防ク一能ハス是ヲ真牛痘
 ト心得ルキハ後ニ天行痘ニ傳染シテ面目ヲ失フ
 トアリ其痘真牛痘ト甚異ニシテ順正ノ經過ナク
 又確定ノ徵候ナシ種タル夜卒ニ發熱シ或ハ下利
 スルモアリ鍼痕乍チ水泡ニナリ熱モ亦速ニ解シ
 テ再ヒ發熱セス又速ニ膿ヲ成セト表皮ノミ膿ヲ
 黄色ニナリ痘根甚淺ク袖ナトニフレテ乍チニ破
 レ膿濁リテ澄清ナラス瘡瘡持ニ甚フシテ盡ク擦
 損シ或ハ破レスシテ全キモ瘡頂尖起シテ扁平ナ

内科秘録卷之十四
 或ハ瘡根硬ク凝テ永ク消散セサルモノアリ真牛
 痘ノ看法ニ熟スレハ假牛痘ハ自分明ニ知レルモ
 ノナリ假牛痘ノ因西洋ノ説ニ膿ノ老テ濁リタル
 モノ或ハ膿ヲ久シク貯ヘテ腐敗シタルモノニテ
 種へ或ハ疥癬ヲ患フル牛痘兒ヨリ苗ヲ採リ或ハ
 誤テ假牛痘ノ落痂ヲ採リテ種タル者假牛痘ヲ發
 スルト云然ラハ牛痘ノ真假ハ痘苗ノ善惡ニ因ル
 モノト見ヘタリ

跋
 癸亥之冬。余西上。留京師歲餘。
 每聞當今名流。及有奇方異術
 者。輒往訪之。盖不下十數家也。
 至則其門人子弟。知余為常藩
 人。往々皆曰。子識東軒本間先
 生乎。余乃曰。是吾所嚴事。親炙

內科秘錄 足
有年。今見以侍鑿。無一藩鑿學
總教。年幾乎六旬。矻矻勤苦。一
日不怠。有老益壯之風矣。其人
曰。嗟乎。然哉。嚮得其所著瘍科
前後之錄。而讀之。至於其抉去
乳嵒。截斷脫疽。及拔取怪異之
諸瘤。嘗服其妙手。近時或有更

妙者。請得聞其說。曰。何能其然。
然斯書師二十年前所著作焉。
未足以識其要訣。今也著述愈
富。發明頗多。而其學最用力於
內景。凡人身中。九竅百骸。臟腑
脈絡之機關。皆能洞見。而究其
精微。是以其治內之方法。固既

出癆科之上。而世但謂其巧於外者。是非善知師者也。及門之士。有慨乎此。將刻其內科秘錄。以問于_中_上。刺成之日。公等其閱之。則余今日之言。信否可徵矣。昔人有持鑲鏡者。鑑物如水。人有病。以照之。盡見臟腑中所壅

滯。然後藥之。莫不即痊。顧斯編實師之一鑲鏡也。亦可以透徹病者之五內。而察其情狀。是安得不寶之哉。余之東下也。剖劂適成。師命跋其後。余喜置名字於卷末。乃綴其告京人之語。以附其尾云。

故其才足以治國而後可
以哉冠矣我

藩侍醫本間和卿嚮著癘
科秘錄天下皆知和卿精于
外科今也又著此編讀其要
知和卿精于外科乃由其精

于內科矣且書題曰秘錄而
不藏之帳中鏤板行世其
用心之公亦可尚也
文久癸亥嘉平月

水府 森蔚識



技其...
 水...
 父...
 和...
 不...
 年...

東京西國横山町三丁目八番地
 和泉屋勘右衛門

