



望聞切大セツノ要也。診脉別メ念ヲ入ルベシ故ニ諸書最初ニ脉ヲ辨論何より詳
アルが中ニモセ死ノ脉、元ヨリ論ズルニ及バズ。予平常竊按ニ數脉、虛實ノ症ニヨラズ、
動ム上十九人ハゾイブント心シ付ベシ。但シ婦人、離経ノ脉ノ如キ格別也。又結促ノ
脉長病急病ニヨラズ至テ心付念ヲ入ルベジタトヘ。痰、氣アル人又、積氣ニ
頗更ニアサ一テ結促スル人ニモ由斯ベカラズ。予家童母ガタメニ平生診候コ
ロニル处ノ脉書ヲ書與ハントスルニ元ヨリ無暇空ク待他日而遇此書
端ニカキニルス者、辛家童沙翁無忽

下之總州而瑤郡太田

加瀨太淳通敍

卷之三

麻疹總論

例治

部位

形色

卷之三

嘔吐

泄瀉

十三東

目發不出

透表

十四丁

不透表

沒早

渴難

喘沒

氣促

十五

十六

十七

十八東

十九丁

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

瘡
齶
譖妄
咬牙
唇燥
唇舌破裂
口氣
舌胎
口疳

九二表

同

互二表

互一表

互一裏

互二裏

互三裏

腹痛
便秘
潤瀉

痢

睡

不食
身冷
姪娠

鼻扇

胸高

身冷

下蟲

九十五裏

九三裏

九四裏

九四裏

九五裏

九六裏

九七裏

同

同

同

正七表

虛羸
麻瘡

附水痘

種痘說

九八表

九七表

九八表

同

麻疹精要

清 張璐 路玉 著



麻疹者手足太陰陽明二經蘊熱所發スル。兒居多大人亦時有之是亦時氣傳染之類其發熱時多咳嗽多嘔多嘔眼中如淚面浮腮亦多濺多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏通身紅赤起而成粒粒而小斜目視之隱隱皮膚之下以手摸之磊磊肌肉之間其

○張璐字路玉號石
頑長洲吳門人當
著醫通數十卷蓋
做韓氏醫通云
醫通十六卷本經
逢原四卷傷寒緒
論四卷同讚論四卷
診宗三昧一卷兼傷
症折義一卷傷寒舌
鑑一卷都名大成又
著医歸通自序云
清康熙乙亥時年七
十有九

形若疥其色若丹以其陽氣從上故頭面愈多者爲順法當清涼發散爲主藥用辛散以升發之涼潤以清解之切忌酸收凡動氣燥悍及一切溫補之藥慎不可犯誤用禍不旋踵辛散如荊芥芬薄荷前胡葛根麻黃石膏鼠粘子涼潤如黑參桔梗根葛根麥冬生甘草芩連貝母連翹竹葉皆應用之藥又當隨所發月時量兒大小及見證輕重而爲制劑若漸出漸收者其勢雖輕而熱尚未平

○犀角消毒散治班疹丹毒發熱痛痒者

牛蒡子 苦草 蒲公英

荆風散

犀角鋸二分

金銀花三分

右水煎服犀角領出服○發癰大熱

口渴咽喉痛加石膏知母爻五分

須防喘急若連綿三四日者其熱雖盛而勢已發泄必無他變宜大青湯或消

毒飲加黑參石羔麥冬竹葉若發熱時

偏身汗出或衄血者此毒解也勿遽止

乏若汗出太多血流不止當以清肺湯

去欬冬杏仁加麻黃根以飲汙犀角地

黃湯以止血運則氣虛神耗爲難治也

若發熱時或嘔吐或自利者此火邪內

逼毒氣上下行也俱宜清熱解毒利小

便切勿止瀉大凡疹證發熱時未有不

論總麻疹

○大青湯治班子熱

米加大青黑參

木通生地黃荆芥竹菜

○消毒飲治痘瘡咽

痛而起癰遲鼠瘡

子研錢甘草五分荆芥一錢水煎日二服

桔梗湯

月考全

五

○清肺湯治痘疹肺
咽喉不宣風熱肺
熱端喉中火加梗狀肺
湯加麥門冬數
甘草杏仁貝母牛蒡
花子服之

○桔梗湯治痘疹肺
咽喉初起並得服之桔梗
花杏仁貝母牛蒡
甘草杏仁貝母牛蒡
花子服之

○犀角地黃湯治
傷寒溫病一應發汗
而不得汗內益血及
鼻衄吐血不盡內餘
瘀血血面黃或
中脫作病犀角生

地黃酒浸另擣取皮

渴者但當與荳豆燈心湯勿與冷飲致
成水蓄多生變幻也即葷腥酒麪生冷
水藥咸須禁之麻疹多有熱痰在肺初
發時必嗽嗽宜清熱透表不得止嗽麻
後嗽嗽切忌辛溫酸瀉但用清咽滋肺
湯以清餘熱痰壅自愈多喘者熱邪壅
肺也切勿定喘惟應大劑竹葉石膏湯
去半夏加貝母黑參薄荷如冬大寒甚
麻毒爲寒鬱於內不得透出而喘加蜜
酒炒麻黃一劑立止夏月熱勢甚者即
無犀角則升麻以代此

痘科鍵

白芍右四兩水煎
去滓入地黃再煎數

沸過行服喜忘加
狂加大黃芩附大
來遲腹不滿而自言
滿者加當歸肉桂吐
衄加藕汁扁柏童便

用白虎湯加竹葉忌用外麻誤服必喘
然喘爲肺氣壅遏故喘必兼嗽而張口
擡肩者肺竅不通不治也故謠有喘而
嗽嗽者可療喘而不嗽者難醫之語又
其證多泄瀉慎勿止瀉惟宜芩連葛根
則瀉自止疹家不忌瀉瀉則陽明之邪
熱得解是亦表裏分消之義又有疹收
之後飲食如常卒然心腹絞痛遍身冷
汗如冰者此元氣虛弱而中惡氣也朝
發夕死勿妄治之凡麻疹以鮮明似錦

○清咽滋肺湯治麻
後食熱咳嗽聲嘶黑
參鼠粘子荆芥歲性
貝母去心桔梗根馬兜
鈴桔梗麥門冬等甘
草減半水煎溫服繆仲淳無
馬兜鈴有薄荷

爲吉黑晦如煤最凶頭面不出者重紅
紫黯慘者重咽喉腫痛不食者重黑黯
乾枯一出即沒者不治鼻扇張目無神
者不治鼻青糞黑者不治牙癧臭爛者
不治疹之牙癧最難治外用無比散
吹之內服加味清胃散更加莉芍石膏
緩則不救疹中諸患不宜依證施治惟
當治本者手太陰足陽明二經之邪
熱也解其邪熱則諸證自退矣

人參半荅麥門冬

○白虎湯加治熱病
壯熱煩渴及中暍煩
熱渴石膏生知
母三甘草三粳米半
水煎溫分三服一日
盡飲之

○無比散治麻後牙
痛腐爛取黃牛糞煅
存性入龍腦少許研
紳吹之

不必治疹但當托痘爲主然治痘宜溫
治疹宜涼此又不可不審大人男婦出
疹當與外感並治惟清涼解表墮天時
寒暑施治凡麻痘並作藏府凡熱交惡
也麻乃風邪外感痘爲胎毒內發二者
相雜赤暈發熾多有誤認痘出大密而
委之不救殊不知其爲疹夾痘也當與
化班湯續頻進麻毒解而痘自起矣
有腫行漿疹子極似痘最難看然痘則必
有頂盤疹雖有漿而頭粒必不堅根盤

○加吳清胃散治

班疹口舌生瘡齒

銀腐爛清胃散加

犀角連翹生甘草

○化班湯治痘與班

灰出用此消班起痘

黑參二錢粘子一

柴胡八分荊芥防風

各分連翹七分木通八

殼枳七分蟬脫五分生甘

草四分燈心莖淡竹葉十五分

水煎服二三服

必無紅暈也疹後痘不結痂及元氣虧損當大補脾胃爲主不可誤認邪熱未盡復與清熱退火之藥

例治四十則

七分地名

麻疹俗名痧子浙人呼爲痘子麻病風熱人或不知痧之與痘字學不收皆土音習俗之訛耳原其證之輕重今昔懸殊吾吳水土濡弱之鄉生氣最易萌動故麻疹之發自始至終不過二三日即安

從古迄今靡不皆然邇來風氣變遷有似北方氣候即尋常麻疹必六七日乃化稍若熱勢未盡或觸風寒或犯飲食變證百出其危有甚於痘者因遍攷方書從無麻疹專學間有一二及此無非附見痘疹之末一皆簡略不詳何怪兒科之莫能舉措且以痘方混治曷知麻屬陽陽從陰化故外不出內沒而不漿痘屬陰陰從陽化當外躁內托以助膿二者相去天淵烏可不辨然皆爲嬰孺說

也但今不特嬰孺少壯每多患此雖當參詳診功仍不能舍此繩墨而臨證之機活法在乎心手繩墨又不可拘也予聞扁鵲入咸陽秦人愛念小兒即爲小兒醫予由是隨時兼愛曲盡一貫之道爲麻疹特聞生面云

發熱

麻痘之初必由發熱但痘熱不過二三日即出麻熱有六七日或半月乃出或乍涼乍熱或壯熱經日不退始熱之際必

見面赤眼腫多涕淚欬嗽連聲是其候也熱甚經日不退曰壯熱惟正出時爲正候若初發壯熱至已出而熱不少衰者其證必重清熱透肌湯出盡而壯熱不退者竹葉石膏湯去半夏加荊芥黑參沒後而壯熱不退者危急需涼解爲主其有熱數日止而復作者有早熱而暮退者在初發時爲熱邪未透葛根解肌湯正出之際而煩熱轉甚乃邪熱未解而復內攻也清熱退肌湯沒後見者

○清熱透肌湯治
治例○清熱透肌湯治
麻疹未透熱甚而
欬黑參石膏鼠糰
子荊芥防風前胡
葛根杏仁分生甘
草減水煎熱服
○竹葉石膏湯方

○葛根解肌湯治麻
疹初起發熱欬嗽或
乍涼乍熱葛根前胡

荊芥鼠粘子連翹

赤芍蟬蛻木通等
生甘草減半水煎熱

服

○清熱退肌湯

○四物湯治營血

虛熱熟地黃二當

歸身一白芍葉三

半

爲餘邪未盡四物湯換生地赤芍加連翹黑參亦有麻退身涼越六七日而復熱者非餘熱未清即復感風邪當以意消息或因大病之後中氣虛而然者治本爲要臨病之機不可不審也

部位

麻屬府候發則先動陽分而後歸陰經一身之中陽部宜多陰部宜少陽部宜透陰部即不透亦可無慮若陰部多而陽部反少不透者爲險防有他變陽部者

川芎薑八分右四果

水煎溫服肥盛多

濕痰及嘔逆少食

便溏者禁用

頭面背四肢向外者皆爲陽陰部者胸腹腰四肢向內者皆爲陰也凡癰自頭至足爲齊頭面多者爲順先從胸腹緩處起漸發四肢者順如從手足起漸發胸腹背者逆

形色

○清熱透肌湯方見

形色

色貴紅潤形貴尖聳若色雖紅潤而不起二便艱滯者清熱透肌湯如色淡不起二便如常此屬本虛兼當培養氣血亦有色黯不起大便秘結唇舌燥赤者爲

○白虎湯 方見
總論

麻疹全

火邪內鬱，白虎湯加黑參荊芥其有色
白不分肉地惟點粒高聳眸時即沒者
邪熱本輕也然有表氣本虛而色白者
調護溫煖越一二日自變紅活也若正
出時爲風寒所遏而色白如膚必毛竅
安永五年丙申夏麻疹
流行天下一般沿門闔境
盡染數家店之男子
彼家共症略トメ不棄
一日忽告麥末ニ未治其
症鼻塞喘息不顧人事
湯水不入咽至手重三下多分六脉口手
處アリ乃热毒心包二入ト
ナシテ施治全愈ルヲ得タリ遇偶中スルがエニヨシ書日加フルノミ。客古蕉燥トアドモコニ穀ガ舌脣

○葛根解肌湯 方見
發

安永五年丙申夏麻疹
流行天下一般沿門闔境
盡染數家店之男子
彼家共症略トメ不棄

寒便變爲自身不發熱而反內攻煩躁
竦栗葛根解肌湯或麻出成片一被風
腹痛痰喘氣急者危如毒攻於胃則嘔
吐清水攻於脾則腹張不食攻於肺則
鼻塞喘促攻於心包則唇舌焦躁不省

条云ルトク不正氣拿ラ顧ニサルニ古ハニルトナシ

○涼血飲子治麻疹
火毒熾盛紫赤而黯
生地黃半錢連分黃
芩荆芥黑參各一紅
花三分赤芍丹皮各八
木通分水煎溫服

人事搖頭掣手攻於腎肝則變黑而不
救也若色紫赤而黯是火毒熾盛頂粒
起者可治宜涼血飲子讝語煩躁者黃
連解毒湯調益元散枯燥不起者難治
若頂粒焦者無論紅淡皆爲熱劇之候
並宜白虎湯重用石膏乾燥無汗加麻
黃以汗之大便秘者涼膈散下之亦有
麻發如雲頭大片其形有二一者大片
焮赤一者大片之上復有小紅點粒皆
火邪熾盛所致白虎湯加黑參竹葉若

伊弉諾黃湯倉公名火齊湯治蕉
實燒瘧躁便秘黃連酒
○王連解毒湯治發
邢内外俱盛三苗湯

大黃酒浸

水余麻沸湯并須臾

大黃末

分溫再服麻沸湯者白水空

等分煎服

方惟降火善用之

益元散

一名天水散

治暑月小便不利滑石水飛甘草炙六錢爲散

六兩生四錢爲

散清水調服三錢矣

散溫病熱病加葱白

五七莖杏豉四合水

煎溫服老人虛人及病

後傷津液小便不利禁

用此方加芍藥煎服則

兼散表邪加吳茱萸則治血痢加炮姜則

散肝火加薄荷則清

肺熱加石膏則除胃

焚甚入聖双解之毒等

方隨證配合未遑枚舉

兼消飲食加神砂則

兼退心火加青黛則

散肝火加薄荷則清

肺熱加石膏則除胃

焚甚入聖双解之毒等

方隨證配合未遑枚舉

○白虎湯 方見

○涼膈散 方治溫熱

時行表裏實焚及心

火元盛目赤便祕冒

熱卷班大黃二酒浸芒硝一

兩甘草錢六連翹兩

治暑月小便不利滑石水飛甘草炙六錢爲散

六兩生四錢爲

散清水調服三錢矣

散溫病熱病加葱白

五七莖杏豉四合水

煎溫服老人虛人及病

後傷津液小便不利禁

用此方加芍藥煎服則

麻出班爛如錦紋或出膿血腥臭不乾
心胸煩悶嘔吐清水身溫熱者白虎湯
加黃芩茅朮若初發時有似班屑者乃
風寒在表而成癰疹極宜疎解俟麻透
其疹自退切勿誤認爲班而與苦寒
之劑致麻內陷而難救也
欬嗽 ○清金散治咳口乾心煩之癰疹。天花粉
丹蔴半安桔梗半皮知母各七分玄參一
蓮莖乾葛各三十克
致然欬則毛竅開而麻易出故未出之
先最喜欬甚發透其欬自己若出盡及
汗

麻發之際常宜微汗微汗則肌腠疎豁而
邪易透不可復用外麻外發恐汗大泄
不無亡陽之慮其有隱陷不透之壞證
用權外發得大汗而解者此特語其變

也若壯熱無汗而皮膚乾燥者必風寒壅滯難出多成內攻之候或腹脹痛或發喘促宜與葛根解肌湯冬月越脾三拗退為度某無竹葉有善一斤棗一枚葱白一莖硝黃得枳朴之童者芩梔翹薄之輕揚則上抑之而下清此表氣則下投表之而順下得涼膈之所攸分也用甘草者即調胃兼氣之義也局方專主溫發時行故用竹葉若治感冒之證從世本用

總不逾上法也

○黃芩一山梔八薄荷七
七爲散每服四五錢加竹葉十五片水煎溫日三夜二服得下
抵退爲度某無竹葉有善一斤棗一枚葱白一莖硝黃得枳朴之童者芩梔翹薄之輕揚則上抑之而下清此表氣則下投表之而順下得涼膈之所攸分也用甘草者即調胃兼氣之義也局方專主溫發時行故用竹葉若治感冒之證從世本用

葱白姜棗可也

○白虎湯方見總論

○清咽滋肺湯方見總論

○甘桔湯治麻疹咽

喉口舌生瘡甘草桔梗山豆根黑參鼠粘子荊芥等分麥門冬用

水煎溫服

○參白虎湯王函印人

虎湯治癰病吉丸大渴發熱背寒白虎湯加入參

○葛根解肌湯方見發熱

嘔

○麻疹初起而多嘔者是內火因風邪激搏而然正出時有嘔者其候必輕如沒後尚有嘔者邪熱盡解可無餘患矣如嘔而多涕者渴壅得泄肺氣自清最爲吉兆若無嘔而鼻塞不通必有風邪留滯宜辛涼之劑以透達之

○嘔吐發熱火邪內逼毒氣上衝則嘔吐宜竹茹石膏湯陳皮半夏石膏竹茹白芍芩耳草木煎瘦料出

○奇經經論

○越婢湯金匱治風水
惡寒一身悉腫脉浮
不渴續自汗出無大
熱者麻黃湯去桂枝
杏仁倍麻黃加石膏
八生姜三 大棗五 枣水煎
越婢者矣 越土之邪氣
溫分三服濕土之邪氣
也水濕之氣因風滯播
中外兩相激搏勢難分
解不得不藉麻黃桂枝
從表而越石膏清之
從裏而化內經開鬼
門法也本方加木以助
勝理開汗大泄於加
木方中更加附子以治

洩而作葛根解肌湯正出及正沒時見
者消毒飲加枳實黃連多痰者更加貝
母桔梗根若沒後而嘔者脾胃虛而熱
滯也石斛解清胃散其有嘔而吐者胃
中痰熱膠固蟲無所養而上竄也能食
即定如吐出多而不能食爲胃敗不治
泄瀉丹臺王案必勝飲治癰已出而瀉不止
陳皮 厚朴 蒼朮 白茯苓 牛蒡子澤瀉木
泄瀉爲麻疹之常候熱邪得以開泄也發
熱時瀉而黃赤稠粒小水短濇者屬熱
四苓散加木通滑石已出人參白虎湯

脚氣症治方可考見也

脚氣惡風開中寓闔信手合轍其大青龍小續命麻杏甘石湯或加桂枝以和營或加參歸以鼓舞或加杏仁以泄滿總以此方為樞局也
○或問表無大熱何得輕用麻黃內無煩渴何輕用石膏蓋惡寒身腫自汗渾是濕氣鬱著非風以播之不能解散麻黃在寒傷營創中則為正治在越婢青龍續命方中則為導引不可以此礙彼也

去知毋易麥冬其證必多發渴甚不止
熱甚不退雖數劑無妨如瀉下清稀白
沫腹疼喜得溫按者屬寒胃苓湯去蒼
木加煨薑瀉利塞迫而腹痛脹滿或噯
氣如敗卵者爲飲食停滯枳殼湯加楂
蘖木通大抵麻疹泄瀉屬熱者多屬寒
者少辨治宜早不可令其瀉久瀉久則
正氣下陷或成腫滿或變下利並宜枳
實理中之類以理脾胃爲主麻後瀉利
不止口渴目閉四肢不溫者不治嘔吐

不食洞泄不知者不治

目

矣根無汗而喘骨節痛麻黃去
傷肺而欬悞行欬肺
太桂枝用麻黃
右粟水煎溫服接覆取微汗不
須啜粥以寒邪入傷營氣宮元
甘草生杏仁連皮等
起於中焦恐穀氣却助邪熱也
分更加桔梗荊芥各
加吳三拗湯

○白虎湯

方見總論

吐。葛根解肌湯

方見

麻疹發熱之時眼光如水而多眵淚或目
睛微紅此正候也若沒後猶見紅赤爲
肺經風熱未盡瀉白散加荆芥薄荷黑
參牛蒡子連翹木通赤而
腫痛者風熱上壅也導赤散加荆旁黑
參若爲風熱所侵而眼眶赤爛者柴胡
飲子急須治之否則爲終身痼疾

發不出

○石斛清胃散治麻

方見

後嘔吐日虛不食熱

滯石斛芩橘皮枳

殼橘蘿豆蔻杏丹皮赤

芍等甘草減半爲散每

服三錢加生姜一片水

煎服之。

世五苓散治傷寒表裏未解渴

渴四苓散治小便赤

而小便不利果生茯苓猪苓澤

瀆脹痛及溫熱時行

鴻桂五苓散太桂

寸口三服或生料煎服溫覆取微

似汗。按五苓散本治大陽經邪犯

本渴而小便不利飲水即吐之水主故

用芩次本利水生津又需桂以蒸

動其津則渴者自不渴矣後人

不食洞沚不知者不治

庚子年

十四

卷之三
癰疽無汗而喘骨節痛麻黃去
桂枝三
桂枝甘草煎杏仁三十枚泡
右煎水煎溫服緩覆取微汗不
大桂枝用麻黃不
須啜粥以寒邪入傷營氣當
甘草生杏仁連皮
起於中焦恐穀氣却助邪熱也
分更加桔梗荊芥各

加昊三拗湯

○白虎湯

吐。葛根解肌湯見。

○肖蠶歌

卷之三

○不角之音

卷之三

卷之九

後嘔吐冒虛不食熱
滯石斛茯苓橘皮枳
殼甘橘豆蔻杏丹皮赤
芍等甘草減半為散每
服三四錢加生姜一片水
煎服之

前序。五苓散治傷寒表裏未解渴而小便不利。白朮生茯苓猪苓桂枝。鴻桂丸。右五味為散。自飲和服。方似汗。○按五苓散本治太陽經邪犯人參白虎湯。方見咳。本渴而小便不利。飲水即吐之水。故用苓次本利水生津。又需桂以蒸動其津。則渴者自不渴矣。後人

初起發熱欬嗽渾身脹痛有似傷寒之候惟乾欬連聲目亦多淚嘔惡便溏確爲麻疹之驗若將發之際或爲風寒暑濕或因肢體坦露寒鬱熱邪不能外出此全盛之勢未萌興出後沒早不同如氣粗喘促腹中脹痛煩擾不寧而不得外出急與麻杏甘石湯或越婢湯去棗重用石膏輕則升麻湯以外發之若因鶲犯霧露風寒隱現不能發出以新猪矢冲湯膈草蒸之冷則更添滾者并取豬矢

卷之三

麻疹發熱之時，眼光如水而多眵淚，或目
睛微紅，此正候也。若後猶見紅赤，爲
肺經風熱未盡，渴白散加荊芥薄荷黑
參牛蒡，閉不欲開，更加連翹木通赤芍
腫痛者，口尊赤散加荊芥旁黑參若，
飲子血桂勝散，終身痼疾。

卷之三無汗而喘骨節痛麻黃去

序言全

古

不食洞泄不知者不治

目

傷肺而欬悞行欬肺

桂枝用麻黃

桂枝生杏仁連皮等

甘草生杏仁連皮等

桂枝用麻黃

桂枝生杏仁連皮等

桂枝用麻黃

序言全

古

麻疹發熱之時眼光如水而多眵淚或目
睛微紅此正候也若沒後猶見紅赤爲
肺經風熱未盡瀉白散加荆芥薄荷黑
參牛蒡子連翹木通赤而
腫痛者風熱上壅也導赤散加荆芥旁黑
參若爲風熱所侵而眼眶赤爛者柴胡
飲子急須治之否則爲終身痼疾
發不出

○消毒飲

方見總論

○石斛清胃散治麻

○白虎湯

方見總論

○吐葛根解肌湯

方見

○後嘔吐日虛不食熱

滯石斛芩芍橘皮枳

殼桔梗豆蔻香丹皮赤

芍等甘草減半爲散每

服三錢加生姜一片水

煎服之

○五苓散治傷寒表裏未解渴

渴○四苓散治小便赤

而小便不利梟生茯苓猪苓澤泻

瀆脹痛及溫熱時行

鴻鵠桂枝五味子爲散白散和服方

煩渴五苓散太桂

寸口日三服或生料煎服瀆復取微

似汗○按五苓散本治大陽經邪犯

本渴而小便不利飲水即吐之水主故

用三苓本利水生津又需桂以蒸

動其津則渴者自不渴矣後人

○人參白虎湯

方見

咳

本渴而小便不利飲水即吐之水主故

用三苓本利水生津又需桂以蒸

動其津則渴者自不渴矣後人

○人參白虎湯

方見

咳

本渴而小便不利飲水即吐之水主故

用三苓本利水生津又需桂以蒸

動其津則渴者自不渴矣後人

○人參白虎湯

方見

咳

本渴而小便不利飲水即吐之水主故

用三苓本利水生津又需桂以蒸

動其津則渴者自不渴矣後人

甘草錢五為散每服四五錢入粳米百粒竹葉一把水煎服加橘紅桔梗各加吳鴻白散有熱更加知母黃芩如有客邪禁用或問地骨皮三焦氣分藥鴻白用之何義答言三焦屬腎寒則鴻其子也門人曰唯吾道一以貫之

○道子赤散局治小腸實熱小便赤濁生地黃五錢通甘草稍

生各竹葉握右四果一錢水煎熱服瀉血加辰砂五錢一方多燈草分一方多車前

○柴胡飲子治風熱眼眶赤爛柴胡羌活防風赤芍桔梗荆芥生地黃各甘草錢五水煎熱服

○麻杏甘石湯治不出發汗後汗出而喘無大熱者麻黃湯去桂枝加石膏半兩此麻黃湯去桂而兼越脾之意當祛

風寒鬱遏也越脾湯葛根解肌湯隨輕重取用其有表虛不勝踈透者一附葱白濃煎時與之但得微汗即解若頭粒隱紅紫一片而不透表者火毒熾盛也白虎湯加荊芥黑參如肌膚不燥唇色淡白二便如常而不透者中氣本虛也消毒飲加連翹木通車前茯苓雖有蘊熱不可輕用寒涼即用峻利外發亦必不能複透但當解利使之內化爲主亦有胸背腰腹煖處起發而紅頭面

沒早

麻出未經三日或爲風寒外鬱或熱邪內陷或誤食酸收之物一日半日即沒周身煖處絕無紅影終變危候若雖沒早肌膚煖處尚未全沒急需透表發之不起即當審其所觸而與內解如外爲風

上焦溼熱痰氣與芩
桂木甘湯互參彼藉
芩木專祛心下之支
飲此藉石膏專祛膈
上之溼熱也

○越脾湯方見汗

○升麻湯一名升麻葛根湯
治陽明經邪發熱及
痘疹初起升麻一葛
根白芍各錢半甘草八錢
分右四果水煎溫服
升麻為陽明經之嚮
道守陽明專主肌肉恐
開泄大過即以白芍欽
護營血甘草調和中

寒所遇邪反內攻而沒早者消毒飲如
葱頭熱服復透者吉甚則加麻黃紫山
甲或越脾三柳選用若不急治必喘脹
而死亦有偏身青紫熱腫喘脹氣急此
毒滯血凝半匿肌表急投涼膈散去芒
硝加麻黃石膏以發越之若腹脹喘促
溺瀉臍突者涼膈散加葶苈大戟或可救
燥或腹脹喘急不看人事者白虎湯加
黑參竹葉若誤食酸醋收斂之物伏匿
一二若內挾痰熱火毒元劇而伏匿煩

氣所以解利本經邪

撲及時行痘疹皆為

專藥然在起脹後禁

用透竹葉石黑湯方見總論

○透葛根解肌湯方見表

○透葛根解肌湯方見表

○白虎湯方見總論

○消毒飲方見總論

○消毒飲方見總論

○越脾三柳二方見汗

○涼膈散見形色

壯熱喘欬煩悶以豬膽汁製甘草煎成
續之與之得吐微汗為効或苦瓠生耳
附煎湯灌之亦能取吐吐中便有發越
之義誤食豕肉喘脹氣急枳殼湯加山
楂杏硝以下奪之誤食核桃喘欬聲嘶
消毒飲加石膏馬兜鈴若得熱退身安
氣息漸調者方可無慮或大病之後或
洞泄不止中氣本虛不能發越而沒早
惟當捷運中氣畧兼解毒清熱若沒後
遍身搔癢者露風早也消風散以踈解

○白虎湯

方見總論

○枳殼湯

方見泄瀉

○消風散

局治風熱
欬嗽遍身癆瘍小兒
瘡瘍餘熱川芎羌
活防風荊芥穗藿
香入參茯苓殼蠶
蟬蛻等甘草炙陳皮
厚朴減半右十二味
清調下或用五錢水
煎去滓服如各病頭
風目翳每日三服効

之

難沒

西北水土剛勁稟質示厚麻必五七日乃
沒東南風氣柔弱麻出不過二三日即
化邇來地運變遷未有不綿延數日者
當非難沒之比若三四日後點燥色白
隱於肌腠而難沒者此必衛氣素微
不能歛發或衣被單薄阻其發越之機
以致綿延多日法當辛散透達不可遽
用寒涼蔽其開泄之路也

此方妙用全在厚朴

人參當知肌表之疾

無不由冒而發故用

厚朴清理其內即以

人參助諸風熱消解

風熱於外則恙防荆

芥輩方始得力耳

渴門冬甘露飲治

麻疹熱甚而渴麥

門冬二錢黑參蜜芩

桔梗根連翹各一錢

甘草五分燈心土竹葉

水煎溫服

○七果白木散

即錢
木散

喘者熱邪壅遏肺竅氣道阻塞而然其證

渴

渴乃肺胃熱盛之候唇口必紅二便秘滿
者門冬甘露飲若二便清利唇色不紅
而但渴者此必寒涼大過脾虛不生津
液而作渴也七味白朮散去朮香加粳
米渴而煩躁者是熱邪凌燦心包白虎
湯加麥冬竹葉正沒時竹葉石膏湯去
半夏渴而腹脹者本虛實滯爲難治也

喘

治胃虛津氣不行而渴四君子湯加藿香木香煨葛根為散每服三四錢水煎日三服

○白虎湯方見總論

○三拗湯方見

○白虎湯方見

○清咽滋肺湯方見

喘竹葉石膏湯方見

○白虎湯方見總論

有虛實之分虛者難治實者易調虛則小便清利大便溏泄身無大熱雖清潤肺多難獲効實則大便堅燥小便赤瀦身發壯熱竹葉石膏湯去半夏加麥仁貝母冬月量加蜜炙麻黃隨手而應若喘而無滯兼之鼻扇者不治大抵未出而喘者易治後喘者難治初發之時喘者三拗湯加石膏芽茶喘而鼻乾口燥者白虎湯最捷若見於麻後又宜清咽滋肺湯以滋肺胃白虎湯又爲切

○白虎湯方見

○清熱透肌湯方見促例治

○除熱清肺湯治麻疹盡透而壯熱欬

喉大便祕結石膏三

黑參生地黃赤芍貝母桔梗根各一錢

冬葵半甘草五分水煎溫服

○射干消毒飲治麻瘡

方見總論

禁故曰醫不執方活法在人耳

氣促

桂ニニカワメ無ツラシテトテ古人フカク此ニ我ム鬼角
醫ニ臨壳應變必ニモ一方ニナムベカラス

氣促多緣肺熱不清所致初發正出時見之清熱透肌湯在正沒後清咽滋肺湯如喉中有痰齁嗰而鳴者熱邪阻逆不得發越也見於初發正出之間除熱清肺湯正沒後見者必邪熱未透或露風沒早餘熱內攻而肺氣受傷也難治

瘡

疹欬嗽聲瘡咽腫
痛射干黑參連翹
荊芥鼠芻子等甘草
減半水煎溫服

搐○清熱透肌湯方見例治

衄○犀角地黃湯方見總論

○四物湯方見發搐

譖忘○白虎湯方見總論

○竹葉石羔湯方見總論

咬○麥門冬湯治痘
才疹便實而渴四物

肺胃熱邪爲風寒所襲不能盡達於表。欬
盛咽喉傷故瘡宜清咽滋肺湯若瘡而腫
痛者射干消毒飲然瘡爲麻疹之常不可
與痘瘡比例。

搐

搐爲痰熱聚於心包見於初發未透之時
清熱透肌湯加蔓仁竹葉沒後見者難
治。宜輕清之。剖調之不可誤用金石
痰涎壅盛者一味枯蔓湯吐之若搐無
痰鳴或自嚙指者非眞搐也此爲正虛

不能主持必死不治

衄

衄者火邪熾盛血隨火載上行而溢於鼻
口氣○清胃散治胃中
溫熱中脘作痛痛
後火氣發泄必作
寒熱乃止及齒齦
腫痛出血痛引頭
腦生地黃升麻

錢半杜丹皮錢當歸
川連酒蒸各三錢烏散分

譖妄是熱邪熾盛於心包若發熱正出時
見者爲火邪內伏不得透表而致白虎

三服水煎去滓細細呷之半日再服犀角地黃湯專以散瘀為主故用犀角比則開提胃

湯加荆芥鼠粘子甚則加麻黃以發越
之在正沒後並宜竹葉石膏湯去半
夏加生地黃以清解之

箕加生地黃以清解之

寢一加二生

卷之三

故曰先達其能加
果清畠則兼二方之
制但少芍藥耳

古文選

九見

白虎湯總論

○當取散治口舌生

瘡牙根毒發大便
秘結當取赤芍一錢

三

證咬牙有寒熱之分。麻疹咬牙皆爲熱例。乃陽陷於陰故多發渴手足熱喜飲冷者麥門冬湯加丹皮若手足不熱而反厥冷喜飲熱湯此爲熱邪內亢後必下血咽喉作痰鳴而死即與白虎湯多不可救。

川芎五分大黃三分甘草三分
生五爲散加生薑一
分

生王烏散加生薑一
分

卷之三

磨礪

唇燥多屬脾胃之熱淡而燥者其熱輕亦
而燥者其熱深紫黑而燥者熱劇而重
也隨輕重以清潤之

舌破裂者心脾之火上壅也其色必多
深赤如火發正出時見之白虎湯加芩連

黑參荆芥薄荷若正沒後見者爲心脾俱絕不及紫黑柏燥而血不活者皆難

瘡腐爛荔枝穗薄荷
青黛各三玄明粉硼
錢

錢

砂合二甘草錢半百葉煎

口氣

二錢為散點舌上令其自化。

便。清涼飲治上焦積熱肺秘。

四順清涼飲治血熱便祕。

氣不化呎口乾燥黃連黃芩治血熱便祕。

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

一錢五分水煎入生白蜜一匕搗服

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

一錢五分水煎入生白蜜一匕搗服

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

一錢五分水煎入生白蜜一匕搗服

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

一錢五分水煎入生白蜜一匕搗服

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

一錢五分水煎入生白蜜各酒蒸各

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

當歸赤芍甘草大黃水煎入生白蜜各酒蒸各

口氣濁乃熱邪蘊隆於胃清胃散加石羔連翹生耳艸其有臭不可聞者此胃敗也不治若其人本有是證不在此例舌者心之苗麻本火候心屬於火故舌多利更參外證而爲施治純黑爲心絕黑而溼者熱滯血分黑而燥者熱滯氣分皆爲危候並宜白虎湯溼者加生地黃

黑參燥者加麥冬竹葉黑色漸退者吉不退者死

口痺

牙疳齧爛是熱留陽明餘毒上衝所致加味清胃散加石羔芥大便秘者當歸散微利之外用粟根白皮煎湯漱淨以無比散或燒鹽散吹之如通齶色白者自外延入內者無膿血者齒落口臭者喘促痰鳴者皆爲不治若滿口唇舌赤白爛獨牙齦無恙者此爲口瘡非牙

功用天淵
消○道守赤散

目方見

桂枝湯王治風傷衛氣脉浮

利○黃芩湯王函一合

葛根芩白汗散自汗營衛不和桂枝散

葛根散治伏氣發溫大陽

自汗三甘草炙生姜五太東散

葛根散治自汗營衛不和桂枝散

葛根散治伏氣發溫大陽

汗出三甘草炙生姜五太東散

葛根散治伏氣發溫大陽

自汗三甘草炙生姜五太東散

葛根散治伏氣發溫大陽

自汗三甘草炙生姜五太東散

葛根散治伏氣發溫大陽

自汗三甘草炙生姜五太東散

葛根散治伏氣發溫大陽

○凡ソ疾病在テハ饑ト渴ト其情相似テ自差
別アリ諸病ニ於テ食ヲ思フノ欲シ失フ者屢
くコレマリ然レバ飲ヨリノ機タ失ウテ飲フ能
ザル者ハ鮮矣却テ大渴引飲ノ症シ也死スル者
往々トアキ大食ヲ爲ス者ハ殆ト稀ナリ

○發渴水液竭涸因ノ症治ソ論ス

夫レ渴シモ所以ノ者ハ天性自然ニ水様ノ嗜欲
身體中ニ置キスルヲ告訴ス劣爲ナリ是ニテ多
ク表発ノ蒸氣ヲ泄ミ或ニ多ク汗出発ミ故ニ多
小水ヲ利シ或ニ多ク水渴渇泄ミ或大ニ動作为勞
碌ヲ爲シ或ニ壯熱乾燥ノ病ニ入ル皆必又渴
渴發スルナリ但シ壯熱病ニ於テ渴スルナキハ一箇
惡徵トス更リ津液竭涸乾燥スト難モ天
性自然ニ告訴スルノ機カ虧損スル也

升去滓溫服一升不愈更服

○枳殼湯 方見泄瀉

○平胃散 祛治胃中宿食不化藜蘆宜之蒼木泔浸去皮麻油拌

○厚朴湯 治脾胃虛寒作脹腹中時痛時止平田日散 太蒼不加

茯苓乾姜潔古加
厚朴去皮姜陳皮泡甘草炙各三兩
大棗四五錢加生姜三兩
水煎溫服

半夏枳實姜棗

○半夏泻心湯 王下痞滿不痛半夏
蜜乾姜炮甘草炙人參苗芩各一錢
參湯 王治田日虛客熱
黃連一錢大棗一枚右七果水

煎溫服分三

痞滿半夏瀉心湯太

半夏甘草大棗加用
黃連錢

見者分利餘熱其痛自愈又須驗其有無他證屬虛屬實而與治之若熱邪內結而腹痛者通利大便爲主有麻後脾氣不調而致腹脹面目四肢浮腫分利小水爲要至若元氣大虛陰陽不能升降小水不利遍身浮腫喘促兼見者難治

便秘

大便秘結火壅血燥而耗津液麻疹大利所宜無論日期前後速宜清潤四順清

疳也亦胃中餘熱未盡毒壅上焦二便必多難瀉導赤散以瀉心脾之火外以綠袍散敷之

腹痛

腹痛之由不一總爲火毒內鬱或風寒壅遏或飲食停滯皆能致痛於癰熱正出時風寒壅遏毒反內攻而腹痛者急與疎表麻透自己若飲食過傷腹滿脹痛者力爲消導其痛自除時當正沒沒未盡而腹痛者兼清中外而痛自止沒後

涼飲甚則涼膈散以通利之慎勿遲延
恐麻變焦紫而難救也大抵麻疹自也
至沒二便俱不宜秘秘即微利可也

瀉上閉トヨシ尋子間テ

治施スヘシ瀉ル症ハタヘバ

重症ニテモ早卒ニヤヤニキ
無キ也閉ル人ハ長病ニテモ又
ハ何症ニヨラ急病ニテモ大
小兒ニヨラ判日ヨリスギテ
小便閉ア人ハ元氣ヨリミテ
モ忽ニ變キタリテ死スルモノ
也予か師又ハ先人正永毅
半日教ラレシテ子ニゴロ也

小便赤瀉在初熱正出時熱邪瀉滲是爲
正候沒後見之爲餘熱下匿膀胱導赤
散加麥冬以滋氣化利之仍不通者必
大便秘欝之故大便一通小便自利

痢

麻之作痢爲熱邪內陷在正沒或沒後而

痢下色白者黃芩湯加防風枳殼下膿
血者白頭翁湯去黃芩加防風或因食
積而滯下者枳殼湯楂蘆木通腰中作
脹時痛時止者厚朴湯亦有瀉久而成
痢者乾薑黃芩黃連人參湯自初至終
痢不徹者必有風寒留滯於內則宜解
毒行滯而兼疎風實脾庶幾克應如痢
下紫黑如癰膿如屋漏水如雞肝色如
黑豆汁之類加之氣喘躁渴熱甚發口
噤口不食麻色紫晦者皆死不治

下蟲

下蟲多見於沒後此以胃熱少食蟲不能安而下也與過食傷中蟲不能容而下不同但須調其飲食自愈非上出之比不須治之

睡

此症邪氣輕シトシテ元カセニスガラス
ミタ心ラツテニルビ

麻疹正出時精神困倦沉睡不醒者爲逆蓋緣正氣虧損邪火內鬱正氣不勝所致若沒後而沉睡不醒者爲氣血俱虛補脾養血爲要如沒後煩擾而反不得

寐是餘火復燃急需滋養陰血虛陽自缺亦有昏睡不知起止指其夾車合谷不知疼痛似寐非寐無問正出沒後良非吉兆當察其兼見何證而與中施治可也

不食

不食雖妨害ヨク入テ診脉スベシ肝脾也

不食是胃中邪熱熾盛不可強與雖數日不食亦無妨害在初發正出時白虎湯加荆芥麻透熱清自能食也沒後不能食百解清胃散諒加健運之味元氣委

石

吐嘔

○石斛清胃散方

總論

○白虎湯方

頻者急需培補，防有虛羸之患

鼻扇

鼻扇者肺將絕也。若兼喘滿痰鳴此必不治。如咽喉清利無喘滿而精神不減者可治。宜滋培肺氣為主。沒後見者死。

胸高

麻疹胸高肺熱熾盛而脹也多見於正沒後為肺經壞證不治

身冷

麻為肺胃邪熱所發本屬於陽肢體常宜

溫煖若反清冷如冰是為逆也。其有沒後遍體溫涼如故獨下體厥冷過膝者為腎敗不治。如初出腰以下不熱毒不能透而反漸沒者亦為逆候急當溫養脾胃或有得生者。

妊娠

麻屬火候最易墮胎。若初發正出時須驗其色之紅淡熱之重輕而與疎解疎解之中佐以清冷滋血安胎為主。四物湯加一條芩艾葉荊芥紫蘿之類。若胎氣上

妊娠
○四物湯
方見
發熱

衝急用草根艾葉煎湯磨櫟續進以降之一切實脾行氣溫燥之藥既礙麻

疹復傷子氣咸須禁之

虛羸

○雙和湯治麻後虛羸

虛羸熟地黃白芍酒炒各一錢黃耆蜜酒當歸各七川芎甘草灸各四分肉桂三分有四分生薑一斤紅棗一枚太極

水煎溫服

○四君子湯治冒

麻患既平形體羸瘦精神倦怠飲食減少或欬嗽不止或便泄不已或身熱不除皆真元虧損恐成勞瘵並宜雙和湯去川芎以和之嗽加橘紅貝母欬加麥冬百合鴻加白朮蘿豆食難享代加砂仁穀芽氣血俱虛合四君子湯隨證調之

氣虛弱飲食不思倦怠少食人參一錢至三錢

白朮炒黃一錢至茯苓二錢

一錢至甘草灸六分右減半至一錢右

四呆水煎空心溫服

古四君子乃吾家氣方之耑葉留氣虛而用之功効立見即血虛用四物亦必兼此故八珍之主治不獨氣血兩虛也即虛者亦須兼用但凡氣則偏於四君補血則偏四物若純用血藥不得陽生之方陰無由以化也方

切禁寒涼傷犯脾胃之藥專力資培緩圖平復可也

麻瘡

麻後發瘡多緣生水濕浴太早水氣留泊肌腠而發但須日以荆防艾葉煎湯洗之勿用生水亦不可用瘡藥熏塗失治必每歲依期而發雖云小疾亦須慎之

水痘

水痘者色淡漿稀故曰水痘色赤者曰赤痘將發之時亦皆發熱由紅點而水泡

中白木若治脾胃虛衰
大便不實或嘔惡不食合
用炒焦方有健運之力
加肺田日虛燥欬嗽矢血
須用陳米飯上蒸過十
餘次者則轉渴為清轉
燥為潤是以異功散八珍
湯及飯脾逍遙等方內並
宜蒸者則陰虛乾欬
吐白血總無妨礙更加
白蜜拌蒸猶為合宜其於
輕重炮製之間全在用者
之活法權變舉此可以
類推三隅矣

右紅盤由水泡膿泡而結疣但水痘則
皮薄色嬌赤痘則紅潤形軟總不似正
痘之根窠圓淨緊束也且見點起發灌
漿結痂止於五六日之間其邪氣之輕
淺可知皆由風熱鬱於肌表而發小兒
肌肉嫩薄尤多此證當與大連翹湯解
之亦有夾疹而出者有夾正痘而出者
若先水痘收後而發正痘其痘必輕

附種痘說

痘本胎毒根於先天發則由於時氣以故

沿門合境安危相率與疫癘傳染無異
且多外挾風寒內停宿滯及平跌撲驚
恐為患種種匪可意料自伏波迄今天
生天殺莫可誰何邇年有種痘之說始
自江右達於燕齊近則遍行南北詳究
其源云自玄女降乩之方專取痘氣熏
蒸發兒胎毒於安寧無病之時則開發
之機裕如不似正痘之天人合發內外
合邪兩難分解也原其種痘之苗別無
他藥惟是盜取痘兒標粒之漿收入棉

水痘○大連翹湯治溼
痘利小便連翹瞿
麥車前木通滑石
研當歸赤芍防風
荆芥柴胡鉢一蟬
蛻黃芩酒炒山梔黑
甘草炙各七分水煎食
前焚服焚甚加酒
大黃兒小量與本方
大黃加紫草名太山

內納兒，鼻孔女右男左七日其氣宜通熱發點見少則數點多不過一二百顆亦有面部稍見微腫胎毒隨解大抵苗順則順必然之理如痘漿不得盜痘痂亦可發苗痘痂無可竊則以新出痘兒所服之衣與他兒服之示能出痘總取同氣氤氳爲胎毒之嚮導其盜機也天下莫能知而聖功生焉或有熱發出遲點不即起或雜發於麻疹之中須藥扶持者悉如正痘法調理自安當知胎毒

有限助虐無窮況苗發之痘既無客邪鼓動血氣勢無癢塌悶亂之虞正氣內守雖酒氣穢氣略無妨礙脫痂絕無瘢痕口鼻亦無殘廢之厄允爲避險就安之捷徑間有意外之變此兒正氣內奪加以客邪交迫時動必潰命之制在氣道之理也值此而與種痘未有不告變者故凡病後之兒及顏色太嬌骨幹太弱肌理大踈者皆未可以輕試也其於痘證初行疫邪方熾之時切須避其銳

氣當俟大勢稍平，方可施補。天浴日之妙用，其間或有不順者，此必苗非順，痘醫非慣家是不能無搘苗助長之憾然。皆方士之所爲人知，其神之神而不知不神之所以神。吾以靜眼觀之曷若順天隨時，不假強爲之爲愈也。

十仙湯治疹後錄
毒柴胡、黃芩、
陳皮、茯苓、生地
黃連、葛根、桔梗各半方
右繫毒者可用虛者勿用之

麻疹精要後序

氣運鬱發遷正退位之所以致，自天疫流行數十年之間或一次或二次焉。庚戌之秋瘟疫頻行，深秋之交麻疹復流行，沿門闔境傳染甚多焉。時醫好清涼者，通敷長子。申甫五十歲享保年中流行，其後二十餘年又流行，今歲安水青申春ヨリソ天下盡流行，保年中流行。只通敷三四歲，其後室營年中三十中間二十四五年，又東都ヨリ歸來專治療。寶曆年中ヨリ今歲安永五年又二十三年。十一月安永申申又二十三年十一月安永申申又二十三年也。

通丹追加安水立ヨリ寶曆三年追サ四年。

寶曆三年ヨリ享保十四年四月。

元錄四年上四年目。

疹流行以以前八精明流行之年斯不審。

通敷今歲安永丙申。

申甫五十歲享保年中流行，其後二十餘年又流行，今歲安水青申春ヨリソ天下盡流行，保年中流行。只通敷三四歲，其後室營年中三十中間二十四五年，又東都ヨリ歸來專治療。寶曆年中ヨリ今歲安永五年又二十三年。

得十全其七八偏溫補者固不得其治也是由下顎論麻疹書莫可以適從也張氏之爲書其設論也具備取方也簡當得擇焉而精語焉而詳之旨焉余依此書醫麻疹百發百中若鼓之應

桴矣今以其全書卷帙繁重工程難計應書肆之需抄其麻疹門加副墨以登梨棗如張氏宮牆之富美則可求諸其全書云

享保辛亥秋九月

浪華

上月專庵撰



作者清張璐玉

訓定者上月專庵

大坂心齋橋南誥題谷角

丹波屋半兵衛板



