





痧脹玉衡書卷之中

構李郭志遂右陶著

徧身腫脹痧

痧者暑熱時疫惡毒之氣攻於裏則爲痰喘爲血瘀昏迷沉重不省人事若元氣壯實內不受邪不入於裏卽散其毒於肌膚血肉之表爲腫爲脹若誤飲熱湯熱酒便成大害此痧之暗者宜從脉異處辨之

治驗

一翰黃聞兄一婢久生瘡患腹大如臌手足俱腫

延余診之。左脉微數。右脉或時歇指。余思瘡毒入內作腫。作脹。其脉必然洪數。有力。方見脉症相對。乃可治其瘡毒。今左脉微數。右脉歇指。脉症不合。必慢痧爲患也。視其腿灣果有痧筋青色。刺五十針。紫黑毒血流之如注。未愈。又刺指頭毒血二十針。用寶花散併付桃仁紅花湯入服。服後腫脹俱消。如舊。

一翰黃聞兄長女。手足俱腫。將逮於腹。延余診之。六脉弦細沉遲。知其爲慢痧之變症也。云宜先放。

其痧緣畏刺不放。余辭不用藥。恐藥氣稍冷。不能治。及於血肉之分也。越六日。腫脹益甚。復延余治。令其僕婦爲主。女放痧三十餘針。紫黑毒血已出。用寶花散稍冷服之。併用散痧解毒消瘀順氣之劑治之。以其痧久綿延。難於速效。計服二十四劑。方得腫脹俱消。安平如舊。

一賈峰青偏身腫脹。服藥不應。延余治之。余見心口將平。脣有青筋。余曰。危哉。診脈無根。殆不可療。然視其指上腿灣青筋交現。刺出毒血甚多。彼又

謂，痧症不當服藥。遂已後至一月餘，終成真臘而

歎惜哉。

一余隣許姓者，有子四歲。頭面胸腹手足徧身俱腫，脹紅色。頭汗如珠，不絕。求余診視。兩關兩尺皆洪大滑實，兩寸厥厥動搖。此傷食之痧感於脾經，故徧身肌肉腫脹。及看其痧筋不現，刮痧不起。此因誤飲熱湯。痧氣內攻壅塞，衝心。故徧身作腫。作脹，惟衝心心臟不受其害。故上干頭面化而爲汗出。之如珠。皆心液也。用紫朴湯加大黃丸微冷飲爲調治。

之脹消，汗止而愈。

悶痧

痧毒衝心，發暈悶地。一似中暑中風人不知覺。即時而斃。此痧之急者。如略有甦醒，扶起放痧，不愈。審脉，服藥施治。如發暈不醒，扶之不能起。必須審脈辨症的確。果係何因。先用藥數劑灌醒。然後扶起放痧。漸爲調治。

治驗

一注君美內室六月間發暈昏迷。延余診之。兩寸

丸而散餘脉如常但重按之時見歇指此暑熱穢氣觸犯心經之痧也扶之不起先用寶花散薄荷湯併藿香湯冷服稍醒扶起刺出毒血三針不愈用沉香阿魏丸薄荷湯微冷飲之漸安後用四物湯調理而愈

落弓痧

倏忽昏迷不醒或痰喘不已眼目上吊形如小兒落弓之症此暗痧難識必須審脈辨症的是痧毒看其身體涼熱唇舌潤燥何如然後治之

治驗

一盛洪烈子九月間發熱口渴昏悶不醒兩目上翻延余診視六脉微細而伏先用寶花散加砂仁湯冷下而甦扶起放痧十二針去紫黑毒血用救苦丹併細辛大黃丸加砂仁湯稍冷下又用防風散痧湯加金銀花丹參山楂葡萄而痊

一陳公玉八月間時常身熱口中微渴煎滾茶飲之倏然沉重昏迷不醒余診之左尺沉細動止不勻右寸脉浮而芤此腎虛而痧犯之腎水之痧逆

行千母肺金。故痰氣壅盛而發暉也。用獨活紅花湯入貝母牛膝同煎加童便飲之更進圓紅散而醒。然後扶起放痧一日後痧氣清用補中益氣湯六味地黃丸調理而痊。

噤口痧

默默不語。語亦無聲。形如啞子。此乃痧氣壅盛。熱痰上升。阻逆氣管。故咽喉閉塞。而然治宜先放其痧。審其肺腎脾三經之脉爲要。然後推詳餘經之脉。則知病之所本矣。

治驗

一吳子瑞。一女十一月間忽然痧脹。心中煩悶昏沉不語。子瑞善放痧。稍醒語更終日無聲。余診之。左關有力。右脈沉伏。傷氣之痧也。此女日爲後母所詈。故有此變。用陳香圓一隻。煎湯微冷飲之。稍有聲焉。未愈。次日左脈弦長而動。余曰。怒氣傷肝。痧氣猶阻於肝經之故。刺腿灣紫筋三針。血流如注。又刺項心臂指二十餘針。乃用二香散。陳皮厚朴湯。加延胡索香附。微溫飲之乃痊。

角弓痧

心胸脹極。痧毒內攻。故頭項向上。形如角弓。反脹是臟腑已壞。死症也。不可以治。

撲鵝痧

痰涎壅盛。氣急發喘。喉聲如鋸。痛若喉鵝。但喉鵝之症。喉內腫脹。若痧則有如喉鵝之痛。而無喉鵝之脹。又形若急喉風。但喉風之症。痛而不移。若痧則痛無一定。且痧有痧筋。喉鵝無痧筋。此可辨也。

治驗

不施襲先痰氣壅盛。吹引痰藥益凶。暴痛極。余診之。脉多怪異。此三焦命門之痧也。閑臂揩筋刺。十一針腿灣青筋刺。二針出紫黑毒血甚多。不愈用沉香鬱金散。救苦丹。清茶冷飲之外。吹冰硼散。又用荆芥銀花湯。微冷飲之。三劑而痊。

一周龍生喉痛之極。痰涎壅盛。延余。余曰。痧也。不信。飲熱湯。至夕而瘳。

傷風咳嗽痧

痧從時氣所感。因而咳嗽。肺經受傷。不可以傷風治。

之益傷風以疏風爲主。若痧則純乎疏風非其所宜當刮痧爲先。宜清喉順氣涼肺散痧爲主。若專重疏風縱非緊痧急症亦必咳嗽日甚纏綿不已。勞嗽等症由此而成慎之慎之。

### 治驗

一徐茂公傷風咳嗽日晡微寒發熱余診之右寸脉浮而芤。餘脉虛而無力。時氣所感肺經之痧也。其弟爲之放痧刮痧稍可不服藥至十餘日咳嗽不止。余用射干丸芩湯加前胡山豆根稍冷飲之。

### 漸愈

#### 痘前痧脹

痘本先天因時而發必由外感至如痧者亦時疫之氣所感作脹作痛而胎元之毒因之俱發。凡痘未見點之前痧脹必心胸煩悶痰涎壅塞甚至昏迷沉重不省人事此其候也。其小兒滑疾之脉類於痧症厥厥動搖之脉雖若疑似難明然痧有痧筋可辨宜先刺出毒血而後用藥清理之則痧自退痘自起矣。若痘點既形觸穢痘隱者諸痘科自悉不贅。

治驗

一夏子亮幼子五月發熱，痰喘氣急。四肢戰動，兩目無神，不省人事。口熱如爐，面有隱隱紅紫細點。延余看痘，閱其腿灣，有紫筋兩條。余曰：「兩日無神，四肢戰動，痘之候也。」隱隱微點，痘之形也。口熱如爐，紅紫之色，熱之盛也。但是痰喘氣急，有腿灣紫筋兩條，必痘因，疤痕而發。治宜先放其痘，後發其痘，則痘自起。用針刺出毒血，隨用荆芥連翹防風，紅花，青皮，桔梗，枳殼，山楂，葛子一劑。俟稍冷飲之。

其痘卽發，至十一朝乃痊。

痘後疤痕

痘後中氣多虛，有感必傷，尤宜防護。嘗有小兒痘後，收醫脫痂，安然無事。一遇暑熱所侵，或穢惡所觸，卽成疤痕。往往忽然生變，人多認為惡痘所致。卽痘科任事者，亦以為然。竟不知其疤痕之為害，有如斯也。

治驗

一胡丹辰，子七歲。八月出痘，脫痂光潔，飲食如常。行步如舊，迨二十五朝，忽然叫喊不已，發暈，欲死。

皆以爲惡痘餘毒使然。求余治之。左右手六部俱微細而伏。余思惡痘餘毒兆變脈當沉緊有力。今微細而伏。若此。脉症不合。視其痧筋歷歷可指刺。出紫黑毒血不愈。用荆芥銀花湯合和脾宣化飲。稍冷飲之。卽甦後。小腹痛變爲痢疾。用當歸五錢。山楂一錢。熟大黃五分。加童便微溫飲之。稍安後。獨用當歸山楂四劑而痊。

一張可久。女十五歲痘後。二十二朝忽然發暈沉重。不能轉側。延余診治。右脉微細。左脉洪大。時一

歇。指視其指頭黑色。青筋歷歷刺出。毒血不愈。用降香桃花散合枳實大黃湯。稍冷飲之不愈。用三香丸。微溫服而痊。後傷食爲穢氣所觸。腹痛刮痧。服稜术湯。加明礬二分。微冷飲之而安。

胎前產後痧

孕婦之痧。最易傷胎。產後之痧。須防惡阻。較之乎人更甚。當急爲救療。庶於痧毒未攻壞臟腑之時。可以施治。若屬暗痧。發於此時。胎前痧脉溷於有孕產後。痧脉雜於惡阻。又無心腹痛據。痧從暗發。須當究其

症候察其聲色看有瘀筋急宜刺破肌膚瘀擁尤重  
油鹽至若瘀毒橫行肆攻臟腑莫可挽回慎母草草  
以誤人也

治驗

一趙方亨內室懷娠六月寒熱交作煩悶不安延  
余時痧在始發脉固未現初不覺其爲痧用藥不  
應忽爾昏沉次日余診左手脉伏面目微黑乃識  
其痧刺腿灣青筋六針出毒血少愈用桑寄生紅  
花香附益母草荆芥細辛葛子神麴冲砂仁末微

冷服而安後用小柴胡湯退熱又參苓歸地健脾  
養血乃痊

胎前痧痛論

胎前痧痛。毒氣攻胎。尚懼胎孕。絞動傷胎。頃命。況痧  
有毒血攻衝胎孕。嬌嫩決難安靜。至如安胎用白米  
當歸茯苓之類。痧所大禁。若一悞用。立時痧脹凶危。  
其痧脹所宜。惟是破血破氣之劑。又胎孕所忌。愚嘗  
斟酌其間。若刮痧放痧。不愈必欲活血解毒。用金銀  
花丹參益母草紅花桑寄生。消瘀而不損胎元。順氣

用香附陳皮紫朴砂仁烏藥行氣而不傷胎氣散痧  
用荆芥防風獨活細辛透竅而不動胎孕消食積用  
山楂葛子神麴麥芽寬中而不伐胎性採擇於中最  
爲穩當然惡毒勢盛此等之藥難於速效或椎用一  
二味克伐又恐於胎有害此予所以反復而不敢輕  
任也

產後瘀痛論

產後用藥必須溫煖。瘀脹用藥惟重清涼此症屬相  
反處治之方母執產後一於溫煖亦母執瘀脹一於

清涼也愚嘗遇此等症竊以爲消瘀破血之藥雖同  
其餘有不可通用者是以製就一方爲臨症之法散  
瘀用獨活細辛破血用桃仁紅花順氣用香附烏藥  
陳皮解毒用金銀花紫花地丁消食用山楂葛子神  
麴麥芽如產後利用薑灰肉桂以溫血瘀症所大禁  
瘀症利用荆芥防風以散瘀連翹薄荷以清熱產後  
所不宜況瘀症脹極尤重大黃枳實枳榔以通其積  
滯而產後之藥更不可不禁恐用此傷產後之氣分  
也且產婦服藥宜溫瘀症服藥宜冷若瘀而用溫脹

者益脹。產而用冷。瘀者益瘀。故予臨症。惟取微溫之氣。則既無害。產後而亦無助。瘀。若瘀更凶。極微溫之氣。難於制治。加童便以清熱。消瘀。產後瘀症。俱得其宜矣。

治驗

一顧月溪內室產後三日。腹中絞痛。脹大如臌。惡露不通。延余診之。余思產婦腹痛當在小腹。大腹脹痛。亦僅微疼。今產婦大腹絞痛異常。非產婦本症。及按脉。洪數有力。余曰。此產後兼瘀脹也。當取

瘀筋驗之。不信。漫服產後藥。益覺昏迷不醒。復求余治。勢已危極。瘀筋不現。先取童便一杯飲之。少甦。閑十指筋刺出紫黑毒血。一十一針。然後扶起。放腿灣瘀。六針。絞痛稍定。用獨活紅花湯。微溫。服之。迨瘀毒消盡。脹痛盡止。惡露俱通。後調補乃痊。一蔣南軒內室產後八日。惡露去血過多。忽惡寒發。熱胸中。脹悶垂危。延余診。脉洪大無倫。余思惡露不盡。猶可。今惡露去盡。何以驟得此脉。因語之曰。脈甚凶。若兼瘀。可救。南軒善放瘀。信余言。入視瘀

筋紫紅色者一條放毒血余復診之不復洪大又刺指臂出紫黑毒血三十餘針用獨活細辛柴胡金銀花丹參益母草牛膝石斛烏藥山楂陳皮四劑微溫服之寒熱脹悶俱除後調補而愈

一單公廉內室產後六日遍體疼痛寒熱如瘡昏悶異常延余六脉時有歇指閱左中指右無名指微帶黑色乃知兼痧之症刺指上紫黑毒血七針臂上毒血一針舌底下紫黑毒血一針昏悶疼痛稍緩用獨活桃仁蘇木香附童便薑黃山楂微溫

服一劑疼痛昏悶俱除但寒熱未已用金銀花丹參益母草艾柴胡獨活薑灰牛膝山楂溫服四劑寒熱乃瘳調補月餘而健

倒經痧

經行之際適遇痧發經阻逆行或鼻紅或吐紅肚腹腫脹臥牀不能轉側者是也肚腹不痛亦爲暗痧若痧毒攻壞臟腑者不治

治驗

一沈弘先內人經期發熱鼻血如注昏迷沉重肚

腹作脹延余診之脉伏余曰兼痧而經逆者也弘先善放痧刺腿灣二針出紫黑毒血不愈余用桃仁紅花獨活細辛山楂香附青皮加童便飲之經行調理而愈

痧熱頭汗痧在讌語附

痧氣壅盛發爲熱症或熱而不涼或日晡發熱或潮熱往來皆痧毒之氣阻而不通搏激肌表發而爲熱不識者認爲外感傳經熱症發汗溫飲卽慢痧遲緩勢必痧氣益盛變出頭汗發狂種種重症不知外感

之脉浮數而緊熱症之脉洪數有力痧症之脉終有不同或有可疑須看痧筋有無辨之卽明

治驗

一沈懷先夏月日晚發熱五日不涼諸藥不效反益昏悶煩躁余診之右三部及左關俱微細無力余見其病氣有餘脉反若不足知非真不足乃痧脉之變者也先令刮背上痧又於十指臂灣刺出紫黑毒血三十餘針不愈用冷茶送寶花散二服又以陳皮厚朴湯主之倍加玄胡索香附煎湯稍

冷服四劑而痊。

一邵洪玉內室日晡發熱頭汗如雨延余六脈震動不常故知其痧刺出十指紫黑毒血一寸針不能愈煎紫朴湯稍冷服二劑痧氣已盡用大黃三錢枳實陳皮厚朴各一錢煎湯溫飲下其結糞熱退身涼後朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸調理而痊

一褚元龍夏月潮熱往來已六日矣服他藥熱極不涼發狂讖語延余左脉俱微右脉俱洪大非痧

日漸調理半月而痊

痧煩痧睡

痧氣衝於心胸故心煩或嗜睡此等之痧俱屬慢痧之類輕而且淺人多誤以心煩嗜睡治之日甚一日倘日服熟酒熟湯熱物雖非驟然緊急勢必日漸凶險故併錄之以示戒

治驗

一王培元適會於其弟宋臣書室。云及心煩之甚。已非一日。將服他藥。余診之。脉症不合。止而不服。閱腿灣痧筋刺而放之。不藥而痊。此等痧甚多姑記一以爲例。

一余弟驥武每心煩嗜睡。自識其痧便欲刮放。不藥而痊。此由中氣虛故易感痧。患雖輕之至不足。具述然亦痧之一症也。姑錄之以廣其說。

老弱兼痧

先有痰火咳嗽之疾。忽爾喘急痰涎。喉聲如鋸。或頭

汗如油喘而不休。心胸煩悶。莫可名狀。雖云痰火危篤。往往有之。然亦有兼感時氣。或穢氣所觸。驟然勢盛者。凡治必宜細細察脉。按症先清其痧。次治其疾。然後漸補氣血。則標本兼得其理矣。

治驗

一汪子建母。七旬有餘。素犯痰火老弱之症。忽痰涎壅盛。喘急不休。喉聲如鋸。延余診視。六脉不勻。右如雀啄。雖老弱痰火之脉。嘗有歇指。亦不足怪。然視其驟然作變。病必有異。余曰。此兼痧症。尚可

治也。閱其左腿灣下有青筋二條刺之紫黑血流如注。先用散瘀消食豁痰順氣之劑併進牛黃抱龍丸。病勢漸安後惟補其氣血乃痊。

一盛君和母五十歲痰火多年忽面赤頭汗遍身俱腫喘急煩悶倍常延余診視余思老年痰火固所宜然何面赤頭汗偏身俱腫之聚也及按其脉又與症相合不可據以爲瘀然恐瘀之爲禍不小若竟以老弱痰火治之終覺疑而不安細視其十指有細紅絲筋歷歷可驗則其瘀之爲老弱變症

也明矣先治其瘀刺指頭二十餘針去其毒血次用稍冷湯服寶花散面赤頭汗身腫俱除喘急亦漸和緩唯是老弱痰火爲終身之疾。

瘡症兼瘀

瘡痛者心火血熱所致故火盛而膿腫作痛然膿瘡雖痛必漸漸而極非若兼瘀之驟故凡瘡瘍兼瘀其腫痛必多可畏處況瘡瘍脉多洪數兼瘀脉固不同其筋色又有可驗也。

治驗

一潘子亮女十八歲患瘡已半載。忽一日飲酒後。膿瘡大盛。或以其酒助血熱。且食鷄鴨發毒之味。膿瘡腫痛。由斯而極。治以涼血活血解毒托裏之劑。更覺昏迷飽悶。延余治之。脉不洪數。而反沉微。余曰。脉不對症。必瘳。使然刺出指頭。毒血又刺頭。項心一針。神情方始清爽。但胸中飽悶。用順氣散。痧消毒之味。四劑微冷飲之。兼外搽合掌丸。飽悶。膿瘡俱愈。

弱症兼痧

先有勞弱不足之症。或吐血時發。或微微乾嗽。兩顧唇口鮮紅。或骨蒸發熱不已。一觸犯時。氣傳染。或穢惡之氣相犯。必兼痧暍。或多痰喘。或咽喉如鯁。或心腹脹悶。煩躁發熱。較之平時不足之症。益覺沉重。此宜以痧爲主治之。令痧毒退盡。方可治其本症。不然勞弱未見凶危。痧禍已在目前矣。

治驗

一婦人吐血乾嗽。晝涼夜熱。已久忽午後發熱異常。脹悶沉重。他醫以爲怒氣血虛。用養血化痰順

氣之劑病勢益盛。昏迷痰喘不省人事。延余左關微緩無力。右關似緊非緊。餘脉應指不勻。余思怒氣填胸。左關必須有力。平時勞弱脉亦自宜弦數。內有鬱血。上中二部示當見芤。何脉不對症若是。看其左腿灣有紫筋數條。歷歷可指。其爲兼痧之症明矣。故昏迷痰喘先刺其痧筋出其毒血。倍用寶花散清茶微冷飲之。方得神情清爽。不復痰喘昏迷。脈悶沉重之勢。但勞弱由於本原不足。綿延未愈。

痧變勞瘵

痧症有惡飲熱湯者。有反喜飲熱湯者。惟其喜飲熱湯。痧症益莫能識。慢痧所以變成勞瘵也。原其痧毒之始入於氣分。令人喘嗽吐痰。發熱聲啞。蓋火毒傷肺。肺爲嬌臟。若不知治。變成百日緊勞。輕者數年難愈。卒至危亡。痧毒之始入於血分。重者迅變在卽輕者。歲月延捱。若乃毒瘀胃口。必須去盡而愈。毒瘀肝經。損壞內潰。吐血數發。勢極多危。毒瘀心胞絡。更加凶險。不待時日。毒瘀腎經。腰脊疼痛。嗽痰咯血。日甚。

一日不可得瘡。凡瘡毒遺患，總成勞瘵。治須識之。於始俱可療治。莫咎其終。若一潰損，臟腑便屬不治。

治驗

一王君瑞，內室咳嗽吐痰發熱，左背疼痛已年餘矣。延余診之，六脈浮緊洪數，脉症不合。又無瘡筋，但用刮痧痛減服散，痧清熱消痰順氣四劑而愈。一楊音節，痧脹不服藥，惟放痧三次，胃脘間成一大塊，咳嗽吐痰發熱不食，日漸尪瘦。延余診之，右關脉芤而緊，餘脉俱數。余曰：內有瘀血，必吐出而

可解。用桃仁蘇木澤蘭白蒺藜香附烏藥酒煎服之。吐紫黑血碗許，更用活血引下之劑加童便酒服之而愈。

一左元峰，痧脹放痧三次，不服藥，痧根不絕，變成勞瘵。咳嗽咯血，音啞，發喘骨瘦如柴。脉洪大無倫，余辭不治。又一月而終。

臌脹兼痧

先有臌脹，而痧氣乘之，臌脹益甚。在臌脹不可先醫，在痧氣自宜早治。

治驗

一江雲甫肚腹脹急如臍。臍突筋青心口將平。余診之知爲血臍之症。其指頭黑色此臍症之所無也。視指上有青筋兼痧無疑。刺二十餘針又刺臂灣腿灣青筋五針俱去其毒血略鬆用蒺藜散微溫飲之臍下青筋漸退後用臍症之藥導去惡水日服治臍香圓丸一月餘臍症盡平永不復發。

痧變臍脹

痧者毒也慢痧之毒遷延時日留滯肌膚腸胃血肉

之中若不早治卽成真臍。

治驗

一嚴天玉次子氣急作脹胸腹飽悶。臍下有青筋突起心口將平此慢痧成臍也。刺腿灣青筋六針出紫黑毒血甚多。又刺指頭出毒血二十四針。臍上青筋卽淡色。腹內覺鬆用寶花散微冷服腹脹漸消其後不復用藥施治。但恐其根未除日後復發姑誌之以例其餘。

半身不遂痧

心主血。痧毒入於血分。故易攻心。此痧症所以發昏也。若痧之慢者。衝激遲緩。未逆於心。留滯經絡。或在於右。或在於左。爲半身疼痛。或麻痺不仁。如此半身。遂總因痧毒之遺害也。治之者見有痧筋急。宜刺破。然後用藥以散其毒。活血以消其瘀。則痧根既拔。其症漸痊。若不知治。綿延日久。痧毒益深。勢不可遏。當又有變症難愈矣。

治驗

一章道庵屢患吐血。發熱不涼。左半身疼痛不已。

行步艱難。延余診視。初不覺其爲痧也。細思脉症不合之處。檢其痧筋。刺之。用桃仁澤蘭獨活烏藥煎。一劑微溫服。吐血疼痛俱愈。永不復發。

一盛成年。朝涼夜熱。氣急半年。服藥不應。反加右半身疼痛。不能俛仰咳嗽。吐痰飲食減少。成勞弱不足之症。棹舟迎余。脉不見弦數。而微細。時有歇指。脈症不合。閱其痧筋。刺二十餘針。用姜黃旋覆花丹參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山楂角刺穿山甲。二劑微溫服。疼痛吐痰俱除。後朝用六味地黃丸。

卷中  
夕用補中益氣湯朝涼夜熱俱愈

內傷兼痧

人有內傷訖無外感。外感之症不獨風寒卽夏月暑熱之氣。時疫傳染之氣。穢惡觸犯之氣。一受於身。亦如外感。然則內傷者本病。外感者標病。故傷寒集中。有內傷外感之症。此之集中。有內傷兼痧之症。治法主意。先辨痧症。治其標。後審內傷。治其本。

治驗

一曹洪宇子之外戚。爭奪家產。涉訟公庭。有老婦

造其家。互相爭毆。發熱沉重。咳嗽吐痰。胸中脹悶。諸親戚惟恐斃於曹姓室中。延醫青來王兄更邀。余往視。青來幾不敢任。余憐憫此婦。不治人命重。情彼此俱敗。若一救之。不特活婦一命。亦且保全兩家。是亦大德。余爲診之。知其內傷兼痧症也。刺痧筋。二十餘針。付寶花散。微溫服之。脹悶稍鬆。爰定一方。卽於青來廂中取藥。用桃仁赤芍澤蘭玄胡索紅花陳皮烏藥。獨活治其內傷。服後下黑糞。瘀血俱消。諸症俱愈。但其舊有不足之症。非參不

可後青來用參芪大補乃健而歸

紫胞疵

痧症不內攻則外潰。余於發蒙論中已略陳其概矣。無如痧症變異。更有難盡述者。卽若爲腫爲毒之外。又有發爲紫血胞者。此真痧之異者也。余故記之以例其餘。

治驗

一余隣許秀芝女嫁爲養媳婦。手足下半身俱腫。大腹亦脹。發出兩腿足紫血胞。如圓眼大密難數。

記皆云此爛瘋之症。服藥益甚。秀芝憐惜其女。載與俱歸。求余治。視胞多可畏。及見有疵筋。發現於腿灣方知。疵者猶樹之根。胞者猶樹之葉也。遂爲放疵三針。又刺指頭疵。二十一針盡去其毒血。復診其脈六部俱和。殆其疵毒之氣已散。但存肌表紫胞而已。用蘇木紅花澤蘭桃仁烏藥桔梗川芎牛膝。二劑溫服。凡紫血胞盡收。曆結痂而愈。

痰喘氣急痧

先有痰喘氣急。而痧張因之。先治其痧。後治其痰氣。

無。令。疵。爲。本。病。之。助。先。有。疵。脹。而。痰。喘。氣。急。因。之。但。  
治。其。疵。而。痰。喘。氣。急。自。愈。若。疵。有。寒。熱。不。清。痰。喘。氣。  
急。者。兼。和。解。疵。有。有。熟。無。寒。痰。喘。氣。急。者。兼。清。熱。疵。  
有。食。結。不。化。痰。喘。氣。急。者。兼。消。食。順。氣。疵。有。大。便。不。  
通。小。便。不。利。痰。喘。氣。急。者。急。攻。其。裏。疵。有。瘀。下。膿。血。  
或。赤。或。白。痰。喘。氣。急。者。急。攻。其。積。疵。有。瘀。血。凝。滯。小。  
便。利。大。便。黑。痰。喘。氣。急。者。急。消。其。瘀。疵。有。嘔。吐。紫。黑。  
血。或。鮮。血。痰。喘。氣。急。者。當。慮。疵。毒。攻。壞。臟。腑。不。痛。者。  
可。治。痛。而。不。已。者。難。治。服。藥。不。應。者。必。

治驗

一祖南軒四月發熱頭痛脹悶昏迷痰喘氣急延  
余六脉無根余曰脈法六脉無根者死若爲疵脹  
而然則有救其家善放疵因閱疵筋放之不愈余  
用沉香鬱金散圓紅散稍冷服又用化毒丹一服  
昏迷卽醒脹悶痰喘氣急俱平更用防風散痧湯  
加青皮連翹山楂葛子熟大黃一錢服之發熱頭  
痛俱已六脉如舊

一費道元內室痰喘氣急脹悶不已延余左三部

脉浮緊而數右三部脉如無余曰。痧脰暗發也。其兄善放痧刺乳下出紫黑毒血一針如注六脉復舊。余用和脾宣化飲二服稍冷飲之。痰喘氣急脹悶俱痊。

一錢公肅子二月晚間痰喘氣急發熱身重腹中絞痛延余脉沉微刮痧放痧不愈用藿香湯稍冷服之又用稜术湯加大黃五分微溫服之諸病俱痊。

痧瘋

瘋者天地間厲氣所感發而爲瘋。蓋惡毒之氣躍於血肉散於肌表留於經絡以成瘋症最惡候也。若痧者亦時行惡毒之氣變爲大瘋尚何疑乎。余昔在秦溪嘗見一人犯大麻瘋症眉髮俱脫面目頽敗手足蹉攣遇一老者爲之放痧三次曰此痧瘋也傳汝一方金銀花六錢黃芩一錢五分皂角刺一錢赤芍二錢紅花二錢牛膝三錢苦參四錢生地二錢水煎日服日漸而痊。若余於此症固未嘗治及不敢虛載治驗適余經見老者所治有然故附錄之以見痧症之

亦有是變焉。

痧重

痧症始發勢雖凶暴未必身重若飲熱湯熱酒痧毒即阻塞於經絡血肉之間。徧身重痛不能轉側放痧之後治宜消瘀解毒爲先。初起易治久則難治放痧服藥不效者效。

治驗

一邵光先十二月腹中微痛嘔噦酸水以爲胸中受寒服薑湯一碗徧身大痛腹脹身重不能轉側

迎余右脉俱伏放痧用當歸枳殼湯稍冷飲之又用桃仁紅花湯微溫服次日痧毒之氣漸減又放痧服如前藥而愈。

一莫秉雲次子頭痛發熱胸中脹悶飲熱湯一碗徧身疼痛不能轉側卧床不起服他藥益昏沈延余右寸氣口脉虛左寸微細關洪緊有力知其痧也刺指頭出毒血九針少愈用消瘀活血解毒藥三劑而痊。

眼目痧

痧者火毒也。若犯痧症適與心主之火相合故痧毒逆衝最要防。攻心之患今少陰心君不受邪逆犯厥陰肝母故兩目紅腫如桃甚則眼珠突出最爲凶險然他症患目惟在於目若因痧爲患必然先覺心中煩悶而目疾因之苟不知蚤治則痧毒已叅陽位其火勢之炎蒸輕則壞目重則殞命治宜先刺巔頂百會穴以洩毒氣當放者放刮者刮用清火活血順氣之劑加牛膝石斛以引火歸原誠爲良法。

治驗

一江道誠患心中煩熱頭眩忽兩目紅腫大痛飲熱茶熱酒眼珠掛出左目尤甚至晚卽昏沉發暉延余診視左脉微細無根痧毒之爲害也放痧不愈用金銀花茜草連翹黑山梔枳殼丹皮赤芍牛膝石斛草決明加童便微冷飲之眼珠始收調理而愈。

瘡痧

寒氣鬱伏於肌膚血肉之間至春而發變爲瘡症是名瘡痧又暑熱傷感凝滯於肌膚血肉之中至秋而

發亦名瘡疵。但春瘡疵毒受病者少。不相傳染。時或有之。秋瘡疵毒受病者多。老幼相傳。甚至一家數人犯疵。或一方數人犯疵。其發也必惡寒發熱。或腹痛。或不腹痛似瘧。非瘧或氣急發喘。頭面腫脹。胸腹飽悶。或變下痢。膿血輕者牽連歲月。重者危急。一時治宜放疵消食積。爲生俟。痧毒已洩。然後和解清理。除其寒熱。健脾養血。補其中虛。

治驗

一洪公震九月惡寒發熱。吐痰咳嗽。胸中煩悶。口

渴舌胎延。余診之。左脉時有歇指。右脉沉而有力。刺疵筋。毒血不流。後卧床不醒。益覺沉重。此誤飲燕湯爲害也。用陰陽水一碗。加明礬二分。飲之。又用消食去積之藥。加熟大黃一錢。微冷飲之。少愈。次日疵筋復現。刺臂灣一針。十指二十二針。去毒血。用活血解毒藥。諸症漸鬆。調理而痊。

一公震內室。同時惡寒發熱。頭面腫脹。心胸煩悶。似大頭瘟。診之六脉俱伏。此瘡疵也。放痧不愈。先飲微冷礬湯。次用透竅消毒下氣之劑。加牛膝三

錢同煎微冷飲之二服全愈

一公震次子十月寒熱如瘡心腹絞痛吐瀉不已。六脉沉緊亦瘡癥爲害也用沉香阿魏丸清茶微冷下併和脾宣化飲入大黃一錢同煎微冷飲之次日再服如前而愈。

頭眩偏痛癥

癥氣慢者上升於三陽頭面常覺頭眩內熱或半邊頭痛心煩不安宜刮痧不愈用清涼之劑治之。

治驗

一鍾仲宣數頭眩日漸益甚或時右偏頭痛脈症不合刮痧不藥而痊。

一潘尚峰苦頭眩或左偏頭痛服他藥不應延余脉微與症不合放痧不愈用清熱下氣之劑而痊流火流痰痧。

痧毒傳變不待時日朝發於足而足腫痛夕流於手而手腫痛朝發於肌膚而肌膚紅腫夕入於裏而痰喘不休此等之痧乍隱乍現乍來乍去按之脉而痧脈或不現最難識認如痧毒所流及之處熱者似流

火而非流火。腫者似流痰而非流痰。或痛極難忍。或  
痒痛不已。又痧之變者也。欲知此痧須看病勢凶暴。  
不比流痰流火之輕緩者也。驗之於痧筋發現刺之無  
疑。然後憑脈所犯風寒暑濕及食積痰血氣阻分治  
之。斯能有效。如或不覺便成效症。

### 治驗

一張宏原內室日間左足小腿紅腫大痛暮卽腹  
痛而足痛止。次日左足小腿又復紅腫大痛而腹  
痛又止來去不常。痛無一定。延余診之六脉如常。

而微數。此平人之脈也。難據爲痧。但症異凶暴。須  
看痧筋發現便有實據。可從痧而理也。扶看腿灣  
有青筋三條刺之。紫黑毒血流出甚多。反加痰喘。  
此放痧有未盡故也。用荆芥金銀花湯。加土貝母  
二錢。微冷服。二劑少愈。次日左足腿灣下又現痧  
筋一條。刺去毒血。併刺贊頸一針。服前湯。加牛膝  
三錢。二劑痧退。服紅花湯半月。腫痛俱痊。  
一葛隆生。次子清晨臂上紅腫大痛。次日變爲足  
腿上紅腫大痛。乍來乍去。隆生以爲流火使然。延

余診其脈。厥厥動搖數而不安。疾余曰。脈異於常而症多變。殆其痧與不信服熱湯二日而殂。一奚敬峰晚間右大腿紅腫痛。方已喉旁發腫而痛延。余脉不見異。初不覺其爲痧也。只見時症犯此者多細看兩臂痧筋刺出毒血。如注診氣口脉洪實。用紫朴湯倍山楂葛子加大黃一錢微冷飲之。食消便下而安。

咳嗽嘔噦痧

痧毒之氣上凌肺金。故氣逆發嗰而咳嗽痰涎上湧。

或嘔噦惡心。或面目浮腫。或心胸煩悶。此熱毒入於氣分。痧筋往往不現。治以刮痧爲主。間有人於血分者。必有痧筋。然後刺之。臨症用藥宜理。痧毒爲主。若以傷風咳嗽治之。則悞矣。

治驗

一俞仲嘉長女。五月發熱咳嗽。嘔吐痰涎。胸中脹悶。面目浮腫。延他醫服傷風痰嗽之藥四劑。心中益張悶。遂止不藥。將及一月。余偶過求。余診之。右寸脉虛。知其爲痧之變症也。刮痧訖。用防風散。妙。

湯加貝母薄荷童便微冷飲之卽痊。

一王惟誠咳嗽發哈不絕聲面目俱腫嘔痰不已更吐鮮血延余治之六脉弦緊且數此痧毒之氣搏激於筋脉間故見脈乃爾刺指頭出毒血三針令多爲刮痧用寶花散加童便微冷服又用圓紅散微溫服而痊。

痧張玉衡書 卷十

