

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

特別
ヤ9
1087
1


重要参考書
宋代(九六〇)人陳自明著婦人良方大全ハ全部廿四卷
ニシテ本邦ニ傳來セレハ足利時代ト曰くハ再承幸邦ノ医家ハ
婦人科全典トシテ江戸時代ニ及ビタリ

婦人良方 卷之一

陳自明良甫編

寛永版

16.35



太醫院校註婦人良方序

高麗

臣

秀水石山沈謐譔
病一也而婦人爲難醫一也而識病
爲難夫病多始於七情遂古之初性
靜情逸精神純暢每治于未病之先
治之以不治也以故藥不試而躋上
壽者比比迨乎後世恣情縱欲精神

西蜀圖書

耗而元氣索病道日多而醫効日渺
况婦人女子之性陰濁勝而陽明微
喜怒哀樂發而中節者寡其爲病常
浮于男子什九欲診問以識所因亦
誠難矣吳郡立齋薛君雅好岐黃素
難之書每爲人治病察色辨脉變藥
立方增除橫出優游容與俟其自愈

不示功不計程期在必起時精絕於
醫者不能及尤旁通外科女科之指
間取臨川陳良甫所著婦人良方一
帙爲之補註附以治驗示余讀之見
其發揮經絡揆度陰陽網羅百病凡
婦人症最人所難識者彬彬可睹蓋
薛君生平精力不貲委費坐卧行住

須臾不離。嗚呼斯亦觀其深矣。業者當自得之。

嘉靖歲丁未冬十月既望

太醫院校註婦人良方用藥宜禁

各症詳見本門復錄
首卷特以示急用也

一通經丸若脾胃無虧，暴怒氣逆或生冷，所傷陰血凝滯，月經不通者，宜暫用之。若脾胃虛弱，不能生血者，宜用六君當歸丸。

若因脾胃鬱火內耗，其益者宜用歸脾湯。若因肝脾鬱火，氣血傷，而月經不通者，宜用加味歸脾湯。若因肝脾虛熱，血傷，而月經不通者，宜用加味逍遙散。方見本門後倣此

一艾附丸若脾胃虛寒，陰血不足，氣逆發熱，月經不調，或胎氣不成，或暫宜用之。若肝腎虧損，陰虛發熱，月經不調，或崩漏帶下，或便血吐衄，小便淋澁，或肺熱內熱，寒熱往來，或盜汗，自汗，不時發熱，宜用六味地黃丸。若兼脾氣不足，飲食少思者，佐以六君子湯。

四物湯若脾經血燥發熱或月經不調宜暫用之君因脾經虛熱肝經怒火所致宜用四君子佐以加味逍遙散若因脾經氣虛血弱兼晡熱內熱宜用八珍湯加柴胡丹皮若因走氣下陷而致諸症宜用補中益氣湯

一人參橘皮湯若胎前氣痞痰滯作嘔不食者宜暫用之若脾胃氣虛胸膈痞脹痰停作嘔飲食少思者宜用半夏旋冬湯若因怒動肝火剋制脾土而致前症者宜用六君子加柴胡山梔枳殼脾胃虛寒者用六君子加木香砂仁內半夏治脾胃虛寒諸症尤當用

一紫蘇順氣飲若胎動不安元氣無虧者宜暫用之若因脾氣虛弱者宜用六君子加紫蘇枳殼欝結傷脾者宜用四君子

一加柴胡山梔蘇梗欝怒傷脾胃者宜用六君子加柴胡黃文批註一四物膠艾湯若內熱胎痛下血不正者宜暫用之若因肝經風熱而下血者宜用防風黃芩丸若因肝火血熱宜用加味逍遙散若因脾經鬱火宜用加味歸脾湯若因脾氣虛陷宜用補中益氣湯倍加升麻柴胡若因事下血者宜用八珍湯一黃芩白朮二味爲安胎之藥若脾胃虛熱中氣無虧者暫宜用之凡屬脾胃虛痞飲食少思或泄瀉嘔吐面色痿黃肢體倦怠者宜用六君子湯

一達生散若厚味安逸者宜用若芻蕘勞役者不宜用

一妊娠腹痛湏驗其面赤舌青者此胎已死用平胃散加朴硝

三錢化下之下後隨用八珍太補等湯調補之若昏戶俱青

吐出痰沫者子母俱死也若面舌俱青者母死子活產下亦

月經宣導

二

一小續命湯若外中風邪腰背反張筋脈癱瘓者宜暫用之若產後失血過多陽火熾盛虛熱生風者宜用八珍湯加鈞藤丹皮如不應當用四君子湯加當歸丹皮鈞藤若陽氣脫陷者宜用補中益氣湯如不應急加附子氣血虛敗者宜用十全大補湯如不應急加附子亦有生者

一澤蘭湯若產後惡露腹痛胸滿少氣宜用之若體倦面黃食少少寐而惡露不止宜用加味歸脾湯若氣血虛損而惡露上攻先用朱砂散後用八珍湯禁用黑神散奪命丹之類一產後口鼻起黑氣鼻衄者是胃氣虛敗而血滯也急用二味參蘇飲多有生者

藥禁畢

太醫院校註婦人良方九例

一各論有重複闢更棄遺難及歷代名醫治法增減庶灼見本症病因不致紛雜難曉

一各論有陳無擇熊教峯先生評論治法繁就簡併入本論以便觀覽

一諸治驗原隨方者悉從其舊若詞義重複者刪之以便覽閱傷寒之症反覆變遷命係毫髮須熟讀仲景等書專為一科庶無博而不精之誤

一製藥之法當因病制宜本集所云未備不錄恐執泥也

一各方有合大劑者今減作小方庶得臨症損益量病加減其有常服者悉仍舊

凡例畢

十一卷首論妊娠所藥之法當爲遵守其作用之藥不可輕
一補遺第二十四卷各卷已備不錄今補遺啓等一十四症方
論足成其卷

芍藥之性味酸寒產後用之於太補八珍等湯內以酒拌炒
用無妨凡屬脾胃虛寒虛弱面色痿黃者亦宜酒拌炒用

太醫院校註婦人良方目錄

卷之一

調經門

月經序論第一

精血篇第二

產寶方序論第三

王子亨方論第四

月水不調方論第五

月經不通方論第六

養生必用論病第七

室女月水不通方論第八

室女經閉成勞方論第九

血枯方論第十

月水不利方論第十一

月水行止腹痛方論第十二

月水不斷方論第十三

殺血心痛方論第十四

暴崩下血方論第十五

帶下方論第十六

崩中漏下生死脉方論第十七

白濁白淫方論第十八

天癸過期方論第十九

血分水分腫滿方論二十

卷之二

衆疾門

產寶方論第一

博濟方論第二

冠宗奭論第三

通用方序論第四

卷之三

衆疾門

中風諸症方論第一

中風角弓反張方論第二

中風口禁方論第三

中風不語方論第四

風痺手足不隨方論第五

中風自汗方論第六

筋脈癆瘻方論第七新附

虛風顫振方論第八新附

風寒臂痛方論第九

賊風偏枯方論第十

偏風口喎方論第十一

血風心神驚悸方論第十二

失血過多心神不安方論第十三

卷之四

衆疾門

風邪顛狂方論第十四

飛尸血厥方論第十五

血風肢體骨節疼痛方論第一

血風白虎歷節走症方論第二

血風癮癰瘙痒方論第三

虛風頭目眩暈方論第四

血風頭痛方論第五

頸項強痛方論第六

腰痛方論第七

腰脚疼痛方論第八

風邪腳氣方論第九

卷之五

衆疾門

勞瘵各症方論第一

二十四種蒸病論第二
新附

骨蒸勞方論第三

血風勞氣方論第四

冷勞方論第五

卷之六

衆疾門

熱勞方論第一

客熱方論第二

寒熱方論第三

寡婦寒熱如瘡方論第四

惡寒方論第五

血風煩悶方論第六

血風攻脾不食方論第七

夢與鬼交方論第八

傷寒傷風方論第九

熱入血室方論第十

咳嗽方論第十一

咳嗽用溫藥方論第十二

勞嗽方論第十三

喘滿方論第十四

風痰積飲咳嗽方論第十五

心胸嘈雜方論第十六

卷之七

衆疾門

嘔吐方論第一

霍亂方論第二

翻胃吐食方論第三

血膈方論第四

鼻血方論第五

吐血方論第六

痃癖諸氣方論第七

疝瘕方論第八

八瘕方論第九

腹中瘀血方論第十

瘕痞方論第十一

食瘕方論第十二

積年血瘕方論第十三

血氣心痛方論第十四

血氣心腹疼痛第十五

血氣小腹疼痛第十六

兩脇脹痛方論第十七

心腹脹滿方論第十八

卷之八

衆疾門

小便淋瀝不通方論第一

脬轉小便不利方論第二

小便數方論第三

遺尿失禁方論第四

小便出血方論第五

大便不通方論第六

老弱風人便秘戒用利藥第七
泄濁秘結方論第八

泄濁方論第九

協熱下利方論第十

滯下方論第十一

痢後嘔噦方論第十二

大便下血方論第十三

痔瘻方論第十四

脫肛方論第十五

陰腫方論第十六

陰痒方論第十七

大醫門本言卷之九目錄

陰冷方論第十

陰挺下脫方論第十九

陰中生瘡方論第二十

交接傷丈夫頭痛方第二十一

交接輒痛出血方第二十二

交接他物所傷方第二十三

小戶嫁痛方第二十四

卷之九

求嗣門

陳無擇求子論第一

褚尚書求男論第二

婦人無子論第三

千金翼末子方論第四

交會禁忌第五

男子受胎時日法第六

推支干旺相日法第七

推每月宿日第八

求子服藥須知第九

溫隱居求嗣保生篇第十

胎教門

妊娠總論第一

卷之十

受形論第二

受形篇第三

論胎教第四

孕元立本章第五

凝形殊稟章第六

氣質生成章第七

轉女爲男法第八

卷之十一

候胎門

脈例第一

診婦人有妊娠歌第二

驗胎法第三

胎殺避忘產前將護法第四

食忌論第五

孕婦藥忌歌第六

卷之十二

妊娠門

隨月服藥將息法第一

惡阻方論第二

癥逆不食方論第三

胎動不安方論第四

胎漏下血方論第五

卒然下血方論第六

驚胎及僵仆方論第七

胎上逼方論第八

下如豆汁胎動腹痛方第九

誤服毒藥胎動方第十

心痛方論第十一

心腹痛方論第十二

中惡方論第十三

腰腹背痛方論第十四

小腹痛方論第十五

心腹脹滿方論第十六

卷之十三

妊娠門

數墮胎方論第一

胎不長方論第二

胎不安方論第三

墮胎後血下方論第四

未足月欲產方論第五

斷產方論第六

咳嗽方論第七

吐血衄血方論第八

子煩方論第九

煩躁口乾方論第十

卷之十四

妊娠門

中風方論第一

風症方論第二

癆癰方論第三新附

鬼胎方論第四

傷寒方論第五

時氣方論第六

熱病方論第七

傷寒熱病防損胎方論第八

熱病胎死腹中方論第九
瘡疾方論第十
霍亂方論第十一

卷之十五

妊娠門

泄瀉方論第一

下痢黃水方論第二

大小便不通方論第三

小便不通方論第四

子淋方論第五

遺尿方論第六

大醫門本言女人方 目錄

目錄

十

尿血方論第七

胎水腫滿方論第八

腹內鍾鳴方第九

龍彥德孕癰方第十

不語論第十一

傷食方論第十二

臟燥悲傷方論第十三

卷之十六

坐月門

產寶方周題序第一

將護孕婦論第二

滑胎例第三

月室方位例第四

逐月安產藏衣忌向方位第五

推妊娠行年法第六

體玄子借地法第七

禁草法第八

禁水法第九

入月預備藥物第十

卷之十七

產難門

○太醫門本言女人方 目錄

十一

楊子建十產論第二

催生方論第三

交骨不開產門不閉方論第四新附

郭稽中產難方論第五

產難子死腹中方論第六

產難生死訣第七

卷之十八

產後門

產後將護法第一

調理法第二

通用方論第三

- 胞衣不出方論第四
血量方論第五
顛狂方論第六
狂言譖語方論第七
不語方論第八

卷之十九

產後門

- 乍見鬼神方論第一
心神驚悸方論第二
中風心驚方論第三
中風恍惚方論第四

虛極生風方論第五

虛汗不止方論第六

冒悶汗出方論第七

汗多變症方論第八

口禁腰背久張方論第九

中風方論第十

四肢筋攣方論第十一

瘻癰方論第十二新附

脚氣方論第十三

卷之二十

產後門

遍身疼痛方論第一

腰痛方論第二

惡露不絕方論第三

惡露不下方論第四

惡露上攻心痛方論第五

惡露腹痛方論第六

兒枕腰痛方論第七

小腹痛方論第八

寒疝腹痛方論第九

兩脇脹痛方論第十

積聚癰塊方論第十一

血瘀方論第十二

虛煩方論第十四

餘血奔心煩悶方論第十三

虛煩方論第十四

卷之二十一

產後門

口乾痞悶方論第一

血渴方論第二

乍寒乍熱方論第三

瘡疾方論第四

蓐勞方論第五

虛羸方論第六

風虛勞冷方論第七
腹脹滿悶方論第八
嘔逆不食方論第九
霍亂方論第十

卷之二十二

產後門

寒熱方論第一

頭痛方論第二

咳嗽方論第三

喘促方論第四

口鼻黑鼻衄方論第五

咳噫方論第六

血崩方論第七

月水不調方論第八

月水不通方論第九

四肢浮腫方論第十

腹痛瀉利方論第十一

痢疾及虛羸氣痢方論第十二

卷之二十三

產後門

痢疾作渴方論第一

大便秘滯方論第二

大小便不通方論第三

遺糞方第四

諸淋方論第五

小便頻數方論第六

小便不禁方論第七

小便出血方論第八

陰脫玉門不閉方論第九

陰蝕痺方論第十

乳少或無方論第十一

乳自出方論第十二

妬乳方論第十三

卷之二十四

瘡瘍門

新附

羸唇方論第一

耳聆痛方論第二

瘰癧方論第三

結核方論第四

流注方論第五

血風瘡方論第六

赤白遊風方論第七

橫痃方論第八

鶴膝風方論第九

下注臚瘡方論第十

足跟瘡方論第十一

肺癰方論第十二

腸癰方論第十三

乳癰乳岩方論第十四



太醫院校註婦人良方大全卷之一

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齋薛己校註


建邑書林泗泉余彰德梓

調經門

九醫婦人先湏
調經故以爲首

月經序論第一

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二十七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下天謂天眞之氣癸謂壬癸之水故云天癸也然衝爲血海任主胞胎一脉流通經血漸盈應時而下常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後症相類若被驚怒勞役則血氣錯亂經脈不行多致勞瘵等疾



若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血而瘰疬癰瘍若經益內滲則竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變症百出冗時微若毫成患重如山岳此不畏哉

愚按血者水穀之精氣也和調五臟酒陳六腑在男子則化爲精在婦人上爲乳汁下爲血海故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然詩云婦人和平則樂有子和則陰陽不乖平則氣血不爭故經云平和之氣三百一見可不慎哉

精血篇論第二

齊大夫褚澄遺書

飲食五味養骨髓肌肉毛髮男子爲陽陽中必有陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子爲陰陰中必有陽陽

中之數七故丁七而陰血升二七而陰血溢皆飲食五味之實秀也方其升也智慮開明齒牙更始髮黃者黑筋筋者強暨其溢也凡充身體手足耳目之餘雖針灸之歷無有不下凡子形肖父母者以其精血歸於父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然雖烏牝獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而竭之則太小便牽痛愈痛則愈便愈便則愈婦女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或潰而入骨或變而爲腫後雖合而難升

念多則瀝枯虛人產衆則血枯殺人觀其精血思過半矣
愚按丹溪先生云人受天地之氣以生天之陽氣爲氣地之
陰氣爲血故氣常有餘血常不足夫人之生也男十六歲
而精通女子十四歲而經行故古人必待三十二十而後嫁
娶可見陰氣之難成而養之必欲其固也經曰年至四十陰
氣自半而起衰矣夫陰氣之成止供給得三十年之運用
况男子六十四歲而精絕女子四十九歲而經斷夫腎乃陰
中之陰也主閉藏者肝乃陰中之陽也主疏泄者然而二臟
皆有相火其系上屬于心心火一動則相火翕然而從之所
以丹溪先生只是教人收心養性其旨深矣天地以五行更
迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺如四月屬

己五月屬午爲火大旺火爲肺金之夫火旺則金裏火六月屬
未爲土大旺土爲水之夫土旺則水衰况腎水常藉肺金爲
母以補其不足古人於夏月必獨宿而淡味兢兢業業保養
金水二臟正嫌火土之旺爾經又曰冬藏精者春不病溫十月
屬亥十一月屬子正火氣潛藏必養其本然之裏助來
春生發之氣則春末夏初無頭痛腳軟食少體熱注夏之病
矣竊謂人之少有老態不耐寒暑不勝勞役四時迭病皆因
氣血方長而勞心虧損或精血未滿而早斲喪故見其症難
以名狀若左尺脉虛弱或細數是左腎之真陰不足也用六
味丸右尺脉遲軟或沉細而數欲絕是命門之相火不足也
用八味丸至於兩尺微弱是陰陽俱虛用十補丸此皆滋其

大醫四言婦人良方 卷之三
化源也不可輕用黃耆知母之類，設或六淫外侵而見諸症，亦因其氣內虛而外邪湊襲尤宜用前藥。

附治驗驗見內科摘要

一婦人年三十有七早婚居兩腿骨作痛，晡熱體倦，月經不調，或發寒熱數年矣。一日頸項兩側結核，兩脇脹痛，此係肝經鬱火而成也。先用小柴胡湯合四物數劑，肝症頓愈。又用加味逍遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑，血症漸痊，再用加味歸脾等藥，年餘而安。

一婦婦兩腿作痛，或用除濕化瘀等藥，遍身作痛而無定處，余曰此血症也。不信乃服流氣飲之類，而歿。

一放出宮人年四十餘，臂腿內股作痛，晡熱口乾，月經不調。此

係肝經血少不能養經絡，而然也。宜用加味逍遙散加澤蘭葉五十餘劑，諸症稍緩，又以歸脾湯兼服二十餘劑而痊。一放出宮人臂腿腫痛，內熱，晡熱，寒體倦，咳嗽，胸痞，月經過期，而少，彼以為氣毒流注，服清熱理氣之劑，歷歷余曰此乃肝經瘀血停留所致。蓋肝經上貫鬲布脇肋循喉嚨下循膾，內臟燒陰器抵少腹，舌苔之法，但當補其所不勝而制其所勝，補者脾也，制者肝也。經曰虛則補之，實則瀉之，此定法也。彼不信，仍服前藥，遂致不起。

附方

八味丸

八味丸

十補丸三方丸一十四卷第十一論

太醫司內本草卷之二

卷

四

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

四物湯 方見二十四卷第六論

加味逍遙散

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

產寶方序論第三

大率治病先論其所主，男子調其氣，女子調其血。氣血者人之神也。然婦人以血為基本，苟能謹於調護，則血氣宣行，其神自清。月水如期，血凝成孕。若脾胃虛弱，不能飲食，榮衛不足，月經不行，飢膚黃燥，面無光澤，裏熱腹痛，漏難於子息，或帶下崩漏益不流行，則成瘕症。

愚按前症，若婦人脾胃久虛，以致氣血俱衰，遂而月經不行。

宜補其陽氣，滋其化源。或選中消胃熱津液不足，而致血海乾涸，宜清胃補脾，其經自行矣。經曰：胃者，衛之源；脾者，榮之本。鍼經曰：榮出中焦衛出上焦。衛不足，益之以辛；榮不足，補之以甘。辛相合，脾胃健，而榮衛生。是以氣血俱旺也。或因勞心虛火妄動，月經錯行，宜安心補血，瀉火。此東垣先生治法也。

王子亨方論卷四

論曰：經者常候也。謂候其一身之陰陽愆伏，知其安危。故每月正至，太過不及皆爲不調。陽太過則先期而至，陰不及則後時而來。其有乍多乍少，斷絕不行，崩漏不止，皆由陰陽衰盛所致。愚按《經云》：脾統盈肝藏盈。此症多因恚怒傷肝鬱結，傷脾所

大醫書言女科 卷五
致當從二經爲主而參以前論治之

月水不調方論第五

婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衛任之脉損手太陽少陰之經蓋衛任之脉皆起於胞中爲經絡之海與手太陽小腸手少陰心經爲表裏上爲乳汁下爲月水然月水乃經絡之餘苟能謁構得宜則經應以時矣

愚按經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣先生所謂脾爲生化之源心統諸經之血誠哉是言也竊謂心脾平和則經候如常苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動則月經不調矣又丹溪先生云先期而

至者血熱也後期而至者血虛也愚所謂先期而至者有因脾經血燥有因脾經鬱火有因肝經怒火有因益分有熱有因勞役火動過期而至者有因脾經血虛有因肝經血少有因氣虛脾弱主治之法脾經血燥者加味逍遙散脾經鬱火者歸脾湯肝經怒火者加味小柴胡湯血分有熱者加味四物湯勞役火動者補中益氣湯脾經血虛者人參養榮湯肝經血少者六味地黃丸氣虛血弱者八珍湯蓋血生於脾土故云脾統血凡血病當用苦甘之劑以助陽氣而生陰血也

附治驗

一婦人發熱口乾月經不調兩腿無力或用祛風滲濕之剉腿痛體倦二膝浮腫經事不通余作足三陰經血虛火燥名鶴

勝風用六味八味二丸薰服兩月形體漸健飲食漸進勝腫漸消半載而痊

一婦人月事未期而至發熱自汗或用清熱止汗之劑作渴頭眩手掉身麻余曰此肝經血虛火動火為陽陽盛則生風用柴胡炒芩連山梔歸芍生地丹皮各一錢參芪芩木各一錢五分川芎七分甘草五分二劑汗止更用補中益氣而愈一婦人經行勞役勿休民憒面赤吐痰余曰此乃去血過多陽無所附故耳急飲童便碗許神思漸爽更用參芪各五錢芩歸各三錢玄參柴胡山梔各一錢一劑又用逍遙散加五味麥門二劑如此月餘漸愈但體倦面黃又以十全大補加五味麥門治之而愈

一婦人性善怒產後脣腫內熱或用清熱敗毒散脣口腫脹日晡熱甚月水不調再用降火化瘀遂令食少作嘔大便不實唇出血水又用理氣消導胸膈痞滿頭目不清脣腫經閉又用清胃行血肢體倦怠發熱煩躁涎水湧出又欲用通經之劑余曰病本七情肝脾虧損又數行攻伐故元氣之益虛耳法當補益陽遂以濟生歸脾湯加味逍遙散補中益氣湯調治元氣漸復諸症悉愈

菖蒲散

治療血凝滯肚腹刺痛或腹脹發熱口乾等症

菖蒲

當歸酒拌各蓮木炭

紅花

桂心

川芎

玄胡索炒

牡丹皮各五

右水酒各一半煎服

醋附丸 治元臟虛冷，月候不調，頭眩少食，渾身寒熱，腹中急痛，赤白帶下。心沖氣悶，血中虛寒胎氣不固。用醋煮香附半斤，燒爲末，醋糊丸，桐子大，每服三四十丸，米飲下。
愚按前症若元臟虛寒，手足逆冷，用八味丸，手足發熱，用六味丸。氣血不足，用八珍湯，中氣不足，用補中益氣湯，脾氣不足，用六君子湯。脾氣鬱結，用歸脾湯。若例用香散之劑，恐陽氣燥而陰血漸衰也。

附方

加味逍遙散 八珍湯 歸脾湯三方見二十四卷第四論
加味小柴胡湯方見二十四卷第二論

加味四物湯

六君子湯

補中益氣湯三方見二十四卷第六論

人參養榮湯方見二十四卷第二論
八味丸 六味丸二方見二十四卷第十一論

月經不通方論第六

婦人月水不通，或因醉飽，入房，或因勞役過度，或因吐血失血，傷損肝脾，但滋其化源，其經自通。若小便不利，苦頭眩痛，腰背作痛，足寒，刺痛，久而血結於內，變爲癥瘕。若血水相侮，脾胃虛弱，壅滯不通，變爲水腫。若脾氣衰弱，不能制水，水漬肌肉，變爲腫滿，當益其津液，大補脾胃，方可保生。

愚按經水，陰血也，屬衝任，二脉上為乳汁，下為月水。其為患，有因脾虛，而不能生血者；有因脾鬱而血不行者；有因胃火而血消爍者；有因脾胃損而血少者；有因勞傷心，而血少者。

有因怒傷肝而血少者有因腎水不能生肝而血少者有因肺氣虛不能行血者治療之法若脾虛而不行者清而補之脾胃損而不行者解而補之胃火而不行者調而補之脾鬱而不行者溫而補之勞傷心血而不行者速而補之怒傷肝而不行者和而補之肺氣虛而不行者補之肺經二云損其肺者益其氣損其肝者緩其中損其腎者益其精皆當審而治之

附治驗

一婦久停食飽悶發熱或用人參養胃湯益其甚再用木香楂榔丸泄瀉吐痰腹中成塊飲食少思又用二陳黃連厚朴之類

前症益甚腹脹不食月經不至余以爲胃氣虧損用補中益氣加茯苓半夏三十餘劑脾胃健而諸症愈又二十餘劑而經自行

一婦人飲食後或腹脹或吞酸彼服枳术丸吞酸益甚飲食日少胸膈痞滿腿內酸痛畏寒風寒又服養胃湯一劑腿內作痛又二別腿膝浮腫月經不行余謂鬱結所傷脾虛濕熱下注侵晨用四君二陳芳歸午後以前湯送越鞠丸飲食漸進諸症漸愈又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行

一婦人性沉多慮月經不行胸滿少食或作脹或吞酸余以爲中氣虛寒用補中益氣加砂仁香附煨薑二劑胸膈和而飲食進更以六君加芳歸貝母桔梗生薑太棗數劑脾胃和而

太醫門言卷之三

三

九

九

經自調矣

一婦人素有胃火或用清胃散而安後因勞鍛鍊渴內熱肌肉消瘦月經不行余謂此胃火消爍陰血用逍遙散加丹皮炒梔以清胃熱用八珍湯加茯苓遠志以養脾血而經自行矣
一婦人久患瘡形體怯弱內熱晡熱自汗盜汗飲食少思月事不行或用通經丸虛症悉具余曰此因虛而致瘡因瘡以閉經也用補中益氣及六味地黃丸各百餘劑瘡愈而經自行
一婦人久患瘡瘍作則經不行形虛脉大頭痛懶食大使泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹蓋由久瘡正氣已虛陰火獨旺用補中益氣湯治之尋愈惟不時頭痛乃加蔓荆子而痛止又兼用六味地黃丸而經行

一婦人因勞耳鳴頭痛體倦此元氣不足用補中益氣加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞倦前症益甚月經不行肺熱內熱自汗盜汗用六味地黃丸補中益氣湯頻愈
一婦人胃氣素弱爲哭舟吐血咳嗽發熱盜汗經水三月不行余以爲悲則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣加桔梗昇母知母又用歸脾湯送地黃丸而愈

一癆婦少寐經水兩月餘一至誤服通經丸復轉無寐午前惡寒午後發熱余以爲思慮虧損脾血用歸脾湯作丸午前以六君送下午後以逍遙散送下兩月餘得寐半載經行如期年餘而瘡愈餘詳見各門

附方

太醫門言卷之三

三

九

九

補中益氣

四君子湯

六君子湯 三才集二十
四君處方論

二酉源
成翻毛方見六卷第七論

趙華九
元祐

金匱要略 卷之二十一 方見二十

八珍湯
清胃散 方見二十四卷首論

六味丸

養生必用論病第七

病若榮血虧損不能滋養百骸則髮落面黃羸瘦燥熱燥氣盛
則金受邪金受邪則爲哕爲嗽爲肺癰爲肺痿必矣但助胃壯
氣則榮血生而經自行湏慎飲食調七情保神氣庶可得生若
暴怒氣逆經閉不行當用行氣破血之劑

愚按劉宗厚先生云榮者水穀之精和調於五臟灑陳於六腑乃能入於脉也源源而來化生於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能握足得之而能步臟得之而能滾腑得之而能氣注之於脉少則濶充則實常以飲食滋養則陽生陰長變化而爲血諸經恃此則百脈長養耗竭則百脈空虛可不慎哉若陰氣一傷變症百出妄行於上則吐衄壅油於下則

瘻閉血滲，腸閉則為腸風陰虛陽搏，則為崩中濕蒸熱厥，則為滯下熱極腐化，則為膿血火極似水，則血紫黑，熱勝於陰，發為瘡癰濕滯於血，則為癰瘍癰瘍在上，則善忘甚，之在下，則善狂。

琥珀散 治心膈迷悶，肚腹撮痛，月信不通等疾，

烏藥二兩

當歸酒製一兩

蓬木醋製一兩

右爲末，每服二錢，溫酒調。

萬病丸 治月經瘀閉，臍腹作痛及產後癰瘕等病，

乾漆炒烟出青白爲度

牛膝酒入焙各一兩

右爲末，生地黃汁一升，砂器慢火，熬膏丸，桐子大，每服二十丸，空心米飲下，仍參前論主之。

紅花當歸散 治經候不行，腰脇重痛，小腹堅硬，

紅花

當歸尾半兩

紫葳

牛膝酒製

甘草炙

蘇木錢二

白芷

桂心各一錢半

赤芍藥

炒一兩

劉寄奴去根五分

右爲末，每服三錢，溫酒調。

室女月水不通方論第八

論曰：夫衝任之脈，起於胞內，為經脈之海，手太陽小腸手少陰心二經，為表裏，女子二七而天癸至，腎氣全盛，衝任流通，經血既盈，應時而下，否則不通也。

愚按前症，若稟陰血不足，用四物參，怒傷肝血，用加味逍遙散，鬱結傷脾，用加味歸脾湯，肝火拂鬱，用加味小柴胡湯，胃經積熱，用加味清胃散，餘當參考前論。

附方

四物湯 方見二十四卷第六論

加味道遙散 加味歸脾湯 二方見二十四卷第四卷

加味小柴胡湯 方見二十四卷第二

加味清胃散 方見二十四卷首論

室友經閉成勞方論第九

寇宗奭曰夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血者。若室女童男，積想在心，思慮過度，多致勞損。男子則神色消散，文字則月水先閉，蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭，神色先散，月水先閉且心病則不能養脾，故不嗜食，脾虛則金虧，故發厥腎水絕，則太鬚不榮而四肢乾瘦，故多怒而髮焦筋骨瘦，若五

臟傳遍，則死角能改易心志，用藥扶持庶可保生，切不可用青蒿、黃芩等涼血行血，宜用柏子仁丸澤蘭湯益陰血，制虛火。愚按經云五穀入於胃，其糟粕津液宗氣分爲三隧，故宗氣積于胸中，出於喉嚨，以貫心肺，而行呼吸，榮氣者秘其津液，注之於脈，化以爲血，以榮四末，內養五臟六腑，若服苦寒之劑，復傷胃氣必致不起。

附治驗

一室女年十七，瘻久不愈，天癸未通，發熱咳嗽，飲食少思，欲用通經丸，余曰此蓋因血氣不足，陰血未充故耳，但養氣血，益津液，其經自行，彼感於速効，仍用之，余曰非其治也。此方標悍，之劑大助陽火，陰血得之，則妄行脾胃得之，則愈虛，及久服，

經血妄行飲食愈少遂致不斂

柏子仁丸

柏子仁炒別研牛膝酒

卷柏各半澤蘭葉一兩

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸空心米飲下

澤蘭湯

澤蘭葉二錢當歸

芍藥一錢甘草五分

右水煎服

刲勞散 治勞嗽發熱盜汗肺瘦唾中有紅或成肺痿

白芍藥炒一黃芪炒

甘草炒

人參

五味子炒

半夏薑製

白茯苓

熟地黃自製

阿膠炒

當歸

右薑棗水煎日三服鄉人楊元鼎女及笄病此甚危百藥無

効偶遇名醫得此方服三十餘劑遂愈不察

血枯方論第十

出駱龍吉方

腹中論曰有病胸膈支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此等少時因大脫血或醉而入房虧損腎肝蓋肝藏血受天之氣以爲滋榮其經上貫膈布脇肋若脫血失精肝氣已傷肝血枯涸不榮而胸膈滿妨於食則肝病傳脾而聞腥臊臭出清液若以肝病而肺乘之則嗜血四肢清目眩時時前後血出皆肝病血傷之症也

愚按前症若飲食起居失宜而脾胃虛損當滋化源而佐以燥藥補火內作而津液消燥宜清熱養血若脾胃虧損而氣

血虛宜補中益氣若胃熱消中而血液耗損宜清脾胃之火若大便祕澀小便清利而經不行宜清胞絡之火若勞傷心火血涸而經不行宜補心養血仍參看前第三論主治

附治驗

一婦人久患血崩肢體消瘦飲食到口則聞腥臊口出清液每食少許腹中作脹此血枯之症肺肝脾腃虧損之患用八珍湯烏賊骨丸煎服兩月而經行百餘劑而安

烏賊魚骨丸

烏賊魚骨去甲四兩

蘭茹一兩

右爲末以雀卵丸小豆大每服五丸加至十丸鮑魚煎湯下以飯壓之

熟地黃湯 治大脫血或醉入寒月事不行以致崩漏
熟地黃白製 澤蘭葉 白茯苓 人參
五味子杵炒 附子炮 禹餘粮製 當歸酒炒各五分
右爲末每服三錢水煎空心服

附方

八珍湯方見二十四卷第四論

茯苓補心湯 治婦人心氣虛耗不能至盈又不能制乎肺金氣得以乘乎肝木肝既虧損則血不能藏漸致精血枯涸月事不調此方專補心元之虛抑其肺氣調和榮衛滋養血脉前方參蘇飲內除木香與四物湯對角和每服四錢以薑茶煎溫服此方常進用以治宮娥多効

月水不利方論第十一

婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而風冷客於胞內傷於衝任之脈故也若寸脉弦關脉沉是肝病也兼主腹痛乳竅生瘡尺脉滑血氣實經終不利或尺脉絕不至兼生小腹引腰痛氣攻胸膈也

愚按前症屬肝膽二經蓋肝膽相爲表裏多因恚怒所傷若本經風熱用補肝散血虛用四物加酸棗仁若腎水不足用六味丸若患諸瘡瘍治見第八卷二十四卷

牛膝散 治月水不利腰腹作痛或小腹引腰氣攻胸膈
牛膝酒製 桂心 赤芍藥炒 桃仁去皮尖
玄胡索炒當歸酒浸 牡丹皮略一木香三錢

右爲末每服一錢溫酒調下或每服三五錢水煎

附方

補肝散方見七卷第十一論

四物湯方見二十四卷第六論

六味丸方見二十四卷第十一論

月水行止腹痛方論第十二

婦人經來腹痛由風冷客於胞絡衝任或傷手太陽少陰經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂憇氣鬱而血滯用桂枝桃仁湯地黃通經丸若血結而成塊用萬病丸

愚按前症若風寒傷脾者六君加炮薑思慮傷益者四物加參木思慮傷氣者歸脾加柴施鬱怒傷益者歸脾逍遙無服

餘叅前後論治之

附治驗

一婦人經行腹痛食餌嘔吐肢體倦怠發熱口渴此乃素羸氣血不足用八珍湯二十餘劑而愈後生子二年而經不行前症仍作服八珍湯逍遙散百餘劑方愈

地黃通經丸

治月經不行或產後惡露臍腹作痛

熟地黃

自製
四兩
蜜蠟去頭
翅膀炒

水蛭

林米同炒

桃仁

去皮尖各五十枚

右爲末蜜丸桐子大每服五七丸空心溫酒下

萬病丸

方見前

溫經湯

治寒風客於血室以致血氣凝滯腹作痛其脉沉緊

當歸

川芎

芍藥

桂心

蓬木

醋炒

牡丹皮各五分

人參

牛膝

酒炒

甘草

炒各三分

右水煎服

桂枝桃仁湯 治經脈頓然不行腹中作痛或上攻心胸欲死或因經脈不行漸成積塊臍下如覆杯

桂枝

芍藥

生地黃

錢各二

桃仁

七枚去皮尖

甘草

錢一

右薑水煎

若因七情鬱結血隨氣滯者宜服此湯如不瘥用地黃通經丸已成血塊者用萬病丸

方見前

愚按前症若肝經怒氣用加味道遙散若肝經血虛用四物參木柴胡牡丹皮若肝經血熱用四物牡丹皮若肝腎虛火用六味地黃丸若肝脾血虛用八珍加牡丹皮若肝脾鬱怒

用加味歸脾湯若氣虛血弱用補中益氣湯若脾不能運血
用六君子加川芎當歸若肝虛不能藏血用補肝散

附方

六君子湯

四物湯二方見二 · 四卷第六論

歸脾湯

逍遙散

八珍湯三方見二十四卷第四論

月水不斷方論第十三

婦人月水不斷淋瀝腹痛或因勞損氣血而傷衝任或因經行
而令陰陽以致外邪客於胞內滯於血海故也但調養元氣而
病邪自愈若攻其邪則元氣反傷矣

愚按前症若鬱結傷脾用歸脾湯憲怒傷肝逍遙散肝火妄
動加味四物湯脾氣虛弱六君子湯元氣下陷補中益氣湯

熱傷元氣煎湯加五味麥門炒黑黃柏

附治驗

儒者錢思吾子室年三十餘無嗣月經淋瀝無期夫婦異處
幾年矣思吾欲爲娶妾以謀諸余念此鬱怒傷肝脾虛火
動而血不歸經乃肝不能藏脾不能稱也當清肝火補脾氣
遂與加味歸脾逍遙二藥四劑送至其家仍告其姑曰服此
病自愈而當受胎妾可無娶也果病愈次生生子

一婦人性急每怒非大陽耳項喉齒胸乳作痛則胸滿吞酸吐
瀉少食經行不止此皆肝火之症肝自病則外症見土受冠
則內症作余先以四物加白朮茱萸柴胡炒梔炒龍膽清肺
養血次用四君加柴胡芍藥神曲吳茱萸炒黃連以培土制

肺漸愈惟月經不止是血分有熱脾氣尚虛以逍遙散信
白朮茯苓陳皮又以補中益氣加酒炒芍藥兼服而安
一婦久多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體倦瘦口乾內熱
盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣用參芪
歸木茯神遠志棗仁麥門五味丹皮龍眼肉炙草柴胡升麻
治之獲痊

一婦人懷抱不舒腹脹少寐飲食素少痰涎上湧月經頻數余
曰脾統血而主涎此鬱悶傷脾不能攝血歸源耳用補中益
氣濟生歸脾而愈

附方

歸脾湯 逍遙散 二方見二十四卷第四論

加味四物湯 四君子湯 六五子湯

補中益氣湯 四方見二十四卷第六論

婦人殺血心痛方論第十四

婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產失
血過多而心痛甚者亦然用烏賊魚骨炒爲末醋湯調下失笑
散亦効

愚按前症若陰血耗散用烏賊丸收斂之若瘀血不散用朱
笑散行散之若心血虛弱用芎歸湯補養之若鬱結傷血用
歸脾湯調補之

附治驗

一婦人血崩無心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛症悉具面色

本草綱目 卷之二十一
瘞黃余曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛宜用十全大補湯參米倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

附方

失笑散 方見二十卷第五論 芳歸湯 方見十七卷第四論

歸脾湯 十全大補湯 二方見二十四卷第四論

黑崩下血不止方論第十五

婦人衝任二脈爲經脈之海外循經絡內榮臟腑若陰陽和平經下依時若勞傷不能約制則忽然暴下其則昏悶若寸脉微搏爲寒在上焦則吐血衄血尺脉微遲爲寒在下焦則崩血便血大抵數小為順洪大爲逆太法當調補脾胃爲主

愚按經云陰虛陽搏謂之崩又云陽絡傷則血外溢陰絡傷

則血內溢又云脾統血肝藏血治法前症因脾胃虧損不能攝血歸源用六君加芍歸柴胡若肝經之火而血下行用竅效四物湯或四物加柴梔芩术若肝經風熱而血妄行用加味消遙散或小柴胡梔芍丹皮若怒動肝火而血沸騰亦用前藥若脾經鬱結而血不歸經用歸脾加柴梔丹皮若非傷胞絡而血下崩用四君加柴梔升麻故東垣先生云凡下血症須用四君子以收功厥有旨哉若大吐血母以脉論當急用獨參湯救之若潮熱咳嗽脉數乃元氣虛弱假熱之脉尤當用入參溫補此等症候無不由脾胃先損故脉洪大察其有胃氣能受補則可救苟用寒涼止血之藥復傷脾胃反不能補血歸源是速其危也

附治驗

大尹王天成之內父患崩，自服四物涼血之劑，或作或徹。因怒發熱其血不正，服前藥不應，乃主降火，更加胸腹大痛，手俱冷。余曰：此脾胃虛寒所致，先用附子理中湯，體熱痛止。又用濟生歸脾補中益氣二湯，崩血頓愈。若泥瘤無補法，則誤矣。錦衣楊求興之內患崩症，過服寒涼之劑，其症益甚，更加肚腹痞悶，飲食不入，發熱煩躁，脈洪大而虛。余曰：此脾經氣血虛，而發躁也。當急用八珍湯加炮薑以溫補之，緩則不效，不信，乃服止血降火之劑，虛症蜂起，始信。余言緩不及治矣。一婦人面黃，或赤覺腰間或脇下作痛，四肢困倦，煩熱不安，經行先發寒熱，兩肋如束，血湧如崩。此脾胃虧損，元氣下陷，与

相火濕熱所致，用補中益氣加防風芍藥炒黑，黃柏間以歸脾湯調補，而血始歸經。

一婦人因怒崩益久，不已面青黃，而或赤。此肝木制脾土而血虛，用小柴胡合四物清肝火，生肝血，又用歸脾補中二湯，益脾氣，生肝血而瘥。此症若因肝經風熱而血不寧者，防風爲丸，以兼症之藥煎送，或肝經火動而血不寧者，炒條芩爲丸，以兼症之藥煎送。若瘀血為患，用五靈脂爲末，燒鐵器燙酒調服，無不効者。

奇効四物湯 治肝經虛熱血沸騰而崩又不正。

當歸

拌酒

熟地黃

自製

白芍藥

炒各等分

阿膠

炒

艾葉

炒

川芎

右每服四錢水煎

治血崩血瘕或經行產後心腹脇痛五靈脂炒烟盡爲末每服一錢溫酒調或用三錢水酒童便煎服

治風熱血崩荆芥穗燈火燒焦爲末每服三錢童便調獨聖散 治肝經有風血崩用防風去叉蘆爲末每服二錢空心

食前酒煮白麵清飲調下極驗

神應散 治血虛內熱血不歸源而崩用桂心燒存性爲末每服一錢米飲調下

又方陳槐花一兩百草霜半兩爲末每服一錢燒紅粃錙碎酒下

附方

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

四物湯

四方見二十四卷第六論

歸脾湯

加味道逍遙散

八珍湯

三方見二十四卷

小柴胡湯

方見二十四卷

獨參湯

方見三卷

附子理中湯

方見二十卷

第八論

帶下方論第十六

婦人帶下其名有五因經行產後風邪入胞門傳於臟腑而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷足少陰腎經黑如衃血又有帶脉橫於腰間如束帶之狀病生於此故名帶愚按徐用誠先生云前症白屬氣而赤屬血東垣先生云血崩久則亡陽故白滑之物下流未必全拘於帶脉亦有濕瘀

流注下焦或腎肝陰淫之濕勝或因驚恐而木乘土位濁液下流或思慕爲筋痿戴人以六脉滑大有力用宣導之法此瀉其實也東垣以脈微細沉緊或洪大而虛用補陽調經乃兼責其虛也丹溪用海石南星椿根皮之類乃治其濕痰也竊謂前症者當壯脾胃升陽氣爲主佐以各經見症之藥色青者屬肝用小柴胡加山梔防風濕熱壅滯小便赤澀用龍膽瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱用六味丸色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香散等藥色白者屬肺用補中益氣加山梔色黃者屬脾用六君子加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬腎用六味丸氣血俱虛八珍湯陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏薑半夏薑水黃

一婦氣虛痰飲下注四七湯送六味丸不可拘肥人多痰瘦人多火而以燥濕瀉火之藥輕治之也

附治驗

一婦婦腹脹腸痛內熱晡熱月經不調肢體痠麻不時吐痰或用清氣化痰喉間不利帶下青黃腹脹膈脹又用行氣之劑胸膈不利肢體如麻此乃鬱怒傷脾肝脾同用歸脾湯以解脾鬱生脾氣久用加味道逍散以生肝血清肝火百餘劑愈一婦人久瘡癰癧發熱口乾體倦用七味白朮散加麥門五味太劑煎與恣飲再發稍可乃用補中益氣加茯苓半夏薑水黃劑而愈

一婦人頭暈吐痰胸滿氣喘得食稍緩苦於白帶二十餘年矣

諸藥不順此氣虛而痰飲也痰飲愈而帶自愈遂朝用六君子湯夕用六味地黃丸不月而驗

一婦人耳鳴胸痞內熱口乾喉中若有二核吞吐不利月經不調兼之帶下余以為肝脾鬱結用歸脾湯加半夏山梔升麻柴胡間以四七湯下白丸子而愈

一婦人吞酸飽滿食少便泄月經不調服清氣化痰丸兩膝漸腫寒熱往來帶下黃白面瘦體倦此脾胃俱虛濕痰下注用補中益氣倍用參术加茯苓半夏炮薑而愈

一婦人帶下四肢無力余曰四肢者土也此脾胃虛弱濕痰下注以補中益氣濟生歸脾二藥治之而愈

一婦人帶下黃白怒則胸膈不利飲食少思或用消導利氣之藥瘀喘胸滿大便下血余曰此因脾氣虧損不能攝血歸源用補中益氣加茯苓半夏炮薑四劑諸症頓減又用八珍加柴胡山梔而痊

附方

小柴胡湯方見二十四卷第二論

龍膽瀉肝湯方見二十四卷第八論

六味丸方見二十四卷第十一論

妙香散方見三卷第十三論

補中益氣湯六君子湯一方見二十四卷第六論

歸脾湯八珍湯

七味白朮散三方見二十一卷第六論加味逍遙散

白丸子方見三卷第四論

四七湯方八十二卷第七論

崩中漏血生死脉論第十七

婦人崩中漏下之症已見前論按其寸口脉弦而大弦則爲緊大則疾疾急緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏其脉爲牢婦人半產漏下赤白不止脉小虛滑者生脉太緊實數者死又脉急疾者死遲者生又云尺寸脉虛者漏血脉浮者俱不治

愚按前症闡內經微言濟無窮天札須固胃爲善蓋胃爲五臟之本源人身之根蒂所用治法當參前後論

附治驗

一婦人年將七十素有肝脾之症每作則飲食不進或胸膈不

利或中脘作痛或大便作瀉或小便不利余用逍遙散加山梔茯神遠志木香而愈後憂女婿居不時吐紫血其病每作尤倦怠而後發熱經曰積憂傷肺積思傷脾肺脾受傷舉是念子母俱病不能攝血歸經而致前症遂以前藥加炒黑黃連三分吳茱萸二分頓愈復因怒吐赤血甚多躁渴垂死此血脫也法當補氣乃用人參一兩芩术當歸各三錢陳皮炮黑荳蔻各二錢炙草木香各一錢一劑頓止

一婦人年六十有四久鬱怒頭痛寒熱春間乳內時痛服流氣飲之類益甚不寐有血如經行又因大驚恐飲食不進夜寐不寧此因高年去血過多至春無以生發肝木血虛火燥所以至熱熱則發赤經云肝藏冤冤無所附故不能寐先以

逍遙散 酒炒黑龍膽草一錢山梔一錢五分二劑腫痛頓退又二劑而全消再用歸脾湯加炒梔貝母諸症悉愈
表弟方健甫內五十歲辛丑患血崩諸藥罔効壬寅八月身熱體痛頭暈涕出吐痰少食衆作火治展轉發熱絕粒數日余診之曰脾胃久虛過服寒藥中病未已寒病復起遂用八味丸料一服翌早遂索粥數匙再服食倍熱減止乃服八味丸而愈癸卯秋因勞役憂怒甲辰夏病復作胸飽發熱脊痛腰疼神氣憊憊或作內傷或作中暑崩血便血煩渴引飲粒米不進昏憊時作脈洪大按之微弱此無根之火內虛寒而外假熱也以十全大補加附子一劑遂食粥三四匙崩血漸減丁服八味丸始得全愈備見文
科根要

柏葉散 治元氣虛弱崩中漏血年久不愈亦治白帶

柏葉炒

續斷酒

川芎

當歸

生地黃

鱉甲炙

龜甲炙

禹餘糧

各一兩五錢

阿膠炙

赤石脂煅

艾葉炒

牡蠣煅

地榆

鹿茸炙

右爲末每服一錢粥飲調下

地黃丸 治足三陰虧損經行數日不止或兼帶下無子

熟地黃

自製

山茱萸肉

蕷黃仁

各一兩

乾蕷炮三錢

白芍藥

炒各一兩

白殼桑

炒各一兩

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸空心溫酒日三服

許學士

云凡婦人有白帶多致不產育宜速治之故扁鵲過荆鄖聞

婦人此病遂自鳴帶下醫以就治之

白芷散

治下元虛弱赤白帶下或經行不止等症

白芷

一
兩

海螵蛸

二枚

胎髮

一團

右為末每服一錢溫酒調下

附方

東垣益胃升陽湯

治血脫

當益其氣蓋先補胃氣以助生發

之氣故曰陽生陰長諸其藥為之先務舉世皆以爲補氣殊不知其能生血此陽生陰長之理故先理胃氣則血歸於脾矣故曰脾統血

東垣升麻除濕湯

二方見二十卷第九論

東垣升陽益胃湯

治肺脾胃虛怠惰嗜卧四肢不收身體沉重口乾食無味六便不調小便頻數食少食不消酒漸惡寒

而或得熱崩帶不正

方見三卷第十三論

十全大補湯

逍遙散

歸脾湯三方見二十四卷第四論

八味丸

方見二十四卷第十一論

婦人白濁白淫方論第十八

婦人小便白濁白澑由心腎不交水火不濟用金鎖正元丹若心虛而致用平補正心丹降心舟威喜丸若思慮傷脾用四七湯吞白丸子更以烏沉湯加茯苓益智

愚按前症若元氣下陷用補中益氣湯脾胃虧損六君加升麻柴胡脾經鬱結歸脾加黃柏山梔肝經怒火龍膽瀉肝湯

血脈內詳

逍遙散宜與帶下參看主治

附治

一婦人善怒或小腹痞悶或寒熱往來或小便頻數時下白澑藥久不愈面青口苦余以爲積憤而不能發散所致用龍膽瀉肝湯而愈用加味道逍遙散八珍湯而安

鎖精丸

治下元虛弱小便白濁或白帶淋濺小便頻數

破故紙炒

青鹽

白茯苓去皮

五味子炒等

五味子炒等

龍骨煅

桑螵蛸酒

白石脂煅各

固精丸 治胞氣虛寒小便白濁或小便無度等症

牡蠣煅

兔絲子酒浸蒸炒

韭子炒

龍骨煅

右爲末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯或酒下

五味子炒 白茯苓去皮

桑螵蛸酒

白石脂煅各

右爲末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯下

附方

補中益氣湯

六君子湯二方見二十四卷第六論

龍膽瀉肝湯 方見二十四卷第八論

歸脾湯 方見二十四卷第四論

婦人天癸過期方論第十九

許學士云婦人經脈過期不及腰腹疼痛或七七數盡而月經下老宜用當歸散治之

愚按前症若肝腎虛熱用當歸散肝血虛熱四物加柴梔丹皮肝火內動小柴胡加山梔丹皮肝火血燥加味道逍遙散脾經鬱火加味歸脾湯肝脾鬱火歸脾逍遙散服肝腎虧損歸脾六味仍與前後月經不調治驗同用

一婦人年五十內熱晡熱經水兩三月一至此血虛有熱用逍
遙散加山茱萸治之而愈後有痰作渴或小便不調或頭暉
白帶用六味丸而安

當歸散

當歸

洗酒

川芎

白芍藥炒

黃芩炒

白朮

炒各半兩

山茱萸肉

一兩半

右爲末每服二錢酒調日三服氣虛去寒加桂心一兩

附方

四物湯方見二十四卷第六論

小柴胡湯方見二十四卷第二論

加味逍遙散 加味歸脾湯

方見二十四卷第十四論

六味丸

方見二十四卷第十一論

婦人血分水分腫滿方論第二十

婦人經水不通則化爲血血不通則復化爲水故先因經水斷絕後四肢浮腫致小便不通名曰血分宜用椒仁丸若先因小便不通後身面浮腫致經水不通名曰水分宜用葶藶丸經脉不通而化爲水流走四肢悉皆腫滿亦名血分其症與水症相似實非水也用入參丸

愚按前症或因飲食起居失養或因七情失宜以致脾胃虛損不能生發統攝氣血垂羸行失常道若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化爲水名曰血分宜用椒仁丸

丸治之若尤小便不利後至身面浮腫經水不通水化為血
名曰水分宜用葶苈丸治之此屬形氣不足邪淫隧道必用
此藥以宣導其邪而佐以補輔元氣之劑庶使藥力有所仗
而行則邪自不能容而真氣亦不至於復傷矣大凡月水不
通凝結於內久而變爲血瘕血水相并亦爲水腫

附治驗

一婦人月經不調晡熱內熱飲食少思肌體消瘦小便頻數或
用濟陰丸月經不行四肢浮腫小便不通余曰此水分也朝
用柏仁丸夕用歸脾湯漸愈服入參丸兩月而愈仍專用歸
脾湯五十餘劑而平

二婦人面白浮腫月經不通此水分也朝用葶苈丸夕用歸脾

湯漸愈更用入參丸兼服而全愈

三婦人素性急先因飲食難化月水不調或用理化瘀藥反肿
腹膨脹大便泄瀉又加烏藥蓬朮肚腹腫脹小便不利加猪
苓澤瀉藜喘氣急手足厥冷頭面肢體腫脹指按成窟脉沉
細右寸尤甚余曰此肺脾虛冷不能通調水道下輸膀胱滲
泄之令不行生化之氣不運東垣云水飲留積若土在兩中
則爲泥矣得和氣暖自水濕去而陽化自然萬物生長喜其
脉相應遂與金匱加減腎氣丸料服之小便即通數劑腫脹
消半四肢漸溫自能轉側又與六君加木香肉桂炮薑治之
全愈後不戒七情不節飲食頓作泄瀉仍用前藥加附子五
分而安

太醫院校註婦人良方卷之一 終

太醫院校註婦人良方一卷

三十一

