



婦人良方卷之十三一十五

特別  
1087  
5



49  
1087  
5



校註婦人良方大全卷之十二

江右臨川陳自明良甫編

大醫院使立齋薛已校註

建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠疾病門胎後已明須知三娘

妊娠諸病忌毒藥餘當對症依法治之

妊娠隨月服藥折息法第一

千金云妊娠一月名始胎飲食精熟酸美受御宜食木麥母食  
腥辛是謂纒正足月足厥陰脈養不可針灸其經此經內屬於  
肝肝主筋血一月之內血行否否者下少為力事寢必安靜毋令恐  
再凡一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉至胎腹痛腹滿



胞急卒有所下當預安之宜服烏雄雞湯

烏雄雞湯方

烏雄雞一隻治如食法

吳茱萸兩一

茯苓

阿膠各二兩

生薑

甘草各一兩

人參

芍藥

白木各三兩

麥門冬五合去心

右以水一斗二升煮雞取汁六升下藥煮取三升內酒三升

并膠等取汁三升分三服

補胎湯 若曾傷二月胎者當預服此藥

細辛兩一

防風兩二

烏梅升一

吳茱萸

土地黃

白木各一兩

大麥合五

生薑兩四

右以水七升煮取汁二升半分三服寒多倍細辛茱萸熟多

去甲 羊菜萸加括囊根二兩有所思去太麥加栝子仁三合

一方有入參一兩忌生菜蕪蕪桃李雀肉等物

妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經此經內屬於膽膽主精

是時兒精成於胞裡當謹護勿驚動况二月始陰陽踞經有寒

不成有熱即萎卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛

卒有所下乍寒乍熱艾葉湯主之

艾葉湯方

丹參三兩

人參

麻黃去節

艾葉

阿膠各二兩

甘草一兩

大棗十二枚

生薑六兩

右以酒三升水一斗內藥煮減平去滓內膠煎取三升分三

服忌海藻菘菜

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此藥

黃連

人參各一兩

吳茱萸各五合

生地黃兩

生薑三兩

右以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日作一劑若覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水忌猪肉冷水蘆薈二方加當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美數視璧玉欲子賢良端正清虛是謂外象而內感者也是月手心主脈養不可鍼灸其經此經內屬於心母悲哀思慮驚動蓋二月為定形有寒則大便清有熱則小便難不赤即黃卒驚恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脈腹滿繞臍苦痛腰痛卒有所下宜服雄鷄湯

雄鷄湯方

雄鷄一隻治如食法

甘草炙

茯苓

人參

阿膠兩各二兩炒

黃芩

白朮各一兩

芍藥兩

交門冬五合去心

大棗十二枚擘

生薑一兩切

右以水一斗五升煮鷄臠平內藥煮取一半入清酒三升并膠再煎取三升分三服日飲盡忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等一方有當歸川芎二兩無黃芩生薑

扶神湯

若曾傷三月胎者當預服此藥

扶神

丹參

龍骨各一兩

阿膠炒

當歸

甘草炙

人參各二兩

赤小豆

大棗十一枚擘

右酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一劑服加桑寄生

生二兩深師方有薤白二兩麻子一升忌同前  
 雄娠四月以受水精始成血脈其食稻稗其羹魚鴈是謂成血  
 氣以通耳且而行經絡是月手少陽脈養不可針灸其經此經  
 內輸三焦其時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食蓋四月  
 為離經有寒心下溫溫欲嘔胸滿不食小便如淋臍下苦急卒  
 中風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛或時胎上胸煩  
 不安卒有所下宜服菊花湯主之

菊花湯方

- 菊花 如鷄子 大一枚
- 麥門冬 去心 一升
- 麻黃 去節
- 阿膠 炙 各二兩
- 生薑 兩五
- 甘草 炙
- 當歸
- 半夏 洗 各兩
- 人參 兩五 錢一
- 大棗 十二枚 擘

右以水八升煮減一半內清酒三升并阿膠煎取三升分三  
 服溫卧當汗以粉撲之獲風寒四五日忌食如前

調中湯

- 芍藥 兩四
- 甘草 炙
- 芫蕪
- 續斷 各一兩
- 柴胡
- 白朮 各三兩
- 烏梅 升一
- 李根白皮 三兩
- 當歸 一兩 五錢
- 生薑 兩四
- 厚朴 炙
- 枳實 炙 各兩

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一今日每服一劑  
 方有半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉  
 雄娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚其衣  
 裳期吸天光以避寒殃其食稻麥菘菜牛羊和菜萹調以五味  
 是謂養氣以定五臟是月足太陽脈養不可鍼灸其經此經內

輸於脾其時兒四肢成無大熱無吐無食乾燥無目多熱無  
 大勞倦蓋五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒則腹滿  
 痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛頓欲仆  
 卒有所下宜服阿膠湯又名旋覆花湯主之

阿膠湯方

阿膠炙四兩 人參兩一 麥門冬去心一升 生薑兩六

吳茱萸合七 旋覆花 當歸 芍藥

甘草炙 黃芩各二

右以水九升煮取三升內清酒三升并阿膠微火煎取三升  
 半分四服日三夜一先食後服便愈不差更服忌海藻菘菜  
 安中湯 若曾傷五月胎者當預服此方

甘草炙 芍藥各三 當歸 人參

生地黃 芎藭各二 五味子合五 生薑兩六

麥門冬去心一升 大麻仁合五 大棗三十五枚 黃芩兩一

右以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日  
 再服一劑忌如前

安胎當歸湯 若妊娠五月舉動愕胎不安小腹引腰脇小  
 便下血

當歸 阿膠炒 芎藭 人參各一

大棗十二枚 艾把一

右以酒水各三升煮至二升去滓內膠令烊分三服一升為  
 甘草無參棗

妊娠六月始受金精以成筋，欲微勞無得靜處，山遊於野，數  
 觀走犬走馬，食忌鷲鳥猛獸之肉，是謂變膜理筋，以養其力。  
 以堅背脊，是月足陽明脈，養不可針灸其經，此經內屬於胃，主  
 其口目，蓋六月之時，兒口自皆成，調五味食甘美，毋大飽，六月  
 卒有所動，不安寒熱，往來腹內脹滿，體腫驚怖，忽有所下，腹痛  
 如欲產，手足煩疼，宜服麥門冬湯。

麥門冬湯方

麥門冬去心 一升

甘草炙

人參各一

生地黃三

黃芩二

阿膠炒 四兩

生薑六

大棗十五

右以水七升，煮減半，內清酒二升，并膠煎取三升，分三服，如  
 人行三四里，進糜粥，忌海藻、菘菜、蕪荑。

柴胡湯 若曾傷六月胎者，當預服之

柴胡四

芍藥一方

白朮

甘草炙 各二兩

麥門冬三

去心 旋覆花一

芎藭二

生地黃五

生薑六

大棗三十

右以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一，仍進糜粥，七日更  
 服。一劑忌海藻、菘菜、蕪荑、桃李、雀肉等。一方有黃芩二兩。

旋覆花湯亦名集驗療妊娠六七月胎不安常處

旋覆花兩

厚朴製

白朮

枳殼

黃芩炒

茯苓各三

半夏炒 一兩

生薑各二

右以水一斗，煮取二升，半先食，分五服，日三夜二，忌羊肉、錫  
 醋、桃李、雀肉等，千金同。

大醫醫婦人良方 十一  
妊娠七月始受水精以成骨，筋骨強，肢無使定止，黃作屈伸，以運血氣，自此後居處必節飲食，避寒暑，令稊稻以密膝理，是謂養骨而堅齒。是月手太陰脈養，不可鍼灸其經，此經內屬於肺，主皮毛，是時兒皮毛已成，無木言無號哭，無薄衣，無洗浴，無寒飲，若忽驚恐，搖動腹痛，卒有汗，手足厥陰脈若傷，寒煩熱，腹滿，短氣，常苦頸項腰背強，宜服葱白湯。

葱白湯方

葱白十五枚 半夏細切 麥門冬去心 人參一兩  
生薑八兩 甘草炙 當歸 黃芪炒各三兩  
阿膠炒四兩 黃芩兩 旋覆花一兩  
右以水八升，煮減至內清酒三升，并膠煎取四升，溫服一升。

日三夜一，溫卧當汗出，無汗加麻黃二兩，秋後勿強汗，忌等肉錫、海藻、松菜等。

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服

杏仁去雙仁皮火碎 甘草炙 鐘乳研 麥門冬去心

吳茱萸各一分 五味子 粳米各五合 紫苑一兩

右以水八升，煮取三升半，分四服，日三夜一，七日服，一劑忌海藻、松菜。

妊娠八月始受土精，以成膚革，和心靜息，無使氣極，是謂周密。膝理光澤，顏色是月手陽明脈養，不可針灸其經，此經內屬於大腸，大腸主九竅，是時兒九竅皆成，無食燥物，無輒失食，無忍大氣，若中風寒有所犯觸身，宜避寒作熱，胎動不安，若頭



眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或寒慄腰背苦  
冷痛而目視茫茫宜服芍藥湯

芍藥湯方

芍藥 四錢

人參

當歸

甘草 炙各二兩

白朮 一兩

厚朴 二兩 製

薤白 一升 切

生薑 四兩 切

右以水五升酒四升煮取三升分四服日三夜一忌海藻松

菜桃李雀肉等類

葵子湯 若胃傷八月胎者當預服

甘草 炙

柴胡

白朮 各二兩

厚朴 薑製 二兩 炒

芍藥

葵子 一升

生薑 六兩

大棗 二十枚 擘

右以水九升煮取三升分四服日三夜一 日服三劑忌猪肉

冷水葢莢桃李雀肉酢物等類

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘  
緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力是月足少陰脉所養不  
可針灸其經此經內屬於腎主續縷皆成無處温冷無氣可灸  
本若卒下痢腹滿懸急上衝腰背痛不可轉側短氣宜服半夏  
半夏湯方

半夏 五合 泡炒

麥門冬 五合 去心

乾薑 一兩 炮

當歸

吳茱萸

阿膠 三兩 炙

大棗 十二枚 擘

右以水九升煮取三升去粗內白蜜八合微火温分四服痢即

止忌生血物錫

清腎湯 若胃傷九月胎者當預服

猪腎具一

茯苓

桑寄生

乾薑炮

生地黃

芎藭各三

白朮四

麥門冬一升

附子大者一枚

右以水一斗煮猪腎熟去之內諸藥煎三升半分四服日三

夜一十日更一劑忌猪肉燕蕪桃李雀肉酢物

妊娠十月五臟俱備六腑通納天地氣於丹田故使關節人事皆備但俟時而生

愚按妊娠所禁之法皆傳自上古當永為遵守其方藥用須斟酌

芎藭補中湯 治懷孕血氣不能榮養以致半產子嘗治一妊

娠不足月而損墜服此藥遂安

乾薑煨

阿膠炒

芎藭

五味子各五分

黃芪炒

當歸

白朮

杜仲炒

白芍藥各

木香

人參

甘草各五分

右水煎服

妊娠惡阻方論第二

妊娠惡阻病產寶謂之子病巢氏病源謂之惡阻由胃氣怯弱中脘停痰脉息和順但肢體沉重頭眩擇食惟嗜酸醎甚者寒熱嘔吐胸膈煩滿半夏茯苓主之

愚按前症若中脘停痰用二陳湯加枳殼若飲食停滯用六

君子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘

皮湯兼氣惱加枳殼胸脇痞悶再加蘇梗便脇痛再加柴胡若

飲食少思用六君子加紫蘇梗頭暈體倦用六君子湯若

脾胃虛弱嘔吐不食用半茯苓湯蓋半夏乃健脾胃氣化痰滯  
之主藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安  
必用茯苓半夏湯倍加白朮然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善  
能安胎氣健脾胃子常用驗矣

附治驗

一妊娠嘔吐惡食體倦嗜臥此胃氣虛而惡阻也用入參橘皮  
湯二劑漸愈又用六君加紫蘇二劑而安  
一妊娠吞酸惡心時欲作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六君  
加枳殼香附治之而愈  
一妊娠停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食余以為飲食停滯兼肝  
木傷脾土用六君子湯以健脾胃加蒼朮厚朴以消飲食吳

茱萸所製黃連以清肝火諸症悉愈又以六君加砂仁調理  
而脾土乃安

白朮湯 治胃虛惡阻吐水甚至十餘日粥漿不入

白朮錢炒一 人參分五 丁香 甘草炒各二分

右薑水煎服

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水飲食少思肢體倦怠

人參 橘紅 白朮炒 麥門冬去心

白茯苓錢各一 厚朴製 甘草炙五分

右加竹茹薑水煎服

保生湯 治妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參錢一 甘草炒 白朮炒 香附

烏梅

橘紅各五

右薑朮煎服

安胎湯

治體倦惡食或胎動腹痛或下血發熱

甘草炒

茯苓

當歸

熟地黃製

川芎

白朮炒

羌活炒

白芍藥炒

半夏湯

阿膠切

地榆各五

右薑水煎服

又方縮砂仁為末每服二錢薑湯或米飲調下

附方

二陳湯方見二十四卷第五論

六君子湯方見二十四卷第六論

異功散方見二十二卷第三論

半夏茯苓湯方見後

妊娠痰逆不食方論第三

妊娠嘔逆者乃水飲停積為痰輕者妨食嘔逆甚者腹痛傷胎皆由胃氣不健或風冷外乘所致也

愚按前症因食停滯用半夏茯苓湯加枳殼蕪氣惱更加柴胡因痰壅滯用半夏茯苓湯加白朮因風寒外傷用參蘇飲飲食腹脹用香砂六君子湯寒熱嘔吐人參養胃湯

附治驗

一妊婦嘔吐脇脹或寒熱往來兩巴青黃此木旺而剋脾土用六君子加柴胡枳椶枳殼而安

一 妊婦嘔吐酸水胸滿不食此理上虛而肝木所侮用六君子  
 加芍藥而愈又用四君子加枳殼桔梗而安  
 一 妊婦胸腹膨脹吐痰不食此脾胃虛而飲食為痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因  
 恚怒脇脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山梔而愈  
 半夏茯苓湯 治妊婦脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止  
 半夏炮炒 陳皮各一錢 白茯苓二錢  
 砂仁炒一錢 甘草分五  
 右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸  
 茯苓丸 治妊婦煩悶頭暈聞食吐逆或腦腹痞悶  
 赤茯苓 人參 桂心 乾薑炮

半夏泡洗 橘紅各一兩 白朮炒 葛根  
 甘草炒 枳殼炒各  
 右為末蜜丸桐子大每服五十九丸米飲下日三服  
 四七湯 方見十一卷第七論  
 附方  
 參蘇飲 方見六卷第十三論  
 六君子湯 四君子湯  
 香砂六君子湯 三方見二十四卷第六論  
 人參養胃湯 方見八卷第十八論

**胎動不安方論第四**

一 妊婦胎動或飲食起居或衝任屋突或跌仆擊觸或怒傷肝火

或解氣... 當各推其因而治之... 若因胎動而母病唯當安其胎... 若面赤舌青是兒死也面青舌赤吐沫是母死也唇口色青兩邊沫出是子母俱死也察而治之

愚按前症胎氣鬱滯者用蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加蘇殼鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔鬱怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝腐化之

附治驗

一姪婦內熱晡熱或蕪寒熱飲食少思其胎或下墜或上攻此肝經血虛而火動耳先用加味道遙散數劑次用六君子加

柴胡枳殼各數劑而愈

一姪婦因怒寒熱胸脇脹痛嘔吐不食狀如傷寒此怒動肝火脾氣受傷也用六君子加柴胡山梔枳殼牡丹皮而愈但內熱口乾用四君子加芎歸升麻柴胡而安

釣藤湯 治姪娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者

釣藤鈎 當歸 茯神 人參 各一錢

苦梗 五分 桑寄生 一錢

右水煎服煩熱加石膏

黃芪湯 治氣虛胎動腹痛下水

糯米 合 黃芪 炒 川芎 各

右水煎分三服

順氣飲之 產前服之安胎

紫蘇葉 木香炮 人參 草豆蔻

茯苓 各一 甘草 砂五 大腹子 一兩氣

右每服三錢帶根三寸糯米少許水煎服

安胎寄生湯 治產後下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生 白朮 各五 茯苓 分四 甘草 錢一

右水煎服

又方好銀煮取水入葱白作羹食之

又方川芎二兩葱白五兩水三碗煮二碗半分三服

四物湯加熟艾阿膠茯苓或芎藭補中湯杜仲丸皆妙方並見附方

紫蘇飲方見十二卷第八論

六君子湯 四君子湯二方見二十四卷第六論

加味小柴胡 方見二十四卷第二論

平胃散 方見七卷第十八論

加味道遙散 歸脾湯二方見二十四卷第四論

**妊娠漏胎下血方論第五**

妊娠經水時下此由衝任氣虛不能約制蓋心小腸二經相為表裏上為乳汁下為月水故妊娠經水壅之以養胎黃芩以為乳若經水時下名曰胞漏血盡則斃矣

愚按前症若因風熱用防風黃芩丸若因血熱用加味道遙散若因血虛用二黃散若因血多太多用八珍湯未應補中

益氣沙若因肝火用柴胡山梔若因脾火用加味歸脾湯  
若因事下血作痛用八珍湯加阿膠熟艾若因脾胃虛弱用  
補中益氣湯加五味子若因脾胃虛陷用前湯倍用升麻柴  
胡若補熱內熱宜用逍遙散

附治驗方藥

一姪婦下血服涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不  
能攝血余用補中益氣湯而愈後因怒而寒熱其血仍下此  
肝火旺而血沸騰用加味逍遙散血止用補中益氣湯而安  
一姪婦下血發熱作渴食少體倦屬脾氣虛而肝火所侮用四  
君子加柴胡山梔血止因怒復作用六君子加柴胡山梔升麻  
而安

二黃散 治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁作渴  
或脇肋脹痛等症

生地黃

熟地黃自製

右為末每服三錢煎白朮枳殼湯調下二黃須杵膏為丸庶  
藥不粘槁而有力也

防風黃芩丸 方見後

加味歸脾湯 加味逍遙散

人參湯 三方見二十四卷第四論

四君子湯 補中益氣湯

六君子湯 三方見二十四卷第六論

柴胡山梔散 方見二十四卷第三論



妊婦卒然下血方論第六  
妊婦下血因冷熱不調七情失宜氣血不和所致若傷於胎則痛而下血甚則胎墮矣

愚按前症若因氣怒用小柴胡湯若因風熱用一味防風丸若因血熱用一味子芩丸若因脾氣虛弱用六君子湯若因中氣下陷用補中益氣湯若氣血而下血者乃因兒小飲少也不必服藥

附治驗

一妊婦六月每怒下血甚至寒熱頭痛脇腹痠疼作嘔少食余謂寒熱頭痛乃肝火上衝脇腹痠疼乃肝氣不行作嘔少食乃肝侮脾胃小便下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑

山桅菴苓白朮而愈

一妊婦六月體倦食少勞役下血用六君加當歸熟地升麻柴胡而愈

安胎散 治卒然腰痛下血

熟地黃自製 艾葉 白芍藥炒 川芎 黃芪炒

阿膠炒 當歸 甘草炒 地榆各五分

右薑棗水煎服

附方

子芩丸 治肝經有熱妄行用細條黃芩炒為末每服一錢以

秤錘燒赤碎酒熱調服若脾胃虛不宜用

防風丸 治肝經有風以致血得虛而流散不歸經用防風為

未每服一錢白湯調服

防風黃芩丸

治肝經有風熱致血崩便血尿血用條芩炒焦

防風等分爲末酒糊丸桐子大每服三五丸食遠或食前

米飲或溫酒送下

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

六君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

**妊娠驚胎及僵仆方論第七**

妊娠驚胎者乃懷妊將滿胎神已其墜仆傷胎甚至下血不醒

若欲驗其子母安否當參第四論治之

愚按前症若因怒跌仆或手足抽搐用釣藤湯若因氣滯用

紫蘇飲若因脾胃氣虛用六君子加蘇梗若鬱結傷脾用歸

脾湯若鬱怒傷肝脾用四七湯加芎歸若去血過多用佛手

散如不應膠艾湯氣血虛八珍加膠艾

神妙佛手散

治胎痛服之即安胎損服之立下

即芎歸湯

當歸

川芎各五錢

右水酒煎血崩昏暈用冰煎服

治妊娠從高墜下腹痛下血

生地黄

益母草各二錢

當歸

黃芪炒各一錢

右薑水煎服

膠艾湯

治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或去血

腹痛

阿膠一兩

熟艾葉數莖

右以水三碗煮取二碗分三服

又方川芎末二錢酒下二三服胎生即安胎死即下

又方失所胎動或子煩飲竹瀝一升立愈

又方縮砂和皮炒為末每服二錢米飲下腹熱即安

秦朮湯方見前

安胎散 治頭仆胎動腰腹痛方見前

附方

四七湯 治七情鬱結成痰或如梅核鯁於喉間或中脘停痰

氣痞或痰壅氣喘或痰飲中脘嘔逆惡心

紫蘇葉 厚朴薑製 茯苓各一錢 半夏薑製五分

右薑棗水煎白濁送青州白丸子極妙

加味四物湯 治症同前

又方治寒邪所犯心腹作痛

桂枝 芍藥炒 半夏各一錢 茯苓 厚朴薑製

枳殼炒 甘草炒各五分 人參

右薑棗水煎服

釣藤湯方見前

紫蘇飲方見後

六君子湯方見二十四卷第六論

歸脾湯 八珍湯 二方見二十四卷第四論

妊娠胎上逼方論第八

妊娠將養如法則血氣調和胎得其所而產亦易否則胎動氣

○太醫完交主婦人良方

逆臨產亦難甚至危矣

愚按前症若氣逆胎上用紫蘇飲飲食不甘兼以四君子若內熱晡熱兼以逍遙散若胃火所致用四君薑苓枳殼柴施若脾鬱所致用歸脾湯加柴施枳殼

附治驗

一姪婦每因恚怒其胎上逼左關脉弦洪乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山施而愈但體倦不食用四君子調養脾土加柴胡枳殼調和肝氣乃瘥

一姪婦胎上逼腦滿暖氣飲食少思此脾氣鬱滯用紫蘇飲頗安又用四君子加枳殼柴胡山施而瘥

紫蘇飲 治子懸腰痛或臨產驚恐氣結連日不下或大小便

不利

當歸

甘草炙

大腹皮

黑豆浸水包

人參

川芎

橘皮

白芍藥

炒各五分

紫蘇

右薑葱水煎

一孕婦累日不產催藥不驗此坐草太早心懷畏懼氣結而血不行也用前飲一服便產

一婦人孕七月止衝腹痛面不赤舌不青乃子懸也亦用前飲而胎母俱安

當歸湯 治胎動煩躁或生理不順唇舌青黑手足厥冷

當歸

人參

阿膠炒

甘草炒各一錢

連根葱白

推

右水四碗煎四味至半去滓下葱煎至一碗分二服

大聖散 治妊娠心忪驚心腹脹滿連臍急痛

白茯苓

川芎

麥門冬心去

黃芪炒

當歸各一錢

人參

甘草炒

木香各五分

右薑水煎服

又方 治胎上逼熱痛下血或煩悶困篤用葱二十莖水濃煮

飲胎未死即安胎已死即下未効再服若唇口青黑手足厥

冷須佐以當歸湯

白朮湯 治遍身痛或衝心痛欲死方見後

附方

四君子湯 六君子湯二方見二十四卷第六論

逍遙散

歸脾湯二方見二十四卷第四論

小柴胡湯方見二十四卷第二論

妊娠下如豆汁胎動腹痛方第九

愚按前症肝脾濕熱用升陽除濕湯肝脾風熱用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯脾胃氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用防風黃芩丸風入腸胃用胃風湯

附治驗

一妊婦因怒腦膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾胃愈弱飲食愈少大便不實且無度久而便黃水或帶白視其面色黃中隱白余曰黃色脾虛也白色肺虛也朝以補中益氣湯

升補胃氣效以六君子培補脾氣而愈

治妊娠忽然下如豆汁等物或胎動腹痛

糯米升 黃芪炒六兩

右水煎分四服

補遺用野苧根二兩好銀三五兩或金銀首飾水酒各半煎服

附方

胃風湯 治風邪乘虛客於腸胃水穀不化泄瀉下注腹脇虛

滿腸鳴作痛及腸胃虛熱下如豆汁或瘀血日夜無度方見卷第八

卷第十論

東垣升陽除濕湯 治婦人女子漏下惡血月事不調或暴崩

不止多下冰漿之物皆由飲食失節或勞傷形體或素患心

氣不足因飲食勞倦致心火乘脾其脈緩而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡 蒼朮 黃芪炒各一錢五分

防風 甘草炙 升麻 藁本各一錢

蔓荆子七分 獨活 當歸各五分

右水煎食前服

加味逍遙散 加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

防風黃芩丸 方見前

補中益氣湯 六君子湯 二方見二十四卷第六論

錢氏白朮散 方見二十一卷第二論

妊娠誤服毒藥胎動方第十

愚按前症若因毒藥用甘草黑豆淡竹葉若因頭仆用阿膠散未應前送知母丸若因頭仆下血腹痛用佛手散未應用八珍送知母丸血出過多用八珍湯斤許益母草四兩水煎徐徐與服若胎死以補硝或平胃散下之

奪命丹

治小產或毒藥唇白爪青黑其胎已死

牡丹皮

白茯苓

桂心

赤芍藥

桃仁去皮尖研如泥

右等分蜜丸彈子大每服一丸醋湯速進兩丸立出

阿膠散

治妊娠跌作或毒藥致胎不安

熟地黃

白芍藥

艾葉

當歸

甘草

阿膠

黃芪炒各一錢

右薑棗水煎服

藥毒胎動甘草烏火淡竹葉等分用水濃煎服

附方

知母丸 又名一母丸方見十三卷第九論

佛手散 方見

八珍湯 方見二十四卷第四論

平胃散 方見八卷第十八論

妊娠心痛方論第十一

妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛朝發夕死夕發旦死若傷心支絡則乍安乍作若傷於子藏則胎動而血下愚按前症若飲食所傷用平胃散加枳殼山楂若因錯雜諸

邪當審其因而治之

附治驗

一姓婦心痛煩熱作渴用白朮散即愈後因停食其痛仍作胸腹膨滿按之則痛此因飲食停滯用入參養胃湯按之不痛乃脾胃受傷以六君子補之而愈

一姓婦心腹作痛脇脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山查山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎動不食面色青黃肝脈弦緊脾脈弦長此肝乘其土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈

姓婦卒心痛氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴製各一錢

右水煎服

白朮湯 治姓娠內熱心痛

白朮

四錢

赤芍藥

三錢

黃芩

二錢

右水煎忌桃李雀肉

雷公炮灸論云心痛欲死急覓延胡

大方青竹茹一升酒二升煮二升分三服

又方破鷄子一枚調酒服之

紫蘇飲 方見前

附方

人參養胃湯

平胃散

二方見七卷第十八論

二陳湯

方見二十四卷五論

大醫文主編

卷五

卷五

卷五



六君子湯

方見二十四卷第六論

妊娠心腹痛方論第十二

妊娠心腹痛或宿有冷疾或新觸風寒或痰飲相搏若痛傷胞絡必致動胎甚則傷墮

愚按前症若風寒痰飲用金沸草散胎氣鬱滯加香附川芎若飲食停滯用六君子加柴胡枳殼若怒動肝火用前藥更加柴胡山梔若鬱結傷脾用歸脾湯加枳殼山梔

附治驗

一妊婦心腹作痛吐痰惡心胎氣上攻飲食少思此脾虛氣滯而為痰用六君子加柴胡枳殼諸症漸退飲食漸進又用四君子加枳殼山梔桔梗而安後因怒兩脇氣脹中腕作痛惡

寒嘔吐用六君子加柴胡升麻木香二劑而愈

當歸芍藥湯

治妊娠心腹急痛或去血過多而眩暈

白芍藥炒

當歸

茯苓

白朮炒

澤瀉各一錢

川芎二錢

右水煎服

阿膠散 治胎動腹痛

白茯苓

白朮炒

川芎

阿膠各一錢炒

當歸

陳皮各一錢

甘草炒三分

右水薑棗煎服

治胎動腹痛欲落上等銀一斤茅根二斤去黑皮水五碗煮取

三碗入清酒一碗注示根煎數沸徐徐服立安金銀首飾可

○大醫宗要方注婦人良方

十二卷

二二

附方

金沸草散 方見六卷第十二論

紫蘇飲 方見前

四君子湯 六君子湯 二方見二十四卷第六論

歸脾湯 方見二十四卷第四論

妊娠中惡方論第十三

妊娠若忽然心痛悶絕欲死者謂之中惡蓋因氣血不足精神衰弱故邪毒得以中之也

愚按前症當調補正氣為善用金銀藤一味煎湯飲之

又方治前症

生地黃<sub>錢二</sub>

枳殼<sub>錢一</sub>

木香<sub>分三</sub>

右水煎服

又方豆豉一兩薑半兩水煎服

妊娠心腹痛或吐血衄血<sub>其</sub>熱艾如拳大煮汁服

又方用鹽一盞水調服以冷水嚥之吐出即安

又方用竈土為末每服二錢白湯調

妊娠腰腹背痛方論第十四

腎主腰足因勞役傷損其經以致風冷乘之腰腹相引而痛蓋婦人腎以繫胞妊娠痛甚則胎墮也

愚按前症若外邪所傷用獨活寄生湯勞傷元氣用八珍杜

仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥加白朮補骨脂氣血鬱滯用

紫蘇飲加桔梗<sub>錢一</sub>煎火所動用小柴胡湯加白朮枳殼山

大醫附錄 婦人諸方 卷之十一  
扼肝脾鬱結用歸脾湯加柴胡枳殼

附治驗

一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致用按草菴活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊

通氣散 治腎虛腰痛神妙破故紙炒為末空心每服二錢嚼

核桃肉半箇以溫酒下

杜仲丸 治妊娘腰背痛杜仲炒續斷酒浸等分為末煮棗肉

丸桐子大每服七十九酒下米飲亦可

膠湯 治腰腹疼痛胎動欲落即前妊娘下血補遺內安

附方

獨活寄生湯 方見四卷第七論

八珍湯 歸脾湯 二方見二十四卷第四論

紫蘇飲 方見前

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

菴活勝濕湯 方見四卷第一論

妊娘小腹痛方論第十五

妊娘小腹痛由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也

愚按前症若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯

脾氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安

胎飲加升麻白朮不應兼補中益氣湯

附治驗方藥

一妊婦小腹痛作痛甚治以安氣攻左右或時逆上小便不利用

小柴胡湯加青皮山桅清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸症頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安紫蘇飲方見前

八珍湯方見二十四卷第四論

四君子湯 六君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

安胎飲方見前

小柴胡湯方見二十四卷第二論

龍膽瀉肝湯方見二十四卷第八論

妊娠心腹脹滿方論第十六

夫妊娠心腹脹滿者由脾胃虛寒復因冷飲相搏所致也愚按前症若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散若食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇飲

附治驗

一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用入參養胃湯加青皮山查枳殼其脹益甚其胎上攻惡心不食右關脈浮大按之則弦此脾土不足肝木所侮余用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益氣湯升舉脾氣乃瘥下氣湯治心腹兩脇脹悶飲食少思四肢無力

- 羌活 赤芍藥炒 甘草炒 枳榔
- 青皮 大腹皮 陳皮 赤茯苓

半夏製 桑白皮炒各五分 桂心一分 紫蘇葉一錢

右水煎服

局方枳殼散保風散紫蘇飲藿香正氣散皆良

附方

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

人參養胃湯 方見七卷第十八論

大醫院校註婦人良方大全卷之十二 終

大醫院校註婦人良方大全卷之十三

江右臨川陳自明良甫編  
大醫院使立齋薛已校註  
建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠數墮胎方論第一

夫胎乃陽施陰化榮衛調和經養完全十月而產若血氣虛損不能養胎所以數墮也凡妊婦腰痛多墮胎

愚按丹溪先生曰陽施陰化胎孕乃成血氣虛乏不能榮養其胎則墜譬如枝枯則果落藤瘦則花墜譬治賈氏婦每有孕至三月前後必墜診其脉左右大而無力重則瀆知其血虛也補其中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下黃

大醫院校註婦人良方 十三卷  
芩末二錢與數十貼得保而生因思之墮於內熱而虛者  
於理為多曰熱曰虛蓋孕至三月上屬相火所以易墮不然  
何以黃芩熟艾阿膠等為安胎之妙如此也太抵治法須審  
某月屬某經育養而藥之

附治驗

一妊婦五月服剪紅丸而胎墮及腹脹痛乃服破血之劑痛益  
甚手不敢近予曰此峻藥重傷脾胃也用八珍倍加參芪生  
夏乳香沒藥二劑而痛止數劑而安

吳江庠史萬湖仲子室年二十餘疫疾墮胎時咳服清肺解  
表之藥喘急不寐予以為脾土虛而不能生肺金藥後慎而  
益甚也先與補中益氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈後

性視之用八珍加五味及十全大補湯而愈

一方鯉魚二筋煮一尾粳米一升用鹽醬煮食甚善月食三次

芩藟補中湯杜仲丸治氣虛而胎墮 方見十二卷第一論

附方

十全大補湯 八珍湯二方見二十四卷第四論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

妊娠不長方論第二

夫妊娠不長者因有宿疾或因失調以致臟腑衰損氣血虛弱  
而胎不長也當治其疾或益其氣血則胎自長矣  
愚按前症更當察其經絡審其所因而治之

附治驗

一妊婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而胎不長因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣

一妊婦因感寒熱往來內熱晡熱脇痛嘔吐胎至六月而不長此因肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗病愈而胎亦長矣

黃芪湯 治妊娠不長更安胎和氣

黃芪炒 白朮炒 陳皮 麥門冬去心 白茯苓

前胡 人參各五 川芎 甘草炒三

右薑棗水煎服

集驗用鯉魚長尺許如食法飲其汁其胎漸大而長矣

附方

六君子湯 方見二十四卷第六論

八珍湯 方見二十四卷第四論

妊娠胎動不安當下方論第三

夫人以胃氣壯實衝任榮和則胎得所如魚處淵若氣血虛弱無以滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍

愚按前症宜用第十二卷十四方論主之其胎果不能安者方可議下慎之慎之

附治驗

馮臚張淑人痢疾後胎動心神不安肢體殊倦用八珍散二十餘劑漸愈因勞加煩熱頭痛以大劑補中益氣湯加蔓荊

子治之熱痛頓止仍用前散又五十餘劑而安其後生產

桂心散 治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心

瓜蒌

牛膝

藎麥

各五分

當歸

右水煎

又方牛膝一兩酒一鐘煎七分作二服

小品方用麥藥一升搗碎水二升煮一升服之神効觀麥藥能

損氣破血如此脾胃虛弱飲食不化者不宜用明矣

文仲取雞子一枚鹽三錢服之立下

佛手散服之胎死者即下生者亦安

方見十二卷第七論

附方

八珍散

方見二十四卷第四論

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

**妊娠墮胎後血下方論第四**

墮胎後復損經脈而下血不止甚則煩悶至死皆以調補胃氣為主

愚按前症若肝經血熱用四物參朮山梔肝經風熱用防風

黃芩丸肝經怒火用加味逍遙散脾經氣虛用四君歸地脾

經鬱滯用加味歸脾湯氣滯不和用紫蘇飲胃氣下陷用補

中益氣湯

附治驗

一妊婦墮胎昏憤不特吐痰自用養血化痰之劑昏憤不省自汗發搐痰涎湧出彼以為中風欲用祛風化痰予曰此屬脾



氣虛寒所致遂用十全大補湯加炮薑二十餘劑尋愈  
治妊娠損動下血腹痛

阿膠一兩

艾葉半兩

右水一大盞煎

治墮胎下血煩滿寒熱狂悶鎊鹿角炒為末每服三錢水調下  
日三服或家雞翎燒為末每服二錢溫酒下良及再服以效為  
度

附方

四物湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

紫蘇飲 方見十二卷第八論

防風黃芩丸

方見十二卷第六論

加味逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

妊娠未足月欲產方論第五

妊娠未足月而痛如欲產或應產而難或為子煩用知母一味  
蜜丸桐子大粥飲服之或槐子蒲黃等分為丸酒服或蒲黃水  
調錢許並効

愚按小產重於大產蓋大產如瓜熟自脫小產如生採斷其  
根蒂豈不重哉而人輕忽死於是者多矣太抵治法宜補形  
氣生新血去瘀血為主若未足月痛而欲產用芎歸補中湯

倍加知母止之產而血不止入參黃芪湯補之產而心腹痛  
當歸川芎湯主之元氣弱而欲產八珍湯固之出血過多而  
發熱聖愈湯治之若汗不止或昏潰喘咳急用獨參湯若發  
熱煩躁或肉瞤筋惕用八珍湯太渴面赤脉洪而虛者用當  
歸補血湯身熱面赤脉沉而微者用四君薑附以回其陽可  
也

附治驗方藥

一妊婦八月胎欲墜如產卧久少安日晡益甚此氣血虛弱朝  
用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯調理而安  
當歸川芎湯 治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒  
當歸 川芎 熟地黃自製

白芍藥炒

玄胡索炒

紅花

香附

青皮炒

澤蘭

牡丹皮

桃仁

右水煎入童便酒各小半盞服

若以手按腹愈痛此瘀血為患宜用此藥或失笑散消之若  
按之不痛此是血虛宜用四物參苓白朮若痛而作嘔此是  
胃虛宜用六君子若痛而作瀉此是脾虛宜用六君子送二神  
丸

芎歸補中湯 治氣血虛而欲產

艾葉代薑

阿膠炒

川芎

五味子并炒

黃芪炙

當歸

白朮炒 芍藥炒 人參

杜仲炒各一錢 甘草炙五分

右每服五錢水煎服

若脾氣虛弱須用補中益氣湯若氣虛而有火宜用安胎飲

人參黃芪湯 治小產氣虛血下不正

人參 黃芪炒 當歸 白朮炒

白芍藥炒 艾葉各一錢 阿膠炒二錢

右作一劑水煎服

當歸散 治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱宜服此藥

當歸 白芍藥炒 川芎 黃芩炒各一兩

白朮五錢

右為細末溫童便調下二錢

聖愈湯 方見二十四卷第九論

獨參湯 方見三卷第十三論

當歸補血湯

八珍湯 二方見二十四卷第四論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

斷產方論第六

易曰天地之大德曰生然婦人有臨產艱難或生育不巳而欲斷之故錄驗方以備所用若服水銀 禹蟲水蛭之類不惟孕不復懷且禍在反掌

愚按前云用蠶故紙尺許燒灰為末產後酒服之血虛者終

本草綱目卷之八十一 婦人經水不調 十三

不復孕大抵斷產之劑多用峻厲性性有不起者是則產之  
害未若斷產之害也吾聞閣老張羅峯太常李恒齋俱因服  
斷產之劑自謂形體俱怯遇勞必病有由然矣

千金斷產用油煎水銀一日方息空心服棗大一丸永斷其孕  
且不損久

千金去胎太麩五升清酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食  
且再服其胎如糜母無所苦千金不傳

四物湯每服五錢加芫薹子二撮於經行後空心溫服

妊娠咳嗽方論第七

夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳嗽秋則肺受  
之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳於腑

妊娠病久不已則傷胎也

愚按前症若秋間風邪傷肺用金沸草散夏間火邪射肺用  
人參平肺散冬間寒邪傷肺用人參敗毒散春間風邪傷肺  
用參蘇飲若脾肺氣虛用六君芎歸桔梗若血虛四物桑皮  
杏仁桔梗腎火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃氣虛風  
寒所傷用補中益氣加桑皮杏仁桔梗蓋肺屬辛金生於巳  
土嗽久不愈者多因脾土虛而不能生肺氣而脾理不密以  
致外邪復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治  
法當壯土生腎水為善諸臟腑嗽見六卷第十一等論

附治驗

一妊娠氣喘促甚諸藥不効素有帶下始於目下浮兩月餘其

面亦然此氣虛而有痰飲也用六味丸料數劑而愈  
 一妊婦嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中  
 益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎氣而愈  
 一妊婦咳嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予以爲此水泛  
 爲痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安  
 一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯  
 加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用  
 六君子加柴胡升麻而痊

桔梗散 治風寒咳嗽喘急不食  
 天門冬去心一錢 桑白皮 桔梗炒 紫蘇各五分  
 赤茯苓錢一 麻黃去節三分 貝母 人參 甘草炒

右薑水煎

馬兜鈴散 治咳嗽氣喘

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草

貝母各五分 陳皮去白 大腹皮黑豆水浸洗 紫蘇

桑白皮各一錢 五味子五分

右薑水煎

百合散 治咳嗽胃膈煩悶

川百合 紫苑 麥門冬 苦梗

桑白皮各五分 甘草三分 竹茹二分

右薑水煎

治姙娠傷寒延多咳嗽

大醫元文 卷之五 十一

知母 杏仁 天門冬 桑白皮各五

右薑水煎服

旋覆花湯感冒喘嗽胃滿痰盛方見二十二卷第四論  
葦蓋散治症同上或項背拘急鼻塞頭眩時發寒熱方見六卷第十二論  
參蘇飲加杏仁五味子治症同上

附方

金沸草散 方見六卷第十二論

人參平肺散 方見二十一卷第十二論

人參敗毒散 方見二十四卷第十論

補中益氣湯 四君子湯

六君子湯 三方見二十四卷第六論

六味丸 方見二十四卷第十一論  
小柴胡湯 方見二十四卷第十二論

妊娠吐血衄血方論第八

妊娠吐血由七情臟腑所傷氣逆於上致血上溢不止心悶甚  
者多死或墜胎也宜用局方必勝散

愚按前症若肝經怒火先用小柴胡山桅生地次用前藥全  
四物後用加味逍遙散肝經風熱防風子芩丸心經有熱珠  
砂安神丸心氣不足補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀  
角地黃湯膏梁積熱加味清胃散鬱結傷脾加味歸脾湯肺  
經有火黃芩清肺飲因氣鬱滯紫蘇飲子氣不攝血用補中  
益氣湯腎經虛火加味六味丸仍以七卷第五論互用

婦人經水不調方

附治驗方藥

一 姙娘因怒吐血兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血蓄上隨火出也用小柴胡合四物四劑血止用六君子安胎飲調理而

卷第八論

若肝脾氣血虛而有火不安宜兼逍遙散若脾氣虛弱而不

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

四物湯 補中益氣湯

六君子湯 方見二十四卷第六論

加味逍遙散 加味歸脾湯 方見二十四卷第四論

防風子芩丸 方見十二卷第六論

硃砂安神丸 方見三卷第十論

養心湯 方見三卷第十論

妙香散 方見三卷第十一論

安胎飲 方見十二卷第一論

犀角地黃湯 方見七卷第六論

加味清胃散 方見二十四卷第一論

黃芩清肺飲 方見八卷第一論

加味六味丸 方見二十四卷第十一論

姙娠子煩方論第九

論曰姙娠苦煩悶者以四月受少陰君火以養精六月受少陽

相火以養氣若母心驚膽寒多有是症產寶云是心肺虛熱或痰積於胃若三月而煩者但熱而已若痰飲而煩者吐涎惡食大凡停痰積飲寒熱相搏吐甚則胎動不安

愚按前症若因內熱用竹葉湯氣滯用紫蘇飲痰滯用二陳白朮黃芩枳殼氣鬱用分氣飲加川芎脾胃虛弱用六君紫蘇山梔

附治驗

一姪婦煩熱吐痰惡食惡心頭暈此脾虛風痰為患用半夏白朮天麻湯以補元氣祛風邪漸愈惟頭暈未痊乃用補中益氣湯加蔓荊子以升補陽氣而愈  
竹葉湯 治子煩

防風

黃芩炒

麥門冬各一

白茯苓二錢

右竹葉數片水煎服

人參散

治熱乘心脾煩熱乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

乾葛

黃芩炒

犀角每各一錢

甘草五分

右水煎

竹茹湯

治姪媛煩燥或胎不安淡竹茹一兩水煎服之

益母丸知母炒為末棗肉丸彈子大每服一丸人參煎湯下

附方

分氣飲

治脾胃虛弱氣血不和胃膈不利或痰氣喘嗽飲少思

少思



陳皮 茯苓 半夏炒 桔梗炒  
 大腹皮 紫蘇梗 枳殼炒 白朮炒  
 山梔炒各 甘草炙五分

紫蘇飲 方見十二卷第八論

二陳湯 方見二十四卷第五論

六君子湯 補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

**妊娠煩燥口乾方論第十**

足太陰脾之經其氣通於口手少陰心之經其氣通於舌若臟腑不調氣血不和以致內熱乘於心脾津液消燥故心煩口乾也與丁煩大同小異宜用益母丸

愚按前症若胃經實火用竹葉石膏湯若胃經虛熱用入參黃芪散若胃經氣虛用補中益氣湯若肺經虛熱用紫蘇飲若肝經火動用加味逍遙散若脾氣鬱結用加味歸脾湯若腎經火動加味地黃丸

**附治驗**

一妊婦煩熱兼咽間作痛用知母散加山梔以清肺經而愈後內熱咳嗽小便自遺用補中益氣加麥門山梔以補肺氣滋腎水而痊

知母散 治煩燥悶亂口乾

知母 麥門冬 黃芪炒 子芩炒  
 赤茯苓 各一 甘草

右水煎入竹瀝一合更煎二沸而服  
人參黃芪散 治身熱煩燥口乾

人參

黃芪炒

葛根

秦艽

赤茯苓

麥門冬各一錢

知母

甘草五分

右薑三片竹葉二七片水煎

補遺人參白朮散黃芪六一湯皆良

附方

竹葉石膏湯

石膏一錢

半夏五分

甘草

人參各一錢

麥門冬

竹葉各五分

右薑水煎服

補中益氣湯方見二十四卷第六論

紫蘇飲方見十二卷第八論

加味逍遙散

加味歸脾湯方見二十四卷第四論

加味地黃丸方見二十四卷第十一論



太醫院校註婦人良方大全卷之十三終

太醫院校註婦人良方大全卷之十四

江右臨川陳自明良甫編  
太醫院使立齋薛已校註  
建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠中風方論第一

論曰四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物否則名為虛邪賊害萬物體虛中乏客於皮膚則頑痺不仁入於筋脈則攣急喎僻若兼濕熱則弛縱痿軟若入臟腑氣隨所傷經絡而為諸病妊娠中之必須早治庶免墮胎之患

愚按病機機要云風本為熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是

太醫院校註婦人良方 卷之十四

亦養血也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多着四肢則脉浮惡寒拘急不仁中臟者多着九竅之則唇緩失音耳聾鼻塞目瞽便秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以太藥養之此中風之要法妊婦患之亦當以此施治而佐以安胎之藥仍參三卷首論主治之為是

防風

桑寄生

葛根各五分

家菊花

細辛

防已

秦艽

當歸

桂心

茯神

甘草

羚羊角三分

右水煎入竹瀝半合服

白木酒 治妊娠中風口噤不語

白木 半兩

獨活 兩

黑豆 炒一合

右酒煎分四服灌之得汗即愈

補遺治妊娠中風排風湯續命湯參蘇湯加羌活引風湯皆可

選用 方見第三卷中風類

妊娠風痙方論第二

論曰妊娠體虛受風而傷足太陽經遇風寒相搏則口噤背強甚則腰反張名之曰痙須臾自醒良久復作又名子癰子鼻當審察其因而治之

愚按前症若心肝風熱用釣藤湯肝脾血虛加味逍遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱釣藤散脾

鬱痰滯二陳薑汁竹瀝若蕪症相雜當參照子煩門

附治驗

一妊婦出汗口噤腰背反張時作時止此怒動肝火也用加味逍遙散漸愈又用釣藤散而止更以四君子湯加釣藤山梔柴胡而安

一妊婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項強用羚羊角散漸愈更用釣藤散始痊又用歸脾湯而安

羚羊角散 治妊娘肩悶角弓反張名曰子癇風症

羚羊角 獨活 酸棗仁 五加皮

薏苡仁 炒 防風 當歸 酒 川芎

白木 茯神 木 杏仁 去皮尖 木香 甘草 各二分

右薑水煎

附方

釣藤湯 方見十二卷第四論

加味逍遙散

加味歸脾湯 二方見二十四卷第四論

紫蘇飲 方見十二卷第八論

釣藤散 方見四卷第四論

二陳湯 方見二十四卷第五論

四君子湯 方見二十四卷第六論

妊娠瘕疝方論第三 新附

竊謂瘕者筋脉急而縮也疝者筋脉緩而伸也一縮一伸手足

相引搖搖不已大抵與嬰孩發搐相似謂之瘈瘲也此証多屬風蓋風主搖動駱龍吉云心主脉肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則為瘈瘲也治法若因風熱用釣藤湯加柴胡山桅黃芩白朮以平肝木降心火養氣血若風痰上湧加竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蠍殭蠶虧損氣血用八珍湯加釣藤山桅為主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝氣絕也皆不治

附治驗方

一姪婦四肢不能伸服祛風燥血之劑遺尿痰甚四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩為主佐以釣藤湯而安後因怒前症復作小便下血寒熱少寐飲食少思用釣藤散

加山桅柴胡而血止用加味逍遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥釣藤飲食進而漸安

八珍湯 方見二十四卷第四論  
六君子湯 方見二十四卷第六論

姪鬼胎方論第四

夫人臟腑調和則血氣充實精神健旺若榮衛虛損精神衰弱

妹魅之類乘之亦如懷妊之狀故曰鬼胎也愚按前症因七情脾肺虧損氣血虛弱行失常道衝任乖違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補庶無是症治法以補元氣為主而佐以雄黃丸之類行散之若脾經鬱結氣逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不

足者用六君等歸培養之肝火血耗者用加味逍遙散滋抑  
之肝脾鬱怒者用加味歸脾逍遙二藥兼服腎肝虛弱者用  
六味地黃丸

附治驗

一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應  
余診視之曰面青脉瀋寒熱往來肝經血病也面黃腹大少  
食體倦脾經血病也此鬱怒傷脾肝之症非胎也不信仍用  
治胎散之類不驗余用加味逍遙歸脾二藥各二十餘劑諸  
症稍愈彼欲速效別服通經丸一服下血昏憤自汗惡寒手  
足俱冷嘔吐不食余用人參炮薑二劑漸愈又用十全大補  
湯五十餘劑而安

雄黃丸 治鬼胎瘵血腹痛

雄黃

鬼白去毛

莽草

丹砂研細

巴豆去油

獺肝炙黃各半兩

蜥蜴炙黃一枚

蜈蚣炙黃一條

右為末蜜丸桐子大每服二丸空心溫酒下日二服或下如  
蛇蠱之類其病乃除

治鬼胎及血氣痛不可忍

班猫去頭翅足製

延胡索炒各等分

右為末以溫酒調下半錢以下穢物為度

附方

加味歸脾湯

加味逍遙散

十全大補湯三方見二十四卷第四論

六君子湯方見二十四卷第六論  
六味丸方見二十四卷第十一論

妊娠傷寒方論第五

夫時令嚴寒體虛所傷即成傷寒輕者洒淅惡寒翁翁發熱微咳鼻塞數日而愈重者頭疼體痛寒熱交作久而不愈者多致傷胎也

愚按前症為害匪輕當審經絡表裡而治之不可輕忽  
加減四物湯 治妊婦腹痛或月事不調胎氣不安產後血塊或亡血過多或惡露不下

當歸 川芎 白芍藥炒 熟地黃略一  
右每服四五錢水煎日二三服下血加艾葉阿膠虛熱口乾

加括蕪根麥門冬兼血腹痛加當歸芍藥血崩血淋加熟地  
蒲黃因熱生風加川芎柴胡頭昏項強加柴胡黃芩大便秘  
結加大黃桃仁嘔吐惡心加白朮人參虛煩不眠加竹葉人  
參煩躁大渴加知母石膏水停吐逆加猪苓茯苓虛煩傷寒  
加入參柴胡防風

阿膠散 治時氣先服此以安胎却以主藥間服  
阿膠炙 白朮炒 桑寄生 人參 白茯苓

右為末等分每服一錢用糯米飲調下日三服  
前胡湯 治傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏錢 前胡 甜竹茹 梔子炒  
黃芩炒 大青 知母各五



右用葱白水煎服

蘇木湯 治傷寒時行洒淅寒振或蕪穢者

赤芍藥

橘紅

黃芩炒

黃連

甘草

蘇木各五分

右用水煎服汗出即瘥如胎不安蕪服阿膠湯

黃龍湯 治妊婦寒熱頭疼嘔嘔不食脇痛嘔痰及產後傷風

熱入胞宮寒熱如瘧或經水適來勞復熱不解散

柴胡錢二

黃芩炒

人參

甘草各一分

右用水煎服

柴胡石膏湯 治頭痛惡寒身熱拘急口乾

柴胡錢二

甘草錢一

石膏錢三

右用薑水煎服氣虛加入參

枳實散 治傷寒四日至五六日腹脹少食腰疼體重

枳實炒三錢

陳皮錢一

麥門冬半錢

右用生薑葱白水煎服

旋覆花湯 治傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花

赤芍藥

甘草各五分

前胡

石膏錢各一

白朮

人參

麻黃節去根

黃芩各三分

右用薑水煎服

麥門冬湯 治傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參

石膏錢各半

前胡

黃芩各五分

葛根

麥門冬各一

右薑棗竹茹一分用水煎服

梔子大青湯 治發斑變黑尿便血

升麻

梔子各一

大青

杏仁

黃芩各三

右用葱白三寸水煎服

白朮湯 治傷寒煩熱頭痛胎動或時吐逆不食

白朮

橘紅

麥門冬

人參

前胡

赤茯苓

川芎

甘草

半夏各五

右用生薑竹茹一分水煎服

良方白朮散 治傷寒

白朮

黃芩各二錢

右用薑棗水煎服若四肢厥逆陰症也不可用

芎蘇散 治外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶

紫蘇葉

川芎

白朮

白芍藥

麥門冬去心

陳皮

乾葛各五

甘草各三

右用生薑葱白水煎

參蘇飲去木 治證同前方見六卷第十二論

妊娠時氣方論第六

論曰四季之間非其時而有其氣謂春寒夏冷秋熱冬煖之不

正也所感者不拘長少其症相類故云時氣妊娠患之重者多致傷胎

愚按前症與前傷寒互相生治

秦艽散 治時氣五六日不得汗口乾飲水狂言嘔逆

秦艽

柴胡各五

石膏

犀角 鎊

赤茯苓

前胡

甘草

葛根

升麻

黃芩各四

右用淡竹茹一分水煎服

葛根飲子 治時氣煩熱口乾頭痛

乾葛

麻黃 去節根 各半兩

石膏 兩

豉合

白米 半合

梔子 七枚

葱白 二莖

右用水煎分三服汗出為効

芒莢飲子 治消熱六七日大小便不利

芒硝 一兩 細研

葵子 二兩

右如前煎服以利為効芒硝即朴硝

人參敗毒散 方見二十四卷第十論

妊娠熱病方論第七

冬時觸冒嚴寒即病為傷寒藏於肌骨夏至發為暑病即熱症也妊娠患之多致墮胎熱病與中暑相似但熱病者脈實中暑者脈虛治當審察不可槩施

愚按此症與前後三症同治

治雜娘熱病頭痛嘔吐煩悶

人參無一方

竹茹

葛根各一兩

蘆根兩二

知母兩三

麥門冬兩去心一兩

右每服四錢連根葱白三寸水煎

梔子仁飲

治熱病發斑黑色小便如血氣喘急胎欲墮

梔子

升麻

石膏

生地黄各二錢

黃芩

大青兩一

右每服半兩葱白七寸豉四斗九粒水煎

大黃飲

治熱病六七日大小便秘澀

大黃炒微

石膏兩一

知母

前胡

赤茯苓各三兩

梔子

甘草

黃芩各半兩

右每服五錢生地黄一分煎服

又方伏龍肝細研每服一錢水調下外用水調塗臍下

又方葛根煮汗時服一盞

補遺蘆根湯 治熱病頭疼心煩嘔吐

知母兩四

青竹茹兩二

右每服五錢生蘆根一握糯米一撮水煎

梔子五物湯

治雜婦傷寒壯熱頭痛

梔子

前胡

知母兩一

黃芩兩一

石膏兩四

右每服五錢用水煎服

升麻六物湯 治傷寒斑黑瀉血

升麻 梔子各二兩 石膏 杏仁 黃芩

右每服五錢葱頭水煎

妊娠傷寒熱病防損胎方論第八

論曰非節之氣傷於妊婦熱毒侵損胞胎若不早治多致墮胎

愚按前症當分察六經為主而察於前後方論

治妊娠傷寒身痛壯熱

葱白物一 前胡 葛根 石膏各十  
青黛分六 升麻八分 梔子十二

右用水煎分三服

治妊娠傷寒太便秘結

前胡分十 大黃 石膏各二 梔子仁十  
知母 黃芩 茯苓 生薑各八

右用水煎分三服

治妊娠傷寒發斑忽黑小便如血胎欲落

梔子 升麻各四 青黛二 生地黃二十  
石膏八 葱白物一 黃芩三

右用水煎分三服忌熱物

又用井中泥塗心下乾則易二方出本事

補遺治妊娠熱病先以白朮散安胎方見前

妊娠熱病胎死腹中方論第九

論曰熱病以致胎死不能出者但服黑神散胎自下矣

愚按陳無擇先生曰前症當視產母若面赤舌青知其子死面青舌赤知母死子生辰青吐沫子母俱死若雙胎或一死一活用黑神散竊謂前症宜補助產母使其胎自下黑神散恐其太熱不宜輕用果一胎已死者用平胃散朴硝水銀下之最為穩當庶不併傷生者平胃散方見後

黑神散又名烏金散靈苑方名肉桂散

桂心

當歸

芍藥

甘草炙

乾薑炒

生地黃兩一

黑豆炒去皮

附子炮去皮

右為末每服二錢空心用溫酒調下

補遺胎死用紅花酒煮汁飲二三碗

又方伏龍肝為末溫酒調下二錢白湯亦可

又方朴硝末童子小便和熱酒調下三錢立出

妊娠瘧疾方論第十

論曰妊娠病瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱作其發晏者由風邪客於風府循督而下衛氣至二日一夜常大會於風府故發日晏與早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內上注於伏衛之脈其行九日出缺盆其氣既止故發更早其間日發者風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作也妊娠而發多傷於胎

愚按前症因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾  
或暑邪所伏審係飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外  
邪多而飲食少用藿香正氣散外邪少而飲食多用人參養  
胃湯勞傷元氣用補中益氣湯若鬱怒所傷用小柴胡蕪歸  
脾湯若木侮土又而不愈用六君子為主佐以安胎藥乃參  
三陰三陽經而治之

附治驗

一婦人因怒患瘧舉發無期久而不已胸腹不利飲食少思吞  
酸吐痰用六君子加柴胡山梔二十餘劑尋愈但晡熱少食  
又用四君子加柴胡升麻為主佐以逍遙散而痊  
一妊婦瘧久不已愛氣下氣胸腹膨脹食少欲嘔便血少寐此

屬肝脾鬱怒用歸脾湯加柴胡山梔漸愈又用六君子湯加  
柴胡山梔升麻而愈

一妊婦患瘧已愈但寒熱少食頭痛晡熱內熱此脾虛血弱也  
用補中益氣湯加蔓荊子頭痛頓止又用六君子湯加芎歸  
飲食頓進再用逍遙散加參朮而寒熱愈

七寶散 治瘧疾 一日一發或一日兩發或間一日發

常山

厚朴薑製

青皮

陳皮並去白

甘草炒

檳榔

草菓等分

右每服半兩酒水各一碗煎至一盞去粗露一宿發時面東  
溫服良久再服一妊婦先寒後熱六脉浮緊用前散一劑而愈  
人參養胃湯 治妊娠瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心

身痛面色青白脉弦遲者又有驅邪散治證亦同方見七卷  
清脾湯 治姪婦瘡疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾大便  
秘澁不進飲食脉弦數者

青皮 厚朴薑製 白朮炒 草蓰 茯苓  
半夏炒 黃芩 柴胡 甘草炙各五分

右用薑水煎  
附方

交加散 治食瘡神効

肉豆蔻二箇一煨 草豆蔻二箇一煨 甘草二錢半炒半生  
厚朴二錢半炒半生 生薑一兩半煨半生  
右用薑水煎發日五更服

仲景白虎加桂枝湯 治溫瘧

知母六錢 桂枝 黃芩各一錢 括蕪根二錢  
甘草炙 牡蠣 乾薑各一錢

右用水煎服汗出即愈此少陽經藥也

桂枝羌活湯 治瘡處暑以前頭痛脉浮惡風有汗

桂枝 羌活 防風 甘草各一錢五分

右水煎發服吐加半夏一錢

麻黃羌活湯 治症如前但惡寒無汗

麻黃節去 羌活 防風 甘草各半兩  
右如前服加法同二方太陽經藥也

白芷湯 治瘡身熱目痛熱多寒少脉長先以大柴胡下之微



利為度餘熱不盡當服此湯

白芷一兩

知母七錢

石膏四兩

右粗末依前服陽明經藥也

桂枝芍藥湯

治瘧寒熱不論先後此太陽陽明合病寒熱作則必戰經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知內熱也乃陽盛陰虛之證此湯主之否則久而傳於陰經矣

桂五分

黃芪炒

知母

石膏

芍藥各二錢

右粗末水煎此太陽陽明經藥也

桂枝黃芩湯

如服前藥轉甚三陽合病也宜此和之

柴胡一錢五分

黃芩

人參

甘草各八分

半夏

石膏

知母各五分

右每粗末依前服如外邪已解而內未已再服下藥從邪至午發大柴胡下之從午至酉發邪氣在內也太承氣下之從酉至子發或至寅發邪氣在血也桃仁承氣湯下之微利後更以小柴胡湯徹其邪氣按此太陽陽明少陽經藥也以上諸方並係發風寒暑熱之氣自外而入中於三陽之經者也

桂枝石膏湯

治瘧疾隔日先寒後熱寒少熱多

桂枝五錢

石膏一兩五錢

知母一兩五錢

黃芩一兩

右分三服水煎此太陽陽明經藥也隔日發者邪氣所舍深者也

麻黃黃芩湯

治瘧發如前症而夜發者

麻黃一兩去節

甘草三錢

桃仁三十箇去皮尖

黃芩五錢

桂枝二錢

右依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血驟則肝氣燥經所謂肝苦急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒治風暑深入陰分乃血受病邪氣所舍尤深者也麻黃桂枝桃仁等乃太陽經血藥非三陰經藥也

附方

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

藿香正氣散

方見二十一卷第十論

人參養胃湯

方見七卷第十八論

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

逍遙散

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

妊娠霍亂方論第十一

夫飲食過度觸冒風冷陰陽不和清濁相干謂之霍亂其間或先吐或腹痛吐利是因於熱也若頭痛體疼發熱是挾風邪也若風折皮膚則氣不宣通而風熱上衝為頭痛若風入腸胃則洩利嘔吐甚則手足逆冷此陽氣暴竭謂之四逆妊娠患之多致傷胎也

愚按前症若因內傷飲食外感風寒用藿香正氣散若因飲食停滯用平胃散果脾胃頻傷陽氣虛寒手足逆冷者須用

溫補之劑治當詳審毋使動胎也

附治驗

一妊婦霍亂已止但不進飲食口內味酸泛行消導寬中余曰此胃氣傷而虛熱也當用四君子湯彼不信乃服人參養胃湯嘔吐酸水其胎不安是藥復傷也仍與四君子湯俾煎熟令患者先嗅藥氣不作嘔則呷少許恐復嘔則胎為鈞動也如是旬餘而愈

人參散 治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不化

人參

厚朴薑製

橘紅各一錢

當歸

乾薑炮

甘草炙各五分

右用棗水煎服

人參白朮散

治脾胃虛弱吐瀉或吐瀉作渴不食

白朮

茯苓

人參

甘草炒

木香

藿香各五分 乾葛一錢

右用水煎服吐甚加生姜汁頻飲之

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜沉冷頻服

草蓂仁兩四 烏梅肉兩三 甘草兩半

右每服半兩用姜十片水煎

木瓜煎 治吐瀉轉筋悶絕

吳茱萸湯泡七次

生薑切各一分

木瓜木刀切兩半

右每服二三錢用水煎

治霍亂其効神速一方有黃連無扁豆仍與第一論通用妊婦

霍乱腹痛四肢冷逆汗脉細理中湯治之傷食加陳皮寒甚  
脉欲絕陰症悉冥加炮附子方見二十卷  
竹茹湯 治霍乱熱渴脉數 見七卷嘔吐門

附方

藿香正氣散 方見二十一卷第十論

平胃散 方見七卷第十八論

四君子湯 方見二十四卷第六論

人參養胃湯 方見七卷第十八論

五苓散 方見二十一卷第十論

理中丸 方見二十卷第八論

香薷飲 方見七卷第二論

太醫院校註婦人良方大全卷之十四 終

太醫院校註婦人良方大全卷之十五

江右臨川陳自明良甫編  
太醫院使立齋薛已校註  
建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠泄瀉方論第一

論曰妊娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞泄水穀  
不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連  
阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脉沉緊  
數用戊己丸和之愛腐不食胃脉沉緊用感應丸下之後調和  
脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃風湯寒冷臍下陰冷動泄  
用理中湯治中湯伏暑心煩瀉瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便

自利用不換金正氣散胃苓湯此四證之木畧也仍參第八卷  
第八論主之

愚按米食所傷用六君加穀蘖麵食所傷用六君加麥蘖肉  
食所傷用六君加山查若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六  
君加柴胡生薑蕪嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加  
薑桂不應用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠  
用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香  
肉果若作嘔不食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑  
桂若瀉在五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神丸  
日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思急用八味  
丸補命門火以生脾土為善不可忽也

附治驗

邊太常側室姪娠泄瀉自用枳朮黃連之類腹悶吐痰發熱  
惡寒飲食到口即欲作嘔強匙許即吞酸不快欲用祛痰理  
氣余曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃矣遂  
以參朮炮薑為末丸如黍粒不時含嚥三五丸漸加至三百  
後日進六君子湯而尋愈

進士王繳徵之內懷姪泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其君  
憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃醒宿滯  
自化飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲  
投降火寒藥余曰若然則胃氣益傷也經云損其脾胃者謂  
其飲食適其寒溫後不藥果愈

厚朴丸 治洞泄寒中

乾薑炒

厚朴去皮等分

右水拌炒為末水糊丸梧子大每服五十九米飲下

草菓散 治虛寒泄瀉腹痛無度

厚朴

薑汁拌炒二兩

肉豆蔻牛蒡麵煨

草豆蔻十箇煨

右每服三錢用薑水煎

附方

附子理中湯方見二十卷第八論

理中丸

五苓散 二方見二十一卷第十論

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

錢氏益黃散

方見二十一卷第九論

四神丸 方見八卷第八論

七味白朮散

方見二十一卷第二論

八味丸

方見二十四卷第十一論

妊娠下痢黃水方論第二

論曰妊娠飲食生冷脾胃不能消化致冷心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜若熱乘大腸血虛受患則成血痢也

愚按治痢之法當察前篇其下黃水乃脾土虧損真色下陷也當補益中氣若黃而兼青乃肝木剋脾土宜平肝補脾若黃而兼白乃子令母虛須補脾胃若黃而兼黑是水反侮土

矢必治補脾胃若黃而兼赤乃心母益子但補中益氣若腸胃虛弱風邪客之用胃風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣凡安胎之藥當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類

附治驗  
地官胡成甫之內妊娘久病自用消導理氣之劑腹內重墜胎氣不安又用阿膠艾葉之類不應余曰腹重墜下元氣虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益氣而安又用六君子湯全愈

治妊娘利黃水

厚朴薑汁炙 黃連二兩 肉豆蔻五箇連皮  
右用水煎徐徐服忌如前並出產寶

治妊娘熱痢

黃連升 黃蘗升 梔子仁二十枚  
右用每服五錢水煎嘔加橘皮生薑

治妊娘下痢腹痛小便澀滯

糯米合 當歸炒 黃芪各一兩  
右用水煎分四服

治臨產下痢用梔子炒為末每服二錢白湯調其效

附方

胃風湯方見十二卷第九論  
補中益氣湯方見二十四卷第六論

妊娘大小便不通方論第三

太醫完校注婦人良方

夫妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通  
小腸熱則小便不利大小腸俱熱更推其因而藥之  
愚按前症若大腸血燥用四物湯加條芩桃仁大腸氣滯用  
紫蘇飲加杏仁條芩腸胃氣虛用六君子加紫蘇杏仁肝脾  
蘊熱用龍膽瀉肝湯心肝虛熱用加味道遙散加車前子

附治驗

亞卿李浦汀側室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元  
氣反虛肝脉弦急脾脉遲滯視其面色青黃不澤余曰此鬱  
怒所致也用加味歸脾湯為主佐以加味道遙散而安  
主政王天成之內妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫自用  
清熱之劑未效余診其脉浮大而瀉此氣血虛也朝用八珍

湯加桃仁杏仁用加味道遙散加車前子而瘥

蜀歸散 治妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難

小便澁產門腫

當歸五分 赤茯苓 枳殼炒 白芍藥

川芎各一錢 白薑炮 木香煨 粉草各三分

右用薑水煎氣弱枳殼減半大便秘加蜜同煎

治妊娠大小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黃炒 木通 檳榔各一兩 枳殼炒

訶梨勒四箇去核半生半煨 大腹子三枚

右為末用重便一盞葱白二寸煎六分調服二錢

初虞世治妊娠風氣大便秘澁



枳殼三兩

防風二兩

甘草一兩

右為末每服一二錢空心用白滾湯調日三服

小品治妊娠小便不利氣急服猪苓散不瘥用甘遂為末蜜和服豆許微利之未利再服利後仍服猪苓散

猪苓散 治妊娠小便澁痛及胎水猪苓去皮為末白湯調下

錢許加至二錢日三夜二服

又方車前子一兩太黃半兩炒為末每服三錢蜜湯調

附方

四物湯

六君子湯二方見二十四卷第六論

紫蘇飲方見二十四卷第八論

龍膽瀉肝湯方見二十四卷第八論

加味逍遙散

加味歸脾湯

八珍湯三方見二十四卷第四論

**妊娠小便不通方論第四**

夫妊娠小便不通為小腸有熱傳於脬而不利耳若兼心膈氣滯則致喘急陳無擇云妊娠胎滿逼胞多致小便不利若心膈氣虛清濁相干而為諸淋若胞系下戾小便不通名曰轉胞若胞滿尿出名曰遺尿

愚按丹溪云生轉脬小便閉多因胎婦虛弱憂悶性躁食味厚古方用滑利疎導藥鮮效若脬為胎所墮而不通但升舉

其胎胞系踈而小便自行若臍腹作脹而小便淋閉此脾胃氣虛胎壓尿胞四物之陳參朮空心服後探吐數次自安竊謂前症亦有脾肺氣虛而不能下輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦有金為火熾脾土濕熱甚而不利者更當詳審施治

附治驗

司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥不應余曰非个味丸不能救不信別用分利之藥肚腹腫脹以致不起傷者王文遠室患此小腹腫脹幾至於殆用个味丸一服小便滴瀝再以前丸之料加車前子一劑即利肚腹頓宛而安个味丸治婦人飲食如故煩熱不得卧支倚息因臍系了戾

不得溺名轉將但利小便則愈蓋此藥之利冬故也緩則止

救方見二十四卷第十一論

古今錄驗妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母去心炒

苦參各三兩

滑石兩

右為末煉蜜丸小豆大每服二三十九丸米飲下

治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子研

榆白皮切兩

葱白七莖

右水煎分三服

古今錄驗妊娠不得小便者在去皮尖炒黃檗九燈心湯吞此

又方滑石末水和塗臍上

又方用車前草汁調滑石末塗臍周圍四寸熱易之

又方搗杏仁入滑石末飯丸小豆大每服二十丸白湯下  
又方用紫苑為丸并花調下二錢  
葵子散 治妊婦小便不利身重惡寒眩暈及水腫用葵子五兩赤茯苓五兩為末每服二錢米飲調

附方

四物散 方見二十四卷第六論

二陳湯 方見二十四卷第五論

妊婦子淋方論第五

妊婦小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊婦胞繫於腎腎間虛熱而成斯症甚者心煩悶亂名曰子淋也  
愚按前症若頸項節攣瀝痰甚用羚羊角散若小便清少

淋瀝用安樂散若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯若肝經虛熱用加味逍遙散腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黃柏知母芩歸甘草若頻數而色黃用四物加黃柏知母五味麥門玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺瘰癧而頻數用地黃丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸若膀胱陽虛陰無所化用腎氣丸

附治驗

一婦人每怒發熱脇脹小便淋瀝如遇經行旬餘未已受胎三月因怒前症復作朝用加味逍遙散夕用安胎飲各二劑而

安五月又怒後下血如經行四日未正仍用前藥而愈  
 一姪娘飲食後因惱怒寒熱嘔吐頭痛惡寒胸腹脹痛大便不  
 實其面青色小便頻數時或有血服安胎止血之劑益甚余  
 曰寒熱嘔吐而腹脹此肝木剋脾土而元氣傷也太便不實  
 而面青此飲食傷脾兼肝侮土也小便頻數而有血此肝熱  
 傳胞而蕪挺痿也用六君子加枳殼紫蘇山梔二劑脾胃頻  
 醒又用加味道遙散加紫蘇枳殼二劑小便頻清後節飲食  
 調理而安

地膚大黃湯 治子淋

大黃炒 地膚草略三 知母 黃芩炒  
 猪苓 赤芍藥 通草 升麻

枳實炒 甘草各二兩  
 每服四五錢水煎服  
 安樂散 治子淋甚妙

麥門冬去心 通草 滑石 當歸  
 燈心 甘草 人參 細辛各五分

右水煎服  
 治小便淋痛心煩悶亂

藎麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子各錢  
 黃芩炒 芍藥 枳殼 車前子炒各五分

右水煎服  
 治子淋小便澀劑

大醫完交主

冬葵子

滑石

木通各等分

右每服四五錢葱白一子水煎

猪苓散 療子淋小便澀痛 方見本卷第三論

附方

羚羊角散 方見四卷首論

龍膽瀉肝湯 方見二十四卷第八論

加味逍遙散

四物湯 二方見二十四卷第四論

腎氣丸 即六味丸

六味丸

八味丸 二方見二十四卷第十一論

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

五淋散 滋腎丸

黃芩清肺飲 三方見八卷第一論

安胎飲 方見十二卷第二論

妊娠遺尿方論第六

妊娠尿出不知用白薇芍藥為末酒調下或白礬牡蠣為末酒調二錢或鷄毛灰末酒服一七或次桑螵蛸益智子仁為末米飲下

愚按前症若將中宜用加味逍遙散若脾肺氣虛宜用補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜用六味丸

附治驗方樂

一妊婦遺尿內熱肝脈以數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹余以為肝火血虛用加味道遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或發熱或患怒前症仍作用八珍散道遙散兼服以清肝火養肝血而痊

附方

加味道遙散

八珍湯二方見二十四卷第四論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

六味地黃丸方見二十四卷第十一論

妊婦尿血方論第七

妊婦尿血內熱乘於血分以致血熱流滲於脬名字淋用葵子一升研細水五升煮二升分三服或生艾葉一片酒五升煮二升分三服或生地黃一斤酒四升煮二升分三服亦治落產後下血

愚按前症因怒動火者宜小柴胡加山梔因勞動火者宜補中益氣湯若因厚味積熱宜用加味清胃散若因肝經血熱宜用加味道遙散若因脾氣下陷宜用補中益氣湯若因脾虛血熱宜用加味道遙散

附治驗

一妊婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作脹飲食少思肝脈弦弱此肝經血虛而熱也用加味道遙散六味地黃丸

兼服漸愈又用珍珠湯加柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治姙娠下血及尿血

當歸 生地黃各一兩 續斷半兩 赤芍藥錢五

右為末每服二錢空心用葱白煎湯調下

治姙娠尿血

阿膠炒為末 四兩 熟地黃用生者 四兩 酒拌蒸熟 炒骨

右和丸桐子大每服七八十九空心粥飲下

五苓散去桂加阿膠 炒同為粗末 每四錢用車前子白茅根水煎溫服

又方白茅根濃煎湯吞酒蒸黃連丸

附方

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

加味清胃散 方見二十四卷第一論

加味逍遙散

加味歸脾湯 二方二十四卷第四論

姙娠胎水腫滿方論第八

產乳集云姙娠三月足腫至腿出水飲食不甘似水腫謂之子氣至分挽方消者此脾胃氣虛或衝任經有血風各醫錄云宋少主元徽與徐文伯微行學鍼法文伯見一姙婦足腫脉之少主曰此女形也文伯曰此鬼胎也在左而黑遂用鍼胎下果然亦有脾虛水氣流溢或曰瀉瀉臟腑虛寒或因瘡疾飲水脾虛濕瀆或因水漬胎不能分利皆致腿足肚腹腫症也

愚按前症若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃  
虛弱佐以四君子若面白虛浮肢體如水氣用全生白朮散  
如未應用六君子湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣加茯苓  
苓若飲食失宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫喘悶不  
安或指縫出水用天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應  
用補中益氣湯若脾肺氣滯用加味歸脾湯佐以加味道遙  
散

附治驗

一妊娠每胎至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身  
後及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣夜用六君子加蘇  
梗而愈凡治妊娠母泥月數但見其經症即用本藥為善

天仙藤散 治婦人有水氣而成胎以致兩腿足浮腫

天仙藤洗畧

香附子炒

陳皮

甘草

烏藥軟白者辣者良各五分

右每服五錢生薑木瓜蘇葉各三片水煎日三服

澤瀉散 治妊娠遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀

澤瀉

桑白皮炒

木通

枳殼炒

檳榔

赤茯苓各五分

右薑水煎服

防已散 治脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防已三錢

桑白皮炒

紫蘇葉

赤茯苓各三錢

木香分二



右薑水煎

千金鯉魚湯

治妊娠腹大胎間有水氣

白木兩五

茯苓兩四

當歸

芍藥各三兩

右先以小鯉魚一頭如食法煮取汁每汁二盞入藥伍錢薑

七片橘皮少許煎七分空心服

腎着湯 治妊娠腰脚腫

茯苓

白木各八分

乾薑炮

甘草各一分

杏仁五分

右用水煎

五皮散

治胎水腫滿

大腹皮

桑白皮炒

生薑皮

茯苓皮

橘皮各一錢

木香二分

右水煎服

治妊娠脚浮腫因脾衰血化成水用生料平胃散薑棗水煎服

或為末用蘇葉湯調下每服二錢

全生白木散

治妊娠面目浮虛四肢腫如水氣名曰胎氣名

曰胎腫

白木兩一

生薑皮

大腹皮

陳皮

白茯苓各半兩

右各為末每服二錢米飲下

附方

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

加味歸脾湯  
加味逍遙散

二方見二十四卷第四論

妊娠腹內鍾鳴方論第九

治孕婦腹內鳴用鼠窟中土為末入麝香酒調下二錢立愈或黃連濃煎汁母當啣之

愚按產寶云小兒在腹中哭其治法亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃飲之即止想即是症又云臍帶上吃啞兒含口中因妊婦登高至臂脫出兒口以此作聲令妊婦曲腰就地如拾物仍入兒口即止然黃連性寒麝香開竅當酌量用之

龍彥德孕癰方第十

治孕癰用烏藥五錢水一鍾煎七分入牛皮膠一兩煎化溫服

或意苾仕煮汁飲之

愚按孕癰即是腹內患癰如前法不應宜用牡丹皮散或意苾湯治驗見二十四卷

妊娠不語論第十一

孕婦不語不須服藥臨產月但服保生丸四物湯產下便語黃帝問曰人有重身九月而瘖何也岐伯對曰胞絡繫於腎腎脉貫繫舌本故不能言十月分娩後自為之言也

愚按前症果內經寔理之言人有患此當調攝以寧之不必驚畏而泛用藥也

妊娠傷食方論第十二

經曰飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮

傷在五味故妊娠傷食最難治者

愚按東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不飢多食而不傷蓋胃主司納脾主消化五臟之本也然食倍而傷者乃脾氣虛而不化也若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣當審其所因而調治之若飲食停滯或肚腹作痛用平胃散嘔吐惡心加枳殼砂仁吞酸噯腐加黃連三分吳茱萸二分腹滿泄瀉用六君子湯停滯肉食倍加山楂停滯麵食倍加麥蘖停滯糯食用白酒麩末一味米食停滯倍加穀蘖魚腥所傷倍加陳皮傷辛熱之物加黃連傷性冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應用四神丸若脾氣下陷用補中益氣湯凡噯覺藥氣且戒藥餌節飲食經云損其脾者調

其飲食適其寒溫太丸脾胃虛弱飲食難化以白朮陳皮為末等分陳麩糊丸常服最善枳木丸但可暫用枳實峻厲能耗真氣治者慎之

附治驗

一妊娠因停食服枳木丸胸腹不利飲食益少更服消導寬中之劑其胎下墜余謂此脾氣虛而不能承載也用補中益氣及六君子湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻調理而痊

木香丸 治妊娠脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉

木香仁 白朮炒 人參 白茯苓 各等分

右為末麵糊丸每服三四十九丸熱水下

白木散 治姙娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白木炒 紫蘇分一兩 人參 白芷各三錢炒

川芎 訶子皮 青皮各半兩 甘草錢炒一

右每服二錢薑水煎

附方

平胃散 方見七卷第十八論

補中益氣湯

六君子湯 二方見二十四卷第六論

四神丸 方見八卷第八論

八珍湯 方見二十四卷第四論

妊娠臟燥悲傷方論第十三

許孝士云下婦無故數次悲泣是為臟燥用大東湯而愈又程虎卿內姙娠五月慘感悲傷亦投大東湯而愈

一愚按前症或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

附治驗

一姙婦無故自悲用大東湯二劑而愈後復患又用前湯佐以

四君子加山桅而安

一姙婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹

湯為主佐以八珍湯而安

大東湯

甘草三兩 小麥三兩 大東散

右水六鍾煎三鍾分三服補脾氣

淡竹茹湯

治妊娠

心虛

驚悸

燥悲傷

或作

麥門冬心去

小麥

半夏

湯炮各一分

人參

白茯苓各一

甘草

分五

右薑棗并竹茹少許水煎

治胎臍燥悲哭用紅棗燒存性米飲調下

附方

四君子湯

方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

大醫曹院校註婦人良方大全卷之十五終



