



麻疹心得
 多紀桂山著
 (安長)

ヤ 9
 1089
 2



79
1089
2



麻疹心得

序説

麻疹ノ説ハ始テ宋ノ劉昉カ幼幼新書ニ見レ陳無擇

カ三因方ニモ載タリ去レ氏太夕疎畧ナリ特リ明ノ

萬密齋カ痘疹世醫心法ニ至テ頗ル備ル故ニ黄廉号銅

壁山人カ痘疹全書ハ萬氏ニ本ツキ其餘意ヲ廣メ管櫛

カ保赤全書ハ又夕黄氏ニ依テ增添ス痘科鍵全ク王保赤ヲ襲フ

肯堂カ證治準繩ニ至リ以上三家ノ方論ヲ輯メ自己

ノ經驗ヲ載ス赤水玄珠景岳全書錦囊秘録ノ類モ此皆萬氏ヲ祖トメ少々ツノ發明アリ

麻疹心得

書多堂藏板



91-1868



四家ハ淵源一派ナリ繆仲淳カ廣筆記ハ別ニ一家ノ
 方法ヲ立テ親ク驗アルヲ記タリ翁仲仁カ麻疹心法朱
 之黯カ治法綱ハ肯堂仲淳二家ノ書ヲ合セ僅カ少々
 體例ヲ異ニシタル者之馬之騏カ疹科纂要ハ前人ノ說
 ヲ襲ズ成方ヲ運用シテ實驗ノ論ナリ殷仲春カ痧疹
 心法ハ自己ノ論ハ數條ニ過ズサレ生死ヲ判斷スル
 ハ稍詳ナリ証ヲ列スル所潮熱ヨリ夾丹ニ至ルマテハ
徐君盛カ痘疹全書ノ上層ニ出ス只少々
ノ異同アリ又麻疹治法十三條ノ内豫夫曰ト云ヲ除
キテハ盡ク古今醫鑑ナリ左スレバ兩三家ノ論說ヲ湊
合シテ編タル 龔信カ古今醫鑑李挺カ醫學入門龔廷
賢カ 書トミヘタリ

回春全ク入ノ類畧セリトイヘ氏益ナキニアラス聶尚恒
 門ヲ襲フカ活幼心法モ方論簡約ナレ親切ナリ翟良カ痘科類
編ニ三方ノ効 稱スアルヲ 孫文胤カ丹臺玉案羅彦周カ醫宗粹元談金章
 カ幼科誠書ノ類モ經効ノ方劑ヲ載タレハ間々取ヘキ
 アリ特ニ石頑老人醫通ニ至テ辨證處方ノ條例大ニ
 備リ其說ニ從テ藥ヲ用ルニ其應桴鼓ノ如キモノアリ
 誠ニ麻疹ノ妙ヲ得ルモノナリコレニ繼クハ乾隆御纂ノ
 醫宗金鑑顧世澄カ瘍醫大全ノ類皆一二採ルヘキモノ
 アレ石頑カ詳悉的實ニ及ズ予諸家ノ長ヲ取り麻疹

麻疹心法
 二
 醫宗金鑑
 及

輯要ノ一書ヲ編メ凡未夕藁ヲ脱セズ此編ハ丙申年
 先考藍溪先生石頑ノ方論ヲ運用シテ處療スル二本
 キ今年予カ身驗スル一得ノ愚見ヲ雜ヘテ哀メ記シ
 タル之若シ重テ疹ノ行ハル、二十八年ノ後ニアラバ予
 年マサニ七十六ナリ存没ハカルベキニアラザレ凡幸ニ死
 セザルヲ得タリ凡毫ニ近クヒ劑ノ任ニ夕ヘザルベシ其
 時ニ當リテ兒輩此書ヲ披テ處療セハ萬黃管王各々
 增益アルカ如ク亦必ス心ニ得ルヲアリテ予カ先考ノ業
 ヲ推廣スルニ勝ルモノアラシ

麻源

麻疹ノ源ハ宋人ハ天行疫氣ノ病トス萬密齋アタリ
 ヨリ胎毒ノ説アリ然レ凡胎毒ト云ヘ凡天行ニ由ラザ
 ルヲ無トテ代天宣化丸韓氏五瘟丹ノ變方ニ等預解ノ方ヲ出シ
 タリ是ヨリ以來ハ胎毒ノ説ヲ主張ス談金章ニ至リテ
 ハ斷テ天行疫氣トシテ胎毒ノ説ヲ駁ス愚考ルニ我
 邦近古以來大抵二十余年ヲ期トシ西南ヨリ東北海
 内一般ニ傳染シ大小相似タルモノ疫ニアラスノ何ソ然
 レ凡終身一次ニテ再ヒ染ルヲ無キヲ痘毒ノ如クナレバ

赤胎毒ニアラズトモ云カタシ左スレバ先天固有ノ胎毒ヲ
 一種ノ疫氣行ワレ鼓動シテ發出スルモノナラン景岳カ
 説ニ痘前ニ在ルモノハ痘後ニ必ス復タ疹ス惟痘後ニ
 疹ヲ出ス者ハ方ニ結局タリト是レヲ今年ニ試ルニ
 予弟宗徳カ如キモ丙申ノ年痘前ニ患ヘ又今年モ患
 ヘタリ此外頗ル多シ其説信スベシ又一醫丙申ノ年痘後
 ニ患ヘ今年又患ルモノアリ因テ渠固ク執テ疫癘ノ説
 ヲ信シ胎毒ノ説ヲ破ル理アルニ似タレ氏實ニ千百人中
 ノ一人ニテ變ト云ヘシ變ヲ以テ常ヲ語ルベカラサルコトハ

麻疹ノ一事ニハカキルマシ麻疹ノ源ハ石頑黙シテ説ナ
 シ蓋シ見ル所アリト知ルベシ

談金章云方書但云疹亦胎毒殊属揣摩明係肺病發
 于皮毛試按諸方既係胎毒何以外發和解毫不及胎
 毒之藥耶况疹之症有終身不犯者有一人數犯者有
 數犯在一年內者或踰年而一犯者此豈胎毒耶邪從
 虛入疫癘相干診是症者必先明歲氣母伐天和可也

此説ニヨル片ハ唐土ニテ度々流行メ日本
 ノ北余年流行カ如キニハ非スト見ユ

統治

麻疹ノ初起ハ傷寒感冒ト同シク頭痛惡寒發熱身軀
疼痛シ欬嗽出テ嘔多ク惡心シ鼻涕出テ淚多ク痰多
ク腮赤ク眼胞腫ル或ハ初ヨリ咽ハシカク或ハ痛ナク
或不食或ハ相應ニ食スルアリ汗無キアリ汗出ルアリ
或ハ渴シ或煩悶ス先此時ハ葛根消毒飲ヲ用テ汗ヲ
發ス二三日ニメ面部額兩頰腮并ニ耳ノ前後紅點ヲ
發シ外ニ異証ナクハ前方ヲ用ユ夫ヨリ次第ニ胸腹背
ニ及ビ手ヨリ足ノ指マデ紅點ヲ發シ粒ダチ尖リ紅
潤ニシテ熱モ甚シカラス渴モナク兩便常ニ替ラズ食モ

相應ニ吃スル順証ナリ輕ク化毒清表湯ヲ用ユ輕キ
証ニテモ六七日ノアタリ一齊ニ發透セントスル日ハ熱
モ強ク或ハ惡寒モアリテ何ト云フナク苦シムモノニ
面部紅色薄ク疹散リ或ハ黒ミカリ或ハ白ク粉ヲフ
キタル如ク皮剥レ足ノ先キハ未夕収カ、ラサレ疔殘
リナク透發シテ粒尖ルニ至レバ苦ミモ除キ精神モ
爽快ナリ此時ニ熱解セザルハ前方ヲ用ユ全ク收リテ
熱除カサレ柴胡四物湯ヨシ熱解テ一通ノ肥立ト云
ニハ四物湯ニ防風黃芩連翹ヲ加テ調理ス是レ一應

ノ輕症ニテ十人カ七八人ハ是ニテ能事畢ルナリ
 萬氏ノ說ニ初熱一日強ク次日鷄鳴ノ時熱醒テ唯
 五心ニ微熱アリ欬嗽鼻涕出或ハ腹痛飲食漸ク減
 シ申酉ノ間ヨリ其熱復來ル如此ナル者四日用手
 髮際ノ処ヲ按ルニ甚夕熱シ腮赤ク眼淚多ク噴嚏
 頻ニ發シ或ハ衄血ス五日ニ至テ熱晝夜ヲ分タス
 六日早朝ニ疹出テ細々紅點兩頰ノ下ニ發シ午ノ
 時ニ至リ兩手背腰及渾身密々トメ紅点アリ七日
 ニ並ニ徧ク掀發シ鼻涕モ噴嚏モ止ミ七日ノ晚ニ

兩頰顔色漸ク淡シ此レ出疹ヲ驗ムルノ要法ト云
 ヘリ醫通ニモ尋常麻疹必ス六七日乃チ化ストアリ
 即此邦ニ七日ヲ峠トスル俗說ニ合ス何レ重証ト
 至テノ輕証ハ姑ク置キ七日ヲ限ルモノ實ニ驗ア
 リユヘニ七ニ四十九日ニテ食禁ヲ止ムルヲ萬氏等
 カ書ニ見ヘタリ
 熱盛
 初熱一旦ユルミ又夫ヨリ次第ニ盛ニ透盡ノ前ニ強
 ク苦ムハ内攻ヲ兼ヌルニ清熱透肌湯ニ宜シニ便不

通ナリ此方ニテ大抵ハ通ルニ若更ニ熱甚ク煩悶
シ謔語寧カラズ蛇ノ灰ニアルガ如ク蚓ノ塵ニアルガ如
ト云ヘル譬ニ同シキハ白虎湯合解毒湯ヲ用ユ透リ盡テ
熱解セサルハ竹葉石膏湯半夏代根繆氏三黃石膏加檉葉
湯亦可ナリ

形色

麻疹初起見ワカタザルハ斜目見之トアリ横ノ方ヨリス
カメミルベシ皮下ニ隱々タルモ又肉色ト一般ニ沸子ノ
如クブツクシタルモ能ク見ユルニ色黒ク麻面ノ人モ見ヘ

ガタシ右ノ如クニメ見ルベシ色紅潤ニ形尖リ地腫
脹ホトニ多ク發スルハ順ナリ又色白ク肉色ト分タズ惟
點粒ノ高ク聳ヘタルカ晬時ニメ没スルハ邪熱ノ本輕
キニ虛ニハアラズ若色紅潤ナレハ尖ザルハ邪熱甚ク
壅遏スルユヘニ二便必ス秘瀯ス清熱透肌湯ニ宜シ又
色ツヤナク黯ニメ尖起ラズ大便秘結シ舌脣燥キ赤キ
ハ火邪ノ内鬱ナリ白虎湯ニ加玄參荆芥若粒焦レタ
ルハ色ノ淡紅ニカマイナク熱劇ノ証ナリ白虎湯ニ石
膏ヲ增テ用ユ汗無キハ麻黃ヲ加フ大便秘スルハ涼膈

散ニ宜シ色至テ紅ク紫黒ヲ帶ヒ熱勢モ盛ナルハ血中
ノ熱毒甚シキニ涼血飲子大青湯大青代 青黛ニテ犀角ノ
末日ニ壹冬ヲ用ユ又白色ニテ紅潤ナラズ熱勢ノ緩ナ
ルハ血虛ナリ養血化斑湯虛甚キハ養榮湯ヲ用ユ保
赤ニ麻ハ朶ヲナスト云テ蚊蚤ノ跡小紅點カ一レキリク
ニアツマリテ出ヅ又尤ナキ大小ソロハズニハラリト出ルアリ
又大キニ片ヲナシ雲頭ノ如クムラクト斑ヲナシ焮ナルアリ
又大片ノ上ニ復無數ノ小紅點アルアリ惣テ大片ヲナスモ
ノハ火邪ノ熾盛ナルハ白虎加玄參竹葉湯ノ類他証ヲ

致テ劑ヲ投スベシ

不透

葛根消毒飲ヲ用テ面部ナト少々見レ凡皮膚乾燥シ
テ毛竅竦慄ニメ二三日或ハ五六日ニ及テモ增長セ
サ六皮膚堅厚ニメ腠理閉塞ナルカ又ハ風寒ノ襲タル
ニ準繩麻黃湯ニテ檉葉散ヲ用ユ喘アルハ麻黃杏仁
甘草石膏湯ニ宜シ若又汗出ルヲ多ク熱勢ノ甚カラ
ザハ中氣ノ本虛ナリ消毒飲合ニ仙散檉葉ヲ加フ又
熱邪擁遏ニテ發セザルハ小便赤澁口渴煩躁ス清熱

透肌湯便秘ルハ涼膈散若頭粒隠々トシテ紅紫一片ニ
テ表工透ラザルハ火毒盛ナルニ白虎湯ニ加荆芥玄參

脉腹

麻疹ノ脉ハ大抵浮大滑數或緊弦數ナレハ熱ノ浮沈ニ
應テ緩急アリ又初メハ甚タ數ナラスメ緩漫ニ透發ノ
際ニ數急ナルアリ陶氏ガ所謂証ヲ取テ脉ヲ取ザルアリ
熱甚ノ片ハ多クハ洪大無カナリ石膏等ノ藥ヲ用ヒ
熱解テ脉カ出ルアリヨク々証ト參ヘ察スベシ只萬氏
右脉無カヲ虚トス云ヘリ没後ノ諸証ニハ符合スルモノ

多シ○腹部ヲ揣ルニ多クハ胸脇苦滿シテ按ヲ拒ムニ
熱盛ノ際ハ鳩尾ノ下動氣鼓築ノ勢ハ甚シ疹子透發
ノ候ナリ没後不食ハ多ク心下痞鞭スルモノニ若シ不
食ト没後ノ痢ト心下痞鞭等ノ候ナク腹部一体ニ按
テ痛ム処ナキハ口舌乾燥舌胎等アリト云ハ寒涼剋伐ノ
藥ヲ用ユルヲ勿レ暗ニ大虚ノ証アルモノナリ宜ク心ヲ
用テ察揣スベシ没後虚里ノ動強ク或ハ滿腹
動氣アルモノアリ吉兆ニアラズ

麻疹舌ニ胎アラザルモノ稀ニ然レハ白胎黃胎アレハ潤滑

ニメ乾燥スルモノ少シ舌上白胎滑ハ傷寒ナレハ附子ノ
主トスル証ナレハ小便ノ赤瀉ヲ的トシテ石膏黃連大黃
ノ属ヲ用テ妨ナシ若黒胎アリテ燥ニハ白虎湯ニ麥門
竹葉ヲ加ヘ濕ニハ生地玄參ヲ加フ

出遲

麻疹ノ熱初メ壯熱シ夫ヨリ乍涼乍熱シ荏苒七八日
或十二三日或ハ半月ニメ出ルモノアリ出後千尋常ノ
証ト同ク収没ストイハ凡多クハ痧癘トナルモノアリ或
四五日少ク紅點ヲ發シ諸方ヲ投テ發透セズ十餘日

不食一時湧出シ精神恍惚舌澁テ語セズ煩悶寧カラ
ナルモノハ死ス是レ元氣應ゼズ疹透テ元氣脱スルニ
ナリ胸背腰腹等ノ煖處起發シテ紅ニ頭面手足ニ乍
有乍無キモノアリ此証ハ纏綿トメ難已タトヘ没スル凡
後五七日ニメ復前ノ如クニ發シ兩三次ニメ愈ニ間一月
モ經テ愈ルアリ消毒飲合ニ仙散ノ類ニテ款々ニ治ス
ベシ速効ヲ求メント欲セハ轉々危殆ヲ増スト石頑モ云ヘリ

部位

麻疹ハ頭面多キモノ順ナリ先胸腹ノ煖處ヨリ起リ漸

々手ヨリ足ニ及ブハ順ナリ手足ヨリ起リ漸ク胸腹背
 ニ發スル者ハ逆ナリ惣テ頭ヨリ起リテ足ニ至ルモノハ
 出齊トス俗ニ麻ハ耳後ニ始リテ足ノ脛中ニ發スルニ
 終ルト云亦理アリ 丙申年予妹手掌中ヨリ初テ發ス重
 証ニ近カリレガ収没ノ後他異ナレ
 萬氏以來麻疹出沒六時ヲ準トス假令ハ子ノ後ニ
 出ルハ午ノ時ニ収リ午ノ後ニ出ルハ子ノ時ニ収リ
 出沒三次ニメ収ルト云說諸書ニ見ヘタリ是レヲ試ル
 ニ曾テ其言ノ如クナラス景日暘カ嵩厓尊生書ニ此
 說ヲ舉テ必定シガタキト云ヘリ然ラハ其說モ理ヲ推

テ立タルモノト見ヘタリ

發泄

麻疹ハ疎泄ヲヨシトス故ニ汗嚏鼻涕眼淚鼻血嘔吐瀉
 下欬嗽ノ類ハ皆好ム所ナリ

沒早

麻疹出テ邊ニ引クコトアリ或ハ風寒ニ中ルカ誤テ酸キ物
 ヲ食フニ因ル周身ノ煖處マデ紅影無キハ危証ニ若暖處
 猶沒セザルモノハ其因ヲ詳ニメ急ニ療理スベシ若シ風寒ニ
 中テ内攻メ早ク沒スルハ消毒飲ニ葱白ヲ加ヘテ煎ス甚

キハ麻黄穿山甲ヲ加フ或ハ越婢湯ノ類ヲ用ユ急ニ
 治セザレバ喘脹シテ死ス又惣身青紫熱腫喘脹氣急ナルモ
 ノハ毒滯血凝ナリ涼膈散ニ去苾硝、麻黄石膏ヲ加フ
 若シ腹脹喘促小便瀦リ臍突出スル者ハ涼膈散ニ加
 葶藶今牽牛頭末ヲ点服ス若内ニ痰熱ヲ挾ニ煩躁腹
 脹喘急シテ人事ヲ省ニサハル者ハ白虎湯加玄參竹葉
 若誤テ酸醋收斂ノ物ヲ吃テ壯熱喘欬煩悶スルハ一味
 甘州湯ニテ吐スベシ或ハ苦瓠甘草煎湯ヲ用テ吐ヲ取
 ルヲヨレトス今年白梅ヲ食テ死スルモノ多シ予皆十後ニ

聞ケリ若魚肉ヲ食フニ因テ喘脹氣急ナラバ枳殼湯加
 山查苾硝或ハ大病ノ後洞泄シテ脾胃虛メ從スルヲ能
 スメ没ルヲ早キアリ本方錢氏ガ白朮散虛寒甚キハ理中
 ノ葷ニ宜シ以上ハ皆石頑カ述スル所ニテ今日ニ試
 ルニ其應嚮ノ如シ左レ氏没早ノ一証ハ十中一二ヲ
 救ベシ妄ニ藥ヲ與ヘガタシ又没早熱毒内攻ニ白虎合黃
 連解毒湯ヲ與ヘ兼テ紫雪ヲ用ヒ万一ヲ救フベシ

汗

麻疹微汗スベシ汗アハ邪透リマスレ汗太多ケレバ陽ノ

患アリ若シ壯熱シテ汗ナク皮膚乾燥スルハ風寒ノ壅滯
 ナリ多クハ内攻シ或ハ腹脹痛シ或ハ喘促ヲ發ス輕キ
 ハ葛根消毒飲ニ檉葉ヲ加ヘ重キハ越脾湯ニ檉葉散ヲ
 点服ス又熱極テ火鬱シ皮膚乾燥シテ出難キハ必ズ
 脣舌燥裂ノ二便秘瀆シ壯熱昏沈身体脹痛喘促痰鳴
 ス白虎湯加檉葉ヲ用ユ惣テ麻疹ハ熱々汗出ルヲ順
 候トス

渴

麻疹渴セザルハナシ若渴甚ク二便秘瀆スルハ準繩ノ白虎

合解毒湯ニ宜シ若尋常ノ渴ハ保赤ノ菘豆甘州炒米
 三味ヲ煎シ湯水ニ代フ停水ノ患ナシ又煩躁等ノ劇
 証ナク白虎解毒ニ及ザルハ門冬甘露飲若シ二便清
 利シ格別ノ熱ナク渴スルハ寒涼大過シテ脾胃ノ津液不
 足ナルナリ錢氏白朮散去木香加粳米正ニ没セントメ渴
 アルハ竹葉石膏湯去半夏加枯樓根渴テ至テ熱湯ヲ好ムハ熱ノ熾盛ナルニ
 誤認テ虛冷ト
 ナスヲ勿レ

欬嗽

欬嗽スルハ麻疹發泄スルユヘ甚シキヲヨシトス發シ透レ

バ自ラ止ム若シ初起ニ強キハ消毒合瀉白散出テ、熱
 盛ニ效スル除熱清肺湯ニ宜シ發透正没ノ間一時效嗽
 頻併氣促悶乱スルハ白虎湯稍輕キハ蠱虎湯没後效嗽
 出ルハ滋咽清肺湯重キ者ハ門冬清肺飲若咽喉痛口
 舌瘡ヲ生スルハ甘桔湯加苓連没後效嗽久不已諸藥
 効十ク亦他症無キモノハ犀角解毒化痰清火丸効ア
 リ

喘

麻疹發セントメ喘スル者ハ邪熱肺ニ壅ルナリ繆氏カ竹

葉石膏湯或ハ三拗湯加石膏檉葉ニ宜シ没メ後喘ス

ルハ治シカタシ輕キモノハ清咽滋肺湯重キ者ハ竹

葉石膏湯半夏代瓜萋根譫語アルハ辰砂益元散加牛黃或ハ大

無比散ヲ兼用シ甚シキハ紫雪ヲ用ユ若シ擗肩鼻扇

胸高ク龜ノ如ク手ヲ擺リ頭ヲ揺スハ不治ノ証ニ若

以上ノ惡証無ク凡小便清利大便溏泄メ身ニ大熱十

キ者ハ虚ニ属ス亦治シ難シ喘メ嗽ヲ兼ヌルハ治シ易ク嗽セスメ喘スル治

レ難シ是レ大槩ニ

嘔吐

初熱ノトキ嘔吐スル者ハ順ナリ若藥食トモニ受ガレ
 ハ濟生竹茹湯ニ宜シ出ントメ嘔スル者石頑カ消毒飲
 加黃連枳實ヲ用テ愈吐メ煩悶スルハ竹茹石膏湯正ニ
 没セントスル片嘔吐スルモ右ノ方ニテ宜シ若シ又藥氣ヲ
 惡ミ胸中煩熱メ悶乱スルハ小半夏加茯苓更ニ石膏ヲ
 加ヘ煎シ冷シ少々呷ハシム若シ猶ヲ嘔吐止ガレ辰苓
 散五七分ヲ以テ冷水ニ送り下ス必ス定ル是レ已ム
 一ヲ得サル片ノ策ナリ又胃虛ノモノアリニ便清利スル
 錢氏白朮散ノ類増減メ用ユベシ

瀉



疹家瀉ヲ忌ズ瀉スレバ熱毒開キ泄ル故ニ去レ凡瀉利
 數行ニテ小便短濇ナルハ升麻澤瀉湯加味四苓散ノ類
 ヲ用ユ熱渴甚シキハ白虎湯去知母易麥門若シ瀉利シ
 テ快カラス腹痛脹滿シ或ハ臭キ噯氣出ルハ食滯ナリ枳
 殼湯ニ山查麥芽木通ヲ加フ若シ瀉下スルモノ白朮ニ
 テ腹疼ミ按スコヲ喜ムハ寒ニ屬ス胃苓湯ニ蒼朮ヲ
 去リ炮姜ヲ加フ此証ハ稀レニテ先ハ熱ニ屬スルモノ多
 キニ没後ノ瀉ハ多ク寒涼ヲ用テ脾胃ヲ尅伐シタルヨ

麻疹心傳
麻疹ノ疹ハ邪熱内陷スルニヨル正ニ没シ或ハ没メ後赤
リ發ルモノアリ理中ノ輩ニ宜シ

痢

麻疹ノ痢ハ邪熱内陷スルニヨル正ニ没シ或ハ没メ後赤
白下利裏急後重スルハ清熱導滯湯又ハ準繩ノ加味黃
芩湯ニ宜シ没後ノ痢ハ繆氏カニ方甚効アリ若日數
稍久キハ銅壁山人黃芩湯方中ニ人參アリ瀉久クメ痢トナル
者ハ連理湯乾姜黃芩黃連人參湯撰ヒ用ユ食積ヨリ
痢ヲナス者ハ枳殼湯ニ山查麥芽木通ヲ加フ腹中脹痛
シ時ニ痛時ニ止ムハ厚朴湯若シ裏急後重ノ勢ナク腹

痛マズ按テ痛ム処ナク度數モ多カラズ吐水不食ノ者ハ
小便不利赤濁舌胎口燥ス凡必寒涼ヲ用ユベカラズ脉
虛軟ニテ微ク數アハ内虚ニ属ス卒ニ脫陽ノ形ヲ見
スモノニ如是モノハ虚痢ノ藥ヲ用ユベシ若シ痢下紫黑ニ
メ癰膿ノ如ク屋漏水ノ如ク鶏肝色ノ如ク黑豆汁ノ
如ク氣喘躁渴熱甚ク呃逆シ噤口不食疹ノ色紫晦ナ
ル者ハ不治ナリ○麻疹痢疾ニ檉葉一味末トナシ砂
糖湯ニテ一錢ヲ送り下ス下繆氏カ方ニテ効アリ去
レ凡青臭キヲ嫌テ服スル者稀レシ

便秘

便秘ノ証表熱熾盛ニ因ルモノ石膏ヲ用ユレハ自然ト通
 利スル之或ハ通セザルモノハ三黃湯沸湯ニ擺出シ用ユ若
 熱甚ナルハ涼膈散ニテ速ニ通利スベシ或ハ腹滿實痛ニ
 ハ大承氣湯一二帖ヲ用ヒ通利セバ他藥ヲ用ユ若血
 燥テ結スルハ四順清涼飲ニ宜シ便秘ノ証瀉利ノ藥ヲ
 用ズ變テ麻疹焦レ紫色ニナリテ救難キアリ大抵首尾
 共大便通利スルヲ好トス

小便不利

小便赤澀又ハ小便ノ遠キハ初熱正出ノ時ハ邪熱瀉
 滲シ汗ヨリモ津液泄ルユヘ正候トス通利ノ藥ヲ用ルニ
 及ス没後赤澀スル餘熱膀胱ニ匿ルモノニ導赤散ニ
 加麥冬兼テ辰砂益元散ヲ用ユ大便秘閉スルモノハ大
 便利スレバ小便必ズ通ズ

腹痛

腹痛多クハ毒氣ノ内鬱ニ因ル發表解毒ノ劑ヲ用ユ
 レバ治セズメ自ラ愈ユ或ハ飲食停滯ヲ兼ヌルハ金鑑ノ加
 味平胃散若シ便秘スルハ承氣丸ヲ兼用ス尚ヲ他症ヲ

考へ藥ヲ投ゼヨ又疔ヲ兼ルアリ治疔ノ藥ヲ兼用ユ又
虻ニ因ルアリ下ノ虻ノ藥ヲ用ユベシ

聲啞

欬嗽甚ク聲啞スルモノ麻疹ノ常ナリ清咽滋肺湯宜シ
最モ甚キハ金鑑ノ加味涼膈散兼テ児茶散ヲ用ユ殷
氏カ訶子一味水ニ磨シ服スルモ亦効アリ若シ瘡テ腫
痛スル者ハ射干消毒飲

氣促

氣促ハ呼吸ノセワシキニ初メ壯熱ノ片ハ清熱透肌湯
ニ宜シ若喉中ニ痰アリテ齁齁シテ鳴ルモノハ熱邪ノ阻
逆スルナリ初發并ニ正出ノ間ハ除熱清肺湯没後ニ止
マザルハ最モ難治ナリ多クハ餘熱内攻メ肺氣傷ヲ受
ルニ因ル

唇

唇ノ燥テ色淡ナルハ輕シ赤キハ熱深シ紫黒ナルハ熱劇
シ輕重ニ從テ清潤ノ藥ヲ用ヨ又唇舌破裂スルハ火毒
ノ上衝スルニ白虎合解毒湯ノ類ニ宜シ若シ正ニ没セン
トスル時又ハ没後ニ見ルハ心脾ノ絶トス又紫黒枯燥

メ血活セガルモ難治ナリ

牙疳

正没々後ニ齒齲ノ爛レテ飲食ニ艱ナルアリ桔梗散ヲ
用テ含漱ス一二帖ニメ愈ユ惣テ口瘡モ此方ニ宜シ
或ハ漱了テ柳花散加砂ヲ傳テ最ヨシ一人透發ノ際
卒ニ齒齲紫黒ニ變シ痛ミ兩頰ニ徹シ號呼悶乱疹色
亦夕紫黒ニ變ズ此火毒上逆ナリ犀角地黄湯ニ合三
黃湯與ヘ服セシムニ帖ニメ痛定リ五帖ニメ色常ニ復
ス一晝夜ニ犀角屑ヲ
點服スルヲ三夕餘ニ若シ齒齲腐爛紫色ナル牙疳ニ

加味清胃散ニ加石膏荆芥外ニ銅綠人中白ノ末ヲ擦
ル大便秘スルハ犀角地黄合三黃湯若齲尽ク白ク或ハ
外ヨリ内ニ延入者膿血ナキ者齒落ナク口臭キ者喘促
痰鳴ノ者皆不治ナリ

眼

眼光水ノ如ク眵淚多ク或ハ白睛微紅ナルハ麻疹ノ正
候ニ若疹子發出シテ匏脹シ眼胞塞テ不開或ハ明ヲ
羞ルモノハ護目膏ヲ塗リテコレヲ防クベシ若赤脉多ク澁
痛スル者ハ退赤散ニテ薰洗スルモ亦ヨシ収没ノ後眼

赤ク或ハ翳ヲ生シ或ハ赤爛スル者ハ柴胡飲子
羚羊角散ノ類撰ヒ用ユベシ麻後眼疾終身ノ患ヲナスモ
ノアリ忽ニスベカラズ

睡

正出ノ時不寐ハ常候ナリ若シ精神困倦メ沈睡醒ガ
ルハ邪火内鬱メ正氣勝タサルニ逆トス然レハ發透シ
盡レハ神爽ナルモノ之若没メ後沈睡醒メガル者ハ氣血ノ
兩虚ニ養榮湯ニ遠志酸棗ヲ加フ若シ没後煩擾メ反
テ寐ザルハ餘火ナリ當歸養榮湯ニ拔萃ノ朱砂安神丸

ヲ下ス若シ昏睡メ起止ヲ知ラス疼痒ヲ知ラス寐ニ似テ寐
ニアラサルハ正出没後ヲ問フテ無ク大ニ凶候ナリ多クハ元
氣虚脱ニヨル當ニ兼証在ニ脉腹ヲ察テ施治スベシ

不食

不食ハ胃中ノ邪熱熾盛ニ因ル強テ與フ可カラズ數日
ナリハ妨ナレ初發正出ノ時ニ絶食ニモ近キハ白虎湯ヲ
用ユ麻透リ熱清レハ自ラ能ク食ス没後不食ノ者ハ
石斛清胃散或ハ錢氏白朮散去木香加黃連若久ク不
食シ脾胃虚憊シテ危篤ニ及ブモノアリ宜ク深ク察スベシ

蛇

吐蛇スルモノハ邪熱熾盛ニメ不食スルニ因テ蛇安カラズメ
 吐出ス麻疹ノ藥ヲ用ヒ兼テ椒連丸ヲ用ユ若シ嘔吐
 惡心胸悶スル者ハ清中安蛇湯ニ宜シ若シ嘔吐止ガル者
 ハ竹茹石膏湯ニ兼テ椒連丸ヲ用ユ妊婦マ、此証アリ
 若シ吐蛇多ク不食脈數疾ナルハ胃敗テ死ス○虫ヲ下
 スト多ク没後ニアリ胃熱メ食少ク虫安スニスルヲ能ワズ
 メ下ルナリ飲食ヲ調ユバ自ラ愈
一老醫云丙申年ニ理
 中安蛇湯ヲ用ヒ藥殺
 セシトアリ
 ト恐ルベシ

口臭

口臭穢濁ナルハ熱邪胃ニ蘊ムカユヘニ清胃散ニ石膏連
 翹甘草ヲ加フ其臭氣甚キハ胃敗ニテ不治ニ

身冷

麻疹ハ陽熱甚ナルニ因テ肢體溫暖ナルベキニ却テ清冷
 ニメ冰ノ如クナルハ逆ニ没後下體厥冷メ膝ヲ過ル者
 腎敗ニメ不治ニ若初メ出テ、腰以下熱セズ毒透ル
 能ワズ反テ漸クニ没スル者モ亦逆候トス急ニ脾腎ヲ養
 フベシ或ハ生ヲ得ル者アリト醫通ニ見ユ未タ如此ノ証

ヲ見ズ

譫妄

譫妄ハ邪熱熾盛ナル者ノ常候ニ火邪内伏メ表ニ透ラズ故ニ譫妄アリ白虎湯ニ加荆芥牛旁子煎テ大無比散ヲ用ユ若シ没後ニアルハ餘熱心ニ乘ズルニ竹葉石膏湯去半夏加生苳又熱勢甚シカラズ譫語アルモノハ多クハ癩証ヲ挾ムナリ兼テ朱砂安神丸ヲ與フ

血

麻疹ノ血アル傷寒紅汗ニ同ク初起ニハ順候トス發透正

没ノ時疹色赤紫血多キモノハ亂髮灰鼻中ニ吹入レ犀角地黄湯ヲ用ユ若シ熱甚キハ犀角地黄湯ニ黃連解毒湯ヲ合ス血出ルヲ多キハ脉沈弱數ナル者多シ遽ニ補澁ノ藥ヲ與フ可カラス没後衄スル者ハ四物湯加卮子麥門百草霜

發搐

發搐ハ痰熱心包ニ聚ルニ初發未透ノ時ハ清熱透肌湯ニ萇仁竹葉ヲ加フ没後見ルハ難治ニ當歸養血湯煎テ黃連安神丸ヲ用ユ金石ノ藥ヲ用ユベカラス若痰涎壅

盛ナル者ハ一味ノ括萋煎汁ニテ吐出スベシ若擗メ痰
鳴ナク或ハ自ラ指ヲ嚙ム者ハ真ノ擗ニハアラス此レ正
氣虚メ主持スルヲ能ハザル故ニ必ス死ス

咬牙

咬牙痘ニハ寒熱ノ分アリ麻疹ニ有テハ皆ナ熱ニ属ス故
ニ多クハ渴メ手足熱シ喜テ冷ヲ飲ム麥門冬湯ニ加丹
皮若手足熱セズ反テ厥冷喜テ熱ヲ飲ムハ此レ熱邪内
攻後必ズ下血ス咽喉痛ヲ作シ痰鳴メ死ス白虎湯ヲ
與フ多クハ救フベカラズ

癩

一人正没ノ時惡寒至テ甚ク鼓頷シ又忽ニ壯熱ス惡
寒ノ時ハ殊ニ煩悶甚ク苦惱名ツク可カラズ脉弦急ニ
メ數左大右小心下胸脇ノ下鞭滿シ按テ痛ミアリ是レ
邪熱肝膽ニ伏シ癩証ヲ動スルモノ之景岳白虎煎ニ黃
連ヲ加ヘ兼テ辰砂益氣散ヲ用ユ即日ニメ諸証定ル凡麻
疹ノ熱ニテ平素癩疾アル人ハ種々ノ異証ヲ發スルモノ
ニ能々心ヲ用テ診スベシ

妊婦

蘇 大 心 得

七 建 修 堂 藏 板

妊婦麻疹初起ニ景岳力透邪煎ニ牛旁子檉葉ヲ加ヘ
 用ヒ若熱盛ニ至リテハ清熱透肌湯加檉葉ノ類ニ宜シ
 嘔逆吐衄ヲ兼ヌルモノ多シ竹茹石膏湯兼テ椒連丸ヲ
 用ヨ欬喘甚ク上逆悶乱スルニハ白虎湯ニ麥門冬ヲ加
 フ古人云麻ハ火候ニ属ス最モ胎ヲ墮シ易シト火ヲ清
 クスルハ石膏ニ如クモノナレ故ニ妊婦胎ヲ墮サント欲
 セバ必ズ石膏ヲ用ユベシ纂要ニ妊婦疹出テ、快カラザルハ
 升麻葛根湯ニ白虎湯ヲ合シ玄參牛旁子ヲ加フト甚タ良
 方ニテ火清ク熱解スレバ胎自ラ全安ニ予妊婦ヲ治スル十

餘人多ク劇証ニ遇ヘ凡一人胎ヲ墮スモノナレ皆ナシ石膏ノ

カナリ 虚ノ兼ルハ西
洋參ヲ加フ

保赤ニ孕婦麻疹ハ四物湯ニ白朮條芩艾葉ヲ倍メ
 安シト醫通ニハ四物湯ニ條芩艾葉荆芥紫蘇ノ類ヲ
 加フトアリ予今年治スル所多クハ嘔逆惡心ヲ兼四物
 ノ類ハ胸ニ泥ミ嘔ヲ助ケテ服レ得ルモノナレ故ニ多
 ク効ヲ見ズ○纂要ニ孕婦麻疹熱甚ノ胎氣安カラザ
 ル者ハ固胎飲ヲ用ユ 丹溪纂要ニ本
出タル方ナリ 若コレヲ服テ腹痛腰
 酸スルハ胎必ス墮ルニ在リ即チ産法ヲ以テ論ズ先ツ大

補ヲ用ヒ次ニ他症ノ藥ヲ用ヒハ胎動クトイヘ凡婦ハ生ク
可レトアリコレモ胎動ニ遇ハザレハ試用セズ○又保赤ニ如
シ胎氣上ニ衝カハ急ニ苧麻根艾葉煎ニテ生栝榔末
ヲ服ス多ク上藥ヲ服スレテ妙トストアリ是レモ亦夕上冲ノ証
ニ逢サレハ其効ヲ知ラズ附録ノ後來ノ試験ニ備フ

臨月

妊婦臨月ノ麻疹ハ治法前ニ同シ惟々分娩ノ際一時
邪熱血分ニ犯サンコトヲ恐ル故ニ四物湯合黃連解毒湯ヲ用
ユ若シ惡露下ラザルハ破血ノ藥ヲ兼用ス此際ノ治術方

法古人ノ書載ルモノヲ見ズ宜ク臨機應變ナルベシ証ノ
輕重ニ隨ヒ麻疹産後ノ方藥一ヲ主トシ一ヲ兼用ト
シテ可ナルベシ茲ニ治驗一則ヲ舉ケテ治例ヲ示ス

婦人年二十歳妊娠彌月ニ至テ惡寒發熱欬咽痛
等ノ諸証具ル透邪煎ヲ用三日疹子已ニ面ニ發シ
四日夜半ノ後忽チ陣痛分娩ス急ニ予ヲ邀フ予至
テ診ルニ疹子紅潤ニ出ルモノ五六分熱甚渴スルヲ頻
ニ六脉浮滑數ナリ胞衣ハ尋テ下レ凡惡露未夕下
ラス腹ヲ揣ルニ燒熱シ少腹コレヲ按バ痛ム因テ四物

解毒湯ニ加牛旁子荆芥別ニ良方ノ牛膝散ニ去木
 香加紅花ヲ以テ間ヘ服サシム第六日ニ至リ透發ノ
 勢アリテ熱甚ク欬嗽微喘氣ヤ、短促ニ時ニ譫語ス
 因テ改メテ繆氏カ竹葉石膏湯ヲ用ユ第七日疹子
 盡ク透發ス大便ノ通ル一產前一日アリテ秘スル一四
 日因テ思産後不大便ハ常候ナリト云ヘ凡疹家ニ在テ
 ハ忌ム所ナリ恐クハ毒氣壅閉ノ患アラシ且惡露猶
 下ル一稀ナルヲ以テ牛膝散加減ニ更ニ大黃ヲ加フ
 第八日ノ曉ニ大便通ル一椀斗リ初ハ鞭ク後溏ス

因テ大黃ヲ去ル疹漸ク没ス但小便不利赤瀉ニ欬
 喘氣促燒熱依然タリ本方猶前劑ヲ用ヒ兼テ牛膝
 散ヲ用ヒ第九日熱半ハ解シ譫語止シ惡露稍々ニ
 下ル但小便赤瀉下體微腫ス更ニ辰砂益元散ヲ用
 ユ此方第六日ヨリ用ユ赤瀉微腫以後ハ多服セシム第十日第十一日更ニ前方ヲ
 用ヒ諸証初テ愈ヘ氣促稍定ル第十二日ニ至テ改
 テ當歸養血湯ノ一方ヲ用ヒ時ニ辰砂益元散ヲ用
 ユ後七八日諸証全愈ヘタリ唯々時々欬嗽出ヅ清金
 寧嗽湯ヲ用ヒ連日不止婦人素ヨリ色白體弱脉虛

數ナリ恐クハ痧勞トナラン劫勞散ニ粟殼ヲ加ヘ用ルコト十
 餘日效止脈平ナリ其兒疹中ニ生ル故遍身赤疹アツ
 テ分娩ス啞科療ツルコト數日ニメ疹没ス此婦人子ヲ産
 スルコト二次皆一臘ノ中ニ殤ス此ニ至テ母子雙ヲ安ク
 舉家歡喜スト云

半産

妊婦麻疹墮胎スルモノ多クハ透發正没熱盛ノ時ニアリ古
 人云麻ハ内虛ニ宜シ故ニ胎落テ母存スト是ノ說大ニ然
 ラス胎落テ後死スルモノ十二常ニ七八大抵其証燒熱止

ズ欬嗽喘急氣促擡肩虛里動甚シク心胸滿悶譫妄恍
 惚渴テ引飲脈滑數或ハ虛大或緊細數疾等ナリ或ハ
 墮テ後四五日ニ死スルアリ或ハ熱甚シカラス荏苒トメ痧
 勞トナリ死スルアリ必竟保ツ可キモノ、保タザルハ元氣旺セ
 ズ邪熱熾盛ナルニ因ル是ニテ其ノ生ヲ得難キコト知ヘシ墮
 後熱盛ニ前証アルハ急ニ竹葉石膏湯半夏代枯藁根脈
 虛スルモノハ每帖洋參三五分ヲ用ヒ煎テ牛黃辰砂益元
 散ヲ用ユ譫妄止テ氣息平穩ヲ俟テ初テ慮リ無ルベシ次
 ニ當歸養血湯ヲ用テ調理ス此証十餘人ヲ診ス藥ヲ

與テ治スルモノ西三人ニ過ギズ

浮腫

麻後脾氣調フラス腹脹面目四肢浮腫スルモノハ小便ヲ分
利スベシ茯苓琥珀湯ニ去桂枝加防己車前子若餘毒壅
遏ノ腫ルモノハ河間ガ結陽ヲ治スル犀角湯甚効アリ此
餘ハ大抵尋常ノ水腫ト同シ虚實ヲ量テ治療スベシ若シ
元氣大虚シ陰陽升降セズ小便不利上部腫多ク喘促嘔
惡不食ノ者ハ難治ニ

脚氣

麻後面部微浮黯黑肩背重ク両手両脚亦微腫麻痺シ
膝頭緩弱或ハ臑膈拘攣心下痞滿呼吸短息虚里跳動
スルモノハ脚氣ナリ尤難治トス若嘔吐喘促擡肩不食小
便不利脉細數或ハ虚大駛ナルハ衝心シテ死ス當ニ千金
外臺脚氣ノ諸方ヲ撰用スベシ若脉虚ニ便清利スルモノハ
六物附子湯或ハ千金附子湯ノ属ヲ用テ妨ケナシ或ハ
麻痺痿弱手足共ニ廢スルモノアリ血液ヲ補養スルヲ主ト
スベシ大防風湯局方續斷圓附子アリノ属ニ宜シ今年此証
ルモノ
多クアリ全愈ヲ得ルモノ稀レシ

痔

麻後痔疾ヲ發スルモノ多シ或ハ肛邊腫核ヲ起シ疼甚キアリ加味當歸湯ニ穿山甲皂角刺ヲ加フ熱毒甚キハ大黃牡丹湯一應ノ痔疾ハ壽世ノ祛風辟痔湯輕キモノハ四物湯ニ槐花黃栢紅花ヲ加テ効アリ

痧勞

麻後熱解セス脉數或盜汗日久ク減セザルハ柴胡門冬散柴胡四物湯ニ宜シ或ハ吳又可カ柴胡養榮湯ヲ用ユ若シ惡心アラハ外臺竹葉飲即竹葉石膏湯去石膏或ハ鼈甲胡黃連

ヲ加テ効アリ若シ午後潮熱欬吐痰盜汗脉虛數ナル者ハ痧勞トナル難治ニ金匱麥門冬湯纂要養榮湯并ニ鼈甲阿膠五味子ヲ加フ或ハ婦人良方ノ劫勞散ニ前藥ヲ加ヘ用ユ兼テ犀角解毒化痰清火丸ヲ用ユ若シ欬甚ク徹夜不寐ノモノハ醫鑑ノ一粒金丹朝一粒夕一粒煎湯ニテ用若吐血欬血ハ犀角地黄湯涼榮湯ノ属ニ宜シ又疳勞ヲ生スルヲ痧疳ト云直指ノ黃芪湯或ハ消疳飲ニ清熱除疳丸ヲ兼用ス又身熱口渴或ハ肚熱足冷膨脹氣急小便自利大便滑泄形体羸瘦脉虛細數ニ補藥ヲ受ケザルモノ皆

不治ニ

瘡

痧後ノ瘡ハ常瘡ニ異ナラズ繆氏カ一方法ノ如クニ用ルニ甚効アリ

調理

麻後ノ調理ハ四物湯ニ連翹黃芩玄參ヲ加ヘ用ユ若諸証愈テ後惡心不食スルハ竹茹石膏湯石膏代花粉加黃連若シ虚弱ナルモノハ繆氏カ痧後元氣復セズ脾胃弱キヲ治スル一方ヲ用ユベシ或ハ虛羸スルハ纂要ノ養榮湯

柴胡四物湯ニ宜シ醫通ニ雙和湯ヲ主トスレト桂枝アルユヘ容易ニ用ヒ難シ

麻後瘡

麻後ニ小瘡ヲ發シ周身搔痒ニ夕ヘザルアリ瘡藥薰塗治ヲ失ヘハ終身ノ患トナリ年々舊ニ依テ發スルナリ連翹生地散ニ宜シ麻後瘡癩等一切ノ餘毒ハ大連翹飲龔氏ガ十全湯ノ類ニ宜シ又纂要ニ麻疹沒後瘡ヲ生シ及眼目諸証ニハ黃連解毒湯ヲ以テ加減メ治ストアリ証ニ依ルベシ○麻後瘡ハ早く生水ニ浴スルヨリ起ルト醫通ニミ

へタリ去レ氏浴セザル以前ヨリ發スルアリ何レ皮膚中ニ餘毒ノ鬱スルニヨル麻後始テ浴スルニハ荆芥防風艾葉ノ三味ヲ湯ニ煎テ浴スベシ是レ亦醫通ニミへタリ此湯ニ浴シタリト云氏麻後瘡發スルモノアレ氏生水ニ始ヨリ浴スルハ宜カルマシ

纂要ニハ麻風瘡ト名ク

用藥寒温

丙申及今年氏麻疹ヲ治ル數百人ニ及へ氏一人モ虚寒ノ証ニ遇ワズ景岳温胃飲五君煎等ヲ用ル証ヲ論シ錦囊秘録ニ全真一氣湯ヲ用テ虚冷ノ麻疹ヲ治シタル醫案

アリ又今年モ初起ニ附子理中湯建理湯ナド用テ虚ヲ補ヒ透發ノ頃實熱ニ變シタル片尋常清涼ノ劑ヲ用テ効ヲ奏シタリト云醫師モアレ氏予ハ右様ノ証ニ出逢ワズ至テ虚弱ナル人又ハ大病後ノ疹ニハ初二透邪煎又ハ顧氏が加味逍遙散ヲ用ヒ中コ熱ノ劇キニ至リテハ化毒清表湯或ハ石膏ヲ加フルモアリ解毒快班湯ナド用テ皆効ヲ奏シタリ病ノ變狀一概ニ論シガタケレバ後學ヨクク心ヲ用テ診處スベシ

不可過寒凉

麻疹ハ陽熱ニ属ス寒凉ノ藥ニアラザレハ功ヲ取ル不能ワ

ナルハ固ヨリ之左レモ寒涼ヲ過スベカラズ惣テ疹後ハ陰
 血津液乾枯スルノミニアラズ藏府ノ氣一變スルト見ヘテ宿
 疾アル人宿疾頓ニ除クアリ又宿疾ナキ人却テ宿疾
 ノ生ルアリノ類アリ尤スレバ寒涼度ニ過レハ脾胃虛憊シ
 収没ノ後子ニ至リ不食下利等種々ノ雜証ヲ生ジ救フ
 ベカラナルニ至ル或ハ死ニ至ラザレモ必ズ痊愈ノ日遲シ王
 侯大人ヲ治スルニハ尤心ヲ用テ斟酌アルベキナリ

中惡

麻疹収完ノ後飲食動止常ノ如ク忽チ心腹絞痛遍身

冷汗出デ、氷ノ如クナルアリ朝ニ發メタニ死ス此元氣虛弱
 ニモ惡氣ニ中ル之中惡ト名クト萬氏ノ書ニ見ユ玄珠ニハ
 蘇合香丸ヲ用テ甦ルト云又準繩ニハ人參湯ヲ用テ蘇
 合丸ヲ研リ送り下メ甦ルトアリ又醫通ニハ妄ニ治スル
 勿レト云此証今年ナドアリマ予未タコレヲ見ズ拈出メ檢
 考ニ備ルノミ

輕重不治三證

麻疹輕重不治ノ三証前各條ニ出ス更ニ其要ヲ撮テ
 見閱ニ便ニス

頭面先見レ次ニ兩頤透出テ漸々手ヨリ足ニ至リ形漆瘡ニ似テ芥子ノ如ク色桃花ノ如ク二三番齊ク透リ神氣安寧飲食ニ便調和スルモノハ順候ニ

頭面發シ透リ粒肥テ多ク淡紅滋潤レ三日ニノ漸ク没スルモノハ輕シ

頭面兩頤透リ難キモノハ重シ 風ニ冒シ没スルコト早キモノハ重シ 兩頤紫雲ノ如ク片ヲナス者ハ重シ 疹

ノ中ニ斑ヲ夾ミ氣逆スルモノハ重シ 紅紫暗燥ナルモノハ重シ 咽喉腫痛シテ不食スルモノハ重シ 赤白下痢ス

ルモノハ重シ

黑暗乾枯メ一出即チ没スルモノハ不治 鼻扇口張リ目

ニ神ナキハ不治 鼻青糞黒者ハ不治 熱極喘脹胸

高ク肩息シ 狂言衄血手ヲ搦シ頭ヲ揺カシ衣ヲ尋子

床ヲ摸テ噦惡便秘口ニ屍氣ヲ出スモノハ不治 氣喘

心前ニ吸フ者ハ不治 頭面出サルモノハ不治 麻後牙

疳五不治アリ臭爛ノ者不治外ヨリ内ニ入者不治

膿血無キ者不治白色者ハ胃爛ニ不治牙落ル者ハ腎敗

ニ不治 正氣不足シ邪ヲ逐テ外ニ出スコト能ワズ毒内ニ

伏シ喘脹スルモノハ死ス 錦囊ニ俗ニ悶痧ト云トアリ丹方彙編ニ檉葉末一味水ニテ四
ネヲ下シ頂門ノ紅筋紅瘰ヲ挑ケ
破レバ即出ストアリ是未夕試ミズ

禁忌

纂要ニ云麻疹ハ其本原淺クメ出易シ痘瘡ニ較ラブレバ
易トス然レモ倏忽ニ變化スルコト最急ニ初出一二日ヨリ後愈
テ後月餘虚スル者ハ百日皆ナ其易キヲ以テコレヲ忽ニス
ベカラス經曰痘前麻後信哉ト云ヘリ萬氏云疹家禁忌ハ
痘家ニ比スレバ禁忌尤甚シ必四十九日ヲ待テ方ニ禁無キニ
保赤ニ四十九日或ハ百日後方ニ無禁忌トアリ云此三説ニ

依テ考フルニ重キハ百日輕キハ五十日禁忌スベシ今年疹後
食ニ因テ死スルモノ甚多シ白梅苜蓿頗稜菜鱧子鰻鱺ノ
類ヲ食シ其毒ニ中ルアリ恐ルヘシ古人禁忌スル所左録ス
風寒冷水瓜菓之類如シ一タコレヲ犯セバ皮毛閉塞
毒氣泄レ難シ遂ニ紫黒ニ變テ死ス 大ニ葷腥ヲ
食フコトヲ忌ム毒氣抑鬱メ内攻ス 鷄魚ヲ食ハ終身
天行ノ時ニ又重テ出テシム 鹽醋コレヲ食ハ咳シテ止サ
ラシム又云酸醋收斂之物ヲ食ハ壯熱伏匿シテ咳喘煩
悶セシム 五辛ヲ食ハ驚熱ヲ生セシム 核桃ヲ食ハ

喘效聲瘖セシム

梅桃李魚酒蜂蜜糖香鮮之物ヲ忌

ム疳蟲ヲ引テ上行セシム 菓中ニ梨ハ宜シ 五辛ト云ハ

一切ノ辛熱ノ物ヲ云トスベシ佛家ノ五辛ニハ限ラズ 別ニ禁忌ヲ記ス

論用升麻

繆氏云痧疹升麻ヲ用ル_ルヲ禁ズコレヲ服スレバ必ズ喘スト

石頭モ亦其説ヲ載セタリ予麻疹ヲ療スル數百人升麻ヲ

用ヒザルモノ甚々稀ニ然レ_レ升麻ヲ用ヒテ喘スル者一人モナシ

不用シテ喘スルモノアリ喘ノ發スルト不_レ發トハ必ズ升麻ニアラス

本草ヲ攷ルニ升麻百毒ヲ解シ時氣ノ毒ヲ治ス活人書ニ

犀角ニ代テ衄血ヲ治スルノ説アリ是レ痧疹必用ノ品ナリ升

麻ヲ以テ升提ノ藥トスル_ルハ潔古東垣ヨリ起ル繆氏藥性

ヲ論スル喜テ其説ヲ宗トシテ迂腐ノ談ニ執拘ス故ニ此説

ヲ生ス丙申年先考悉ク升麻葛根湯ヲ用ユ故ニ今年予

亦用之其益アリ害ナキヲ知ル世醫繆氏ノ説ニ畏怖シ

テ升麻ヲ用ヒス藥肆山積スレ_レ買フ者罕ニ故ニコニ述テ

升麻ノ缺ク可カラザル_ルヲ似ス○準繩ニ云大抵疹出ント

欲シ己ニ出ル_ル際寒スト雖モ桂枝ヲ用ル_ル勿レ虛ト雖モ

參朮ヲ用ル_ル勿レ嘔シテ痰アリト雖モ半夏南星ヲ用ル_ル勿

レ此言實ニ然リ然レ止ムコトヲ得ナルニ至テハ亦用ル者ノ
權變ニアリ

論西河柳

西河柳ヲ用ルル準繩ニ出テ繆氏カ諸方コレヲ用ヒ痲疹ノ要
藥トス其功用ハ倪氏カ本草彙言ニ詳ナリ丙申流行ノ片マ
デハ此ヲ用ルモノアルヲ聞ズ予今春巢鴨ヲ過リ執家ニ至
テ一株ヲ買得テ園中ニ移シ試用セント欲ス果テ春李ヨ
リ麻疹行ハルコト以テ仲淳ガ法ニ遵テコレヲ用ユルニ甚タ効
驗ノ著キヲ見ズ然レ初ヨリ藥ヲ投スルモノ數百人悉ク全

愈ヲ得タリ或ハ單味ニテ喘欬氣急等ヲ治シタリト云人モ
アレ予ハ試効セズサレ何レ檉柳効功ナキノ藥ニアラス因
テ意フ暑ヲ解スル主藥ハ香薷ニ黄ヲ治スル主藥ハ茵陳
ナリ然レ暑熱甚シキニ至テハ更ニ石膏黃連ヲ藉ラサレバ
効ヲ奏スルコト能ワズ黃疸ノヤ、劇ナルニ至リテモ加ルニ梔子大
黄ヲ以テセザレバ痲熱ヲ去ルコト得ズ痲疹ノ檉アル必用ノ
品ニシテ暑ノ香薷黄ノ茵陳ト同シカルベシ然レ其實ハ葛
根牛旁子石膏小ト功驗著キハ無キト暑ノ石膏黃連黄ノ梔
子大黄ノ如シ石頑ガ書ニ繆氏ノ說ヲ載ルモノアリ然レ

檉葉ヲ用ル方ナシ石頑コレヲ用ルヲ知ラサルカ抑モ其功ノ
緩ナルヲ以テ用ヒサルカ

似麻

一種ノ疹アリ初起ハ正疹証候ト同シク程ナク面エ紅點ヲ發ス
病家醫家認テ麻疹トス又程ナク収没ス後數日或ハ月餘再ヒ
正疹ヲ發ス但出ルノ前熱甚シク出テ熱大ニ減シ正疹ト同カラ
サルモノアリ疑似ノ間ニ葉氏真武湯ヲ用ユタトヘ正疹タリ凡
此方ヲ用妨ナシ丙申年ニモマ、アリ今年別シテ多ク此証ア
リテ病家驚訝スルモノ多シ故ニ茲ニ附記メ後ノ攷ニ備フ終

享和三年癸亥歲九月廿五日於日光山中之蓮藏坊

書寫畢

此書ハ一時ノ劄記意ニ於テ未タ安カラザルモノアリ因
テ他見有可ラサル者也

法眼安長

加 彦 心 得

廿七 三 仰 堂 辨 本

去 耶 安 身

書 寫 畢



