



醫  
部  
總  
論  
綱

ヤ 9  
1091  
2





西說醫範提綱釋義卷之二

榛齋宇田川先生譯述

門人

勢州

諏訪俊士德筆記

三腔提綱篇第三

下腔藏胃腸。腸間膜乳糜脈。乳糜囊。乳糜管。脾門脈。  
 胃。肝。膽。脾。腎。輸尿管。膀胱。尿道。畢丸。輸精管。精囊。腹膜。  
 網膜。子宮。卵巢等。以消化水穀。上輸乳糜。轉導。溲屎。

是綱釋義

1091  
乙



91-1790

化成孕胎

胃受水穀而糜爛而輸之腸

○胃ハ横膈ノ下。腹ノ上際ニ横居シ。全形楕圓ニシテ其狀橐ノ如シ。其質ハ數膜ヲ重襲テ成ル。上口ハ直ニシテ胃管ニ連リ。心窩ノ右邊ニ差左側ニアリ。下口ハ曲テ腸ニ連リ。心窩ノ右邊ニ當ル。上下口俱ニ常ニ收閉ス。飲食上口ニ至レハ排開テ胃ニ下ル。下レバ即チ閉ル。常ノ如シ。故ニ既ニ納ル飲食妄ニ上溢セズ。下口ノ腸ニ連ル處モ斯ノ如ク。飲食盡ク腸ニ輸リテ胃空シケレハ即チ閉ルニ因テ既ニ腸ニ下ル物ハ胃ニ反溢スル。即チ閉ル。故ニ受ケ容ルノ飲ニ縦寬ニシテ自ラ皺襞ヲ作ス。故ニ受ケ容ルノ飲

食暫ク此ニ留リテ速ニ滑脱シ下ラス。其際ニ胃中ノ温暖ニテ烹醸シ。且胃ニ循ル神經ト其筋膜ノ機關ニテ胃徐徐ニ縮張シ。皺襞自ラ相磨擦シテ食物ヲ糜爛シ。又其縮張ノ機轉ニテ漸次ニ下口ニ移シ腸ニ輸ル。其未ダ糜爛セサルモノハ梗阻シテ轉輸スルニ便ナラサレハ自ラ皺襞ノ間ニ殘リ留テ下口ニ行トナシ。然レ飽飧シテ充滿スレバ裏膜伸テ皺襞減ス。故ニ未ダ糜爛シ熟セサル食物モ常度ニ越テ速ニ腸ニ轉輸スルナリ。○胃ノ裏面ノ膜ヨリ常ニ津唾ノ如キ稀液ヲ滲出ス。此ヲ胃液ト謂フ。此液飲食ニ混和シ能ク醸熟スルノ性アリテ津唾ト同ジ。夫レ津唾ハ稀クシテ味ヒ淡十レレ其質徒ニ水ニ非ズ。其中揮發透竄ノ鹽氣ヲ含ミ能ク物ニ滲透シテ焔解融化シ醸熟ヲ爲ス。故ニ飲食ヲ咀嚙ス

ル毎ニ必ス和シテ化熟ヲ扶ク。若シ唾液不足シ或ハ稠粘ニナリテ飲食ニ和セザレハ其味ヒ舌ニ通徹シテ知ルコトナク。且胃中ニ下レハ糜爛シ難シ。凡ソ飲食先ヅ口中ニテ津唾ヲ加ヘ。始テ稍化熟ラ催シ。燕下セハ胃管ノ液ヲ加ヘ。胃ニ至テハ胃液ヲ加テ。逾釀熟ヲナス。然レ猶未ダ消化セズ。唯糜爛スルノミ。○不食ノ症ハ血中ニ粘稠液アリテ胃液ニ交リ。胃中ニ滲入スレハ飲食釀熟スシテ糜爛シ難ク。且其粘液徧ク胃ノ裏面ニ粘著シ。食味ヲ其中ノ神經ニ通徹スルコト能ハリルニ因リ。或ハ胃ノ神經衰弱シテ自ラ食味ヲ知覺シ難ク。其縮張ノ機轉モ怠弛シテ健ナラス故ニ糜爛シ難ク。停滞ン易フシテ不食ヲ爲ナリ。○渴ノ症ハ總テ胃中ノ鹽氣ヨリ起ル。凡ソ血中固ヨリ鹽氣アリ。常ニ飲食中ノ鹽ヲ

以ナコレヲ補ヒ缺乏無ラシム。鹽ノ性ハ素ヨリ熱ニシテ血液ノ温暖ヲ資ク。其用ヲ終レハ表發ノ蒸氣及ビ大小便ニ混和シテ體中ヲ謝シ去リ。新陳相代リテ鬱留スルコトナシ。若シ血液ノ運化常度ヲ失ヘハ其鹽モ蒸氣トニ便トニ從テ泄レ去ルコト能ハス。鬱積シテ熱性逾加ハリ。血液熱沸煎熟シテ清掃滋潤ノ津液ヲ消耗シ。遂ニ凝結シテ酷厲ニナル。此ニ由テ一身壯熱ヲ發シ。諸部乾燥シ。胃ノ神經其酷萬ナル壯熱ニ堪スシテ自ラ飲ヲ引テ潤シ救ハシ。下欲シ大ニ渴ヲ發フルナリ。常ニ鹽物ヲ過食スレハ其熱性ニテ胃液ヲ燥シ粘結シテ冷ヲ發スルガ如シ。○胃痛ノ證ハ胃ニ酷厲ノ液アリテ其部ノ神經ヲ刺ノ刺衝スルナリ。胃痛ハ即チ胃脘痛心下刺痛ノ類ナリ。○吐下ノ症ハ胃ニ酷厲ノ毒アリテ其

裏面ノ膜ヲ侵刺衝動シ神經其刺衝ニ堪スシテ變  
 急ヲ起シ其毒ヲ除シトシテ吐下ヲ爲ナリ若シ上  
 口ノ邊專ラ擧急スレハ下口ヲ上ノ方ニ牽縮メ其  
 毒ヲ上轉シテ嘔吐ヲ發ス甚キ者ハ腸ニ及テ膽液  
 脾液モ併テ吐出スルナリ若シ下口ノ邊專ラ擧  
 急スレハ上口ヲ下ノ方ニ牽縮メ其毒ヲ腸ニ傾瀉  
 シテ下利セシム凡テ飲食藥劑等ニ因テ吐下スル  
 モ其理同シ○腦ノ第八對ノ神經ハ左右ニ直ニ  
 胸内ニ下行シ心肺ニ連リ胃ヲ絡フ故ニ腦ト胃ト  
 親ク交通ス此ニ由テ大抵腦病ハ胃ニ及ヒ胃病ハ  
 腦ニ係ル即チ胃中鬱積嘔吐胃痛等ハ頭痛眩暈等  
 ヲ兼子頭痛眩暈等ハ不食嘔逆ヲ兼ル者多キニテ  
 知ヘシ又胃ノ上口ハ特ニ神經多ク絡ノ故ニ動モ  
 スレバ胃口劇痛ヲ發シ易シ

腸承胃所輸飲食和以膽脾二液調熟化釀以造乳糜輸  
 之乳糜脈糟粕則導去爲屎○乳糜者水穀之精液而爲  
 血之原白色如乳汁

○腸ハ數膜ヲ重覆セル一大膜管ニシテ長ニ丈七  
 八尺許迂曲廻疊シテ腹腔ニ充實シ胃ノ下口ニ始  
 リテ肛門ニ終ル趾ヨリ一條ノ腸ナレ凡ニ形狀主用  
 ノ同シカフサルニ因テ六腸ニ分ツ十二指腸空腸  
 廻腸育腸結腸直腸ナリ前ノ三腸ハ其管薄フシテ  
 窄小故ニ小腸ト謂フ後ノ三腸ハ其管厚フシテ潤  
 大故ニ大腸ト謂フ十二指腸ハ胃ノ下口上腹ノ右  
 邊ニ始リ屈シテ左ニ行リ十二指橫徑故ニ此名アリ

リ。ソレヨリ上腹ノ臍邊マテ迂曲廻轉スルヲ凡ソ  
 十二三掌ノ中和蘭ノ名腕中横紋ヨ此ヲ空腸  
 トス。凡ソ水穀十二指腸ヨリ此腸ニ至テ特ニ多ク  
 消化シテ精液ハ速ニ上輸シ糟粕ハ疾ク降り他腸  
 一此スレハ空虚ノ時多シ。故ニ此名アリ。十二指腸  
 腸ヲ總管ヨリ注キ臍管ヨリ肝膽液ヲ注ク。故ニ臍管ニ其次  
 臍邊ヨリ小腹内ヲ廻疊スルヲ凡ソ二十一掌。此ヲ  
 廻腸ト謂フ。最モ長フシテ廻轉スルヲ多シ。故ニ此  
 名アリ。廻腸ノ次ハ臍トノ右邊ニ上行シ。右腎ニ傍  
 ヒ。此ヨリ腸始メテ太シ。此盲腸ノ始ナリ。其太キ處。下  
 側ニ淵ク張出シテ狀チ囊底ノ如シ。此ヨリ上行ス  
 ルヲ凡ソ四指横徑。此ヲ盲腸ト謂フ。其囊底ノ如ニ  
 處他ニ通スルノ道ナシ。故ニ此名アリ。又盲腸ト廻  
 腸トノ交際ノ處ヨリ長五指横徑許ノ小管垂レ其

端夫テ蛔蟲ノ狀ノ如シ。此ヲ蟲様垂ト名ク。盲腸ノ  
 次ヨリ上行シテ肝膽ニ傍ヒ。上腹ノ右邊ニ至リ。曲  
 テ胃底ニ浴ヒ。上腹ノ左邊ニ行キ。脾。左腎ニ傍ヒ。復  
 々曲テ下行シ小腹ノ下邊ノ左側ニ至リ。此ヨリ復  
 々臍下ニ上ル。斯ノ如ク廻曲スルヲ凡ソ八九掌。此  
 ヲ結腸ト謂フ。糟粕此ニ至テ專ラ結成人。故ニ此名  
 アリ。其次臍下ヨリ直ニ肛門ニ下ルヲ一掌半。此ヲ  
 直腸ト謂フ。直行スルヲ以テ此名アリ。大抵小腸ハ  
 長フシテ十ノ八ニ居リ。大腸ハ短フシテ十ノ二ニ  
 居ル。又大腸ハ多ク上部ヲ廻リ。小腸ハ多ク下部ニ  
 在リ。○胃ハ水穀ヲ糜爛スレ。凡未ダ消化ヲ爲サズ。  
 十二指腸ニ下リ膽脾ノ二液ヲ注クニ至テ全ク釀  
 熟シ。小腸ヲ行ルノ際ニ盡ク消化シテ精粗ヲ分ツ。  
 精液ハ即チ乳糜ニシテ悉ク乳糜脈ニ運行シ。粗滓

ハ即チ糟粕ニシテ漸ク大腸ノ始メノ盲腸ニ傳ヘ。囊底ノ如キ處ニ留積シテ次第ニ轉輸シ。結腸ニ至テ結成凝固シ尿トナルナリ。○蟲様垂ハ其質腺ハ腺十器編ニシテ津液ヲ滲出シ盲腸ニ注ヒテ糟粕ヲ滋潤シ。燥結滯塞スルヲ無ラシム。凡ノ人平全ナレハ飲液水漿多少ニ論テ盡ク乳糜ニ和シテ乳糜腺ニ滲入シ清濁自ラ能ク泌別シテ腸中ニ盛ル者ハ糟粕ノミ。故ニ大腸ニ至レバ皆結成シテ屎トナルナリ。○大小腸ノ裏面ヨリ徧ク稀液ヲ滲出スル。胃管及ヒ胃ノ如シ。此ヲ腸液ト謂フ。其質モ亦津唾ト同シ。此液小腸ニ在テハ釀熟ヲ資ク。乳糜ヲ稀解シテ能ク乳糜腺ニ流利滲入セシム。大腸ニ在テハ大便ヲ潤シ燥結ノ患ヲ防ク。○居恒大小腸比ニ徐徐ニ縮張ノ運動ヲ爲スコレ腸ヲ囊成スル諸膜

ノ機能ニ由ル此ヲ以テ小腸ニ於テハ乳糜ヲ轉輸シ粗滓ヲ順下シ大腸ニ於テハ糟粕ヲ傳送導泄ス。此ヲ腸ノ蠕動機ト謂フ蠕動機トハ蟲一這フ如ク形容スルニナリ。胃管ノ呼吸ノ出納。横膈ノ低昂。腹筋ノ弛張。膽液腸中ニ注テ衝動スル等ニテ常ニ此機轉ヲ扶ルナリ。○乳糜ハ飲食消化シテ成ル純白精粹ノ液ナリ。腸ヨリ乳糜諸道ヲ歴テ左ノ鎖骨下靜脈ノ血ニ混シ。心肺ヲ運リ動脈ニ流注スルノ際ニ漸ク化シテ血トナル。凡ノ血ノ榮養ヲ致シ諸液ヲ分利スルハ皆飲食スル物ノ氣味性質。悉ク乳糜ニ含蓄シテ血ニ輸リ妙合融化ンテ各其功用ヲ爲スニ由ル。故ニ藥ノ服シテ効驗アルモ各其性味。乳糜ニ和ンテ血ニ混シ。動脈ニ行リテ諸部ニ分布シ。頭巔ヨリ四肢ニ普達スルヲ以テナリ。○吐糞病。其他

嘔吐シテ大便結閉スルノ諸症ハ皆諸腸順下ノ縮  
張ヲ失フテ逆行ノ機轉ヲ爲シ化物コトニ從テ吐  
スルナリ。然レ其病因一ナラズ。或ハ尿モ通利スルヲ得ス  
ノ如クナリ。新ニ化成スル屎モ通利スルヲ得ス  
或ハ腸ニ頑硬ノ腫瘍ヲ生シ。或ハ腸ニ循ル神經枯  
衰シテ腸ノ疝不遂ヲ爲ス等ニ由ル。○大便秘結ノ  
症ハ腸液滲出スルヲ少ク或ハ腸液腸中ニ注ク  
不足ナルニ由ル。腸液ハ其性酷烈ナルヲ以テ常ニ  
腸ヲ衝動シテ順導ノ蠕動機ヲ起發セシム故ニ其  
注入スルヲ乏ケレハ必ス秘結スル所以ナリ。○完  
穀下利ノ症ハ或ハ腸胃ノ神經衰弱シ消化ノ機ヲ  
失ノ粘液ヲ生シ。或ハ血中粘液多クシテ腸液胃液  
モ粘液ニ化シ其粘著鈍滯ノ性ニ因テ腸胃ノ運化  
ト腸脾ニ液ノ功用トヲ妨ク食物ヲ消化スルヲ能

ハリルニ因ル。假令腸脾ノ二液食物ニ混スト雖モ  
腸液胃液和セリレハ消化ノ用ノ爲リスシテ限ニ  
泄利ス。○乳糜利ノ症ハ粘液中ニ此ニ胃液腸液ヲ  
交ユレハ食物頗ル化シテ乳糜トナレハ消化足フ  
マシテ粗濁稠粘ニナリ微細ノ乳糜ニ滲通スル  
ト能ハズシテ直ニ腸ヨリ泄利ス。故ニ泄利スル物  
必ス灰白色ナリ。又腸間膜中ノ腺ニ粘液窒塞スル  
者ハ假令飲食能ク消化シテ純粹ナル白色ノ乳糜  
ヲ生スト雖モ乳糜腺ユレヲ通スルト能ハズシテ  
苦泄利ス。乳糜利ハ内科選要○痢病ハ素ト外感内  
傷其他ノ諸因ニヨリテ諸腸運化ノ常度ノ失又者  
血中ニ酷厲液ヲ生スレハ腸ノ動脈ニ流レ滿チ腸  
液ニ從テ頻リニ腸内ニ滲泄シ腸ノ裏面ヲ劇ク侵  
刺ス。故ニ腸大ニ孳急シテ絞痛ヲ發シ其毒液ヲ驅



除セントシテ下利ヲ爲ナリ。其毒剝キ者ハ腸ノ血  
絡ヲ侵蝕シ血ヲ交テ流泄ス。若シ侵蝕ノ傷處膿壞  
スレバ膿ヲ下ス是即チ膿血痢ナリ。或ハ其毒甚々  
惡厲ナル者ハ熱モ烈フシテ血液ヲ腐壞シ腸終ニ  
冷瓊焦黑シテ死肌トナリ。脫疽ノ狀ノ如シテ死  
ス。凡ソ下劑ヲ用レハ其藥ノ酷厲ナル氣味腸ノ  
裏面ヲ侵刺スルニ由テ腸ノ神經コレヲ觸知シテ  
其侵刺ニ堪ズ自ラ寧急ヲ作シテ多ク腸液ヲ絞出  
シコレ一從テ其毒ヲ泄利シ去ルナリ故ニ乳糜。飲  
食。膾臍ニ夜ヒ大便ニ從テ瀉下フ。

乳糜脈微細白脈偏起於小腸吸收乳糜會同于腸間膜

中之腺

○乳糜脈ノ微細ノ薄膜管ニシテ偏ク小腸ニ起リ。  
乳糜ヲ受テ悉ク腸間膜ニ循行ス故ニ乳糜透見シ  
テ白色ナリ。此脈皆小腸ニ起レ在テハ大腸ニ近  
空腸トニ多シ。廻腸ノ部ニ在テハ大腸ニ近  
隨テ次第ニ少ク。既ニ大腸ニ至テハ絶テ無シ。其故  
ハ十二指腸ト空腸トニ於テ水穀專ラ消化シテ乳  
糜ヲ造ルノ最モ多ク。液此最モ多ク於テ膾臍ニ大腸ニ  
近ツクニ隨テ乳糜次第ニ減ジ。糟粕逾多ク大腸ニ  
至テハ乳糜盡ク竭テ尿ノミニナレハナリ。

腸間膜在腸間厚而複全徑差圓中央當臍上延袤展圍  
連綴諸腸而維持繫約之複間即乳糜脈之所道而會于

### 腺夏復起於腺而輻輳于乳糜囊也

○腸間膜ハ持ニ厚クシテ重複ノ膜ナリ中央ノ處一掌徑許最モ厚ク平滑ニシテ後ハ腰骨ニ著キ周圍ハ種種ニ分裂疊積ヲ爲シ縱横ニ轉廻セル數丈ノ腸ニ悉ク連著シ腸ヲ繫固メテ位置ヲ失ハスコト括約シテ適宜ク腹腔内ニ收メ容ム。但シ結腸直腸ハ此周圍ニ連著セスシテ結腸ノ始メノ處ヨリ此膜ノ右端長ク延テ帶ノ如ク爲リ。結腸ト直腸ヲ繫固ス故ニ別ニ此ヲ大腸ノ腸間膜ト名ク。此重複ノ二膜ノ間ニ乳糜脈。脈。血絡。神經。水脈。脂肪。布滿ス。腺。水脈。脂肪ノ用ハ十器編ニ辨ス。○乳糜脈ハ。悉ク此膜ノ重複ノ間ヲ循行シ此内ニアル許多ノ脈ニ

入り乳糜ヲ輸ル。水脈モ亦腹内諸部ヨリ此膜間ノ腺ニ連リ水液ヲ輸ル。故ニ腺ニテ水脈ヨリ注ク水液ヲ和シ乳糜ヲ稀解シテ釀熟ス。其腺ヨリ復々多クノ乳糜脈起リ。悉ク乳糜囊ニ湊合ス。故ニ腸間膜ハ多クノ乳糜脈ヲ統括包攝シテ乳糜囊ニ連リ達セシメ。常ニ乳糜ヲ血中ニ運輸スル最要ノ器ナリ。○凡ソ腸胃ノ薄弱ナル者ハ飲食消化シ難クシテ漸ク壞液ヲ生シ或ハ粘結鬱積シテ蛔蟲ヲ生シ。或ハ其液多クシテ漸ク乳糜ニ和シ乳糜脈ニ滲入ス。レハ乳糜脈及ヒ腸間膜中ノ腺ニ粘結滯積シテ壅塞ス故ニ乳糜皆腸間膜中ニ留滞シテ逾腐壞シ遂ニ腹脹ヲ爲ス。既ニ新血ヲ生スルノ原ヲ失フニ由テ全身ノ榮養漸ク之缺シ壞液益多クナリテ肢體則ニ瘦削ス。此ノ如キハ即チ勞症ノ一種ナリ。此病

多ク致ヲ兼ルハ腐敗ノ乳糜血中ニ浸染シテ酷厲  
液トナリ氣管ニ參入シテ刺衝シ擧急ヲ發スルニ  
因ル。又此病乳糜利ヲ兼ルモノ多シ。此ハ腸中新ニ  
化スルノ乳糜ト腸間膜ノ閉塞ニ由テ行路ヲ失ヒ  
直ニ下利シテ洩ルナリ。或ハ下利セスト湧シテ嘔  
逆ヲ爲シ或ハ口中甘味ヲ覺ルナリ。此即チ乳糜  
ノ味ノ上溢スルナリ。又水腫ヲ兼ル者多シ。此ハ腸  
間膜ノ腺閉塞スルニ由テ此ニ連ル多クノ水脈ニ  
水液留滯シ。漸ク身體諸部ノ水脈ニ泛濫停溜シ。遂  
ニ其脈破裂シ其所在ニ隨テ腫起スルナリ。若シ其  
腸間膜ノ腺開通スレバ水液漸ク疏通シテ乳糜道  
ニ歸流シ。水脈破裂ノ處ヨリ復タ其泛濫ノ水液ヲ  
吸收シ。終ニ其液盡ク。隨テ脈外ノ諸部乾クニ至レ  
ハ破裂ノ處自ラ癒合シ水腫消シテ病治スルナリ。

○小兒ノ疳症ハ總テ甘味ノ物ヲ過食シ腸胃ニ鬱積シテ酸敗液ヲ生シ腸間膜ニ滯塞スル者居多シ故ニ腹脹四肢瘦削スル等ノ症ヲ發スルナリ。大抵前症ニ同ジ

乳糜囊即乳糜脈湊合爲一小囊狀者在腸間膜中央之後側。左腎之右會聚乳糜輸之乳糜管

○乳糜囊ハ腸間膜中央ノ後邊。左腎ノ差右ニ在リ。多クノ乳糜脈會合シテ長ク圓キ小ナル膜嚢ヲ爲スモノナリ。故ニ下ハ多クノ乳糜脈連リ。上ハ延長シテ一條ノ乳糜管トナル。又諸部ヨリ水脈連リ水液ヲ此内ニ流注ス。故ニ此器ハ乳糜ヲ統會シ水液ヲ和シテ稀解釀熟シ乳糜管ニ輸スルナリ。

乳糜管即乳糜囊之上端漸長為管沿脊骨之左側而上  
行連于左鎖骨下靜脈者

○乳糜管ハ乳糜囊ノ上口延長シテ一小膜管トナ  
リ。脊骨ノ左側ニ循テ上行シ。腹部ヨリ胸部ヲ歴テ  
左ノ鎖骨下靜脈ニ連リ此處ニテ乳糜ヲ其血中ニ  
輸リ。鎖骨下靜脈ヨリ靜脈幹ニ輸リ。此ヨリ心。肺。動脈  
幹枝ノ長途ヲ巡ルノ際ニ血ト乳糜トニ含有スル  
鹽。油。上。硫氣等ノ諸物ノ融和妙合スルニ由テ漸ク  
釀化シテ血トナルナリ乳糜ノ条ト  
參考スヘシ

脾在胃之左側受血於動脈而分泌焉稀水則水脈輸

之乳糜管。乳糜囊。脾等稠血則輸之門脈

○脾ハ左ノ季肋内。胃ノ左側ノ後邊ニ在リ。其形左  
ハ圓ク右ハ凹ミ。右ト前トハ胃ニ著キ。左ハ季肋ト  
横膈ニ著キ。上モ亦横膈ニ著ク。後ハ背骨ニ著キト  
ハ左腎ニ著ク。其凹處ニ動脈門脈ノ支別。水脈。神經  
連ル。水脈ハ脾ノ外面ニ蔓延シテ乳糜管。乳糜囊。脾  
胃等ニ行ク。○其質ハ腺ニ血脈。神經。水脈ヲ加テ組  
織シ。外面膜ヲ被ル。柔軟ニシニ水綿ノ如シ。○此藏  
ハ血ヲ動脈ニ受テ血ト水トヲ分泌シ。其稀水ハ水  
脈ヨリ乳糜管。乳糜囊。胃。脾。其他並傍ノ諸器ニ輸ル  
此液ハ徒ニ淡水ニ非ス。酸味ヲ帶テ能ク物ヲ釀熟  
スルノ能アリ。故ニ乳糜囊。乳糜管ニ行テハ乳糜ヲ  
釀熟稀解シ。脾ニ入テハ脾液ヲ授ケ。胃腸ニ行テハ

是綱目釋義

胃液腸液ヲ襍ク其純厚ノ抽血ハ門脈ニ傳テ肝ノ  
膽液ヲ造ル原ヲ爲ス○脾ノ血甚ダ汚濁稠結シ或  
ハ血ト水トヲ分利スルノ常度ヲ失ヘハ其血脾ニ  
留滞ンテ大ニ腫脹シ或ハ硬結シテ其部位ニ急  
切痛等ノ諸症ヲ發ス此ヲ脾病ト名ク即チ積聚癥  
癖ノ一種ナリ又血ト水トノ分利悪キヲ以テ酸稀  
ノ水液乳糜ニ和セズ故ニ乳糜釀熟セスシテ血ニ  
入り其血大ニ稠濁ニナリテ遂ニ敗黒ノ液ヲ生シ  
頭腦ニ留著シ靈液ヲ營過シテ志意樂マサル愁鬱  
ノ諸症ヲ發ス○又脾ニ汚血惡液留滯スルト多ク  
レバ大ニ腫脹シ其甚シキハ小腹ノ邊マテ至ル者  
アリ

門脈細血脈起於胃腸腸間膜脾脾網膜而輻輳于腸

間臍上部合爲一幹入于肝復支蔓其中者此會萃腹內

諸器之血釀熟之輸于肝爲膽液之原

○門脈ハ一種ノ血脈ナリ胃腸腸間膜脾脾網膜  
ヨリ各數多ノ細血絡起リ腸ノ間夕臍上ノ部位ニ  
會湊シテ一幹管トナリ上行シテ肝ニ入り復タ支  
分シテ其中ニ彌蔓ス○凡ソ動脈幹ノ支別ハ全身  
諸藏諸器ニ彌蔓シテ至ラサル所ナシ然ルニ胃腸  
腸間膜脾脾網膜ノ七器ニハ靜脈幹ノ支別循行  
セズ門脈此ニ代リテ其諸器ノ動脈ノ支末ニ連テ  
起リ其血ヲ受テ門脈ノ幹ニ會萃シ其血ヲ釀熟シ  
テ肝ニ輸リ膽液ヲ造ルノ原トナスナリ○此脈  
ハ腹內諸器ノ動脈ノ血ヲ受テ支末ヨリ幹ニ輸ル

ハ靜脈ノ如シ。然レ肝中ニ障膜ナシ。又肝ニ入テ血ヲ幹ヨリ肝中ノ支ニ輸ルハ動脈ノ如シ。然レ搏動ナシ。故ニ動靜二血脈一殊ナル一種ノ血脈トスルナリ

肝在胃之右側受血於門脈而分泌之以造膽液有二管焉一自肝出而入于膽謂之輸膽管輸液於膽一自肝出與膽管連謂之肝管其連者合為一而入于腸謂之總管

總輸肝膽二管之液

○肝ハ腹内ノ諸藏ニ於テ最モ大ニシテ上腹ノ右邊ニ在リ。右ハ季肋内ニ充テ。左ハ胃ノ右部ヲ覆ヒ。

其端薄ク延テ心窩ヲ過ク。上面ト前面ハ凸ニシテ横膈ニ著キ。下面ト後面ハ凹ニシテ高低及ヒ披裂アリ。飲食胃ニ滿テ飽脹スレハ此臟壓レテ横膈ト共ニ高舉シ。胃空シケレバ俱ニ低垂ス。其質ハ腺動靜二脈。門脈。膽液管。神經。水脈ヲ交錯會組シ外面膜ニテ被包ス。○門脈ノ幹ハ肝中ニ入テ細分シ。其文末皆腺ニ連リテ血ヲ輸ル。腺コレヲ受テ膽液ヲ必別シ。血ハ肝ノ靜脈ヨリ靜脈幹ニ還シ。膽液ハ膽液管ニ輸ル。○膽液管ハ微細ノ管ニシテ徧ク肝中ノ腺ヨリ起リ。膽液ヲ腺ニ受テ肝中ニ於テ會集シテ二管トナル。一ハ細小ニシテ肝ヨリ膽ノ側面ニ連リ。膽液ヲ膽ニ納ル。此ヲ輸膽管ト謂フ。一ハ大ニシテ太サ難翅管ノ如シ。肝ヨリ出テ膽管ニ連リ。膽液ヲ膽管ノ液ニ和シテ總管ニ注ク。此ヲ肝管ト謂

フ總管トハ肝管ト膽管ト合シテ一トナリ十一指  
腸ニ連ル者ヲ謂フ。此管ヨリ肝管ノ液ト膽管ノ液  
ト相混シタルヲ受テ十二指腸ニ注ク膽管ハ長シ  
フテ膽ノ管斜ニ見ユ者ヲ謂故ニ膽液ハ肝膽ニ藏ヨリ共  
ニ腸ニ注クナリ○神經ハ肝中ニ布蔓シテ肝ノ膽  
汁ヲ泌別スルノ機カヲ起發ス○水脈ハ肝中ノ腺  
ニ起リテ腸間膜ノ腺及ビ乳糜囊。乳糜管ニ連リ肝  
ヨリ水液ヲ輸ルナリ

膽懸肝之中垂肝之下形如囊上口漸長爲一管謂之膽  
管膽之職受膽液於肝蓄藏釀熟而後輸之膽管與肝管  
所輸之液相混注于總管○膽液者黃而稠悍而苦以克

殺飲食但出於膽者氣味烈出於肝者質較稀故其力自  
有強弱二液從飲食之多少互相調和以適其用

○膽ハ形ナ楕圓ノ一膜囊ニシテ大ナル者ハ大約  
雞卵ノ如シ下底ハ圓ク上口ハ尖小ニシテ管ト爲  
ル。此即チ膽管ナリ。此管肝管ニ連リ合シテ總管ト  
ナリ。十二指腸ニ入ル○膽ハ輸膽管ヨリ注ク肝ノ  
膽液ヲ受ク蓄藏シテ釀熟シ粘稠醇厚ニシテ氣味  
酷烈。性カ強健ナル膽液ト爲スナリ○膽液ニ二樣  
アリテ其名ヲ異ニス。一ハ肝ヨリ肝管ニ通ジ總管  
ニ行キ。十二指腸ニ注ク。此ヲ肝ノ膽液ト謂フ。一ハ  
肝ヨリ輸膽管ヲ經テ膽ニ入リ。其内ニ蓄藏シ。膽管  
ヨリ出テ總管ニ行キ。肝ノ膽液ト合シテ十二指腸

一注ク。此ヲ膽ノ膽液ト謂フ。肝ノ膽液ハ其色鮮黄ニシテ較稀ク。慄悍ノ氣及ビ苦味モ俱ニ烈シカニシテ居恒ニ腸ニ注ク。多シ膽ノ膽液ハ其色濃ク粘稠ニシテ苦味烈ク。性力尤モ強フシテ常ニ腸ニ注ク。少シシテ其故ハ凡ノ飲食シテ腸胃充脹スレハ膽コレニ壓レテ其液自ラ膽管ヨリ溢出シテ二指腸ニ注泄ス。故ニ飲食多ケレバ胃ノ膨脹シテ膽ヲ壓シ其液ノ注泄スルヲモ特ニ多クシテ其性力ノ強キヲ以テ過多ノ飲食ト雖モ盡ク克殺ス。飲食次第ニ消化シ減人レハ胃腸モ漸ク收窄シ膽ヲ壓レテ注シテ膽液ノ注クモ亦減ス。此ニ於テ稀薄ニシテ性力弱キ肝ノ膽液次第ニ多ク注泄シ。飲食ノ多キニ應ジテ消化ノ用ヲ爲スナリ。故ニ飲食少ナケレハ膽ノ膽液ノ性力強キヲ用ルヲ無ク。又飽

食充滿スレバ性力劣弱ナル肝ノ膽液ニテハ盡ク克化スルヲ能ハス。乃チ二液互ニ調和シテ能ク其用ニ適スル所以ナリ。○膽液ハ黄色ニシテ其味若烈辛透其性硫黄ニ似テ火氣ヲ含ム。故ニ雄悍壯熱ニシテ揮發衝動透發開達シ能ク飲食ヲ熱沸蒸熟ス。又其質ハ油ヲ夾シテ石鹼汁ト同ク能ク脂膏ヲ去リ粘液ヲ淨除シ汚滯ヲ導決ス。故ニ水穀ノ精汁ト糟粕トヲ能ク分利ス。又其慄悍若辛ノ酷厲ナル氣味ニテ腸ノ裏面ヲ刺衝スレバ腸ノ神經此ニ堪スシテ徐徐ニ牽動ヲ起シ腸ノ蠕動機ヲ作サシム。此ヲ以テ乳糜ハ速ニ乳糜脈ニ運輸シ糟粕ハ能ク傳送順下シテ上圓ノ常度ヲ失ハザラシム。溲尿ノ臭色此液ト同キニテ知ベシ。故ニ此液大過ナレバ大ニ腸ヲ衝動シテ烈ク寧急ヲ生シ運轉ノ機殊ニ



急疾ニシテ下利ヲ發ス又此液乳糜ニ混ジ血ニ和シ能ク血液ヲ健行衛盪シテ幹旋ノ動機ヲ作シ神經靈液ノ精カヲ資ケ更ニ火力ヲ振テ一身温熱ノ基ヲ扶ク故ニ能ク鬱結凝泣ヲ開達シ滯塞壅閉ヲ透發シ沈寒冷結ヲ融解シ酸性ノ敗液ヲ驅散シ收斂ノ大過ヲ抑制スルナリ○此液ノ苦烈ノ味ニテ粘液留飲ヲ驅泄シ自然ニ蟲ヲ制伏スルノ能アリ故ニ此液不足スレハ諸腸健運セズシテ多ク粘液ヲ生シ或ハ蟲ヲ生ズ○肝ニ粘液汚血滯塞スレハ膽液ヲ製造スルノ機能ヲ失ヒ其毒留著シテ腫脹痰瘰ヲ發シ或ハ橫膈及ビ胃ヲ壓迫寧急シ或ハ膽液腸ニ注カスシテ飲食消化ヲ爲サズ若シ其滯塞セシテ全身皮中ノ細血絡ニ傳ヘ其腺ニ留著スレハ

皮膚灰黃色ニ透見シテ黃疸ヲ發シ又小水ヨリ府敗汚濁ノ黃汁ヲ泄ス斯ノ如クトレハ膽液ノ腸ニ注クト少ナク腸ノ傳送ノ機轉健ナラズシテ大便澀滯シ且通スルモ黃色寡シ凡テ此病ノ膽液ハ粘稠ノ敗汁ナレバ血中ニ入ト雖モ健運揮發スルノ性カナク血中ノ精氣モ從テ衰敗シ身體諸部ヲ榮養スルヲ無フシテ精力乏弱神志沉重ヲ爲ス其敗液諸筋ニ多ク滯著スレハ肢體懈惰シテ舉動シ難シ又肝膽中或ハ總管中ニ結石ヲ生シテ閉塞スレバ膽液腸ニ通スルヲ得スシテ止トヲ得ス肝ノ靜脈中ニ溢死シ血中ニ泛溢シテ黃疸ヲ發スル者アリ

脾受血於動血脈分泌之以造脾液形如牛舌橫居胃下

裏有一管謂之脾管其端與總管合輸液于腸○脾液者

酸烈清稀與膽液和以釀化飲食

○脾ハ其質盡ク腺ニシテ外面膜ヲ被ル其長大約八九指横徑許幅一指半横徑許横ニ胃底ニ著ク左ハ狹クシテ脾ニ接ン右ハ廣クシテ十二指腸ニ接ス全質ノ腺ヨリ偏ク微細ノ管起リ其裏ノ中央ニ聚リテ一幹トナルコレ脾管ナリ此管脾ノ左端ヨリ此管ノ右端ニ出テ總管ト相並ビ十二指腸ニ連リ合シテ一トナリ其内ニ通ス○脾ハ血ヲ動脈ニ受ク泌別シテ酸稀ノ清汁ヲ取り其内ニ藏ムコレ脾液ナリ常ニ脾管ニ流通シテ腸ニ注キ膽液ト和シテ飲食ヲ消化ス○脾液ハ酸稀ニシテ能ク物ニ透滲シ融解溶化シテ釀熟ヲ作ス故ニ能ク水穀ヲ化シテ乳糜トナフシム其性收斂清涼ナルニ由テ燥涸ヲ滋潤シ壯熱ヲ制止シ慄悍ヲ抑挫シ粘稠ヲ稀解シ汚濁ヲ清澄ス若シ膽液過多ニシテ熱蒸沸騰スレバ消化順導ノ常度ヲ失ヒ飲食泛溢シテ上湧下注ヲ變ヲ爲シ或ハ熱燥煎熬ニ過キ津液凝結シテ流利セズ此ニ於テ脾液併セ注ヒテ相調和シ酸味ヲ以テ涼氣ヲ生シ津液ヲ聚テ燥涸ヲ潤シ沸蒸ノ泛溢ヲ收メテ熾赫ノ熱勢ヲ挫キ清稀ノ滲透ノ質ヲ以テ粘結痰液ヲ解釋スルヲ恰セ酸梅ノ類ニ口津ヲ生ジ白礬ノ忽チ汚水ヲ澄スガ如シ故ニ糟粕ハ通收固シテ底沈降下シ乳糜ハ益煥解シテ流利運行スコレ膽脾ノ二液五ニ制伏調停シテ乳糜ヲ製造シ消化傳送ノ用ヲ爲ス所以ナリ又

ク物ニ透滲シ融解溶化シテ釀熟ヲ作ス故ニ能ク水穀ヲ化シテ乳糜トナフシム其性收斂清涼ナルニ由テ燥涸ヲ滋潤シ壯熱ヲ制止シ慄悍ヲ抑挫シ粘稠ヲ稀解シ汚濁ヲ清澄ス若シ膽液過多ニシテ熱蒸沸騰スレバ消化順導ノ常度ヲ失ヒ飲食泛溢シテ上湧下注ヲ變ヲ爲シ或ハ熱燥煎熬ニ過キ津液凝結シテ流利セズ此ニ於テ脾液併セ注ヒテ相調和シ酸味ヲ以テ涼氣ヲ生シ津液ヲ聚テ燥涸ヲ潤シ沸蒸ノ泛溢ヲ收メテ熾赫ノ熱勢ヲ挫キ清稀ノ滲透ノ質ヲ以テ粘結痰液ヲ解釋スルヲ恰セ酸梅ノ類ニ口津ヲ生ジ白礬ノ忽チ汚水ヲ澄スガ如シ故ニ糟粕ハ通收固シテ底沈降下シ乳糜ハ益煥解シテ流利運行スコレ膽脾ノ二液五ニ制伏調停シテ乳糜ヲ製造シ消化傳送ノ用ヲ爲ス所以ナリ又

乳糜ニ混シ血液ニ和シテ膽脾ニ液相須テ各其功績ヲ致シ。皆人寒熱偏勝ノ害無ク中和平全ノ化ヲ保續スルナリ

腎有兩枚對居左右在肝脾之下俱受血於動血脈滲泌之以作尿輸之輸尿管○尿者血中之鹹渣行于腎者也凡飲食化為血液中有精微之鹽氣以供榮養其渣則與諸廢液混謂之鹹渣行于腎則為尿行于皮則為汗俱謝去體中新陳交代

○腎ハ兩枚ニシテ右ハ肝ノ下左ハ脾ノ下ニ著キ左右ニ對居ス。後ハ背ニ著テ腹底ニ在リ兩腎相隔ツ。六指橫徑許心窩ノ臍ノ中分ノ兩側ニ位ス形子楕圓ニシテ長四五指橫徑幅三指橫徑許厚サ一二指橫徑外側ハ圓ク内側ハ凹ナリ。四十ル處ノ裏ニ空間アリ。空内潤サ一拇指橫徑許此ヲ腎盂ト名ク○其實ハ腺。細管。神經ニテ織リ成シ外面膜ヲ被ル。但シ腺ハ專ラ表分ニアリ。細管ハ叢束シテ裏ノ質ヲ成ス。又水脈アリ。外面ヲ纏テ腺ニ連リ。水液ヲ腺ニ受テ流通シテ外面及ビ近傍ノ諸器ヲ滋潤シ。末梢ハ皆乳糜囊ニ連リ水液ヲ輸ル。又内側ノ凹處ニ動靜ニ幹脈ノ兩支別及ビ神經連ル。其動脈支ヲ腎動脈ト名ク。其靜脈支ヲ腎靜脈ト名ク。此二脈又微細ニ分レテ腎中ニ彌蔓シ悉ク腺ニ連ル。此ニ

由テ常ニ腎動脈ヨリ血ヲ輸レハ腺コレヲ受テ其  
中ノ滓餘無用ノ鹹渣液無用ヲ濾分テ細管ニ輸  
ル。細管コレヲ受テ悉ク腎盂ノ内ニ湊會ス。此即チ尿  
ナリ。此ヨリ輸尿管ニ輸リテ膀胱ニ納ル。又尿ヲ濾  
取リタル滓餘ノ血ハ腎靜脈ニ傳ヘテ靜脈幹ニ還  
リ。ツノ神經ハ腎中ニ布蔓シテ尿ヲ分泌スルノ機  
關ヲ作シム。○鹹渣ハ體中ノ鹽ノ諸部ヲ養ヒ終リ  
タル渣ト諸液ノ老廢シテ無用トナリタル滓液ト  
相混ジテ血中ニ在ル者ヲ謂フ。此液血中ニ在テ腎  
動脈ヨリ腎ニ行クハ泌別ンテ尿トナリ。動脈ノ細  
支ニ從テ皮下ノ腺ニ行クハ泌別ンテ汗トナル。故  
ニ汗ト尿ト同ジカラズト雖モ共ニ血中ノ一剝液  
ナリ。此ニ由テ汗多クハ尿少ク尿多クハ汗  
少ナシ。但シ此ニ液ノ質差異ナルハ其泌別スル腺

ノ體同シカニサレバナリ。○別ニ腎腺腎ト名ル  
者左右ニアリ。各腎ノ内側ノ上邊ニ副腎ト名ルフ。動靜二幹  
ノ支別ト腎ノ動靜二脈ノ支別ト此ニ連ル。又此ヨ  
リ水脈起テ腎靜脈ニ連ル。此物大小人毎ニ同ジカ  
ラス。大ナル者ハ胡桃子ノ如ク。小ナル者ハ黎豆ノ  
如シ。幼兒ハ大ニシテ幾ント腎ノ如シ。年長スルニ  
隨テ漸ク小ナリ。總テ身體ニ液汁多キ人ハ此物大  
ナリ。其實ハ腺ニシテ其裏空シク。内ニ淡黑色ノ汁  
アリ。此物ノ用ハ血ヲ動脈ニ受テ水液ヲ分泌ンテ  
水脈ニ傳ヘ。腎靜脈ニ流通シテ稠血ヲ稀薄ニシ。靜  
脈幹ニ流利シ易カラシム。腎靜脈ノ血ハ尿ヲ泌別  
シタル滓餘ノ血ナレバ甚ク稠粘ニシテ流利シ難  
クハナリ。其内ニアル淡黑色ノ汁ハ即チ水液ヲ  
分泌シタル滓血ニシテ。此ニ連ル靜脈支ヨリ靜脈

提綱釋義

輸尿管起於腎兩腎各一連于膀胱後側之左右並受尿

於腎輸之膀胱

○輸尿管ハ太サ羽管ノ如キ膜管ニシテ。左右各腎盂ニ起リ。腎ノ内側ヨリ出テ俱ニ腰脊ノ兩側ニ循ヒ下行シテ膀胱後面ノ下部ノ兩側ニ連リ。尿ヲ腎ニ受テ膀胱ニ輸ル

膀胱尿之瀦滿則下口洩之尿道尿道在陰莖中通尿與

精

○膀胱ハ大ナル一膜囊ニシテ男子ハ横骨ト直腸ノ間ニアリ。婦人ハ横骨ト膈トノ間ニ在リ形ヲ捨テニシテ上ハ廣ク圓シ。此ヲ膀胱底ト謂フ。下ハ狹窄ニシテ漸ク細シ。此ヲ膀胱頸ト謂フ。コレ即チ下口ニシテ下テ肛門ト相並ビ。尿道ニ連ル。故ニ其狀チ長頸ノ壘ノ倒懸スルガ如シ。後面ノ下側ノ左右ニ輸尿管連ル。其連ル處。左右相開ク。二指横徑許此管小水ニ輸レバ膀胱受テ瀦留シ。滿レバ下口ヨリ尿道ニ通泄ス。○膀胱ハ尿ノ多少ニ從テ能ク縮張ス。即チ尿溜レバ隨テ張リ。既ニ洩ヒバ隨テ縮ム。コノ一縮一張ノ機ニ由テ尿ヲ搾リ出スナリ。若シ膀胱衰弱シテ不遂ヲ爲シ。或ハ孿急スレバ縮張ノ機轉。常度ヲ失ヒ。尿閉淋瀝或ハ失禁ヲ患フ。○下口ハ其膜特ニ厚ク且筋アリテ能ク其口ヲ括閉ス。此

ニ由テ尿其内ニ猪ルト雖モ。安リニ漏泄スルヲ無シ。然レ尿瀦テ下口ヲ衝撐スレバ自ヲ放開シテ通スルナリ。○尿道ハ一ノ膜管ナリ。男子ハ長ク細シ。其始メ膀胱ノ下口窄小ニシテ此管トナリ肛門ト相接スル處ヨリ屈シテ會陰ノ正縫隙ノ皮下ヲ行テ陰莖ノ根ニ至リ。陰莖ノ下面ノ正中ヲ行テ龜頭ノ端ニ口ヲ開ク婦人ハ此管直ニシテ短ク太シ。膀胱ノ下口ヨリ腔ノ口ト延孔トノ間ニ出テハヲ開ク。其長僅ニ二指横徑許アリ。○膀胱擽急ヲ爲シ。或ハ結石ヲ生シ。或ハ粘液凝結シ。或ハ焮腫スル等ニ由テ下口窒塞シ。尿閉ヲ爲ス者ハ測胞子ト云銀管ヲ尿道ヨリ入レテ膀胱ノ下口ヲ穿開スレバ尿必ス通利入。此ヲ入レニハ預メ尿道ノ長短。曲直。廣狹ヲ認メ知リレハ其術ヲ施シ難シ。婦人ハ短直ニ

シテ太キヲ以テ施シ易ク。且膀胱ニ石ヲ生スルヲモ稀ナリ。偶生スレバ自ラ脱出ス。○腎或ハ輸尿管ニ結石。粘液。焮腫等アリテ閉塞スレバ小便閉ヲ爲ス。此症ハ其毒。膀胱ヨリ上ニ在シテ。測胞子ニテハ通スルヲ能ハス。○腎。輸尿管。膀胱等焮腫シ或ハ粘液結石アリテ窒塞シ或ハ強拘攣急麻痺。不遂シテ縮張ノ常度ヲ失ヒ或ハ尿道中ニ腫瘍。瘻肉ヲ生スル等ハ皆小便閉。不利淋瀝ヲ爲スナリ。腎ニ石ヲ生スルハ。素ヨリ血中ニ粘液アリテ尿ヲ泌別スル際腎中ニ懸留シ。鹹渣中ノ鹽此ニ多ク粘著シテ凝結シ其中ノ清稀ノ液。盡ク漏散スレバ殘滓ノ粘物。膠固硬結シ漸次ニ重層圍積シテ石ヲ成スナリ。此ニ由テ其症。腎部ヨリ腰ニ連テ牽痛シ。或ハ焮腫シ或ハ小便淋瀝尿閉等ヲ爲ス。然レ其石微細ナレ

バ細砂ノ如クニシテ小便ニ通スレバ自ラ知ラヤ  
ル者アリ又患人壯實ナル者ハ血液健運ノ力ニ由  
テ。自ラ其石ヲ輸尿管ニ壓出シ或ハ膀胱ニ下ル  
アリ。斯ノ如キハ皆其石ノ在ル所閉塞シテ小便閉  
ヲ為ス。或ハ粘液。腎中ニ於テ未ダ石トナラズシテ  
膀胱ニ下リ留著シテ石トナル者アリ

畢丸二個俱受血於動血脈分泌之以造精輸之輸精管

○畢丸ハ陰囊中ニ懸垂ス。大小一ナラス。然レ大約  
鳩卵許アリ。右ハ左ヨリ大ナル者多シ。其質ハ纖毫  
微細ノ管。纏縮疊屈シ其中ニ微細ノ腺間錯シ。外面  
膜ヲ被ル。試ニ横斷スレバ其色淡白且疊屈セル細  
管區區相湊リテ周圍ヨリ中央ニ輻湊ス。其狀宛モ  
横斷セル橙柚ノ臍ノ切口ニ似タリ。又其膜ヲ剥ギ

或ハ横斷シテ水ニ漬セバ細管一二條分解シテ  
蛛絲ノ如シ。又別ニ上畢ト名ル者アリ。畢丸中ノ細  
管六七條其上面ニ張出シ。疊屈叢束シテ形テ長ク。  
畢丸ノ上ニ著久。畢丸ヨリハ小ニシテ白ク。畢丸ノ  
外膜ニテ共ニ被包ス。○畢丸ニ動靜二脈。神經。水脈。  
連ル。水脈ハ畢丸ト上畢ヨリ起リ。其靜脈ニ循テ上  
行ス。動脈ハ動脈幹ノ腎部ノ差下ニ當ル處ヨリ二  
支並ビ生ジ。左右腰脊ノ兩側ニ附キ。漸次ニ前ニ向  
テ下行シ。横骨ノ外側ニ循テ腹股合縫ノ處ヨリ陰  
囊中ニ入り。左右各畢丸ニ連ル。靜脈ハ一ハ靜脈幹  
ノ腎部ノ差下ニ當ル處ヨリ起リ。右方ノ動脈ニ部  
テ下行シ。右畢丸ニ連ル。一ハ左ノ腎靜脈ヨリ起リ  
左方ノ動脈ニ部テ下行シ。左畢丸ニ連ル。此靜脈ハ  
左右氏ニ屈折紆曲シ。動脈ハ直行ス。其動脈ヲ精動

脈ト謂ヒ靜脈ヲ精靜脈ト謂フ○精動脈ハ常ニ血ヲ單九ニ輸リ。單九受テ血中ノ精水ヲ分泌シ。殘餘ノ血ハ精靜脈ニ輸リ靜脈幹ニ還ル。其精ハ單九中ノ細管ニ滲通流廻シ。其際ニ精中ノ刺餘ノ水液ヲ水脈ニ注泄シ精靜脈ノ血ニ混ス。此ニ由テ其精醇厚ニナリ。單九ノ細管ヲ歷テ上單ニ行ク。又上單ノ細管ヲ流廻スル際ニ聚ビ精中ニ殘リシ水液ヲ分利シテ水脈ニ注泄シ。其精全ク純粹ニ熟成スルニ至テ輸精管ニ輸ル。故ニ單九ハ精ヲ造リテ資生ノ基趾ヲ建ル一大貴重ノ器トス。凡ソ單九ノ打撲損傷。嗽腫。潰瘍ニ由テ缺損シ或ハ頑硬結腫スル等。皆其細管閉塞シテ精ヲ造ル不能ハズ或ハ稍分泌スト雖モ純粹ナラスシテ必ズ子ヲ生スルコト無シ

輸精管輸精于精囊之管雙起於兩單俱連于精囊

○輸精管ハ小ナル膜管ニシテ上單ニ起ル。其始ノ上單ノ細管悉ク延長シテ錯綜會束シ。終ニ湊合シテ此管トナリ。精動脈精靜脈ニ循ヒ上行シテ小腹ニ入り。横骨ノ上際ヨリ曲テ左右各膀胱後面ノ下側ニ行キ。輸尿管ノ差下ノ處ヨリ精囊ニ入ル。其起ル處ハ細ク上行スルニ隨テ漸ク太シ。此管。精ヲ上單ニ受テ精囊ニ輸ルナリ

精囊其精之囊在膀胱下之背側情感則射出精於尿道  
尿道有小孔與精囊通

○精囊ハ一物ニシテ左右ニ分ル。其長各三四指橫

○精囊ハ一物ニシテ左右ニ分ル。其長各三四指橫





徑許幅一拇指橫徑許。外面薄膜ヲ被ル。膀胱後面ノ  
 下端ノ左右ニ著キ。直腸ニ接ス。其形チ上ハ左右ニ  
 廣ク相離レテ膀胱ノ後面ノ兩側ニ著キ。下ハ狹ク  
 相接シテ膀胱ノ下口ノ下面ニ著キ。其端左右共ニ細  
 キ管トナリ相並ンデ尿道ニ通ス。外膜ヲ剥テ其裏  
 ヲ見レバ。小ナル膜管ヲ疊折廻束シテ其狀小鳥ノ  
 鴈ノ廻疊スルニ似タリ。輸精管ヲ竹管ニテ吹ケバ。  
 其氣精囊ニ充テ起脹シ。相傳テ尿道ニ通ス。精囊ノ  
 下端ノ兩管ハ長一拇指橫徑許ニシテ本ハ差太ク。  
 末ハ甚ダ細ク。左右相並テ膀胱ノ下口。尿道ノ始メ  
 ノ處ノ下面ヨリ其内ニ通ス。此ヲ射精管ト謂フ。尿  
 道ヲ剖割シテ觀レバ。射精管ノ孔相並テ幾ド小鳥  
 ノ兩眼ノ如シ。指ヲ以テ精囊ヲ押バ。精此孔ヨリ流  
 出ス。又射精管ノ兩孔ノ隔間ニ。豎ニ長キ突起ノ小

肉アリ。此ヲ雞冠ト謂フ。精ヲ射出スルノ時兩管ニ  
 齊シク精水充滿スレバ此間隔アルヲ以テ。其管相  
 壓テ閉塞スルヲ無ク。又此ヲ以テ常ニ管口ヲ括閉  
 シテ矣リニ精ヲ漏スルヲ無シ。○精囊ハ常ニ精ヲ輸  
 精管ヨリ受テ蓄藏シ。情慾動キ快美ノ時ニ當テ射  
 精管ヨリ尿道ニ通泄ス。又此囊ニ多ク微細ノ水脈  
 アリテ近傍ノ諸器ノ靜脈ニ連リ或ハ蔓延シテ乳  
 糜諸道ニ連ル。平常精水滿溢スレバ此水脈ニ通シ  
 テ靜脈ノ血ニ和シ或ハ乳糜諸道ニ輸リテ乳糜ニ  
 混ス其故ハ精久ク其内ニ滿テ鬱スレバ腐敗シテ  
 酷厲ノ液トナレハナリ。○凡ソ人情意發動スレバ  
 陰莖強直ニナリ。其脈絡及ビ筋ノ中ニ血充實シテ  
 焮熱起脹ス。此ニ於テ交接シテ頻リニ此ヲ摩蕩ス

レバ神經大ニ感觸シテ快美ヲ起シ。靈液<sup>リキ</sup>逾<sup>リ</sup>注<sup>ス</sup>キ來<sup>ル</sup>テ諸筋緊張シ勃起怒張ノ勢ヲ逞<sup>ク</sup>ス。靈液<sup>リキ</sup>神經ニ充満スルノ已<sup>ニ</sup>甚<sup>キ</sup>ニ至<sup>ル</sup>レバ感覺スル<sup>ル</sup>モ其極ニ至<sup>ル</sup>リ。堪<sup>ハ</sup>忍<sup>ブ</sup>ベカテスシテ其勢直<sup>ニ</sup>精囊ニ連<sup>リ</sup>及<sup>シ</sup>シ。精囊ノ神經諸筋忽チ擧<sup>ゲ</sup>急<sup>シ</sup>シテ一<sup>ニ</sup>齊<sup>ニ</sup>精囊ヲ壓<sup>ス</sup>迫<sup>ス</sup>シ。精ヲ尿道ニ傾<sup>テ</sup>寫<sup>シ</sup>テ射出スルナリ。○攝護ト云フ者アリ。精囊ノ下尿道ノ始メノ處ノ下面ニ著<sup>ク</sup>。此物兩體ナレバ左右相接合シ薄膜<sup>ニ</sup>被<sup>テ</sup>一<sup>ニ</sup>形<sup>ヲ</sup>或<sup>シ</sup>シ。楯圓ニシテ大サ胡桃子ノ如ク。柔軟鬆疎ニシテ氷綿<sup>ニ</sup>似<sup>タ</sup>リ。兩ノ射精管<sup>中</sup>ヲ貫<sup>テ</sup>尿道一通<sup>ス</sup>。其質ハ腺ト微細ノ管ヲ交<sup>ヘ</sup>テ成<sup>リ</sup>。動靜二脈神經連<sup>リ</sup>絡<sup>フ</sup>。又多クノ細管<sup>中</sup>ノ腺ヨリ尿道中ノ射精管孔ノ傍<sup>ニ</sup>通<sup>ジ</sup>。雜冠ノ周圍<sup>ニ</sup>數孔ヲ開<sup>ク</sup>。其孔ノ數<sup>大</sup>約<sup>十</sup>許<sup>アリ</sup>。試<sup>ニ</sup>指<sup>ニ</sup>テ此器ヲ押<sup>セ</sup>バ清

澄<sup>ナル</sup>滑液<sup>其</sup>孔ヨリ流出ス。又此ヲ割斷スレバ其内ニ滑液充<sup>ツ</sup>。此器ノ用ハ常ニ血ヲ動脈ヨリ其中ノ腺ニ受<sup>ク</sup>。泌<sup>別</sup>濾<sup>清</sup>シテ滑液ヲ取<sup>リ</sup>此内ニ蓄<sup>テ</sup>其管ヨリ尿道ニ滲<sup>シ</sup>。居<sup>恒</sup>尿道ヲ滑利滋潤シテ尿性ノ鹹厲慄悍ナレバ能ク攝護シテ侵刺傷爛スル<sup>ト</sup>無<sup>ラ</sup>シム。又交媾シテ精ヲ射出セントスルノ前ニ此液先<sup>ツ</sup>一<sup>ニ</sup>頸<sup>ニ</sup>多ク進出シテ尿道ニ灌注シ。此ヲ以<sup>テ</sup>一<sup>ニ</sup>ハ精ヲ滑利ニシテ能ク流射セシメ。一<sup>ニ</sup>ハ精ヲ包攝圍護シテ精中ニ含<sup>ム</sup>所ノ純粹精微ノ神氣ヲシテ飛散逆脱スル<sup>ト</sup>無<sup>ク</sup>子宮ニ射入セシム。此器老人小兒ハ小ナリ。中年或ハ多慾ナル者ハ大ナリ。○凡<sup>ソ</sup>此器衰弱シテ機關ヲ失<sup>ヘ</sup>バ其液常ニ漏泄シテ遺精滑泄ノ病ム。○此器ニ惡液留結シテ大ニ腫脹スレバ尿道ヲ壓塞ヤテ小便閉ラ

爲ス○癰毒アル婦人ト交接シテ毒液ノ蒸氣尿道ヨリ薰蒸侵入スレハ尿道刺痛陰莖焮腫シ攝護ノ細管口ヲ侵蝕スレハ攝護ノ液多ク流泄シ膿ヲ成セバ膿汁ヲ泄シ淋疾トナル或ハ尿道中ノ細血絡ヲ侵蝕スレバ血ヲ通利ス或ハ其焮熱ニ由テ陰莖ノ諸筋ニ汚血流滿スレバ陰莖硬強不遂孿急ヲ爲シ神經纏急シテ切痛ヲ爲ス若シ速ニ救療セズシテ攝護ノ細管口ヲ深ク腐蝕スレバ其口全ク瘡ルテ能ハズシテ常ニ汚液流泄シ久淋或ハ滑精トナル或ハ其毒甚フシテ攝護ニ侵入スレバ必ス膿ヲ成シ夥ク粘穢ノ膿汁ヲ滲出シテ尿道ヨリ通泄人○攝護ヨリ陰莖精囊膀胱ニ連ル血脈ニ病毒浸染シ血ニ混シテ敷衍スレバ膀胱頭精囊陰莖盡ク焮熱腫痛シ或ハ膿潰腐爛シテ缺損シ或ハ尿道閉塞

シ或ハ膿汁粘結膠固シテ尿管ヲ爲ス或ハ尿道腐爛シ尿管ノ鹹烈慄慄ノ夜侵刺シテ刺痛ヲ發ス或ハ其毒滋蔓シテ腹股合縫ノ處ノ腺ニ留結スレハ便毒トナル又尿道中潰瘍ノ痕頑固シテ瘰癧ノ如ク爲リ尿道狹クシテ尿管ノ通利ヲ碍ルヲナリ

子宮在膀胱與直腸之間左右外側各有一膜管而著焉

謂之喇叭管管上又各有一膜囊而著焉謂之卵巢巢中

有許多小囊如豆大而精液滿焉謂之卵男精舍神射宮

由管入巢著卵卵得其神而漸大則由管逆出舍于宮以

為胚胎

○子宮ハ大サ難卵ノ如ク。形チ小囊ヲ倒懸スルニ似タリ。上底ハ廣フシテ幅ニ指半横徑許下口ハ窄フシテ幅一指横徑許。腔ノ底ニアリ其口小二陰莖ノ口ヲ横ニスル狀ノ如シ。既ニ産スル者ハ較潤シ。上底ヨリトロニ至ルツテ。長三指横徑許。全圓ノ厚サニ指横徑許。上廣々下窄キヲ以テ全形圓ナラス。頗ル三隅形ナリ。内空ハ狹フシテ僅ニ蠶豆ヲ容ル許ナリ。然レ卵メハ延張テ潤大ニナリ。其底臍或ハ臍上ニ至ル。其體質ハ肉ノ如ク又膜ノ如クニシテ甚々厚シ。局テ延張スレバ從テ漸ク薄シ。○子宮ニ血脈神經。水脈偏ク連ル。血脈ハ小腹内ニ於テ動靜二幹。各左右兩支ヲ生シ共ニ子宮ニ循行シテ

復々多クノ支別ヲ分チ周ク子宮ヲ纏絡ス。又精動脈精靜脈ノ多クノ支別左右卵巢ヨリ子宮ヲ絡ノ○喇八管ハ兩ノ膜管ニシテ横ニ子宮底ノ左右外側ニ著キ。其内ニ通ス。人毎ニ長短差同シカラス。又老少年行ニ由テ殊ナリ。大抵短キ者ハ四指横徑許長キ者ハ八九指横徑許。子宮ニ著ク處ハ甚々細ク末ニ至テハ漸ク太ク。大約小指ノ容ベシ。然レ其端ニ至テハ復々差窄クナリ。其口ノ全圍ニ釐ク小ナル肉條アリ。長ク展開テ宛モ卵絲花ノ如シ故ニ此ヲ剪絲ト名ク。子宮ニ著ク處ヨリ端ニ至ルマテ弓ノ如ク屈曲シテ上ニ向セ。卵巢ヲ抱クナリ。○卵巢ハ左右各喇以管ノ上ニ著キ子宮底ノ兩側ニアリ。子宮底ヲ離ルル各二指横徑許。形チ楕圓ニシテ外面膜ヲ被リ。差凸凹アリテ灰白色。大サ中年ノ

提綱釋義

卷之二

三十一

者ハ大抵小ナル鳩卵ノ如シ。老婦ハ乾ニ皺縮シ少  
女ハ軟柔平滑ニシテ俱ニ小ナリ。動靜三脈。神經。水  
脈此ニ連リ皆支分シテ其裏ニ彌蔓ス婦人ノ此器  
アルハ男子ノ畢丸アルガ如ク其動靜二脈ノ起ル  
所及ビ屈折紆曲シテ此器ニ連ルノ狀。男子ノ精動  
脈精靜脈ノ畢丸ニ連ルガ如シ。故ニ亦其動脈ヲ精  
動脈ト謂モ。其靜脈ヲ精靜脈ト謂フ。又此二脈ノ支  
別多ク子宮ト刺ハ管ヲ絡フ。外膜ヲ剥バ其裏白色  
ニシテ柔軟。其質ハ微細ノ膜ト纖毫ノ管トヲ錯綜  
合織シテ成ル。畢竟此一種ノ腺ナリ。○卵巢中ニ小  
膜囊アリ。大小一ナラス然レ大約黎豆ノ如シ。少女  
老婦ハ俱ニ小ナリ。其數多少アリト雖モ大抵一卵  
巢一二十許アリ。此ヲ卵ト謂フ卵中ニ清澄ノ液充  
ツ是即チ精ナリ。試ニコレヲ煮レハ凝固シテ色味

俱ニ雞子白ノ如シ○卵巢ハ常ニ血ヲ精動脈ニ受  
ケ。其中ノ精ヲ泌別シテ卵中ニ藏ム。其殘滓ノ血ハ  
精靜脈ニ通シテ靜脈幹ニ還リ。神經ハ血ヲ泌別ス  
ルノ機ヲ發シ。水脈ハ水液ヲ卵巢ニ受ケ又溢餘ノ  
精ヲ卵ニ受テ精靜脈及ビ其傍邊ノ靜脈ニ連リ或  
ハ乳糜諸道ニ連リテ流通スルナリ○腺ハ陰門ヨ  
リ子宮口マテヲ謂フ。陰莖ヲ受容シ。胎子産出。月經  
通利ノ用ヲ爲ス。後ハ直腸ニ著キ。前ハ膀胱ニ著シ。  
其内ニ編ク皺襞アリ。特ニ前ノ方ニ多シ。既ニ産ス  
ル者ハ皺襞較減ス。神經布满シテ知覺甚ク敏ナリ。  
皺襞ノ中ニ細小ノ腺アリ。特ニ腔ノ上面ニ多シ。此ヨ  
リ常ニ滑液ヲ滲出シテ滋潤ス。若シ情意ヲ生スレ  
バ男子ノ陰莖ノ如ク神經ニ靈液充満シ。隨テ血モ  
脈終ニ盈脹ス。故ニ此器ノ筋肉皆起張シ其液多ク

是問

湧出シテ神經ニ浸透シ。頻リニ衝動シテ逾情意ヲ  
發起ス。既ニ交接スルニ至テハ此液甚ダ多ク出ル  
男子ノ攝護ノ液ノ如シ。又子宮口ノ裏面ニモ腺  
アリテ滑液ヲ滲出ス。其感快ノ極ニ至テ射出スル  
ノ汁モ此液ノ一齊ニ多ク湧泄スルナリ。卵中ノ精  
液出ルニ非ズ。○腔ヨリ出ル液ノ性。酷厲ニナリテ  
常ニ多ク滲出スレバ白帶下トナル。或ハ其神經ヲ  
侵刺スレバ疼痛ヲ發シ。諸筋ニ留著スレバ膀胱ニ  
連テ攣急シ。遂ニ小便不利ヲ爲ス。アリ○腔ハ直  
腸ニ著キ。唯膜ニテ隔ツノミ。故ニ直腸ノ潰瘍漏瘡  
或ハ難産等ニテ其膜破裂シ。大便。腔ヨリ漏出スル  
者アリ。○男子ノ精。子宮ニ注射スレバ。精中ニ含メ  
ル純粹精微ノ神氣ハ自ラ喇叭管中ニ竄透シ。其殘  
滓ノ粘汁ハ復々子宮ヨリ腔ニ出ヅ。其神氣ハ喇叭

管ヲ通行シ。端末ノ口ヨリ卵巢ニ滲透シ。其中ノ一  
卵ニ入ル。此ニ於テ兩氣合感シ生機發動シテ其卵  
漸ク盈長シ。活勢日ニ萌起シテ靜藏セズ。以巢中ノ  
諸脈管モ血液充テ腫脹シ其卵ヲ壓迫ス。故ニ卵巢  
ノ外膜目ノ破綻シテ卵其中ヨリ迸出シ。喇叭管端  
ノ剪絲コレヲ圍拵纏絡シテ管中ニ收メ容レ漸ク  
子宮ニ納ル。此ニ由テ卵巢萎縮シ。其包膜ノ破綻ノ  
處自ラ産へ竟ニ其處癩痕ヲナス。故ニ産兒多少ノ  
數ニ從テ其痕モ亦多少アリ。子宮ニ來リ余スルノ  
卵ハ自チ肝脾ニシテ。時ニ漸ク生息シ。子宮内ノ血  
絡。卵ノ外膜ヲ終ヒ聚テ終ニ胞衣ヲ成シ。又其中ヨ  
リ動靜ニ脈ノ支別。卵中ニ連テ臍帶トナリ常ニ胞  
衣ヨリ血ヲ往來シ榮養長育ヲ爲ス。ナリ○凡ソ氣形  
ノ活物皆卵ヨリ生ゼザルハ無シ。唯其卵母體ニ在

テ化スルト體外ニ在テ化スルトノ別アルノミ所  
 謂胎生ハ其卵母體ニ在テ化スルトナリ。卵生ハ其卵  
 體外ニ出テ化スルトナリ。畜ニ活物ノミナラズ。草木  
 ノ子仁モ亦此レ一種ノ卵ニシテ。土中ニ在テ化フ  
 ル者ナリ。○巢中ノ卵或ハ甚ダ大ニシテ水ノ如キ  
 液充チ。試ニ此ヲ煮ルニ凝固ヒザル者アリ。或ハ卵  
 巢ノ大サ拳ノ如ク。其中ニ卵無フシテ粘液又ハ緑  
 色黄色ノ液満チ又ハ結石生スル者アリ。コレ皆血  
 中悪液アリテ卵巢ニ滲入シ蓄ルナリ。或ハ巢中ニ  
 卵及ヒ液無ク唯肉ノ如キ者アリ。又喇叭管ニ孔無  
 キ者アリ。此ニツノ者ハ共ニ天稟ノ異常トス。或ハ  
 喇叭管ニ粘稠ノ悪液窒塞スル者アリ。總テ斯ノ如  
 キ者ハ皆弱ムトナシ。○卵既ニ男子ノ精ヲ受テ子  
 宮ニ含ルト雖モ母體虛弱ニシテ子宮ノ血絡ニテ

養フテ能ハザレバ。卵白ヲ腐壞シ。凝塊ノ汚液トナ  
 リテ漏出スル者多シ。○妊母ノ血中瘀液アリテ喇  
 叭管ニ滯塞シ。或ハ子宮ノ病或ハ他ノ病因アリテ  
 喇叭管。剪絲片ニ孳急牽縮シ。卵巢ヨリ迸出スル時  
 ニ臨テ剪絲コレヲ抱攝スルヲ能ハザレバ。其卵。管  
 中ニハルヲ得ズシテ常途ヲ失ヒ。小腹内ノ罅隙  
 ニ落ツ。又ハ剪絲常ノ如ク抱攝シテ管中ニ容ルト  
 雖モ其管ノ窒塞スル所ニ滯止シテ子宮ニ含ルト  
 ヲ得ザンバ。其卵生氣ヲ含ムニ由テ本位ニ非スト  
 雖モ時ニ滋息盈長シテ其管緊脹シ。遂ニ破裂シテ  
 小腹内ニ落ルナリ。此ニ證俱ニ本位ヲ變シ常居ヲ  
 失フト雖モ。卵子ノ生機活潑崩動スルヲ以テ其部  
 ノ血絡コレヲ連絡シ卵ノ外膜ニ聚テ胞衣ヲ成シ  
 臍帶ヲ生シテ養長シ。終ニ全ク兒形ヲ成ス。然レ母

體ノ脆弱ナル者ハ久ク養長スルヲ能ハズシテ其  
胎腐壞シ。壞液。母體ニ浸滲シ。諸惡症ヲ發シテ死ス。  
其壯實ナル者ハ體中健運ノ機力ヲ以テ胞衣ヨリ  
血ヲ輸リテ榮養ノ路ヲ絶ズ。且月滿ルト雖生産出  
ノ道路ナラシテ胞衣ヲ脱セザレバ。其血ヲ輸ル  
止ズシテ月ヲ累子年ヲ經テ全ク長育シ。骨堅マリ  
齒生シ髮長スルニ至ル。然在胎本位ニ非ズ終ニ  
産出ノ道ナキヲ以テ生胎ト雖モ一大危厄ノ疾ト  
ス。故ニ終ニ自然ノ良能ニ由テ血脈ノ養ヲ絶テ其  
傍邊ノ諸器モ次第ニ強ク壓迫シテ生機自ラ熄  
胎兒死シテ終ニ腐壞ヲ爲ス。此時ニ當テ母體頻  
ニ諸險症ヲ發シ。患苦百端舉テ數ハ難シ。コレ畢竟  
自然良能ノ力ニ由テコレヲ體外ニ驅除セント欲  
シテ爲ス所ナレバ。排出スヘキ道ナキヲ以テ死胎

ノ壞液日ニ漸ク母體ニ浸滲シ。母モ亦死スルナリ。  
但シ母體ノ特ニ強健ナル者ハ。更ニ良能ノ勢力ニ  
テ死胎ノ近傍ノ諸器ヲ腐蝕シ其潰口ヨリ驅出ス  
ルナリ。即チ直腸ニ由ル者ハ肛門ヨリ下シ。子宮  
ニ由ル者ハ陰戸ヨリ出シ。或ハ小腹突腫。膿瘍ヲ生  
シ。其潰口ヨリ出ル者アリ。斯ノ如キハ必ス碎骨。齒  
牙。毛髮。筋膜。腦蓋。頭面。手足等壞爛シテ奇態異狀ヲ  
爲シ其膿一從テ脱出ス。既ニ膿潰シテ後。其母精力  
尚餘裕アレハ。穢物盡ク除キ瘡口全ク收マリテ中  
外故ニ復ス。此モ亦良能ノ妙機ニ由テ偶活路ヲ表  
位ニ開ク者ニシテ厄中ノ大幸ト謂フベシ。症後ハ予  
往々候コレ有テ聞ク前ノ症ニ非ハ病ナレバ。固ヨリ  
外ハ候コレ有テ明察スベキ難シ。其死後ニ至テ候  
或ハ血塊シテ或ハ毛骨等癩癩シテ難シ。至テ候  
或ハ血塊シテ或ハ毛骨等癩癩シテ難シ。至テ候  
或ハ血塊シテ或ハ毛骨等癩癩シテ難シ。至テ候



其原由ヲ究ム。假令治セザルニ於テ至ルモ其然ル所以  
 ヲ知ラフハ。法方ヲ施スニ於テ錯誤ヲ為スル所ト以  
 ベカシ。○男子ノ精ハ本血中ノ精液ニシテ精微透竄  
 ノ鹽氣及ビ油氣アリ。且靈液ヲ夾ス。少ナカラズ。  
 凡ノ人大抵十四五歳以前ハ血液未ク醇厚ナラザ  
 ルニ由テ精ヲ造ル。少ナク且ツ淡水ノ如クニシ  
 テ透竄揮發ノ鹽氣微ナリ。歳長シ血液醇厚熟成ス  
 ルニ從テ精ヲ造ル。多ク且純粹ニシテ常ニ精囊  
 ニ蓄藏ス。然レ滿溢スレバ自ラ精囊ニ連ル水脈ヨ  
 リ靜脈ノ血中ニ流通ス。此ニ由テ又ク精囊中ニ鬱  
 留ニテ腐敗ヲ爲ス。無シ。又其精常ニ血中ニ入り  
 透竄揮發ノ鹽氣ヲ以テ血ヲ沸釀化熟シ。血液更ニ  
 活潑健運ス。故ニ漸ク陰具ノ血脈ニ充テ其諸筋ヲ  
 獎勵シ。攝護ノ液モ鹽氣ヲ帶ビ其部ノ神經ニ滲浸  
 シテ自ラ靈液ヲ催起シ。遂ニ情意ヲ發動シテ生生

ノ用ヲ爲スナリ。○婦人モ年長スレバ其血醇厚ニ  
 シテ卵中ノ精ヲ造ル。多ク且純粹ナリ。故ニ滿溢  
 スレバ亦水脈ヨリ靜脈ノ血ニ入り。血液沸釀シテ  
 陰具ノ血脈ニ充テ。又腔中及ビ子宮口ノ裏面。陰門  
 唇等ヨリ出ル滑液モ鹽氣ヲ帶テ神經ニ滲浸シ。靈  
 液ヲ催起シテ漸ク情意ヲ發動スル。男子ト同ジ  
 ○房勞過度スレバ精神乏弱。身體羸瘦。皮膚色澤ヲ  
 失ヒ終ニ諸險症ヲ發シ。或ハ勞瘵トナル。其故ハ血  
 中純粹ノ精液及ビ揮發ノ鹽氣共ニ缺損シテ活潑  
 健運スル。不能ハズ。其血諸部ヲ榮養シ。諸液ヲ分利  
 スルニ足ズシテ身體漸ク枯瘦ス。又血中ノ精氣減  
 スルニ由テ腦ニ上テ靈液ヲ生ズル。寡ク精神モ  
 衰乏スルナリ。○婦人十四五歳ニ至レバ其精漸ク  
 熟成シ。且月經通ス。猶男子此年行ニ至テ精熟成ス

ルカ如シ。其故ハ婦人ノ卵巢ハ男子ノ睪丸ノ如ク  
 精動脈ノ血ヲ受テ精ヲ分泌ス。但シ年幼ナレバ血  
 未タ醇厚ナラハルヲ以テ精モ亦純粹ナラス。又於  
 十四五歳ニ至テ血及ビ精熟成シ。自ラ卵中ニ滿溢マ  
 レバ水脈ヨリ靜脈ノ血ニ入テ。卵中ニ鬱敗スルコ  
 ナク。又其醇厚活潑ノ精大ニ血ヲ沸釀シ。運行ノ勢  
 盛ニニテ。或ハ乳内ノ腺ニ流レ滿レバ乳房起脹  
 シ。或ハ子宮ノ動脈ニ流レ滿レバ其内ニ通スル細  
 絡ヨリ子宮内ニ滲出シテ下口ニ泄レ月經トナル。  
 此血ハ固ヨリ胎兒ヲ養フ爲ニ設ルヲ以テ。男子ニ  
 比スレハ自然ニ多ク生ズ。故ニ屬マホルノ時ハ其  
 剝行ニ屬スルノ血ハ月經トナリテ泄去リ。其餘ハ  
 子宮ノ靜脈ヨリ還流シテ靜脈幹ニ輸リ。常ニ身體  
 ヲ榮養スルノ用トトル。然レ月經通ズルノ時ニハ

其血靜脈ニ還リ行ヨリハ月經トナリテ外泄スルコ  
 居多ナリ。斯ノ如ク通泄スルノ多キニ由テ體中諸  
 血脈ニ滿溢スルノ血減シ。精ノ血ヲ沸騰スル勢モ  
 次第ニ靜止シ。運行更ニ和平ニシテ調順ナリ。爾後復  
 タ盈テ剝餘トナレバ外泄スルコト前ノ如シ。○月經  
 ノ時小腹ヨリ腰ニ連テ痛ミ。發熱。頭痛。脚脛懈惰等  
 ノ諸症ヲ患ル者多シ。此其過多ノ血。子宮ヲ絡フ血  
 脈ニ滿溢スレバ子宮ニ連絡スル脊髓神經ヲ壓迫  
 シ。此ニ屬スル諸筋盡ク攣急シテ。子宮及ビ腰部掣  
 痛スルナリ。又血過多ナルニ由テ運行増盛シテ一  
 身ニ沸騰衝動シ。發熱頭痛等ヲ發ス。血ノ酷厲ナル  
 者ハ其他諸症ヲ發ス。又其血子宮ノ脈絡ニ滿溢膨  
 脹シテ脚部ニ循ル血脈ヲ障碍シ常度ノ如ク下部  
 ニ輸ラズ。故ニ足脚ノ諸筋ニ行ノ血減シテ懈惰ヲ

爲スナリ。凡ノ乳汁出ル者ハ月經下ラズ。コレ血  
乳房ニ多ク行テ乳汁ヲ分利シ。血中揮發ノ鹽氣及  
ビ純粹ノ精モ乳汁ニ和シテ外泄シ其血子宮ニ滯  
溢スルニ足ザルナリ。然レ産後無幾月經來ル者ア  
リ。コレ素ヨリ體中多血ニシテ産後速ニ滿溢スル  
ナリ。又産後兩三年ノ中乳兒アレ月經行ル者ア  
リ。コレ血液漸ク増生シテ盈餘ニ至リ。且乳汁ノ次  
第ニ減スルニ隨テ月經トナルナリ。又妊娠中二月  
經行ル者アリ。コレ多血ノ最モ其キ者ナリ

腹膜薄而複。透亮表者謂之外腹膜。周布腹腔裏面如一  
大囊。統包諸器裏者謂之内腹膜。就諸器形區包之俾之

相連不失位置

腹膜ハ重複ノ薄膜ナリ。外腹膜ハ腹腔ノ裏面ニ周  
布シ。悉ク其内ノ諸物ヲ包容スル。肋膜ノ胸腔ニ  
在ガ如シ。上ハ横膈ノ下面ニ著キ。下ハ胛骨。横骨。尾  
骶骨ノ裏面ニ著キ。後ハ腰骨。薦骨ニ著キ。前及ビ兩  
側ハ腹筋ノ裏面ニ著ク。故ニ一大囊ノ如ク腹中ノ  
諸臟諸器ヲ包容ス。内腹膜ノ外腹膜ノ裏面ニ在テ  
胃。腸。腸間膜。肝。膽。脾。腎。膀胱。子宮。胃管。乳糜囊。精血  
脈。輸尿管等ノ形ニ從テ區ニ包裹シ各其器ノ外被  
膜ト爲ル。斯ノ如ク區包スレト本一膜ナルヲ以テ  
悉ク相連リテ離ル。ナシ。故ニ腹中ノ諸器皆此膜  
ニテ維持スル。亦胸膜ノ胸中諸器ヲ維持スルガ  
如シ。又甚ク薄キヲ以テ解剖ノ時。腹ノ筋皮ヲ剥去

レハ諸臟皆外腹膜上ヨリ透見ス○外腹膜ノ用ハ  
腹中ノ諸器ヲ總包圍容シテ維持衛護シ又諸器ノ  
柔軟ナルト腹腔ヲ圍擁スル筋骨ノ堅硬ナルトヲ  
間隔シテ觸損スルヲ無ラシム。内腹膜ノ用ハ各臟  
諸器ヲ區包シ。動搖スト雖モ相磨シテ毀傷スルヲ  
無ク又此膜ニテ諸器相連リテ位置ヲ失フヲ無ラ  
シメ且横膈ノ低昂ニ從テ腹中ノ諸器共ニ弛  
張動搖ヲ爲サシム

網膜狀如網薄而復透亮。在外腹膜裏而被布于腸上連  
胃。肝脾下展施臍邊凡腹腔諸器之筋膜所以得肥澤緩  
舒温煦之調者以複間夾脂肪也

○網膜ハ重複ノ薄膜ニシテ外腹膜ノ裏ニ在リ。上  
ハ胃肝脾ニ連リ。トハ臍邊ニ至リ。其間徧ク腸ヲ被  
フ。二膜凡ニ甚ダ薄ク透徹シ。此ニ白色ノ線條アリ  
テ羅網ノ如ク錯綜シ。又重複ノ間ニ動靜二脈。神經  
水脈。脂膜。脂肪。布蔓ス。故ニ此膜ハ紅白ノ線ニ黃脂  
ヲ加テ織リタル網ノ如ク。其狀甚ダ美ナリ○此膜  
ノ用ハ其中ノ脂膜ニ動脈ノ血ヲ受テ泌別シテ脂  
肪ヲ取リ。膜中ニ蓄藏シテ常ニ腹部ノ諸臟筋膜ニ  
滲流シ。融和緩舒シテ牽急牽縮スルヲ無ラシム。又  
能ク温煖滋養シテ筋肉ヲ肥ス。故ニ體肥テ腹ノ豐  
大ナル人ハ此膜ニ脂肪滿テ甚ダ厚シ。瘦人ハ此ニ  
脂肪少ナフシテ薄ク且皺縮ス。即チ腹ノ肥瘦緩急  
ハ此膜ノ厚薄。脂肪ノ多少ニ因ルナリ○此膜ニ布  
蔓スル神經ハ脂肪ヲ泌別スルノ機力ヲ發起シ。水

是綱目釋義 卷之二 三十五

脈ハ水液ヲ脂膜ニ受テ靜脈ニ輸リ或ハ傷邊ノ諸部ニ注テ滋潤ノ用ヲナス。又脂膜ニ水液ア<sup>レ</sup>バ脂肪ニ混ジテ其質純粹ナラス故ニ水脈ニテ盡ク其水液ヲ除キ去ルナリ尚脂膜ノ条ト參考スベシ

西說醫範提綱釋義卷之二

終



Ken.

