

醫圖療手引草 上編 坤

ヤ 9

1094



醫療手引草上編坤

參河烏巢道人謙齋著

平安男 加藤玄順 校補

越前 門人 尾崎元麟 校正

瘧

瘧ハ素問ニ瘧論アリ殊外委シク記シテアレヒ念ヲ入レテ能見テ今日用
ニ立ガタキナリ某ニテハ愈ヌガ究ニテ愈ルコトモアリ医者ノ手取道具ナ
リト吳崑ガ方考ニ書レ通リナリワレテ是デタシカニヨキト自慢ハナ
ラソ然レモ先ツ療治ノ大法ヲ知テ子ハナラヌ



○フルヒハ毎日フルフナリ一日ハサメニフルヒ或二日三日ヲ隔テフルフアリ古人ノ論ニ日フルヒハ輕ク一日オキハ重ク二日三日隔ハ尚重シトアレレ今病人ヲ見ルニ兎角日フルヒガ重キナリ一日隔ハ仕ヨキコトナリ二日三日ハコレケタルナリ是ハ長引モノナリ然レハ大方ガ一日隔ニテ日フルヒヤ二日隔ハスクナキナリ

○日フルヒニモセヨ一日ハサメニモセヨ寒熱ヲ能見分ヨソレニハイウク功者ナル見マウアレレ指當リテ寒ケ少ク熱多ケレハ熱證ナリ寒ケ多ク熱少ケレハ寒證ナリ一向ニ寒ケバカリニテ熱ナキアリ熱バカリニテ寒ケナキアリ是ハ大熱證大寒證ナリ俞嘉言カ医門法律ニ柴胡姜

桂湯ト云茶ヲ出ス小柴胡湯ニ去人参加乾姜肉桂モノナリ寒證ナラバ肉桂乾姜ヲ多ク加ベシ熱證ナラバ肉桂乾姜ヲ減ジテ柴胡黄芩ヲ多ク加ベシ是カアリベカ、リノ主方トスベシ加減ハ渴キ強クバ加天花粉大方ツカヘガアルモノナリ痞バ枳實香附ヲ加ベキナリ嘔アラバ半夏ヲ倍シ莪朮ニテモツカヘヲ推ス茶ヲ可加ナリ瘧ノ嘔ハ大方ツカヘアルユヘナリ或熱ノ強キユヘニモ嘔ヲナス熱強キト見ハイヨ、黄芩ヲ倍スベシ是テ必オツルモノニテモナケレ此療治ニテハ過ナシイカニモ虚證ナルモノ草臥見ヘバ人參ヲモ加ベシ金匱ニ柴胡姜桂湯アリ

同方ナリ其方柴胡一分 桂枝一分 乾姜一分 枳實根二分 黄芩一分 五厘 牡蛎

一分 甘草一分 右七味水以四孟煎二孟去滓煎一孟之瘧寒多者微レク熱アリ
 或但寒 不熱ニ用ル方ナリ予試用ルニ寒瘧ニ限ラズ最初ヨリ截柴ノミヲ
 用テ發汗共一旦ヲナルト云ヘ凡振上復シクノ胸腹痛 勞瘧ノマウニナリ
 シモ此方即効アリ牡蠣ハ生ニテお碎キ用ヘシ或分量倍シテ柴胡八分
 ノ分量ニスレバ一貼ニ及五分ナリ某汁コキヲ嫌フモノハ一々二分五厘トスベシ水
 量ハ貼ノ多少ニヨラス同前ナリ初瘧ナド長引モノ此湯ニテ大方ヨシ
 医門法律ノ方モ此方ヲ據トノ組タル方ト見ヘタリ又最初ヨリ截柴ナド
 禁ジテ柴桂湯ヲ用レバ自然ト截ルモノナリ證ニヨルベシ
 ○寒クナレニ熱バカリアル大熱ノ證ニ八九味清脾湯或暑月ナラズ白虎湯

或白虎加桂湯或柴白湯ヲ用ヘシ熱瘧ヲ治スルニ大柴胡湯ヲ用ニ微利シテ
 後餘邪未盡ニハ白芷湯ト云方ヲ用ヘシ白芷知母 石膏 芍薬 水煎ノ用
 ルナリ
 ○熱ナレニ寒ケバカリアル大寒證ニ六味ノ不換金散甚キ時ハ姜附湯
 附子理中湯ヲ用ベシ

○全体カワキタル瘧アルモノナリ食積上云七味清脾湯ヲ用ヘシ
 ○瘧ハ腹ヲ能見ヨ真中ヘサレ込三水落ノ通りへ疑ケルウチ何トシテモ
 截ヌモノナリソレヲ無理ニ截スハアレキナリソレガ某ヲ用テ真中カ少
 シ左右へ開カバソレノ截ルト意得ベシイカフ長引ナラハ截某ヲ用

正氣散ヲ用ルコトモアルベシ時ノ見合ナリ虚證ナルモノ食滯痞モ少シア
 リラフラクト振ヒ急ニ截スコトモ仕ニクキ時ハ人參養胃湯ヲフロク
 用テ置ベシ又古方家ダチノ療治ニ隔日ニ發先寒後熱寒少熱多キニ桂
 枝石膏湯ト云テ用ルナリ桂枝五分石膏知母各五分黄芩五分右四味水煎ノ用
 ルナリ又寒熱大發者ハ前後ニ拘ラス桂枝芍藥湯ト云テ用ルナリ桂枝二分黄
 芩知母芍藥石膏各五分右五味水煎若シ前藥ヲ服シ寒熱轉大者ハ太陽
 陽明少陽ノ合病ナリ桂枝黄芩湯ト云テ和スヘシ生甘草四分石膏知母各五分桂
 枝一分柴胡二分黄芩四分人參四分半夏四分右生姜水煎ノ用ナリ

ハ最初ヨリ此等ノ劑ヲ用レバ長引ヌナリ

○家傳ノ截リ藥ハ柴胡大楨榔中草菓小水煎一宿露シテ用ル也能截
 ル藥ナリ若シ截ヌ草菓ヲヤメテ唐牛膝ニ代ベシ此外仕モツレ長引トキ
 ハイロクノ療治モアレバ豫メ事多クレバ記サスイロクト長引兎角何テ
 モ截ヌ時ハ灸ニテ能截ルモノナリ先ツ大推ヘ灸スレバ能截ルナリ然レモイ
 カフニ數ハ是ニテモ截ヌモノナリ至極ノツミリノ灸ハ足ノ裏湧泉ノ
 穴三壯ホドモ灸スベシニセツハ截ルナリ是日ブルヒニ隔ノ療治ナリ
 或瘡ノ後イロクノコトアルモノナリソレハ盡クハ記シ難シ諸方書ヲ
 考ベレ後世家ノ醫書ニテ偏ナク初心ノ見安キ医方ノ書多シト

イハ手近ク重寶ナル医方ハ奈須玄竹翁ノ医方聚要十二卷ナリ
近代ハアコリ人モ知ラス医方入門ト云シガ不捌ナルカ医方聚要ト改
ム太抵ノコトハ近ク考ルニ便ナル書ナリ薛巳十六種ホト未タ和刻ニナラサル以
煎ノトニ補瀉ニ偏ナク今日療治本ニ六利口ナル書ナリ

○夏月惡寒強ク後熱出テ頭痛咽渴ク多ク公瘡ナリ先ツ發散ノ茶
ヲ用ベシタトヒ瘡ニアラザレモ害ナフシテ宜キナリ初瘡ナドハ初發ニ
汗ヲトルカヨシ柴胡桂枝湯ノ類四五日用テ汗出テ大概邪氣衰ル時
分五發クテ并ニテ截スベシ又寒瘡ト見タラバ丹水翁ノ驅邪湯ヲ三ニ
日モ用テ實證ノ者ハ藿香正氣散ニ常山合半ヲ加テ截ルベシ前晚ニ

煎シヲキ一宿露シテ翌早朝温メテ用ルナリ又截茶ノ吐茶ニ常山大

黄甘草ノ三味ヲ前夜ニ煎シ早朝ニ少シ温メテ用ル必吐スルナリ是ニ

截ルナリ然レモ老人ニハ用ベカラス虚弱者ノ截茶ハ唐白朮一匁

姜一匁ノ二味ヲ煎シ前日發リタル時分一時アコリ前ニ右ノ煎湯ノ内

ニ生姜汁多ク入レテ一番煎シ殘ラズ用ルナリニ番モ煎シヲキ又半時

ハカリレニ生姜汁ヲ入レテ用ル必截ルナリ

○夜發ノ陰癰ハ晝ヘ出サレハ截又モノナリ方書ニ世ニ胡芍飯湯ヲ用テ

アレモハハリ柴桂湯ヲ立カケ用ルト晝ヘナルナリ晝ヘ出テ復截ナリ

又或傳ニ夜發ノ者ヲ治スルニ麻黄黄芩湯上云方ヲ用ルナリ麻黄二分

甘草六分 桃仁二分 黃芩桂枝各三分 右五味水煎ノ用ルナリ 古方家ニハ夜發ノモノニ桃仁承氣湯ヲ用ルコトモアルナリ

○又疳積ニテ腹積サレ込ムモノモ柴桂湯ニテ治スルナリ 積ノ加減ニ不及ナリヤリ 小兒ナトハ小菘胡合不換金加青皮草菓用テヨシ或九味清脾湯モヨシ惣ジテ小兒ノ熱アリテ瘡ノ如ク指引スル證アリ 是多久蟲積ナリコノ清脾湯ヲ用テ効アリ又夏月少シ惡寒アツテドヲヤラ瘡ラシクシテ輕キ證ニ人參養胃湯ヨク効アリ世医夏月寒熱アル證ヲ類瘡ト云是ナキコトナリ瘡ハ瘡風邪ハ風邪ト分ツベシ 柴桂湯 見傷寒

白虎加桂枝湯

本方加桂枝

柴白湯

二方合方

九味清脾湯

七味清脾湯

人參養胃湯

右三方衆方規矩太成瘡疾門ニ出

十味、換金散

治寒瘡寒疫及發惡寒

人參、養胃湯加附子

驅邪湯 丹水翁自制 治寒瘡

桂枝 二錢

乾姜 一錢

蒼朮 一錢

半唐

半夏 一錢

附子七分

柴胡一匁

甘草少

右姜煎。加減見。医方問餘。

○者^{サテ}後ノ調理ハ益氣湯加減ヨレ是モ人ノ熱^{ユウ}證冷證ニ因テ温
 凉^{リヤウ}ノ^ハ六時ノ見計ナリ或久瘧ニナリテハ氣血調補ノ某又ハ滋
 補^ホモ用ルナリ予久瘧或折々再發^{ソレヒカシ}ノ勞瘧ニナル草臥モアル證ニ
 前條ニ云ヘル金匱柴胡桂枝乾姜湯ニ去乾姜加人參生姜大棗ユルノ
 用テ効ヲ得ル丁多シ此時ハ水常ノ如クニ孟ヲ一孟ニ煎スナリ其
 餘ハ調理或ハ餘證ヲ兼ルモノ^{サテ}諸方書ヲ考レハ自然ニ治方明ナリ

傷食

食傷ト云モノハ平生澤山ナモノニテ大抵ノ食傷ハ病ノ^ハ食傷
 ナリト云モノノ腹痛スルカ腹脹スルカ吐瀉スルカ強キハ目ニヒモアルモノ
 噫^{イキ}ナト出テ氣色ガアレキモノナリ是大抵ノ食傷ナリ^{サテ}諸重キ
 食傷ト輕キ食傷トガ知ヌモノナリ輕キ食傷ハ腹痛吐瀉モナ
 ク^{ハナ}眩サキツカヘテ氣色アレク頭痛ナドモ少シスルモノ感冒マラ精
 ノツキ^ハヲ知ヌモノナリ^{サテ}諸重キ食傷ハ俄ニ氣色アレク其人ホ
 ボヘ^ニキマウニナリ或卒中風ノヤウニ倒テ^{タラ}性ニナル大抵ノ
 食傷ハ脈ニ不及食傷ト見ル輕キ食傷ハ却テ^{カハ}脈テナケレバ知レヌ
 右ノ關脈ガ^{クニ}緊成ナルモノナリ或伏スルコトモアリ^{サテ}諸何ヲ^{クハ}喰タルト

傷食

傷食

申七

食物ヲ吟味スベシ重キ食傷ノ卒ニ倒ルカ覺ノナイヤウニナルハ脉ガ伏
スルカ瀕スルモノナリ此亦何ヲ食タルト食物ノ吟味ニルガ肝要ナリ右ノ
意得テツレニテ療治ヲスベシ

ノ大ニ食傷ニ消導ノ劑ヲ用ヨ消導ノ食ヲ消シテ大小便
ノ導クト云コトナリ

平胃散

消導之劑

蒼朮 八分

陳皮

厚朴 各五分

甘草 三分

本姜煎ノ飯餅ノ類ニ傷ニ加神麥芽○麩類ニ加蘿蔔子神
麩○魚鳥ニ加山楂檳榔草菓○菓物ニ加青豆乾美○右ノ

通リノ用食傷上云モノガ一色バカリハ不食モノ一色ニ依ルモノノ物モ滯

リテアルホトニ神麩麥芽山楂青皮乾姜本香ノ六味ヲ加ヘ用ベシ諸大抵

皆腹痛スルモノナリ本香ハ腹痛ノ茶ナリ○吐ニハ加半夏藿香○

瀉ニ加縮砂○大便秘結或液ニハ加枳殼

○重キ食傷ハ吐スルカ瀉スルカサスベシ食ニ傷レテ間モナク食上腕

中腕ルハ吐サスルガヨイ間ガアリテ食中腕ヨリ下腕ニアルハ瀉下

シテ吐サスルハ枇杷葉湯ヲ用ベシ瀉下スルハ保和丸十粒備急丸

五粒上ツニセテ十五粒用ベシ

枇杷葉湯 此茶吐スル功モ瀉スル功モアリナリ

藿香 青葉 或軸 木香 莪朮 吳茱萸 各中

肉桂 枇杷葉 各 甘草 少

沸湯用之欲為吐可加ル毛草

保和 凡有傷食者皆主之但傷冷物者可斟酌

山檀 二兩 神麴 半夏 茯苓 各一

蘿蔔子 陳皮 連翹 各五

右糊丸

備急圓 傷食之下劑也一切屬實暴病主之

大黃 古渡重 實者 乾姜 完干 巴豆 去皮心油 各等分

右糊丸或蜜丸此円ハ心腹卒ニ痛ムト云ガ肝要ノ目ニ金匱

方方ニ子金方ノ紫円ナドハ豆ハ楮石赤石脂杏仁ノ四味ヲ丸

トシタル方モ此方ヨリ來ルナリ和邦ニ紫元子ト名テ都鄙氏ニ

虫下シテ丸茶ニ賣茶ニアリ大實ノ證ニ用ルナリ近來古方家

一三分テ嚴シキ流ハ萬病皆一毒ト云ヘル見識ニ諸病皆三黃

丸ニ散ニテ泻下ス若シ快利セザルモノハ紫圓ヲ以テ泻下

生等京學ハ久シクハナラス博ク醫方ニ涉ル丁ハナニズ古代ヨリアリフ

レタル醫書ハハ打テ破リ此流ニ傾クモノハタ見識ヲ立テル器

量ノ先達ノ人トハ違ヒ聞取法問ノ輩辺鄙ニ附子ヤラ大黃ヤラ知
ラヌ俗人ニ與テ入ラ誤ル多シ虚實ト云丁一向ニ云ハル流ユヘ諸病ノ
不拘妄リニ用之殊ニ込比新渡ノ大黃ハ性輕浮ニテ何程
用ミ三黃湯ヲトニ功ナレ故ニイラツテ紫円ヲ用テ瀉下ノ意ヲ
ルト多シ古渡重實ノ大黃新渡ニテモ重實ノモノハ能瀉下スルナ
リ遠國トハ和産ヲ用ルモノモアレト快利セサルナリコレニ込比
ハ圓ヲ以テ下スナリ同シ瀉下スルト云ハレ大黃ノ性寒ト巴豆
ノ大熱トツ口ニ云ハレヌナリ此誤也此新刻ノ丹医斷ニ精シク辨
アリテ云ニ不及トイヘ氏素ハハ理會セズ故ニ此議ニハルモノアリ

又和産大黃ヲ炒リ大ニ近世流行藥ノ俵屋擺ニ用レ云ハレ瀉下セ
斯渡ノ輕浮ナル大黃ハ和産ト大抵別シキ物ニテ効ナレ予自ラ用ヒテ
試ルニ少シモ瀉下ノ功ナレ吟味スベキナリ又此流ニ補ト云フナレ某
ハ皆毒菜ニシテ毒ヲ以テ毒ヲ責ムト是レ病ニヨリ又某ニモヨルナリ
ナハ毒菜ト云ハレ穀肉果菜ニ對シテ云ヘリ人參白朮ト甘遂大黃豈
一ツノイハレニヤ穀肉果菜ハ入ラ補養スルモノト云ハレ今大虚脱也
ニ穀肉果菜ガ擬ルモノカ人參白朮ノ類ニテ補フニアラサレハ
奈何レシガ又暴瀉金瘡脱血勞役虚損ノ證ヲ外内虚ヨリ起
諸病拳テ數難シ是皆尺ク毒ニ属ストロシヤ辨ヲ不待ナリ

是程ノ訣理會ナキ先達ノ人ニハ非スト云ヘ凡題言ニモ云ヘル如ク一見識
ヲ其ノ人ハ流弊トハ知ナガラ丹溪ノ陽有餘景岳ノ陰有餘コレ皆時ノ
弊トシテ言ナリ中頃薛己ノ流都都氏ニ行レ大実大熱ノ證ニモ
手寒涼ヲ用ズ倦斃スルコトアリ此時ニ至テ古方家ノ先達ノ
寒涼攻撃ヲ以テ効ヲ得ルコト多シ然レモ近比ニテハ遂ニ流弊トナリ
テ初心ノ医生入ヲ誤ルコト多シ慎ムベシク兎角諸流トモニ自見ヲ以
テ其ニヨリテ用捨アルベキコトナリ其用捨ハ博ク医籍ニ依ルベシ今
近代ノ医流ヲ亞声ニ云ラ、**巴** 閣ニ非某選斤醫斷ノ言ナカ
リ其バ軒岐ノ澤モ仲景ノ術モ塗炭トナランマ唐ニ西氏ノ家ノ論又

富貴貧賤病ヲ異ニストモアリ、薛己ノ天子ノ御側医者ト張子和ノ北方
夷狄ニ近キ山家医者トハ療法モ異ニツナリ一見識ヲ立テ、風ト云
ハリニナリテハ負惜ニモアルベキモノナリ
重キ食傷ニ卒中風ノヤウニナルヲ食厥ト云卒中風トノ見分ハ脉
が伏ルモノ卒中風ハ脉ガ動急トテ強クヒツハルモノ食物ノ穿議ヲレテ
食厥ハハミラバ塩湯ヲヌルクレテ多ク用ヒ鳥ノ羽ヲ喉ヘイレテコノク
ルト必吐スルモノナリ又枇杷葉湯デモヨシ其上ニテ虚實ヲ見
計ヒテ薬ヲ用ヨ實ナラハ藿香正氣散ニ加南星木香虚ナラハ理中
湯附子理中湯加有皮縮砂若シ咽ガツヨク渴クナラハ其上ニ加葛根コレ

乾霍乱ノ療治モ同前ナリ

○輕キ食傷ナラハ香砂二陳湯カヨシ
梨柿蜜柑瓜ノ類ナドニアテ
ラレ 或臈ノ類ニテアテラレカ輕キ食傷ニハ此茶カヨイ或前ニア
ル平胃散ノ加減モヨシ

香砂二陳湯

陳皮

香附

各一
錢半

茯苓

錢一

半夏

縮砂

神麴

甘草

各六
分

右姜煎○或加山楂杏仁

○大鳥肉或麩麩或葱ノ類一切ノ發物ニ傷レタルニ輕キハ保和丸ヲ
用ベシ重キニハ枳實導滯丸ヲ用ベシ

枳實導滯丸 傷濕發物不消化痞滿不安者主之

茯苓

白朮

黃芩

黃連

澤瀉

大黃

枳實

神麴

右糊丸

○一切ノ寒冷ノ物ニ傷レタルニ前ニアル平胃散ヲ加減ヲ用ベシ重キ
ニハ紅丸子ヲ用ベシ

紅丸子 傷寒冷物腹痛成積者主之

木

三稜

陳皮

青皮

乾姜

胡椒

右以醋糊為丸以礬紅為衣

○食傷ニテ腹痛甚シク煎湯ヲ用テモ當分不正腹痛難堪發物ニ

食傷

申

十二

傷レタリニ木香道滯丸寒冷ノ物ニ傷ラレタルニ紅丸子

木香道滯丸 即枳實道滯丸加木香換榔

○イ 嘔ノ次手ニ持病ノ疝氣或積ナド指出テ甚腹痛スルコトアリ是モヤハリ寒熱ヲ見分テ紅丸子木香道滯丸ノニ方テヨシ

○大食傷ニ卒ニ腹痛忽悶絶シテ死セントスルニ備急丸五粒バカリ可用ナリ齒ヲ喰結口カ不開ハ湯ニテ和カニシテ齒ヲコシアケテ用ヨ忽

吐瀉シテヨレ若レ効ナクハ又五粒ホド用ベシソウレテ後見合ニ煎茶ヲ用ヨカヤウナ急證ハ卒病門トモテヨシ

○食傷吐逆スルハヨキコトナレト吐逆イツマデモ不止ハ枇杷葉湯ニ用ベ

シ枇杷葉湯ハ吐逆サスル茶ナレト吐逆ヲ止ルニヒヨイ吐逆ヲ止ントスルトキハ

ヒルモ草ヲ加タハアレハ味ナシニ用ベシヒルモ草ハ吐茶ナリ

○食傷テ瀉スルハヨキコトナレトイツニテモ瀉ノ不止ハ理中湯加肉

豆蔻縮砂ナリ實證ノ人ニハ人參ヲ去テモヨシ

○食傷テ頭痛スルコトアリマハリ食傷ノ療治ヲシテヨシ頭痛ニ

カニフコトハナシ

大抵實證ナ者ノ療治ナリ下地イカウ虚證ナ者マ病中病後ノ療治ハ意得アリ左ニ記ス

○大抵ノ食傷ニ胃散ノ加減ヲ用ベキ證ナレバ其人イカフ虚證ナカ

疾中カ病後ナラハ六君子湯加香附縮砂ナリ大便と不瀉バ加香附
 縮砂青皮テモヨシ素虛證ナ人ハアツリ飽食モ止ヌモノナレバ大食傷
 ハヤニナリ大形ハ六君子湯ノ加減テヨイモノ早速ハ茶カキカヌモノ
 病人ニモ其理會サセテソノ療治セヨ若シ病甚シク脈モ沉微ニテリ
 手足モ冷ルヤウニアラハ附子理中湯加青皮コレ虛人ノ療治ナリ病
 中病後ニハムサトシタルモノハ不食ニツヨキ食傷ハナイモノイツテモ六
 君子ノ加味カヨシ杜杷茶湯ハ虛證ナモノテモ用テクルシカラス甚シ
 キ食傷ニテ吐サセタクハ用テヨシ
 ○虛人病中病後ノ食傷ニ六君子湯ト保和丸ト兼用スルアリ

コレモヨイツ若シ脈ガ沉微ニテ手足モ冷ヘ虛寒ト見タラハ保和丸
 シ用ヘカラス理中湯或附子理中湯加青皮
 右ハ虛證ノ人ノ療治ナリ

○大酒シテ酒ニアテラレタルニ先ヅ不換金加葛根大縮砂茯苓澤瀉
 ナリ當分ノコトナレハ此茶テヨシ若シ四五日モ長引トカク酒ニアタリ
 タルヨリ發ル病ナラハ葛花解醒湯ヲ用ヨ酒毒ヲ解スル茶ナレバ酒カ
 ラル病ナラハ新病大病トモニ此茶ガヨシ
 葛花解醒湯

- 白豆蔻
- 縮砂
- 葛花各五分
- 茯苓
- 陳皮

猪苓 人参 白朮 神麴 沢瀉

乾生姜 青皮 木香

水煎服得微汗則酒病去

一切ノ菌ニ傷ラレ大食傷ニテツテ大抵ノ療治テ効ナキニ塩麴

ノカハリヲ平胃散ニ大ニ加ヘテ用ヨ吐スルカ大ニ瀉スルカレテ愈ユ無クハ

方ナリ少シノアタリニテモ菌ノ食傷ニハ此ヲ用ルカヨシ大抵ハ平

胃散増甘草加黃連ヨシ

河豚及ビ一切ノ魚毒ニハ葦五ノ莖ヲ絞テ汁ヲ吞テヨシ又葦五

ノ莖ヲ陰乾ニシテ刻ミ平胃散ノ中ヘ多ク加ヘテヨシ又葦五ノ莖

ヲ一味煎シテ用テヨシ又河豚ノ毒ニアタリ無性ニナリ危キニ至ルモノハ

臘月糞壺ノ中ヘ竹筒ヲ薄ク刮リ兩方節ヲノコシ漬オケハ寒三十

日ノ間ニ糞汁筒中ニ溜ル綿ニシメシ畜置キ口中ヘ絞リコメハ忽チ

盡ク吐出シテ正氣ツク甚妙經驗ノ方ナリ然レモ此ヲ頼ニシテ安

リニ河豚ヲ喰ベカラス河豚ニ齒一枚齒ナルモノアリ究メテ毒アリ近

來東海ノ邊ニテモ若シ一枚齒ノ物ヲ見レバ深ク埋ミテ雞犬ニモ投セ

スレ云ヘリ

蟹ノ食傷ニ紫蘇一味ヲ煎シ用テヨシ

蕎麥切ニテ大食傷ニタルニ枇杷葉湯ニ父羊母ノ皮ヲ菜一貼ノカサ

六ト加ヘテ用ベシ

内傷

内^ノ病^ニ虚^ニ實^ノニツアリ實ト云ハ食ニ傷ラレタルコトナリ大要食
傷^門ニ詳ナリ虚ト云ハ氣ヲ勞シ形ヲ疲シ精カヲ草臥カラ起ル病ナリ
先ツ感冒ニ似タルモノ頭痛惡寒アリ感冒ト違ハ惣体草臥カツヨ
イ頭痛モ指引アツテはタリ止タリ何ゾ精カヲツカフト頭痛發熱惡
寒ナラアツテ氣色アシク休息スレハ少シ能ヤウニアル脉ガ大フリニ
ウテオレテ見レハ根ニカカナイ脉ガ肝要ノ見分ナリ内傷勞傷ト外
邪感冒ト見分ハサシクノ目ツクアツテ事ノ多キモノナリ 詳ニ東垣

ノ脾胃論辨惑論ニアリ其外何レノ医書ニモアルホトニ診覽ノ

傷ト外邪ト交ルコトアリソレカ勞役ノ感冒ト云感冒門ニ詳ナリ

補中益氣湯 治内傷内傷ノ病證ハ東垣ノ書ニ詳ニシテ諸書ニ

委^レク云テアル^ニ診覽ス^{ベシ}此ニ大概ヲ云先ツ食飲飢飽トハ食モノ飲

ノカ過タリ不足ナリタリレテ惣シテ食物ニシテ食アリテ食事ニ

慎^シミカナケレハ當坐ニ食傷スルテモナケレモ胃ノ府カ自然ニ草臥

其證ハ息疾クナリ或氣勢カケロリトナツタマウテ氣カ乏シ

クナリ或大熱ヲ生シ面ノ内カ強ク熱スル偕又形ヲツカヒ體ヲ

若^シレハ脾ノ臟ヲ傷ル其證ハトカク臥シ寢タカリ手足カタル

ク起テ居トモナヒマウニアツテ大便モ瀉スルモノフレカ胃カ傷ルハ
 脾モ傷ル、脾カ病人ハ胃モ病ムユヘニ右ノ證カイツレモアルモノ
 此證アラハ脉ニ弱ニカアラハル、何脉ニモセヨ按テ見テカノナヒカ
 虚脉ト知ベシ其ウチ浮ウカミカクニシテカガナク惣体熱カアルモノサ
 レ氏脉ノ浮洪ナト熱ノアルト云ニカキリハセヌ外ノ脉ニモアルモノ
 熱ナナイトモアルモノ兎角草臥テ寢タカルモノナリ委ハレクハ
 筆ニ記サレス諸書ヲ見テ自然ニ理會セ子ハナラヌ○諸此某
 ハ元氣ヲ補フ藥ナレバ虚損門ニモ入テアル諸虚損門ニカキラヌ
 一切ノ病ニ不用病ハ一病ニナケレハ病門コトニ入テアルナレバ其病

ニ用方ヲ記シテアル加減モサレノアル手近キモノハ衆方イハツク見イハツクル
 医方口訣頭書ヲ見ベシ加減モ右ノ書ニ精クアルナリ○諸此方
 ノ立方ノ本旨ハ東垣先生其師ソウエン繫ケツ古老人ニ秘密ノ方ヲ傳受ス却
 調中益氣湯是ナリ調中益氣湯ニ加減レテ此方ヲ建ツクリ立アリ調
 中益氣湯ノ大意ハ人飢飽勞役ニ因テ元氣ヲ損傷シ脾胃不調
 種々ノ病證ヲ見ス故ニ其病ヲ治スル藥ヲ調中益氣湯ト云此其
 補中焦以テ至トス故ニ補中益氣湯ト云調中ト補中トノ文字
 ノ意ヲ以テ考ベシ夫調中益氣湯ハ奇妙ノ秘方ニ東垣此ヲ
 重寶トス然ルニ金ノ天興五年壬辰ノ春元ヨリ金ノ都ヲ圍

ム金敵ノ圍ヲ受テ絶食半月ノ間野菜粗食ヲ喰ヒ其上敵ヲ
畏レ脾胃ノ氣虚スル丁甚シ圍解テ後驟ニ飽食レ脾胃ヲ
傷リ傷寒流行死者毎日千人餘ニ及ベリ其死者百万ニ及ブ
トアリ此病モト傷寒ニアラス内傷勞倦ニ因テ傷寒ニ類スル
時疫ナリ其時ノ医者不知之皆傷寒トシ傷寒ノ茶ヲ用
ル程ニ數百万ノ人死スルナリ東垣先生調中益氣湯ニ加減シテ
補中益氣湯ヲ製シ悉救之或問此方ハ東垣先生ニカタヨリ
製シオカレタルヤ又此度ノ時疫ニ依テ始テ加減シラレタルヤ否
答云辨惑論ヲ按スルニ遠ク真祐興定之間東平大原鳳翔之

地又如此ト云ヘリ東平大原鳳翔ハ金ノ地ニ圍ヲ受タル所ナリ夫
興五年ヨリ八十四五年ニ前ナリ其時モ又アトニ如此ノ時疫流行
ス此モ商ノ圍ヲ受テ食ニ乏ク脾胃虚ヨリ生シタル傷寒ト意得
テ師傳ノ調中益氣湯ヲ加減シテ此方ヲ製シラレタリ然レ
ハ兼テ試ラレタルモノナリ東垣ハ敦厚ノ明医茶方ヲ製スルニ
且ノ思ヒ付ニテハアルニシキナリ措方意ヲ案ズルニ調中益氣湯ハ
麻劑ノ中ニ蒼朮黃蘗ノ降下ノ茶ヲ兼テ調中益氣湯ヲ以テ
主トス此湯ハ右ノ二味ヲ去リ加白朮當歸純和ノ茶トナレ專ラ補
中益氣ヲ以テ主トス故ニ以黃耆為君益氣波毛閉腠理不令自汗

予云皮毛ト云ハ輕キヤウナレ皮毛ハ衛ナリ衛ハ七神ノ別名周身
ヲ衛護ス皮毛ノ間ニアリソレテ臟腑ヨリ大事ノ所ニ内ニアツテ
肺ノ合ナリ病從是生スト云ハ内經ノ旨ニ即仲景黃耆建
中湯ヲ製スル根本ナリ索古老人又此旨ヲ得テ東垣先生制
此方以黃耆為君ハ聖賢傳受ノ妙旨ナリ人參甘草次之為
佐補元陽治邪火肺ノ本ハ脾胃ナリ飢飽勞役ニヨツテ脾胃ノ氣虛
スレバ肺ノ本絶又白朮ノ苦甘温ヲ以テ人參黃耆甘草ト同ク補
脾胃升麻柴胡苦微寒甘薄而引清氣升上參耆甘草ノ輩ヲ
引テ衛氣ノ補散解兼テ傷寒ノ熱ヲ解ス陳皮枳實中ノ氣

ヲ利シ當飯和血此方ノ方タル處ヲ按ズルニ脾胃ノ方倦ヲ補
茶ト云ハ凡其見證ハ傷寒ノ藥ナリ皆人一概ニ意得テ補茶
ト計意得テ居ル補茶ハ成程補茶ニ紛レ無レ凡其主治ハ
傷寒ノ茶ト意得ベシ此東垣立方ノ本意ナリツレカラ
後人此茶ヲ百病ニ用テ驗ヲ得ル脾胃一虛而百病生ス此茶
ノツミリハ補脾ノ茶ナレバ百病ニ用テ功アルト勿論ナリサレモ此
茶ノ主治ハ傷寒ノ熱ヲサス茶ト意得ルガ第一ノ目當ナ
リツレカラ無熱證ニモ加減ニ因テ用ルト云ハ凡ソレハ後人ノ
使ヒ覺ナリ去程ニ東垣モ初病熱中ノ茶トシ末傳寒中ニ

ナリテハ理中湯ヲ主方トス此方ハ先指當テ熱ノアルモノニ用ルガ
目當ナリ熱アルニモ傷寒時疫其外虛熱實熱色々紛レアル
程ニソコヲ隨分ニギレヌマウニスベシ○陳麗京ガ説ニ脾胃勞倦内
傷ノ證ニ人參ヲ以テ君茶トシ表虛自汗潰癰ニ黃耆ヲ以テ
君茶トスト云ハカナマウナコトニテ此東垣立方ノ本旨ニ暗ク後
世此方ニ用ル活法ニヨツテ云タルモノナリ活法ニ因ルトキハ何ラ
君茶トシマラ始ヨリ極リハオシ若シ立方ノ本旨ニ依ルトキ
ハ以黃耆君茶トスルニ疑ナシ此方ノ分量薛已重子テ改メテ
人參白朮當歸ニ分量ヲ進メ升麻柴胡ハ本ノ分量ノ如シ

此薛已ノ他病ニ用ル活法ニ東垣ノ旨テハノ月溪薛己ヲ始メ
益氣湯ノ本旨ハ知又ナリ東垣ノ門人羅天益ヲ始メ此旨カ
云テナイカ此ハ知又テハアルミイコトヲ云ニ及ハス辨惑論ノ
字面ガ亦ニ類傷寒ノ茶トアレバ重子ヲ云ニ及バザルナリ
カヘス此茶ハ類傷寒ノ茶ト意得ルカ至極第一ノ意得
アリ○虛人飲食所傷及外感暴病新愈之後皆當此君子
用理胃為主内傷勞倦及久病之後用此湯理脾則百病
不生不理脾則諸病續起久之仍入於胃也予云此ハ饑飽
傷胃ト勞役傷脾トノ異ヲ辨ス當用此君子理胃ト云ハ饑

飽傷胃ヲ為主六君子ハ微ク消導ノ意アリ内傷勞倦ハ元
 氣ノ衰微ナリ理脾ヲ為主再按ニ傷胃ハ息トラレク精
 神ケロリトノ大熱ニ或時アリテ面熱ス傷脾ハ惣体草
 ヲテ事足タルク大便泄瀉スルモノナリ。諸仲景ノ時ニアツ
 テハ勞役、傷寒ニ停食ヲ兼ニハ桂枝人參湯ヲ以テ中
 ヲ理ス外邪重キハ黃耆建中湯ヲ用レバ補中益氣湯ガ無
 クテモ桂枝人參湯ト黃耆建中湯ニ加減スレバ事ハカケヌ
 ナリ其上内傷ノ初起熱中ノトキハ補中益氣湯ヲ可用
 未傳寒中ニナレバ温補テナケレバナラヌ又理中湯ノ加減ヲ可用

○頭痛大作氣高而喘身熱而煩上氣鼻息不調四肢困倦不食無氣以
 動無氣以言或煩燥悶亂心煩不安或渴或不渴心火上炎尅肺經
 則渴血脉中有濕則不渴或表虛不任風寒目不欲開口不知味
 氣口脈大於人迎兩三倍但急大而時見一代此内顯脾氣不續
 之脈也此證若有宿食則右關獨沉而滑枳朮丸主之云此條
 至ク勞倦ノ見證ヲ云後枳朮丸ヲ出スハ内傷飲食ナリ

- 黃耆 一錢
- 人參
- 白朮
- 當歸 各七
- 陳皮 五分
- 柴胡
- 升麻 各三分
- 甘草

右姜朮並炭○此方辨惑論脾胃論ニ書ニ出ス俱ニ東垣ノ書ニ其

百病手引草

書ノ前後ヲ考レバ辨惑論先ニ脾胃論ハ後ナリ而書ヲ參考スベシ分量モ又原方ノ本書ヲ見ベシ

讀中益氣湯 此方ハ補中益氣湯ヲ用ヘキ證ニ濕ヲ兼テ礮泄シテ腹ノ脹リフクレルニ用ル茶ナリ羅天益ノ方ニ無木香有黃柏コレテハ濕熱ヲ兼ルニ用ルト意得ベシ○以蒼朮代白朮去當飯加木香

八解散 此茶元來局方ニ用ルハ傷寒ノ茶ナリ今内傷ニ用ル意ハ食ノ泥ニモアリ勞倦ト草臥アルニ用ル食ノ泥ト云ハ食滯ト云程ハナケレバ食ガモタレテ脾胃ノ不運コトナリ其上ニ草臥モアルニ

用ル茶ナリ元來傷寒ノ茶ナレバ感冒シ兼タルニモ勿論白イハツナリソレテ衆方規矩ニ益氣湯ソ輕キ證ニ用ルトアルヲメツタナ云マウト笑ヘ凡衆方規矩ノ意ハ右ノ意テ云タモノ意ニアママリハナケレバマウカ鹿相ナルユニ胡乱ニキコヘルゾ加減方衆方規矩大成參考スベシ香砂六君子湯 此方ハ脾胃虛シテ食ノ味ガナイ食ハ喰ヘトモ其食ガ胸ニモタレテコナレヌニ用ル茶ナリ

- 香附 白朮 茯苓 半夏 陳皮
- 厚朴各一 縮砂 人參 木香 益智
- 甘草各五 右姜枣煎正傳方木方加香附縮砂藿香

香砂養胃湯

此茶ハ脾胃不健^{スレ}テ食ノ食^レヌニ用ルナリ脾胃
ヲ運^カラセ補^ヒテ食ヲ進^スルナリ即チ前方ノ香砂六君子湯去半
夏益智加白豆蔻蒼朮

虚勞

先輩ノ療治ヲ案スルニ虚勞ト稱スルモノハ多クハ陰虛火動^ヲ勞^ヲ察^シノ病
ナリ昨^ニ虚氣虚陽氣不足ノ病ハ別ニ補益門ヲ立^ルナリ仲景ノ金匱
要畧ヲ案スルニ虚勞ト云モノハ陰陽俱不足氣血兩虛ノ證ナリ故^ニ黃耆
建中湯小建中湯ヲ用テ氣血陰陽ノ不足ヲ補フ是治虚勞ノ大綱^ト領^ト
ナリ後世ノ諸建中湯ハ物湯大補湯ノ類ノ根本ナリ其間陽氣偏虚脾

胃虚寒ノ者アリ理中湯至^シ後世コレニ依テ脾胃虚無寒有微熱^ヲ皆^テ四君
子湯ヲ以テ補脾ノ聖劑トスルナリ四君子湯ノ類古ハ理中湯ヲ根本トス
ルナリ又^ハ房^ノ欲^ヲ淫^ニ事^ニ依テ陰虛火動腎火盛^ノ證^{アリ}金匱ノ八味腎氣丸
至^シ之^ヲ以^テ非^ズ乾^也黃^也瀉^也腎火コト尤急ナリ後世ノ六味丸諸ノ滋陰降火ノ劑皆以
八味腎氣丸祖トスルナリ後世ハ味丸無根ノ火尤^ニ用^之陰虛火動ノ某ニ
テハナレ右件ノ治法ヲ熟讀スレバ治虚勞ノ大綱領ニ明ナリ諸ノ方書
ニ所載ノ治法此ニ外ナラス此病上ヨリ下ルアリ下ヨリ上ルアリテ難經所謂
一損損皮毛云云大抵心肺脾胃肝ノ虚ヨリ來ルアリ病後產後ヨリ此
證ニナルアリ誤^ス茶^ヲニヨツテナルモアリ或^ハ鬱^證ヨリ變ズルアリ病因多^シ
虚勞

虚勞

申

二十三

百病考手引草

トイハ右件ノ意得テ諸方書ヲ方ラ以テコレヲ療スベシ脈ステニ微細數
ニナツテハ不治ナリ療ズベカラズ况ヤ泄瀉ニ及テハ死ニ近キナリ

○此證婦人血虚男子腎虚又ハ氣虚或ハ初メ感冒發散ノトキ桂麻ノ茶
ヲ發散スヘキ寒邪ヲ參蘇飲ノ類ノ涼解ノ劑ヲ用ヒテ咳嗽連綿ト
不止ツイニ發熱出テ勞咳トナル者多シ大抵勞證發熱咳嗽盜汗脈虚
數或咳嗽ノトアリ熱甚シカラス食味ナク瘦モノニハ參養湯ヲ用テ
ヨレ是モ餘程熱アルニナリテハ却テ熱ヲ増スナリ先ツ逍遙散加
款地黄麥門陳皮知母男子ノ陰虚ノ虚勞初發ニ用ルナリ是モ日久シ
ク夜ニツクモノニハ効ナシ或ハ救陰理癆湯ニ酒炒ノ黃蘗ヲ少シ加ヘ用ル

コトモアルナリ諸方書ニ利口ニ組シ方數多アリ初發ノ中ハ効アリ何レ
ナリ任考ヘ用ベシ古方家ニテハ寒熱強キハ小柴胡湯加石膏用ルナリ
咳強ク痰乾キ或痰血アルモノ金匱麥門冬湯加石膏或血證多キハ砂生
ノ生地黃黃連ナドヲモ加ルナリ咳モ水ノ如ク多ク痰出ルニ小青龍湯
加石膏用ルナリレカレ此等ノ劑ニテ効アルハ脾氣未虚大便結シ渴ノ
氣味モアルニ暫用テ効アラバ出入加減スベシ未ダ寐ニツカサル前ノ
治方ナルベシ

○婦人女子崩結ヨリ發熱咳嗽不止モノハ滋陰至寶湯ヲ用ルナリ惣シテ
婦人産後瘡後一切ノ勞ニ逍遙散ヲ主トス發熱強キハ加牡丹皮山梔

虚勞 申 二十四

名加味道遙散或加麥門貝母或見合ニ飯脾湯ヲ用ルコトモアリ是ハ陰虛
血虛勞熱強キニアレ、又滋陰降火湯モ初發咳アリ足心熱出陰虛火
動ノ幾ト見ユル時ニ早ク用テヨレ日久シクナリテハ知母黃蘗ハ大キ
ニアレ、又勞嗽ニ瓊玉膏ヲ何レノ方ナリト見合ニ兼用スベシ至
極ノ茶ナレト百倒ナル茶ニテ用ルモノ少シ
○婦人虛勞咳嗽或咳血無汗モノニ茯苓補心湯ヲ用テヨレ此ハ氣道ノ
メグリアレクシテソレヨリ心血ノ損タルモノニ用ルナリ故ニ補心湯ト
名ツク宮城ニ多ク此證アリ養管湯飯脾湯ノ心脾ノ血虛ヲ補フ
モノトハ大イニ異ナリ

○虛勞泄瀉ノ者ハ多ク死ス參苓白朮散或異功散加炮姜芍藥山茱萸用
ルナリ或參朮膏ヲ用レバ十二人モ泄瀉ノ止コトアリ瓊玉膏參
朮膏ノ二方李仲梓カ願生微論ニ出タリ

○此證中華ノ灸ヲ早クシテ治スルアリ又却テ大キニ障リソレヨリ
熱強クナリテ床ニ着クアリ屢試ルニ積氣ヲ兼テ熱ナキ方證ニ
スハリ唐ノ崔氏ガ四華穩ニシテ毎日壯數ヲ倍セス灸シテ効アルモノ
多シ類經ノ四華ハ骨蒸ノ熱傳尸カハリニ用テヨレ血ハ乾キ咳ア
ルモノニ障ルコト多シ或傳ニ四華患門ハ膠ノ穴ナド大補湯ハ味丸ナド
ノ相應ナル虛カハ灸シテ効アリ溫補不相應ニシテ平補ノ劑六味丸

ナド相應ナル虚勞ハ灸治却テ障ルト云ヘリ是ヲ試ルニ大方相違ナレ
又積塊アツテ氣ヲ塞キ勞ニ似タルモノ後藤流ノ二行通りノ灸法ヲ
數千壯レテ藥治ノ効ナキ者ヲ全快セシコト其數多シ此乾キモ熱ノ
往來モ各別ナレ又十四五歳ニテノ内ニ疝勞ト云モノ多クハ小兒ノ時ニ
五疝又ハ癖疾ノ殘リヨリ勞ニ紛ル證ニ三行通りノ灸隨分餘計シ
テ効アリ或ハ咳ナドモ少々アルモノナリ但シ男子ノ陰虚女子ノ血虚或多
産ノ婦人血液燥キ火ノ亢ルモノ三行通ノ灸レテ障ルヲ多シ此血液
燥テ灸火ニ不堪レテ却テ障ルナリ然レバ人ノ稟病ノ傳變モサミ
クアレハ一概ニ究メラレハ世又ナリ尚後ノ發明ヲ待モノナリ

○十全大補湯 氣血兩虚ヲ補ヒ産後金瘡脱血ノ後自汗アル者スヘテ用
ルナリ無熱虚勞ニ用テヨシ○六味丸ハ陰虚レテ水カフキ目カスニ或熱出
ナドスルニ水ヲ滋ス寒劑ノ方ナリ宋ノ錢仲陽小兒ノ齒遲ク歩行スルニ遲
ク是皆先天ノ元氣弱キ故ナリ此方ヲ以テ補フナリ○此方ニ加五味子
名七味丸一名八都燕丸トモ云陰虚勞嗽ニ究メテ効アリ○崔氏八味丸
ハ是仲景ノ原方ニシテ虚勞腰痛少腹拘急小便不利者ニ用テ陰虚火
動ノ劑ナリ乾地黄ヲ用テ後世ノ八味丸ト其功各別違ナリ此辨別
記アリ○後世ノ八味丸ハ足ノ三陰陽氣虚敗レテ惡寒發熱手足俱冷
吐痰不食ニ便溺數等ノ證ヲ治ス是レ乾地黄ニテ至治大異ナリ又此

凡二加車前牛膝陰分不足ノ水腫小腹無力下焦三腫多ク無熱小便不利者ニ
用ルナリ此嚴用和力濟生腎氣丸ナリ凡此後世八味丸八種ノ證ニ多
ク用テ効アリ諸ノ方書ヲ見ベシ

○儲虛勞嗽ト勞咳ハ治方大ニ異ナリ虛勞嗽ハ藥相應シテ厚ク
養性スレバ快氣スル者多シ風邪後ノ咳長引テ勞咳ニナリレハ藥餌灸治
湯藥ノ及ブ所ニアラス捨鞭ウツテ麻黃附子細辛湯ヲ用ヘシ十人二人ハ
助ルコトモアルベシ

人參養營湯 治男婦諸虛不足止汗補心除血虛潮熱

- 芍藥 三兩
- 當歸 伊吹
- 肉桂
- 甘草
- 橘皮

- 人參
- 白朮
- 黃耆
- 熟地黄
- 五味子

茯苓 遠志 各一兩
右姜朮煎ノ咳嗽加阿膠合此方諸ノ虛勞ニ證脈ヲ不論可用
ノ説アリテ究メテ良方ナリ

救陰理勞湯 治陰虛火動皮寒骨熱食少痰多咳嗽短氣倦怠焦煩

- 生地黄 姜汁酒炒
- 當歸
- 麥門
- 牡丹
- 陳皮 各五分
- 芍藥 七分
- 人參 六分
- 薏苡
- 蓮肉 各二分
- 五味 三分
- 甘草 四分

右朮一枚徐々服ノ傳ニ加酒炒黃柏知母滋陰降火湯ノ證ニ用ルナ
リ加減方彙ナドニアリ救陽理勞湯ト對メ李仲梓カ新定ノ方人

救陽理勞湯ハ補中益氣湯去升柴加肉桂五味子治勞傷氣耗倦怠
懶言動作喘之表熱自汗心煩偏身作痛コレ勞役氣耗感冒十
ト二用テ効アリ後世ハ味丸ナト兼用ル丁モアルナリ

滋陰至寶湯 治婦人經水不調因前生勞潮熱欬嗽有盜汗者

- 當皈 白朮 芍藥 茯苓 陳皮 貝母
- 知母 香附 地骨 麥門各ハ 柴胡 甘草 各ニ

右生姜薄荷水煎或諸菜等分

逍遙散 方見諸書

加牡丹山梔名加味逍遙散前證熱強者主

之○本方去白朮甘草加陳皮青皮香附和邦老臣傳名平肝湯

濕痰加半夏燥痰加貝母有火加山梔婦人專用ノ劑トス逍遙散 證

ニ動悸積氣惱ヲ兼ルモノ多シト平肝流氣飲ニ黃連梔子半夏川芎

厚朴吳茱萸甘草ヲ去シ方ナリ白朮ハ動悸積氣ニ障ルモノ多キニハ

逍遙散ニ去シモノナリ常ニ婦人ノアシラヒニ用テヨシ又婦人ノ積痛

肝火ヲ兼ルモノ多シ本方平肝流氣飲ヲ用ルナリ或傳ニ婦人血痛或

赤白帶下淋病ナド血中ノ氣ヲ順スルニ烏苓通氣散ヲ專用シ肝火

積氣ニ平肝流氣飲ヲ專用此ニ方ヲ以テ婦人ノ常用ノ劑トス此老

臣ノ傳ナリ一概ニ拘ルカラズト云ヘモカマヲテ療法モ時ニヨリ用タキ

丁アルモノナリ 方并ニ加減衆方規矩大成勞嗽門ニ見ユ

飯脾湯 思慮過制勞傷心脾健忘怔忡嚴氏原方

白朮 茯神 黃耆 龍眼肉 酸棗 各一兩

人參 木香 各半 甘草 二錢

右姜東煎。加當飯遠志常用此薛氏重訂之方也血虛發熱者

加牡丹山拖名加味飯脾湯

滋陰降火湯 治陰虛動發熱咳嗽哮喘急盜汗口乾脾胃未虛者

方并二加減衆方規矩大成勞嗽門二見

麥門冬湯 見咳嗽 小青龍湯 見傷寒 參苓白朮散 見痢疾

參朮膏 治虛勞之人脾胃虧損或脹或瀉

人參 白朮 各八兩 薏苡 四兩 蓮肉 三兩 黃耆 二兩

茯苓 二兩 神麴 一兩 澤瀉 甘草 各三錢

右水二斗熬一斗去滓再煎。此煎汁。膏。上。其。効。速。十

リ。參。苓。白。朮。散。異。効。散。加。味。三。効。ナ。キ。モ。早。ク。用。テ。ヨ。シ。或。傳。ニ。此。膏。効

アリト云。圧。容。易。製。シ。難。シ。右。九。味。細。末。ノ。水。ニ。テ。煮。熟。レ。膏。ノ。如。ク。ニ。シ。テ

用。ベ。シ。早。ク。用。レ。バ。効。アリ。大。便。少。々。ニ。テ。モ。和。カ。ナ。幾。レ。ア。ス。油。斷。セ。ス。用。ヘ。シ

諸血

凡。血。外。ハ。溢。ル。ハ。皆。熱。ニ。屬。ス。脈。洪。大。ナル。ヲ。忌。ム。沉。小。ナル。ヲ。吉。ト。ス。吐。血。血。吐。ニ
犀角地黄湯ヲ至茶トス。此。場。ヲ。古。方。家。ニ。テ。ハ。三。黃。瀉。心。湯。ニ。生。地。黃

三々或五々十々加へ用テ大ニ効アリ然レ是皆實ナルモノナリ又吐血
 衄血甚フ欲絶スルモ獨參湯ヲ用ルナリ是血脱ニ補氣ハ古聖人之法也
 シテ先賢ノ格言ナリ古方家ニ熊參湯ヲ用ルナリ熊膽二分人參
 五分水煎ジテ用ルナリ此人參吉野人參ヲ用テ專ラ逆氣ヲ下シ熊
 膽ト並用テ逆上ノ血勢ヲ開キ推シ下ルノ功ニシテ血脱シテ氣モ絶セントス
 ルトキ韓參チヤウセンノ獨參湯ヲ用ルトハ其意迥カニ異ナリ動モスレバ茶方ニヨ
 リ韓參ト吉野人參トノ違ニテ四名異方ノ茶アリ此議遠國ノ醫俗ト
 モニ意得アルベキコトナリ京攝ナトニテハ大抵素人ニテモ理會シテ居
 ルナレバムサトシタ間違ハナシ

○吐血モ酒香吐血ハ治シマスレ是ハ酒ニ熱逆上シテ吐血スルニ右ノ三黄
 ノ類ニテ治スルナリ下戸ノ吐血ハ心血ノ傷レ多シ故ニ難治ノ虚弱ノ人心氣
 不足ノ吐血ニ飯脾湯加麥門阿膠大キニ効アリ古方家ニテハヤハリ三黄
 瀉心湯ヲ用ルナリ此段同シ病ニシテ藥ノ雲泥ノ違アルコト不審
 ○咳血ニ古方家麥門冬湯ニ生地黃ヲ五々以上ヲ加へ用ルナリ下血ニモ
 先ツ三黄湯ニ生地黃ノ加味ナリ是古來ヨリ生地四物湯ニ黄連解
 毒湯ヲ合方シテ用ル場ヘ三黄生地黃ナリ單方ニシテ生ノ地黄ナ
 ルニ何程餘計用テモ野菜ノ煮汁ノ如ク薄シテ吞ヤスク血熱ヲ解
 スルコト甚タ速ナリ此等ハ實ニ近來古方家ノ使ヒ覓ニシテ中古ノ医

ノ未用處ナリ然レ凡^ニ鄙^ニテハ生^ノ地黄得安カラス志アラハ自^ラ園^ニ造^リテ用意スヘシ山城大和ノ産ホト六ナレト云ヘ凡^ニ培養^ヲ精^シクス
レハ細^キ地黄ハ何^レノ土^ニテモ生セスト云コトナレ此事ハ戶田子ノ非^ニ藥^選ニモ云ヘリ

○下血久^ク不止^モ古方家ニテハ芍^白膠^艾湯ヲ用テ此^モ生^ノ地黄
五錢ヨリ十錢ニテヲ加^フ阿膠ハ生ニテ煎^シ上ケアトヨリ入^レテトラ
カ^レ用ルナリ然^レ凡^ニ下血久^ク不止^モ顔色青^ク短^氣ニレテ歩^行成^リ
リカタキニ六^益氣湯ハ物湯大補湯ニテ効^ヲ得ルモノ多^シ諸^ノ方書
ヲ考^ヘシ



○唾^ハ血^ハ咯^ハ陰^虛火^動腎^虛證^{ナリ}古方家ニ麥^冬湯ニ生^ノ地黄
加^味ナリ古來ヨリ知^母黃^蘗ヲ用テ陰^火ヲシメス四^物湯加^知母^黃蘗
リ或^ハ地黄ノ泥^ム證^ニ陳^皮貝^母茯^苓白^朮桔^梗知^母黃^蘗栝^甘草ノ八^味ヲ
用テ輕^クアラシラフコトモアルナリ

○風^ノ腸^胃ニ入^テ泄^瀉シ便^血ヲ下^ス其^色赤^ク黑^キ氣^味アルナリ胃^風
湯ヲ用ベシ泄^瀉門^{ニアリ}

○痔^ニテ下^血スルニ大^抵加^味逍^遙散加^槐花^生地^黃ナリ日^文シキモ
ハ加^阿膠^古方^家ニ三^黃湯加^生地^黃當^歸ナリ

○溺^血ニ古^方家傷^寒論ノ猪^苓湯ヲ用ルナリ又^甚々^實熱^ノ者ニハ
イ^ハリ

醫方類聚

大兼氣湯加當飯コレハ農夫ナドニ間ニアルコトナリ大抵瀉血ノ劑ハ清腸湯ヲ用ナリ其外日久キニ至テハ加味道遙散益氣湯四物湯六味丸加牛膝等ノ方ニテ効ナキニ古方家猪苓湯カ又ハ大承氣湯ニテ即功アルコトアリ虚實ヲ考ヘ用ベシ

○吐血クツトク 諸方書ニ補瀉トモニ精シク擧テアリ考ベシ陽虚ノ吐血ニ歸脾湯陰虚ノ吐血ニ犀角地黄湯ナリ此ニ方ノ意ヲ以テ古來ヨリ用ヒ來シ劑又近來古方定メ用方ヲ考合テ施治スベシ
○又吐血ニ脾胃虚弱ニシテ氣促氣乏シク精神短少血吐血スルモノアリ人參飲子ヲ用ベシ又當飯補血湯又保元湯小建中黃耆建中湯

ナド證ニ隨ヒ用ルコトモアリ○又理中湯加木香胃虚不能食化其氣逆上シテ吐血チツケツスルコトアリ如斯ノ氣劑ヲ用テ治スルコトアリ○又四君子湯加葛根川芎山拖傷酒吐血ノモノニ用ルコトアリ○又六君子湯加香附子縮砂葛根飲酒過多ニ胃ヲ傷リ吐血スルモノニヨシ其外六味丸生脉散ナドノ治法多シ博ク方書ヲ考ベシサレモ博ク方書ニ涉ルトイヘ凡取シテリナフシテ却テ見ヌモノヨリモ劣レリ大部小部ノ書ニ限ラズ眼ノツケ処アルベキコトナリ證治準繩ナドヲ枕トシテ居ル醫師ニ存ノ外働サル療治アリ衆方規矩一卷ニテモ手ニ入リ吞込ヨケバ功者ナル醫師アリ大部ナ医書ハ唯道具立テ同前ニナリテアマリ近來公賣用

世ス正宗ノ名劔モ無手ニテハ用ニ立難シ近來古方ノ流行スルモ手取早
ニシテ傷寒金匱ノ兩書ニテ一切ノ治法相濟ム故ナリ千金外臺ノ方モ
取扱ヘテソレハ餘程吟味アリシ上ノ丁ナリ其外ハ動スレバ三黃紫圓ヲ
會款モナク投ズ辺鄙ナド此流義アリテハ医俗トモニ不案内ノ輩
多ケレバサテクアラナモノナリ能々意得ベシ

犀角地黄湯 上膈壅熱血積胸中吐出紫黑塊血脉洪大弦長按
之有カ精神不倦者或食不物或傷温酒死血上迫面赤身熱譫
語○此方用血者則有瘀熱於經中而暴衄者主之

犀角 如無以升 麻代之 芍藥 生地黃 牡丹皮

右水煎熱多者加黃芩

三黃瀉心湯 心火盛而吐血衄血者

黃連 黃芩 大黃 可撰重 實者 或大黃 芍藥連名

右各等分以麻沸湯攪之用或以水一盞二三分煎一盞

芍藥膠艾湯

川芎 唐或 豐後 阿膠 甘草 各二 艾葉 三 當歸 三

芍藥 兩 生地黃 或乾地黃五兩

右水煎

猪苓湯

諸汗

猪苓

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

各一

右水煎

清腸湯

瀉血者小便出血心移熱於小腸也

當歸

生地黃

山梔

黃連

芍藥

黃柏

瞿麥

赤茯苓

木通

篇蓄

知母

麥門冬

甘草

烏梅

右燈心水煎

麥門冬湯

見咳嗽

飯脾湯

見虛勞

諸汗

自汗

ハ陽虛盜汗ハ陰虛ナリ

自汗ニハ益氣湯或黃耆建中湯盜汗ニハ逍遙散加地骨皮或當歸地黃湯ヲ用ルナリ又盜汗ハ半表半裏ニ邪アレハ必出ル

モノ多シ柴桂湯ヲ用ベシ或熱強クハ小柴胡湯尤ヨシ又自汗モ内ニ熱甚シテ

蒸レテ出ルコト多シ白虎湯竹葉石膏湯ノ類ニテ熱サムレ止ムモノ多シ全

ク陽氣不足ノ證ハ自汗出テ脉虚ニシテカナレ是ハ黃耆建中湯ヲ用ベシ

又盜汗モ麥門冬湯加石膏用ルコトアリ是ハ虚勞ノ類咳アツテ盜汗出ルニ用

ルナリ或汗證ニ小柴胡湯加石膏用ルコトアリ又温熱病時疫汗吐下ノ後

盜汗者小柴胡湯去人参半夏加橘皮或濕熱ニヨリテ陰囊ズン汗ヅクモノ

麥門冬湯

諸汗

申

三十四

陰汗ト名ク此湯去入参加茯苓龍胆黃柏

○陽虛氣弱ク虚汗大出止ズ肢^{シタイケンタイ}躄倦息スルハ附子黃耆等分姜枣煎コレヲ耆附湯ト名ク又陽虛自汗風寒ニ不堪^{タハ}モノハ四君子湯ニ茯苓令ヲ減シ黃耆桂枝或附子ヲ加ヘ用ベシ又一切大病ノ後食減ジ盜汗スルハ參耆白朮散加黃耆當既用ベシ又盜汗ニ當既六黃湯ニテ効ナキニ人參養胃湯ヲ用テ効アルコトアリ是ハ顔色蒼々トシテ食減シ脉緩弱ナルヲ目當トスベシ

○汗ハ産後ノ大禁トス急ニ人參ヲ不用トキハ其朝夕ヲ保^{タモ}子難シ保元湯合四君子湯加芍藥五味子用ベシ

○金匱云男子平人脉虛弱微細者善盜汗出ト云ヘリ此證ニハ當歸補血湯ニ炒酸枣仁半兩ヲ加ヘ用ベシ數服ノ後七味地黄丸ヲ與ニ調補スベシ此外自汗盜汗ノ治法多シ此ニ大概ヲ挙ク諸方書ヲ考ヘシ

當歸地黄湯 治盜汗屬氣血兩虛者

- 當歸
- 熟地黄
- 黃耆
- 白朮
- 茯苓
- 生地黄 各一分
- 人參 五分
- 陳皮 八分
- 甘草 三分
- 黃柏
- 知母 各八分

右大車浮麦水煎温服

桂枝加龍骨牡蛎湯 治男子失精^{ヒツキ}女人夢交^{ユメニニハリ}自汗盜汗者

醫方手引

桂枝

芍藥

龍骨

牡蛎 各三

甘草 各二

右大棗水煎

竹葉石膏湯

石膏 二錢

半夏

麥門

人參

甘草 各一

右青竹葉生姜粳米水煎。極熱發狂倍知礮。熱嘔加姜汁

當歸六黃湯

當歸

黃耆 各

黃柏

黃芩

黃連

生地

熟地 各七

右水煎

人參養胃湯 見瘡門

保元湯

人參 二錢

黃耆 三錢

甘草 錢

右生姜水煎

當歸補血湯

治氣血虛損或安胎峻劑致氣血益虛肌熱大渴引飲目赤面紅脈洪大而虛重按全無此病多得於飢飽勞役者

黃耆 蜜炙 一兩

當歸 二錢

右水煎

七味地黄丸

陰虛盜汗咳嗽堪用

六味丸加五味子 二兩

一名都炁丸

痰飲

古云痰生百病トイヘ凡根本ヲ穿議スレハ痰ヨリ病ヲ生スルモノデハ

痰

痰

申

三十六

ナレ何ナリ此病ガアツテ痰ヲ生ズレカラレテ寔ジテ百病ヲ生ズイ
チノ根本ハ痰テハナイ痰ニナツテカラ又百病ヲ生スルナリ先ツ痰ヲ
本トシテ療治スベレナラモ其本ヲ吟味スレバ痰ヲ生ズル本ガアル程
ニソコニ意ヲツクテ療治スベレ儲痰ノ療治ニナツテハ痰ト飲トヲ分
別スルカ肝要ナリ不稠粘ヲ飲トシ稠粘ナルヲ痰トス飲ハ寒ニ属シ痰
ニハ濕ニ属スルト火ニ属スルトノ違アリ先ツ飲ハ水ナリ仲景ノ水氣ト
云モノ是ナリ外ヨリ飲物内ヨリハ肺ノ液コレ水氣ナリツレカ何ゾ
訣ガアツテ飲トナル飲ニナツテハ五ツノ品アルニヨツテ五飲ト云子ハリ
ナレノ水ニテ身ノ中ニアツテ事ヲスル間ニハ子ハリタルガアレ此カタニ

ツタハカリニテ粘リカクコロテシテ見ルマクナハカタニツテモ飲ナリ此皆属陰
寒リテ湿痰ト痰火ノ別アリ濕痰ハ脾胃不健シテ水飲ヲ不行ユニ滯
テ痰トナル半夏南星ノ燥劑ヲ用ルナリ其中テモ脾濕ハカリナレバ濕
痰ト云半夏カヨイ肝カ手傳ヘバ風痰ト云テ南星ヲ用ユ痰ノ色青キモノ
ナリリレ此必青キモノテモナシ又濕痰テハアリナカラ火モ手傳フコト
アリニ陳湯ヲ主トシテ貝母瓜蒌仁黄芩ト濕火相兼テ療スルコトモア
リ痰火ト云ニナツテハ一向ニ燥劑ヲ用ルコトヲ忌ナリ潤劑寒劑ヲ用テ
半夏南星ノ燥劑ヲ忌ムナリ是ニツイテ五臟ノ司ドル処カライハバ色マ
名アレ此大抵如此意得ルトキハ大要ガスムナリウレカラ諸方各ヲ見テ考ル

此書

一キハ大ナル差ナカルベシ飲ノ脈ハ弦ナルモノ湿痰ノ脈ハ洪ナルモノナリ痰
火ノ脈モ洪ナルモノゾ是ニ兼ルトコロノ脈ガ各アリ此ヲ能考テ療治
スベシ中風ナトノ痰涎壅盛ト云トキハアマリ細カニ吟味セスニ只急ニ痰
ヲ開クマクニスベシ

○借金匱ニ四ツノ飲アリ痰飲懸飲溢飲支飲ナリ其證詳ニ琴テア
リ精ク熟覽スベシ今古方家專ラ飲家ノ病ヲ瀉下ノ丸散ヲ投シ
テ久シキ留飲ナト即効アルコト此近來ノ使ヒ覺ミテ手際ナルコトナリ
懸飲ノ内痛ハ金匱ニ琴ルコトク飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲ナ
リ一武官富貴奉養ノ人希古ニ近シ平常厚味ニシテ下ガナリ菓子餅ノ

類ノ甘味ヲ嗜ミ持茶ニ益氣湯ハ味九ナリ且持病ニ頭痛脱肛アリ魚鳥
ノ類過食ノ後ハ寃メテ頭痛或脱肛發ルイツニテモ頭痛ハ香砂六君子湯
或消導ノ劑ヲ用テ黃水ヲ吐シ或痰水ヲ吐シテ即チ愈ユ一日風ト一声ノ
咳出テ脇下ニ引痛ニ身動シ歩行スルコトナラスニ便氏ニ兩人拵テ甚々苦メ
リ然レモ飲食氣カ平日ノ如ク脈弦ナリ三四医更ニ治スレモ寸効ナシ既ニ
七十餘日ニ及ベリ此懸飲ノ内痛ナリ古方家ヲ招キ治セントスレモ衆評
ニテクニシテ唯恐畏シテ決セス予強テ進之遂ニ古方家先達ナルモノヲ
招キ治セント即チ十束湯ヲ以テ粉茶五分ヲ翌朝用ヒ暫シテ粥ヲ與テ
忽チ腹鳴動シテ大便ニ行シ便器ヲ以テ是ヲ見レハ米泔汁ノ如キ留飲ニ

痰飲
申 三十八

升餘ヲ下ス示暫シテ七八合ヲ下ス午前鮎ノ炙物ニテ飯二椀ヲ食ス味
常ニ異ナラス申ノ刻ニテ三四行米泔汁ノ如キモノヲ下シテ申中刻七十餘
日フリニテ始テ自ラ起テ七八歩ス此即効衆拳驚ク後五七日レテ出勤
平日ノ如シ實ニ是古方家ノ近來行ハルノ奇特ナリ其外控涎丹ノ類留
飲ニ用テ即効アリ金匱甘遂半夏湯ナドハ吞ニクキ煎湯ニハ大抵ハ控涎
丹ヲ用ルナリ其外溢飲支飲ノ治法金匱要畧ニ詳ナリトイヘモ未熟
ノ輩妄リニ虚實ヲ辨ヘス投スベキ劑ニアラス即効アレハ亦即害アリ審
ニ診察スベシ痰飲ハ胸脇支滿目眩スル者ニ桂苓木甘湯ナドハ平和劑
飲證ニカキラス近世流行茶ナリ隨分水氣ナトニ効アリ用ベシ短氣有微

飲ニ小便ヨリ可去之アリ桂苓木甘湯麦之ハ味腎氣凡モ亦至之トイヘリ是
等ノ方ハ未熟ノ者取扱マスキ古ナリタトヒ的中セカレハ害ナシ又外臺茯苓
苓飲ハ醫方紀原ニ云君子湯ノ原方ナリト甲賀子イヘリ心胸ノ中ノ停痰
宿水ニ用テ即効アリ小青龍湯ナドモ溢飲ノ茶ナリ溢飲ノ病ハ飲水流
行シテ四肢ニ振シ汗出ヘシテ汗不出身體疼テ重キモノヲ溢飲ト云ナリ
大青龍小青龍ノ二方ヲ選用ルナリ效逆倚息短氣不得臥其形如腫モノ
ヲ支飲ト云膈間ノ支飲ハ木防己湯木防己加茯苓芒硝湯ヲ掌テアリ心下
ノ支飲其人苦シニ冒眩スルハ澤瀉白朮湯支飲胸滿者ハ厚朴大黃湯支飲不
得息者ハ葶藶大黃瀉肺湯主之嘔家ノ心下ニ有支飲ニ小半夏湯ヲ用ルナリ

五言詩集

以上ノ諸方金匱要畧ニ詳ナリ熟覽スベシ○五飲湯ト云アリ王海藏が製ナ
リ五飲通シテ用之先輩コレヲ笑ヘ凡輕證ニ用ヘシ旋覆花ノ功甘遂芫花
ノ代リナリ水飲ヲ逐フノ能アリ飲家ニ用テ効アリタトヒ不的トイヘ凡
害ヲナサス或傳ニ旋覆花一味別ニ細末ノ五飲湯ヲ香汁ニテ一度ニ二分三分用
テ飲證ニ効アリ何分甘遂芫花ノ代ニ用テ害ナレ旋覆花テ即効ハナケレ
凡レ子ト飲水カケレバニ夕用ヤスキ方ナリ

○火實ノ積痰アヤレキ證候アルハ痰癆ヲ用ベシ火ニ属スル痰百般ノ患
ヲナス證ニ奇効アリ精シキ主治ハ諸方書ニアリ考ヘ用ベシ痰癆丸ハ火ノ
痰ニ用ルナリ控涎丹ハ水ノ痰ニ用ルナリ是即飲ナリニ方凡二人ノ虛喘貝ヲ

ハカリ精シク考ヘ用ミ未熟ノ輩安リニ用テ誤ルベカラス

○瘧疾ニ用ル諸方果シク何レノ古書ニ出テアリ見レバ大抵二陳湯ノ方
後ノ加減ニ委クアリ近來動スレハ昨今ノ鍼医半分ノ新醫師ガ業ヲ調合ス
ルニモ留飲ト云フ流行テ古方家ノ言ヲ真似フコトオカシ既ニ飲トイハ掃キ
去ル治法ナリ胡亂ニ措クニ武者ナトバカリ云スト又薛氏ノ治痰ノ法モア
ラニレ理會スヘシ六君子湯加木香脾虛痰滯氣逆ノモノヲ治ス補中益氣湯
合ニ陳湯脾氣虛弱不能消湿シテ痰ヲ生スルモノヲ治ス入參理中湯胃氣虛
弱寒痰凝滯ノモノヲ治ス六味地黄丸腎虛水泛テ生痰モノ脾經血燥ニ因テ生
痰モノ腎虛陰火上炎ノ生痰モノヲ并治ス八味丸腎氣虛寒痰上湧モノヲ治ス

史綱

右八虛人又中人以上財主療治ニルコトナリ精シク考ベキモノナリ

桂苓味甘湯 心下有痰飲胸腹支滿目眩

茯苓 四兩 桂枝 三兩 白朮 二兩 甘草 一兩

右水煎 小青龍湯 見傷寒

小半夏湯

半夏 一升 生姜 半斤

右以水七升取一升半千金小半夏加茯苓湯 加茯苓三兩

一法四兩 卒嘔吐心下痞脹間有水眩悸者此方主之

外臺茯苓飲 治心膈中有停痰宿水自吐出水後心膈間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 人參 白朮 枳實 橘皮 生姜

右水六升煮取一升八合分溫三服

十棗湯

芫花 甘遂 大戟 各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮芫花大棗十枚取九合去滓內棗

末強人服一錢匕羸人服半錢平旦溫服之不下者明日更加半

錢得快下後糜粥自養十棗丸諸棗各亦分以棗肉煮棗去皮

核搗爛為丸梧桐子大每服四十九清晨以熱湯下之治水氣浮腫上氣喘急大小便不通者

十束湯變方 陳養晦傷寒五法 治裏有水氣其證乾嘔脇痛心下滿咳引

脇下痛身涼不發熱

芫花 大戟各三分 甘遂二分 陳皮三分 茯苓一分 半夏一分

乾姜五分 大棗十枚

右水盞半煎八分先服四分停半日又進若下後病不除者明日

又進以胸中和快為度後進糜粥此方平和也欲古方十束湯者先以此方試之可也

控涎丹 留飲之下劑

大戟 甘遂 白芥子 各一分

右為細末姜汁打麩糊丸梧桐子大每服七丸或二十九以津液

嚥下若取利則服五六丸

滾痰丸 諸實熱積痰異證孕婦勿服

青礞石 色青者良三兩同煨硝三合入湯成 沉香 兩

大黃 兩 黃芩 兩

右為丸食遠服

五飲湯 五飲通用

人參 白朮 茯苓 甘草 枳實 厚朴 唐

陳皮

半夏

猪苓

澤瀉

前胡

肉桂

芍藥

旋覆花各五分

右姜煎温服。○因酒成飲如葛根葛花縮砂

甘遂半夏湯

木防己湯

木防己加茯苓芍藥湯

澤瀉白朮湯

厚朴大黃湯

葶藶大棗芍藥湯

以上六方見金匱要略

右外痰飲ノ諸方ハ局方以來諸方書ニ載シテアリ考ヘシ

咳嗽

咳嗽ノ病因甚多ニ一例ヲ舉テ藥論ナリガ如シ故ニ方書ニモ六氣ノ咳嗽

ヲ載セシヨリレテ虚实寒熱種々ノ咳嗽ヲ並記ス此外ニ内經ニ五藏六府ノ

咳ヲ説ク治方證治準繩張氏醫通等ニ詳ナリサレモアレガカイノアルコト

ニラモノサレサレモ間大アルコトナル程ニ考テ用ベシ大抵感冒ノ咳嗽ニテ

一旦咳ニテツテハ早速ハ不愈モノナリサレバ此ハ外邪カ解スレバ自愈ルモ

ノ感冒ガアラフニ愈タラハ服薬ハ止ムベシ感冒ノ咳嗽サレコレナレバ外ノ咳

嗽ハ難止モノト兼テ意得ベシ唯心ノユルサレバ氣遣ナルハ另咳ニハナシイカ

ト油断スベカラス楮外邪ノモノハ發散スレバ咳オノツカラ止ム小書龍湯ヨリ

又ハ輕キ咳ニシテ外邪強キモノハ仲景ノ葛根湯加杏仁用テヨシ今世

ハ此湯ニ參蘇飲ヲ用ルナリ如杏仁桑白皮イモクヨシ此ハ婦人ナトノ

氣鬱ヲ兼名ニ用ヒテヨシ若シ初々風寒傷ラレ咳スルモノニカマウノ冬蒸飲
ノ涼解ノ劑ヲ用レハ風寒去ラズ邪氣連綿トシテツイニ咳不止シテ勞
咳トナルモノ多シ誤ルベカラス凡咳ト云モノハ無形ノヒ氣ニテ難止モノ
ナリ勞咳ノ咳ハ不治ナリ咳ハ常ノ咳ニテモ止カスルニ殊ニ脈細數ニシテ
咳出ルモノハ勞ニテ治シ難キモノナリ又小兒ノ咳モ多ク中焦ノ食ノ
停滯ニテソレニ令喰トコロノ食又次足シテ中焦ニヒタト積ムニ治シテ
シ故ニ小兒ハ中焦ヲスカスマウニスベシ不換金ニ杏仁桑白皮ナトヲ加ヘ
用テヨシ○大人感冒發散後咳不止痰乾キ胸中ニ粘リツキテ出ガタ
キモノハ金匱麥門冬湯ヲ潤シ下シテヨシ後世ニテハ清肺湯ヲ用ル

ナリ又感冒ノ後咳不止甚々咳入り顔赤ク上氣シ痰不出モノハ桂枝五味
甘草湯ヲ用テヨシ後世ニテハ杏仁五味子湯ト云方アリ此ヲ用ルナリ
○惣シテ何レノ證ニテモ咳アツテ沫ノ如ク痰水ヲ吐クハ此ヲ水氣或留
飲ト云勞咳水腫ノ咳ニモ小青龍湯ヨシ石膏ヲ多ク加ヘテ用ルナリ
此ハ下地熱アル證ニハ小青龍湯ハ溫劑ニハ石膏ナケレハ大キニ上ルニハ
ナリ發汗ノ時感冒ノ最初亦熱ナキ咳ニハ石膏ハ無用ナリ貝母ハ痰ヲ
潤シヌグウテ取ヤウナモノナリ故ニ虛勞ノ咳ナド陰虛ノ咳ニ半夏ノ燥
劑用ヒ難シ故ニ貝母ヲ用ルナリ貝母ハ鬱ヲ解スルモノナリ桑白皮ハ肺
熱ノ咳ニ黃芩ト同用テ肺火ヲ瀉スル風寒ノ邪ニテ咳スル者ニ忌ム杏

臣國醫手引草

仁公氣ヲ下シ胸膈ヲ通利シテ少シ發散ノ意アリ故ニ表邪アル證ニ
用ルナリ五味子ハコレモ咳ニ用ル是ハ浮散ノ氣ヲ收メ潤シテ咳ヲ止
ムル故ニ又咳ニ用テ潤スナリ故ニ外邪ノ者ニ忌ムサレ小青龙ノ五味
子アルハ麻黄桂枝ニツレテ内ニシメル意ナクシテ咳ヲ止ルナリ半夏ハ
脾胃ニ聚ル湿痰食痰ヲ驅モノナリ具母ハ胸膈ニ聚ル燥痰ヲ潤シ流
スナリ

小青龙湯 見傷寒 此方ハ風寒ヲ發散シテ水氣ヲ去ル方ナリ

故ニ咳嗽アツク如ク痰出ルモノニ用テヨシ又ハ水腫ノ咳嗽ニ用テヨシ
凡ハ一ハ咳嗽咳ルルキモヨシ又咳嗽アツクテ面目浮腫レ或

小便不利ニ用ルナリ初風寒ニ感スルトキ涼解ノ劑ヲ不用此方ヲ用テ
風寒去テ咳止ミ勞トナルコトナシ又又咳熱アリ或勞咳ノ類又ハ水
腫ニテモ咳嗽ニ用ル時ニ石膏ヲ加ヘサレ熱某ニハ升リテ却テアン
シ石膏ヲ入テ鬱熱ヲ和スルトヨシ即金匱ニ肺脹效而上氣煩燥而
喘脈浮者心下有水小青龙加石膏湯主之トイヘリ

麥門冬湯 大逆上氣

麥門冬ニ 半夏ハ 人參ニ 甘草ニ 粳米ハ 大枣ハ
右水二盞煎一盞〇隨證加石膏三錢〇此方ハ虛火ヲ下ヘ導キ又
逆上氣ヲ治スルモアリ又ハ火逆上氣ヲ治スルモアリ兜角潤シテ氣ヲ下

臣國醫手引草

行サスルト見(タリ)麦門冬多クシテ半夏三ツ割一分入テ麦門冬重キヲ半夏
 ニテメクラスト見(タリ)虚勞咳嗽無痰モノ又ハ咳血吐血ニモ石膏生地黄ヲ加ヘ
 テ用ルナリ又時疫ノ大概熱サメテ後餘熱アツテ耳聞ヘズ或スラクスト
 云ニスヘテ用テ調理スルナリ世上ノ大補湯大トノ場合ニ古方家專ヲ用
 ルナリ此時ハ韓參ナルベシ此茶免角滋シテ津液ヲ生スルモノナリ又ハ
 上氣シテ少シ耳ナトモ鳴リ腹ニ動アルモノニ用ルナリ又狂癩ニテサシ上
 モノニ麦門加黄連湯ヲ用ルナリ甚シキモノハ石膏ヲ加フ此時ハ三黄丸
 ヲ兼用ルナリ泄瀉アルモノハ麦門冬湯ハ不用ナリ

桂苓五味甘草湯

- 茯苓 桂枝 五味子 甘草

右四味以水八升煮三升去滓分三温服

清肺湯 治肺熱痰嗽脈數脾胃不虛者

- 黄芩 桔梗 茯苓 陳皮 貝母
- 桑白皮 當歸 山柘 天門 杏仁
- 麥門冬 五味子 甘草

右藥煎食後服○痰嗽有三因痰火者凡薑桂實湯因濕痰者
 二陳湯因肺熱者此湯主之○或痰咳久不止向必脾胃未虛者
 此一方主之 天花粉當歸唐厚朴茯苓半夏黃芩知母 甘草

右姜煎有血去知母加阿膠或白芨

杏仁五味子湯 諸嗽通用

杏仁

茯苓

各一

橘皮

各七

五味子

桔梗

甘草

各五分

右水煎温服。春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏黃

芩知母麥門。夏多火熱炎上宜清金降火加桑白皮黃芩知母

石膏姜門。秋多濕熱傷肺宜清熱偏濕加蒼朮桑白皮防風山

拖黃芩。冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏防風乾

姜

右ノ外效嗽ノ藥諸方書ニ多ク見ルヘシ

喘

世俗喘息ト云ハ哮喘ト云モノナリ此ハ多ク下地痰熱ナル人風寒ニ感シ

テ發スワレニ極暑極寒ニ發ラス春ハ暖氣ニナリク秋ハ冷氣ニナリク

テニ必發ルモノナリ黃芩麻黃ヲ主茶トス黃芩ニテ熱ヲサシ麻黃ニテ

邪ヲ散スル赤水玄珠ノ黃芩半夏湯ト云茶毎々効アリ。産後ノ喘

瘵後ノ喘久病ノ喘コレ何レモ死證ナリ獨參湯參姜湯參附湯ヲ用テ

届クモノアリ不届モノアリ病ノ淺深虛實アルヒハ入參ノ善惡多少

ニモヨリナリ古方家ニ熊參湯ヲ用ルナリ

○持病ノ喘急ニ蘇沈九宝湯モ宜シ古方ニ麻黃杏仁甘草石膏湯

後遺癆ノ喘

喘

申

四十七

大キニ効アリ哮喘久シク不止風寒去テ痰火ノコリ久シク喘不止モカ
 或咳喘甚シク胸痛大ニ苦シム此ニハ瓜蒌枳實湯尤宜シ竹瀝姜汁又
 ナル功ウスレ或又何ゾ事ニアツカリ氣ヲツカヒ俄ニ喘スルモノアリ此
 ハ蘊子降氣湯ヲ用ベシ哮喘證ハ多クハ夜強クテ明方ニユルナルモ
 黃芩半夏湯

黃芩 生姜各三錢 芍藥 甘草各二錢 大棗二枚 半夏半合

右吹咀水煎服

蘊沉九寶湯 治人素有喘急過寒暄不常發則不止哮喘夜不得睡者

紫菀 陳皮 薄荷 麻黃 杏仁 桑白皮

大腹皮 肉桂 甘草 生姜 烏梅

古水煎

瓜蒌枳實湯 治痰結咯吐不出胸膈作痛不能轉側或痰結胸膈

悶作寒熱氣急并痰迷心竅不能言語者并皆治之

瓜蒌仁 枳實 桔梗 茯苓 貝母 陳皮

黃芩 山梔各一錢 當歸二分 縮砂各五分 甘草三分

右姜煎入竹瀝姜汁○胃火痰結加石膏知母甚効

蘊子降氣湯 治因憂悵意而氣困不得升降一旦氣逆發痰喘咳嗽

當歸 甘草 厚朴 前胡各二兩 陳皮 肉桂各三兩

蘆子

半夏

各五兩

右姜枣煎之足冷ルモノ宛メテ効アリ

右ノ外小青龍湯諸ノ白散或四君子六君子ナト氣虛レテ火肺
ニ入ルモノハ生肌散又ハ陰虛レテ火金ニ乘シテ不得臥モノハ六味丸ヲ用
ルナリ喘急腎虛火源ニ不歸モノハ八味丸ナド用ルコトアリ諸方書ヲ
考ベレ此證平日淡味ヲ食ベレ厚味胃火ヲ動スルトキハ其發ルヲ制シ

短氣

少氣

逆氣

諸方書ニ記スコトクニフトモニ俗ニ云息遠シキ事ナリ此ニ疾カアレバ喘
息ナリ疾ハ無テ息遠シキハ短氣トモカ氣トモ云ナリ諸病ニツイテ

息遠シキト云コトハアルモノツレコトヲ一ツノ病門トスルハ何病モナラテ只息遠

シキト云證ナリ短氣ハ虛寒ナリ少氣ハ一向ニ虛證ナリ○水心下

ニ滯リ短氣小便難キハ五苓散○短氣ハ微飲アリ小便ヨリコレヲ

去ルベシ桂苓木甘湯主之亦金匱腎氣丸主之ト云ヘリ其ウチニ

呼吸ノ短キハ桂苓木甘湯ナリ吸氣ノ短キハ腎氣丸ナリ又虛證

ノ短氣小便利者ハ四君子湯去茯苓加黃耆若レ腹中氣不轉者ハ

倍甘草肺氣短促或息スルニ足ラズ或腎虛發熱唾痰者生肌散加當

歸黃耆生地黃凡病後產後一切瘡疽潰後氣虛不能接續及事高病

久正氣耗散之人雖有痰火不可作有餘誤用耗氣藥大劑生肌散

短氣 少氣 逆氣

為君少佐陳皮○少氣ハ氣少ク言コトナラズ獨參湯生脈散保元湯異
功散ノ類選用ベシ。

○逆氣ハ氣上逆シテ息ツカヒアラク音アルヲ云此ニ痰声ガアレハ喘ナレ
ト痰声無シテ息ツカヒアラキモノナリツレテラハ自ト息遠シキ氣味ハア
リ短氣ハ息遠シキハカリ逆氣ハ息ツカヒツヨクアラク息ニ音アルナリ
ニ息遠シキナリ治法ハ蘇子降氣湯杏子湯小青龍湯越婢湯ナト
皆肺絡ノ氣逆ヲ治スルナリ

四君子湯 管衛氣虛藏府怯弱心腹脹滿食不思食腸鳴泄瀉嘔
喘吐逆

人参

白朮

茯苓

甘草 各等分

右水煎○脾氣虛弱加芍藥倍甘草○脾胃不和倍白朮加姜枣
○脾胃虛弱加肉桂當歸黃耆○小水利者去茯苓加黃耆○常
服調氣加山藥和氣加生姜○加橘皮名五味異功散姜枣水煎
治脾胃虛寒稀痰喘嗽○加橘皮半夏名六君子湯姜枣水煎治
脾胃虛有痰者無痰者亦治也夫脾胃虛即氣虛也氣虛即脾胃
虛也或此湯少有消導之意也又脾胃補之外以和順為主故先
輩諸病加味之用法最多矣

生脈散 滋生精氣培養真元補心潤肺

麥門冬

人參 各三錢

五味子 韓十 五粒

右水煎

獨活湯

治陰虛陽暴絕肢仆上下失血者

人參 韓產二兩或上半須須透明者次之

右以水一升煎半升

參附湯

真陽虛之上氣喘急自汗盜汗短氣頭眩眼花

人蔘 一兩 附子 半兩炮

右細切分作三服加生姜水煎溫服。此湯治真陽虛之厥冷者世人所知也虛陽浮散下大者欲入井反見熱候者是真寒假熱也以

此湯主之

保元湯

治營衛氣血不足

黃耆 三錢 人參 二錢 甘草 一錢

右水煎或入姜

杏子湯

治喘急迫或自汗或不汗或咳煩渴者恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃 四兩 杏仁 五十個 甘草 二兩 石膏 半斤

右四味水煎

越婢湯

麻黃 六兩 石膏 半斤 生姜 三兩 大棗 十五枚 甘草 二兩

投藥

脚氣

申

五十一

右水煎。惡風者加附子一枚 風水如木

四兩度 蒼木

脚氣

此證乾脚氣濕脚氣ト云アリ 乾脚氣ハ脚不腫シテ痛ム此證多クハ
氣滯ニ屬ス 後世檳榔散ハナチ香蘇散加檳榔木瓜ナリ古方家
ニテ大抵檳榔湯此證ニヨレ又濕脚氣ハ脚ヨリ腫ルナリ折ニ脚痛ニダ
ルク或レビレナドスルモノナリ是皆濕邪下焦ニ流ル 賤シキ者ハ地ヲ履
テ濕ヲ受テ外ヨリ感ズルモノ多シ貴人ハ酒食水飲ニ濕下ニ流レテ
腫ル 先テ越婢湯ヲ用ベシ尤蒼木ヲ加ベシ惡風アルモノ或日久シ腫
タル処冷ル様ナルモノハ附子ヲ加ヘテメクラヌナリ多クハ脚氣ノ證胸

息タワシクナル此ヲ脚氣衝心ト云氣急ニノレハ多クハ死ス輕キ時ハ小檳榔
湯加種子茯苓用ルナリ氣急甚シキ時ハ十束丸加 大黃牽牛子一度ニ
七八分用テオリク下スナリ尤病家ハ此證至テ大切ナルヲ能喻
シテ某ヲ用ベシ 或傳ニ脚氣上テ衝心ノ急證ニ豫メ其衝キ上
ス端ニ灸之若急則藜ヲ以テ嚼爛シ温湯ヲ以テ送下之コレ急卒
ニ備ルノ法ナリ又杉木湯木葉散ノ諸方選用ベシ
小檳榔湯 腫滿氣急衝心下上部腫多者用之就中此湯以疼痛
可為目的

生姜 一錢

半夏 八分

肉桂 六分

檳榔

四分 別末 九佳

右水煎

大栝柳湯 小栝柳湯證而氣急甚脈有熱難用前湯者投之此湯無痰喘唯心下氣急者主之

橘皮 紫菀 木瓜 吳茱萸 栝柳 生姜

右水煎

腎氣丸 金匱 脚氣腫滿コレヲ推シテ見ルニ腫マワラカニシテ勢ナシ

小腹カケテ麻痺スル氣味アツテ小腹ニ無力小便不利ニ用テ熱多キ者ニ難用或煎湯トナシ專用

蕪子湯 心下ニ衝コトナキ氣滯ニミリテ上ニ腫多ク或痰喘アルモノニ

尤宜之 即蕪子降氣湯見喘門

木茱散 治脚氣衝心悶亂不識人手足脈欲絕

吳茱萸 半兩 木瓜 兩 栝柳 二兩

右為末温湯送下或生姜五片水煎

杉木湯

杉木節水煮浸將脚火驗 足踝ニテ洗ベシ上ヲ浸洗コトニ忌ム

礬石湯 治脚氣冲心

礬石 唐二十錢

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良久漿水ノ代ニ醋五升

二水一斗ヲ交セテ煮テ礬石二十目ヲ細末シテ入ルベシ○或傳ニ礬石
 五錢ヲ藥甘草各五分水煎シテ布ニ浸シテ洗フナリ脚氣ニ
 限ラズ痛風手足ノ痛ヲ洗ヒ蒸スベシ宛メテ効アリ又醋ヲ造ル
 屋ニ三番醋或四番醋ト云モノ漆物屋ニ用ルナリ右ノ醋四五斗ニ唐
 明礬一斤入レテ居風呂トシ一廻リ或二廻リ程入湯スベシ脚氣ニ
 限ラス一切ノ諸痛骨節痛ヲナスニ効アリ濕毒後骨痛ニモ屢
 効有リ試タリ尤面ヲ洗フベカラズ居風呂ノ中ニテ常ノ湯ニテ別ニ
 面ヲ洗フテヨシ其内脚氣ノ痛ハ腰ヨリ下ベカリヲ洗ヘシ
 水陳湯 一切腫滿出入加減通用

陳皮

半貝

茯苓

香附

縮砂

葛根

澤瀉

薏苡仁 各等分

右薑煎○去葛根加吳茱萸檉木瓜是治脚氣腫滿如減也

右近來脚氣ノ説医俗トモニ噴シ然レモ虛分ノ短氣又ハ病後ノ浮
 腫或産後血分ノ衰ヨリ足脛痛モノ大防風湯大補湯ナトノ證ニ足痛
 スハ脚氣ト名ケ檉柳湯ノ類ヲ用テ氣血イヨク虚損ト大便滑利シ
 テ足脛ナト浮氣出ルコトアリ此レ脾胃ニ及ニテ難治ノ證トナルコ
 ト多シ足脛痛ニ浮腫アルコト婦人産後調理ヲ失シテ成モ多シ
 一概ニ脚氣腫滿ト名クベカラズ男子ノ脾胃虚損ノ浮腫コレ亦多

或病後調理アシク浮腫スルモノアリ此等ハ牡原湯濟生腎氣丸
料ノ加減ナドヲ治スルヲ多シ人ノ知ル所ナリ又虚分ナキモノハ浮腫
ニ瀉陸大蘇ノ煮汁ヲ赤小豆一合ヲ煮テ一日ニ食尽シ其間一日ニ瀉一合
ツヨリ外ニ食セズ塩断シテ小便大イニ通シ満腫一廻リ力ニ廻リノ中ニ
又ケルナリ原本草赤小豆附方ニ出タリ然レモ塩断セズ食モ多クレバ効
ナシ畢竟腹ヲ干ス意持ニテ塩ヲ断テ小便ヲ利スル治法ナリ或大坂
林生ガ賣藥ニテ麥飯バカリ食シ一切嚴シク毒忌シテ即效アリ此等
ハ脚氣家ノ浮腫凡アチガチ見ヘ又ナリタトヒ水腫ニモセヨ脹滿ニモセヨ
脚氣ニモセヨ脾腎虚ニ其上心氣ニ鬱結アリテ出タル浮腫多クハ難治ナリ

今日世上ヲ見當ルニアミリ相違ナシ豫ジス心カクテ養性セバ腫満ノ患ハ
道ルベキナリ

一 厥

厥證ニ種々ノ名アリ内經ニ詳ナリ或説ニ今ノ脚氣衝心ト云モノハ厥論
ニ所謂寒厥干腸上衝胸中ノコトニシテ今ノ脚氣衝心ト云モノニラ腎ノ精氣
溢下ノ因ナリ皆質壯多淫ノ人ナリ老衰幼弱ニチキハ腎虚ノ説タルコト
決セリ但シ虚ニ二途アリ又虚ノ者ハ勞證ノ類ニ屬シ暴虚ノ者ハ厥逆
ニ屬ス便チ脚氣ナリ何ヲ以コレヲ云ハ久虚ノ者ハ治不治俱ニ緩シ邪
ナクバナリ暴虚ノ者ハ死生ニ急速ニシテ邪アルナリ何ヲ邪ト云ヤ

是腎水心火之剋スルモノニシテ其實腎氣奔心ヲ衝クモノナリ本邦百有餘年昌平豐饒娥眉靈其内狂荼腐其外逸君放肆無固筋骸之事也加之以瘟疫之氣乘間之令然者也乎是酒淫腎虛後厥逆究今脚氣衝心者皆是厥證也厥為病暴卒竭之謂而於人身之患尤急矣云是東武松材庵カ脚氣論ノ説ナリ

○諸大抵寒厥カ熱厥カト云テ分別スヘシ寒厥陰厥足ノ指ノ裏ヨリ發シ熱厥陽厥足ノ指ノ表ヨリ發ル何レモ卒倒不省入事モノニテ異病ナリ輕キモノハ難ク重キモノハ死スルナリスレバ卒中風ニ類スルモノナリサレバ氣厥モアリ食厥ノ類ニ急ニ暴厥スルモノハ厥證ナリ中風門ト考合スヘシ

平生澤山ニアル病テハナイ此ニアラク治例ヲ考ルナリ精シキコトハ諸方書ヲ考ベシ

○厥證足ノ指ノ裏ヨリ發リ冷ル者ハ陰厥ナリ四逆湯主之

○夏月勞役ヨリ陽虛煩擾シテ目昏耳閉コレヲ内經ニ煎厥ト云四君子湯加遠志防風芍藥麥門陳皮

○勞役ニ因テ飲水タラズ驚ニ遇ニ發厥者六君子湯加黃連黃芩竹瀝薑汁

○怒氣逆甚ク嘔血鼻衄發厥者四物湯去地黃加茯苓人參桂枝陳皮麥門樞榔

皮麥門樞榔

○熱厥ハ諸承氣湯ヲ用ベシ是熱極テ寒ニ似タリ真熱假寒ノ證ナリ
外邪ヲ兼ル者ハ防風通聖散ヲ用ベシ

痞滿

痞滿ニツアリ傷寒ノ痞滿ハ無形ノ心下痞スルナリ雜病ノ痞滿ハ
有形テ心下痞スルナリ此事難知ニ出ス有形ト云ハ積聚ノマウナレ
ト食アリ疼アリ氣アリ是俗ニ云ツカヘト云モノナリ方書ノ諸方ハ大抵
雜病ノ痞ヲ云就中養胃湯ノ一方雜病ノ痞ノ主方俗ニ云ツカヘニ可用
此合点ナレニ痞滿門ニ從テ考レバ傷寒ノ痞滿ト雜病ノ痞滿ト混ノアル
ソレヲ明白ニ辨別スルハ此事難知ナリ

○痞痞滿ハ食鬱痰濕熱心下アツシリテナス大抵心下痞滿不食或大便
溏スルモアリ半夏瀉心湯ヲ用ベシ又心下痞滿シテ上氣便秘スルモ三黃
湯ニ下スベシ是古古家ノ治方ナリ後世ニテ三陳湯加黃連枳實心下痞
滿ヲ治ス或香砂養胃湯ナドヲ用ユ半夏ガ心下ノ痞ヲ瀉スルナリ枳
實ハ心下ノ硬キヲ推シ開ク黃連ハ寒ニシテ心下ノ痞ヲ開ク枳實ハ心下
ノ食積痰積ヲオシヒラクナリ

養胃湯 治胸腹痞滿凡痞者心下痞滿而不能食也傷寒論曰
滿而不痛為痞滿而痛為結

- 香附 縮砂 木香 枳實 厚朴 白豆蔻

百病...

藿香各七 白朮 茯苓 陳皮 半夏各一 甘草各二

右姜枣水煎。瘦人心下痞滿加黃連去半夏。血虛中滿加當歸芍藥去半夏。食積中滿加神麴山楂麥蘖。白朮半夏。肥人心下痞悶加蒼朮。氣虛中滿加人參去半夏。痰膈中滿加瓜薑仁貝母桔梗竹瀝姜汁少許去白朮半夏。脾油中滿加蒼朮為菜去半夏。此方痞滿養胃湯ト結セツ上代ヨリ本邦老醫ノ用ヒ来ルコト尚シ

半夏瀉心湯

半夏各 乾薑 黃芩各 黃連各 甘草二

人參一分 若若虛弱者用若參唐參 大棗三分

右以水三盞煎一盞半去滓煎一盞。加生姜四分。名生薑瀉心湯。湯ハ緩キカタナリ韓參唐參ヲ用ル時ハ緩キカタナレド直根ニテハ同シコトナリ傷寒ノ以ニテ三瀉心湯トモニ用ルトキハ人參甘草ノ指引ニヨツテ用ヒカタ有ベレ今痞ノ藥其外嘔逆積氣腹痛ナドニ用ル半夏瀉心湯ハヤハリ野人參ヲ用 儲此方ハ中氣不健レテ邪熱心下ニアツリ痞滯スルモノニ用ルナリ故ニ此方ハ熱ヲ瀉シ痞ヲ散サズル此方目當ハ心下痞スルト云フ的トスベシ心下痞レテ腹鳴リ或嘔シ或下利スルモノハ正面ノ場ナリサナクテモ心下ノ前後ニテ腹痛レ或サシコニ熱少レアルモ

ノニ用テ先^ツ上^ミラヒラカス又不食スルモハ多ク心下ニ痞スルヘナリ此湯
ヲ用ベシ是モ脉弱ク腹マワラカニテ不食スルモハ不用ナリ大抵ノ腹
痛積聚脉ニ少^カシ數アルモノニ用テヨシ痢疾裏急後重去テ後
調理ニモ用ルナリ^區多キモノハ生姜泻心湯ヲ用ベシ此方後世ノ
順氣和中湯ヲ用ル場ヘ即効アリ

三黄湯 方見血證

此方三味等分ニ成^イ大黄ヲ倍シテ水三盞ヲ以テ一盞ニ煎スル是
金匱ノ瀉心湯ナリ然レモ今世上專^ニヲ用ルハ麻沸湯ニテサ^レト煎
ジ用ルナリ^ハ擺^カ某同煎ナリ病人用ルニ氣味輕ク吞ヤスレ又

大黄ヲユルクト煎スレバ其効モ速^クナラサレハナリ又黄芩ヲ去テ大黄一棗
黄連五分ヲ麻沸湯ニテ煎ス即チ傷寒論大黄黄連瀉心湯ナリ傷
寒^ト誤^ク下^ク為^シニ痞スルモノニ用ルナリ三黄湯ト云トキハ三味等分麻沸
湯ニ煎スルナリ元來此方伊^イ尹^イ三黄湯倉公火齊湯ヨリ出タル方
ナリ然レモ其書ナケバ唯^タ如^ス斯^ノ言^ハ傳^ヘナリ^ハ岡^カ白^ク駒^ノ子^ノ史^キ記^キ載^ル
ニ三黄湯ノコトアリ何サモ古方中ノ古方ナルモノニシテ故ニ即効五
人ノ能^ク知^ルル處ナリ古來ヨリ降^ク火^ノ第^一方ナリ故ニ千金外臺ノ紫
雪ノ條下ニモ紫雪ノ効ヲイハントテ三黄湯十劑ニ勝ルトイヘリ^備
此藥ノ主治和劑局方三黄圓ノ主治ニテ考^ヘ合^セ用^ベシ上中下ノ

三焦積熱ヲ下スト云ガ目當ナリ三味等分ヲ蜜丸ナリ湯ニ比スレバ
其効和緩ナリ今ハ大方糊カクニテ丸マニ大黃モ倍シテ局方ノ圓マヨリモ
其効速ナリ然レモ局方蜜丸スミヤカ梧桐子大サ三十圓トアリ今テ糊丸
大黃ヲ倍ストイヘモ一度ニ三分五分ホドク用ルユヘ大抵功用同シ
カルベシ或近來散葉トシオウセウ黃鍾オウセウト名ケ古方家專ラ用ル其効甚
々速ナリ然レモ大黃性セツアレケレバ瀉下ノ功ナレ

○和劑局方主治云三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫
痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不寐飲食下焦有熱小便赤澀
大便秘結五臟俱熱即生痔瘡瘡瘍及治五般痔疾薰門腫痛或

下鮮血セツコノ局方ノ主治甚精セツ此意ヲ以テ積熱ヲ下スト云カ此藥
ノ目當ナリ辛熱厚味ヲ過食シ足脛痛モ此湯此丸ヲ用テ効
アリ濕毒家カニモ兼用ユルコトアリ審察シテ用ベシ

積聚

積聚ノ治法寒積熱積血積ヲ能辨別シテ療治スベシ諸病人ノ虛實ヲ
見合スルカ肝要ナリ虛人ノ積カク攻カク擊カクナリカクシ實人ノ積カクトイヘモ根
治ハナリ難シ或積サシカク發カクテハ藥食トモニ受カク入カク又モノナリサレモ時カクアツテ
フクノ食ヲ受レバムサト死スルモノナリ此證灸治ヲ專ニスヘシ瘡滿積
聚ノ二病治法灸炳カクヲ以テ主トスベシ後藤子ノ點法カクナド別シテ大功

積聚

申

アリ○此モ心下へサレコムニハ半夏瀉心湯ヨシ痛甚シク熱アルモノニハ三黄瀉心湯ヲ用ベシ又左へサレコムハ肝積ナリ小柴胡湯加青皮芍薬ナリ熱輕シテ積モ甚シクナリ左ニ動悸アルモノ柴桂湯ヨシ右ノ方へサレコムハ治レカタクモノナリ是ハ多クハ食積ナリ枳實厚朴ハ藥ヲ用ヘシ大便秘スルモノハ厚朴七物湯或瀉脾湯ヲ用ベシ又腹脹リ或左右ニ積アリテ全体脹ノ弱キモノニ寛中湯ヨシ建中湯加枳實厚朴モノナリ又臍上積動シ氣強ククワツクト氣ノボルモノニ瀉脾湯加龍骨牡蛎尤ヨシ又積ニテ腹強甚シク臍ノ上左右ノアタリ形アリテムクモチアグル如クニ嚴シク痛モノコレ大建中湯ノ證ナリ又臍

下ニテ痛ミ男子ハ疝氣女子ハ瘀血ノモノ多シ疝氣ニ建中湯加吳茱萸又熱アラハ小柴胡湯加吳茱萸川烏頭山梔用ベシ疝ハ臍下ヨリ腰へカケテ痛モノナリ或陰囊へサレコムモアリ婦人ノ瘀血ニテ小腹痛ハ桂枝茯苓湯加大黃用ヘシ甚シキモノハ抵當丸ヲ用ヘシ物惣シテ積ノ調理ニ建中湯ヲ用テ氣血ヲ和スベシ建中湯ノ證ハ腹筋バリ痛ムナリ建中湯ハ急迫ノ氣ヲ緩ムルナリ此意ヲ以テ考ヘ用ヘシ全体脹グサレシテ無カソノ内ニコカレコニ凝アルモノハ建中湯ニテ和スレバヨシ以上古方家ノ治法ナリ又後世ニテノ積ノ治法ハ青皮肝積留滯ノ氣ヲ推シ破ル莪朮ハ血積ヲ破ル三稜ハ莪朮ヨリハ積ヲ破ルト強ク血中

後世家ノ治法

申

ノ氣積ヲ破ルナリ 今、茶肆通用、三稜、偽物也、格別非、攻撃、茶 不換金如青皮枳實諸積用
ルナリ痛ニ加木香、又左ヘサレコニ有熱ニ六君子湯加柴胡青皮芍藥
後調理ニ逍遙散如青皮香附用ルナリ又積甚痛煩悶スルモノニ熱ナ
ケレバ大七氣湯ヲ用エ熱甚シキモノハ柴平湯ヲ用エ此皆古來ヨリア
リ觸タル治方ナリ古方後世ノ治法トモ二人ノ虛實病ノ淺深ヲ考テ
用ベシ其内人壯邪實者古方ヲ用ベシ病モサホドニ劇シクモナイ人モ
アツリ丈夫ニモナク先ツ古來ヨリアリフレタル治法ヲ用ヒソレニテヨ
クハ重疊ノコト行キ過タル治方ハ必スヘカラス病人ヲナフリモノニスル
ト云モノナリ夫トモ古方手ニ入り虚實ノ决断タレカニサヘアラハ茶ノ

キ、メハ單方ユヘ古方ニアリテ汗下ノ劑ハ其速ナリ然レモ婦人小
兒ノ外茶嫌ヒノモノハ多クハ香カヌルモノナリ作器アルベキコトナリ一
擲ニ後世方ヲ古方家カラ奴隸ノゴトクイヘモ宋明ノ医モ皆ガ皆迄
下手ハカリモアルニ昔時日本ノ老醫宋明ノ書ヲ專ラ用テ妙手
多シ衆方規矩ニ瘡ノ發ル時刻ニヨリテ大柴胡桃仁養氣大養氣ヲ
用ル差別アリ此治方ハ却テ金匱ノ瘡門ニナシ宋明ノ後世ノ医ノ使
ヒ覺ト見ユルナリ又土茯苓ユウタンフクジヤ熱膽ネンタン蝮蛇ブツサ生漆等ノ茶金匱モ組合タテ方モ
見ヘ子匠古方家使ヒ覺ナリ兎角後世ノ方書ニテモ儒門事親トハ取リ
用テ聊補虚ノ事ヲ云ヘル方書ハ取ラズ此題言ニ迷ル如ク長沙氏ノ

本草綱目

申

六十二

古方ヲ用ルト云ハ是專ラ寒茶瀉茶ノミヲ主トスル流ニシテ昔時丹
水翁ノ温茶補茶ノミヲ主トスル流ト背腹ニシテ兩流合セバ偏見ノ弊
ナナルヘキ乎

三黃瀉心湯 見血證

小柴胡湯 見傷寒

柴桂湯 見傷寒

厚朴七物湯 金匱云病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故此湯主之

厚朴半斤 甘草二兩 大黃三兩 枳實五枚 桂枝二兩 生姜五兩

右水煎○此古ハ表證ヲ帶テ腹滿硬痛ヲ用ルカ先ツ主方ト見

ヘタリ或食傷ニモ外邪ヲ兼タルニ用テニレ此皆腹滿ヲ目當トシテ用
ルナリ古方家藿香正氣散ノ功ニ用テ外邪ニ食滯ヲ兼タルモノニ
用ルナリ然レハ藿香正氣散ノ證ハ格別腹滿硬痛スル證ニモアラズ
委細感冒門ニ云如シ右ノ輕證ニ厚朴七物湯ハ病ヨリ葉ガギヤ
ウサシニコソアレ金匱要畧ニ藿香正氣散ノ代ニナリクウナル古方ハ
ナシ無理ニ厚朴七物湯ヲ擬フヤウニナリシモノナリ是ニ於テ古方
バカリニテモ不自由ナリ能々了簡アツテ考ヘキナリ

瀉脾湯・積通用或臍上積動悸強上逆方中人參直根參也

茯苓 厚朴各七分 半夏 桂枝 生姜各五分 黃芩 甘草各五分 人參三分

右八味以水三合煎一合半常用加龍骨牡蛎各七合或加石膏

○千金翼方方ナリ古方家專用テ積氣動悸ヲ治ス

寘中湯 腹脹或積在左右全射腹弱者主之

即建中湯去飴加枳實厚朴 兼疝者加茴香吳茱

大建中湯 心膈中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有

頭足上下痛而不可觸近此湯主之

蜀椒二合 乾薑四兩 人參二兩 直根或韓參各

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半

冷溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫再服之

桂枝茯苓湯

桂枝 茯苓 牡丹 桃人 芍藥各等分

右水煎○或加大黃減半○五味細末蜜丸常用湯劑亦佳○婦

人產後一切瘀血結證用之○古方家產後二世間龍王湯撰

藥ヲ用ル場へ加大黃用ルナリ或肉桂延胡索ナト云場ニ用也

抵當丸

大黃三錢 桃仁五錢 蟅蟲 水蛭各六

右四味各別杵篩合和煉蜜丸為四丸以酒合煮一丸取八夕日二服

茯苓桂枝甘草大棗湯 治發汗後臍下悸者欲作賁豚

茯苓 八分 甘草 二分 大棗 四分 桂枝 四分

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓
溫服一升日三服 甘爛水法 見金匱 ○此方積衝上甘或痛或拘急スル

モ尋常ノ某ニテ効ナク勞ノ如ク荏苒トノ形容最ハ食タトキ
ハ腹脹リ或手足拘攣シテ立ツコトアタハズ一兩年モレモツレタハモニ

此甘味ノ煎湯ニテ大効アリ甘草急迫ヲ治スルニナリ建中湯ニ
テ無効ニ此湯ニテ即効アルト多シ某汁甘ク吞カヌルモノハ將酒ノ

類ニテモ先嘗テ某ヲ用ベシ一兩日モ吞ナレトキハ後ハ何ノ障リモ
ナク能吞ムモノナリ予此湯一病人二年余ニテ積勞ヲ治タリ

此平陽 積塊屬熱者宜清化也此方主之

柴胡 黃芩 半夏 蒼朮 厚朴 陳皮

青皮 枳殼 神麴 山楂 莪朮 甘草

右姜朮水煎○或加真三稜 自可採之某肆 通用者偽物也

大七氣湯 治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作者時心腹疼痛

上氣窒塞小腹脹滿大小便不利者

三稜 莪朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香

香附 益智 肉桂 各一兩半 甘草 七錢半

右水煎○加大黃枳榔治諸般痞積面黃肌瘦四肢無力皆緣內

有虫積也。○戴元禮治五積加減之法在衆方規矩大成悉
 ○嚴用和力濟生方大七氣湯三戴元禮力五藏三積加減アリ證
 治要訣ニ詳ナリ此五藏ノリニツキ予カ先人内經一見識ノ發端ノ辨
 拳ルナリ近來内經ハ偽書トノ一向不信用ナリ夫素問ノ名ハ仲景傷
 寒論自序ニ素問九卷ハ十一難ト云ニ始ル定テ其前ヨリアル名ナルダ
 レトモイツカ始ト云コトハ知レヌ靈樞八鍼經トモ云古書ニ黄帝鍼經
 トルカスナハチ靈樞ノト正シク靈樞ノ名ハ唐王氷ガ次詳ノ序ニ漢
 各藝文志ヲ引テ素問九卷靈樞九卷トアル緒此ニ書ヲ合セテ内
 經ト云ハ藝文志ニ黃帝内經十八卷トアル儒者力素問ハ内經ト

稱スルハ過分ノ名ナリト叱レトモコレモイラヌ穿鑿ナリ 医者ノ口
 カラソウ云ニイモノテナレ内經ノ内經タル所ハサヤクノ無益ナ名セシサリ
 デナシ先ツ緒思テ見ヨ人カ生レナカラ知ルモノテナイ耳 鼻口頭
 面手足ナドハオノレトシリモセウカ腹中ニアルモノハドレカ藏ヤラ府ヤ
 ラ聖人ノ教ナラテハ知レヌナリ唯今ラヌトバカリ意得テイレバ魚鳥ノ
 ハラワタヲ見ルモ同前ナリコレラハタカラ内經ノ教ガ無テモソレホ
 ハ知レウナモノトイヘドモ中々ウテナイヤスイコト素問五藏別論ニ
 方士ガ説ニ頭腦骨髓腸胃ヲ藏ト云トアルヲ黃帝モ不審シ王ト岐
 伯ニタツ子玉ヒシニ岐伯ノイヤクソウテナヒト精ノ辨ノ再ヒ異論ノ

ニ文々句々如金玉トアルハ主張スルト云モノカウ云訣カラ註家ノ説
テ反テ内經ハスニヌコニナルナリ讀メヌ手紙ヲ無理ニ讀テスニ
ト同ジコトスニヌコハ闕疑シテオイタカヨイ又スニハスメヒスニテカラ
合点ノイカヌ者ガアルコレモ闕疑スベシ闕疑ノ二字ハ論語ニ出テ
書ヲ見ルツノ意得ナリ此書ノ所詮ハ前ニ云ヤウニ平人ト病人トノ
ニツラ云平人ハ生レツキ自然ノ先天ノ沙汰カラ後天ノ沙汰ミテ詳ニ
云テアルソレガ病ムトキハ外六淫ノ邪ニ感ジ内七情ノ傷ニヨル訣ヲ内
外詳ニ説テアルコレヲ病人ト云此ニツラ説テアルニ理ニ於テ當然クニ
モフウアルコトモアリ又理屈ハアリテカラ實ノタメサヌコトモアルソレ後

世ノ牽合附會ノ説トニエル理屈ハキコヘテモタメサヌカハ違カアリ
モノタトハハ夏涼キ家ハ冬ハ暖ナモノ是ニ大抵チカイハナケレト間
ニハ夏涼ク冬ニ寒キ家カアルモノ上トクトフルニワサキカラ
餅ハキラヒト合点スレド間ニニツナガラ好物ガアリ此各ヲ見ルニ
ハ理モ實モ具タコトアリ理ハアリナガラ實ノナイモノモアリ是ヲ
見分ルガ肝要ナリ又問答ノ發端ハオヒタレキコトニテ医術全体ヘ
カルヤウナレト其下ノ問答ヲ見バソレホトナコトテハナレ是レ理モ
實モアリナガラ古代ノ書ハトレモ此ヤウナモノナリハレノヨリ此
書ヲ作ラント云合点ハナイ一坐ノ問答ヲ記録シタモノユヘ首尾ノ

ソロハヌコトカアルニ篇ノ名モ後世ノ人カ付タモノ其並ビマウノ次
弟モ金元起カ太素ノ本ト王氷ガ次註トハ違フ是モ王氷ガ了
簡テヨイマウニ移シカヘタモノ深キレサイハナレ借此書テ療治ノ
タニツテハ鍼ノ療治カ專ニ云テアル是ヨリ先キズンド上代ハ
移精寢氣ノ術ト云テマシヒノマウナコトテ病カナオル此書ノ
時分ハ鍼療治カ專ナリ此合点テニ云モノハ内經ハ療治ニハ遠キ
書ノマウニ云ヘトモソウテナク鍼ノ療治ハ隨分手近ニ云テアル其ノ
病ハ某ノ穴ヲ刺セトチカニ云テアル是ヨリ手近ナ云ヒマウハナレ
仲景ノ時分カラ某方ノ療治カ專ラナリ内經ノ時分ニ某方

ノ療治カ專ラ行ルハナラバ藥方モ手近ニ云テアルハズナリ然ルニ
鍼ノ療治專ラ行ルト云ヘ此時ノ刺法ハ今ハ絶テナレ張子和ガ久
瘧ノ病人ニ十本ノ指ノサキカラ血ヲトリテ愈シタトアルハ珍シキコ
トノマウニ云テアル内經ノ時分ハオレナメ此マウナ療治ヲシタト見
ユルサレ内經ノ時分ニヤト云テモ鍼ノ療治ハカリデモナレ少シク
某方ノ療治モ其外イロクナ療治ガアル後世デモ某方ノ療治ハ
カリデモナレ間々ニハ鍼灸ノ療治モ世子ハナラヌナリ是レ内經全篇
ヘアツカレ大意ヲ述ルナリ此合点ナレニ内經ヲ見レバサレタリ治瘧
タメニナラヌ書ノマウニ思ヒ偽書ナリトノ一向ニ捨ルヤウニモ近來ハナリ

タリ然レ居今日五藏ノ名目ハ何レノ書カラ云ヒタシタルナラゾヤ仲景
ノ金匱要畧ノ開卷ニモ藏府經絡先後第一ト心肝脾肺腎ノ名目
ハ仲景モ内經ヨリ五藏ノ名ハ出し玉ヘルニアラスヤ又近來周禮ヲ據トメ
九藏ノ説アリ此五藏ニ膽胃大腸膀胱ノ府ヲ合メ九藏トシ小腸ノ府
ナシト云ヘリ古來ヨリ大腸小腸ノ府トハ白ノ上曰下白ノ如クニ其
間ニ白ノ心木ノ如キ處ニ闌門ト云テ水穀ヲ泌別スルト云ヘリ金匱要
畧五藏風寒積聚病ノ條ニ大腸有寒者多務鳥溇有熱者便腸
垢小腸有寒者其人下重便血有熱者心疝ト云ヘリ今小腸ナシト
ハ仲景ノ言モ妄ナラシカ此コト代水ノ外科伊良子見道齋ガ官府ニ

ヒテ自斷罪ノ者ノ腹ヲ割キクハシク見テ大腸小腸一府ニシテ
上下ニカサナリ其間ニ闌門アルコトヲ自ラ解テ見タリ近來内
經ノ説ヲヤブラントシテ医書ニテモナキタマニ周禮ニ九藏ノ説
アルヲ以テ内經ヲ破ラントスルトモ古方家ノタツトフ仲景ノ書ニ小
腸アリ但シ云ガハリニナリテハ仲景トモニ撃テ取ル乎此等ノ
コトオモヒマリテ見ルベシ胡乱ニ素靈ヲ偽書トスルモノハ自ラ
見解ノ不足ナリ戴元禮ガ五藏ノ五積ノ加減ニツイテ素靈ノ
用捨ヲ次手ニ記スモノナリ

○本邦老醫ノ傳ニ乱世ニハ肝膽ノ氣鬱スルコトスクナレ治せ

皆肝膽ノ氣射スルナリ故ニ熊胆ヲ用テ開其前肝膽ノ氣ヲ
達セシムルナリ治世ニ積氣ノ病多キハ肝膽ノ氣鬱スルニヨッ
テナリ

○又傳ニ背肉ニ行通りノ穴所ヲオスニ上ヨリ下ニ通りテ任脈ノ
如キ脈道連リアリツレヲ外ニスルヤフニ陷没ノ所ヲ求テ点スベシ或ハ
其人ニヨリ其上ニ点スルコトモアリ又其外ニ点スルコトモアリ是始
ニ灸ノ其アタリ凝血^{ヤウク}テキテヨリアレバヤハリ其所ヲヨケテ点ス
畢竟腹内ニ徹セシコトヲ願ヘバナリ其所ノ陷没ト云モコレ少シ
ニテモヒクケレバ腹へ徹スルコトヨケレバナリ

○又傳ニ狂ノ下地ニテ安ニ恐惶^{クワウ}シ人ヲ見ルコトヲ惡ミ一室ニテ
リ半年モ後ヤウヤク其氣味止ミテ手足拘攣^{コウレン}シ舌コハリ言語
難澁^{ナンゼツ}ス其心下板ノ如ク積氣ノ勢甚シスナハチ北月ニ灸セシメ熊胆
ヲ用ヒ是ニヨリ其證大半緩クナリタリ物体半途ニ至テ拘攣^{コウレン}
ノ證ヲアラハシテハモハヤ狂トハナラズ其治モ易シ唯狂トナル外ニ
何ノ苦ミモナク偏ニ積氣内ヲ攻テ心コレガ為ニ其職ヲ失フユヘニ治シ
ガタシ半バニ外へ出タルモノハモハヤ狂トナルコト少シ
○中氣ノキザレアル病人ニ速ニ灸セシムベシ是腹氣不和ナルコト甚シソコへ食
傷トスルト其ニ中氣ヲ發ス故ニ灸ニテ其不和ヲ和セシムルヤウニスベシ然

ル下部不足陰虛ヲ兼テ中氣ノキザレアルモノ灸シテ倍々真陰ヲ純シ
中氣トナルコトアリ意得ベシ是ニ灸治斟酌スベシ何レ既ニ灸メハ陶器
ニヒシレ入タル如シ本ニ復スルコト難シ豫防グベシ

○積氣ノ患アリテ后時疫ニ感ノ熱甚ク讒語ナトアツテ其氣ヨホ
ドツカレタルト三邪モ大方ニ解ストイヘアト連綿タリ是レ積氣心下衝
テ大便秘スシ六七日因テ服某ヲ止メ餌食ヲナサシム后大便通シ日ヲ逐テ
快復ス此病人第一大便秘スルト云ガ大幸ナリ秘ル者ハアメリ元氣ノツカレ
ナキモノナリ

○痞ハ塞ナリ鬱塞ノ意シカワリト形不成メ氣ノ聚ヲ云是カワリク飛テ

積トナル痞ハ積ノ下地ナリ痞ハ天地不口ノ意ナリ鬱滯滯壅窒碍結
ノ七字痞ノ義冬ク苦辛ノ某ヲ用テ可ナリ

○積聚古ハ分チアリトイヘ凡分チナキモ可ナリ臟腑ノ間ニ垢カタミルモ
ノナリツロクト氣聚リ凝結スルナリ裏面ノ内分ヘカルナリ

○積陰温メメクラサレバナラス故灸火ノ陽氣ヲ借テス六消化スルナリ難
經五積ノ事形是ニ不限仲景ノ奔豚ト云ハ下カラ直ニ升ルモノヲ通ノ云
婦人血塊ハ經閉ナリ是ニ芍歸湯ニ紅花桂或氣劑ニ紅花芍歸ヲ加テ
用ヒ可ナリ甘草木ノ類不可用又燥屎ト積氣ト見認ルテアリコレハ
クルクトシテ手ニテ按テ大抵シル、モノナリ下焦ニアルノ三ニアラス上

中焦へモ升ルナリ

○痰ハ津液ヲ化スル処ナリ惣ノ痰ト云ハ津液ノ化スルナリ津液凝結
ノ皮膚ノ間ニアラハ腫物ヲナス所謂氣腫ナドノ如シウチ咽喉ノ間
ニ壅閉シテ流行シカタキ時ハ痰トナル皆積氣カラ塞ギ元氣ノ流行
不順ナレバナリ中ニ結トコオルトキハ痰カ積氣カニナルステ流行
アレキカラナリ凡臓腑ニハ毛ノ孔ノ如キモノアリテ津液ヲハコブ
舌ノ孔ヲ以テ知ベシ

○膈證鼓脹ト其因同レトナリ初ハ同シヤナルモチリ先初臍下ニ
浮腫アリテツレカ漸々ニ張出スト鼓脹ニテリ次第ニ背へツクト膈ニ他

ナリ灸三四ヨリ十二ニテノ脊際ニ數万ノ灸スルガ宜キナリサテ
アラキノ類用ル宜ナリアラキハ燒酎ノ類ナリ

○鼓脹ノ脹ツヨキハ腹ニ青筋テキルモノナリ是ハ水氣ニテ推出スナリ
先ハ腹バカリトイヘ庄手足へモ少々浮腫アルモノナリ

○勞氣ヲ患ヒ腹中瀉レ易ク食モ中枕ニツホドナラテハ食ス是積氣脾
胃ヲ妨ゲスホムナリ此證ニ瀉多キハ疝氣下リニ同レ是ニ赤蛙ヲ用テ治
ス然ハ赤蛙ハ小兒ノミ治スルニアラス鰻魚ヲ用ルニ瀉アルニ能ク
タルヲ用テヨシ

○凡餌食ノ鳥類ハ雞鶴ヨシ野雞ハ其性人ニ宜シカラス水鳥ハ鴨鷺ノ

五禽書ノ下

申

七十四

類、常々食ノ害ナシ病人食ハ大便ヲユルクス是其、鳥皆便ユルレ其餘推シ
 ○虚勞ノ證腹ヲ按スル心下ヨリ臍ニテ任脈ノ手ニ當ルハ皆底ニ氣ガ
 聚テ脈ヲハルナリサナキハ沉テアルナリ老人ナドノ脱肉レテ死ニ近ク
 心下陰部ニテ任脈上ハハリ出ルモノアリ是死ニ近キ證ナリ又按腹シ
 テ心下任脈ノ左右引ハツタルハヨキナリ弱キ腹ハ此、ヒツハリナキナリ
 ○虚冷ノ人唇ノ血色耳輪乾キカシケタルハ救ヒ難シ此、兩虚見ハ救ル
 者多シ又虚浮ノ者脱肉セザルヤウニニユル心ヲ付テ見ルベシ世間ノ人コレヲ
 以テ脱肉トハ思ハヌナリ先ニ所ハ背部ナリ病人效スルカ或ハ喘レナド
 氣逆スル度ニ背陷出テ氣動ク因テ脱肉ノ所ニユルナリ虚浮ハ只

ノミハツテアルモノニテ元氣ヨク令然、ヒノニアラス
 ○勞證ノ脈細數ナルモノ和平ニナルニ必死ニ近キナリ焚レモ脈和ノ其、
 死スト云ニハアラズニ三五七日ノ間ニ死スルナリ

○虚冷ノ人大便泻利止スヨキホトニテ一日ニ度通スト云モ安心ナラス
 モノナリサアル者ハ后ニハベタクト泻スルモノナリ只秘結ノ三日ニ度ニ

日ニ度便スル方ヨシ
 ○音聲ヲ奪ニスル人吐血スルモノ多シ常ニ吐血脈ス、ムモノナリ今、此ハ脈

不進或ス、ムモアリ眞吐血ニ不進モアリ凡、風邪愈ハ難ク愈テモ又、
 ク發スルアリ是、風劑ヲ多服スベカラズ只温散ノ某ヨシ温散ハ氣ヲ

申 七十五

順スル故ニ久用ルモ可ナリ

○痔下血ノ者諸^モ失血ノ後未復^テ風寒ノ邪ニ中ル者多ク勞トナル邪ニ
アタラサレ^テコチケテ身中ノグワイアレクナルエニ勞火動トナルナリ
○瘡毒ニ脉進^ト遲鈍ナルトアリ兎角瘡毒六脉スニテモ效アリテモ
思ノ外肉脱セ^テモノナリサテ大便秘小便淋瀝スルナリ勞證ニ小便ノ
コル^トハアレ^レ淋瀝スル^トナキナリ瘡毒ノ大便瀉スレバ末ニアル^トニレテ
是ハムツカレキナリ又瘡毒ノ眼ニ入ルモノ其始頭痛ヨリ仕ザルハナレ
○痢疾ニ^御鯨^ノ鱈^ヲ用ル^ト通^ノ用^カタレ^レ凡^テ生^{ナル}物^ハ惡^シ者^燒人
物^ハ肉^ニテ^コナレ^バス^レ茶^良膏^ノ香^ノ物^ヲモ^不用^ヨレ^痢ノ^ニニ^不限^諸病

皆同レ丸^ノ鯨^魚ヲ^可用^痢ハ^疎條^スベ^シ證^ノリ^補劑^ヲ用^ル南^ニ禁^スヘ^レ
○本邦名匠中斐德本子梅花無盡藏云

△寶丹

- | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 白豆蔻 ^一 | 辰砂 ^{一分} | 乳香 ^一 | 麝香 ^一 | 丁子 ^一 | 白姜 ^一 |
| 菴香 ^{青葉} | 水銀 ^半 | 黑鉛 ^一 | 龍腦 ^分 | 附子 ^分 | 金箔 ^{三百} |
| 全蝎 ^二 | 革澄茄 ^{一分} | 真珠 ^分 | 人參 ^{一分} | 肉桂 ^分 | 川烏頭 ^二 |
| 麻仁 ^分 | 烏蛇 ^分 | 當歸 ^分 | 沈香 ^分 | | |
- 以上二十二味以生蜜煉
- △玉丹 瀉下ノ丸藥ナリ諸病ニ用

巴豆燒 代赭石燒 胡椒三 丁子半 人參分 大黃分
 白朮分 辰砂分 桔梗分 天麻分 南星分 樗榔分
 赤石脂分 鬱金分 芒硝分 大戟分 射干分 牽牛分
 右十八味以生蜜煉以水一度一五合用之
 玉丹用ヒ多口訣

欲用玉丹使病者厚衣足袋鉢ハチ寒而后可投之雖大暑時身冷寒
 以一度一錢半為十五丸衣葛粉以新汲水ハチ吞之必勿中齒不
 然則破口中若服後覺吐氣以生米少炒二三粒可食之如是則
 吐氣必止可進ハチ也且禁食氣故新則可建之

○寶丹 諸病常々可用之空丹玉丹ヲ用ルト徳本ハ自由自在
 ニセトナリ病證ニヨリ用マウノ分量ニ甚又勅辨ハチアルトナリ此
 意味肝要ニテ粗ソコエニテ難及トナリト云レントナリ又空丹ハ何病ニ
 テモ常ニ用テ吉病入ヲ見テハ寶丹ヲ用コトイワレントナリ按スルニ此
 書ノ極意諸病ニ玉丹ヲ以テ泻下レ寶丹ヲ以テ補ヘト云ノ治法ナリ
 ニカトモニ効アルベキ奇藥ナリ

○同書云 三聖湯 大寒 黃連 黃芩 大黃分 芒硝分
 乾姜・肉桂各 甘草 右煎服 ○二聖湯 中寒
 黃連 黃芩 山梔各 黃蘗中 柴胡中 肉桂小 白朮小 茯苓小

甘草 右姜炙 ○小白散小寒 地骨皮大 黄柏大

知母大 升麻中 山梔中 肉桂小 白朮中 柴胡小 甘草 右煎

○升氣湯大 附子中 乾姜中 木香中 良姜大 白朮大

肉桂小 藿香大 甘草 右煎服 ○藿香湯中 熟 乾姜大

白朮小 肉桂小 藿香大 川芎中 白芷中 甘草 右煎服

○白朮散小 發 人參中 黄耆中 白朮大 茯苓大 藿香大

肉桂大 茯苓大 甘草小 右煎服

按右六方大寒大熱ノ藥ノ大中小ヲ三段ニ分テ諸病ノ寒證ト熱證トニ用ユ手取早キ治方アリ九諸病イロクアリト云ハ臣某齊

寒熱ニツル、コナレ其外此梅花魚尾藏ニ九散煎湯アリ然レ臣等ニ

通例ト違タ方ナリ尺ク右ノ書ヲ理會スルトキハ右ノ一流ニモナルベシ

然レ臣未熟ノ者ハ得ト斟酌差畧ナケレバ亦誤ル丁多カラ臣等

ノミラ以テスレバ妙茶醫師ノ如クナルベシ徳本子ハ自ラ數年經驗ノ

工夫ツモリテ未熟粗工ノ及フベキニアラス今此玉丹寶丹寒熱

ノ六方ヲ意ヲ以テ此流ノ極意ヲ知ル丁銘々ノ了簡ニアルベキコ

乎玉丹ハ近來紫圓ヲ以テ諸病ヲ瀉下スル治方ニ近シトイトモ

其方多味ニメ用ヒヤツニ法アリ又寶丹モ并用テ補フナリ一瀉瀉

下スルバカリニアラス寒熱ノ六法ニテ補瀉ノ緩急ヲ知ベシ

右件本邦老医ノ傳此門ノ積聚ノ病ニ不關ナリト云ハ凡當流ノ意得ニナルト多クレバ記スモノナリ

水腫

水腫ノ病因甚多故ニ治法モ亦多端ナリ諸方書ヲ熟覽スベシ此病ノ治法急ニ治スルト緩ク效ヲ取トノニツノ分別ガ大事ナリ病人ヲ請取ハシメニ此思案ヲ定ムベシ暴ニ得ル證ハ急ニ治シテモ効アリイツトナク腫滿ノ證ニテリタル緩ク療治セザバ効ナレ水道ヲ通シ小便ヲ利スルガサシメテ療治ナレ直ニ小便ヲ通スルヤウニスルヨリ小便ノ不通本心ヲ付テ療治スルガ醫者ニ拙ナル処ナリ陰水陽水氣血

ノ辨博群書ニ求ベシ脈ノ浮沉肝要ナレ凡腕カ大キニ腫レバ浮ナル脈ニ沉ニナルコトアリフレニ脈ヲ審ニ考ベシ此證ノ不治ハ群書ニイヘシコトシツレガ一ツアツテモ難治ト意得ベシニツモ三ツミアレバ七ハ不治ノ證ナリ腫滿ノ病塩ヲ食スルヲ甚々忌ム然レ凡一向斷ハ食事ノ進メマウカナイ此等カ醫者ノ見計ヒ肝要ナリ

○陽水ハ飲食或濕邪脾胃ニ停滯シ或氣ノ鬱滯ニヨツテ發ス其證小便赤淡或大便結スルモノナリ脈數ニシテカアリ腫モ皆才モテ通り陽經ナリ是ヲ推ニクボムトイヘ凡カアリ或渴スルモノアリ先腹堅クシテ後手足腫ルナリ皆脾胃ニ濕邪停滯スルモノナリ故ニ

夕、中焦ヲスカスカヨレ厚朴猪苓澤瀉木通等ノ通葉ヲ用ベシ安
リニ大黃刮ハフシ水腫濕邪ヲ受テ腫レテ足ナド痛ムモアリ或
脚氣腫満足腫ル、モノ或風水トテ風邪ニテ偏身ハル、アリコトク
越婢湯ヲ用ベシ食積停滯、厚朴七物湯心下痞シテ腫ル、モノハ
半夏瀉心湯又氣ニテ腫ル、モノハ多クハ上ニ多シ腫ラ推テ見レハ
堅クシテ手ニ隨テ起ル上ニ多キモノハ蘘子湯小檗湯ナドヲ用ヘ
レ免角腫レハ通葉ニテハ通シガタク何ゾ然ルエエンアツテ腫レルナリ
蘘子湯、證ハ上ニ腫氣アリテ脊ナドカタクコリ面ハル、コト多シ
下赤、實ノ證ナリ下ニ腫多キモノハ越婢湯ヨレ腹ニ多キモノハ

桃花湯ニテ下スベシ婦人小腹ニ塊アツテソレヨリ腫ラテスモノハ抵當湯
或桃仁承氣湯ヲ用ベシ○陰水ノモノハ咽渴セズ小便少シトイヘモ甚ク
淡ラス大便結セズ或病後久瀉ノ後腫レヲナス其腫ラ推ニクサリ
タル瓜ヲ袋ノ内ニ入レテオスコトクアチラヘオセバ大ヒニクホシテベツタ
リトナリコチラヘオセバ又ベツタリトナリ早速モトノ如クオシタルア
アガラス是脾腎不足ニ屬スルナリハ味丸或真武湯或附子理中湯
ナドヲ用ルナリ長病ニテ少シニテモ足ノ甲ハル、モノハ不治ナリ陰
水ハ多クハ不治、モノナリ後世ニテ用レバ陽水ニハ藿香正氣散加猪
苓澤瀉或回春實脾飲又ハ胃苓湯ノ類ヲ用ルナリ又一方ニ白朮

醫方類聚

申 二八十一

茯苓陳皮厚朴交胸山柘猪苓沢瀉右ハ味水煎此方ハ腹脹腫氣
アルモノニ通ソ用ルナリ夏月湿邪停滯ヨリ腫レナスモノ多シ右ノ正
氣散胃苓湯ヨシ腹堅ク凝テ腫アルモノニ實脾飲ヨシ此方食積多
シ湿邪停滯ラ小便ニ通スルナリ後世陰水ニ赤水壯原湯或附子理
中湯加肉桂茯苓用ルナリ又ハ補中益氣湯合五苓散用ルナリ又脾腎
不足ヨリシテ脹ハリ小腹腫レ滿テコレヲ推ニ弱ク是ハ陰虛ニ多シ
金匱腎氣丸尤ヨシ或氣腫ノモノ後世ニテハ分心氣飲又ハ分氣補
心湯ナトテ用ユ或導水茯苓湯ヲモ用ルナリ食物ニ中鯉ヲヤ
ハリ味噌汁ニ煮テ食スルモヨシ

越婢湯

方見短氣 此方ハ脚氣腫滿ノ主方先ツ足腫レ痺レルモノニ

第一用テヨシ或痛風ニテ偏身コカレコ大キニ痛ク用テヨシ或ハ
カク足ノ腫ヲ目當トシ用ルナリ日久レクシテ腫レメグリ兼ルモノ
ハ加附子惡風ニ加トアレモソレニ不限脈ニアマリ發ニヘズ少シ下
指先ツメタキ氣味アルト云ヤウナメクリノ又ルキモノニ附子ヲ見合
セテ加ベシ

厚朴七物湯 方見積聚

半夏瀉心湯 方見痞滿

藶子湯 方見脚氣

小檗柳湯 全

桃花湯 婦人産後因瘀血腫者其人實者即効

桃花陰干一錢或二錢 右一味水煎

桃仁承氣湯 中焦畜血ノ證ニ用ルナリ脈數ニシテ咽渴キ小便

頻數ニテ腹カタク塊ノ如クナルモノアルハ畜血ノ證ナリツレテ故ナ

クシテ湯水ヲ好ム腫物ノ催^{モヨイ}ント知ルベシ 方見傷寒

抵當湯 抵當丸ヲ湯劑トスルナリ 方見積聚

八味丸 方畧

真武湯 方見傷寒

實脾飲 腫脹一應之初起輕證通用

蒼朮 白朮 厚朴 枳殼 陳皮 茯苓 砂仁 木香

香附 猪苓 澤瀉 大腹皮

右生姜燈草水煎 友松子云此方飲食ニ所傷ニ用テ腫ル者ヲ治

ス或胸滿或愛^{アイ}氣或泄下者用之鼓^{ツミ}ノ悸ニ應スル如シ或不服水土シテ腫

ノ加藿佳香間亦奇ヲ得タリ若シ氣虛血虛ノ腫モ此方中ニ於テ人

參芍茶當飯ヲ加トイヘ^{アニヨクナサン}豈能濟事ヤ學者臨病酌量斯可也コ

レ回春ノ加減ヲ見レバ一切ノ水腫ヲ治スル合点ニ北山翁如斯辨セリ

壯原湯 治下焦虛寒中滿腫脹小水不利上氣喘急陰囊兩腿皆腫

或面有浮氣

人參 白朮 茯苓 破故紙 肉桂 附子 乾姜

砂仁各五 陳皮各七

右水煎食遠眼。○有痰加半夏一錢。○喉中痰声加桑白皮一錢。效亦加。○脚踏面腫加薏苡二錢。○中氣不轉運不知餓加木香厚朴。○氣鬱不舒加沉香烏茶臨服磨入。○氣虛甚入參加作五錢。大附子加作一錢半。○汗多再加桂枝五分。白芍藥炒過八分。○夏月喘乏無力或汗多加麥門冬一錢五味子十一粒。○夜夢不安者加遠志一錢。○兩脇氣硬加白芥子八分。○面浮腫脇下氣硬加白芥子蕪子五分。○身重不能轉動加蒼朮澤瀉七分。○濕盛加桑白皮赤小豆。○一法用此湯為散。四君子湯加木香燈

心類送下。○此方參朮ヲ用ル大茯苓破故紙ヲ用ル中桂附乾姜砂仁陳皮ヲ用ル小ナリ此間分量進退意味アルベシ方ヲ制スル意未知上云ヘモ純ラ中下焦ヲ温補スルニ於テ此外ニ可用藥ナレ破故紙縮砂ノ二味意ヲ付ヘレ一方ノ趣向本方ヲ質トシシカク加味ノ働ヲ以テ効ヲ取ル合点ト三々リ故ニ加味スヘシ加減ノ方後ニ散藥ニ用ル本邦老臣ノ傳ナリ傳者云破故紙ノ香ヲ忌ムト云ヘリ愚思フニ此藥ヲ煎服スルニ香サラニ烈シカラス然ルニ散藥ニスル煎湯ニテ用レバ秤ニカクレバ格別サレ加減何トシモ分量ニ不同アリ此藥分量ヲ大事ニスル藥故ニ兼テ散藥ニ分兩不同ナキヤウニスルトニヘタリ

附子理中湯加肉桂茯苓方 此加味滋補ノ第一ナリ 飯田棟隆子
專用之寒熱虛實ニ不拘投セリ 虛寒ノ者ハ即効アリ

補中益氣湯合五苓散方 此二方ノ方意ヲ以テ 虛腫ニ用ヘシ

濟生腎氣丸料 按加味腎氣丸ハ嚴用和濟生方ノ方ニシテ 後人

金匱腎氣丸ト名ク治腎虛腰重脚腫小便不利 附子炮ニ 茯苓

澤瀉 山茱萸 山藥 車前 牡丹各一兩 肉桂 牛膝 熟地

黃各半兩 右為末煉蜜為圓每服七十圓空心以米飲送下○薛

氏方 茯苓熟地黄各四兩 附子五錢 餘藥各 右姜枣水煎原為丸

用之為煎劑數効○原方上薛方ト分量異也意ヲ以テ臨證用ヘシ

分心氣飲 治氣腫

肉桂 茯苓 半夏 木通各三錢半 桑白皮 陳皮 青皮

羌活 大腹皮各五錢 紫蘊二兩 芍藥三錢 甘草二錢半

右姜枣燈心煎

分氣補心湯 治心氣鬱結而四肢浮腫上氣喘急者

大腹皮 香附 茯苓 桔梗 木通 川芎 前胡

青皮 枳殼 甘草 細辛 木香

右姜枣水煎

導水茯苓湯 治遍身水腫喘滿小便秘澀諸藥不效者用此即愈

赤茯苓 麥門冬 沢瀉 白朮各三 桑白皮 楨榔子

紫蘓 木瓜各一 大腹皮 陳皮 砂仁 木香各七

右燈草二十五根連進三服小水漸利○此方去砂仁木香白朮

加赤小豆商陸各冬 羌活連翹各中 疥癬內攻各 腫ヲ發スルニ用テ吉

五皮散 面目四肢浮腫屬濕熱內無積滯者宜之或心腹膨脹上

氣促急兼治皮水妊娠胎水

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 猪苓皮 各等分

本咬咀每服三錢水一盞煎七八分絞服無時○三位法眼傳云

脚氣腫滿ト水腫ト脹滿ト積聚ト脹滿ト三品アリ脚氣ノ脹滿ハ平

常脚氣ヲモテタル人足ヨリ腫テ上ル水腫ノ脹滿ハ面ヨリ下ル腫ナリ水腫

ノ脹滿ハ易治脚氣ノ脹滿ト積聚ノ脹滿ハ早ク治セ子ハ死スル治方ハ

此湯可ナリ水腫ノ脹滿ニ加木通楨榔枳殼晝夜 二十貼ハカリモ

與レハ小便ニテ悉コト下ルナリ積聚ノ脹滿ニ加枳殼大黃木通楨榔

荆芥黃芩茯苓晝夜二十貼方リ用ヨ大便不下ニ大黃別煎レサセ

シテ合半ヲ加ヨ此時ハ加ハ參ナリ脚氣ノ脹滿ハ積聚ノ脹滿ト同方

ナリ脚氣カクトキハ少ク加鹿茸又兎絲子モ可ナリ○又云大切ノ病者

小便閉此湯加ハ參茯苓楨榔○此湯加木瓜防已證治準繩名加

味五皮散專治脚腫或不服水土入胃苓湯

脹滿

八十五

脹満

脹満ト水腫ノ辨ヲ知ベシ水腫ハ手足面目頭下ヨリ腫テ次第ニ腹ニ及ナリ
脹満ハ腹ヨリ腫テ手足ニ至ルナリ水腫手足頭面ハカリ腫テ腹ニ不及コト
モアリ脹満腹ハカリ腫テ手足ニ至コトモアリ或水腫腹ヨリ手足ニ及フマ
アリ脹満腹ヨリ脹テ手足ニ及フヲ腫脹ト云水腫ハ多ク實ニ属シ脹満ハ多
ク虚ニ属ス脹満ノ病因モ亦甚多シ諸方書ノ證治ヲ詳ニ考ベシ
○鼓脹ハ單腹脹トテ腹ハカリ脹テ手足ハ却テ痺ルナリ此證キト中焦ノ
メダリ弱キ所ヨリイワト云コトナク少シクシテ食滯リフレヨリ脹テナス是虚
中ノ實ナリ甚々治シ難キモノナリ脹ヲスカサハ脾胃ニサワリ脾胃ヲ補ハ

脹イヨクニス何トモ治シレキ時分テ見テスカレテ後ニ補劑テモ用ベシ
先ツハ厚朴七物湯或ハ小承氣湯ナドヲ用ルナリ間ニ十棗丸ニ加テ大黃牽牛
子用テ下スナリ婦人血脹ナトハ抵當丸桃仁承氣湯ナドヲ用ルナリ是
古方家ノ治法ナリ後世ニハ血脹ニ準繩ノ當証活血散又ハ散血消脹湯ナ
ドヲ用ルナリ又通用脹満ノ劑ハ後世ニハ蘇桂香正氣散加枳殼換極用ルテ
リ或實脾飲又ハ一方ニ白朮蒼朮陳皮茯苓黃芩厚朴麥門冬古七味水
煎氣滯アルト見ルモノニハ加木通木香或加猪苓澤瀉或加大腹皮何レモ腹
満ヲ瀉スルナリ是補中治濕湯補氣健中湯ノ類ナリ此鼓脹モ脾胃不足
ヨリ發スルモノニ壯原湯ヲ用ルナリ或腎氣丸ニテ無効モノニ景岳至春ノ方ニ

參附理陰煎加白朮治之トアリ脾腎虛極之甚キニ用テ効アリ予腎氣丸ニ
テ無効ニ用テ効ヲ得タリ大劑ニシテ用ベシ熟地黄ノ製吟味スベシ

○婦人單腹脹ニ小便モ相應ニ通シ食事モアキラオチ又ニ積塊ノ加減ニテ
効アルコトヲ九灸治ニ數十壯スベシ後藤流ノ點法ナド効アルコト屢見聞シ
タリ又自分ノ經驗モアリ煎湯ハ回春ノ内消散ノ類或一方ニ茯苓半夏
枳實厚朴甘草ヲ主トシテ我朮青皮芍藥ナド見合加味ノ積塊ヨリ發
スル諸證ニ用テ効アリ或氣鬱類方ノ證ニ灸治專テ相兼テ効アリ
此一方ハ金匱半夏厚朴湯ニ似タモノニテ後世四七湯ト名ケ梅核氣ヲ治
スル藥ナリ故ニ氣鬱ノ方々ニ常々加減シテ効アルナリ然レハ血氣不足ノ

一射燥キアルモノニハ此一方ナドモ或當飯阿膠ハ棗根黃芩知母ノ類ヲ加味ス
ルトイヘ疝疾火血熱ナド兼タルニヨケレバ眞ノ血氣不足ノ證ニ用ルトキハアリ
カマウナル味ハ諸流ニテ精シク試サバ治法一偏ナリテ碎キ醫ノ名分ニ
ヌカレ難シ又鼓脹單腹脹ニカギラズ一切ノ浮腫ニ赤小豆四十商陸七
大蒜三三味煮款レ商陸大蒜ヲ去リ赤小豆ハカリ一日ニ食日ニ盡シテ其
間粥一合ヨリ外ニ食ス塩斷テ鼓脹モ愈ナリト屢見聞シタリ是レ本
草綱目赤小豆ヲ附方ニテリ右赤小豆ヲ一廻リ或二廻リ三廻リ程モ腫
ノ輕重ニテ用ルナリ其間毎日テ換金加茯苓一匙ツ、赤小豆ヲ食ノ口
ナオシニ少々ツ、用ルナリ大蒜ヲ口中アリクナルニナリ

當飯活血散 痰畜死血二因テ脹滿トナリ腹皮ノ上ニ青紫筋ヲ見シ
小水反テ利レ脈孔濇婦人此疾多シ先與桃仁承氣湯重者抵當湯
其人虛弱ニ下劑難用者以此湯調和之

赤芍藥 生地黃 當飯鬚各一分 桃仁 紅花 香附各一分

川芎 牡丹皮 玄胡索 莪朮各一分 三稜 青皮各七分

右水二鍾煎七分空心服

散血消脹湯 治血脹小便多大便溏黑光亮

歸尾一分 五靈脂 肉桂 烏菜 甘草各一分 木香各六分

川芎一分 半夏 莪朮各一分 紫蘇各一分 砂仁一分 生姜五分

右水煎食前温服○此方前オト大抵同レ畜血脹滿トナリ腹皮ノ上
見青紫筋或手足有紅縷赤痕小水利大便黑輕證六宜此湯重キ片
ハ金匱下瘀血湯不應抵當丸去水蛭如搏難為丸空服進梧子大三
丸血下テ止後服

○本邦老医傳云心腹肚脇ノ皮強クヒツハリ推セ大鼓ラ皮ヲオスカ如クニテ
タルニナク底ニ物ヲ空虛ナルハ脹ナリ或大便少シ瀉ス虛證トス長ハ
煎茶ニテソク汗ヲ出シテ小便ヲ通ズベシ

補中消脹湯

香附 陳皮 白朮 茯苓 瞿麥 扁蓄

右六味水煎の右煎湯ノ間ニ補茶ヲ丸茶ニテ用ベシ
寛中丸

白朮 人參 木香 枳實 厚朴 茯苓

右六味為丸の右煎湯丸茶油断ナク用テ禁物ヲ慎ムベシ

○腹脹ノ皮ハツレホド張子凡腹モ脇モ大ニテ底カタク石ノ如クテ痛ニ大
便結小便黃赤ナルハ満ナリ實證トス煎茶ヲ満氣ヲクツロクルナリ

寛胃湯

厚朴 枳實 陳皮 茯苓 香附 枳殼 黃連

右七味水煎の此方ヲ常ニ用テ大便結セバ六七日に一度ノ潤腸丸

ヲ五十粒ホドツノ用ベシ如此療治レテ満實ノ心少シクツロキ心安シトイハム

又補茶ヲ少々用ベシ 人參 白朮 青皮 枳實 大腹皮

為茶 右水煎ジテモ丸シテモ用ルナリ張満ニ限テ治病ノ藥バカリラ

偏ニ用ベカラス中焦ノ正氣虚セル故ニ張トフルレ満トミナタルナリ故

補茶バカリニテハ張満シリツカス消脹ノ藥バカリニテハ中虚本復セス

然ル間五六日ハ病ヲ攻メ又二三日ハ正氣ヲ補フナリ効驗ヲ急クヘカラス

○膨脹ニ限テ心腹ハリニチテ苦シキ故ニ病者モ瀉シタカリ醫者モ病者

ニイソカレテ急ニ通瀉ヲ用レバ一旦ハクツロクヤウナレバ二三日スキテ前ヨ

リ一倍ツヨク脹ルナリ故ニ効ヲイソカス表脹ナラハ汗ヲ發シ尿ヲ利シ

其間ニ補茶ヲ用ベシ裏満ナラハニ便ヲ通瀉シ脹満ヲ消治シテ其間ニ補茶ヲ用ルナリ。

○小便液リ小腹脹ラハ木通茯苓瞿麥車前子ヲ加ベシ小便液ルヲ其ミオケハ面目四肢ニ腫氣ヲ生スナリ瀉ハ山椒ノ目大ヲ加ベシ

○寒脹 木香小 厚朴中 山楂 良姜 縮砂 枳榔 青皮 肉桂 莪朮各中、小

○癥脹ハ 山梔小 黃連 香附 芍藥 枳實 枳殼 大黃各小 脹満ノ禁食ハ魚鳥一切ノ養生冷諸ノ硬物甘味ノ物茶ハ甘草 右補中消脹湯ヨリ下本邦老医ノ傳ナリ

厚朴七物湯 小承氣湯 十棗丸 實脾飲 壯原湯

以上五方見前

參附理陰煎加白朮方 治腫脹脾腎虛極者屢得効

乾地黄 大和産大者不用酒 數遍蒸三五七匙 當歸 二三匙 炙甘草 一ニ

乾姜 黄色炒一 二三匙 肉桂 二匙 人參 附子 白朮 各三 五匙

右水ニ鍾煎七八分熱服○景岳全書云金匱腎氣丸ニ無効者用之方中ノ茯苓澤瀉牛膝車前子等脾腎虛極ノ者ハ不所宜ト云ヘリ其論新刻腫脹全書ニ詳ナリ此茶ノ分量ハ時ノ宜キニ隨ヘシ大抵乾地黄一錢目韓人參二分三分見計ニ用ベシ

産前後

申

九十

産前後

從是以下三門ハ僅ニ治法ヲ誤レハ救ヒ難ク又ハ荏苒トシテ愈
難キニ至ル病證ヲ次第ニ拘ハラズ擧テ經驗ノ治方ヲ記ス

諸ノ方書ノ通りナリ難産ニツテハサテノ治方アリ催生ノ茶モイロ
々アリ大抵仲條流ヨシ手早キ療治ノ法ナリソレユヘ産前後ノテシラヒハ
都鄙トモニ仲條流ヲ多ク用ルナリ穩婆ノ功者ヲ撰ムベシ辺土ニ穩婆
ノ功者ナル少シ産婦ノ虚實ニヨリ産前ヨリノカヘニ補茶ヲ用ルコト
モアリ初産ナドニ虚弱ナルモノハ催シアルヨリ獨參湯或參薑湯ヲ
見計ニ用ヘシ催生ノ茶ハハサト用ヘカラス格別ノ證ニ用ベシ然レモ胞水

下リテ産セサル者ニハ急キ用ベシ催生ノ茶諸方書又ハ家々ノツカヒ
覺アリ大抵催シアリテ平和ナル産婦ニハ仲條ノ本味ヲ用ベシハ老
ハ虚實時ノ宜キニ隨ベシ
本味七味生氣散

- 人參 白朮 當歸 川芎 芍藥 沉香 各等 甘草

右水煎或加陳皮香附或隨證諸藥有増減○此方為散或獨參
湯以薄味啗汁用之○此方ハ大抵一通リノ産婦ニハ人參ヲ薩摩
小入參ニシテ催生ヨリ引續キ産後ニ至リテモ用テヨシ虚弱ナルモ
ノハ眞ノ人參ヲ用ヒ薩摩人參吉野人參ハ不可用此品痞癢ヲ推シ

開功アルニヨリ實證ナル産婦ニ却テ白木當飯ノ類泥ニズレテ
 通用虚婦實婦トモニ産育養生薬ニ散薬ニシテ九味ノ本味ノ
 方ヲ用ルナリ或國ニ此散薬ヲ賣薬ニシテ産前後ニ通用シテ甚
 々効アリテ此散薬流行ス原仲條ノ本味ノ粉薬ナレバ効アルモ理ナリ
 ○諸産後ノ事一通リハ仲條ノ本味ニ證ニ隨ニ加減シテ用ベシ仲條流ノ
 寫本多シ考見ベシ或十六味撰薬アリ是レ赤井龍王湯ナリ類方家々
 ニ多シ血暈上氣反張ノモノニ用ルナリ即効アル薬ナリ然レモ脱血多
 キモノニハ禁用ナリ獨參湯ヲ用ベシ脱血ノ血量ニ安神散ヲ獨參
 湯ニテアリタテ用ベシ正氣ツカハ衆方規矩ノ補虚湯ニ參湯ヲサシ加

用ベシ是血脱ニ氣ヲ補フ古聖人ノ法ナリ又難産ニテ手間ドリ血脱レ
 元氣モ弱ク大汗出ルニ參附湯テナケレバ届カヌゾ油断ナク用ベシ又
 産後ニ嘔逆アルニ虚弱ナルハ四君子湯異功散或渴アルハ七味白朮散
 ナトニテ一二貼見合ルコトアリ此等ハ皆虚弱ナ上テノ療法ナリ其外
 産後ノ諸證黑薬ナドイロク治方アリト云ヘモ盡クハ記シ難シ此
 書ニ産後ノ脱血家瘀血家ニテ治方若シ差ハ忽チ人命ヲ絶ス
 ニ産後虚實ノ大端素人ニテモ意得ニナルコトナレバ衆方書記スナリ
 ○諸出産シテ血ノ下リヤウノ多シヲ第一ニ問ヒ是レ肝要ノ意得ナ
 リ瘀血ヲ一向ニ見ザルモノ或瘀血ヲ下リ少シバカリノ者ハ必瘀血上

テ血暈シテ正氣ヲ失フコトアリ十六味擬茶ヨレ甚レケレバ一味ノ熊胆
 二三分或一二分用テ即効アリ必脈ガ伏スルモノナリ驚クベカラズ瘀
 血上衝テ經脈ヲ塞グナリ此時ニ熊膽ヲ用レバ瘀血ヲ下ヘ下スコト
 速ナリ瘀血下レハ脈モ出テ正氣ツクナリ煎湯モ瘀血ヲ下ス劑ヲ用
 ベシ大黃ナド入ル煎湯或擺葉ヨレ必紫黑色塊リタル瘀血ヲ大分
 下スモノナリ大方ヤ夜中モ次第ニ瘀血薄クナリテ下ルモノナリ
 近來ハ此場ヲ桂枝茯苓加天黃湯ナド用ルナリ必補葉ヲ用ヘカラ
 ズ此證ニハ人參甚々大禁ナリ往々醫者モ素人モ脈ノ無キヲ見テ
 人參ヲ獨參ナドヲ用ルトイテ塞キテ即死ス此時古方家吉野

人參ノ熊參湯ナドハ即効アルベシ是レ吉野參ハ存類ヲヒラクニ害ナレ
 韓參唐參ハ瘀血ノ塞ルモマハリ補フニイテ塞キテ忽チ斃死ス
 大抵此味ニ韓參唐參場へ吉野參代藥ニナルモノカ考ヘ見ルベシ畢
 竟吉野參ハ古來ヨリツカヒ來ル和人参節人參同物ニテ直根ト云マテ
 ノコトニテ虫積ノ茶ニ入ルモノナリ微塵モ眞ノ人參ノ代テルモノニア
 ラズ不吟味ノ醫師益氣湯大補湯ニ入レ用テサノニ障リモ見ヘナレ理中
 湯ナドノ吐瀉ノアル證ニ忽チ害著シ但レ近來ノ説ノ如ク元來補ト
 云コトナレバ人參心下痞鞭ヲ治スト云見解ナルハ又格別ノ沈沈ナリ儲
 中人以上財主ナドノ初産ニ産前ヨリ獨參ヲ煎シテキ瘀血ノ下ル多

本草綱目卷之...

少ノ吟味モセス血暈脈伏スル否ヤ參湯ヲ用テ大死サセルコアリ却テ
ヒセシ 卑賤ノモノ此アマチチ故ニ既ニ分俛ヒセシ 共敗血ノ下リク多少ヲ詳ニ
吟味スル事秘中ノ秘ナリ予ニノアタリ屢試之産後補瀉ノ大端ト
ス人參ト熊膽トノ用法ノ分別コニアリ若シ脱血甚多ク脈絶モノハ多
ク難治ナリ必虚弱ノ婦人ニアルモノナリ産前ヨリ其意得シテ補
藥ヲ用テカヘヨ然レ何程産前ニ養性シテモ夥數脱血シ隨分大補
ヲ立ケケ用テ届クモノアリ不届モノアリ人參ノ善惡分量ノ多少モア
リ又定命モアリ此等ハ一概ニ意得ヘカラス大抵脱血家ハ脈カフワク
トカクカクナルモノナリ是虚脈ナリ其自汗ナトアラハ人參ハカリニテハ

届ヌナリ參附湯ヲ用ベシ唯瘀血ノ下ラヌモノハ脈不伏ト云ヘ補劑大禁
ナリ若シ誤テ人參ヲ用レバ脈モ伏スルモノナリ世俗ノ人産後ニ人參ヲ嫌
フモノアリ是瘀血ノアル産婦ニ誤テ人參ヲ用ヒ却テ血暈スルコトハ人參
ハ産後ニ惡シト覺テイルモ是素人ノ餘儀モナキ了簡ナリ医者モ此大端
ヲトクト考サシヨリ産後脱血家ニ人參ヲ用ルトモアブクトシテ恐ロシガナリ
餘病ト違ヒテトリナキモノユヘ血暈ト瘀血トニテ補瀉ノ用法天地懸隔ナリ
寧ニ詳カニ察スバ忽チ人命ヲ絶ツ天道豈恐レサルヘケンヤ

- 醋ヲカバセルモノハ瘀血家ニヨシ脱血家ニハアシ
- 虚弱ノ産後調理ニ大補湯人參養營湯ガリト意得ヘシ或産後專

女科要方

申

門三補中益氣湯加附子乾姜才レテ用ルナリ然レ其產婦火ノ勝チ上逆
スルモノハ升提ノ劑ニ桂附八逆上スルナリ道送散ニ人參陳皮麥門冬下
ラ加ハ或昔飯調血飲類見合セ用テ上逆定テ後ハ物湯ガリト意得
ベシ地黄泥ムトアル六補虛湯ニ指引レテヨシ益氣湯ハ勞役或ハ氣ノ引
立テカイナキニ用テ氣ツケノ意キカタ亦是モ血脫ニ補氣ヲ用ル例ナリ
當飯地黄下ハ急ニ補血スルモノニアラス血ハ氣ニヨリテ生スルト云古聖ノ格
言ヲ以テ先ノ補中益氣湯ヲ主劑トシテ乾姜附子ハ參耆ノカヲメグラス
タシセリカウナルコトハ近來テハ一向イハヌコトナレ血ハ氣ニ依テ生スルコ
現然タリ血脫補氣者古聖人之法也ト云コト是内經ヨリ出タル要旨

レテ後賢此語ヲ述テ萬世脫血家ノ規矩トナルハハリ内經ノ註ト云七
ノニシテ今日内經ニテヒカ取ラルト云モニアラスヤ或陰虛則内熱陽虛則
外寒ノ經文ナド今日治療ニヒト符合レテ東垣補中益氣湯ヲ建立
シモフ深省ナリ此陰虛則内熱ト云ラアレク意得レハ陰虛之動ノヤウ
ニ思フハ間違ナリ此辨別記ス言長クバ此ハ不迷ナリ
○儲產後勞勞ト云モノ多クハ調理アレク補藥ハ乳ニ障ルナドレテ
湖乳ニ黑燒茶ノ類瘀血家ノ粉葉等ヲ飲スナリ是婦人トイヘドモ
アラカシク意得ベキナリ
右ノ外産後ノ諸證イロクアリ大抵伸條條ニテスモ考ヘシ然レ其格

別ノ六々敷證ニナツテハ仲條流ハカリニ拘ルベカラス婦人良方ノ薛氏ノ註ヲ見テ能々施治スレ臨機應變ノ工夫アルベシ

補虚湯 産後ノ虚弱ナルモノニ用ベシ太補湯ノ類ヲ可用證ナレバ食モシカク不進地黄ナドノ用ヒガタキニ先此補虚湯ニヨリ加味ハ見計ヒタルベシ

人参 白朮 唐黃耆 陳皮 當皈 芍薬 甘草

右水煎 發熱輕則加茯苓重則加炒黑乾姜

補龍王湯 産前後打撲折傷金瘡大食傷狂亂淋病大腹痛黃胖病氣附毒酒反張血留癰疔諸惡瘡類中風痘瘡後漏水胞衣

不下産後諸證効驗難々述

當皈 芍薬州 黄耆大 良姜十 川骨大 黄芩中 大黃小

木香中 川芎大 黄連中 肉桂小 桂心小 人参隨 甘草小

右十四味以上カハチ器炒一貼壹錢四五分フル擺用三度而如常煎○有

熱加柴胡○金瘡筋斷絶○加枳榔中丁子小○打撲倍○川骨

凡脫血ヨリ○致ル諸病和流ニテ通用ナリ金瘡血暈上氣反張大熱疾

痛等ノ證最妙ナリ此方類方多シ家々ニテ○蘇銘○違○安榮湯調榮

湯ハ參湯妙香湯ナト皆此類方ニテ十六味フル擺ト云ハ是ナリ此方寒熱補

瀉ノ品駁雜シテ一處ニ炒リ火ヲ忌ム藥モカニハ○聖澤○タル○蘇劑○レ○代

ヨリ都鄙トモニ用ニ覺(意外ノ効アリ産後一兩年モ歷テイロ、持病
 ノヤウニナリ或勞證ナドニ給レルモ此方ニテ効アルコト多シ加減指引分量
 ハ證ニ臨テ意ヲ以テ増損スベシ此方熟地黄或乾地黄ナド入ル方モアリ
 或紫檀乳香藿香ナド入レ方アレ是ハ主治多キ藥ニ(家々)加減ヲ
 スクニ方ト立ント見ヘタリ如斯駁雜ニ集ハ近來ニテハ笑ヘキノ方ナリト
 イヘ氏又理外ノ効アリ必用ベシ

黑葉順榮散 産後血暈惡露不下或勞物煩腦金瘡打撲一切血證

- 黎自然生 川骨生 沉香生 乾鮭首霜各七
- 角豆亦者浸煎茶去皮炙末四錢 麻時採之葉根陰乾霜以酒沾之五錢

右六味一味宛細末後合之○黑葉類方多シ此方至テ効アリ
 中神散 脫血元氣甚弱血暈

- 茯神 白朮唐 黃耆 遠志 山棗各十 人參 桔梗各五
- 木香二錢 辰砂 甘草各二

右為散白湯送下或以獨參湯和散服
 失笑散 産後惡血上攻心腹作痛或牙關緊急者主之

五靈脂 蒲黃各一

右細末白湯送下

奪命丹 胞衣不下以致心胸脹痛者主之

附子半兩 牡丹皮二兩 乾漆一 大黃一

右為末桐子大丸温酒吞五七丸

無憂散 胎衣不出腹痛手按痛稍緩者主之

當飯 川芎 芍藥 枳殼 乳香各三 甘草 髮灰各一

右為末每三匙水煎服

芎飯調血飲 產後諸疾宜加減用之 加減法在諸方書

當飯 川芎 芍藥 熟地 白朮 茯苓 陳皮 香附

甘草 右薑末煎温服或有人參

桂枝茯苓加大黃湯七味白朮散

勝勢飲 治產前後一切諸證上熱下寒者温腰膝赤白帶下屬寒

才秘効

香附妙 川芎 茯苓 肉桂 當飯 蒼朮唐 沙參各中

木通小 丁子中 甘草少

右十味攤用後煎服。和方ナリ婦人ニ用テ効アル薬ナリ

○產前惡阻ニ紫蘊和氣飲類其外痰ニ因ルモノハ二陳湯加味ヨシ半

夏黃色ニ炒用テヨシ或惡阻嘔吐屬血虛者茯苓補心湯加黃連妙 竹

茹惡阻ハ嘔吐ノ定ハ時節アリ無理ニ茶ヲ投スレバ茶食トモ受ヌコトアリ

其茹暫ク見合セ休養シテヨシ小半夏加茯苓湯ナト生半夏ノ一錢餘

長壽縣志 申 九十八

三月レバ三五日ノ内ニ隨胎スルモノナリ今通用ノ粒半夏某肆ニテ數遍水ニ
テ洗サシ晒サシスルモノニ製同然ナリ然レモ妊娠ニ壹錢餘モ用レバ胎ニ障ル
ナリ。儲胎動カトイフノ事アリ和氣飲安胎飲ノ類ニテヨシ甚シキハ
子癩カトテ臨月ニ瘰癧カヲ發スルアリ羚羊角散或葛根湯ト云主方アリ見
合世用ヘシ甚外子煩子腫子淋ナド皆胎動ナリ諸ノ方書ニアリ較覽
スレシ物休產前後ノ諸證此分ニテハ治法不足ナリ今此書ニ次第病
ハス產前後門ヲ擧ルハ畢竟產後補瀉ノ綱領ヲ著シク述テ素
入カニ疑ナク脫血瘀血ノ違ニテ療法大ニ相違ナルコトヲ遠境辺鄙
ノ醫ニ之レキ里ヘ知レメテ欲メ和氣飲等ノ數方衆方規矩大成ニ詳カ也

山微瘡并結毒

此病近來四方ニ傳染シテ輕重アリテ老壯男女ニ患ル者多シ初發ハ
淋病便毒疔瘡ヨリ證ニヨリテイロクノ惱ニアリ繁華ノ地最多シトス食
毒醇酒厚味ニヨリテ發ルアリ此療治方諸家ニイロク用ヒ覺ノ方アリテ
効ヲ取ルナリ其内素リ生レソイテ濕熱ノツヨキ證或其父母ヨリノ遺毒
アル證ニ再ヒ傳染スルモノハヒエク井ニ火ノツキ安キ道理ニテ傳染モ速ニ
テ其病モ重シ最初荆防敗毒散又消疔敗毒散消風敗毒散ノ類ヲ用ル
ナリ便毒疔瘡ニ至リテハ龍胆泻肝湯或便毒下シ粉某或和方キケン
ホウノ類方ニ大元湯ト云アリ最効アリ證ニヨリ速ニ愈ルモノアリ長引

山微瘡并結毒

申

痲愈リカ子難義及不證モアリ此ハ毒氣ノ淺深其ハ虚實ニヨツテナリ
此病外見ヲ人々厭^{イハレ}之^ヲ發出スルコトヲ忌ミ或^ハ輕粉劑ヲ時節アレク用ヒ
上部ニ毒氣有無ヲ不論^セ妄^カリニ用ヒ誤^ルコト多シ本草ニ輕粉ノ毒頭中
ニ非^レハ百毒不治ト云ヘリ故ニ下部ニ毒氣アリテ愈カタキニ多ク粉劑
ヲ用ルナリ然レモ用ル法ヲ得サレ却^テ障^ルナリ又茶湯或温^ク水モ所
ニヨリ時節ニヨリテ的^的不^的的^的モ辨^スヘス却^テ其病ヲ破^壞スルコト多シ大抵土
茯苓^ノ又^ハ服^シテ其間加減指引シテ燥^キタル證ハ滋^補ノ劑四物湯六味
丸^ノ類ヲ兼用ルコトモアリ或^ハ解毒劑ナドニ云モ古方家ナド專用ル
ナリ土茯苓ヲ主トシテ本道忌^ム類ニテ小便ヨリ毒氣ヲ通シ大黃ニテ

大便ヨリ毒氣ヲ泄^シ川芎^ヲ山^薢毒ヲ解ス此方モ家々ニテ少々茶^ノ品ノ
若^ク大抵ハ右ノ茶味ナリ證ニ隨^ヒ荆^芥防^風ヲ加味^シ或^ハ芒^硝ヲ加
味^シ蟻^蛇ナ^リモ加味スルコトアリ一貼土茯苓三錢或^ハ五錢晝夜ニ三貼モ四貼
モ病人氣根次第ニ用テ効アリ大抵此方ヲ最初ヨリ油^斷ナク用テ
愈^ルモノナリ此方ハ便毒疳瘡久淋ニモ用テ効アリ又防風通聖散ニ
土茯苓ヲ合半ニシテ用ルコトアリ是ハ頭面^ハ發出シタルモノニ用ヒ^テ兎角
發出スルコトヲ忌テ最初ヨリニ便^ハ毒氣ヲ抜^ク療治當世專^クテ諸人
好^ムコトナリ然^レモ都^合ヨク兩便ヨリ毒氣又ケ^テ證アリテ毒^ヲ發出スル
モノアリ此時ニ往^テ急^テ輕^粉劑ヲ用テ一旦愈^ルト云^ハ後日ニ害ヲナス

コトアリ又其人ノ證ニヨリ粉劑ニテ愈テ重テ發せず生涯無事ノモアリ是レ毒氣ノ深淺其人ノ稟賦ニヨツテナリ此病彼ニヨキ程ニトテ又是レニモヨシト云テ請合ノ輕粉劑ヲ妄リニ用ベカラズ

○儲此病結毒ニナリテハ大抵ニテハ愈ヌモノナリ結毒ハ骨カラミトテ毒氣筋骨ニミツイテ筋骨痛ヲナスナリ或久年ノ頭痛トモク増減アリ是レ風邪ナドノ頭痛ト違ヒ頭ノ骨ノ痛ムナリ或手背腕肩ノ骨イタニ或腫脹膝足ノ脛骨足ノ胛ナリ痛ニ歩行ナリ難ク或陰莖痛ニ陰囊腫レ硬ク或穴ヲ生シ膿水絶ヘズ或肛門痛ヲナレ膿水出テ或頭面肩背手足ニカギラズ瘡爛ヲ骨ヲ見レ年ヲ歴テ口

ヲ收メ或皮肉ハ障リナク骨爛レテ口臭ク咽喉爛レテ膿潰(鼻腐潰)ニ上ル病根甚深レ中々通例ノ劑キクニボウ解毒劑ナドト治スベキニアラス回春ヒアル通仙五寶丹ヲ用ベレ此方ハ王范泉ガ廣東ニ遊宦シテ傳來シ極メテ真ニ揚徽瘡ヲ治スル乃チ天下古今第一ノ仙方ナリ寶貴之寶貴ト龔氏ノ書レシモ外ノ丸散ハ回春ノ主治ノ如ク皆々功アルヤ否ヲ不知トイヘ凡揚梅瘡ニ於テハ五寶丹ニテ經驗シレコト數人ニ及ベリ其外揚梅瘡ヲ癒テ後一切名ノツケラレ又病ヲ患ヘ癩癩アルハ類中風ノ如ク一向揚梅瘡ノ病体ハカツテ見ヘズ他病ニ紛レテ何葉ヲ用テモ愈サルモノ五寶丹ヲ用テ久年ノ

病根ヌケルコトアリ其名状シガタキ病モイロハアレバ尽クハ記シ
難シ惜此方奇方ナリトイヘ氏世間了簡チガヒアリテ五寶丹ヲ
至極ノ峻劑ノヤウニ覺ヘ素人ハ勿論醫師モ甚ダ恐レヲナスモノアリ
是レハ右ノ藥ノ内ニ飛白霜ヲ日本ニテ不圖トリチカヘ輕粉ニシテ用ル
ユヘナリ飛白霜温鈍ノ粉ナリ炒リ過シテ二分半トアルニヨリ輕粉
取り差ヘシモノナリ今ニテモ輕粉入ノ五寶丹アリ是ハ涎沫ヲ流シ
口中破損シ甚ダ苦シニ堪ズ虛弱ナルモノハ危キニ至リ又ハ輕粉ヲ
生シ妙ズ分料モ餘計入ル方ハ別ノ峻劑ナリ然レ疔瘡ノ愈ルコト七
八日ノウチニバラスト乾キ愈ルナリ此外投込ナト云々其多シ何

モ輕粉ヲ生シテ餘計入レカラス毒氣上部ニアルモノハ
究メテ害アリ一應ノ疔瘡便毒処ノ池邊ニ毒發出スルニ胆粉入
ノ丸其ヲ用ヒ早速ニ愈ルコトアリ此ハ輕粉ヲ炒リ過シ隨分小粒ニ丸
シ辰砂ヲ衣トシ一度ニ掛目三分ツ、牡蠣湯加柴胡山梔肝火ヲ制スル
劑ニテ送下ノ即効アリ然レ疔後日ニ骨痛ナト發スルモノナリ其時ハ
搜風解毒湯ニ大黃川芎ヲ加ヘ用テ治ス若シ土茯苓令五七錢モ一
貼ニ入レ油断ナク用テモ効ナキ者ハ早ク五寶丹ヲ用ベシ何劑用テ
モ害ナシ病深重ノモノニ世間ニ劑ヲ用テ少シ効アリトイヘ氏大劑ノ主
依其煎ナレハ用ヒアグニ其外食忌モ多クハ退屈シテ吞得ズレテ愈

及

申

白三

ナルモノ多ク面春三五寶丹ノ吞汁ノ土茯苓湯毎日一斤ヲ煎シテ十二粒ト
スヘトマリ五寶丹粉菜ノ分量ハ五寶各分量アツテ麵粉二分半餘
粉菜合シテ五厘合ノ三分ナリ是ハ唐モ日本モ同シ分量ナレバ土茯苓
湯ハ回春ニ毎日百六十目ナリ日本ニテハ隨分餘計カ四十目ナリ十二
日分ニシテ四百八十目ナリ唐目三斤ニシテ回春ニアル分量異十二斤ナリ
四双倍ノ分量多ク尤異邦ト本邦ト茶ノ吞ヤウ斤多少アレバ元來
此土茯苓ト云フ味淡薄ニシテ餘計用ヒガレバ効ナキ茶ナリ世間
土茯苓ヲ恐ロシガレバ土茯苓ノ外ニアラヌ土茯苓ノ煎湯ノ加茶
大カタ大黃黃連黃芩アリ或兼用ノ丸藥巴豆輕粉并ニ用ル丸

アツテ汚スルカ不食シタリ口中爛涎吐キテ加茶ノ品ニヨリ障アリ
ルニ是土茯苓ニト思フ僻衰ナリ本草ニ健脾胃利濕トアリ又廣
東ナトシテ平生野菜ニ土茯苓ヲ食フコト日本ノ芋ノ如シトイヘリ少シモ
恐ルベキモノニアラス尤乾ク性ナルモノニ血分枯タル人ハ用括スベキナレ
凡既ニ楊梅結毒ノ人ハ血分乾キタル人ニモ外ノ菜ノ及ブベキニアラザレハ
土茯苓ニテケレバ効ナシ跡ニ滋補ノ調理格別ノ夏先ツ五寶丹ナ
ル用ル中滋補ノ兼用ハナリ難シ子カ傳來ニ土茯苓四十目ノ内ハ
黃連壹々ホト加味シ用ルナリ如斯スレバ火ノ多キ燥ク證ニモ土茯苓
味ヨリ用テ燥カズ又證ニヨリ五寶丹ヲ土茯苓煎ニテ用ユル中

大便秘結レ難儀ニ及フコトアリ是ハ局方三董圓ヲ蜜煉ニシテ土
茯苓煎^ソ用ルゴトニ掛目三分或五分程^サモ用ベシ畢竟五寶丹^ハ鎮
礮^ノ粉茶ニテ骨節ニ毒氣^レニツキタルヲ早朝ニ二度用ルハ^ハ哭^物
垢キタルヲ灰ヲ敷テ磨クヤウナルモノニテ跡ニ大劑ノ土茯苓煎^ソ
用ルハ^ハ流^レテ洗^フカ如キモノナリ此水大水ニテクハ垢ツキタル
モノサツハリトナリ難シ合土茯苓百六十目ヲ水三升ハ一斗ニ煎シ
ラ^ハ格別濃キ煎湯ニテモナ^レ十二碗ハ大抵一升ニ合ホドナリ十二
日^ガ間回春ニ茶湯水雞鵝牛肉^等ヲ忌^マリ然レ^ハ病入丈夫
ナラ^ハ塩^煎ヲスル程^ニシ^レ便^能通^スル^ニハ^ハ効^速ナリサレ^ハ一^向

塩^煎モノナラ^ハ又^ハモノ^ハ太^バ如^ク昆布^ト薄^ク煮^テ食^スベ^シ飯^ハ却^テ能^進モ^チ
リ^ハ下^地不^良ノ者^或久^シク煩^ヒ食^事ニ^サリ嫌^ア生^ノハ^輕キ魚^類一^塩ア
テ^ハ見^合用^ベシ是^等ハ^醫ノ見^計ナル^ハニ^物体^五寶^丹ハ^選キカ^コン^トイ
ハ^ハ大^抵二^百日^以上^ノ病^ニハ^氣ツカ^ヒナ^レニ^用ベ^シ尤^モ結^毒上^ニ至^ルハ^最初^ニ
結^毒ニ^{ナル}モノ^ニテ^ナレ^ハ痲^瘡便^毒或^ハ發^出毒^ノ後^ニ初^發ノ^瘡治^力能^テ
モ^惡ク^ラモ^{ナル}夏^{アリ}早^過ナ^ド云^夏モ^回春^ノ面^ニテ^見ヘ^ズ是^ハ輕
粉^入ノ^五寶^丹ヲ^用ル^トテ^イヒ^出シ^{タル}夏^ナリ^輕粉^ハ毒^ノ深^淺ニ^カギ
ラ^ズ早^速愈^リテ^毒發^出せ^ト充^勢モ^押込^テ仕^廻ユ^ハナ^リ
格^回春^ノ分^量ノ^如ク^一味^ク極^細末^シテ^一畧^三分^ヅニ^シテ^十

十二畏ナリ毎朝一畏ヅ、土茯苓煎ニテ攪テ用ヒ二度目ヨ
リ七茯苓湯ハカリ後ハカクテ香盡スベシ土茯苓四十目ニ水三升入シ
一升ニ煎シ用ルナリ如斯ナレバ再煎ニ不及マハリ常ノ釜ニテナリ
鍋ニテナリ片煎スベシ一升ヲ香得サルモノハ水二升四合ヲ入合ニ煎シ
用ベシソレヲモ香得サルモノハ一升ハ合ヲ六合ニ煎シ用ベシ若シソレ
ヲモ香得サルモノハ耳目鼻口モ破壊スルト意得ベシ世俗此病ニ
ヨツテ廢人トナレハ五寶丹土茯苓ヲ恐ルノ過ナリ唐ニテハ土
茯苓一日二百六十目ヅナル故ニ十二日一劑ニテ愈ルナリ若シ不愈
トキハ二劑ニテハ愈ルナリ五寶丹ハ二廻ニテモ掛目七女二分土茯苓

ハ唐目二十四斤ナリ日本ニテ此病ヲ患ルモノ三斤用テノ五斤用テノト
云ハ甚々不案内ナル夏ナリ病深重ニ及バ少シノ斤數ニテハ愈ルモノ
ニテナレ然レ下地虚弱ナルモノハ子ガ傳來ニ五寶丹劑ノ内ハ韓人
參二分或三分加ヘ細末シテ用ルナリ又指當床ニツキ長引タル楊
梅瘡ハ先ツ調理シテ食事ナドモ病人相應ニ食ル節見合用ベシ隨分ト
重キ結毒モ五劑ホドニテハ愈ルナリ病人退屈セハ一劑ノ間大抵五七日モ
隔テ用ベシ氣強ク丈夫ニ用ルモノハ二三劑モ立カク用テヨシ楮土茯苓ハ上
品ホドヨシトク人用卑賤ノ者ハ茶肆シヤカツラト云皮ツキアリ是レ
最卑主氣ヲ洗ヒ皮トモニ刻ニ用ベシ茶肆三番皮ト云モノ品ニヨリ

夜子トテツ水ニ數日浸シ不殘皮ニ仕立ルモアリ是氣味薄ニ効速ナラス
ソレヨリ公シヤカツラ皮ニ刻ミ用テ迫カニ効アリ意得ヘシ
○諸令一ツ世間ニテ簡差ヒタル人モ間ニテリ輕粉入ノ丸某或粉某或嗅
藥管ニテ此等ノ某ヲ一廻リ七日トシテ用ル二兩日用レバ口中破損シテ
涎ヲ流ス是毒氣口中ヨリ出テ病ノ根ヲ抜クト大方覺テイル左ニハ
アラス涎ハ脾ノ液ニテ今日飲食胃ニ入テ脾ニテ運シ十二經絡週身ヘ
此飲食ノ正味吉粹津液トナリ行ワタリテ入ハ生テオルモノナリ
今輕粉ノ為ニ劫カサレテ水穀ノ精氣コトクク涎トナリテ口中ヨリ出
テ十二經絡涸川トナル故ニ嗜慾クハシヤキ五三日ノ内ニハラクト痲オチ

テ愈ルナリ是毒氣ノ口中ヨリ後ルニアラズ脾胃ノ津液ヲ口中へ吐テ
一身全付カワク故瘡モ早速ニカワキ愈ルナリ全ク毒氣ノ口中ヨリ
ヌケルニアラザルナリ是素人ノ意得違ナリ然レモ輕粉劑モ時節
ニヨリテ用ヒサレハナラヌ又アリ輕粉一錢目ヲ大拵五六分ニテニ炒上
テ用ルナリ如斯スレバ茶峻トカラズ丈夫ナル人病火急ニナリ陰虛ヲ
ト落ントス勢ニ至リテハ生ニテ一錢目モ用ルヌ又アリ然レモ是ハ正
ムコヲ得ザルノ療治ナリ最初ヨリ次第ヨク療治ノ時節ヨク至玉
丹ヲ用レバ輕粉劑ニハ不及ナリ五寶丹ハ大拵二百日已上ノ病ニハ輕
重トモニハシモ障リハナシ予一病人百五十日バカリニシテ項ニ瘡ヲ

足膝痛ヲナシハカク行ガタキ證ニ劑用ヒ三四日ニシテ頂ノ瘡ヨリ
膿水ノクスイニ合ホドモ出テ十二日用ル内ニ足膝ノ痛モ和ギ平愈シタリ是
等ハ日數ヲ歷ストイヘ五寶丹的中シタリ然レバアメリ遲ク用
ヒヨト云事モ一概ニ拘ルベカラズ然レモ最初毒發出シテ惣身ニハフリ
ト出時ハ用ニ即効アレモ先ツ荆防敗毒散ヲ數貼服シテ後五寶丹
ヲ用ヘシ是至極ノ治法ナリ又瘡ノ口一處ヘヨリニナリ硬ク腫痛シ
膏藥ナトヲ用テロアキ膿水出ルモハ毒其處ニ滯ルナリ是即
結毒ナリ油断ナク用六膿水オヒタシク出テ瘡根ヲ拔ナリ或面部頭
頂ノアタリ小キ瘡出テ或退久クモシテハ烟管ノ吹口ホドナル漏ヲ生膿

水絶ヘズ甚々復氣アリ或鼻ヨリ淡色ナル痰汁絶ヘス出テ甚々臭シ是
等ハ皆毒氣ノ結滯スル故ナリ以上ノ數證イソギ五寶丹ヲ用ベシ少
シモ遲速ノ氣遣ヒアルベカラズ結毒ノ頭痛ニ解毒劑三黃湯或モ黃湯
ヲト數貼用ヒ大便瀉スルハカリニテ頭痛少シモ不止ニ五寶丹ヲ用テ
四五日ニ頭痛如忘愈タルモノ數人ニ及ベリ又世間楊梅瘡ノ後目管ニミ耳聾
ルコトアル輕粉劑ノ用ヒソコナヒナリ毒氣上部ニアルモノニ用ルユヘナリ此
外ノ治法種々アリトイヘ通仙五寶丹此病ノ惣ニクナリ温良モ時
節ニヨリテ的的アリ精ク考ベシ
消風敗毒散 二方見諸方書

便毒下
大黃 蒼麥粉各二 川芎 當飯各一

右細末白湯送下

又方 山梔二箇 鹽梅中者二箇

右二味燒存性為末用巴豆二粒去油和勻煎茶為三服用一服得快利則止後服。便毒痛甚有二一屬肝火一飲成膿也腫上微赤腫根如燒較痛甚者肝火也龍膽瀉肝湯飲成膿者宜內托之便毒散散膿膿ノ分別要論ナリ

黃耆內托散 便毒內托劑

川芎 當飯 黃耆各二 白朮 金銀花 天花粉

皂角針各一 甘草 澤瀉各五

右水煎。便毒血虛有靨加味道遜散

大元湯 楊梅瘡奇方

大黃 杜仲 生地黄 黃連 牛膝各一 獨活

檳榔 茯苓 防風各半 當飯七 甘草二 土茯苓十五

右水煎隨證以此分量為一貼或為二貼或為三貼。水ノ分量六貼ノ大小ニヨツテ見合ヘシ先一廻リ七日用ルナリ諸此毒ヲ煎シアケテ頭ハ蠶ノ霜五八霜ヲ茶碗一盃ノ煎湯ニ耳搔ニ七ツ程ズ入レテ用ルナリ用毎三日食ナリ凡雜肉ハ每八功

此方以日三六切ハカリナリ大括カシク難ニ弱ヲ内ガリ白燒ニシテ置キ用ル
時ニ極油味増溜類ヲツケ食リニスヘ其間隨分食忌スヘシ通例土茯苓
服ニ食禁ノ如シ此方和方キケンボウ類方ニノ經驗ノ良方ナリ

搜風解毒湯 治楊梅瘡久并結毒

- 土茯苓 二錢
- 薏苡仁
- 金銀花
- 防風
- 木瓜
- 木通
- 皂角
- 白鮮皮 各五分

右水煎此分量經驗傳也或去防風白鮮皮加大黃以苦為三貼
或為二貼亦効コレ本邦キケシウノ祖方ナリ水ノ分量ハ三五ヲ以
テ一盃ニ煎ズヘシ日ニ二服用ルナリ

和劑三黃圓 服大劑土茯苓煎天便秘結者兼用之

- 大黃
- 黃芩
- 黃連 等分
- 右細末東蜜

即驗丹 治疔瘡或毒發下部陰服

- 輕粉 二錢 或炒或生
- 角石 二錢
- 大黃
- 黃連
- 黃芩 各一錢
- 光明朱 五分
- 土茯苓 三錢

右糊丸以大辰砂為衣如蒜月大每服一分日三服○地四物湯
加柴胡山梔送下或以小料土茯苓煎送下凡藥分量每日可服
三分凡一月計而可取効如斯則雖粉劑無害瘡痂自愈

疔瘡瘰癧 馬勃草一錢 光明朱 二分 右細末

煎法以水三升煎一升無再煎之傳云服藥中斷塩味但煮昆
布可食之若食不進者隨宜雖然醇酒厚味濕熱物可禁之
近來癩瘡多食禁ナレトイヘ厚味辛辣ノ物ヲ食ハ瘡口膿水モ
多ク爛レヤスク瘡愈ルヲ遲淡薄ヲ食スハ膿水モ清稀ニレテ瘡口
モ爛レルト輕シ此事ハ病人ノ虛實ニヨツテ見計タルベシ此病毒氣
ヲ内ニ滯ラサヌマタニ最初魚鳥モ食セシメ或雞肉ナトモ用ルトイ
ヘ此結毒ニテリテハ中々食餌ナトテ發出スルモノニアラス却テ濕熱
ヲ益シ宜シカラズ此病食毒ヲ兼ルモノ多シ審ニ考ヘシ

痘疹

發熱疑似之間見證用某

痘ノ流行スルハ冬ノ中比ヨリ翌年ヘカケテ行ハレ大方五月比ニテモ
行ハルハ大流行ノ年ナリ又冬行ハレズ春カラモ行ハル此ハ年ノ運氣
ニヨルナリ運氣ノ經驗ハ外ニ書アリ先ツ此ニハ療治ノ仕方ヲ書ナリ
發熱ノ時ハ常ノ感冒ト同シヤウニ見ユレ此發熱強ケレバ強キナリニ弱
ケレハ弱キナリニ熱タヘズサレテサメル時カスクナキモノナリ是ハ常ヲ
語レシ又スササ今又サスモアリ其時治カハ升麻葛根湯ニ加減シテ用カ
ル或藿香正氣散參桂飲香薷散敗毒散コレ等モ初發熱ニヨ

痘疹

申

百十一

云成程アシクハナシ其證々ニヨリテ若食滯ヲ兼タラバ藿香正
氣散ハ痰ハ參蘇飲ハ熱強キニ敗毒散ハ或敗毒散ニ甘草湯ヲ合
方ニモ用ルナリ又イカフ其病思虚證ナラハ葛根湯合四君子湯用
ルニヨリ是ヲ升君湯ト云活幼心法ニ實證ニハ加味葛根湯虚證ニハ加味
參蘇飲ト分テオイタルモ大概ナリ第一痘ニハ乾カス治方カアレキナレバ
故モナキニ半夏ナドハ不好ナリ葛根ハ發表モンテ又潤ス茶ナレバ痘
全体ニヨキ主茶ト意得ヘキナリ諸此等ノ茶ハ感冒ニシテモ用テヨキ
茶ナリ疑キ内ニ用ルニ痘ナレハ大方手ノ又澤ノ部又ハ股ノ中面部ナトニ
モニ粒ニ粒スルモノゾタレニ痰ハタトテモベク虚ハラ何ヤフ知ヌホドニシレヨ

リ後ハ心ヲ付テ生長スルヲ見ルベシハ當歲ヨリ三四歳六七歳ニシテモ如此疑似
ノ間ニ熱甚シケバ上竅ハ搐搦ハ口眼ハ斜ハスルマツナル驚風類ニシテ證アリサ
ヤクノ時ハ實證ト見ユル兒ニハ蘇合香圓モ用ベシ虚ニ見ユルニハ赤
龍丹ト云フ用ヘシ或輕キ獨參湯ニテ用ルコトモアリ此赤龍丹ハ辰
砂夜神ニ味等分煉蜜ニテ子リオキテ用ル大秘方ナリ備目ヲ
見ツテ齒ヲ食ツメテ暫時或半時バカリ氣ノツカヌヲモアリ熱
レト少々右ノ通りニ痘トオホレキ吹出物モアラバサワカズシテ鐵治
ナレ用テヨシアハス、灸治スベカラズ見ツメルホドノ熱ナレハ暫ハ出子ハ
サメヌモノダ煎湯ハヤハリ見合ニアレラフニ敗毒散ナド天麻全蝎

ナドノ入ル加減擬シ輕ク用ヘシ大方右ノ子リ葉ノ氣附ニテヨキモナリ
○古書ニ外麻葛根湯ヲ用テ見點ニタラバヤメヨトアリ表發ニ過
テアレキトアリ然レモ是モ一撤ニ守ラレヌモアリ直ニ中和ノ劑ニナ
ラスモヨリ中和ノ劑ハ大カ子湯ノ類ナリ又千金内托散ニテラスコ
トモリ是ハ痘ノ形容外證ノモヤワ次第ナリ

○諸右ノ疑似ノ間ニモ虚ツヨク見ユニハ輕キ獨參ヲ用ル莫ナリ是等
ハ古書ニ見ヘヌナリ○諸發熱ノ常例ハ三日ナリ然レモ變ニ至リテ
ハ五日十日或廿日モカリテ知ヌ莫カアルガ此事ハ古書ニモアリ予
ガ經驗ニタラヌナリ夫ハ又トシテ知レヌナレバ二三粒見點シタルモ

ノヲ見レバ成程痘ト見ユルガ時アツテ没シ時アツテ癩シ如斯クモ廿日
バカリモカリテナンタク痘ニノリタルモ有リ然レハ常例ハカカリニハ
拘ハラヌモ有ナリ○痘ト見ヘテスラト澤山ニ出ルハ重シ擗擗トアル
ハカツテ輕キ出物ナリ其意分別アルベシ

見點之間見證用茶

諸面部ニモ二三四五粒手足ニモ四五粒モ見ヘテ懷ニ痘ト見キロタル
ニ其色赤キニ過テハ血熱ノ心アテニテ用茶スベシ色白テ痘形發
ト弱クテ其人元氣モ弱ク静ニテ陰證ト見ルトキハ温補スベシ其赤キ
ニ過タルハ必其人モ躁カシクキヨトツキ聲高シ手足ヲ擗テ或唇舌乾

咽渴キ引飲ス借ヨホド出テ却テ没セトスル勢ヒノ見ユルハ毒多ク血熱ス
ル證ナリ物中動悸ツヨク頭痛シ小便之遠ク流リ或不通又ハ通ズレト赤ク
濁ルナリ此證ニテ神解毒湯の方ナリ二三貼用ル内ニ諸證退ク第一心按
ラ解スルニニ動カ氣頭痛止ニ小便能通ズルガ正面ニテアルナリサマワアレバ
痘色モ赤過タルガヨイ位ニサムルナリサマテ諸證退キタルトキハ消毒飲
ニ甘桔湯合方ナド輕ク用テヨキナリ○色淡白ニテ全体痘色ノ外ニ元
氣ハ虚寒ト見ユルニ温中益氣湯ニハ參一分二分三分五分五分用ベシ
隨分情出シ用ル表モ温ニリ見ル中ニチラクト見點スルモユリ是モ
見點シオセタラハ保元湯ノ費奉ニ生ニシテ用ルガヨシ肉桂木香ナドハ

ウカト長々ト八用ヒラレヌソ○諸者ノ虚實ノ二證ハ毎々驗ノアル方ナリ
此ニ通り當流ノ最初ノ極意ニシテ外ニ格別ノ見訣ナシ然ルニ予ノカ師
傳ニ每度此ニ通りニテヌ事ヲ見出シタリ其證ハ痘ノ全体淡白ニテ
虚寒ト見ユル證ニ存ノ外其人狂躁シテ咽渴キ或痘淡白ナリトイ
ハ此間ニ赤キ點一二粒モ交リ出テ全体躁シク陰陽錯雜ト見ユルハ是痘
毒ハ輕ケレト其人ノ心火有餘ニテ此證アリ此證ニハ医学六要ノ近
制清暑益氣湯ヲ用ベシ又ハ六君子ニ黃連山柘竹茹麥門冬ニナ
ト加味シテ用ルナリ若シ虚甚キハ獨參湯兼用スレシ此證ハ予
カ師傳ノ經驗ナリ惣シテ十神解毒湯ノ證ニモ黃連ヲ加味シテ

用ル夏モアリ是ハ活心法清解散ノ行方ニ似タレモ又ソレトモ遺
ルハアリ所詮予ガ師傳ノ了簡ハ其人ノ心火有餘スルヲ黃連梔子ノ
類ニテ泻シテ心火ノ本分ヲ守ラスルトキハ痘ニ害ヲナサヌホトニ宜シ
クナリテ平和トナルナリ是モ治方過タルハ宜シカラズ起脹ノ前ニ
テハ大カ子湯ナドニテ見合セテヨシ大カ子湯ハ大カ子桔梗芍薬
陳皮荆芥川芎蟬退甘草以上ハ味ナリ此方中和劑ニテ十神解毒
湯ノ證ノ後ニモ用テヨシ虚アルハ人參ヲモ黃耆目モ加味レテ用ルテ
又温中益氣湯ノ證ノ後ハ大方千金内托散ニ加鹿茸是血
補相兼テ甚タ宜シ又温中益氣湯ノ證ニ其當分ハ元氣虛寒ニ

用テ効アリタレモ存ノ外痘發出レテ見レハ赤キニ過キ毒氣ノアルヤウニ
見ユルニハ是モ大カ子湯ヲ用テヨシ全体虚實ニ加味スル用ヨキ薬
ナリ何分見點出揃フ頃ハ此薬ヨキナリ又起脹ノ時ハ用茶ノカワル
トアリ次ニ記スナリ又此大カ子湯ノ場ヲ回春ノ神効散用ル夏モアリ
ソレハ銘々ノ医案ニテ用テ可ナリ古ニハ專ラ神効散ヲ用テ埒明タル
見ヘテ何レノ痘書ニモ一番ニハ神効散ナリ此補瀉兼用ヒタル方故ニ古
來ヨリ用ヒヨカリシト見ヘタリスベテ活心法ニ始メ清解散次ニ調元
化毒湯次ニ清毒活血湯ノ方ハ何レモ神効散ヨリ加味シタル方ナリ活
心法ハ温補ニカラヘテ用ヒタレモ清解ノ方ニハ神効散ヲ至ニシテ

兔角黃耆人參保元ヲ離レヌヤウニシテ元モ二格別ノ熱毒ノ證ニテ
テハ右ノ藥トモニテ八屆又ナリ清解ノ方ニ近來ノ痘科鍵カ至極ヨキ
ナリ活幼心法ノ痘科鍵ト兩書交ヘテ施治スヘシ予活幼心法ノ調元化
毒活血湯ノ類ノ證候ノ熱毒甚シキニハ四味ノ黃連解毒湯加紅花生
地黃又ハ生地四物湯ヲ合方ニシテ用テ功ヲ取ルコト屢ナリサヤウ
ノ時ハ擺茶ニシテ効ヲ即時ニ取ルカヨキナリ是予方傳授ナリ且
ト云ハ躁シキガ靜一リテ元氣モドウヤラ能クナリテ或寐入ルカ食ヲ
好ムカ小便ヲスルカナドシテ形容ヨケレバ是其効ナリ若シ躁カレシ甚
シキニ用ヒテ急ニ靜一リ寢入リテ息モキコヘヌホトニ寢入リテ夕ワヒ

ナキヤウニ見ユルモ脈ヲ見ヨ必和シテ宜シケレバオコサズ寢入ルホト寢サセ
タルガヨシ一時カニ時ニ必サメテ快キモノナリ

起脹之見證用茶

諸起脹ハ痘ミナク出切りテ後ニ水ヲモル夏ナリ此時モ熱毒甚シキハ
清毒活血湯或解毒湯四物湯合方モ用ルナリ又白ケテ痘虛薄ニ用ルハ
保元湯或千金內托散或內托散加鹿茸意ニ任セテ用ヘシ○又色赤キニ
過テモ痘ニ艶アリテ潤フヤウナルハヤハリ内托散ヨシ色赤キニ過テ熱毒
強キハ必艶ナクカラト乾キテ黒ク焦レル氣味見ユルモノナリサヤウナ
ルハ前ノ主方ニテ清解ヲツヨク瀉ヲ用タルガヨキナリ

灌膿

灌膿ハハノ丸水ガ化シテ膿色ニナルトキナリ起脹ト格別ノ療治モナシ
起脹サヘヨケレバ膿ニテルハ手間モイラヌモノナリ又輕キハ起脹一所ヲ
格別ニ日ヲ建ルニテハ及ハヌモノナリ然レモ常例ニテハハ發熱ヨリ三
日ト建テ來ルナリ此時モ膿ケカイナキハ内托散ヨリ熱毒ヲ
クハ大方ガ内托散ニテヨレ虚モ見ヘズ熱毒モナキハ順痘ナリ是ハ内
托散ニハ參肉桂木香ナドヲ去リ山查子ヲ加ヘ用ベシ格別輕キハ服
茶セヌモノシ食事ニ氣ヲ付シ然レモ出物ガ多クハ食モ進ミ機嫌ガ
ヨクトモ内托散ヲ手當ニ用ベシ痒ニテク結痂スルナリタトハ痘別

事ナクトモ痒ミアレハ必アトガツクモノナリ女子ナドハ順痘ナリトモ痒
ミノ手當第一ナルシ其内熱毒ノ痒ミハ六ヶ敷モノナリ借痘瘡解毒ニ
起脹ノ時分ヨク毒氣アルカナキカラ見テ若シ毒氣見ヘハ一角ノ
細末ヲ一分ホドツ用テヨシ或近來蠻國ヨリテリヤアカ渡レリ
眞偽ヲ吟味シテ用ベシ解毒第一ノ丹茶ナリ若シ急ニ求ルコトナ
ラザルモノハ赤水玄珠ノ小靈丹ヲ用ベシ亦毒氣ナキ證ニハ何ニカキラ
ズ解毒ノ茶ナリニ用ベカラス。○明吳門李春懋本草圖云度野伽
一名體亞香南海出于暹羅國以諸獸肉和蜜所製氣味甘凉無毒
正治小兒百病發痘解胎毒初生時未食乳用三五厘合黃連甘草

未蜜調合啞之佳及痘毒未解或小兒二三歲用之預防痘毒患散
癘邪諸解毒赤水小靈丹 解毒發痘之聖藥治紅斑黑陷不
起一切危惡如服此而不見効者決無可生之理矣 硃砂雄黃各
二錢乳香沒藥各壹錢半大蟾蜍取心肝五錢上 鹿麝香三分 右細末取
猪心血雞冠血皂子大每服一丸○身無火熱生酒化下○熱甚
不飲酒紫草燈心湯下即時紅活而起○此丸茶猪心血雞冠血不
キハ蜜丸ニスベシ

收靨 或結痂

收靨灌膿肉ト見ニモナリ是ニテハ元氣モ痘氣モ表ハ張

テ居レ正此時ニナリテハ痘ノ根モユルリ 皺ガヨルナリノレニハ此時ニフト寒
ニ感レ又ハ食滯ニテモ又ハ穢氣ニ觸テモ雜證起ル事ガアルナリ此切リ重キ
ト又ハ寒戰咬牙ナリ寒戰モ熱毒ト虚寒ノニ證アリ咬牙モ同上ナリ虚
寒ニ活幼ノ建中湯ニ參附湯モ兼用ルナリ熱毒ニ活幼ノ加味四苓散或
二陳湯ニ黃連山梔子ヲ加ヘ用ルハ多クハ治ス虚寒ノ證ニハ建中湯カヲ
尽シテ用レモ不治ノ證ニナルモアリサヤウナルハ全体ノ痘重キカ或毒氣
内ニ殘リタルカ訣ノアル支ナレハ是非ニ及バヌナリ其毒氣ノ少シニテモ
内ニ殘リテ收靨ノ時ニ害ガ出來ルモノナリ、

落痂

痲ノ落ルハ仔細モナキ支ナレ是亦證ヨリテ痲ノ落カ子又ハ落ズシテ不
治ノ證ナルモアリ何分コレモ毒ノ残ルカ虚證ノ故ナリ治方ハ方書ヲ考テ
ヨシサニタル六方敷支ハナケレモ不治ノ證トナルモハ必收斂面落痲ニアリサ
レドモ兔角最初ニ療治サヘ違ハ子ハ此時ノ患ハナキモノナリ。諸サカ湯
ノ支瘡ノ輕重ニヨツテ見合ヘシ必日數ニ拘ルカラス。諸瘡後ノ調理
ハ六君子益氣湯或逍遙散ハ物湯大補湯ナト證ニ隨テ用ヘシ。

瘡瘡活套

瘡ノ全体ハ何カラ始ルゾトイハ第一運氣ノ火行ハルニヨツテ其初リ
ニ父母交合スル其行ハル運氣ノ火氣ヲ呼吸ニ出入スレバ自然ト相觸

テ一滴ヲ鎔ナス所ノ火氣其神ニ相附テ内ニ留リ形体成長スレモ猶内ニ
留リ居テ偕同氣ノ運火行ハル時ニ同氣相觸レ感ヨリテ引キ出
サレ天ニカヘルモノナリ天ニカヘル時ハ火氣ハ升ルガ常ナレハ頭面ヘサキ
タチテ最外身ヨリ多ク頭面ニ出ルナリ是常ナリ偕出タル跡カ
瘡トナリテフクレ大豆ノ形ノ如キナリ然ルニ元氣ヲヨキモノハ此火
氣皮膚ヲ破レモ其苦レニ堪テ元陽早ク表ニ及テ事故ナク毒具ニ
一近ニ及ブコトナレ元氣弱キモノニハ此皮膚ニ元陽ノ及フ迄遲ケレハ其
間 氣寒皮膚ヲ犯シナドレテ弥元陽皮膚ニ元氣支ナク表虚ノ證
トナリテ煩悶スルニ及ヘバ不治ノ證トナルナリ

又最初ヨリ虚實ヲ醫師見誤リ或毒氣アルヲ解セスナドレテ
オケル物ハツハ解レテニツ毒残りテ居ル起脹灌膿等ハ其ミ
ニ收靨落痂ノ時ニ至ツテ不治ノ證トナルモノナリ又毒氣モナケレ
斤大分ノ出物ニテ結喉ニモ明キ處モナク胸膈ニモ出ルモノアリ是ハ夕
トヒ十三四歳ニテ食氣モ筋火湯モ理會レテ飲ニ最初ヨリ隨分雜
證モナケレモ灌膿ノ節出物多キユハ悉ク膿ヲハコハス藥食トモニ
通ラヌヤウニナリテ死ス是等ハ是非ナキ天命ナリ大方十二日時分
ニ變出來ルモノナリ又毒氣甚レキ證ハ五六日ノ内ニ多ク死ス此糸黑
ニ焦レ起脹ハ瘡血或灰色ナリ臭ニキ齒齦ナリ瘡破リ開ル

ス多クハ難治ナリ見殺シニモノラリルユハ角ノ末ヲラマアカニ和
シ二三分モ或四五分モ用テ間ニハ助ルモノモアリ此場ニ及シテハ運命
ノ懸ル處ニシテ了簡ニ及ビ難シ

藥方畧記

加減敗毒散 此方初發熱發搐屬實者宜此湯若發搐屬虛者
宜用温中益氣湯

依本方加荆芥防風天麻地骨皮去入參茯苓

加味升麻葛根湯 此方憎寒壯熱頭痛咳嗽鼻流清涕者多因外
感可發散體氣素壯實者宜此湯

依本方加山查紫蘓川芎牛房子桔梗防風右善煎熱服取汗
加味茅蘓飲 此方前證而體氣素虛弱者宜之

依本方加川芎牛房子山槿去枳殼木香

消毒飲

牛房子四錢 荆芥 甘草各一錢 防風半錢

右水煎。一方加黃芩一錢 犀角五分 是熱毒甚者宜之

加減藿香正氣散 此方疑似之間兼食滯者宜之

依本方去半夏加山楂子 痘忌燥無故不好半夏

見點三段之用茶法

十神解毒湯

此方已出未出三日以前痘點煩紅燥渴欲睡臥不
寧小便赤澁者血熱也此湯主之此茶專治身發壯熱腮赤紅臉
赤毛焦色枯者宜之

- 當歸 生地黃 紅花 牡丹皮 芍藥 桔梗
- 木通 大腹皮 連翹 川芎 各等分

右入燈心水煎有熱加黃連。身熱壯盛加葛根前胡。毒盛綿
密加荆芥牛房。渴加天花粉竹葉。小便尿血加犀角梔子。
大便黑加犀角黃連或桃仁。吐血乾嘔加黃連犀角。發紅斑
加犀角黃芩黃蘓梔子玄參。小便赤加梔子。小便短澀加豬

芩澤瀉○小便秘加瞿麥滑石○大便秘加枳殼前胡○大便秘
 力枳殼前胡大黃○煩躁加麥門冬天花粉○煩渴狂亂譫語
 加知母麥門石膏○嘔吐加黃連豬苓澤瀉○嘔加陳皮○咽喉
 痛加甘草牛房子荆芥○泄瀉加豬苓澤瀉
 溫中益氣湯 此方已出未出三日以前痘影淡在皮下不紅活
 唇淡面色白或帶青脈亦遲緩怠倦嗜臥不思飲食形狀靜者虛
 寒也宜之

人參 白朮各五 黃耆生 當歸 茯苓各六 炙甘草
 川芎各五 白芷 防風各三 芍藥 肉桂各三 山查子各六

右姜棗煎服一服中病即止○治氣血虛弱送毒氣不出而驚搖
 狂躁者或身熱雖輕至三四日而怠倦嗜臥不思飲食所出之痘
 影淡白點粒不明此非痘毒輕少亦是血氣虛弱送毒氣不出○
 初發疑以之間發搖屬虛者堪用

張氏近制清暑益氣湯 此方已出未出三日以前痘影淡在皮
 下或交出紅點二三粒驚搖狂躁譫語診之微細數者虛爾無寒
 證也此湯主之或昏睡精神不正者獨參湯兼用

人參 白朮 麥門冬 五味子 陳皮
 甘草 黃耆 當歸 黃蘗酒炙

古姜煎

右件三段ノ用薬少法コレヲ見訣ハ夏秘中ノ秘ナリ始メニ条八見
訣ヤスレ後一ノ條八見訣カクシ是痘疹ノ始終全辨ニ關ル始ナリ

痘科鍵木香異功散 寒戰咬牙痒塌池瀉為裏虛宜此湯

- 人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 附子 肉桂
- 木香 丁香 陳皮 肉豆蔻 訶子

右糯米八煎服

右ノ外種々方アリトイヘド之今補注ノ大端ノ薬ヲ挙ルモノナリ諸
方ニ於テハ法保赤全書痘科鍵木香ノ考ヘレセ々痘疹ノ誤ハ證治

準繩痘疹門ニ詳ナリ考ヘ見ルベシ予カ師傳ノ書ニ痘疹結要ト云
家書アリ此書痘家ノ證治精微ニシ世々先輩ノ論ヲ述タリ伊勢
州平宗安カ述ル所ニ平宗安村上春臺院ノ門人ナリ今其書ノ要
ヲ摘ミ予カ經驗見聞スル所ヲ參ヘテ此門ヲ記スモノナリ

諸雜證總要

○頭疼 止有頭疼輕○目閉 初起ハ不治八九日ハ無事ナリ十三四
日ハ凶ナリ○咳嗽 無事○氣急 初起ハ不治八九日ハ無事○聲啞
初起ハ不治七八日可治或哭泣聲啞色錫ノ如キ者ハ生ク暗ナル
者ハ死ス痲落テ後ハ凶ナリ喘急ヲ熱ル始終不治傷風ノ如ク聲啞ス

儿者不治○喉痛 初起ハ難治ハ九ハ可治痲後ハ凶ナリ○乱語
 初起ハ望シ痲落後ハ凶ナリ○心胸痛 不治○肚痛 初熱ハ無事
 痲落後ハ凶○腰痛 初起及ヒ痘中ハ凶十四日後ハ無事○十指
 冷 不治 手搖 不治○足搖 不治○手足痛 初起ハ凶八九
 日ハ無事○手心疼 用一芍散○足冷 過膝者ハ不治○眼出
 血 不治○耳出血 不治○鼻衄 無事○口吐血 鮮血可治
 黑血不治○尿血 不治○大便血 可治○吐黄水 肚痛ハ凶吐
 不痛ハ無事○吐膿痰 無事○吐臭痰 不治○蛔虫 初起吐
 一二條ハ無事多則凶十三四日吐出即死便ニ出ル丁多者凶○措喉

初起ハ凶買膿ノ時ハ妨々ゲズ○寒戰 初起ハ不治七八日後ハ不死
 ○咬牙 初起ハ不治起脹ノ時ハ凶シ七八日ノ後ハ可治○泄白糞
 寒也理中湯○泄紅糞 熱也可治○泄青糞 寒也理中湯○泄
 黑糞 不治臟腑ノ壞也○痘痲 口渴煩躁者凶○痘痲不食者
 凶ナリ
 古吉凶治不治大抵如是假雖不治證盡力可治之是醫仁術也
 ○脉 發熱ヨリ起脹ノ時ニ至リテハ毒内ヨリ陽ニ出ルノ候ナリ脉
 浮大ニシテ數ニヨリ沉細ニシテ遲ニヨリカラス收靨ヨリ以後ハ毒
 外ヨリ解ス陰ノ候ナリ脉和柔ニシテ洪數ニヨリカラス此大抵ナリ

云ナリ

虚實ヲ不論保元湯唯痘疹ニ定タル方ノヤウニ思ヒ
主方トスルノ甚不可ナリ若シ氣實者又ハ順證ニテ某治不及痘ニ
ウカクト用レハ必害出來ルナリ是當流ノ第一トスルモ思得ナリ原此方
ハ東垣ノ黃耆湯ト云方ナリ蕭山桂岩ノ魏直ガ博愛心鑑ニ此方ヲ殊
外ニ譽又上テ痘疹ノ始終ニ一方ニラスムマウニ云テ置タカラ後人其心
得ニテ用ヒ誤リテ來ルナリ尤痘ハ表氣ヲ堅ク護ルカヨキト云ニテ黃
耆ニ内ノ元氣ヲ表へ引出シ達セシメテ護ル所道理ヨクモ順證又ハ
表實ノ性質ナドニ用テハ實々カエニ却テ痘出兼或出タルモ引込

ヤウニナコト多シ此所ニ隨ハカト念ヲハレテ元氣虚ノ者ニ用レハ何
ノ方中ニモ附子ヲ用ルハ虚寒ト云寒ノ証候タレカナラハ用テ應ノ効ヲ
取ベシ元氣ノ虚寒ニハ功アレモ休ノ痘疹ニハ敵某ナリ附子ヲ痘疹
敵某ト云コトハ世間ニナキ云方ナリ此ハ平宗安ガ每度經驗シタ
リト痘疹結要ニ書ケリ故ニ其書自見解ニ痘火病也ト云論ヲ
設タリ其大畧ヲ云ハ痘ノ病因ハ本火病ニ其火病ニ桂附ノ温熱ヲ用
ル事ナル標ナリ參耆ノ補ヲ用ル事ナル元氣ノ不足ナレハコレモ
標ナリ痘本火病ヲ元氣ニモ不足ノク寒氣暑氣疫氣等ノ障
ナケレバ不某ガ宜キナリ然レモ痘 密ナルハ必元氣ヲウチ或寒

痘疹小傳

暑障リアルベキナレハ其筋々ヲ
 防ギニ某ヲ用ルナリ又難治
 ノ證ハ別ノナリ痘毒木火病ナル故ニ同氣相應ノ常ニ心火ニ属
 シ發スル時モ心ヨリ出ツ故ニ痘ハ輕シトイヘ凡其人生質心火ノ亢ル入ナ
 レハ其痘毒ニ併セテ有餘ニ害ヲナスコアリ然ルニ心火ヲ瀉メ其本位
 ヲ守ラシムルトキハ痘毒ナク發出ノ別義ナレ如此ニ輕キ痘ニサヘ心
 火有餘ノ害アレバ若稠密ノ痘ニ生質心火有餘スレ必難治トナル也
 此所ニ隨分ト氣ヲ付テ可ナリ儲痘ノ心火ニ属スルト云フハ珍シカラヌ云
 分ナレ凡近比ハ此論ヲ云出スモノハ少ク唯理言ノノミヲ云ユハ此ニ痘
 心火ニ属スト云證文ヲ一ニ舉ルナリ準繩ニ我仲仁云痘出之始雖有血

藏心實之○又云痘疹出於心驚搐亦出於心也瘡疹本發熱則
 動心此理之自然云○格致云諸瘡皆属心火心之華在面瘡病
 之候但以面之部位占之思過半矣○又云瘡疹為火火盛則痛云
 云○又云經曰諸痛痒瘡皆属心火○又云少陽所至為瘍疹則痘
 為火毒昭々矣云○治療モ全体ハ中治ト意得テハハ寒涼モ
 大槪ハ解毒湯ヲカキリトスベシ石膏ナドヲ用ル丁ハ格外ノコトノ思
 ヲキナリ世医心法并ニ保赤全書ナドニハ石菖ヲ多ク用テアルナリ
 故ニ此ハヲ入ル丁ナリ菖菖ニテハ月桂丁香乾姜等ヲ限トシテ
 附子ハ格外ノ某ト意得ベシ大抵
 ヲ治スルハ臨機應變ト云

テ其考ヘナシニ用ル人多ケレド雜病ハ害輕シ痘ニ至テハ應寢ノ
考ヘテ遠分念ヲ入ク用ザレバ必即時ニ害來ルナリ雜病ハタトヒ
一旦害アリテモ大方死スルニハ不及痘ニ一旦害アリテハ死ニ極ルモノ
多シ生死判然タル所ヲ重シメ假初ニモウカトシタル療治スベカラス
○儲痘全体ノ療治ハ温補宜シト云モノアリ消毒宜シト云モノア
リ其外ニ方クノ説アレハ畢竟歸一ノ論ナキト云病原ヲキハ
ム待ザル故ナリ經曰治病必求其本云予ガ師傳ノ説ハ先天慾火
論ニシカト心ニ融通メ病根ヲ火病ト立テ置テ儲治方ハ時ノ宜キニ隨
テ温凉善於用ルニ如ク得ルモノ多シ

○儲原痘論三子ノ説ヲ案ニ予ガ師傳ハ保赤ト格致ノ二論ノ先天
慾火ノ説ヲ取テ活幼ノ食ノ厚薄ニヨルト云ヲトテ如何トナレバ惣体痘
ノ病形ヲ察シ見ルニ他病トハ格別ノ所アリ發熱三日見點三日三日ノ
ト三日ツヲ以テ病功ヲ終フコレハ傷寒傳經トイハレカホトニ著クア
ルニアラス言語道斷格別ノ病形ナリ其外病中ノ熱事人共ノ
淨穢生死ノ善惡ニツトシテ不思議ナラズト云フナシ不思議餘
多ケレバ略之是ヲ以テ考レバ明據モ無ク難測トコロノ先天慾火ノ
説カモ見ユ食物ノ厚薄等ノ必々天ノ害ノイタス所ニアラス既
又母血穢ヲ食タルモノハ表へ出ルハ瘡トナリ裏ニ畜フトキ

八瘡積トナリテ別症ノ雜病トナリ
 治方モ別ニアリテ治スルナ
 リヤ。原ノ出ルトキ此血穢ノ毒アルモノガ差合セテ表ニ交リ發
 又裏ニ動ノ驚癇等ノ害ヲナストアリ世俗ニクサシリノ痘ト云
 モノ是ヨリ然レヒ餘リ多ハ無キ證ナリ當世ノ医ハクサシリノ痘ト
 云トコカリンメモ云ナリツレハヤハリ火毒ニテ紫黒ナト云スヲ治スル
 一ヲ不知ク弁シテ無理ニ目利シテ難治ノ證トスルハ誤ナリ活幼
 ニハ據ラシカト取りタキ心ユニ先天慾火ノ説ヲ云消シタルナリ
 右痘疹病原ノ大要ヲ摘ニテ記之者ナリ
 醫療手引草ノ編坤終

醫西療手引艸後序

三編 續 二卷
 西 醫 手 引 草 終

盛哉近來古方之學大行尚傷寒
 金匱肘後千金外臺等書尙不敢
 取宋明以下本邦中古以來專依
 薛氏書治諸病只平々藥劑投之

與之。疾病自愈者。尔洛時鑿。往往
一軌轍耳。時哉。卓識豪英。競起。一
洗舊習。專用寒涼。攻擊。奏奇効者
不爲不多矣。而今有事補者焉。有
事瀉者焉。病客則自察之。虛弱之

病。乞治於補藥家。壯實之病。索劑
於攻擊家。於是補瀉溫涼之術。並
行而不相悖也。嗟呼

本朝。昌平日久。凡百藝術。日精月
審者實

昭代之澤也。予雖淺陋而自弱冠
屢往諸侯之閫。或會平安東都之
醫。講突方書。日事刀圭。既四十年
矣。其數以試効。撰此書記。以國字
者。海內幽僻乏鑿之地。資以施治。

或庶幾可免夭折之患。焉是蓋先
人遺命。而松梅院序文所述。所以
誓於

聖廟也。若夫議當時醫風者。我豈
好辨。不得已也。實不顧僭踰。記以

述其志耳

寶曆甲申孟春皇都盛塘滕懿之
於三河國府主篤菴中謹書



每部須認
此圖記

明和三丙戌年正月

心齋橋南一丁目角

同木挽中之町 高田清兵衛

高麗橋一丁目角 鳥飼市兵衛

淺野彌兵衛

浪速書肆

烏巢先生著

傷寒通玄類證

刊行

金匱通玄類證

撰註 未刻

醫療手引草

中編下編 二冊

病家示訓

增補附錄 未刻

醫療手引草續編

各門方旨 二冊

和韓葭考

後編附家授切紙傳 一冊

同別錄

一冊

未刻

治痢經驗

和韓人參考

醫通纂要

藥籠中全各 一冊

方的

的効方附六經證治綱領 各病諸珍 全一冊

古方活用

未刻 二冊



