

• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN

ヤ 9
1095

骨度正誤圖說

村上宗占著



79
1095

骨度正誤序

蓋醫之術大也人之死生係焉而其疾病多端詳察其症以為之治或藥餌或針砭或灸艾或按摩各通其一科用以取驗此之謂醫也

國家升平百有餘年豪傑并起夫人專門不乏其術唯經絡骨度惟難嚮水里

壹列公出村上宗占所著書示不佞
命序不佞熟讀其書錯綜諸說參考百家
正其違刊其謬間加己意以發千載
不言之妙於是乎經絡之理骨度之法
瞭然明于今不佞箕裘之業自結髮時
講求經絡骨度嘗有大疑於是書乎大
疑頓解嗚呼宗占之術可謂勤矣別有

二火一得評其言亦可觀也水野公寬
弘君子宗占屢遊公門則宗占之為人
亦可知也不佞雖未知宗占是以序云
延享二歲次乙丑臘月

江都官醫井上雅貴撰



骨度正誤自序

夫氣血者譬_ハ如流水也。經絡者猶堤坊之在河水也。是以流水為物妨礙_{スギハ}則妄行汎濫以遂失其性也。矣人之經絡為邪壅塞則氣血為之不行而疾病立至焉。欲治之者能視其通塞因_テ其正道而考其經絡究其俞穴於斯也。鍼灸湯液施其宜豈可不九折相慎乎。故伯仁曰不明經絡則不知邪之所在信哉此言也。今也考究經絡



穴者。或有焉。或無焉。奚得其眞乎。蓋俞之正道在骨度。骨度一差。則穴處無不差。而穴處差。則灸刺非徒無益。且施害於人也必矣。故聖人立骨度之法。以垂教於後世。實不易之法也。向來經絡之書。灸刺之法。積為卷數。周行于世家。喻戶曉。其有功於學者。亦不少焉。然未合經旨者。間在矣。或曰。視此書。大凡的張介賓而議。汝曾有讎于張氏。欵抑按。景岳者。明朝醫家之孤。

霍德高才智豐。而天下顯名之人也。合靈素二經之類。照已之見識。著二經之註。間啓發蘊奧矣。其功績至大哉。舉世而賞焉。後學講二經者。多賴於類經也。汝今舉張氏之說。以為非。而議者恐闊人之情。而不可也。予應之曰。雖智者亦不能無一失也。凡。是。為。是。非。為。非。者。天下之通論也。蓋。按。類經附翼。心主三焦。命門辨其下者。是之高者。非之。又圖翼謂。背俞篇。俠脊寸法。

志篇草度之法象。胸腹骨度之折法。肩至肘骨度之註。俱皆非經肯也。雖然舉世以為博識敏達。故不正其非。而是之信之者衆矣。余曾嘆其以繆傳誤。故為吾子第著此書。名曰骨度正誤圖說。不敢有仇於張氏。不得已也。篇末草度之法象。別以國字和解。而便於初學。童蒙云爾。

延享元年甲子十一月冬至日

村上親方宗白自叙



凡例

一先輩數多出銅人形圖畫矣。予嘗視其圖畫間。有差繆故。初學迷其正疑。予以所學。千師爲子弟。出圖畫焉。於胸腹手足附刻。骨度之尺寸。而使俞穴知分寸也。貟附刻而可知骨度穴處之尺寸。是發前人未發也。

一篇中獨的張景岳而議焉。不敢有讎焉。按晉自皇甫謐下。至明世豪傑起。而經絡之書今不乏。蓋各有得失。今不暇儀。其中景岳尤爲博識。顯名之人。舉世賞焉。然錯骨度。故俞穴之尺寸。


亦間差有不似于景岳之聰明也未聞有正其非者却而是之者有焉予曾嘆傳誤於世斯以爲敵而議焉

一銅人形圖系彩以某藏府之色由于素問經絡論也藏經濃府經薄今所彩肺經銀○大腸經胡粉○心經朱○小腸經丹○心胞經紫三焦經薄紫○腎經黑膀胱經薄黑○脾經黃○胃經薄黃○肝經青○膽經綠青○督脈金○任脈銀視其系彩而可知藏府之經行矣

凡例終


銅人形總圖

俞穴中三角者禁針
四角者禁灸



目錄

- 一 銅人形經俞校正惣圖 幷骨度正誤圖
- 二 仰人之骨度差繆辨
- 三 同正義
- 四 同詳解
- 五 巨闕一穴一下說謂臍上六寸當爲六寸半辨
- 六 脖至橫骨一下說謂五寸也正義詳解
- 七 兩乳濶在骨度爲九寸半取經穴者當爲八寸辨
- 八 肩至肘一尺七寸一下說有誤以辨
- 九 同正義



十中指本節至末四寸半辨

土胃經下行腹之經六骨度辨

土督脉之穴處所在衆說與景岳不同以辨

三背俞寸方辨不同

古同或問二條

五血氣形志篇草度之方解

共同草度之方象國字解


亡脊骨長短



充張外賓草度方解

大或問草度之方



三背俞篇俠脊辨


目錄終






洞人形脉圖






承靈脛空玄督脈各二寸一分
風池去督脈二寸
絡却玉枕去督脈各一寸五分
天柱去督脈一寸三分



曲池至腕之陽谿一尺二寸半



禁灸之穴歌
數唱而可記臆焉

禁灸之穴四十五。承光、瘦門及風府。天柱、素髎。
臨泣上、晴明、攢竹、迎香、數、禾、布、顴、布、紫竹、空頭。
維下、關與脊中。肩貞、心俞、白環、俞、天牖、人迎俱。




乳中。周榮淵液并鳩尾。脹哀少商魚際位。經渠天府及中衝。陽關陽池地五會。隱白漏谷陰陵泉。條口瀆鼻與陰市。伏兔脾關委中穴。殷門申脉承扶忌。

禁鍼之穴歌

三十二穴不可鍼。腦戶。顙會及神庭。絡却玉枕角孫穴。顱顙承泣與承靈。神道靈臺膻中忌。水分神闕並會陰。橫骨氣衝手五里。箕門承筋及青靈。更加臂上三陽絡。
婦人常禁石門穴。合谷三陰交孕忌。若深肩井，人悶倒補三里穴，必平安。莫深刺雲門鳩尾。缺盆並客主人穴。

村上親方宗白自畫



自天樞至橫骨六寸半蓋腎經與任脈可為脅下於五寸也
脾胃之兩經者可取於六寸半矣

此內經之本旨也




如此脅下之骨度諸經皆爲五寸
則脾胃之兩經穴處不居本位也

故爲誤焉

異說

近世所謂歸來當橫骨下者誤也按歸來在橫骨之上廉也氣衝者在歸來之下橫骨之下廉也歸來在橫骨下則氣衝無可著地矣圖翼誤骨度也

近世之人脅下之骨度諸經等量于五寸者非也矣



腎經與任脈者脅下五寸

矣也旨本經內此說正


骨度篇類經註曰肩者肩端也云是以今世之醫肩端自肩髃至曲池爲一尺七寸者甚誤也

骨度篇曰肩至肘一尺七寸者脊中至肘後骨尖爲一尺七寸矣自肘後骨尖至腕橫紋一尺二寸半自腕橫紋至中指本節四寸自中指本節至末四寸經曰四寸半按半字衍也可削蓋此章別有口傳矣

矣也旨本經內此說正

自天突至肘之橫紋長一尺七寸

自腕之橫紋至中指之末八寸



矣也旨本經內此說正


骨度篇類經註曰肩者肩端也云是以今世之醫肩端自肩髃至曲池爲一尺七寸者甚誤也

骨度篇曰肩至肘一尺七寸者脊中至肘後骨尖爲一尺七寸矣自肘後骨尖至腕橫紋一尺二寸半自腕橫紋至中指本節四寸自中指本節至末四寸經曰四寸半按半字衍也可削蓋此章別有口傳矣



肝經繞乎陰器圖

四十經發揮表圖



骨度正誤圖說

土浦城醫員 一得子村上親方宗白著

男

村上宗民

飯山城醫員

門人

岩崎隆碩

輯

東都

隱醫

友生

加藤俊文

校

(二) 骨度篇曰、缺盆至天樞八寸、橫骨六寸半云云。天樞至橫骨六寸半云云。

類經圖翼胸腹折法曰、胸腹折法直寸、以中行爲主、自缺盆中天突起至岐骨際上中庭穴止、折作八寸四分、自鶴筋上岐骨際下至臍中折

作八寸自脣心下至毛際曲骨穴折作五寸也。胸腹直寸法並依之云。按此說非也。由張氏發此語以後世醫從之者衆矣。又醫學綱目立異說甚非也。非自誤而使學者誤焉。从賓樓英二子素明經史博通諸家之言而註內經也。多所發明故今有助於醫家不少矣。雖然其於骨度有註解之誤也。二子之聰明如何如此哉。按周身之輸穴分寸者以骨度量之也。骨度俞穴一差則灸刺不徒益而却施害於人也必矣不可不慎也。張氏曰自鶻筋上岐骨際下至脣心謂不

八寸也。由是觀之則自岐骨際上至天突爲九寸分明也。自張氏發此語以來今之醫多本之也。愚嘗聞當世談經絡者言自缺盆中天突至岐骨之推端九寸自岐骨至脣中八寸自脣中至橫骨上廉五寸云此豈經之本意乎。按皇甫氏王氏滑氏馬氏之輩皆云自缺盆中天突至鶻筋九寸鶻筋至脣中八寸脣中至橫骨六寸半是經意也。予不才雖不足以論先學之是非。唯恨張氏背經旨且差四子之說而立異說誤骨度也。予是以論先輩之是非以示同志之者。

詳義如左

(三) 胸腹之骨度，近世所以誤者，熟考之。十四經發揮任脉。伯仁氏曰：靈樞經曰：鶻筋即岐骨也以下至天樞。天樞足陽明經之穴，腰旁二寸，蓋臍與平直也。長八寸，而中脘居中是也。然人胃有大小，不可拘以身寸，但鶻筋以至脅中，以八寸爲度，各依部分取之。云夫惟伯仁發揮經旨，周悉詳盡，反復丁寧，既如此後人學經絡者，莫不依之。誠爲經絡之學，則矣。張氏以岐骨分骨度，其意蓋即岐骨也。本于如此之細註，歟然則不達經所謂鶻筋之義也。愚按：即岐骨尚爲初學作詳解，如左。

也之細註好事者所加也乎？或岐字則蔽字之誤，歟！伯仁之才何有？鶻筋蔽胃岐骨之義不明，歟！即岐骨也者非伯仁之言也必矣。何以言之？所謂人胃有大小，不可拘以身寸，但鶻筋至脅中，以八寸爲度，各依部分取之。云以此爲證，伯仁如此，丁寧而誘人也。然今諸家多以岐骨分骨度，豈可乎？經曰：缺盆至岐骨，分骨有九寸，則經直可說。至岐骨何言至鶻筋哉？依文原義，經意可觀也。嗚呼甚哉！諸家之誤也，尚爲初學作詳解，如左。

四經曰缺盆至鶴筋九寸度之者先上定天突又定兩乳間於膻中而自天突至膻中量之爲六寸八分也言天突下一寸璇璣璇璣下一寸華蓋華蓋下一寸六分紫宮紫宮下一寸六分玉堂玉堂下一寸六分膻中也合六寸八分也又膻中下一寸六分之處當爲中庭穴也當一千岐此寸用上六寸八分又中庭下六分之處當爲鶴筋之端也又謂鳩尾骨蔽心骨也上自天突下鶴筋通而度之即有九寸此非予臆說也經所謂缺盆至鶴筋九寸者是也經分骨度皆以

用其處之界限也假令天樞至橫骨肘至腕之類也聖人之言不苟夫鶴筋者蔽心骨而從歧骨之間垂下如指大骨也附于胸骨之部分也是胸腹之限也經至鶴筋分骨度豈不宜乎是爲胸腹之界限也不察于此而以岐骨爲限以分骨度豈合經旨乎捨蔽骨而操岐骨豈合骨度乎故余不隨當世之說也是以今爲骨度正誤之圖以示友人蓋雖胸腹之骨度以蔽骨爲界限而蔽骨由人不見或有浮沉長短異不拘之只從天突至中庭八寸四分胸部直寸法皆

可用之矣蓋中庭當岐骨之上一分許也

下說
云中

庭岐骨之上六分膻中岐骨之上二寸二分云又云胸部直骨一度天突至岐骨可為九寸云此甚誤也如所謂則胸部之寸方皆差故有害也必矣

按從岐骨際下長

一寸當爲鶻筋之分而從岐骨際至膻中當爲

九寸太腹直寸法用之矣是非予臆說詳議口

授

(五)巨闕一一穴今人多言膻上六寸非也是亦自張氏始是由岐骨蔽骨之差也當爲六寸五分矣伯仁曰上腕在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸巨闕在鳩尾下一寸鳩尾在蔽骨端其骨垂下

如鳩形故以爲名臆前蔽骨下五分鳩尾穴也人無蔽骨者從岐骨際下一寸之長蔽骨愚謂骨度之法自鶻筋至膻中八寸上腕當于膻上五寸去蔽骨三寸也巨闕在蔽骨下一寸五分巨闕與上腕相去一寸五分也須知巨闕膻上六寸五分也近年岡本爲竹著十四經和語鈔任脉巨闕上腕說云滑氏巨闕註誤愚謂伯仁之註全不誤巨闕上腕之和語之說全誤也學者宜審之經曰脅至橫骨六寸半矣張氏云自膻心至毛際曲骨穴折五寸膻下骨度等用之今人多從

之按脅下骨度不可等爲五寸也等取于五寸者非也蓋任脉與腎經者取脅下於五寸而已非爲骨度也度之者先取神闕與曲骨中間之長折作五即折出四而伸之當于神闕與曲骨則上端神闕下端曲骨也每中折点之也中極關元石門陰交也通而爲五寸氣海一穴在石門與陰交中間也腎經亦如此自橫骨至肓俞折作五可量也脾胃之兩經者可取脅下於六寸半矣等取于五寸則胃經氣來低而不居本位也學者宜校正焉經曰脅至橫骨六寸半者

(七) 非與今言五寸者是與其如之何有圖見前
經曰兩乳濶九寸半是骨度也圖冀曰灸法以

八寸爲當今醫有謂張氏之發明者殊不知焉明於滑氏發揮也豈是張氏發明乎兩乳八寸不知所以然者多焉愚謂自膻中橫至神封二寸神封至乳中二寸左右合而得八寸施鍼灸於胸腹者橫閑之寸法依之也矣

(八) 經曰肩至肘一尺七寸張氏云肩者肩端也愚按肩端自肩髃至肘曲池爲一尺七寸歟也是亦非也近年世醫多宗之是之且樓英說共合

而施於世如此則可調以誤傳誤矣下人誤而衆人誤焉可嘆之甚也夫以骨度篇所說人長七尺五寸者橫直等調也如張氏之說自肩端量則中手奔骨而相捨兩肩之間惡合骨度可調張氏千慮之失也从賓既如此况後學乎九按肩至肘一尺七寸度之者舉臂伸手於左右而自大推下奔中至肘尖可爲一尺七寸也今人肩端肩髃至曲池爲一尺七寸者繆也十經曰中指本節至末四寸半也愚私按半之下字衍文削去可也不然不合于骨度也尚口授

(土)胃經下行腹者考之於經氣府論曰挾鳩尾之外當乳下三寸挾胃脘各五挾脅廣三寸各三下腋二寸挾之各三云經文浩浩乎如望洋因而諸說亦不同也甲乙經曰腹自不容至氣衝二十四穴挾幽門兩旁各一寸五分張氏從之發揮註曰自不容至滑肉門去中行各三寸自天樞至氣來去中行各二寸馬氏從之高武亦同之李梃異焉愚今去中行以二寸爲是也按不容非幽門旁也先輩謂幽門旁對巨闕者非也不合於骨度也骨度之法自髃骱之端至

脣中八寸用豎兩乳之間八寸用橫也人無體
筋者岐骨至脣中作九寸而可度也以此法巨
闕爲脣上六寸五分幽門者巨闕旁不容者可
爲天樞上六寸矣胃經下行腹者自不容至歸
來去任中各二寸也

○十四經曰日月期門下五分愚按非也當爲一
寸五分 ○溫溜穴口傳

○小腸經肩貞臑俞天宗秉風曲垣經行穴處口傳

○髀關二穴口傳此四章著于俞穴辨解

○督脈之穴處張景岳定於脊節之高處者非也

豈然乎按周身之俞穴者所爲榮衛神氣之遊
行交會而皆孔隙也故處在或大骨之際小骨
之下大筋之下小筋之上或骨際陷中空隙也
一不在尖角之骨上所無孔隙故曰孔穴焉如
張氏之說豈節上所無孔隙而榮衛神氣之會
者也哉須爲千慮之失矣余斷然而不從學者
察焉滑氏取於脊骨之低處者是也

○背俞寸方辨不同

膀胱經背二行滑伯仁曰相去脊中爲一寸半
三行相去脊中爲三寸也張介賓曰在二行當

爲二寸在三行當爲三寸半云也二氏之說各不同蓋滑氏爲是張氏爲非雖近世之人謂滑氏爲是或張氏爲非而未知其是非之本源者多焉知其本源而後可謂是非也夫惟背二行五藏俞穴者出于背俞形志之二篇矣伯仁觀經旨也詳而正矣誠爲經絡之達人矣雖不見其人視十四經發揮則思過半矣众賓者天性聰明無不通于諸家而博識精敏也註于內經也啓蘊奧而大有助于醫家者也我視其類經則起而再拜稽首而讀焉嗟呼非常之人可以

讚焉可以賞焉然於背俞之寸法也誤者何乎也蓋千慮之一失也

靈樞背腧篇末章曰腎腧在十四焦之間皆俠脊相去三寸所云云類註曰此自太腧至腎腧左右各相去脊中一寸五分故云俠脊相去三寸所也此註得經旨而正不可改焉然又圖翼曰在二行當爲二寸在三行當爲三寸半云言出於一口而齟齬如此可謂甚錯謨焉所以然者顧形志篇草度之法觀經意也差矣姑舉草度之經文並以張氏註文謂其所差乎經曰欲

知背俞先度其兩乳間中折之更以他草度去半已即以兩隅相柱也類註曰先以草橫量兩乳之間中半摺折之又另以一草比前草而去其半取齊中折之數乃堅立長草橫置短草於下兩頭相柱象△三隅乃舉此草以量其荷令一隅居上齊脊中之大推其在下兩隅當三推之間即肺之俞也云愚按兩乳之間爲八寸也經文先度其兩乳之間中折之則一偏四寸也更以他草度者以另草度中折之一偏也是四寸也去半則二寸也是經旨也張氏所爲者異

之先量兩乳之間中折而又另以一草比前度八寸之草去半此草四寸也以四寸之另草加八寸中折之兩端兩頭相柱象△三隅云非是經旨無以兩隅相柱之義矣可謂以四寸之草加八寸中折之兩端也即成三面等四寸之象以之量背之俞穴故兩穴相去四寸也背俞往而無不爲二寸矣背俞篇註曰自太腧至腎俞左右各相去脊中一寸五分故云俠脊三寸所云矣於形志篇又爲四寸如斯豈不爲錯誤乎熟按張氏背俞篇之註說得而正矣確乎而不

可易焉然雖草度之法詎不自覺却而以背俞篇之註正自己爲非者歟也斯以改而巧言穿脊骨圖翼曰脊骨內闊一寸凡云第二行夾脊一寸半三寸行夾脊三寸者皆除脊一寸外淨以寸半三寸論故在二行當爲二寸在三行當爲三寸半云前後其言出於一口而齟齬差謬無甚於此矣張氏先誤草度之法也經文更以他草度去半已云此中有蘊奧而義存焉張氏不考索之故所爲之法象成四寸三面之象故背之俞穴兩穴相去爲四寸也齊之於大推自肺

(十四)

俞至脾俞下四度則當于十三四推而各不當于本位豈是不爲誤乎學者以張氏所爲法象量背之俞穴試可知焉

或曰居古人之位倣古人之事難矣後人議前人易焉吾子以張氏之說數爲誤者恐不可也張氏爲天下顯名豈得爲議之乎予應之曰凡是以爲是非爲非天下之通論也張氏之功固不可奪焉然其間有不合經旨者故予辨論之舉一廢百古人所惡何妄意誹議乎

○

或問吾子數謂背俞之寸方古人不云適當故

紛紜之說起焉吾子獨得經旨而知其適當歟願聞其說焉予應之曰按皇甫氏王氏滑氏高武氏李氏馬氏皆曰相去脊中爲一寸五分矣夫惟背之俞穴也者醫之先務也知其正路而不可不識其所在故學者進步一差秦胡遂隔絕予是以辨明之爾

(五)

血氣形志篇讀草度之法者去半之下加于使之作四方此五字而可視便可知相柱之義也柱字彙肿與切音主掌也掌邪柱也蓋兩邪柱相對則上尖下廣如鱗形似琴柱故謂相柱也

有四方之物而斜隅與隅等相合作三角之象是謂相柱也經先度其兩乳間中折之更以他草度去半使之作四方已即以兩隅相柱也經文雖無于使之作四方之五字其意含蓄于去半已之中矣是聖經之蘊奧也未有四方之物而何合而得相柱歟不然則經文何指謂已何以謂兩隅何合謂相柱乎哉學者其察諸伏惟雖恐憚於聖典私加使之作四方之五字於經文而便于初學不敢爲達人也

(六)草度之方象國字解

愚按スルニ草度ノ法諸家紛糾ノ説多クソ初學ヲ迷ハシム唐ノ啓玄子王冰ヒトリ草度ノ法經旨ヲ得タリ以テ據トスヘシ然レバ其註文簡約ニシ初學曉シカタシ明ノ李華子馬註化が註證發微ニ草度ノ法解アリ其註文絲絇トノ正シカラズ惟ソノ云トコロ其兩隅當以三寸爲闊則各俞正合去脊寸五分之度ト云フモノ背俞篇トアリ其他ノ文言通シ難シ同世張介賓類經ノ大事ヲ成セリ然ソ草度ノ法解アレ氏其法象ヲ錯リ背俞ノ寸法ヲ誤ミ百有餘年誤リラ世ニ傳ナ

イニ敢テ其非ラ正ス者有ヘラ闕カズ嘆スキカナ今予獨リ其非ラ正サント故ヘ故ニ初學童蒙ノメメニ和諧ラ以テ草度ノ法ラ圖解スルヲ左ノ如シ


血氣形志篇曰欲知背俞先度其兩乳間中折之更以他草度去半已即以兩隅相柱也云云先度其兩乳間トハ度ハ量ナリ古ハ細長草ヲ以テ量リシナリ今ハ細長キ紙ヲ用ニ便利ナル故ナベナリ紙細ク截ッテ先ヅ兩乳ノアイダヲ量ル是ラ八寸トス中折之トハ右ノ乳ノ間ヲ量リシハ寸ノ紙ヲ真中カヨリニツニ折バカタム四寸トアル也

サセ

偏四寸

ハ寸ノ細紙ヲニツニラレバカメ
カタ四寸シニナルナリ圖上

ノコトシ



偏四寸

更以他草度トハ更ハ改ナリ他ハ別ナリ改メテ別々
細キ紙ヲ以テ前ノ中ニ折ル四寸ノ紙ニシラ^ク是ヲモ又
四寸トス圖左リノ如シ

長四寸

更ラニ別ノ紙ヲ以テ前ノカタニ四
寸ニシラ^クハカリ取レナリ

去半已トハ右ノ四寸ノ紙ヲ又ニ中ヨリニツニラル也ニ

ソニ折ハニ寸トナルカ又く捨テニ寸ヲトル故ニ半バラ
去ルト云


ニ寸去リヌテ

上ミニ寸ヲ切リステ下モニ寸ヲ用ユ

ニ寸


此ノニ寸ノ紙ヲ以テ法トシ紙ヲ四角ニ切テ
ニ寸四方トナス是ヲスヂカヒニ折リ角ト角トカサニ
合セテ三角ウロコノ象トナスナリ即チ以^テ兩隅相柱^ト也トハ是ヲ云フナリ隅ハ角ナリ四角ノ紙ヲ角ト角ト
フアハスレハ三角トル此ノ三角トナリメル形ヲ柱スト
云フナリ圖左ノ如シ

臂解



二寸
四方

右ノ二寸ノ紙ラ法トシ如此
ニ寸四方ニ紙ラタツナリ



二寸四方ノ紙ラ圖ノ如クス平カイニ折ル
是ヲ斜メニ折ルト云フ也是上ミニ云フ
トヨロノ角ト角トアハスルナリ

三隅之象

隅ハ角ナリ三隅ハ三角ナリ上ミニノスキカ

イニ折リタル如此三角ニ成リ鱗形ノ如

乃舉以度

其背令其一隅居上齊脊大推兩隅在

下當其下隅者肺之俞也

云云


右ノ三隅ノ象ヲアケテ以テ背ヲハカル上ミニノ大リヲ大推ニア

テ下モ兩傍ノトカリ便ナ背ノ二行ニタルナリ圖ノ如レ

下兩隅ノ端シニ丘ス丙俞

相去ルト全ノ三寸ナリ是レ

背俞篇ト相食ス



大推

復下一度心之俞也

云云

是レ背俞篇トアハズ按ズルニ心之俞也以下ノ經スウム

ガウラクハ缺語アラン背俞篇トアズ先輩ノ註解モ詳
カナラズ予コラ以テ疑ヒラ缺テタ、草度三隅ノ象ヲ
用テ復下一度復下一度ノ法ヲ用ヒズ三隅象下ノ
兩隅ヲ用テ背俞ノ二行ヲ量リテ其兩隅ノハシニ点ス
兩俞アヒ去ルト全ク三寸ナリ背俞篇トマリ故背俞
篇ラ主トメ草度モ亦三隅ノ象下ノ兩隅ヲ用ナリ五
藏俞ニ点セハ皆俞篇ニシタガイ某ノ俞ハ某ノ推下
ニアリ幾度モ脊椎ヲ数エ正ソ詳ニミ誤ハ勿レ壁ニ井
俞ニ点セハ九推ソ下脊中ニ假点ソカノ三隅ノ象ヲ以テ
豎ニニツニ折リ下兩隅ヲ合セ脊中如此折メノ下角ヲ

假点ニ合セ左右ニヒラキ兩隅ノ端ニニ点ス兩点相去ル全
三寸ナリニ行通ノ皆是ニ倣エ是レ予ガ臆説ニ非ス背
俞形志ノニ篇並行レ相悖ラザルナリ又一法アリ胸腹
背鍼灸ヲ施ス横ニ開ク骨度ノ寸法ハ某ノ兩乳ノ間ヲ
細紙ヲ以テ量リ八寸トス四ツニ折リ一折ヲ去ルニ折ヲ取リテ
シトカヨリニツニ折ル偏トニ三寸ナリ折ラ脊中ニアテ左右
開キ其ハシラ背ノ三行トラリトス壁ハ魄戸点セハ三椎
ノ下脊中ニ假点シ彼細紙ノ折メラ假点ニアテ左右開
其端ニ点ス三行通リ各俞皆コレニ倣エ三行ハ上附分ヨリ
下秩遇ニ至リ各脊中ヲ相去ルヲ三寸ナリニ行ハ上ミ太極


ヨリ自環ニ至リ脊中ヲ相去一寸六分ナリ皆兩乳下
寸ノ骨度ヲ用ニテ行三行ニ点セハ背俞篇ニ説リ所ノ如ク
肺俞ハ三焦ノ間ニアリトスハ三推ノ下四推ノ上脊中ニ假リ
点シ点ヨリ横ニ開ケ一寸五分ナリ肺俞以下コレニ倣エ脊
推ヲ數ナリ再三詳ニテ差フヲ勿レ

(十七) 脊骨二十一節アリ大推ヨリ尾骶骨ニ至リ長フ三尺ナリ上
七節中七節下七節長短同シカラズ中七節ハ推節ナ
ガシ上七節ハ中ヨリ短ク下七節ハ又短シ按スル申シ
經註證發微類經等ニ脊節ノ長短ヲ説ケテ詳ナリ
類註曰上節各長一寸四分分ノ一即チ一寸四分一釐十
リ共九寸八分七釐中七節各長一寸六分一厘共一尺
一寸二分七厘第十四節與脅平也下七節各長寸
二分六釐共八寸八分二厘總共二尺九寸六釐不
足四厘者有零未盡云愚按スニ脊推尤モ數エガメ
シニ子ノ説尤モ是ナリ然ニ初學其眞當リガタシ予コ
レヲ師ニ得タリ別口授アリ

(十八) 或人問テ曰老子カ云フトヨロノ草度ノ法ニ寸ヲ以テ法ヒ
四角作りニ寸四方トシ是ヲ斜メ折リ角ト角上合セテニ禱
ノ象トナスト云フ經文ニ見エズ證トスモナシ恐ウハ臆説ナラ
ニ辛吾百經文ノ謚與客易ニ曉スカラズ篤ク學ヒ深ソ思

久フノ然後ニ意味ノ深長ヲ覺ベシ去半已即以兩隅相
柱ストキハ柱セザル前半是ラ法トシ四方作り已リ兩隅ヲ
以テ相柱スシ柱スルトキハ三隅ノ象トナル蓋シ三隅ノ象曰隅
ヨリ生ス四角ナルモノ角ト角トラ合テ三角生ス是レ四隅文中ニ
含蓄ス古文辭ノ語意カクノ如ニ學者熟讀玩味ノ後得シ
○柱ノ字字彙ニ本音直呂切音除上声楹也家ノ柱
ラナリ又腫與切音主掌也掌ハ邪柱ナリ邪ノ
字ナメト訓ス邪柱ハシラノ斜ミガニタルナリ經
相柱スよハ相ハアヒ對スル義ナリニ本ノ邪柱アヒ對ス
上ミ尖リ下ヒロシ鱗ノナリノ如ク琴ノ柱ニ似タリ故柱云

(十九)張外賓考ル益度三隅ノ象經旨ニ彷彿タリトイビ其
象豎長ク横廣シ圖左リノ如シ



八寸中折ノ長草ヲタテニ立テ四寸ノ短草ヲ
下ニラキ中折ノ兩端ニ加エテ三角ノ象ト

ス此ノ圖ヲ以テ背ノ俞穴ヲ量ルトキハ穴處ノビテ各々具
本位ニアタラズ背俞篇トアハズ用ヒガタシ

○予ガ考ル草度三隅ノ象下ノ兩隅相去ルヲ三寸背俞篇ニ
合スト云エビタテ短クノ肺俞以下復メ一度ヲ下スノ法
アハズ彼因テ是ヲ見レバ草度ノ法疑ヒアリテ用ヒカタシ斯
以ソノ疑ヲ闕ヒテ用ヒス背俞篇遂ナキラ以テ正キ據トソニ行

脊中ヨリ一寸半分三行脊中ヨリ三寸トスルナリ是レ經カウ本旨ナリ疑フ勿レ蓋シ俞穴ヲ取ルニ基リ俞ハ某推下、左右ニアリ能推節ヲ數エ正レ取ヒシ推節數エ難シ口授アリ

(三)再按草度ノ法从賓經旨ヲ觀ル錯レり故ニ草度ノ法象四寸三面ノ形イ象トナル是レ以テ收藏ノ俞穴ヲ量ル兩穴相ヒ去ニ四寸ナリ尚又四寸トナスベキノ証トノ昔俞篇ニ所謂皆俠脊カギテコ相去ニ寸所トニフタ據トノ圖翼曰云云前見工タリ其俠脊ト云經文ニ因テ脊骨一寸除脊外ヨリ量皆絳旨ニ非ス自見臆説ナリ予經文中ヲ閲ルニ俠骨加フフ軒俞篇ノミニニ非ス氣府論足ノ陽明白俠鳩尾外

云云俠胃脘云云俠臍云云下臍ニ寸俠之云云此俠也是ソーブヤバ何ニ寸トソ除クベキヤ从賓コレラト行學者コレラ思ヘ脊骨ハ中ニ在リ二行三行ツノ両旁メクル鳩尾胃脘臍トモニ中ニ在リ胃經ソノ両旁ラメクル故ニ俠ト云フナリ俠ノ字深意ナシ从賓が説恐ラクハ經旨ニアラズ故ニ予脊骨ヲゾゾカズ脊中ヨリ分ル者此レガタムナリ

骨度正誤圖說終

書肆

江戸日本橋通三町目

須原屋平左衛門

骨度正誤跋

醫民命所係，任重業博。爲其術內經爲本，方藥爲未病論定而治療立。本末明而治療施，譬諸大匠作于廣廈，掌規矩準繩，得心應手，無施而不可也。故醫國濟天下之名也。漢唐之間，諸名家出，而從內經有不失其義者矣。歷世到今日，醫家者流勃然于世，立功爭名，診候之務摩頂放踵，無不盡惟方是求，惟治是求，益治療之要雖在于方藥，捨本務末，雖多奚爲乎？同寮宗白平素讀內經精力過絕，人遂得其旨統，嘗著《骨度正誤》又素問血氣。

形志篇草度之文簡約而旨意深淵讀者難爲類
經草度解雖張氏聰惠辨博未盡焉於是乎草度
之方象出圖而書於所得以辨解之大發明經旨
無餘蘊矣使學者易曉指掌粲目也發先輩之所
未發也誠不朽之確言也嗚呼經之蘊奧非闇記
研究日久豈可其得乎骨度正誤形志篇草度方
解合而著之發張氏之未備而遂成一家言者也
寶曆二年壬申五月七日與忠廣玄伸書于京都
茅坡園

明治十九年四月求

鳥飼貯持

