

泰西外科叔功

上

ヤ 9

1101

1



外科收効序
余嘗謂縫合金及傷及將帛紮束之
法世俗以為昉于和蘭此殊不然也
後漢書華佗傳云病結積在內鍼藥
所不及者便飲其麻沸散須臾便如
醉死因破取病若在腸中便斫腸瀕

洗縫膜膏摩四五日瘡不痛通鑿唐
紀載則天長壽二年大常工人安金
藏為明皇嗣不及引佩刀自剖其胸
五臟皆出使醫內五藏以桑皮線縫
傳以藥是可以證漢唐而上已有其
法也陳實功外科正宗及福惠全書

願體集王渙洋偶談紀老神仙事皆
載縫合金創以帛紮定是可以証明
清而下亦有其法也唯至于縫合之
法繡縛之術則闕畧亡傳攷其他瘍
科書率用止血散血藥而已可謂鹵
莽亦甚矣外科收効二卷學繡縛法

數十條丁寧及覆如老婆誨兒女諄
然不能自己令人能領會其意而
後止謂之不隔靴而搔痒可也世醫
置一通于傍以背誦其文則臨乎頭
傾腕斷失血如瀑之際精神旺旺運
用如意必有能收其効者矣此收効

之所以為名而上木行世不亦可乎
著斯編者誰大槻玄幹也捐貲而刻
者誰出生玄願也不揣蕪陋而書其
卷端者誰杉本良仲温也

文化甲戌冬日

樗園拙者



大槻玄幹磐水之子也嘗著繡縛圖式以
問世余一見驚曰余稱西洋眼科辱列醫
官孛生構思而所施之縛法与是相符所
謂暗合者邪事亦何太奇近又以國字詳
密其縛法名曰外科収功蓋以易于初学
之瘍醫也余謂此書与圖式併觀則於全
又傷之治療無復餘蘊矣因捐貲以上木
云 甲戌南至

江都

侍醫土生壽玄碩題

外科収功序言

與合和帶

星葉帶

一瘍醫新書原本西哲某氏所撰而外科集成之書也
全編一百十一篇以繡縛法為末篇蓋瘍醫之術千
緒萬端皆以縛帶作収功此書即其約編也
一原本有繡縛總論篇既選其要語作凡例以為圖式
之附言學者宜先熟讀附言而後就此篇玩味縛法
再照圖式以修練其法術也
一綿布長短約以此方曲尺
一編中往往有骨傷脫臼整理之言近頃又就本書起
外科要術之草宜俟上木之日而併考焉

平楨識

外科収功卷之上目次

頭及頸部繃縛法篇第一

兩裁四頭頭顱帶全短帶

分界帶 鈕釦帶

單縛眼帶 雙縛眼帶

單箝口帶 複箝口帶

假面布 兩分帶

喉頭鑽孔法帶

胸腹及陰處諸部繃縛法篇第二

翻廻帶 單法合喙帶

肩胛縛帶 雙合喙帶

湊合帶

翻廻裹頭帶

護鼻四頭帶

代用箝口帶

護頸帶

便法合喙帶

星象帶

卓袱加肩衣帶 四維張帶

單胯縫帶 雙胯縫帶

右通計二十七帶

外科収功卷之下目次

手臂諸部繃縛法篇第三

上臂骨縛帶 下臂骨縛帶

手背骨縛帶 肘節縛帶

肘中縛帶 二十脾脉縛帶

四指縛帶 指節縛帶

上臂切斷縛帶 肩胛縛帶

股脛及足跗繃縛法篇第四

丁字樣帶

腕骨縛帶

手腕縛帶

拇指縛帶

手腕及下臂縛帶

股骨縛帶
 股骨頸縛帶
 膝蓋骨縛帶
 脛骨縛帶
 脚腕及跗骨縛帶
 足跗骨縛帶
 書編帶

右通計二十一帶

外科収功目次終



外科収功卷之上

本書瘍醫新書向磐水先生繼鶴齋先生之創
 艸以述之近楨拔斯篇以講究其術而新製圖
 式又且與岩惠山相謀訂正本篇撰此約篇以
 供急務云爾文化甲戌秋八月平楨玄幹甫誌

頭及頸部繃縛法篇第一

兩裁四頭頭顱帶綿布ノ製裁及ビ寸尺主用等
 醫師先ツ綿布ノ正中ヲ取テ患者ノ頭頂施ス所ノ

按定巾上ニ安シ其後部分裂ノ二端ヲ耳後ヨリ領下ニ廻ラシ又領ヨリ頭後ニ廻ラシテ左右共ニ結ビ止ムベシ又其前部ノ両端ハ前頂ニ附テ後頂へ引廻ラシ頂ニ至テ共ニ此ヲ打チカヘ又耳上ヲ經テ額ニ至リ結ビ止ルナリ

同前短帶

縛汰前帶ト異ナルナシ但其後口ノ両端ヲ領下ニテ結ビ前ノ両端ヲ頂ニテ結ビ止ルナリ

湊合帶

醫師先ツ創口ニ拔爾撒摩^{ハルセム}様ノ主方ヲ塗テ且ツ粘^{カス}連膏^{カクシ}ヲ貼シ其兩側ニ狹キ按定巾^{オモシ}等ヲ施メ後ニ此

帶ノ孔アル所ヲ其創ノ右偏ニ當テ左頭ハ姑ク創邊ニ停メ右頭ヲ以テ頭後ヲ一廻メ其孔ノ處マデ卷キ廻ラシ其卷軸ノ俛ヲ以テ其孔ノ有ル所ヲ其創ノ右邊ニ當テ左頭ハ姑ク創邊ニ停メ右頭ヲ以テ頭後ヲ一廻メ其孔ノ處マデ卷キ廻ラシ其卷軸ノ俛ヲ以テ其孔ニ穿チ通シ其兩軸ヲ以テ意ヲ用ヒテ左右ニ引ク是ニテ其創脣ノ中央ヨリ相共ニ合シ兩側ヨリ自ラ湊合シ程ヨクシマリ合スル様ニナスベキナリ而後其兩軸ヲ以テ兩方ヨリ頭ヲ卷廻スニ右ト左ト其軸端ヲ亞ニ取チカヘ再ビ額ニ至リ又初ノ如ク左右ヲ取チカヘ卷ナリ此ヲ以

テ其創ヨク併合スルコトヲ得ナリ是ノ如クニメ其
帶ノ長サカケハ旋廻スベシ卷終リノ兩端ヲハ前
ノ方ヘ廻シ綴釘ヲ以テ住ムルカ又ハ針ニ系ヲ穿
キ縫ヒ住ルモ可ナリ又或ハ其創竪ニ狹長ナル中
ニモ稍長キモノハ右ノ汰ノ如クニメ一遍卷保セ
テ後又再遍スルノ時正ニ其創上アタル處ニ新ニ
一孔ヲ開キ又初ノ如ク其卷軸ヲ以テ新孔ヲ穿チ
通シ前ノ如ク左右相引ベシ再ビ此汰ヲナスニ因
テ其長キニ過タル創トイヘ凡夫ニ應シヨク引シ
テリ合併メ其愈ヘクテ必ス平等ニナルモノナリ
分界帶 一汰扁舟帶

醫師先ツ本帶ノ下端ヨリ上ニ尺三寸一分ノ處ヲ
額上創口按定中等ヲ施シタル上ニアテ左手ノ拇
指ヲ以テオサヘ其端ハ姑ク垂レ下シラキ其卷軸
ノ方ヲ以テ折十カラ頭圍ヲ一廻メ初メアテタル
處ニ至ラシメ而メ其垂下シタル端ヲ以テ額ヲ越
ヘ矢縫ノ中行ニ循テ項ニ至リ次テ軸頭ヲ其上ニ
再廻セシメ其下端ハ復始ノ如クニ還シ遂ニ其卷
軸ノ方ヲ取テ其頭ノ圍ヲ周ツテ初メ卷タル上ヲ
數遍輪環様ニ旋廻シ其縛帶ノ盡ルニ至ルベシ其
第二汰扁舟帶ト名クルモノハ都テ第一汰ノ如ク
レ凡其斜行ヲナスヲ異ナリトスコレ其頭項ニ於

テ一濶處ヲナシ前後ノ所ヲ尖峭ナラシムルヨウニ卷イナリ此其初メニ垂ル、帶ノ端ヲ初法ノ如ク正ク頭頂ノ中行ヲ越シメズ其兩偏ニ隨テ斜行シ頭頂ニ於テ一濶所ヲ露ハス様ニ卷キ其中間ハ廣ク前後ハ狭クメ其狀自ラ扁舟ノ形ヲナサシムルナリ是レ此名ヲ得ル所ナリ

鈕釦帶

醫師先ツ其創口ニ按定小巾三箇ヲ按シ而後本帶ヲ取り其中央ヲ創十キ部ノ顛顛上ニアテ兩軸共ニ創アル方ノ顛顛上ニ至ラシメ左右送ニトリ違へ換テ旋廻スベシカクノ如クスルヲ數遍其布帶

ノ盡ルニ至ルベシ其動脈ノ創口此力ヲ得テヨク壓定スルナリ

翻廻裏頭帶

醫師先ツ本帶ノ中央ヲ頭後ニ當テ頭圍ヲ旋廻スルヲ一回或ハ二回シ後頭ノ所ニテ兩頭相交へ左軸ハ矢縫ヲ過テ額上ニ下ラシメ右軸ハ又旋廻シ左軸ハ頭上ヲ覆フ下漸々次第ニ左右トリ千カヒ相開キ斜行回轉スルヲ數遍其帶卷キ盡メ頭ノ總部ヲ全ク包蓋シ緊固束縛スルニ至ルベシ

單縛眼帶

醫師先ツ應用ノ主方ヲ用ヒ按定巾ヲ置キ扱本帶

ヲ以テ頭後ニ當テ其頭ヲ譬ヘバ右眼ナレハ右
ニ斜行メ額ヲ過來小眼上ニ至ランメ耳下ヲ經テ
復タ再ビ後頭ニ還シ如是スルヲ三遍ニ至ルベシ
而後頭圍ヲ輪環様ニ廻スナリ若シ其帶ノ餘リア
ルモノハ數廻メ其盡ルニ至ルベシ其盡ル處ニテ
綴針ヲ以テ穿テ留ムベシ

雙縛眼帶

縛法ニアリ其一頭トナスノ法ハ先ツ其帶ヲ後頭
ニ置キ軸ヲナスノ方ヲ耳上ヲ壓テ斜行メ一方ノ
眼ヲ蓋フヨウニ額ヲ過キ復タ後頭ニ還シ換テ始
メ如ク其一方ノ眼ニ向ヒ額上ヘ引額ヨリ斜下メ

其眼ヲ蓋ヒソレヨリ又引下シ復タ換テ初ノ如ク
後頭ニ還ルナリ此ノ如ク一廻スレバ鼻額ノ邊左
右ユキナカヒ自ラ十字様ヲナシ能ク兩眼共ニ蓋
ヒ塞ガルナリ乃チ其兩眼上ヲ蓋フ一左一右各
三襲ス其帶ノ餘レル所ヲ以テ右卷タル處ヲ固持
スルヨウニ顛顛筋ノ部及ビ額ノ上邊ヲ輪環様ニ
旋廻シ了ルベシ又其兩頭軸トナシ用ルノ法ハ即
チ兩頭ノ中央ヲ前ノ如ク後頭ノ部ニ當テ兩頭ヲ
以テ目ヲ蓋フヨウニ旋廻スベシ一頭ハ右眼ヲ覆
ヒ一頭ハ左眼ヲ覆フヨウニ相共ニ額ヲ過テ十字
様ヲナスナリ尤モ其帶ノ兩頭ヲ取テナカハ右ノ者

ハ頭ノ左側ヲ越へ左ノ者ハ右側ヲ越へ共ニ後頭ニ至ル此ノ如クスル一三次眼ヲ蓋フ一各三襲ニ至ル尚其餘レル者ハ頭圍ヲ旋廻スル一前式ノ如シ是施ス所ヲメヨク固定ナラシムルナリ

護鼻四頭帶

醫師先ツ本帶ノ中央孔ヲ開タル處ヲ正ク鼻頭ニ當テ其上端ハ下ニ向ケ下端ハ上ニ向ケ耳上耳下ヲ廻ラシ左右兩端ヲ以テ少ク下ノ方へ向ケ項ニ至ラシメ左右相合シ十字樣ヲナシ再ビ前ノ方額ノ上へ引廻ラメ其宜キ處ニテ結び留ルカ或ハ其著スル所ノ睡帽ニ綴釘ヲ以テ切ニサシ住ムベシ

其下ノ兩端ハ少ク上ノ方へ向ケ後頭へ廻ラシ是亦左右相合シ十字樣ヲナシ再ヒ額ノ方へ廻ラシ右ノ如ク結び留ルカ或ハ綴釘ヲ以テ住ムベシ又此帶其長廿前法ノ半尺ヲ用ユル者アリ此夕バ其兩端ヲ後ロニテ結ブカ或ハ綴釘ヲ以テ住ムベシ凡ソ四頭帶ヲ用ヒテ諸部ヲ保持セシムルノ定式ハ毎ニ其上ノ兩端ヲ初メニ取テ固ク卷キ留メ而後下ノ兩端ヲ上へ向ケ十字樣ニナルヨウニ上ニ升リ過スベキナリ是ヨク其部ヲ収緊スルヲ以テナリ

單籍口帶

醫師先ツ折傷上ニ膏劑ヲ貼シ又燒酒ニ浸シタル
巾及ビ膠骨ノ形ニ作レル副夾ハ榻巾等ヲ按シ而
後此縛帶ヲ施スベシ其用法先ツ其端ヲ頭後ニ當
テ頭ノ圍ミヲ二廻スベシ是其主トスル所ヲメ緊
束セシメンガ為メニ此ニ基ヲ為モノナリ而後折
傷スル方ノ顛顚ノ所ニ廻ラシ来リ其上ニテ其帶
ヲ綴釘ヲ以テヨク縫住ムベシソレヨリメ領下へ
引サゲ恙ナキ方ノ顛顚へ送り升セ前頭ニ至リ再
ビ折傷アル方へ送り下スナリ此ノ如クスルナリ凡
ソニ遍或ハ三遍スベシ而後其帶ヲ後頭ノ方其始
ヲナス所ノ上ノ方へ至ラシメ復夕前ノ方ニ至リ

領上ヲ過テ再ビ後頭へ卷キ戻シ留ムルナリ若シ
其帶尚餘リアル寸ハ額ノ方へ廻シ其十字様ヲ十
スノ邊ニテ卷キ終リ是ヲ留ムベシ蓋是縛法ヲ以
テヨク是ヲ固持スルナリハ顛顚ノ部ニテ兩側共ニ
左右前後ヨリ卷テ十字様ヲ為スヲ以テナリ且ツ
其帶ノ本基ノ所ハ綴針ヲ以テサシ留メ或ハ固ク
縫住スルガ故ナリ又落下顚ノ症ニモ能ク此縛法
ヲ用ヒテ便用ナリトス

複籍口帶

醫師折傷上及ビ領下ニ安住スル藥酒紙巾等前條
ノ如クシ而後本帶ヲ取り其中央ヲ領下ニ當テ左

右共ニ上ノ方顛額ニ向テ卷キ升セ、頭上ニ至ツテ、
兩頭取りチカヘ再ビ額下ニ下シ、又額ヨリ項ヘ廻
ス、是亦前ノ如シ、此ノ如クスルヲ以テ、其折傷ノ
處ニ按スル副夾ヨク収緊ヲナスナリサテ、其項ヘ
卷キ廻ラシタル兩端ヲ額ノ方ヘ輪環様ニ頭圍ヲ
旋廻スベシ、其遍數ハ餘帶ノ長短ニマカセ、何ノ部
ニテモ、宜キ處ニテ卷キ留ムベシ、

代用箱口帶

縛法護鼻四頭帶ノ如シ、其上ノ二頭ハ左右ヨリ項
ヘ廻ラシ、又額ヘ廻シ、兩端ヲ結ビ留ルナリ、其下ノ
兩端ハ頭上ニ升セ、宜キ處ニテ結ビ止ム、其長サ、

多少ニ隨テ額下ニテモ結フベシ、此帶ノ便要ナル
ト前條ノ二法ト其功用ヲ同ス、

假面布

是レ顔面ニ搦方塗藥ヲ施シタル後ニ用ルナリ、又
假面ニ藥酒ヲ浸シ、或ハ膏油ヲ塗タル者ヲ蓋フ、
アリ、縛法宜ク圖ノ如クナスベシ、

両分帶

用法先ツ本帶ノ中央ヲ額上ニ當テ、頭ノ圍ミヲ二
廻シ、項後ニ下シ、十字ニトリチカヘ、後口ノ方ヨリ、
其兩端ヲ左右腋下ニ垂下シ、共ニ腋前ニ出シ、取り
チカヘ、頭上ニ升ス、尤モ移動スル、トナキヨウニ、其

合フ處ヲ帽子ニ縫ヒ付クベシ次ニ其ヲ取テ項後
ニ下リ腋下ニ出シ前ノ如ク頭上ニ升スハ凡テ三
回、緩急度ヲ得セシムベシ終ニ頭ノ圍ミヲ輪環様
ニ旋廻シ了ルベシ此帶能ク頸ヲ正居セシムルガ
故ニ火傷愈テ後斜屈スルノ虞ナキナリ

護頸帶

凡ソ頭頸ノ疾患アルニ當テヨク其主方ヲ施シテ
後ニ此帶ヲ施スベシ其コレヲ施スノ法先ツ其第
二ノ短キ帶ヲ取テ其中央ヲ横ニ頭上ニワタラセ
兩端ヲ肩ニ垂レ下ラシメ置ベシ次ニ其長キモノ
ヲ取テ其垂下シタル上ヲ左ノ如ク輪環様ニ頭頸

ヲ旋廻スコレヲ以テ其既ニ施ス所ノ主方及按定
巾ヨク保定スルナリ即チ其第一ノ帶ハ
兩端ヲ以テ其頸ヲ輪環様ニ旋廻スルナリ但シ是
ヲ卷テ其宜キヲ得ヨウニナメ必ス緊ク扎リ頸ヲ
緊急ニ呼吸ノ妨碍ナキヨウニハ其旋廻シタル終
ヲハ綴針ヲ以テ穿テ住ムベシ且ツ其始メ肩ニ垂
下シタル兩端ハ頭ノ方ニ升セ其宜キ所ニテ又綴
針ヲ以テ穿テ住ムベシ是ノ如ク縱横兩輪ノ狀ヲ
ナス縛法ナルヲ以テヨク此ヲ保スルカ故ニ其施
ス所ノ者容易ニ下垂スルナキナリ

喉頭鑽孔法 主用咽喉諸症



醫師先ツ喉頭鑽孔法ヲ施シ、氣管ノ裏面ニ當テ、食道中ニ小管ヲ挿シ、其上ニ一孔ヲ穿チタル硬膏ヲ貫キ貼シ、又右ノ如キ按定巾ヲ按シ、其上ニ又孔ヲ穿タル縛帶ヲ以テ卷テ、其管ヲ留ムベシ、尤モ意ヲ用ヒテ、患者ノ意ニ應スルヨウニナスベキナリ、此方法ヲ用テ、本病退ク者ハ、其小管ヲ抜キ去リ、創上ニ、拔爾撒摩ヲ塗リ、粘連膏ヲ貼シ、隨テ湊合帶ヲ施ス、ト他ノ豎長創傷ニ施スガ如クスベシ、此帶大約幅二指横徑、長廿四尺六寸二分ニ作ル者ヲ用ユルヲ得タリトス、

胸腹及陰處諸部繃縛法篇第二

翻廻帶

醫師先ツ折骨ヲ整ヘテ後、本帶ヲ施サントスルノ前、鎖骨ノ上下、空罅ヲナスノ處ニ、狹長ニ作りタル按定巾ヲ按シ、又其上按定巾ゴトニ、狹片ノ夾紙ヲ以テ鎖骨ノ長ミナリニ作りタル者ヲ按住スベシ、此ノ如クスレバ、其上下空罅ヲナス處ヲ填實シ、其折骨ノ動揺游移ヲ防クナリ、而後右ノ夾紙ノ上ニ、其長ミニ倣ヒ、正ク其折傷ノ處ニ於テ、別ニ小片ノ夾紙ヲ按シ、又其上ニ四角ナル按定巾ヲ置キ、其上ニ大片ノ夾紙ヲ按シ、右ノ如ク手當悉クナシ、終テ、其處ヲヨク固定メ後ニ、本帶兩頭軸ヲ取テ、肩上ノ

外科初巻上
中央ヨリ巻キ始メ、其前ナル一頭ハ下ノ方ニ向ヒ、
胸ニ卷下ゲ、其後ナル一頭ハ斜メニ肩ヲ下リ、恙ナ
キ部ノ腋下ヲ潜リ經、其前頭ノ下リ懸ルモノ、上
ヲ過キ、患アル方ノ腋下ヲ經テ、再ビ脊ニ廻スナリ、
サテ其前ニ下リ懸リタル前頭ハ、其既ニ横ニ卷ア
ゲタル帯ノ上ニ翻テ、肩ニ上リ、脊ニ下リ、其後頭ノ
腋下ヨリ廻リ来ル者ヲ、其上ニ卷カケ、自ラ十字樣
ヲナスナリ、此ヨリメ、又再ヒ前頭ハ脊ヨリ肩ヲ經、
胸ニ下リ、後頭ハ毎回其腋下部ヲ輪環樣ニ旋廻
スルナリ、前頭モ亦其毎回脊ニ下リ、此ノ如ク互ニ
行合ヒ卷纏スルナリ、是ヲ以テ其始メ施ス處ノ按

定巾夾紙等ヨク按住スルヨウニ卷終ルベシ、凡ソ
此部ノ折傷ハ動モスレバ其折傷ノ處甚ク離レ易
キモノナルカ故ニ、又別ニ一法ヲ用ヒ、ガレバ保チ
難キモノナリ、故ニ右ノ縛法ヲ施メ、後又一法ノ縛
帶ヲ施シ用フベシ、其帶長サ一丈八尺四寸八分、幅
三指、横徑一頭軸ニ作ルベシ、先ツ其帶ノ端ヲ恙ナ
キ部ノ腋下ニ當テ、其軸ヲナス方ヲ後ニ向ケ、其體
ヲ輪環樣ニ一廻メ、恙ナキ部ノ腋下ニ至リ、夫ヨリ
斜メニ脊ヲ升テ前ニ向ヒ、傷アル方ノ肩ヲ經、腋下
ニ下リ、後口ニ向ヒ上行シ、脊ヲ經テ、再ヒ恙ナキ部
ノ肩ヲ越ヘ、腋下ニ下ルナリ、夫ヨリ右ノ如ク前法

ヲ逐テ卷纏スルハ數遍其兩腋ヲ廻スノ形ナ脊上ニ如キ此ノ狀ヲナスナリ此ニ由テ其腋後背ニ牽ツケ其整理シタル處再ビ動キ移ルノ預防トナリ能ク固持スルナリ又三四日ノ間ニハ其伸緩ナル一アルモノナリ醫宜ク預メ別ニ一帯ヲ取テ其膊ノ中間ノ處ヲ軀幹ニ束縛シ固保セシムベシ又コノ治療中ハ其臂ヲ綿布ニテ鈞リ保セラク一手臂縛帶ノ部ニ説ルカ如クスルヲ要トス

單法合喙帶

醫師骨傷ヲ整ヘテ後本帶ヲ取テ其卷端ヲ恙ナキ部ノ腋下ニテ入ラメ把住セシメ其軸ヲナス方ヲ

前ニ向ケ胸ヲ過テ斜上ニ折傷セル鎖骨上ニ至ラシム夫ヨリ肩胛ニ下リ直ニ腋下ニ廻ラシ前ヨリ再ビ上ニ翻シ背ヲ經テ帶ノ始メヲナス腋下ニ廻リ上ニ翻シ背ヨリ斜メニ下リ再ビ恙ナキ部ノ腋下ニ至ルハ又初ノ如クスルナリ此ノ如ク卷纏スルハ凡ソ三回尚意ヲ用ヒテ其折傷ノ處此縛帶ニテヨク包蓋シ強固ナラシムルヨウニナスベシ三遍纏ヒテ後折骨ノ傷ヲ腋ノ樞機ヲナス有膊ノ邊ヲ一二遍輪環様ニ旋廻シ而メ又其上臂ヲ左右共ニ腋脇ニ著シメ其上ヨリ又輪環様ニ旋廻ハ帶ノ益ル處ニテ留ムベシ

又一法同帶ヲ取テ恙十キ部ノ後ロヨリ腋下ニ當テ軸ヲナス方ヲ後ロニ向ケ背ヲ越テ斜上シ其患部ノ前ニ向ヒ折骨ノ上ヲ過其腋下ニ下リ後ロニ廻ラシ復タ再ヒ折骨上ニ翻リ斜下メ胸ヲ經恙十キ部ノ腋下ニ至リ又前ノ如ク旋廻スル毎回前法ノ如シ尤モ両臂ヲ束縛スルモ同様ニ其帶ノ長サ盈ルニ至リ其端ヲ為ス處ニテ固ク此ヲ留ムベシコレタバ其卷キ初メヲ前後ニ為ノミナリ此法實ニ簡便ノ良法ナリ

便法合喙帶

此法前條ノ骨傷ニ施メ極メテ良便ニシ且ツ一骨

兩端折傷セル者ニ殊ニ甚タ便要ナリトス是即チ翻廻帶ニシ其帶ノ長サ二丈七尺七寸二分縛法左ノ如シ先ツ其帶ヲ取テ中央ノ處ヲ患アル方ノ腋下ニアテ其兩頭ヲ以テ肩上ニ至ラシメ其處ニテ取チガヘテ十字樣ヲナサシム而シ其頭ハ前ニ下リ胸ニ至ラシメ又其一頭ハ背ヲ歷テ患十キ方ノ腋下ニ下リ此處ニテ兩頭トリチガヘ前ニ向フ端ハ胸ヲ經後ニ向フ者ハ背ヲ廻リ共ニ患ル方ノ腋下ニ至リ前後行キ合ヒ自ラ輪環樣ヲナシ又コノ處ニテ兩頭ヲ取カヘ再ヒ肩上ニ至ル初ノ如クハ上レハ則チ十字樣ヲナシ前後兩頭下テ患

ナキ方ノ腋下ニ至リ前ノ如ク體ヲ旋廻スル一再
 遍初回ノ如クメ其患アル方ノ腋下ニイタル其前
 ヨリ来ル一頭ハ後口ノ方ニ腋ヲ經廻リ上リテ前
 ニ向ヒ折傷上ヲ過テ胸上ニ垂下ス後口ヨリ来ル
 一頭ハ其帶ヲコヘテ輪環様ニ胸ヲ固ク旋廻シ其
 始メ胸ニ下リ垂ル者ハ又再ビ翻メ肩ニ上行シ
 背ニ下リ其後ハ両頭前法ノ如クスルナリ右法ノ
 如ク前後上下ノ巻纏數遍スル一ハ第一條ノ翻廻
 帶ニ記スルカ如クスベシ蓋シ鎖骨傷ハ醫之レヲ
 整ヘテ後毎ニ膊臂ノ重キアルヲ以テ其處ヲ離レ
 垂レ下ル一ヲ為スナリ故ニ此縛法ヲ用フレバ有

上ニテ十字様ヲナシ其帶ノ前頭鎖骨傷ノ上ヲ經
 下テ恙ナキ部ノ腋下ニ至ルヲ以テ其折タル處ノ
 端能ク臆中骨ノ方ニ附着シ壓定スルナリ或ハ其
 上方ニ放レ向フモノアレバ此法ヲ用ヒテ必ズ下
 方ニ下リテ本位ニ歸スルナリ此法合喙翻廻ノ二
 用ヲ兼テ束縛二回ニイタルヲ以テ其折骨ツレニ
 應メ能ク按住スルナリ其餘前後ノ扱ヒ方ハ尋常
 ノ翻廻帶ト同様ニ心得ベシトナリ此縛法古人意
 ヲ用テ巧ミ出セル所ニ鎖骨傷ニ用ヒテハ尋常
 ノ法ヨリ極メテ便要ナル良法ナリ
 又此骨脱臼スル者ハ醫之レヲ整ヘテ後按定中ニ

温メタル焼耐ヲ浸シ患上ニ按スベシ其臆中骨ノ
傍ニテ脱臼セル者ハ翻廻帶ヲ以テ折傷ニ施スカ
如ク卷纏スベシ或ハ其骨陷没スル者ハ第一條ニ
載スル所ノ第二法ノ縛帶ヲ兼子施スベシ此法ニ
由テ其肩骨後ノ方ニ牽ワケル故ニ其陷没セル鎖
骨上起シ出ルナリ又或ハ其脱臼上ニ突起スル者
ハ其接合ヲナス處ノ上ニ厚キ按定巾ヲ置キ其鎖
骨内ノ方ニ推壓ノ能ク保ツヨウニナスベシ或ハ
此脱臼肩胛ノ傍ラニアル者ハ單法合喙帶ノ法ヲ
用フベシ或ハ左右兩骨共ニ脱臼スル者ハ雙合喙
帶ヲ用フベシ以下ニ出ス肩骨脱臼療法ノ處ニ記

スルガ如シ凡ク此等ノ部位ニアル脱臼ハ毎ニ其
膊臂モ亦一縛帶ヲ以テ釣上ル下ノ手臂縛帶ニ説ク
が如クスルヲ良トスルナリ

肩胛縛帶 單合喙帶ノ副帶ナリ

肩骨ト肩胛トノ間脱臼スルモノハ醫之レヲ整ヘ
テ後單法合喙帶ヲ用ユベシ且ツ其整フル所再ビ
出臼セザルノ預防ヲナスカ為ニ一毬或ハ卷軸ニ
シタル綿布ヲ以テ腋下ニ墊起シ其ニ一按定巾ニ
尺三寸一分幅一手横徑ノモノヲ取テ兩端ノ中程
ヲ兩裂ノ中間ヲ留メ四頭トナシ温酒或ハ焼耐露
水及ビ酢漿ノ類ヲ撰ミ取テ浸シ過シ絞リテ其中

外科の巻上

央ヲ施ス處ノ毬下ニ當テ、兩端四頭ヲ機關上ニ卷
 キ住ムベシ。此ニ由テ其施ス所ノ毬又卷軸布モ脱
 落スルナキナリ。而メ後右ニ云フ、單合喙帶ヲ以
 テ卷縛スベシ。又此症恙ナキ部ノ腋下ニモ、按定巾
 ヲ墊起スルヲ良トス。此縛帶ニテ其處ニ痛ミヲ起
 サバラシムルガ為ニスルナリ。又此合喙帶ハ上臂
 骨ノ頸、肩骨ニ接スル處ノ際外折傷スル者ニモ用
 ヒテ、屯モ功アリトス。他ノ諸法ヲ施メハ更ニ功ヲ
 得ナキモノナリ。

雙合喙帶

醫師本帶ヲ施スニ臨テ、先ツ左右腋下ニ一毬或ハ

按定巾ヲ墊起シ、再脱ノ預防ヲナシ、而メ後本帶ノ
 中央ヲ先ツ一方ノ腋下ニ當テ、其兩頭ハ腋ヲ越テ
 上ニ外セ、肩上ニテ重子テ十字樣ヲナシ、其後ニ向
 フ者ヲ前ノ方胸ニ下シ、前ヨリ向フモノハ背後ニ
 廻ラシ、兩頭共ニ一方ノ腋下ニ至リ行合ヒ、互ニ取
 リ代テ後口ヨリ来ルモノハ前ヨリ上ニ外リ、前ヨ
 リ来ルモノハ後口ニ向ヒ前後肩上ニテ取り、子カ
 へテ、再び始ノ腋下ニイタリ相會メ、又兩頭トリ、子
 カヒ、再び上ニ外テ、初ノ如ク十字樣ヲナシ、前ノ如
 ク卷纏スルナリ。初法ノ如シ、此ノ如クスルナリ。左右各
 三廻ニ至ルベシ、而メ後其帶ノ餘レルモノハ腋下

ノ處ニテ體ヲ一廻シ又肩機ノ處ヲ旋廻スルハ
其餘帶ノ多少ニ任スベシ此ニ由テヨク其處縛定
スルハ即單合喙帶ヲナスが如クスベシ

星象帶

醫師本帶ノ端ヲ後口ヨリ恙ナキ部ノ腋下ニ當テ
其軸ヲナス方ヲ横ニ脊ヲ廻ラシ折傷アル方ノ腋
下ニ至ラシメ此ヲ前ヨリ取テ肩ヲ越ヘ肩胛ニ至
リテソノ既ニ施ス處ノ按定巾ヲ蓋ヒ背ヲ卷廻ラ
シテ又初ノ恙ナキ部ノ腋下ニ至リテ卷クハ患部
ノ如ク旋廻斜上メ背ヲ歷患部ノ腋下ニ至リ初回
ノ如クス此ノ如ク兩腋ヲ卷纏スルハ數遍自ラ背

後ニテ∞ノ如キ形ナシ之ヲ以テ其折傷スル所ノ
肩胛全ク束縛スルニ至ルナリ蓋シ此縛法左右ノ
肩胛ヲ全ク卷縛スルニ因テ左右肩胛折傷スルモ
ノニ用ユルモ亦甚タ便要ナリ又此折傷ニ兼用テ
功アルモノハ第一條及第三條ニ説ク所ノ翻廻帶
ヲ良トス

卓袱加肩衣帶

醫師先ツ第一條ノ綿布ヲ用テ胸腹ノ患上ヲ旋廻
シ其卷終リハ綴針ヲ以テ刺シ止ムベシ而シテ第二
條ノ綿布ヲ取テ其正中ノ孔ニ患者ノ頸ヲイレ肩
ヨリ前後ニ垂レシメ其兩端ヲ腋背ノ横帶ニ著テ

綴針ニテ止ムベシ

四維張帶

醫師木帶ノ中央ヲ一方ノ腋下ニ當テ而頭ヲ肩上ニ升セ十字樣ヲナシ一頭ハ斜メニ胸ニ下リ一頭ハ背ヲ經テ一方ノ腋下ニ至リ前後相會レ又此處ニテ而頭ヲ上ニ升セ卷テ一方ニテナセル如クニシ而メ又一方ノ腋下ニ至ラシメ而頭取リテカヘコトニ至テハ肩上ニ升セズメ一頭ハ胸一頭ハ背ト其前後ヲ廻ラシ一方ノ脇ニ至ラシメ又一頭ハ前一頭ハ後而頭ヲ以テ左右彼此相互ニ旋廻ノ漸次ニ下ノ方ニ卷サゲ全ク胸ヲ蓋ヒテ殊ニ其患上

ニ能ク相應スルヨウニ意ヲ用テ卷縛スベシ

丁字樣帶

醫師法ノ如ク應用ノ諸方ヲ施メ後横帶ヲ以テ體ヲ廻ラシ縦帶ハ後部薦骨ヲ經テ而胯ノ間ヲ前ニ引出シ初メニ廻ラシ置タル横帶ニ結ヒ著クベシ此ノ如ク十スガ為メニ其縦ニ下垂スルノ端ハ管テ而裂ニ作り置ナリ又陰處諸部ニ於テ手術ヲ施シタル後ニ縛スル寸ハ面背地ヲ易テ縛スベシ醫尚此帶ノ下脱セザランテ欲セハ別ニ肩衣帶ヲ用テ附着セシムベシ

單胯縫帶

醫師先ツ脱臼折傷等ヲ整へ脱肛腸出ヲ推シ入レ
タル跡ニテ腋脇ノ傍ヲ胯骨ノ直上ニ於テ其帶ヲ
横ニ安シ腹ヲ過テ後口ニ至リ胯後ヲ經テ尻ニ至
ラシメ胯間ヨリ前ノ方へ出シソレヨリ上ノ方へ
廻スニ其瘡腫アル胯縫ニ已ニ按定中ヲ施シタル
上ヲ蓋フテ上ニ上リ後へ廻シ背へ向へ其始ノタ
ル處へ至リ其初コナス帶ノ端ヲ切ニ其處ニ固定
スルヨウニ卷カクベシ此ノ如ク其帶ヲ數遍旋廻
スルヲ初メ卷タルが如クニシ其後ハ其端ヲ以テ
腰腹ヲ旋廻シ終ルベシ
又法前條ノ丁字樣帶ヲ前ヨリ始ムル者ノ如ク此

帶モ亦患處ノ方ニテ卷初メ一回メ其處ニテ綴針
ヲ用テサシ止メ其軸ヲナセル方ヲ下へサゲ後ノ
方へ向フヨウニ胯間ヲ通シ卷クナリ此ニ由テ其
施ス處ノ按定中ヨク蓋ヒ保ツナリソレヨリメ後
ノ方股骨ノ方へ卷キ廻ラシ前へ向へ再ヒ按定中
上ヲ經過シソレヨリ又上ニ升リ體軀ヲ旋廻シ其
卷終リノ處ニテ固ク結ヒ止ムベシ

雙胯縫帶

前症左右ニ發スル者ハ醫先ツ本帶ヲ以テ患者ノ
後口ニ立テ其腰部ヲ輪環樣ニ一廻シソレヨリ兩
頭左右取り代へ尻ニ下リ股ヲ通り兩胯縫ニ傍ヒ

其上ニ施ス處ノ按定巾ヲ蓋ヒ、再ビ兩股ノ處ニ至
ラシメ、而メ其體ヲ輪環樣ニ一廻シ、又初ノ如ク後
口ヨリ兩膝ノ方ニ下リ上ツテ前ヨリ膝縫ヲ蓋ヒ、
遂ニ初ノ如ク體圍ヲ廻ラシ卷キ止ムベシ、

陰莖縛帶

疳瘡包莖及諸潰瘍ニ膏藥按定巾等ヲ施シタル後
ニ醫本帶ヲ用テ、其兩裂端ヲ一方ノ穴ニ通シ、其中
ニ陰莖ヲ容レテ束縛スル、ドウジメ結束帶ノ如クスベシ、
但シ此ヲ纏フニ、漸々莖本ノ方ヘ卷キ下ゲ、其帶ノ
終ル處ニテ兩裂ノ端ヲ以テ固ク結ビ止ムベシ、
外科切卷之上終

