



功寒後條辨

方

八

79
1104
8



1109
8



傷寒論後條辨附方卷之十五
 仲景一百一十三方。循論中所主治者。摘而名之也。然其間差訛移易。為叔和所更張者。已不少。如桂枝二越婢一湯。及桂枝麻黃各半湯等類。是也。今特備載之。以待考。不妨姑仍其舊。至于因方而加之。以論。則自成無已。始愛禮存羊。併不敢以我意之所是。遂芟去其所非也。

桂枝湯

桂枝

三兩 去皮

芍藥

三兩 苦酸微寒

甘草

二兩 炙甘平

傷寒論後條辨

方

唐古



91-1927

生姜 二兩 辛温

大棗 十二枚 辛温

右五味咬咀以

水七升微火煮取三升去滓適寒温服一升服已須臾飲稀粥一升餘以助藥力温覆令一時許通身發熱微似有汗者益佳不可令如水淋漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服當小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒

酪臭惡等物

成無已曰內經曰辛甘發散為陽桂枝湯辛甘之劑也所以發散風邪內經曰風淫所勝平以辛佐以苦甘以甘緩之以酸收之是以桂枝為主甘草為佐也內經曰風淫於內以甘溫之以辛散之是以生姜大棗為使也

桂枝加葛根湯

照原方訂定

桂枝 三兩

芍藥 二兩

甘草 二兩

生薑 三兩 切

大棗 十二枚 擘

葛根 四兩

右

六味以水一斗先煮葛根減一升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須

桂枝加厚朴杏子湯

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十箇去皮尖餘依前法

桂枝加桂湯

於桂枝湯方內更加桂二兩共五兩餘依前法桂枝加附子湯

於桂枝湯方內加附子一枚炮去皮破八片依前法

桂枝加芍藥生薑各一兩人參二兩新加湯成無已口與桂枝以解未盡之邪加芍藥生薑人參以益不足之血

桂枝加芍藥湯於桂枝湯方內更加芍藥二兩隨前共六兩餘依桂枝湯法

桂枝加大黃湯

傷寒論後條辨

方

三

傷寒論

桂枝二兩 去皮

大黃一兩

芍藥六兩

生姜二兩 切

甘草二兩 炙

大棗十二枚 劈

六味以水七升煮取三升去滓温服一升日三服

桂枝去芍藥湯

於桂枝湯方內去芍藥餘依前法

桂枝去芍藥加附子湯

於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝三兩 去皮

甘草二兩 炙

生薑三兩 切

牡蠣五兩 熬 酸鹹

龍骨四兩 甘平

大棗十二兩 劈

蜀漆二兩 洗去 脚辛平

蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓温服一升

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝一兩

甘草二兩

牡蠣二兩 熬

龍骨二兩

温服八合日三服

右為末以水五升煮取二升去滓

成無已曰辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經中之火邪龍骨牡蠣之澁以收斂浮越之正氣

桂枝甘草湯

桂枝四兩去皮辛熱

甘草二兩炙甘平

右二味以水二

升煮取一升去滓頓服

成無已曰桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入脾而理中

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓半斤甘平

甘草三兩炙甘平

大棗十五枚劈甘平

桂枝四兩去皮

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓

減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三

服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓湯之

水上有珠子五六千顆相逐取用之

成無已曰茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘爛水者揚之無力取不助腎氣也

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓兩兩甘草

桂枝二兩去皮辛熱

白朮二兩苦甘溫

甘草 二兩 炙 甘平

右四味以水六升煮取三升去

滓分溫三服

成無已曰陽不足者補之以甘。茯苓白朮生津液而益陽也。裏氣逆者散之以辛。桂枝甘草行陽散氣。

茯苓甘草湯

茯苓 二兩 甘平

桂枝 二兩 去皮 辛熱

生姜 二兩 切 辛溫

甘草 二兩 炙 甘平

右四味以水四升煮取二升去

滓分溫三服

成無已曰。茯苓甘草之甘。益津液而和衛。桂枝生薑之辛助陽氣而解表。

炙甘草湯

甘草 四兩 炙 甘平

生姜 三兩 切 辛溫

桂枝 三兩 去皮 辛熱

人參 二兩 甘溫

生地黄 一斤 甘溫

阿膠 二兩 溫甘

麥門冬 半升 去心 甘平

大棗 十二枚 擘 甘溫

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠洋消盡溫服一升日三服一名復脈湯

成無已曰補可以去弱。人參甘草大棗之甘以補不足之氣。桂枝生姜之辛以益正氣。聖濟經曰津液耗散為枯。五歲痿弱營衛涸流劑所以潤之。麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脈通心也。○脈按之來緩而時一止復來者名曰結。又脈來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也。脈來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也。得此脈者必難治。

小建中湯

桂枝三兩去皮辛溫

甘草三兩炙甘平

大棗十二枚劈甘溫

芍藥六兩酸微寒

生薑三兩切辛溫

膠飴一升甘溫

右

六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服

成無已曰建中者建脾也。內經曰脾欲緩急食甘以緩之。膠飴大棗甘草之甘以緩中也。辛潤也散也。營衛不足潤而散之。桂枝生姜之辛以行營衛。酸收也。泄也。正氣虛弱收而行之。芍藥之酸以收正氣。

麻黃湯

麻黃三兩去節甘溫 桂枝二兩去皮辛熱 甘草一兩炙甘平

杏仁七十個湯炮去皮尖辛溫 右四味以水九升先煮麻

黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫

服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將

息

成無已曰內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛

麻黃甘草開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣

大青龍湯

麻黃六兩去節甘溫 桂枝二兩去皮辛熱 甘草二兩炙甘平

杏仁五十粒去皮尖苦甘溫 石膏如鷄子大碎甘微辛 右七味以水

九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三

升去滓溫服下升取微似汗汗出多者溫粉撲

之下一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁

不得眠也

成無已曰辛甘均為發散然風宜辛散寒宜甘發

辛甘相合乃能發散營衛之風寒麻黃甘草石膏

杏仁以發散營中之寒桂枝薑棗以解除衛中之風

小青龍湯

麻黃三兩去節甘溫

芍藥三兩微寒

五味子半升酸溫

乾姜二兩辛熱

甘草二兩炙甘平

桂枝三兩辛熱

半夏三兩湯洗辛微溫

細辛三兩辛溫

右八味以水一斗

先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

成無已曰寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝

甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣燥內經曰腎苦燥急食辛以潤之乾姜細辛半夏之辛以行水氣而潤腎欬逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲收急食酸以收之芍藥五味子之酸以收逆氣而安肺

加減法入若微利者去麻黃加芫花如鷄子大熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入胃必作利芫花下十二水水去利自止若濕者去半夏加栝蘂根三兩辛燥而苦潤半夏

辛而燥津液非渴者所宜故去之。栝蔞味苦而生津液故加之。若噎者去麻黃加附子一枚炮。經曰水得寒氣冷必相搏其人氣餒加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐衄去麻黃惡發汗。若小便不利少腹痛去麻黃加茯苓四兩水畜下焦不行為小便不利小腹滿麻黃發津液於外非所宜也。茯苓泄畜水於下加所當也。若喘者去麻黃加杏仁半斤去皮尖金匱要畧曰其人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也。喘

呼形腫水氣標本之疾。

桂枝麻黃各半湯

桂枝一兩十六銖 芍藥

甘草炙 麻黃各一兩

杏仁二十四個湯浸去皮尖及兩仁者 右七味以水五升先

煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合

去滓溫服

桂枝二麻黃一湯

桂枝一兩十銖

芍藥一兩六銖

麻黃十六銖

傷寒論卷十五

方

博古堂

生薑 一兩六銖切

杏仁 十六個 去皮尖

甘草 一兩二銖炙

大棗 五枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日

再

桂枝二越婢一湯

桂枝 去皮

芍藥

甘草 各十八銖炙

生薑 一兩三錢切

大棗 四枚

麻黃 十八銖 去節

石膏 碎綿裹

右七味咬咀以五升水煮麻

黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服

一升本方當裁為越婢湯桂枝湯合飲一升今合為一方桂枝二越婢一

成無已曰胃為十二經之主脾治水穀為卑藏若脾內經曰脾主為胃行其津液是湯所以謂之越脾者以發越脾氣通行津液外臺方一各越脾湯即此義也

桂枝去桂加茯苓白朮湯

於桂枝湯方內去桂枝加茯苓白朮各二兩餘依前法煎服小便利則愈

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃 四兩去節甘溫

杏仁 五十個甘溫

甘草 二兩炙甘平

石膏 半斤碎綿裹甘寒

右四味以水七升先煮麻黃

減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服

一升

成無已曰。內經曰。肝苦急。急食甘以緩之。風氣通於肝。風邪外甚。故以純甘之劑發之。

葛根湯

葛根 四兩

麻黃 二兩去節

桂 二兩去皮

芍藥 二兩酒洗

甘草 二兩炙

生薑 三兩切

大棗 十二枚劈

右七味以水一斗先煮麻黃

葛根減二升去沫內諸藥煮取二升去滓溫服

一升覆取微似汗不須裏粥餘如桂枝法將息

及禁忌

成無已曰。本草云。輕可去實。麻黃葛根之屬是也。此以中風表實。故加二物於桂枝湯中也。

葛根加半夏湯

葛根 四兩

麻黃 三兩去節湯泡去黃汁焙研

傷寒論後條辨

方

十一

生薑 三兩切

甘草 二兩炙

芍藥 二兩

桂枝 二兩去皮

大棗 十二枚劈

半夏 半斤洗

八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗

葛根黃連黃芩湯

葛根 半斤

甘草 二兩炙

黃芩 二兩

黃連 一兩苦寒

右四味以水八升先煮葛根減二升

升入諸藥煮取二升去滓分溫再服

成無已曰。經曰甘發散為陽表未解者散以葛

根甘草之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃連黃芩之苦

麻黃升麻湯

麻黃 一兩半去節甘溫

升麻 一兩一分甘平

當歸 一兩一分辛溫

知母 苦寒

黃芩 苦寒

萎蕤 各十八銖甘平

石膏 碎綿裹甘寒

白朮 甘溫

乾薑 辛熱

芍藥 酸平

天門冬 去心甘平

桂枝 辛熱

茯苓 甘平

甘草 各六銖甘平

右十四味以

水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取

三升去滓分温三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈

成無已曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以甘發之麻黃升麻之甘以發浮熱正氣虛者以辛潤之當歸桂薑之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩之苦涼心去熱津液少者以甘潤之茯苓白朮之甘緩脾生津肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍藥之酸以斂逆氣萎蕤門冬石膏甘草之甘潤肺除熱

麻黃連軛赤小豆湯

麻黃	二兩去節甘温	赤小豆	一升甘草	連軛	二兩連軛根也苦寒
杏仁	四十個去皮尖甘温	大棗	十二枚甘温	生梓白皮	一升苦寒
生姜	二兩切辛温	甘草	一兩炙甘平	已上八味	以潦水

水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分温三服半日則盡

成無已曰內經曰濕上甚而熱治以甘温佐以甘平以汗為故正此之謂也又煎用潦水者亦取其水味薄則不助濕氣

麻黃附子細辛湯

麻黃 二兩去節甘熱

細辛 二兩辛熱

附子 一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上熱

沫內藥煮取三升去滓溫服一升日三服

成無已曰內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之經

麻黃附子甘草湯

麻黃 二兩去節

甘草 二兩炙

附子 一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服成無已曰麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫寒氣

桂枝附子湯

桂枝 四兩去皮辛熱

附子 三枚炮去皮破八片辛熱

生薑 一兩切辛溫

甘草 二兩炙甘溫

大棗 十二枚劈甘溫

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服成無已曰風在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在

經者逐以附子之辛熱薑棗辛甘行營衛通津液以和表也。

去桂枝加白朮湯

於此方內去桂枝加白朮四兩餘依前法成無已日桂發汗走津液此小便利大便鞏為津液不足去桂加朮。

甘草附子湯

甘草 二兩炙
附子 二枚炮去
白朮 二兩
桂枝 四兩去
皮辛熱
右四味以水六升煮取三升去

滓溫服一升日二服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合為妙

成無已曰桂枝甘草之辛甘發散風邪而固衛附子白朮之辛甘解濕氣而溫經。

桂枝人參湯

桂枝 四兩去
皮辛熱
甘草 四兩炙
白朮 三兩
人參 三兩
乾薑 三兩
右五味以水二升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升

日再夜一服。成無已曰。表未解者。辛以散之。裏不足者。甘以緩之。此以裏氣大虛。表裏不解。故加桂枝甘草於理中湯也。

小柴胡湯

柴胡	半斤	苦	微寒	黃芩	三兩	苦	寒	人參	三兩	甘	溫
甘草	三兩	甘	平	半夏	半升	辛	溫	生姜	三兩	辛	溫
大棗	十三枚	甘	溫	右七味	以水一斗二升	煮取六升	去滓	再煎	取三升	溫服	一升
日三服											

成無已曰。熱淫於內。以苦發之。柴胡黃芩之苦。以發傳邪之熱。裏不足者。以甘緩之。人參甘草之甘。以緩中和之氣。邪半入裏。則裏氣逆。辛以散之。半夏以除煩嘔。邪半在表。則營衛爭之。辛甘解之。姜棗以和營衛。

柴胡加桂枝湯

柴胡	四兩	右
黃芩	各一兩	
人參	各一兩	
芍藥	各一兩	
甘草	二兩	合
半夏	半升	
生薑	半斤	切
大棗	六枚	擘
桂枝	去皮	

九味以水七升，煮取三升，去滓，温服。

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡 半斤

苦平

桂枝

三兩 去皮 辛熱

乾姜

三兩 辛熱

括蕒根

四兩 苦寒

黃芩

三兩 苦寒

牡蠣

三兩 熬 鹹寒

甘草

二兩 炙 甘平

右七味以水一斗二升，煮取六

升，去滓，再煎，取三升，温服，一升，日三服，初服微

煩，復服，汗出，便愈。

成無已曰：內經曰：熱淫於內，以苦發之。柴胡、黃芩之苦，以解傳表之邪。辛甘發散，為陽。桂枝、甘草之

辛甘，以散在表之邪。鹹以軟之。牡蠣之鹹，以消胸脇之滿。辛以潤之。乾薑之辛，以固陽虛之汗。津液不足，而為渴。苦以堅之。括蕒之苦，以生津液。

柴胡加芒硝湯

於小柴胡湯方內加芒硝六兩，餘依前法服，不

解更服。

柴胡加龍骨牡蠣湯

半夏 二合 洗

大棗 六枚

柴胡 四兩

生薑 一兩 半

人參 一兩 半

龍骨 一兩 半

易經論說條辨

方

六

傳古堂

鉛丹一兩
 桂枝一兩半
 茯苓一兩
 大黃一兩
 牡蠣一兩
 右十一味以水八升煮取四升內大黃切如棗子更煮下二沸去滓溫服下升

大柴胡湯

柴胡半斤
 黃芩三兩
 芍藥二兩
 半夏半升
 生姜五兩
 枳實四枚
 大棗一枚
 大黃二兩
 右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服下升日三服

方不用大黃若不加大黃恐不為大柴胡湯也
 成無已曰柴胡黃芩之苦入心而折熱枳實芍藥之酸苦湧泄而扶陰辛者散也半夏之辛以散逆氣辛甘和也薑棗之辛甘以和營衛

四逆散

甘草炙甘
 枳實破水漬
 柴胡苦寒
 芍藥酸微
 右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服

成無已曰內經曰熱淫於內佐以甘苦以酸收之

以苦發之。枳實甘草之甘苦以泄裏熱。芍藥之酸以收陰氣。柴胡之苦以發表熱。

加減法。欬者加五味子乾薑各五分。并主下痢。肺寒氣逆則欬。五味子之酸收逆氣。乾薑之辛散肺寒。并主下痢者。肺與大腸為表裡。上欬下痢治則頗同。悸者加桂枝五分。悸者氣虛而不能通行。心下築築狀悸動也。桂猶圭也。引導陽氣。苦熱以使小便不利者。加茯苓五分。茯苓味甘而淡。用以滲泄。腹中痛者加附子一枚。炮。合析裏虛遇。

邪則痛。加附子以補虛。泄利下重者。先以水五升。煮薤白三升。煮取三升。去滓。以散方寸匕。內湯中。煮取一升半。分溫再服。泄利下重者。氣滯也。加薤白以泄氣滯。

論曰。四肢者諸陽之本。陽氣不足。陰寒加之。陽氣不相順接。是致手足不溫。而成四逆。此湯中發陽氣。走散陰寒。溫經暖肌。故以四逆名。此奇製之太劑也。四逆屬少陰。少陰者腎也。腎肝位遠。非太劑不能達。內經曰。遠而奇偶。制大其服。此之謂也。

五苓散

猪苓十八銖去皮甘平 澤瀉一兩六銖半酸鹹 茯苓十八銖甘淡

桂半兩去皮辛熱 白朮十八銖日平 右五味為末以

白飲和服方寸匕七多飲暖水汗出愈

成無已曰淡者一也口入一而為甘甘甚而反淡

甘緩而淡滲猪苓白朮茯苓二味之甘潤虛燥而

利津液鹹味下泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水辛甘

發散為陽桂枝之辛甘以和肌表

文蛤散

五苓散

文蛤五兩醜寒 右一味為散以沸湯和一錢匕服

湯用五合

成無已曰鹹走腎邪可以勝水氣

猪苓湯

猪苓去皮甘平 茯苓甘平 阿膠甘平

滑石碎甘 澤瀉甘鹹寒 右五味以水四

升先煮四味取一升去滓內下阿膠烱消溫服

七合日三服

成無已曰甘甚而反淡淡味滲泄為陽猪苓茯苓

之甘以行小便。鹹味湧泄為陰。澤瀉之鹹以泄伏水。滑利竅。阿膠滑石之滑以利水道。

牡蠣澤瀉散

牡蠣鹹平

澤瀉鹹寒

栝萸根苦寒

蜀漆辛平

葶藶苦寒

商陸根辛酸鹹

海藻鹹寒洗去鹹已上各等分

右七味異搗下篩為散更

入白中治之。白飲和服。方寸匕。小便利止。後服日三服。

成無已曰。鹹味湧泄。牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水。

氣內經曰。濕淫於內。平以苦。佐以酸。辛以苦泄之。蜀漆葶藶栝萸商陸之酸。辛與苦以導腫濕。

大承氣湯

大黃四兩苦寒酒洗

厚朴半斤苦溫炙去皮

枳實五枚炙苦寒

芒硝三錢寒鹹寒

右四味以水一斗。先煮二物。取五

升。去滓。內大黃。煮取二升。去滓。內芒硝。更上火。微下兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。

成無已曰。內經曰。燥淫所勝以苦下之。大黃枳實之苦以潤燥除熱。又曰。燥淫於內。治以苦溫。厚朴

之苦下 燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之寒以攻蘊熱

小承氣湯

大黃 四兩 厚朴 三兩炙 枳實 三枚 已

上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

成無已曰大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去芒硝

又以結不至堅故亦減厚朴枳實也

調胃承氣湯

大黃 三兩清酒 甘草 二兩炙 芒硝 半斤鹹

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服

成無已曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘芒硝鹹寒以除熱大黃苦寒以蕩實甘草甘平助一物推而緩中

麻仁丸

麻子仁甘平 二斤

芍藥酸平 半斤

大黃苦寒 一斤去皮

厚朴苦寒 一斤去皮

枳實苦寒 半斤炙

杏仁尖 一斤去皮

脂甘

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十

丸日三服漸加以和為度

成無已曰內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以飲津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝飴狀攪之勿令隻着欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如下一食頃當大便出

二白散

桔梗三分辛

巴豆一分去皮心煮

苦微溫

黑研如脂平溫

五

貝母一分辛 右作三味為末內巴豆更於白
 中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在
 膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過
 不止進冷粥一盃身熱皮粟不解欲引衣自覆
 者若以水喫之洗之益令熱却不得出當汗而
 不汗則煩假令汗出已腰中痛與芍藥三兩如
 上法
 成無已曰辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下
 氣巴豆之辛用以散實

茵陳蒿湯

茵陳蒿六兩苦 梔子十四枚 大黃二兩去
微寒 劈苦寒 皮苦寒
 右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮
 取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁
 狀色正赤一宿復減黃從小便去也
 成無已曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取
 之茵陳梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜補
 必以酸大黃之苦寒以下瘀熱

十棗湯

傷寒論後條

方

五

博古堂

芫花苦 辛

甘遂苦 寒

大戟苦 寒

大棗甘 溫

右三味等分各別搗為散以

水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內

藥末強人服一錢七羸人服半錢溫服之平日

服若下少病不除者明日更服加半錢得快下

利後糜粥自養

成無已曰辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之

甘遂大戟之苦以泄水水者腎所主也甘者脾之

味也大棗之甘者益土而勝水

大陷胸湯

大黃六兩 去 皮 苦 寒

芒硝一升 鹹 寒

甘遂一錢 苦 寒

右

三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝

煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

成無已曰大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名硝

石以其鹹能更鞭夫間有遂以通水也甘遂若未

間之遂其氣可以直達透結陷胸三物為允

大陷胸丸

大黃半斤 苦 寒

葶藶半升 熬 苦 寒

芒硝半升 鹹 寒

杏仁 半升去皮熬 右四味搗篩二味內杏仁

芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂

末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服

之一宿乃下更服取下為效禁如藥法

成無已曰大黃芒硝之苦鹹所以下熱葶藶杏仁

之苦甘所以泄瀉甘遂取其直達白蜜取其潤利

皆以下泄瀉瀉實物也

小陷胸湯

黃連 一兩 苦寒 半夏 半升洗 辛溫 栝蘆實 大者一 個 苦寒

右三味以水六升先煮栝蘆實取二升去滓內諸

藥煮取二升去滓分溫三服

成無已曰苦以泄之辛以散之黃連栝蘆實苦寒

以泄熱半夏之辛以散結

桃核承氣湯

桃仁 五十個去 皮尖甘平 桂枝 二兩去 皮辛熱 大黃 四兩

芒硝 二兩 甘草 二兩 炙 右五味以水七升

煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先

食溫服五合日三服當微利

成無已曰甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃
仁之甘下焦畜血散以桂枝辛熱之氣寒以收之
熱甚搏血故加二物於調胃承氣湯中也

抵當湯

水蛭三十個熬 鹹苦寒 蠭蟲三十個熬去翅足苦微寒

桃仁三十個熬 苦甘平 大黃三兩酒浸苦寒 右四味為末以

水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

成無已曰苦走血鹹勝血蠭蟲水蛭之鹹苦以除
畜血甘緩結苦泄熱桃仁大黃之苦以下結熱

抵當丸

水蛭二十個苦寒 蠭蟲二十五個苦微寒 桃仁二十個去皮尖

大黃三兩 右四味杵分為四丸以水一升煮

一丸取七合服之晝時當下血若不下者連服

瓜蒂散

瓜蒂一分熬 黃苦寒 赤小豆一分酸溫 右二味各別搗

篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱

湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不

吐者少少加得快利乃止

成無已曰其高者因而越之越以瓜蒂豆豉之苦
在上者瀉之瀉以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄
為陰。

梔子豉湯

梔子 十二枚
擘 苦寒

香豉 四兩
綿裹 苦寒

右二味以水四

升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓
分為二服溫進一服得吐者止後服

成無已曰酸苦湧泄為陰苦以瀉吐寒以勝熱梔
子豉湯相合吐劑宜矣。

梔子甘草豉湯

於梔子豉湯方內加入甘草二兩餘依前法得
吐止後服

梔子生姜豉湯

於梔子豉湯方內加入生薑五兩餘依前法得
吐止後服

梔子厚朴湯

梔子 十四枚
苦寒 厚朴 四兩
炙 苦寒 枳實 四枚
水浸去醎炒 苦寒
已上三味以水二升半煮取一升半去滓

分二服温進一服得吐者止後服
成無已曰酸苦湧泄。梔子之苦以湧虛煩。厚朴枳實之苦以泄腹滿。

梔子乾薑湯

梔子十四枚

乾薑二兩

右二味以水三升

半煮取一升半去滓分三服温進一服得吐者止後服

成無已曰苦以湧之。梔子之苦以此煩。辛以潤之。乾薑之辛以益氣。

枳實梔子豉湯

枳實三枚炙

梔子十四枚

豉一升綿

右

三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取三升下豉更煮五六沸去滓温分再服覆令微似汗

成無已曰枳實梔子豉湯則應吐劑。此云覆令微似汗出者以其熱聚於上。苦則吐之熱散於表者。苦則發之內經曰火淫所勝以苦發之。此之謂也。

梔子棗皮湯

梔子十四枚

棗皮一升

右

三

梔子 一十五個 苦寒

甘草 一兩 甘平

黃檗 右三味

以水四升，煮取一升半，去滓，分溫再服。

半夏瀉心湯

半夏 半升 洗 辛平

黃芩 苦寒

乾薑 辛熱

人參 各三兩 甘溫已上

黃連 一兩 苦寒

大棗 十二枚 擘 溫甘

甘草 三兩 炙 甘平

右七味以水一斗，煮取六升，去滓，再煮，取三升，溫服，一升，日三服。

成無已曰：辛入肺而散氣，半夏之辛以散結氣，苦入心而泄熱，黃芩黃連之苦以瀉痞熱，脾欲緩急。

食甘以緩之，人參大棗之甘以緩之。

大黃黃連瀉心湯

大黃 二兩 苦寒

黃連 一兩 苦寒

右二味以麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓，分溫再服。

成無已曰：內經曰：火熱受邪，心病生焉。苦入心，寒除熱，大黃黃連之苦寒以導瀉，心下之虛熱，但以麻沸湯漬服者，取其氣薄而泄虛熱。

附子瀉心湯

大黃 二兩

黃連

黃芩 各一兩

附子一枚炮去皮破別煮取汁 右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯

生薑四兩切

甘草三兩炙

人參三兩

乾薑一兩

黃芩三兩

半夏半升洗

黃連一兩

大棗十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服下升日三服

甘草瀉心湯

甘草四兩 黃芩三兩 乾姜三兩
半夏半升洗 黃連一兩 大棗十二枚擘 右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服下升日三服

黃芩湯

黃芩三兩苦寒 甘草二兩炙甘平 芍藥二兩酸平
大棗十二枚擘甘溫 右四味以水一斗煮取三升去渣溫服下升日再夜一服若嘔者加半夏半升生薑三兩

成無已曰虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅歛腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

黃芩加半夏生薑湯

於黃芩湯方內加半夏半升生薑一兩半餘依

黃芩湯服法

黃連湯

黃連 苦寒

甘草 多甘平

乾薑 辛熱

桂枝 去皮辛熱 人參 甘平

半夏 辛溫 半升洗

大棗 十二枚 擘甘溫

右七味以水一斗煮取六升

滓溫服一升日服夜二服

成無已曰上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂薑半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之 人參甘草大棗之甘以益胃

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑 三兩 去皮 辛熱

黃連 三兩 去鬚 苦寒

黃芩 三兩 苦寒

人參 三兩 甘溫

右四味以水六升煮取二升去滓

分溫再服

成無已曰辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格

黃連阿膠湯

黃連 四兩 苦寒

黃芩 一兩 苦寒

芍藥 二兩 酸平

雞子黃 二枚 甘溫

阿膠 三兩 甘溫

右五味以水五升

先煮三物取二升去滓內膠洋烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

成無已曰陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足以甘補之雞黃阿膠之甘以補血酸收

也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱

白頭翁湯

白頭翁 三兩 苦寒

黃連 三兩 苦寒

黃柏 三兩 苦寒

秦皮 三兩 苦寒

右四味以水七升煮取二升去滓

溫服一升不愈更服一升

成無已曰內經曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之

竹葉石膏湯

竹葉 二把 辛平

石膏 一斤 甘寒

半夏 半升 辛溫

傷寒論後條辨

方

三兩

傷寒論

人參 三兩 甘溫

甘草 二兩 炙 甘平

粳米 半升 甘微寒

麥門冬 一升 去心 甘平

右七味以水一斗煮取六升

去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三

服

成無已曰辛甘發散而除熱竹葉石膏甘草之甘辛以發散餘熱甘緩脾而益氣麥門冬人參粳米之甘以補不足辛者散也氣逆者欲其散半夏之辛以散逆氣

白虎湯

知母 六兩 苦寒

石膏 一斤 碎 甘寒

甘草 二兩 甘平

粳米 六合 甘平

右四味以水一斗煮米熟湯成去

滓溫服一升日三服

成無已曰熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益

氣

白虎加人參湯

即於前方內加人參餘依白虎湯方法

四逆湯

甘草二兩炙 乾姜一兩半 附子一枚生用
片辛 甘平 辛熱 去皮破八
 大熱 右三味咬咀以水三升煮取一升二合
 去滓溫服再服強人可附子一枚乾姜二兩
 成無已曰內經曰寒淫於內治以甘熱又曰寒淫
 所勝平以辛熱甘草乾姜相合為甘辛大熱之劑
 乃可發散陰陽之氣

茯苓四逆湯

茯苓六兩 人參一兩 甘草二兩炙
甘平 甘溫 甘平
 乾姜一兩半 附子一枚生用去皮 右五味
辛熱 破八片辛熱

以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服
 成無已曰四逆湯以補陽加茯苓人參以益陰
 四逆加入參湯

即四逆湯加入參

成無已曰惡寒脈微而利者陽虛陰勝也利止則
 津液內竭故云亡血金匱玉函曰水竭則無血與
 四逆湯溫經助陽加入參生津益血
 通脈四逆湯

甘草三兩 附子一枚生用
炙 去皮破八片

草薑三兩強人

右三味以水三升，煮取一升

二合，去滓，分溫再服。

加減法

面色赤者，加葱九莖，葱味辛，以通陽氣。

腹中痛者，去葱，加芍藥二兩，芍藥之酸通寒利，腹

中痛為氣不通也。嘔者，加生薑二兩，辛以散之。

嘔為氣不散也。咽痛者，去芍藥，加桔梗一兩，咽

中如結，加桔梗則能散之。利止，脈不出者，去桔

梗，加人參一兩，利止，脈不出者，亡血也。加人參以

補之。經曰：脈微而利，亡血也。四逆加人參湯主之。

脈病皆與方相應者，乃可服之。

四逆加豬膽汁湯

於四逆湯方內加入豬膽汁半合，餘依前法服。如無豬膽，以羊膽代之。

白通湯

葱白四莖

乾薑一兩

附子一枚生用

片辛

右三味以水三升，煮取一升，去滓，分溫

再服。

成無已曰：內經曰：腎苦燥，急食辛以潤之。葱白之

辛以通陽氣。乾薑附子之辛以散陰寒。

白通加猪膽汁湯

葱白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚 生去皮破八片

人尿 五合 鹹寒

猪膽汁 一合 苦寒

已上三味以水

三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分
溫再服若無膽亦可用

成無已曰內經曰若調寒熱之逆冷熱必行則
物冷服下噎之後冷體既消熱性便發由是病氣
隨愈嘔噦皆除情且不違而致大益此和人尿猪

膽汁鹹苦寒物於白通湯熱劑中要其氣相從則
可以去格拒之寒也

附子湯

附子 二枚 去皮辛熱

茯苓 三兩 甘平

人參 二兩 甘溫

白朮 四兩 甘溫

芍藥 三兩 酸平

右五味以水八升

煮取三升去滓溫服一升日三服辛以散之附
子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘
以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以狀者
偏陰偏陽則為病火欲寔水當平之不欲偏勝

也

芍藥甘草附子湯

芍藥 三兩 酸 微寒

甘草 三兩 炙 甘平

附子 一枚 炮去皮 破八片

已上三味以水五升煮取一升五合去滓

分溫服

成無已曰芍藥之酸收斂津液而益營附子之辛

溫固陽氣而補衛甘草之甘調和辛酸而安正氣

乾薑附子湯

乾薑 一兩 辛熱

附子 一枚 生用 去皮 破八片 辛熱

右二味

以水三升煮取一升去滓頓服

成無已曰內經曰寒淫所勝平以辛熱虛寒大甚

是以辛熱劑勝之也

真武湯

茯苓 三兩 甘草 二兩

芍藥 三兩 酸平

生薑 三兩 切 辛溫

白朮 二兩 甘溫

附子 一枚 炮去皮 破八片 辛熱

右五味以

水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

成無已曰脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益

脾逐水寒淫所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸平

附子芍藥生薑之酸辛以溫經散濕

加減法 若欬者加五味半升細辛乾姜各一兩氣

逆欬者五味之酸以收逆氣水寒相搏則欬細辛

乾薑之辛以散水寒若小便利者去茯苓小便

利則無伏水故去茯苓若下利者去芍藥加乾

薑二兩芍藥之酸泄氣乾薑之辛散寒若嘔者

去附子加生薑足前成半斤氣逆則嘔附子補氣

生薑散氣千金曰嘔家多服生薑此為嘔家聖藥

理中湯并丸

人參 甘溫

甘草 炙甘

白朮 甘溫

乾薑 辛熱已上
各三兩

右四味搗篩為末蜜和丸如

雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三

服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯

法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓

溫服一升日三服

成無已曰脾欲緩急食甘以緩之用甘補之人參

白朮甘草之甘以緩脾氣調中寒淫所勝平以辛

熱乾姜之辛以溫胃散寒

加減法 若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。脾
 虛。腎氣動者。臍上築動。內經曰。甘者令人中滿。水
 耳。壅補。桂泄奔豚。是相易也。吐多者。去朮加生
 薑三兩。嘔家不喜甘。故去朮。嘔家多服生薑。以辛
 散之。下多者。還用朮。浮者。加茯苓二兩。下多者
 者。用朮以去濕。悸加茯苓以導氣。渴欲得水者。
 加水。足前成。四兩半。津液不足。則渴。水甘以緩之。
 腹中痛者。加人參。足前成。四兩半。裏虛則痛。加
 人參以補之。寒者。加乾姜。足前成。四兩半。寒淫

所勝平以辛熱。腹滿者。去朮加附子一枚。服湯
 後。如食頃。飲熱粥一升許。微自溫。勿發。捐衣被。胃
 虛則氣壅。腹滿。甘令人中滿。是太水也。附子之辛
 以補陽散壅。

甘草乾薑湯

甘草 四兩 炙

乾薑 二兩 炮

右咬咀。以水三

升。煮取一升。五合。去滓。分溫再服。

成無已曰。辛甘發散為陽。甘草乾薑相合。以復陽
 氣。

烏梅丸

烏梅 三百個 酸溫

細辛 六兩 辛熱

乾薑 十兩 辛熱

黃連 一斤 苦寒

當歸 四兩 辛溫

附子 六兩 辛熱

蜀椒 四兩 去子 辛熱

桂枝 六兩 辛熱

人參 六兩 甘溫

黃柏 六兩 苦寒

右十味異搗篩合治之以苦酒漬

烏梅一宿太核蒸之五升米下飯熟搗成泥和

藥令相得內白中與蜜杵二千下圓如梧桐子

大先食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生

冷滑物臭食等

成無已曰肺主氣肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之入參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之以苦堅之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒虻得甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安虻

吳茱萸湯

吳茱萸 一升 洗 辛熱

生薑 六兩 切 辛溫

大棗 十二枚 擘 甘溫

右四味以水七升煮取三升

傷寒論後條辨

方

聖

滓温服七合日三服
 成無已曰内經曰寒淫於内治以甘熱佐以苦辛
 吳茱萸生薑之辛以温胃人參大棗之甘以緩脾
 當歸四逆湯

當歸 三兩 辛温

桂枝 三兩 辛熱

芍藥 三兩 酸鹹

細辛 二兩 辛熱

大棗 二十五 個

甘草 二兩 炙

通草 二兩 甘平

右七味以水八升煮取三升去滓

温服升日三服

成無已曰内經曰脉者血之府也諸血者皆屬心

通脉者必先補心益血苦先入心當歸之苦以助
 心血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣
 肝苦急急食甘以緩之太棗甘草通草之甘以緩
 陰血

四逆加吳茱萸生薑湯

即前方加吳茱萸二升生薑半斤切以水六升
 清酒六升和煮取五升去滓温分五服一服水
 酒各四升
 成無已曰茱萸辛温以散久寒生薑辛温以行陽

氣

桃花湯

赤石脂一斤一半全用

乾姜辛熱一兩

粳米甘平一升

右三味以水七升煮米令熟去滓

溫服七合內赤石脂末方寸匕日三服若一服

愈餘勿服

成無已曰。瀉可太脫。赤石脂之瀉以固腸胃。辛以散之。乾薑之辛以散裏寒。粳米之甘以補正氣。

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂甘溫一斤碎禹餘糧甘平一斤碎

已上二味以

水六升煮取三升去滓三服

本草云。澁可太脫。石脂之澁以收斂之。重可太脫。餘糧之重以鎮固之。

旋覆代赭石湯

旋覆花鹹溫三兩

人參甘溫二兩

生薑辛溫五兩切

半夏辛溫半升洗

代赭石苦寒一兩

大棗甘溫十二枚

甘草甘平三兩炙

右件七品以水一斗煮取六升

去滓再煎取三升溫服一升日三服

成無已曰。鞭則氣堅。鹹味可以與之。旋覆之鹹。以
與痞。鞭虛則氣浮。重劑可以鎮之。代赭石之重。以
鎮虛逆。辛者散也。生薑半夏之辛。以散虛痞。甘者
緩也。人參大棗甘草大棗之甘。以補胃弱。

厚朴生薑甘草半夏人參湯

厚朴

半斤去皮炙苦溫

生薑

半斤切辛溫

半夏

半斤洗辛平

人參

一兩甘溫

甘草

二兩炙甘平

右五味以水一

斗煮取三升。太澤溫服。下升日三服。

成無已曰。脾欲緩。急食甘以緩之。用苦泄之。厚朴



之苦。以泄腹滿。人參甘草之甘。以益脾胃。半夏生
薑之辛。以散滯氣。

芍藥甘草湯

芍藥

四兩酸微寒

甘草

四兩炙甘平

右二味。以水

三升。煮取一升半。太澤分溫再服之。

成無已曰。芍藥白補而赤瀉。白收而赤散也。酸以
收之。甘以緩之。酸甘相合。用補陰血。

甘草湯

甘草二兩

右一味。以水三升。煮取一升半。太

滓溫服七合日一服

桔梗湯

桔梗一兩辛

甘草二兩甘平

右二味以水三升

煮取一升去滓溫服再服

成無已曰桔梗辛溫以散寒甘草味甘平以除熱
甘梗相合以調寒熱

猪膚湯

猪膚一斤甘寒

右一味以水一斗煮取五升去滓

加白蜜一升白粉五合熬香和相得溫二服

成無已曰猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以
猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

苦酒湯

半夏洗破如棗核大十四枚辛溫

雞子一枚去黃內上苦酒

着雞子殼中甘微寒右二味內半夏着苦酒中以雞子

殼置刀環中安火上令三沸太滓少少含嚥之
不差更作三劑服之

成無已曰辛以散之半夏之辛以發音聲甘以緩
之雞子之甘以緩咽痛酸以收之苦酒之酸以斂

咽瘡

半夏散及湯

半夏洗辛

桂枝去皮辛熱

甘草炙甘平以上各等分

以上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散一兩方寸匕更煎三沸下火令小冷少少與之

成無已曰內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半夏桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣

燒裩散

右取婦人中裩近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則驗婦人病取男子裩襠燒灰

寶永元年九月日 博古堂藏板

附傷寒論原本編次

漢張機仲景著

辨脈法第一

自首條至末條

次第俱同

平脈法第二

一	八	三	二	九	三	四	四	五	四	四	二	并	六	四	四	七	五	四	八	六	四	九	七	四
十	八	四	十	一	五	十	二	八	五	十	三	二	六	十	四	九	四	十	五	一	五	十	六	五
十七	三	五	十八	四	五	十九	八	五	五	二十	六	五	二	一	七	五	二	二	三	六	二	三	二	三
四	六	二	四	五	六	二	五	六	六	二	六	七	二	七	八	六	二	八	九	六	二	九	七	三

傷寒論後條辨

原本編次

博古堂

十七	三一	二七	三二	三七	三三	三七	三四	三三	三五	三七	三六	三七
三七	八七	三八	九七	三九	八八	四一	一八	四一	二八	四二	三八	四三
九五	四四	十六	四五	一六								

傷寒例第三

自首條至末條 具載傷寒例貶僞條

辨瘧濕暍脉證第四

一	四八	二六	三八	五	四	六八	五八	六	七八	七	七八	八	八八	九	八八	十	八八	九
十一	十九	十二	九	又	十三	九	又	十四	九	又	十五	九						

辨太陽病脉證并治上第五

一	九	十	二	又	九	三	又	九	三	九	四	四	九	九	四	〇	五	又	九	五	前	六	又	九
七	又	九	八	六	九	十	九	又	九	十	又	二	二	百	十一	二	九	十	十二	九	九			
十三	三	百	十四	五	二	百	十五	八	百	五	十六	六	又	九	十七	九	又	十八						
一百	十九	三	百	六	二十	百	二十一	十	百	五	二十二	二	百	六	二十三	三	百	二十四	三	百	二十五	三	百	二十六
二	四	二	百	二	五	二	百	二	六	六	二	百	二	七	一	二	百	二	八	五	二	百	二	九
二	九	二	百	三	十	二	百	一																

辨太陽脉證并治中第六

一	五	二	百	二	四	二	百	三	五	二	百	四	一	百	六	五	三	百	十六	六	五	三	百	十七	七	百	三	
三	八	六	百	九	九	十	二	百	十二	四	百	十二	百	十一	二	百	十三	百	十二	四	百	十三	六	百	十三	六	百	三

傷寒論後條辨

原本編次

二

辨不可吐第十八

二二九 四百九

辨可吐病脉證并治第十九

二二三 五百二 二四一 五百一 二五二 五百二 二六三 五百三 二七四 五百四

辨不可下病脉證并治第二十

二八	五五	二九	五五	三十	五五	三一	五五	三二	五五
三三	五九	三四	五九	三五	五九	三六	五九	三七	五九
三八	五七	三九	五七	四〇	五七	四一	五七	四二	五七
四三	五三	四四	五三	四五	五三	四六	五三	四七	五三

五百四八 五百四九 五百五十一 五百五十七

辨可下病脉證并治第二十一

五一	五二	五三	五四	五五	五六	五七	五八	五九	六十
六一	五三	五四	五五	五六	五七	五八	五九	六十	六十一

張仲景本論編次

原本編次

八

博古堂

終

傷寒論後集

一	二	三	四	五	六	七	八	九
九	四	三	二	二	二	二	二	二
十	一	六	六	五	五	四	四	三
三	九	百	百	百	百	百	百	百
十	七	六	六	五	五	四	四	三
三	四	二	二	二	二	二	二	二
又	并	并	并	并	并	并	并	并
九	六	六	五	五	四	四	三	三
四	七	七	七	七	七	七	七	七
五	八	八	八	八	八	八	八	八
又	九	九	九	九	九	九	九	九
三	四	四	四	四	四	四	四	四
前	百	百	百	百	百	百	百	百
二	六	六	五	五	四	四	三	三
六	四	四	四	四	四	四	四	四
又	六	六	五	五	四	四	三	三
後	百	百	百	百	百	百	百	百
二	十	十	十	十	十	十	十	十
	五	五	五	五	五	五	五	五

辨太陽病脈證并治中篇第二
 九五十七條

七	二	七	二	八	三	八	三	七
三	五	四	一	九	二	五	二	五
百	七	一	四	九	八	十	五	三
七	四	三	三	二	二	十	五	三
百	八	八	三	九	四	九	四	十
三	四	二	四	三	二	五	六	二
百	九	百	四	百	九	八	五	五
六	四	三	三	三	二	二	十	五
百	九	百	四	百	九	八	五	五
四	四	三	三	三	二	二	十	五
九	四	九	四	十	五	十	五	十
二	三	四	二	四	三	三	百	十
七	百	六	百	五	百	九	前	百
五	四	四	三	三	二	二	二	十
十	五	十	五	三	六	一	六	十
三	二	三	二	四	一	五	十	百
百	七	十	百	九	二	二	二	六
三	五	四	四	三	百	二	二	十
百	七	十	百	九	二	二	二	六
五	四	四	三	三	百	二	二	十
三	六	五	二	五	百	五	五	七
二	七	三	百	九	後	中	八	十
百	五	四	四	三	三	二	二	十
五	四	四	三	三	二	二	十	十

傷寒論後集

條辨編次

十

傳

一 六	二 五	三 五	四 七	五 八	六 三	七 三	八 七	九 三	十 七	十一 九	十二 四	十三 一	十四 六	十五 三	十六 八	十七 五	十八 二	十九 九	二十 四	二十一 一	二十二 六	二十三 三	二十四 八	二十五 五	二十六 二	二十七 七	二十八 四	二十九 一	三十 六	三十一 三	三十二 八	三十三 五	三十四 二	三十五 七	三十六 四	三十七 一	三十八 六	三十九 三	四十 八	四十一 五	四十二 二	四十三 七	四十四 四	四十五 一	四十六 六	四十七 三	四十八 八	四十九 五	五十 二
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

辨厥陰病脈證并治第八

凡五十四條

一 六	二 五	三 五	四 七	五 八	六 三	七 三	八 七	九 三	十 七	十一 九	十二 四	十三 一	十四 六	十五 三	十六 八	十七 五	十八 二	十九 九	二十 四	二十一 一	二十二 六	二十三 三	二十四 八	二十五 五	二十六 二	二十七 七	二十八 四	二十九 一	三十 六	三十一 三	三十二 八	三十三 五	三十四 二	三十五 七	三十六 四	三十七 一	三十八 六	三十九 三	四十 八	四十一 五	四十二 二	四十三 七	四十四 四	四十五 一	四十六 六	四十七 三	四十八 八	四十九 五	五十 二
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

八	二	百	二	十九	八	二	百	三	二十	八	二	百	四	二	百	二	一	八	二	百	二	二	八	七	百	二
三	八	二	百	二	四	八	二	百	二	五	八	二	百	二	六	二	百	九	八	九	二	七	百	二	七	百
一	九	二	百	三	十	九	二	百	三	一	九	二	百	七												

陽明經下篇

凡外邪已趨少陽未離陽明謂之少陽陽明列於此篇

一	二	百	二	六	二	百	三	二	百	八	附	少	陽	轉	陽	明	二	證	八	二	百	三	〇		
三	三	百	九	附	太	陰	轉	陽	明	一	證	九	二	百	三	附	少	陰	轉	陽	明	一	證	四	九
證	四	百	附	厥	陰	轉	陽	明	一	證	四	九													

一	三	百	二	二	一	二	三	百	三	三	百	四	三	三	百	五	四	一	百	六	四	三	百	二
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

少陽經全篇

一	三	百	二	二	一	二	三	百	三	三	百	四	三	三	百	五	四	一	百	六	四	三	百	二
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

七	四	七	百	八	四	三	百	九	二	三	百	十	三	三	百	十一	二	三	百	十二	三	三	百	四
十三	二	三	百	十四	二	百	八	十五	七	九	十	十六	二	三	百	十七	七	又	九					
十八	四	三	百	十九	四	三	百	二十	五	三	百	二十一	五	三	百									

重編合病併病壞病痰病附三陽經後其過經

不解附三陰經後

一	二	百	二	二	百	三	二	百	三	五	二	百	四	二	百	五	二	百	六	四	三	百	七	二
九	五	二	百	八	五	二	百	九	六	二	百	十	六	十	合	病								
一	四	二	百	二	九	二	百	三	三	七	百	四	三	三	百	五	四	三	百	五	四	十	併	病
一	六	又	九	二	三	三	百	五	壞	病														

傷寒論後條辨

一百三
七
二百
六
十三
四百以上
二十七痰病

太陰經全篇

一
五
三百
二
三百
五
三百
三
三百
四
三百
四
三百
五
三百
五
三百
六
三百
六
三百
七
三百
七
三百

少陰經前篇

一
六
三百
二
三百
三
三百
三
三百
四
三百
四
三百
五
三百
五
三百
六
三百
六
三百
七
三百
七
三百
八
三百
八
三百
九
三百
九
三百
十
三百
十
三百
十一
三百
十一
三百
十二
三百
十二
三百
十三
三百
十三
三百
十四
三百
十四
三百
十五
三百
十五
三百
十六
三百
十六
三百
十七
三百
十七
三百
十八
三百
十八
三百
十九
三百
十九
三百
二十
三百
二十
三百
二十一
三百
二十一
三百
二十二
三百
二十二
三百
二十三
三百
二十三
三百

九
三百
三
二百
二
四百
九
二百
二
五百
二
五百
九
三百

少陰經後篇

一
六
三百
一
四百
二
三百
三
三百
三
三百
四
三百
四
三百
五
三百
五
三百
六
三百
六
三百
七
三百
七
三百
八
三百
八
三百
九
三百
九
三百
十
三百
十
三百
十一
三百
十一
三百
十二
三百
十二
三百
十三
三百
十三
三百
十四
三百
十四
三百
十五
三百
十五
三百
十六
三百
十六
三百
十七
三百
十七
三百
十八
三百
十八
三百
十九
三百
十九
三百

厥陰經全篇

法五十五

一
四
四百
二
四百
三
四百
三
四百
四
四百
四
四百
五
四百
五
四百
六
四百
六
四百
七
四百
七
四百
八
四百
八
四百
九
四百
九
四百
十
四百
十
四百
十一
四百
十一
四百
十二
四百
十二
四百
十三
四百
十三
四百
十四
四百
十四
四百
十五
四百
十五
四百
十六
四百
十六
四百
十七
四百
十七
四百
十八
四百
十八
四百
十九
四百
十九
四百
二十
四百
二十
四百

傷寒論後條辨

尚論篇編次

九

傷寒論後條辨跋

儒與醫不必同其業。要未有不通經而可稱為儒者。則亦未有不通經而可稱為醫者。儒之經曰易書詩禮春秋。醫之經曰靈樞素問。二者之書皆淵深瀾博。未易窺其涯岸。以此求儒。世無幾。儒則以此求醫。世無幾。醫矣。是以後聖有為之。輔翊者焉。輔翊易書詩禮春秋者。孔子之論語是也。輔翊靈樞素問者。仲景之傷寒論是也。反淵深為淺。歸瀾博于簡夷。使六經之神猷。鉅典。人人可循。靈樞素問之微言。與義病。

病○可○按○此○之○謂○輔○翊○儒○不○讀○孔○子○之○論○語○而○曰○吾○能○
淹○貫○乎○易○書○詩○禮○春○秋○勢○必○妄○行○及○易○書○詩○禮○春○秋○
此○亂○儒○也○豈○不○讀○仲○景○之○傷○寒○論○而○曰○吾○能○淹○貫○乎○
靈○樞○素○問○勢○必○妄○施○及○靈○樞○素○問○此○亂○醫○也○不○以○規○
矩○不○能○成○方○圓○不○以○六○律○不○能○正○五○音○論○語○者○六○經○
之○規○矩○而○傷○寒○論○者○內○經○之○六○律○也○今○世○縱○乏○通○儒○
朕○而○有○不○讀○孔○子○之○論○語○者○必○無○其○人○為○問○今○之○豈○
其○能○讀○仲○景○之○傷○寒○論○者○幾○人○哉○不○讀○仲○景○傷○寒○論○
而○偏○會○讀○內○經○剽○竊○愈○深○背○違○愈○甚○以○今○世○之○傷○寒○

言○之○一○篇○素○問○熱○病○論○何○人○不○從○頭○直○寫○到○底○自○家○
縱○不○會○寫○却○有○王○叔○和○之○傷○寒○例○可○以○對○本○無○差○試○
勘○以○仲○景○之○傷○寒○論○語○語○遵○經○語○語○叛○經○耳○此○說○非○
余○小○子○鈺之○所○敢○初○也○以○余○小○子○鈺日○夕○於○
郊○倩○先○生○程○夫○子○之○門○得○之○耳○提○面○命○者○深○私○之○手○
抄○筆○記○者○久○固○不○敢○承○流○襲○敝○重○復○訛○且○傳○訛○也○憶○
鈺於○振○衣○請○業○初○卽○以○傷○寒○質○先○生○語○鈺曰○今○世○之○
傷○寒○無○復○長○沙○公○之○正○本○也○長○沙○公○傷○寒○論○之○大○經○
太○法○久○被○小○人○盜○而○換○太○矣○鈺不○解○而○請○其○故○先○生○

曰今世之傷寒無非盜之。王叔和叔和之傷寒無非盜之內經。惟其盜之內經是以失之。仲景益不解而請其故。先生曰仲景傷寒論猶場中出此一題。按士而應者抄得他人一篇錦繡文字亦何嘗不妙。只是文字雖佳題目錯了。高高一名六等必在斯人斯文矣。鉦因請曰題目錯者以仲景所論者傷寒而叔和所抄者熱病也。如去其熱病而以冬時嚴凝殺厲所感之傷寒應得無入殼否。先生曰以熱病應者錯在題裏以傷寒應者并錯在題面矣。鉦益不解而請

其故。先生乃語鉦曰子曾讀班彪王命論乎。仲景有傷寒論猶班彪之有王命論也。知班彪王命論之題目非為王命設為非王命而妄覬覦王命之草澤神姦設則知仲景傷寒論之題目非為傷寒設為非傷寒而橫天人以傷寒之操刃創醫設也。傷寒只是下病非傷寒之病紛紜錯亂者多端不從論辨處立之。法使皆入我範圍而槩混加之曰傷寒則班彪一篇王命論分明算作一頂平天冠。以此徧加諸草澤神姦之首幾何不遭慘夷之禍。傷寒二字為操刃創

醫枉殺人無筭者坐此。鉅于此日茅塞頓開乃更端以請曰先生此番訓示俾鉅得聞生平所未聞矣但傷寒不作傷寒讀而欲作非傷寒讀紛紜錯亂從何處着手眼先生乃語鉅曰讀書有法貴在窅緊要會處領及古人之意孔子固有春秋矣讀春秋者不以春秋二字讀春秋而從褒貶予奪四字上讀春秋自一字一句一節以推及全部春秋處處皆有褒貶予奪四字法為手眼則何必春秋雖廣之廿一史無不可作春秋讀之矣讀傷寒論者不以傷寒二字讀傷

寒而從表裏府藏四字上讀傷寒自一字一句一節以推及全部傷寒論在在皆從表裏府藏四字法着手眼則何啻傷寒雖廣之百千萬奇形怪狀之病無不可以傷寒該之矣此二者俱重在無字無句處讀出古人筆底下意旨來不徒字是字句是句還他個肖似而已若只從字句上工肖似則孔子曰知我者其唯春秋乎罪我者其唯春秋乎詮而釋之者又何難曰孔尼父云譽我者其唯青帝白帝乎毀我者其唯青帝白帝乎今人以傷寒詮釋傷寒論字句者類

皆從青帝白帝詮釋春秋字之秘法廣而銓釋傷寒者也以此等詮釋之法最易披拾靈樞鋪填素問炫其工且核狀貌衣冠儼狀去而神氣遠矣余前云唯其盜之內經所以失之仲景者以此銓則從而堅請曰不以傷寒讀傷寒而以表裏府藏四字讀傷寒誠為秘訣矣不知表裏府藏四字從何處覓端倪先生曰古人著書必有次敘次敘中便藏着端倪凡著書必有引子仲景之自敘即傷寒論全部書之引子也讀此引子方得作論之故緣傷寒二字久為庸醫竊

來惑世以此殺人不淺仲景深為之創特視世人所惑為之立說以翻駁之此之謂論論是字法蓋攻傷寒非演傷寒也得其字法方可讀全部論讀之從二脈法始蓋表裏府藏分署于六經者祇屬呆位次從呆處得活法須于表裏府藏中辨出虛實寒熱來方識病之有本有標有主有客有真有似有異有同此其樞紐全在脈上二脈法上有了樞紐自可以我之虛實寒熱活處用六經而不為六經之表裏府藏呆處用撥動樞紐遍體皆張壅濕昭而下以及六經

無非。辨。骨。矣。此。卽。論。之。胃。也。從。此。便。可。讀。六。經。乎。
未。也。欲。讀。六。經。須。明。其。例。例。在。防。似。病。有。脈。異。而。經。
則。同。亦。有。經。同。而。病。實。異。者。毫。釐。千。里。須。得。其。列。方。
可。破。似。六。經。皆。作。如。是。觀。瘥。濕。暈。其。例。也。承。上。起。下。
此。爲。論。之。頭。有。了。別。法。六。經。乃。可。分。而。布。之。迭。而。銓。
之。參。差。錯。綜。比。屬。互。而。照。之。矣。曰。三。陽。三。陰。從。表。裏。
府。藏。四。字。畫。疆。界。也。曰。太。少。正。厥。從。表。裏。府。藏。四。字。
別。職。司。也。曰。之。爲。病。從。表。裏。府。藏。四。字。署。年。貌。也。曰。
某。方。主。之。從。表。裏。府。藏。四。字。定。不。蔽。也。直。從。人。身。中。

行。申。畫。郊。圻。慎。固。封。守。之。法。一。有。病。邪。竊。發。可。以。揆。
查。屬。何。地。方。何。人。掌。理。犯。者。係。何。模。樣。所。犯。合。何。款。
律。表。裏。府。藏。可。分。而。轄。之。亦。可。翻。而。較。之。罪。人。斯。得。
無。復。彼。此。影。射。累。及。無。辜。此。爲。論。之。腹。至。于。經。雖。已。
定。防。有。詭。吾。經。者。裏。可。混。表。藏。可。亂。府。如。霍。亂。之。詭。
傷。寒。此。其。類。也。所。當。累。證。而。詳。脈。法。雖。已。定。有。難。泥。
於。法。者。表。裏。不。分。府。藏。難。擬。如。陰。陽。易。之。燒。棍。散。瘥。
後。病。之。枳。實。梔。子。等。湯。從。意。治。也。一。皆。累。脈。而。詳。證。
二。法。又。無。出。六。經。之。辨。例。來。此。爲。論。之。小。結。乃。若。此。

書之作○為○庸○鑿○剽○竊○內○經○妄○言○傷○寒○者○謂○胸○無○脈
淡○徒○賦○亂○經○臨○證○胡○謬○不○過○引○下○篇○熱○病○陽○熾○陰○虛
之○六○經○妄○加○諸○傷○寒○陰○盛○乘○陽○之○等○病○而○以○熱○病○刺
淡○之○汗○泄○妄○移○作○湯○丸○藥○治○之○汗○下○此○處○源○流○大○差
以○後○線○索○都○亂○矣○始○不○過○模○稜○處○治○殊○不○投○機○繼○亦
欲○平○穩○避○咎○反○增○大○劇○對○證○照○用○古○方○到○手○固○非○荆
棘○迨○至○客○熱○煩○蒸○虛○陽○喘○促○胸○膈○滿○悶○二○便○秘○塞○病
從○虛○壞○又○不○得○一○救○壞○之○法○從○前○剽○盡○內○經○到○此○博
一○傳○字○殺○人○此○無○他○胸○中○着○了○傷○寒○二○字○魔○一○切○病

跋

世

之○本○標○病○之○主○客○病○之○真○偽○與○異○同○總○不○識○也○妄○剽
六○經○究○竟○病○之○表○裏○府○藏○不○明○白○也○所○以○不○明○白○者
二○脉○無○有○入○門○表○裏○府○藏○中○之○虛○實○寒○熱○無○着○落○也
凡○屬○病○來○都○在○疑○伯○蒙○昧○之○間○不○汗○無○法○汗○輒○亡○陽
而○動○經○不○下○無○法○下○輒○奪○穀○而○損○胃○舉○聖○人○扶○陽○建
中○大○旨○悉○壞○于○小○人○表○裏○兩○剝○關○頭○苟○欲○破○迷○救○敵
非○從○此○處○大○設○防○閑○不○可○故○終○之○以○可○汗○不○可○汗○可
下○不○可○下○焉○其○可○汗○不○可○汗○可○下○不○可○下○者○以○病○有
此○一○經○之○實○即○有○此○一○经○之○虛○有○此○一○经○之○熱○即○有

跋

七

此一經之寒非表自是表無關於裏裏只是裏無關
于表也推之府藏亦狀經雖一定而虛實寒熱自是
變動不常須在脉上定得樞紐方可參以六經之證
此爲論之大結凡仲景一書源源委委章有章法起
承轉繳一照論體結構其間太旨只是設六經以網
盡衆病非曰傷寒始有六經也故叮嚀告誡無非教
人尋余所集從前後參差彼此互換處簡別出見病
知源之法以後臨着卒病自不至爲傷寒二字印定
眼目總全論之端倪全在此是以字有字法而不在

字句有句法而不在句處處現有靈機層層包着巧
訣妙意精思旁見側出都非尋常行墨所可宣發者
貴在善讀者領畧及表裏府藏四字於字句中字句
外無處不幫有辨字辨中更着辨直於表裏府藏四
字從脉上還他個虛實寒熱明白久當關盡傷寒方
能醫得傷寒使萬病歸宗於六經六經歸宗于一脉
此法也無已則有吾所註傷寒論之後條辨在自
此日承先生之訓片言隻字無非破盡千古之鴻濛
醒及從之昏瞶亟望此書之出以應世而艱困者

久之今剽剽告成日月慶中天矣右此第一部註
以輔翼仲景方顯出仲景第一部論以輔翼內經從
前妄為剽竊者方嫌仲景論中缺去春夏今則聖言
洋洋不特四時之氣咸具而垂教定法比類屬辭得
為仲景一部扶陽宣化之書得為仲景一部正名定
位之書得為仲景一部章顯闡幽之書得為仲景一
部防微杜偽正失救誤之書傷寒云乎哉天道決人
事備不有先生幾沒仲景則此一部傷寒論豈曰醫
世醫民直將豎盡叔和來千百年前後豎傷寒之豎

此之謂太醫太醫必本於太儒先生為海陽名碩髫
年輒以冠軍補博士弟子員生平著述甚富雖屢戰
棘闈不售顧馳聲菽苑者垂三十年經明行修從而
問字者踵相接也遺值申酉避地來吳乃太儒而醫
遂為太醫只此後條辨一書雖云註傷寒論而靈心
慧眼究極天人其間申明論辨揭出扶陽自成先生
一部通經原道之書自成先生一部關邪辨惑之書
自成先生一部搜源晰委之書自成先生一部簇發
神機連貫氣脉之書傷寒論云乎哉作者聖述者明

自有仲景。誰是先生。小子鍾之。受知于先生。受益于先生。最深。欲求下下言之。幾于道。以輔翊先生之書。如先生之輔翼仲景。以輔翼內經者。而不可得。洵之汰之。不禁其述之長敘之冗媿。及問答之詞。竊附先生卷尾。于不朽云。康熙辛亥。受業門人王式。謹跋。



題傷寒後條辨後
古書之難讀也久矣。間雖有讀者。不知其意旨之所在。則買櫝還珠之蔽。遂有焉。張長沙傷寒率病方論者。方法之祖。而為世醫工之規矩準繩也。然而去聖愈遠。闕漏

後俗報出
頗多。是以少有善談者矣。西晉王
叔和。妄意杜撰。僭亂聖言。遂令後
人淄澠混淆。玉石莫分。蓋亦忌
憚之甚。後未成氏。雖隨文解義而
恐微言未拆也。其他如許知可。龐
安常。朱奉議。韓祗和。程德母之。諸

賢。雖各有發明。其坐王氏之罪。不
可逃愆矣。王履采揮之於前。陶華
闡明之於後。亦有執著條辨。削序例
之僭。喻嘉言立論。遂弼次之失。可
謂能羽翼仲景者也。獨程郊倩斯
書。極口以聲王氏之罪。亦論證治。

始得復正。明白簡當。但得其宗。大有裨於後進也。余嘗閱之。惜其書之不廣傳。邇來諸大子家。未報其得。深且為念。今斯書流播。人皆有之。亦將無所流。一歸公亦醫家之本分也。可之喜乎。嗟呼。昔人有言

曰。仲景之書。一孝子之同。治法霄壤。余雖非善談者。而臣筆端尾。以告後之讀仲景書者。勿忤之看過。

寶永改元龍集甲申秋九月

前田道通識

後修刊

華洛二條通新町東入町

書肆武村新兵衛刊行



