



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN



校註錢氏小兒直訣序

古諺有云寧醫十男子莫醫一婦人寧醫十婦人莫醫一小兒幼科之難昔有自矣小兒六歲已下經所不載以乳下嬰兒有病難治者皆為無所承據也中古始有巫方氏作顱顱經以占夭壽判疾病死生而小兒方行

西醫告白書

焉遠於晉宋江左蘇氏齊之徐王僉能相傳有驗而後踵武厥科者則不止於一家矣至宋神宗時有太醫丞錢仲陽氏貫陰陽於一理合色脉於萬全偉論雄才迥邁前列可謂傑起而振出者也門人闡孝忠託其典要緝成直訣若干卷而幼穉之色

脉症治無遺漏矣先君嘗語余曰幼幼之藥宜善調之古謂小兒爲芽兒如草之萌如水之漚故其命方曰保嬰曰全幼者蓋不欲以峻攻耳錢氏之瀆可以日用錢氏之方可以時省也愚服膺先人之言僅有年矣遇施之治有一得驗者輒自識之用

補註於錢文之下同。幼其幼，不
敢以紫亂朱，以薰並蘭也。非特
以錢氏峻攻為不可用也。視古
既遠，元氣亦殊，不欲直施之於
今耳。敬以一得之愚，附續貂尾，
更覩明哲者正諸時。

錢氏小兒直訣目錄

卷一

診察脉色

脉法

目內症

五臟虛實寒熱

心臟症

脾臟症

腎臟症

變蒸

五臟相勝

面部症

肝臟症

肺臟症

卷一

肝病秋見

心病冬見

肺病春見

腎病夏見

脾病見四季

驚風

急驚風症

胎驚風症

發搐

早晨搐

夜間搐

傷食搐

癲癇症

日午搐
傷風搐

百日內搐

慢驚風症

心癟

脾癟

腎癟

諸瘡

痘疹

傷風兼變症

貪睡

自利

吐瀉身溫涼熱

諸經發熱

潮熱

壯熱

腹脹

手足冷感

熱渴

風熱

溫壯

卷二

吐瀉症

夏秋月吐瀉

傷冷吐瀉

咳嗽症

八九月間嗽

五七月間嗽

十一十二月嗽

傷熱吐瀉

初生吐瀉

卷三

諸痺症

肝痺

心痺

脾痺

腎痺

肺痺

腹痛腫脹諸症

無華痺附

積痛

蟲痛

脹喘

腸中有癖

五臟雜症

喜汗

盜汗

胃怯汗

六陽虛汗

夜啼

驚帝

撮口

弄舌

解顱

胎肥

胎熱

急乳不下

胎怯

龜胷龜背

脅怯失音

黃病

黃疸

行遲齒遲髮遲

目錄畢

卷四 方論

遺誤

錢山兒直訣卷一

門人閻孝忠集



脉法

脉弦急

氣不和

脉沈緩

傷食

脉促結

虛驚

脉浮

爲風

沈細爲寒

脉亂

不治

薛按脉者人身之造化病機之先見用藥之準繩不可不明諸心者也全幼心鑑云小兒一歲以前看虎口食指寅卯辰三關以驗其病脉紋從寅關起不至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過辰者十不救一其脉紋見有五色如因驚必青渴病

脉法

卷一

色紫當以類而推之。一歲後則可用一指轉側，撲其三部脉弦急浮沈四五歲後脉七八至而細數者爲平九至者傷十至者困六至五至者爲虛爲寒弦緊者爲風癟弦急爲客忤其變蒸者脉必散亂骨間有熱脉則沉數若浮而不調爲思祟浮大而數爲風熱伏結爲物聚微細爲疳積爲腹痛浮而洪爲有蟲浮而遲爲胃寒此論脉之大要耳然小兒血氣未實驚則氣散氣散則脉亂矣又當參以三部五脉三部者乃看面上氣色虎口脉紋寸口一指脉五脉者上按額前下診太衝，并前三部謂之五脉也治法能分虛實然實者病氣實而形氣虛也虛者形氣病氣俱虛

也經云真氣奪則虛邪氣勝則實又云虛則補其實則瀉其子東垣先生云形病俱實當瀉之形病俱虛當補之
詳見後圖下

面部症

左腮爲肝右腮爲肺額上爲心鼻爲脾頰爲腎若色赤者熱也宜隨症治之

類音接順下也

薛按左腮屬肝其色青者爲順白者爲逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛漆赤主潮熱癥瘕右腮屬肺其色白者爲順赤者爲逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤瀦或淋閉不通額上屬心其色赤者爲順黑者爲逆若青黑

主驚風腹痛癰癧瘍瘍，微黃。主盜汗頭髮乾燥驚瘈，骨熱，鼻齶脣其色黃者爲順，青者爲逆。若色赤，主脾經虛，熱飲食少，思深黃。主小便祕而鼻燥，衄血，頸屬腎，其色黑者爲順，黃者爲逆。若色赤，主腎與膀胱有熱而小便不通。

目部症

目內色赤者心實熱，導赤散淡紅者心虛熱，生犀散，者肝實熱，瀉青丸，淡青者肝虛熱，地黃丸黃。若脾實熱，瀉黃散，微黃者脾虛熱，益黃散，白而混者肺實熱，瀉白散，目無睛光者腎虛也，地黃丸主之。

按目者五臟之精華各有所主，白睛屬肺，黑睛屬

目部症

眼上下眼胞屬脾，紅脉屬心，瞳人屬腎。此五臟之正色也。然白睛本屬肺，而見紅色，此心竅肺之微邪也。見青色，此肝乘侮之微邪也。見黑色，此腎乘肺之實邪也。見黃色，此脾乘肺之虛邪也。餘倣此。

五臟虛實寒熱

心主驚，實則叫喚，發熱飲水而搐，虛則困卧而悸。○心熱則合，面暎或上竄咬牙者，導赤散主之。○心氣實而喜仰卧者，瀉心湯主之。

薛婉前症，若心小腸實熱，宜治以前藥。若心脾血虛，用五味異功散加當歸。若因心血不足，用秘旨安神丸。若肝心血燥，用紫葫施子散。若因肝心血虛，用六

五臟虛實
寒熱

味地黃丸若因脾虛食慬生痰而驚悸不安者宜用四君子以健脾神麴麥芽以消導山楂柴胡以清熱如用前方病氣雖去前症仍作急調補元氣或反甚急溫補元氣凡此多因姪娠厚味七情或小兒乳哺失宜或乳母飲食鬱怒所致病氣既見形氣已虛當推其所因而以助胃壯氣爲主佐以治病之劑爲善餘倣此

肝主風實則面青目直叫喎壯熱項急頭悶虛則咬牙呵欠○肝熱則手尋衣領及亂撓物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之

醫按前症若肝木實熱生風而自病肺金實

亦者宜用前二藥以瀉其邪氣之實若肝經風熱而目直等症者用柴胡梔子散以清肝火加味西物湯以養肝血若腎虛而咬牙諸症者用六君子湯以健脾土六味地黃丸以滋腎水苟不審其症之虛實而妄用前藥則虛虛之禍不能免矣

肝有風則目連劄得心熱則發搐或筋脉牽繫而直視用瀉青丸以治肝導赤散以清心○肝熱則目赤或兼青發搐者亦用前二藥風甚則身反張強直用地黃丸以補腎瀉青丸以治肝

薛按前症若肝經實熱而自病宜用瀉青丸若肝經血燥而自病用抑肝散取水虛不能生肝者宜用地

黃丸若脾土虛不能培木者宜用六君子湯。凡肝經既病風火相搏則肝臟虧損若不固根本必變他症百出也。

脾主困實則身熱引飲用渴黃散虛則吐瀉生風用異功散。○面白腹痛口中氣冷不思飲食或吐清水以益黃散溫補脾虛下利用調中丸。○呵欠多睡者脾氣虛而欲發驚也。

薛按前症若發熱作渴喜冷飲食或泄瀉色黃睡不露睛屬形病俱實宜用渴黃散疏導之若發熱口乾惡冷飲食或泄瀉色白睡而露睛屬形病俱虛宜用異功散調補之若脾氣下陷者補中益氣湯并用。

愚治沈氏子吐瀉腹痛手足並冷余謂此脾土虛弱寒水所侮先用益黃散一劑諸症頓愈手足稍冷此寒水退而脾土虛弱也用異功散少加木香一劑却去木香再劑而痊。

一小兒傷食發熱吐瀉腹痛欲服益黃散余曰內有丁香良薑非其所宜前症乃脾胃受傷而無寒症不信仍服前藥其痛益甚二便不通口舌糜爛而發

肺主喘實則悶亂氣急喘促飲水虛則嘔氣出氣○肺熱則手搘眉自鼻面用甘桔湯主之○肺盛復感風寒則胃滿氣急喘嗽上氣先用瀉白散以清肺氣後用大青膏以散風寒○肺臟怯則唇白用阿膠散補之悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛甚也

薛按前症若腠理不密外邪所感而肺病者用清肺丸若脾胃氣虛不能相生而肺病者用六君子湯若脾胃氣實大腸不利而肺病者用瀉黃散若心火炎燥肺金而肺病者用地黃丸

腎主虛若胎稟虛怯神氣不足目無睛光面白鬱鬱比皆難育雖育不壽或更加色慾變瘡百出愈難救療或

能制心火也皆用地黃丸

薛按索古先生云下竄者腎氣不足兩足發熱故不喜衣覆也蓋臍以下皆腎之所主緣心氣下行於腎部也所以宜用地黃丸壯水制火而補腎故凡必待精血完固而後嫁娶庶可以免前患精血篇云男子精未滿而御女以通其精則五體有不滿之憂異日有難狀之疾今小兒稟賦不足豈有不本於此哉詳見精血篇

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟本腑成而未全自生變

變蒸

後卽長骨脉五臟六腑之神智也變者易也自內而外
自下而上又身熱故以生之日後三十二日一變蒸卽
智意有異於前何也長生臟腑智意故也何謂三十二
日長骨添精神入有三百六十骨除手足中四十五
碎骨外有三百二十數自生下骨十段而上之十
日百段而三十二日計三百二十段爲一遍亦曰一百蒸
三十二數者由變不足其常也或二十八日卽長二十
八齒已下倣此但不過三十二之數也凡一周遍乃生
虛熟諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨
氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎生志火
水

四日再變生膀胱其發耳與骯冷腎與膀胱俱主於水
水數一故先變生之九十六日三變生心喜一百二十
八日四變生小腸其發汗出而微驚心爲火火數二十一
百六十日五變生肝哭一百九十二日六變生膽其發
目閉而赤肝主木木數三百二十四日七變生肺聲
二百五十六日八變生大腸其發膚熱而汗或不汗肺
者金金數四二百八十八日九變生脾智三百二十日
十變生胃其發不食腹痛而吐乳此後乃齒生能言知
喜怒故始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後
六十四日長其經脉手受血故能持物足受血故能行
立也經云變且蒸謂蒸畢而足一年歲之日也師曰不行

而熱者發其汗，大吐者微止不可餘治是以小兒須變蒸蛻齒者如花之易苗所謂不及三十二齒者由變之不及齒當與變日相合也年壯而視齒方明

薛按小兒變者變其情態蒸者蒸其血脉故三十五日一變每變畢則情態異常全嬰方論云變蒸者以長氣血也變者上氣蒸者發熱也輕則體熱虛驚耳冷微汗唇生白泡三百可愈重者寒熱脈亂腹疼啼叫不能乳食食卽吐噃五日方愈古方以黑散子紫丸子主之竊謂此症小兒所不免者雖勿藥可也兄前藥乃屬峻厲非惟臟腑不能勝抑且又傷氣血真之慎之金算見一小兒至二變發熱有痰投以桔梗

丸一粒率至不救觀此可驗矣若不熟不驚略無症候而暗變者蓋受胎氣壯實故也

五臟相勝症治

肝臟病秋見肝強勝肺而肺怯也宜阿膠散以補肺益黃散以補脾瀉青丸以治肝

薛按索古張先生云肝勝肺則身熱發搐喘促氣短病見於申酉戌時此受所制而不能勝謂之真強若心乘肝爲實邪壯熱而搐有力利驚涼驚一丸主之肺乘肝爲賊邪呵欠而搐無力以地黃丸補肝以瀉白散治肺肝乘脾爲賊邪多睡體重發搐瀉青丸主之腃乘肝爲虛邪憎寒呵欠而搐羌活膏主之太丸

五臟相勝 症治

肝之得病必先察其肺腎然腎者肝之母金者木之
賊非腎水不能相生必肺金鬼邪來犯故其源在肺
先治其肺攻其鬼也其源在腎先補其腎滋其本也
然後察其本臟之虛實而寒溫之徐用誠渭伯仁先
生亦云然

心臟病冬見心強勝腎甚則下竄不語當以地黃丸補
腎以導赤散治心

薛按索古云若喘而壯熱此肺乘心也爲微邪用瀉
白散若風熱相搏此肝乘心也爲虛邪用大羌活湯
下大青丸吐瀉身熱此脾乘心也爲實邪用瀉黃散
若恐怖畏寒腎乘心也爲賊邪用安神丸大凡心臟

得病必先調其肝腎腎爲心之鬼也肝氣通則心氣
和肝氣衰則心氣乏此心病先求其肝清其源也五
臟既病必傳其所勝則腎之受邪必傳於心故先治
其腎逐其邪也若肝腎平和而心自病然後察其虛
實而治之

肺病春見肺勝肝也以瀉白散治肺若目淡青或目赤
者當發搐爲肝怯也以地黃丸補肝

薛按索古云肺病喘嗽氣盛見於寅卯辰時當補肝
瀉肺若肺病久嗽宜補脾清心若心乘肺爲賊邪熟
而喘嗽用地黃丸導赤散阿膠散若肝乘肺爲微邪
惡風眩肩背慣用羌活散若腎乘肺爲實邪憎寒肢

嗽清利用百部丸若脾乘肺爲虛邪體重吐痰壯瀉
咳嗽用人參白术散大凡肺之得病必先察心脾二
臟治之若心火尤盛上炎燥肺而肺爲病宜先抑心
氣若肺氣不足腠理不密風邪所感宜先補脾氣若
中焦痞實太陽壅滯熱氣上蒸宜先理脾氣若心脾
平和則治其本經

腎病夏見水勝火腎乘心也甚則悸動發搐宣風散主

之

薛按潔古云心乘腎者爲微邪發熱不惡風寒用桂
枝丸肺乘腎者爲虛邪喘嗽皮膚寒澀用百部丸肝
乘腎者爲實邪拘急發搐身寒用理中丸脾乘腎者

爲賊邪體重泄瀉惡寒用理中丸大抵五行之間惟
腎一臟母盛而子反受邪然物之性有不可以一槩
論者肺腎是也何則肺主氣肺有熱則熱得氣而上
蒸不能下生於腎而腎受邪矣此腎之病源於肺也
又有脾經之濕相刑於腎者法當解肺熱去脾濕若
本經自病者宜滋補之

脾病見四傍皆倣此治之順者易治逆者難治脾怯當
面白黃五臟相乘隨症治之

薛按潔古云凡脾之得疾必先察其肝心二臟之虛
實而治之蓋肝者脾之賊心者脾之母也肝氣盛則
賊邪勝心氣虧則脾氣虛故肝乘脾則風渴而嘔矣

苓半夏湯主之。若心氣實而壯熱體重，泄瀉羌活黃芩、蒼朮甘草湯主之。若肺乘脾而咳嗽便祕飲食如常者，煎檳榔大黃湯下。夢寐丸若腎乘脾而惡寒泄瀉，理中丸之類主之。竊謂五臟之症相乘伏匿隱顯，莫測然病機不離五行生剋制化之理。况小兒未有七情多因形體怯弱血氣未全故有五臟勝乘之病，更當調治其母。若專治其子，多致誤矣。

急驚風症治

小兒急驚因聞大聲或驚而發搐搐止如故此熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱二便黃赤甚則發搐蓋熱盛生風，陽盛而陰虛也。宜以利驚丸除其痰，不可用

巴豆之藥

薛按秘藏保嬰集云急驚之候牙關緊急壯熱涎湧竄視反張搐搦顫動口中氣熱頰赤唇紅脈浮洪數者此肝經血虛火動生風蓋風生則陰血愈散陰火愈熾火動則肺金愈虧肝木愈盛宜滋肝血養脾氣若屢服祛風化痰瀉火辛散之劑便宜認作脾虛血損急補脾土若風火相搏發熱抽搐目瞤筋攣痰盛者用四物鈎藤鈎以生肝血清肝火用四君子加當歸以補脾土生肺金若肝經血燥發熱驚搐目瞤筋攣痰盛者用六味丸以滋腎水四君子以補脾土若肺金尅肝木用六君子湯以實脾土加芍藥木香以

平肺金若屢服驚藥而脾胃虛寒者須用六君子湯
以補脾胃丁香木香以培陽氣否則必變慢驚
愚治一小兒因驚發熱抽搐噁咬牙作渴飲冷大
便祕結面色青赤然印堂左顙赤甚此心肝二經風
熱相搏乃形病俱實之症先用瀉青丸料加炒黃連
煎服一劑太便隨利熱搐頓減用抑青丸一服諸症
悉退但面色癥兼形氣倦怠飲食少思此病氣去而
形氣虛也用補中益氣湯及地黃丸而安

一小兒發熱抽搐口噤痰湧此急驚風也先用瀉青
丸一服六味丸二服諸症頓退又用小柴胡湯加芎
歸山梔釣藤鈎而安繼以補中益氣湯而愈

一小兒六歲忽然發搐目動咬牙或睡中驚搐痰涎
湧盛或用化痰祛風面色青黃此肝木克制脾土不
能攝涎而上湧也當滋腎水生肝血則風自息而痰
自消用六味丸而愈

一女子十二歲善怒睡中驚搐遍身作痒飲食少思
此肝火風熱脾土受侮用參木柴芩湯以清肝火涼
肝血健脾胃而愈

一小兒三歲患急驚面赤發熱作渴飲冷先君已用
瀉青丸一服勢去大半翌早又自用前丸一服即吐
瀉發搐面色青白手足指冷余以爲脾胃受傷用六
君子湯加薑桂升麻柴胡一劑頓安前哲謂小兒易

爲虛實攻伐之藥中病即止不可過劑我先君蓋守此法

一小兒三歲因驚抽搐發熱痰盛久用抱龍丸等藥面色或赤或青此肝心二經血虛風熱用六味丸滋養肝腎佐以六君加柴胡升麻調補脾胃而愈嘉興王舉人女七歲因跌傷腿膝兩膝腫潰左頤色青左關脉無余意驚則氣散而風熱鬱滯先用四君子加升麻柴胡釣藤鈎一劑其脉即至更用四物加柴胡防風釣藤生血補肝而愈

慢驚風症治

小兒慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃而肢體逆冷口鼻氣微手足瘺癰昏睡露睛此脾虛生風無陽之症也溫白丸主之

薛按保嬰集云急驚屢發屢用直瀉則脾損陰消而變爲慢驚者當補脾養血佐以安心清肺制木之藥最爲切當竊謂前症多因脾胃虧損肝木所勝但用五味異功散加當歸佐以釣藤飲子以補脾土平肝木亦多得效如不應用六君加炮薑木香溫補脾土更不應急加附子以回陽若用逐風驅痰之藥反促其危也每見小兒脾胃弱者一病即成慢驚不可泥爲久病誤藥而後成也內經云爲慢脾風言脾虛受病也其意可見矣

慢驚風 症治

王氏子患吐瀉或用藥下之睡而露睛瘦瘠身冷此慢驚也卽用桔蔓湯治之而目開身溫但二便不利或用八正散身復冷不食卽用益黃散史君子丸溫補脾胃諸症悉愈後又不語用地黃丸以補腎半月而愈

愚治一小兒停食吐瀉先用蔻滯之劑更加咬牙發搐面色青白手足指冷眉唇抽動余以爲脾胃虛弱因藥復傷肝木所乘而成慢驚矣遂用六君子加木香柴胡升麻二劑頓安大凡傷食停滯雖見發搐等症且勿用藥待宿食化盡胃氣漸健而自愈設若強與飲食或誤用藥餌不惟甚其所有而且生其所無矣

舉人余時正子傷食發丹服發表之劑手足抽搐服抱龍丸目瞞瘀盛余謂脾胃虧損而變慢驚矣用六君加附子一劑而安再劑而愈

一小兒患抽搐痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君子補中益氣二湯而愈

小兒初生壯熱吐噃身體強直手足抽掣目皮直視是胎驚風症也

薛按前症多因姪婦忿怒驚恐調攝乖常或挾外邪內傷於胎蓋母有所觸胎必感之當用猪乳膏拭兒口中或用惺惺散加漏蘆令母煎服使藥通乳中兒病自愈矣

卷之三

發搐症治

驚癇發搐男則目左視無聲右視有聲女則右視無聲左視有聲相勝故也故有發時之症

薛按前症多因胎中受患或乳母鬱怒傳兒或小兒乳傷自病其症吐乳面青若痰實壅積則壯熱面紅當兼調治其母切不可損其元氣若欲驗逆順男則擗拳拇指又入食指中爲順於外爲逆女則又入食指爲逆於外爲順仍參吮乳不能類以治其母後倣此

王駢馬子五歲目直視而不欲食或以爲鬼祟用符水噴之反加發搐此肝經實火之症也用瀉青丸而愈

愚治少叅王陽湖孫跌傷股骨正體科接之余視其而青而兼黃口角微掣動此肝木侮脾症也且氣血筋骨皆資脾土而生但壯脾氣則所傷自愈遂用六君子加釣藤鈎當歸三十餘劑諸症悉愈

李寺丞子三歲病搐發而目右視大叫哭師曰逆也凡男目右視有聲金木相戰故也當瀉其強而補其弱遂用瀉肺湯肺病退又用地黃丸補腎用涼驚丸瀉青丸瀉心肝而愈此症男反女故男易治於女也假令女發搐目左視肺之勝肝又病在秋即肺旺肝不能往故哭叫當大瀉其肺然後治心續肝所以言男目右視者木反侮金肝旺勝肺當瀉其肝若更病在春夏金氣極盛

發搐
症治

又當補其肺慎勿瀉也

愚治一小兒兩目連劄手足發搐頻服天麻防風丸之類益甚得飲食則稍愈視其鼻準及左頰色青黃此肝木制脾土用六君子加升麻柴胡釣藤鈎二劑而愈又用補中益氣湯而安

桂寅卯辰時身體壯熱目上視手足動搖口出熱涎項勁強此肝旺也當補腎治肝用地黃九瀉青丸主之薛按前症若煩熱作渴飲冷便結者宜用瀉青丸若發熱飲溫大便不結者宜用柴芍參芩散若自汗盜汗腎虛液不帰源也用地黃丸若服峻劑或久病流涎脾虛涎不歸源也用六君子湯所云肝旺者乃肝虛而邪

氣旺也故先補其母後瀉其子

一小兒寅卯時發熱或兼搐有痰服抱龍瀉青二丸而愈後復患仍用前藥以致咳嗽氣喘不時發搐面兼赤色或青黃或浮腫或流涎余謂咳嗽氣喘脾肺氣虛也不時發搐木乘土也面青赤黃肝入心脾也浮腫流涎脾氣虛也用益智丸以補心氣補中益氣湯以養肺脾而愈
丸治心

薛按前症屬邪氣實而真氣虛故用地黃丸其流涎

不正爲心火虛而脾土弱也。佐以六君子湯。
廣親七太尉病潮熱，師曰：「七使將安，八使預防，明午驚
搐既而果然，遂用藥瀉心肝補腎水而愈。蓋見其坐石
杌目直視而腮赤乃心肝俱熱，午時者心肝用事也。
愚治一小兒已午時發熱驚悸等症，發時形氣倦怠
面黃懶食流涎飲湯余以爲心氣不足所致，不信任
服涼心藥，更加吐瀉，睡而露睛，幾至慢脾風，先用六
君子加薑桂，佐以地黃丸而愈。

一小兒七歲因驚夕患搐，熱後已午未時益甚，形氣
倦怠熱定飲湯，余謂心脾氣虛，朝用補中益氣湯加
益智仁，夕用六君子加當歸釣藤鈎而尋愈後，因飲

食過多吐瀉，或用保和丸治之，加寒熱發搐，此脾土
復傷而肝木所侮，余用六君子柴胡治之，寒熱止而
飲食進，但已午未時去後，用補中益氣湯加茯苓半
夏釣藤鈎而愈。

若申酉戌時微搐而喘，目微斜，身似熱，睡而露睛，手足
逆冷，大便淡黃肺旺也，當用益黃散以補脾導赤散以
治心，瀉青丸以治肝。

薛按前症屬脾土真寒，不能生肺氣而假熱，故宜益
黃散以補肺金之母，如用六君炮薑尤效，若手足不
冷屬虛弱，用五味異功散木香其導赤散瀉青丸初
病元氣未虛者酌量用之，若久病元氣已虛者必用。

六君子湯秘旨安神六味地黃二丸主之

徐氏子三歲日晡發搐身微熱目微斜露睛作喘四肢逆冷大便微黃師因此肝實發搐也晡熱肺用事也身溫肺虛也目斜露睛肝肺相勝也四肢逆冷脾氣虛寒也若脾胃虛而木乘土之症當先用益黃散阿膠散以補脾肺後用漏寺丸導赤散涼驚丸以治心肝如法而愈

一小兒潮熱自申酉時熱至子丑時方止遍身似疥大便秘結小便赤澁熱渴飲冷此脾胃實熱而傳肺大腸也先用清涼飲四劑結熱始退又用四物加柴胡黃連數劑其瘡漸愈彼欲速効另用魂角丸之類

諸症益甚遂請施院長治之亦同余藥惟加桃仁赤芍二味至百劑乃愈

一小兒先停滯飲食服蔻伐之藥致面色痿黃體倦少食申酉時潮熱余欲用調補之藥不信更用清熱消導益加泄瀉余用六君子數劑又用補中益氣湯而愈

一小兒酉戌時熱面赤腹中作痛按之益甚服峻厲之劑下五七次發搐吐痰作渴腹痛按之却不痛此脾胃復傷而變症也用七味白朮散補中益氣湯頓安

一小兒飲食停滯服消導之藥余曰此因脾胃虛而

食停滯也當調補爲善已而申酉戌時潮熱食少作渴大便不實用四君子湯而飲食進又用補中益氣湯而諸症愈

若亥子丑時微搐身體發熱目睛緊斜喉中有痰太便白色多睡不省當用益黃散以補脾導赤散涼驚丸以治心

薛按前症屬形病虛寒宜用六君子加炮薑溫補脾土用清心安神丸六味丸調補心血索古張先生云此症皆因太病後脾胃虧損所致其言明矣若非六君子湯以固本必變慢脾風也

朱監簿子五歲夜半發熱曉則如故用涼藥解之反多

涎喜睡大便青白作渴引飲師曰此當健脾胃則諸症退遂用白术散一兩水煎送飲二劑稍愈三劑渴止涎消又投阿膠散二服而安

愚治一小兒亥子丑時發熱泄渴用益黃散而愈後復發服前藥嗜卧露睛作渴少食大便頻黃余謂肝勝脾虛元氣下陷用補中益氣湯佐以地黃丸而尋愈

若傷風發搐口中氣熱呵欠頭悶手足動搖當以大青膏發散之

薛按索古先生云傷風發搐當辨有汗無汗用大青膏小續命湯竊謂前症若口中氣熱搐而有力屬形

病俱實宜用大青膏以散風邪若口氣不熱搐而無力屬形病俱虛宜用異功散以補脾土六味丸以滋肝木釣藤飲以清肝火若因風邪鬱熱而變見諸症當理肺經清風邪若外邪既解而諸症不愈當實脾者補肺金若徑治其肺恐脾氣復傷諸症擣起矣

一小兒傷風鼻塞流涕服藥過重發搐而久頓悶汗出氣喘久不愈其母因勞役發熱余用補中益氣湯時以五七滴與兒飲之母子並愈

一小兒傷風發搐痰盛喘急余謂此脾肺氣虛腠理不密而外邪所乘用六君加柴胡升麻桑皮杏仁一劑痰喘悉退又一劑去桑杏加釣藤鈎而安乃用異

功散數劑後不復發此症若不補脾胃實腠理專治痰邪鮮有不誤

若傷食後發搐身溫多睡或吐不思食者宜先定搐

止用白餅子下之後用安神丸主之

薛按前症若飲食停滯嘔吐不食腹脹便祕者屬實熱宜用白餅子下之若下後搐益甚嘔吐不食者屬虛熱用異功散補之若脾胃既傷肝木所勝用六君加釣藤鈎以健脾氣平肝木大凡飲食既消而不愈者但調補脾胃則諸邪自退矣

一小兒七歲發熱驚悸服祛風化痰藥更惡寒吐痰喘嗽腹痛少食又服抱龍丸大便似痢寒熱往來殊

類風症先兄以爲脾氣本傷藥復據之諸經無所資養而然也用四君子湯少用升麻柴胡以升補陽氣而愈

一小兒傷食發熱抽搐嘔吐氣喘痰嗽屬肺脾氣虛以六君子加炒黑黃連山梔各二分一劑而頓安一小兒三歲停食吐瀉或用蔻滯之劑更咬牙發搐面色青白鼻準青而兼黑手足指冷眉唇抽動此脾胃虛弱而肝木乘之用六君子加木香柴胡升麻二錢頓安

百日內發搐眞者不過兩三次死假者頻發不死真者內生驚癇假者外傷風冷血氣未實不能勝任故發

搐口中氣熱用大青膏塗頤浴體一二湯

薛按前症多因胎中受患或乳母鬱怒傳兒或兒脾傷自病當固元氣爲主而兼調治其母仍參吮乳不能類治之後倣此

李司戶孫百日發搐日三五次或作胎驚治之不應卽用大青膏豆許并塗顧浴體二法三日而愈蓋嬰兒血氣未實不能勝外邪而發搐故用二體法凡搐類者風在表易治宜發散搐稀者在臟難治宜補脾

愚治一小兒百日內患抽搐痰涎自流用驚風藥益甚視其面色黃白仍用六君子補中益氣二湯而愈一小兒面青黑或痿黃審其母素有鬱怒所致用加

味道遙散加味歸脾湯治其母其子亦愈

一小鬼月內發搐鼻塞余以爲風邪所傷以六君子

加桔梗細辛子母俱服更以葱頭七莖生薑一片細

搗難帛上兩掌護溫貼子頸間半晌鼻利搐止

一小兒未兩月發搐嘔乳腹脹作瀉余以爲乳多傷

脾胃用五味異功散加漏蘆母服之子服數滴而尋

愈

癲癇症治

凡治五癇皆隨臟治之每臟各有一獸之形並用五色丸治小病也發而重者死病甚者亦死若反折上竊其聲如犬症屬肝也若目瞪吐舌其聲如羊症屬心也若

目直腹痛其聲如牛症屬脾也若驚跳反折手縱其聲如雞症屬肺也若肢體如尸口吐涎沫其聲如猪症屬腎也

薛按姪娘若遇驚恐則必內應於胎故一月足厥陰脈養驚則肝受病二月足少陽脈養驚則膽受病三月手少陰脈養驚則心受病四月名爲離經五月足太陰脈養驚則脾受病六月足陽明脈養驚則胃受病七月手太陰脈養驚則肺受病八月手陽明脈養驚則大腸受病九月足少陰脈養驚則腎受病是臟腑納氣於丹田自肝至腎十經滋養而生此則胎中所致也若既生之後或驚怪所觸或乳哺失節或亂

癲癇症治

母飲食起居六滛七情臟氣不平亦致是症須察見
症屬於何經更別陰陽虛實以謂補脾胃爲主否則
不時舉發甚至不救

愚治一老生子周歲秋初暴冷忽發搐似癇搐過則
氣息淹淹此元氣虛弱所致用補中益氣湯而安
一小兒十歲一小兒七歲各有癇症歲發二次後因
出痘及飲食停滯舉發頻數並用六君子補中益氣
二湯頓安


一小兒六歲忽然發癇口動咬牙或睡中驚搐口流
痰沫服化痰祛風之藥益甚而面色兼青乃屬肝木
剋制脾土而不能攝涎故上瀉也當滋腎水生用血

則風自息痰自消矣用六味丸而愈

一小兒十三歲因驚患癇服礞砂丸之類而愈後每
發徹服前丸不應或謂風涎內積服藥下之發作日
頻恪服鎮驚等劑益甚余以爲心脾二經氣血虧損
而痰涎留滯朝用補中益氣湯夕用斷癇丹漸愈出
痘瘡後其癇復作仍用補中益氣湯爲主佐以八珍
湯及蟬蛻釣藤飲而愈

附面部三指診候圖

面部
三指診



小兒半歲之間有病以名中食三指曲按額前眉上髮際之下若三指俱熱感受風邪鼻塞氣粗三指俱冷感受風寒臘冷吐瀉若食中二指熱上熱下冷名中二指熱來驚之候食指熱胃膈氣竊乳食不消

附虎口三關脈症圖



水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部位各分逆順難明若憑寸口之浮沉必乃橫亡於孩子須明虎口辨別三關消詳用藥必無差誤未至三歲看虎口三關若脉見風關尚易治交氣關則難治交命關爲死症又當辨其色如獸驚三關必青水驚三關必赤人驚三關必黑若紫色主瀉痢黃色是雷驚

虎口三關

三關脉通度乃極驚之症必死有紋或青或紅如線者
是母食傷脾左右一樣者是驚積齊發紋有三條或
肺傷風痰或驚歸聲青主傷寒及嗽紅主泄瀉有黑相
兼主下痢紅多白痢黑多赤痢有紫相兼虎口脉亂乃
氣不和也蓋脉紋見有五色由其病甚色能如變至於
純黑者不可得而治矣附

五臟瘡疹證治

小兒在胎食五臟血穢伏於命門若遇天行時熱或乳
食所傷或驚恐所觸則其毒當出初起之候面燥腮赤
目胞亦赤呵欠顛悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴手足稍冷驚
悸多睡宜究其何臟所發察其何因所起令乳母亦須

節飲食慎風寒○五臟各有二症肝臟水瘤色青而小
肺臟膿疮色白而大心臟斑色赤而小脾臟疹小次點
故色赤黃淺也先發膿疮後發疹子者順先疹子後斑
子者順反此爲逆惟腎無候但見骯冷耳冷是也若寒
水來侮故黑陷而耳骯反熱爲逆也急用百祥丸牛李
膏各三服不愈者死○如發潮熱三日以上出不甚多
而熱不止者未盡也潮熱隨出如早食潮熱不已爲木
瘤之類也一發便出盡者重瘡夾疹者半輕半重也出
稀者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外白裏黑者
大重也瘡端裏黑點如針孔者勢最劇也青乾紫陷者
睡汗出煩躁熱渴腹脹喘二便不通者困也而大熱

利小便解熱毒。若紫黑乾陷或寒戰咬牙或身黃體
者急以百祥丸下之復惡寒不已身冷出汗耳聾反熱
者死症也此腎氣大旺脾虛不能制故耳下後身熱氣
溫飲水者可治以脾土勝腎寒去而溫熱也不黑者不
可下爭分則內虛歸腎太過瘡疹屬陽在春夏爲順秋冬
爲逆冬月腎旺盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疮夏
黑陷秋瘡子冬瘡子者十活四五黑者十難救一○身
熱煩渴腹滿而喘便澁面赤悶亂大吐此當利小便不
瘥者宣風散下之若能食而痴頭焦起或未焦而喘實
亦可下之若五七日痴不焦是內熱也宣風散導之生
犀角解之○瘡疹作搐爲脾虛而肝所乘心火妄動風
犀角解之○

熟相據也當用柏棗湯瀉心肝補脾土○瘡黑而忽便
膿血并痂皮者乃脾氣實腎邪退而病安也及瀉而
食不化者脾虛不能制腎故難治

薛按痘疹大要與癰疽治法無異宜辨表裏虛實表
熱蓋表虛而用發表之劑輕則斑爛重則不能起發
而死裏實而用托裏之劑輕則患痘毒重則喘急腹
脹而死裏虛而用疎導之劑輕則難以貫膿結痂重
則不能結膿落膿而死治者可不慎哉若疎者發熱
疼痛欲渴飲冷便秘此形氣病氣俱實也雖在裏必
用四順清涼飲以救其陰若黑陷不食嘔吐世間
寒戰咬牙手足逆冷此脾土虛敗寒水所侮也

盛暑必用六君薑附或十二味異功散以回蕩
內經捨時從症之法也若起發遲不紅活不作脾
結瘡或發熱作渴飲食少思此脾胃虛弱也用參芪
四聖散以補之若雖起而色白雖實體而不滿雖清
瘡而不落或瘡竭作渴飲湯腹痛不食嘔吐泄瀉此
脾胃虛寒也用十一味木香散以溫之其在四五日
之間死者元氣虛而不能貫體也旬日之外死者邪氣
去脾胃敗而元氣內陷也治者但能決其死而不知
其死必本於血氣虧損苟能逆推其因而豫為調治
豈斷無生理哉蓋起發貫膿結瘡三者皆由脾胃榮

養不可妄投越伐之劑以致其夭枉也至於大人患
此治法迥異哉丹溪嘗治一老人初患痘瘡不識不
亟用大補四十餘劑遂出痘而愈觀此可見

陸親王大王病瘡疹先用抱龍丸解之彼另用藥下之
其疹稠密余曰瘡疹始出未有他症但用平和之藥解
之如三日不出或出而不快宜微發之更不出當再發
之出而不多脉平和無他症者瘡本稀少不可更發若
瘡起發能食者大黃丸下一二行若初起就用下利則
裏虛瘡不能盡出而稠密難治至三日其瘡黑陷瘡
寒戰遂用百祥丸牛李膏各一服瘡復紅活而愈草
者歸腎也腎旺勝脾故脾虛寒戰則難治所用西草

濕勝勝之邪自不盛也

五太尉因墜鞚患急驚發搐或用表散之藥不愈
急驚當先退其熱以大黃丸玉露散惺惺丸加牛黃
麝解之至三日肌膚尚熱余曰再二日不愈必發瘡
已而果然用必勝散七日而愈此乃初因誤散其表內
熱不止而癰自生也

十太尉瘡疹未出呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面
頤赤咳嗽時嚏此五臟症具也以其別無他候故未
出若已出則歸一臟也用抱龍丸數服瘡疹出而諸症
愈治見於痘

丹瘤

丹瘤之症因熱毒客於腠理搏於氣血發於皮膚當以
白玉散塗之

薛按前症或命門所稟或風熱相搏或頻浴熱湯或
頻著祫衣或傷食發熱或乳母膏梁厚味七情慾火
皆能致者其赤暈遊走者乃血隨風熱也若真胎毒
用化毒丹風熱者敗毒散頻浴烘衣者四物連翹山
梔飲食發熱者四君柴胡神麌母食厚味者加味清
胃散母有薪火者加味逍遙散俱加漏蘆母子銀膠
者宜用若延及胷腹者爲重須用活命飲余
角力於各患處遍吮毒水滌聚於一處急研出敷

一 腹脹脹二便不通者內也用大連翹飲

一者

遇治史少參孫丙申正月陰囊赤腫余作胎毒治而瘡後患發熱痰熱等症診其母有鬱火血熱勝解鬱涼血之藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉小便赤澁兩眼瞤動投參木之類不應或以爲慢驚余視其寅卯關脉赤此屬風熱用柴胡清肝散加釣藤鈎木賊草一劑卽愈至丁酉正月頭患熱毒潰而膿出感風發熱翌日頭面黯腫如斗急破出黑血一盞許隨用清熱化毒湯腫退七八畧日又破各變血不甚黑仍用前藥去牛蒡子加熟地黃而愈此症若緩和

則血凝滯或爲破傷風而死

一小兒患之外勢雖輕內苦便閉此患在臟也服連翹飲數神功散而瘡

一小兒懶患之赤暈走胤令人頻呴使其毒各聚一處乃破出黑血塗以加味神功散時以金銀花甘草節爲末入乳汁調服而愈月餘後兩足赤腫仍治以前法而痊數日後兩足復赤或用犀角解毒之類乳食不進肚腹脹脹此復傷脾胃也仍敷前藥服補中益氣湯加茯苓而瘡神功散甚效但取處微痛用太乙丹亦効

一小兒腿患之神思如故乳食如常此毒發於廻表余謂宜承泄其毒不必服藥不信外敷寒涼內服

傷致腹膨脹，乳食不進，而殃夫寒涼外傷脾氣，則內傷生氣不死，何俟。

一小兒兩足常患腫，以丹毒而不釋，發飲水，瘀，兩頰赤色，先兄以爲，烹腎經虛火，用地黃丸料，金母子俱服而愈。○一小兒兩足生瘡疥，赤暈如丹，久而不愈，亦用地黃丸而痊。

一小兒眼如霞，遊走不定，先以麻油塗，患廩破，出血，其毒即散，更用九味解毒飲一劑而安。

一小兒困，母酒後飲其乳，因睡不醒，遍身如丹瘤狀。

余以爲酒毒傳，見爲患，令母子俱服葛根解醒湯而愈。

一女子赤暈如霞，作痒，發熱，此肝經血熱，用小柴胡加半地連翹丹皮而愈。凡女子天癸將至，婦人月經不調，彼驚，著惱多，有此症，亦治以前藥。

傷風兼變症治二

傷風，貧睡口巾氣熱，呵欠頓悶，用大青膏，發散之，若飲冷不止，而善食者，用大黃丸，微下之，餘不可下也。○傷風手足冷者，脾臟快也，當以益黃散溫脾胃，以大青膏散風邪。○傷風自利，脾臟虛快也，亦用益黃散，大青膏未塞，用調中丸，有下症，用大黃丸，後服溫驚丸。○傷風腹脹或作喘，脾臟虛也，當先發散，仍補脾。○傷風則發搐，頭悶，兼心則驚不安，兼肺則喘嗽，哽氣兼脾，則

傷風兼變症治

因睡菜腎則目畏明，各隨補其母。○傷風多睡能食引飲吐瀉大便色黃，此胃靈熱也。當先用白朮散以生津後用大青膏以發散。○傷風吐沫瀉色青白，悶亂不渴，嘔氣出氣睡而霍曉先用益黃散後用大青膏。○傷風或涼或熱多睡氣粗大便黃白，嘔乳不消不時，啜嗽飛用大青膏後服益黃散慎不可下。○傷風誤用下藥而作渴飲水者此胃土津液而虛熱也。多用白朮散熟湯自止。

薛按大青膏乃表散之劑必外邪蘊結於肺而肺氣未虧損者方可。用之大黃丸乃疎利之劑其食痰積滯於胃而胃氣尚充實者乃可施之。史前症屬脾胃

氣虛腠理不密外邪所乘又當臨症制宜必以固脾胃爲主若兼肢冷自利腹脹喘嗽者脾肺虛寒也。六君子加木香升麻桔梗若兼驚悸痰甚飲食少思，屬心脾臟虛也。四君加芎歸酸棗仁若兼肢體倦怠喘嗽嘔氣肺脾氣虛也。六君當歸桔梗若兼目畏明，白睛多腎氣虛也。六味丸加五味鹿茸如未應更用補中益氣湯加五味子乾山藥以補腎母若多睡能升補元氣苦吐沫瀉青煙而露睛脾虛木所乘也。六君子加升麻柴胡調補脾氣若乍涼乍熱喘嗽氣粗太便黃白嘔乳不消脾肺氣虛而有邪也先用惺惺

散後用四君子湯若悞用下藥而作渴者脾胃之氣傷也。用白朮散或六君子補中益氣二湯補之大凡前症若病邪急而元氣無虧者先用原方或用輕清表散之劑若元氣不足者當如前法固其元氣則外邪自退若因病久或因服吐伐之藥而未愈或更內變症者但調補脾胃諸症自愈其小兒傷風發熱鼻塞或痰壅發搐多因乳母鼻吹頤門但服惺心膏或用葱頭三五莖細切搗爛以紙寸餘攤葱在上兩掌合葱待溫貼於頤門其邪即解乃去其葱却用紺段寸餘塗以麵糊仍貼頤門求無傷風之患

吳江史安卿子傷風用表散化痰之藥反痰盛咳嗽

肚腹膨脹面色㿠白此肺脾俱虛用六君子加桔梗一劑頓愈至三日前症又作鼻流清涕此復傷風寒也仍用前藥加桑皮杏仁而愈

史文牛子喘嗽胃腹膨脹泄瀉不食此飲食傷脾土而不能生肺金也用六君子湯一劑諸症頓愈

史孔修子六歲感冐咳嗽發散過度喘促不食痰中血余曰此成肺癰也父日吐痰而兼膿用桔梗湯而愈後元氣未復大便似痢或以爲痢用五苓散連根實之類痰喘日劇四肢抽搐余曰此脾敗而變慢脾風也果發

諸經發熱症治三

諸經發熱症治

潮熱者時間發熱過時卽退來日依時而發此欲發驚也○疎熱者當熱不已甚則發驚癇也○風熱者身熱而口中氣熱乃風邪外感也○溫壯者肢體微熱也○發熱而不欲飲水者胃氣虛熱也用白朮散發熱而飲水作渴喜冷飲食者胃氣實熱也用瀉黃散

薛按秘藏保嬰集云小兒潮熱或壯熱不退多是變蒸及五臟相勝不必用藥又多食積鬱熱由中發外見於肌表只理其中清陽明之熱而表熱自除不可認作外感用小柴胡輕利等藥重傷其內又潮熱不退恐是此症亦當審察勿便用藥竊謂發熱飲水者熱在內不飲水者熱在外也又當以此辨之其諸熱

症說見各類

朱醫簿子五歲忽發熱腮脣色赤煩躁飲熱或用牛青丸及三物瀉心湯加倦怠不食便利黃珠師謂心經虛熱而誤下之也先用白朮散以生胃中津液後用生犀散以治心經虛熱再與胡黃連丸而愈

鄭人齊姓者子忽臟熱症自用青金膏三服連瀉五行加困睡發驚再一服又瀉二行益加口乾身熱虛羸論先煎白朮散與時時服之後用香瓜丸而愈
曹宣德子三歲面黃時發寒熱不食飲水或用牛黃麝香二丸不愈用止渴乾葛散反吐師謂食伏於胃脘先以白餅子下之又以消積丸磨之而愈

愚治一下小兒先將熱便祕服清涼飲之類愈而復作
服地骨皮散而潮熱不已服四物芩連之類不時而
熱甚余曰不時而熱或晝見夜伏晝伏夜見是虛
也當滋化源不信仍服寒藥愈甚余又用六味丸加
五味子朝用補中益氣加山藥山茱萸而寒
藥即時嘔吐余曰右頤微赤肺經虛熱也鼻准微赤
一小兒五歲發熱作渴右頤鼻准微赤或與冷水涼
胃經虛熱也此胃虛不能生肺耳先用四君子加升
麻三分一劑而不吐又用白朮散二劑而不渴毋用
四君子四劑而頓安

一小兒發熱作渴用瀉黃散大便重墜口角流涎仍

欲鴟火余曰鼻准青白脾虛肝木所侮也口角流涎
胃氣不能攝也太便重墜脾氣不能升也不信渴
服涼劑果眉脣微動四肢微抽余曰此元氣虛極而
變慢脾風也用六君子加炮薑當歸木香釣藤鈎
劑益甚彼欲更劑余曰此藥力不及也設藥不對其
症禍在反掌仍以前藥加炮附子一斤服之即安乃
去附子又一劑而愈

卷之二十一
卷之二十二



