



2m 1 2 3 4 5 6 7 8 9

錢氏小兒直訣卷四



門人閻孝忠集

後學薛鑑校註



瀉青丸

治肝經實熱急驚搐搦，

羌活

大黃

川芎

山梔仁

龍膽草炒

當歸

防風各等分

右爲末煉蜜丸，實大，每服半丸煎竹葉湯入砂糖化下。

薛按：前方足厥陰肝經解散肌邪，疎通內藏之苦寒藥也。若大便祕結煩渴飲冷飲食如常屬形病俱實宜用此瀉之。若大便調和煩渴飲冷屬病氣實而形

氣虛宜用抑青丸平之。若大使不實，作渴飲湯飲食少，患肢體倦怠屬形，病俱虛，宜用地黃丸補之。若肝經血虛，生風先用四物湯加鈞藤鈞以生肝血，繼用地黃丸。四君子湯以補脾土，若因肝經血燥，生痰，用地黃丸生腎水，益肝血，若土不能培木，用四君子湯加當歸以補中，用地黃丸以滋腎。若因肺金克肝木，用六君子湯加芳藥木香、實脾土以平肺金，若因心虛，奪母之氣，或腎水虛，不能生肝木者，並用地黃丸主之。若屢服峻劑，而脾胃虛寒者，必用六君子湯加丁香木香，補脾胃以培陽氣。若因乳母恚怒肝火妄動，致兒爲患者，母服加味小柴胡湯。若因乳母肝脾血虛發

熱致兒爲患者，母服加味逍遙散，子亦服數滴，抑青丸即前方去山梔大黃。

抑肝散 治肝經虛熱發搐，或發熱咬牙，或驚悸寒熱，或木乘土而嘔吐痰涎腹脹，少食睡卧不安者。

軟柴胡五分

川芎八分

當歸

白朮

右水煎，子母同服。

瀉心湯 治心經實熱，

黃連

右爲末，每服五分，臨卧溫水化下。

薛按：前述若啼哭發熱，作渴飲水，抽搐有力，仰面而

睡者屬心經實熱宜用瀉心湯或導赤散若發熱飲湯抽搐之力驚竄咬牙合面而睡者屬心經虛熱用補心散若喘嗽面赤壯熱飲水肺乘心也用瀉白散若頭搖目劄身熱抽搐肝乘心也用柴胡清肝散若合目昏睡泄瀉身熱脾乘心也用瀉黃散若竄視驚悸咬牙足熱腎乘心也用安神丸若因乳母致症亦用前藥以治其母

導赤散 治小腸實熱小便祕赤

生地黃

木通

甘草炙各等分

右爲末每服一錢入淡竹葉水煎

薛按瀉心湯導赤散瀉心小腸實火之劑蓋心爲脾

熱宵睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白喘嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用七味白朮散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審其因而治其母

五味異功散 治脾胃虛弱吐瀉不食

人參

茯苓

白朮

甘草炒

陳皮各等分

右爲末每服三錢薑棗水煎

薛按前方補脾胃之聖藥也况人之一身以脾胃爲主若小兒乳食失節寒涼失宜或乳母六淫七情失

調飮飲其乳，諸病瀕起當專以此藥治之。其應如響。

益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄瀉

陳皮

青皮

詞子肉各五錢

丁香二錢

甘草三錢

右爲末每服一二錢水煎。

薛按前症若因脾土虛弱而吐瀉者用五味異功散。若因肝木侮脾土而吐瀉者用六君子加柴胡。如不應或手足指冷屬脾胃虛寒也更加木香炮薑。若因乳母脾土虛而肝木侮亦治以前藥。若乳母鬱怒致兒患前症母服加味歸脾湯。

人參安胃散 治因服峻劑脾胃虧損或成慢驚泄瀉

母脾爲心子然心既病則脾土益虛矣用者審之

生犀散 治心經虛熱

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛各一兩

甘草五錢

犀角二錢

右爲末每服一二錢水煎。

薛按前方云治心經虛熱然其所用多屬瀉心瀉肝脾之劑。蓋虛熱二字恐傳寫之誤。假如心經自病而血虛熱者用秘旨安神丸。脾虛奪心之氣而熱者用地黃丸。秘旨補脾湯。肝木不能生心火而虛熱者用地黃丸。秘旨安神丸治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作。

人參

半夏泡湯

酸棗仁炒

夜神各一錢

當歸洗酒

橘紅

赤芍藥炒各七分

五味子五粒

甘草炙三分

右爲末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下
瀉黃散治脾胃實熱

藿香葉

甘草各七錢五分

山梔仁一兩

石膏五錢

防風兩

右用蜜酒微炒爲末每服一二錢水煎

薛按前症若作渴飲冷卧不露睛手足熱甚或遍身
發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯卧而露
睛手足並冷屬胃經虛熱宜用糞功散若面青搐搦
乳食少思肝乘脾也用秘旨補脾湯若面赤驚悸身

嘔吐或腸胃有熱以致前症

人參

錢一

黃芪二錢

生甘草

炙甘草各五錢

白芍藥七分

白茯苓四分

黃連二錢

右爲末每服二三錢水煎

七味白朮散

治吐瀉或病後津液不足口乾作渴

人參

錢一

白朮

木香

白茯苓

甘草炙

錢一

藿香葉一錢

乾葛二錢

右爲末每服二三錢水煎

薛按胃傷則嘔脾傷則瀉故用前藥調補胃氣以化
生津液如無他症只因胃氣虛而津液不足者用四

君子湯方效

秘旨補脾湯 治久病而黃肌瘦咬牙目劄頭髮稀少

誤藥所致

人參

白朮各一

白芍藥酒炒

白茯苓各八

陳皮

川芎各六

甘草炙

黃芩炙

當歸酒洗各四分

右每服二三錢薑水煎

瀉白散 治肺經實熱咳嗽痰喘

桑根白皮炒

地骨皮各一兩

甘草炙五錢

右爲末每服一二錢入粳米百粒水煎

薛按活人方云喘者肺氣有餘也氣盛當認作氣衰

有餘當認作不足肺氣盛者肺中之火盛也有餘者肺中之邪有餘也故用前藥以瀉之若土虛不能生肺用補中益氣湯火來尅金用人參平肺散腎不奪母之氣或陰火上炎用地黃丸若肺虛肝木乘侮先用阿膠散後用瀉青丸若因乳母肺經受症致兒爲患母服前散若因乳母感冒風寒肺經鬱熱致兒爲患用十味參蘇飲若因乳母膏粱醇酒積熱致兒爲患用加味清胃散

阿膠散 治肺虛咳嗽口乾作渴

明阿膠一兩

馬勃鈴各一錢

杏仁七箇去皮尖

糯米一兩

甘草炙一錢

梘粘子五分

右爲末，每服二錢水煎。

薛按：前症若因脾胃弱而肺氣虛者，宜用補中益氣湯。若肺金自虛者，宜用四君子湯。

地黃丸 治腎虛解顯或行遲歸脾等症。

熟地黃八錢酒洗

山茱萸肉

乾山藥各四錢

澤瀉

牡丹皮

白芍各三錢

右地黃杵膏餘爲末，加煉蜜丸相半，大每服二三十

丸空心白湯下。

薛按：前丸治腎經虛熱，作渴，小便淋秘，痰氣上壅，或肝經血虛燥熱，風客溼氣而患癰癧結核，或四肢發搐，眼目瞤動，或肺經虛火咳嗽，吐血頭目眩暈，或咽

喉燥，喘口舌齶裂，或心經血虛有火，自汗盜汗，便血，諸血，或脾虛濕熱下刑，於腎，腰膝不利，或濟瘡毒等症，並用前藥爲主，而佐以各臟之藥，大抵此藥爲天一生水之劑。若稟賦不足，肢體瘦弱，解虛失音，或畏明，下竄五遲，五軟，腎痺，肝痺，或早近女色，精氣耗散，五臟虧損，凡諸虛不足之症，皆用此以滋化源，其功不能盡述。

四君子湯 治脾氣虛弱，飲食不化，腸鳴泄瀉，或嘔逆。

人參

白芍各一錢

白朮

甘草炙各五分

右水煎服

四物湯 治肝經血虛發熱，或補益甚，或煩躁不寐。

當歸 熟地黃各二錢 川草分五錢

右作二劑水煎服

八珍湯

治氣血俱虛，或因失血過多，或因耗伐元氣以致內熱，發熱肢體瘦弱，卽四物四君子二湯合服。

十全大補湯 治氣血虛熱，或因病後惡寒發熱，或自汗盜汗，食少體倦，或發熱作渴，頭痛眩運等症，卽八

珍湯加黃芪肉桂。

六君子湯

治脾胃虛弱體瘦面黃，或久患癰癧，不思乳食，或嘔吐泄瀉，飲食不化，或時患飲食停滯，或母有前症致兒爲患者。

人參

白朮

茯苓各二錢

陳皮

半夏

甘草各一錢

大右每服二三錢薑棗水煎。

補中益氣湯 治中氣不足，困睡發熱，或元氣虛弱，感胃風寒諸症，或乳母勞後發熱，致兒爲患者。

黃芪炙

人參

白朮炒

甘草炙

當歸

陳皮各五錢

升麻

柴胡各二錢

右薑棗水煎。

香砂助胃膏 治胃寒吐瀉，乳食不化。

人參

白朮

白茯苓各五錢

甘草炙

丁香各一錢

砂仁四十粒

白荳蔻十四

乾山藥一

肉荳蔻四箇

右爲末，煉蜜丸，芡實大，每服二三十丸，米飲磨化。

人參養胃湯

治外感風寒，內傷生冷，寒熱如瘡，或嘔逆惡心。

人參

厚朴（姜炒）各一錢，蒼朮製

半夏（湯）炮二

藿香

草茱仁

茯苓（鹽）各五

甘草（炙）一

橘紅（二錢）

大蕪荑湯

治小兒脾疳，少食發熱，作渴，大便不調，髮黃。

右每服二三錢，薑三片，烏梅一箇，水煎。

蕪荑

山梔（各五分）

黃柏

甘草（炙）

防風（各二分）

麻黃

羌活

黃連

柴胡（各三分）

白朮

當歸（各四分）

右作二劑，水煎。

肥兒丸

治食積，五疳，頭項結核，髮稀成穗，發熱作渴等症。

黃連（炒）

神曲（炒）

木香（各一兩，五錢）

檳榔（二十箇）

肉荳蔻（二兩）

史君子（酒浸）

麥芽（四兩）

炒各

右爲末，麵糊丸，麻子大，每服三五十丸，米飲下，良久。

用五味異功散，一服以助胃氣。

九味蘆薈丸

治小兒肝脾疳積，體瘦熱渴，大便不調。

或瘻癰結核耳內生瘡等症

蘆薈

胡黃連

黃連

木香

蕪荑炒

青皮

白雷丸

鶴風草兩

麝香三錢

右爲末蒸餅糊丸麻子大每服一二錢空心白湯下
黃連丸治痔勞

黃連五錢膽汁浸酒

瓜蔞根

烏梅肉

杏仁皮焙

石蓮各二錢

右爲末牛膽汁浸糊丸麻子大每服一二十丸煎烏
梅葛蜜湯下

木香丸治冷瘡

木香

青黛

檳榔

肉荳蔻

麝香各一錢

續隨子一兩

去油

蝦蟆

存性一箇燒

右爲末蜜丸菉豆大每服三五丸煎薄荷湯下
愚按前方消瘡清熱逐水破氣之劑然云冷瘡者乃
陽氣虛而脾胃冷也其檳榔續隨子恐導損真陰訶
伐陽氣治當審之

胡黃連丸治熱瘡

胡黃連

黃連各五錢

朱砂二錢另研

右爲末填入猪膽內以線扎懸掛鍋中淡漿水煮數
沸取出研入蘆薈麝香各二錢餃和丸麻子大每服
一二十九米飲下

愚按前症當以本方爲主佐以四君子加蕪荑脾胃虛甚者以四君子加蕪荑爲主以前丸爲佐

如聖丸治冷熱痒瀉

史君子取肉一兩

胡黃連

川黃連

白蕪荑炒各二兩五錢

麝香另研五分

乾蝦蟆五箇酒煮并膏

右爲末以蝦蟆膏杵丸麻子大每服一二十九煎人

參湯下

薛按此之爲患乃肝脾虛熱津液乾涸之症前方乃專於治癬清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃使邪氣退庶可收全功也

蘭香散治鼻瘡赤爛

蘭香散

治鼻瘡赤爛

蘭香葉二錢燒灰

銅青

輕粉各五分

白粉散

治諸痒瘡

海螵蛸三分

白芨二分

輕粉一分

右爲末先用漿水洗拭乾貼

薛按前二方治表之藥如未愈用四味肥兒丸以治其內

四味肥兒丸

治食積脾胃目生雲翳口舌生瘡牙根

癩癰發熱瘦怯遍身生瘡又治小便澀白腹大青筋一切疳症

黃連炒

蕪荑炒

神麴

麥芽炒各等分

右爲末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滚湯

下

蟾蜍丸

治無辜痒症一服虛熱退二服煩渴止三服

漏痢愈

蟾蜍

一枚夏月溝渠中取腹
大不興不鳴身多瘻者

右取糞蛆

一粒置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投

與蛆食

一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出

上焙乾爲末入麝香一字

粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如神

燕羨散

治蟲癟口內流涎

白燕羨

乾漆炒各

右爲末每服五六分米飲下

安蟲散

治蟲動心痛

胡粉炒黃

檳榔

川練子

鶴風

各二錢

枯白礬二錢

右爲末每服五六分痛時米飲調下

薛按蟲動之因多屬胃氣虛弱或聞飲食氣味而動前二方乃化蟲之劑若因脾胃虛弱者須當調補中氣

史君子丸 治臟腑虛滑及脾瘦下利腹脹張滿不思乳食

史君子 麵煨一兩

甘草 炙

厚朴 姜汁

詞子肉 半生
半喂

青黛 各五
錢

陳皮 二錢
五分

右爲末，煉蜜丸，芡實大，每服三五丸，米飲化下。

白玉散 治丹瘤

白土 二錢
五分

寒水石 五錢

右爲末，用米醋或新水調塗。

薛按：前方性味寒涼，六腑受患，毒發於表，二便調和，乳食如常，固爲可用。若胃氣虛弱者，反礙滯瘀血，益增其患者，重者須先吐毒血，各聚於一處，研出以泄之，遍身者當隨其患處，各吮聚研之，更服仙方活命飲。太便不通者，更加大黃，如不應用大連翹飲治法，雖多無效。後法爲良。百日內患者難治。

神功散

治瘡瘍腫作痛，未成者數之，即散已。

數之即愈。丹瘤用之尤妙。但破縫作痛。

黃柏 炒

草烏 炒

血竭 各等分

右爲末，津調敷患處。

柳華散

治熱毒口瘡。

黃柏 炒

蒲黃

青黛者 真正

人中白 等分

右爲末，敷之。

仙方活命散

治一切瘡毒，未成者消已，成者即潰此消。

蟲蛇咬傷止痛之聖藥也。若膿出而腫痛不止者，元氣盡也。當補之。

川山甲

白芷

防風

沒藥

甘草

赤芍藥

當歸尾

乳香

天花粉

貝母各一錢

金銀花

陳皮三錢

皂角刺一錢

瑞音唐
低下也墮
也墮也

右每服二三錢酒水各半煎

竭氣丸 治肚腹虛脹

胡椒一兩

蝎尾五錢

右爲末麵糊丸，粟米大，每服一二十丸，陳米飲下。
薛按前症屬肺脾虛，水氣逆而喘急浮腫，必兼溫補脾土，以生肺金而氣自運行矣。但前藥性屬辛熱，雖能祛散寒邪而恐真氣反傷，不可過劑。

消積丸 治食積太便酸臭發熱

丁香九

縮砂十二

巴豆二

粒去皮心膜

烏梅肉三

右爲末麵糊丸，粟米大，每服五七丸，溫水下。

薛按前症若食積既去而熱不退，或作嘔少食宜用五味異功散以補胃氣，或用四君子加藿香半夏，以安中氣。若兼泄瀉用六君子湯，如不應加升麻柴胡，以升補脾氣。若久瀉不已，宜用補中益氣湯，以升補陽氣。若虛寒加炮薑木香，如不應，兼以四神丸以補脾腎。若體瘦潮熱，口渴太便不調，宜用肥兒丸以消疳積。

保和丸 治食積

山楂三錢 神曲二兩

半夏

茯苓各一兩

陳皮

連翹

蘿蔔子各五錢

右爲末，糊丸桐子大，每服一二十丸，白湯下。
清中解鬱湯 治脾氣虛弱飲食停滯，鬱熱生痰，或身

發赤聾

白朮炒

茯苓

陳皮

山楂炒

山楂

神曲炒

麥芽炒

川芎

桔梗

甘草灸各五分

右每服二三錢水煎。

四神丸 治脾胃稟虛，泄瀉不食，或不勝食後，不實，或
乳母患此，致兒益患。

肉荳蔻

二兩

補骨脂

四兩

五味子

二兩

大黃吳茱萸

一兩

五味子

二兩

右爲末，用米二碗，生薑八兩，紅棗一百枚，煮熟，取棗
肉和末，丸麻子大，每服二三十丸，空心食前，白湯下。
子安並服。

香連丸 治赤白痢疾，并水瀉，渴，渴

黃連

淨二兩

吳茱萸

去梗十兩

右先將一味，用熱水拌和，入磁器內，置熱湯中，頓一日同炒至黃連紫黃色，去茱萸，連爲末，每末四兩，入
木香末一兩，淡醋米飲爲丸，如麻子大，每服四五十
丸，白茶湯下。

醋

五苓散 治霍亂吐瀉躁渴飲水小便不利

木澤瀉

五錢

猪苓

官桂

赤茯苓

正十

白朮

各三錢

右爲末每服一二錢白湯調下

薛按前症若津液偏滯於太腸大便渴而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺氣虛而不能生水也宜用補中益氣湯加麥門五味靈火上炎而小便赤少者此肺氣受傷而不能生水也用地黃丸加麥門五味

大黃丸 治風熱便秘漱水

川芎

五錢

甘草

炙二錢

黑牽牛

五錢半生半炒

大黃

一兩洗蒸酒

右爲末

糊丸麻子大每服數丸溫蜜水下

薛按前方乃內疎之峻劑審其因寒屬臟內實熱方可用

白虎湯

治傷暑煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴

知母

一兩五錢

石膏

四兩

白粳米

八錢

甘草

炙五錢

右爲末每服一二錢水煎

羌活

前胡

麻黃

白芍

川芎

黃芩

甘草

蔓荆子

枳殼

炒

細辛

石膏

另研

菊花

防風各

右爲末每服一二錢水煎

地骨皮散 治壯熱作渴

地骨皮 茯苓

甘草

柴胡

半夏

人參

知母 各等分

右爲末每服一二錢水煎

大羌活湯

羌活

獨活

防已

防風

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

甘草 炙

川芎

細辛 銀二

知母

生地黃 煎一

右爲末每服一二錢水煎熱服

人參羌活散 治傷寒時氣頭疼發熱

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

桔梗

茯苓

枳殼 炒一

川芎

天麻

地骨皮 分二

甘草 炒一

右入薄荷三葉水煎

薛按前方乃解肌發表化痰利氣之劑然元氣虛者宜用清肺散

秘旨清肺散 治感冒發熱鼻流清涕或咳嗽吐痰輕者勿藥自愈重者用此輕和之劑

橘紅

半夏 煥

桔梗 炒

川芎各五分

白茯苓

桑白皮蜜炙各七分

甘草炙各三分

防風各四分

薄荷

枯黃芩炒各三分

白朮一錢

右每服二三錢薑水煎

薛按前症若風邪退而痰熱不上但健中氣則痰自化而病自愈若專用化痰利氣則中氣愈虛痰熱愈甚矣

敗毒散 治傷風時氣寒熱咳嗽

人參

茯苓

甘草炒

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼炒等分

右爲末每服一二錢生薑薄荷水煎
薛按秘旨云小兒雖有感冒傷風鼻塞流涕發熱咳嗽降痰爲主略加微解凡散利敗毒非幼稚所宜或冒輕者不必用藥候一二十日自愈竊謂前症若手足冷或腹脹脾虛也用六君子湯加柴胡升麻若腹脹或氣喘肺虛也用四君子湯加柴胡升麻蓋肺虛則腠理不密外邪易感發表之後其邪既去卽補脾肺以實其表庶無變症矣

百部丸 治肺寒壅嗽微喘

百部炒

麻黃各三分

杏仁四十箇微

水煮

右爲末用蜜丸真子大每服一二丸薑湯化下

麻黃湯 治傷風發熱無汗咳嗽喘急

麻黃

去節三錢水煮
去沫濾出晒乾

肉桂

錢

甘草

炙一錢

杏仁

七箇去皮尖
炒黃研膏

每服一錢水煎服以汗出爲度自汗者不宜服
薛按前方乃發表出汗之劑審其寒邪在表宜用若
邪既去宜補肺脾以實其表庶風邪不能再入往往
表散之後熱嗽不退復行發表多變壞症

地黃清肺飲 治肺痺咳嗽痰唾稠粘

阿膠

一錢
熑炒

鼠粘子

二分
炒

馬兜鈴

甘草

炙各五分

杏仁

七枚去皮尖
炒去皮尖

糯米

十粒
炒

右每服一錢水煎

草巖丸 治傷風咳嗽面赤身熱痰盛喘促

甜夢庵

臘帛
炒

黑牽牛

炒

杏仁

炒黃
研膏

漢防已

各一兩

右爲末入杏膏蒸棗肉搗丸麻子大每服十丸薑湯

下

本草附錄
水煎

薛按前方行氣導濕之峻劑若肺脾虛熱而致諸症者當調補中氣爲主若果係前症宜用惺惺散參蘇

飲清肺丸茯苓半夏湯選用之

惺惺散 治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽

桔梗

細辛

人參

甘草

炙

白茯苓

白术

爪蔓根

各等

右爲末每服二錢入薄荷五葉水煎
參蘇飲 治感冒風寒或腹脹少食泄瀉呴吐或手足
並冷喘促痰涎

人參

紫蘇

陳皮

半夏

茯苓

枳殼

桔梗

前胡

乾葛

甘草

木香

三分

右爲末每服一二錢水煎

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱痰涎惡心或飲食不化嘔
吐發搐或睡卧不寧口流痰涎或乳母脾胃虛弱飲
食不節以致兒患前症亦宜用此藥主之

白术

茯苓

半夏

神曲

一錢

大麥

炒五錢

陳皮

天麻

各三錢

右每服一二錢水煎

甘桔散

治咳吐熱涎咽喉不利

甘草

炒二兩

桔梗

一兩米

右爲末每服二錢入炮阿膠半片水煎服

薛按前症若風熱蘊於肺而咳體血用桔梗湯若心
火尅於肺而吐痰涎用人參平肺散

桔梗湯

炒

貝母

當歸

酒

瓜蔞仁

枳殼

炒

薏苡仁

桑白皮

炒

百合

蒸各五錢

五味子

炒

甜葶苈

炒

地骨皮

知母

炒

甘草節

防已

黃芪

杏仁

右每服一二錢水煎

人參平肺散

治心火旺，肺咳嗽喘啞痰涎壅盛胃膈

痞滿

人參

橘紅

甘草炙

地骨皮各五

茯苓

知母

五味子

青皮

天門冬各四錢白皮一錢

右每服一二錢水煎

小柴胡湯

治傷寒溫熱，身熱惡風頭痛頭強四肢

煩疼寒熱往來嘔噦痰實及治中暑病瘧

柴胡

半夏

黃芩

柴胡

半夏

黃芩

人參

各二錢

甘草

二錢

右每服一二錢薑棗水煎

加味小柴胡湯

治乳母肝火發熱等症致兒爲患，即

小柴胡加山梔牡丹皮水煎子母並服，以下倣此。

加味逍遙散

治乳母肝脾氣血虛弱發熱致兒爲患

當歸

白朮

茯苓

芍藥

炒黃各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔

甘草

炒黃各五分

右水煎服

柴木參芩湯

治肝火血熱遍身癢庠或起赤疊或筋

牽結核

白朮

人參

茯苓

各一錢

柴胡

川芎

山梔

芳藥炒

甘草炒五分

熟地黃自製

當歸各八分

右水煎服

芍藥參苓散

治肝木克脾土，目劄面青食少體倦

芍藥炒

人參

茯苓

白朮

陳皮各七分

柴胡

山梔炒

甘草炒各五分

右薑水煎服

梔子清肝散

治三焦或足少陽經風熱耳內作庠生瘡，或出水疼痛多

梔子炒

柴胡

牡丹皮各

茯苓

川芎

芍藥

牛蒡子

甘草

當歸

炒各七分

右水煎服

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱或囊癰便毒小便瀦滯

龍膽草

酒炒

車前子

炒

木通

當歸尾

澤瀉各三分

甘草

右水煎服

茵陳湯

治身熱鼻乾汗出二便赤瀦濕熱發黃

茵陳錢六

梔子錢二

大黃錢二

右每服一錢水煎

大連翹飲

治積熱大小便不利或痘後餘毒肢體遺

瘡或丹癰遊走不止

連翹

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬退

甘草

山梔

黃芩

炒各
五分

右每服一二錢水煎

清涼飲

治消中能食而瘦口乾自汗太便結燥小便

類數

羌活

柴胡

炙甘草

知母

酒製

黃芪

酒製各一錢

生甘草

防已

生地黃

酒製各五錢

當歸

紅花

杏仁

升麻

四分

石膏

桃仁

草龍膽

各一錢

五分

右每服一二錢水煎入酒少許服

四順清涼飲

治臟腑有熱煩渴

四肢驚掣大便

秘瀉或風熱結核頭面生瘡目赤咽痛一切有餘之

症

赤芍藥

當歸

甘草

大黃各等

黃連香薷飲

香薷

兩

厚朴

兩

黃連

兩

右每服一二錢將朴連同生薑炒令紫色入香薷水

煎服

水

酒各一盞煎冷服

金匱加減腎氣丸 治脾胃虛腰重脚腫小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成盞者此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變者非此藥不救

白芍

各三兩

附子

炮五錢

川牛膝

肉桂

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮

各一兩

熟地黃

四兩
酒
水
半
片
膏

右爲末和地黃膏加煉蜜杵丸桐子大每服一二十丸空心米湯下

五色丸 治五癆

朱砂

真珠

各五錢

水銀

雄黃

各一

黑鉛

三兩同水
銀結成砂

右爲末煉蜜丸麻子大每服三錢九煎金銀薄荷湯

下

愚按前症有因驚因風因食之不同雖痰迷心竅然當補脾氣爲主

斷瘍丹 治瘍差後變症不止

黃芩

各一錢

釣藤鉤

細辛

甘草

炙各五錢

蛇膽

三寸

酒炙

四箇

蟬蛻去土

牛黃一字研

右爲末黃棗肉爲丸麻子大每服五七丸人參煎湯

下

宣風散 治驚風

檳榔二錢 筒陳皮

甘草各五錢

牽牛生半兩半

右爲末，每服三五分，蜜湯調下。

愚按：肝氣爲陽，爲火。肝血爲陰，爲水。故肝氣熱則生風，風熱搏則驚搐，而肝血必損也。然有餘當認爲不足，若疊服，則驚宣風之劑，未免虧損脾胃，以成慢驚矣。慎之。

補銀丸 治風涎膈熱及乳食不消腹脹喘促

巴豆

水銀各五錢

京墨八錢火燒

黑鉛二錢半水銀煎

麝香另研五分

右爲末，陳來粥丸，叢荳大，每服二三丸，煎薄荷湯下。

愚按：前方治癲癇驚搐，消積下痰之藥也。其用牽牛巴豆等，蓋以痰飲癥積結聚堅固，非此不能除。故察古張先生云：爲慙闕，棄旗之將，形病俱實者用之，誠有回生起死之功。必須詳審，不可輕率。

牛黃丸 治驚熱，消癰積，

雄黃研水飛

牽牛各一錢

天竺黃二錢

右爲末，麪糊丸，粟米大，每服五七丸，薄荷水下。

紫霜丸 治驚積，

代赭石二錢水飛

杏仁去皮尖二十一個

巴豆去皮心膜一粒

右爲末，飯丸，粟米大，每服五七丸，薄荷水下。

利驚丸 治急驚，

天竺黃錢 輕粉 青黛各一

黑牽牛錢五

右爲末，煉蜜丸，晚豆大，每歲一丸，薄守水化下。
白餅子 治腹中有癖，但飲乳，嗽而吐痰涎。

滑石

輕粉

半夏湯浸

南星各一錢

巴豆二十四粒，去皮，臍水煮另研

右爲末，糯米飯丸，蒙豆大，捻作餅，每服二三餅，煎葱白湯，下。

薛按前四方乃軼關，奪門，起死回生之重劑也，必審形病俱實，方可施之，恐至失手，命在反掌。經云邪之所凌，其氣必虛，留而不去，其病乃實實者，病氣實，而形氣則虛也。東垣先生云：形病俱實者，當瀉，不得補。

形病俱虛者，當補，不當瀉。治者審焉。
涼驚丸 治驚癲。

龍膽草炒焦

防風

青黛各三錢

釣藤鈎錢

黃連

炒一錢，龍膽一錢

牛黃

麝香各二分

右爲末，麪糊丸，粟米大，每服十九粒，金銀花湯下。
薛按前丸，心肝二經清熱，祛風化痰，散氣之寒劑也。
疳者津液乾涸之症，不宜多服，恐傷胃氣，無以滋腎水，生肝血也。

羌活膏 治脾虛，肝熱，熱盛，生風，或吐瀉，或悞藥變爲慢驚之症。

羌活

川芎

人參

白附子 炮

赤茯苓 各五錢

天麻 兩

白僵蠶 炒酒

乾蝎子 炒去毒

白花蛇 肉酒浸

雄黃

辰砂 各一分另研

附子 炮

防風

麻黃 去節

肉豆蔻

雞舌香

藿香葉

沈香

木香 鐵各二錢

輕粉

真珠

牛黃 各一錢

龍腦 分

麝香 一錢各

右爲末，煉蜜丸，豆大。每服一至二丸，薄晝湯化下。

薛按：前方藥味雜亂，果脾氣虛而或慢驚者當用之。恐發散真氣，重損陰血故也。

抱龍丸

治傷風溫疫，身熱，脅痛，睡風熱，痰實壅嗽，又治

驚風，潮搐及蠱毒中暑。

雄黃 二錢

辰砂 另研五錢

天竺黃 兩

牛膽南星 四兩

麝香 另研五分

大黃

在煮未甘草湯丸，皂子大。每服一丸，白湯化下。

薛按：前丸化痰祛邪，清熱之功居多。屬肝心實熱，而致者，用之殊效。若脾肺虛弱，而見昏睡痰嗽，當用寶鑑天麻散以調補元氣。

小續命湯 治中風，不省人事，癥瘍失音，肢體反張，或

時厥冷。

麻黃 等

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草 等

杏仁 去皮，去核，去皮研

漢防已

官桂各五錢

防風大錢五分

附子炮去皮一錢二錢

右各分爲末和白蜜每服一錢薑桑水煎有熱減桂附實蓋天麻散治急驚脾腎虛弱或變慢驚者

半夏去皮一錢

天麻二錢五分

甘草各一錢

白茯苓

白术錢

右入生薑三錢磁器內水煮候乾爲末每服一錢五分薑桑湯調下

鈎藤鈎飲

治吐利

脾胃虛淡虛風慢驚

鈎藤錢三分

蟬脫

防風炒

人參

鹿角

白僵蠅一錢

天麻

蝎尾去毒火

甘草錢

川芎各一錢

麝香一錢另研

右爲末每服一錢水煎

薛按慢驚之症屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散寒之藥而無調補之功須審用之

大青膏 治傷風吐瀉身溫涼熱

天麻

青黛各一錢

白附子

乾蝎去毒

烏梢蛇肉酒浸焙

朱砂五分

天竺黃二錢

麝香二分

右爲末生薑和膏每服一豆粒許月中見用半粒薄

苛湯化服

愚按大青膏乃表散之劑也必外邪蘊結肺而肺氣之未損者乃可施之况前症屬脾肺氣虛而邪之

所奏必以固脾胃爲主，否則虛虛之禍，恐不能免矣。

溫白丸 治泄瀉瘦弱，令辨洞利及久病而成慢驚。

天麻五錢

白僵蠶一錢

白附子

乾蝎去毒

天南星二錢

焰各五分

右爲末，麵糊丸，米大，每服十丸，米飲下。

愚按前症屬脾氣虛寒無陽之症，無風可散，無痰可逐，當兼用六君子湯十二味異功散，木香散，參芪四聖散，治痘瘡已出至六七日不起發，不成膿。

人參

黃芪炒

白朮炒

茯苓

木通

防風各三錢

糯米粒二百

當歸

芍藥炒

川芎各五錢

紫草

右作二劑水煎服。
陳氏木香散。

木香

大腹皮

人參

桂心

赤茯苓

青皮

前胡

詞梨勒

半夏姜制

丁香

甘草炙各等分

右每服二三錢，薑水煎。

薛按前方，若痘瘡已出未愈之間，其瘡不光澤，不起癢，不紅活，五七日內泄瀉伏渴，或肚腹作脹，氣促作喘，或身雖熱而腹脹足指冷，或身熱作渴，或驚悸腹脹，或汗出不止，或寒戰咬牙瘡不結痂，此皆脾氣虛寒津液衰少，急用此藥治之。若誤認爲實熱，用寒涼

之藥及飲蜜水生冷瓜果之類必不治

十二味異功散

木香半錢

官桂二錢

當歸半錢

茯苓

白术各二錢

人參

陳皮

厚朴姜製

半夏姜製

丁香

肉豆蔻各二錢半

附子炮一錢半

右每服二三錢薑棗水煎

薛按前方若痘瘡不光澤不起發不紅活不結膿謂之表裏俱虛宜用此藥治之若悶亂煩渴吐瀉不食腹痛腹脹痰喘氣急謂之表裏虛寒急用此藥送豆蔻丸或十日至十一日當屬不虛煩渴咬牙手足並

冷飲沸湯而不知熱此陽虛脫陷急用此湯取之有復生者

百祥丸 治痘瘡黑陷及敷而吐青綠水

紅牙大戟陰乾蜜水黃芩去其復入元升中煮

右焙乾爲末水丸粟米大每服十九赤脂麻湯下
蘇按前方治痘瘡黑陷耳聾冷咬牙吐瀉者乃脾土虛敗寒水反侮歸腎之惡候也用百祥丸瀉之急以四君子加丁香陳皮木香厚朴炮薑以溫補脾土身熱飲水黑陷復起十粒一二蓋此症因脾土虛敗寒水乘侮陳文秀先生云若治寒水於既侮之後何保脾土於未敗之先此發前人之未發况前藥少三十

脾胃之氣運於於腎而纏渴之舌恐胃氣先傷而不能及然非錢公之明見不敢投非古昔之元氣不能用治者慎焉

牛李膏 治痘瘡黑陷

靈牛李子

大青葉

甘草

天門冬

生地黃

熟地黃

天門冬

右杵汁石器內熬膏每服半斤大煎杏膠湯化下
雄黃散 治痘後牙齦生瘡

雄黃一錢

銅線鐵

右研細量瘡太小乾繆其上

化毒丹 治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

玄參各三兩

甘草

甜硝各二兩

青黛一兩

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯化下

薛按前方生血涼血解毒寒中之劑用之得宜殊有良驗

括囊湯 治慢驚

括囊根一錢

白甘遂一錢

右慢火炒黃爲末每服二三分煎薄荷香湯下

薛按徐用誠云錢氏治慢驚用括囊湯恐傳寫誤耳蓋驚主風木甲木屬陽病急易治乙木屬陰病緩難治况小兒五臟之氣未實神氣未完而自病慢驚

症非病後及吐瀉脾胃虛損而得者慎勿用此峻厲之劑

溫驚丸 治慢驚風症

牛膽南星四兩

朱砂一盛分

天竺黃五錢

龍腦一錢

紫臘脂一錢

右各另爲末用黃牛膽汁丸茶實大每服半丸砂糖

湯化下

薛按慢驚屬脾胃無陽肝木所勝之寒症故用溫驚丸以溫之但所用之藥乃辛散陽氣祛逐痰涎治者審之

人參理中丸 治中氣虛熱

人參

白朮炒

甘草炙各等分

右爲末薑汁糊丸

菉豆大每服二三十丸白湯下

謂中丸

治脾胃虛寒

白朮

人參

甘草炒各五錢

乾薑四錢

右爲末用蜜丸菉豆大每服二三十丸白湯下薛按前二方本經自病之藥卽人參理中丸也若腎水侮土而虛寒者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加

藿香，甘瀉加木香，

張氏溫脾散 治脾胃虧損腹脹虛脹乳食不進困倦無力

詞子肉

人參各七錢

白朮

木香

桔梗

茯苓

藿香

陳皮

右每服二三錢，薑棗水煎

黃芪各五錢

甘草二錢半

薛按：前方治肺虛弱之症。若肺病已去，前症未已。

仍用六君子湯以調補脾胃。

歸脾湯

治乳母脾經氣鬱致兒爲患。

人參

白朮

龍眼肉

遠志

黃芪

木香

甘草

右薑棗水煎服。加柴胡、山梔、名加味歸脾湯。

越鞠丸治乳母六癥。傳兒爲患，或風滿肚，酸齒痛瘡。

心藥症

收斂炒

神麴炒

香附子

山楂

撫芎

麥芽炒各分

右爲東水調神麴糊丸。桐子大，每服二三十丸，白滾湯下。子母並服。

清心丸治驚熱煩躁。

朱砂

柴胡各二錢

金箔三十片

右爲末，煉蜜丸。桐子大，每服一二丸，竹瀝調下。安神丸治邪熱驚啼心肝壯熱，面黃頰赤。

麥門冬（去心）牙硝各五錢

白茯苓

乾山藥

寒水石

甘草各五錢

朱砂兩

龍膽二分

右爲末，煉蜜丸，芡實大，每服半丸，砂糖水化下。
薛按：前方降火化痰，辛散寒涼之劑不宜過服，恐反傷脾胃也。若睡中驚悸不安，宜用秘旨安神丸。若因乳母脾氣鬱熱，致兒爲患者，宜用加味逍遙散；若因乳母怒氣肝經發熱，致兒爲患者，宜用加味小柴胡湯；若因乳母飲酒，胃經發熱，致兒爲患者，宜用葛花解醒湯。

葛花解醒湯

治乳母酒後乳兒遺熱爲患

砂仁

葛花各五錢

乾生薑

白木

澤瀉

葛花解醒湯

砂仁

葛花各五錢

乾生薑

白木

澤瀉

葛花解醒湯

砂仁

葛花各五錢

葛花解醒湯

砂仁

葛花各五錢

葛花解醒湯

砂仁

葛花各五錢

右爲末，每服二錢，白湯調服。

薛按：前湯氣味辛散，不得已而用之耳。蓋酒病服之，雖效，服則陰損元氣，折人長命，可不慎哉。

化大膏 治夜啼

右全乳上令兒吮之

薛按：前症有因陰盛發躁者，有因寒盛腹痛者，有因寒盛腹痛者，有因乳母鬱悶怒氣，兒者有因乳母

燈花

一錢

十四
停滯傳見者治法說見本論

釣藤散 治夜啼

釣藤鈎

茯神

茯苓

川芎

木香

當歸各一

甘草五分

右爲末每服二錢薑棗水煎

六神散 治而有啼哭口出氣冷或細瀉不乳

人參

山藥

白朮各五錢

甘草三錢

白茯苓

扁豆各一兩炒

右爲末每服一錢薑棗水煎

當歸 治夜啼不乳

白芍藥

人參各二錢

右爲末每服一錢水煎灌之

蟬蛻鈎藤散 治肺疼驚啼

甘草炙一錢

桔梗

陳皮各一錢

右每服一錢燈心水煎

羚羊角丸 治行瘧

天麻

茯苓

川芎

白芍藥各二錢

甘草

蟬蛻各一錢

右每服一錢燈心水煎

羚羊角丸

虎脰骨

生地黃

肉桂

酸棗仁

白茯苓各五錢

黃芪各二錢

防風

當歸

黃芪各二錢

右爲末煉蜜成劑每服一皂子大白湯化下

黃芪各二錢

菖蒲丸 治心氣不足不能言語

石菖蒲

赤石脂

各三錢

人參五錢

丹參二錢

天麥門冬

各一兩半

右爲末蜜丸，每服十丸。若病後腎虛，不能言語，宜

服地黃丸。

止汗散 治睡而自汗

故蒲翁

集

右爲末，每服三錢，溫酒調下。

昏厥丸 治遍身汗出，

黃連

川大黃

燜

柴胡

鱉甲

醋炙

黃柏

黃連

蘆薈

青皮

各等分

右爲末，將黃瓜一箇去穰，納藥，煨熟，杵和，麵糊丸，

豆蔻每服三五丸，新水下。

薜故，自汗屬陽虛，盜汗屬陰虛。若心經血虛，用團參湯，腎經虛熱，用地黃丸。血氣虛，用人參養榮湯之類。胃氣虛，用六君子湯。或用一味白朮，炒爲末，以浮麥炒灑煎湯，調服。

當歸六黃湯 治血氣不足，虛火內動，盜汗不止。

當歸

生下俱

黃柏

炮黑

生地黃

各等分

黃連

右每服二錢，冰煎。

參湯治心虛熱自汗盜汗

當歸各等

右用猪心一斤每服三錢水煎服

芪附湯治稟賦氣虛陽弱自汗不止肢體倦怠或大病後陽氣虧損並急服之多有生者

黃芪蜜

附子炮等

右每服一錢薑水煎

參附湯治稟賦不足上氣喘急自汗盜汗或病久陽氣脫陷急宜服之

參五

附子炮一

右每服一錢薑水煎

人參養榮湯

治肺脾俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少

或久病虛損口乾食少數而下痢驚熱自汗

白芍藥一分

人參

陳皮

黃芪蜜

炒

桂心

當歸

白芍

炒

甘草一錢

熟地黃

五味子

七分

遠志五分

右每服二三錢薑棗水煎

玉露散治傷熱吐瀉蓄血

石膏蜜

寒水石各五

甘草二錢

右爲末每服五分白湯調下

薛按前症若飲食如常依渴飲冷屬胃經實熱宜用

此藥若食少體倦或善噫嘔黃此脾虛色陷也宜用六君子加柴胡升麻若渴而變青更兼腹脹或善怠此脾虛肝所乘也宜用前湯更加木香

木瓜丸 治生下吐

木瓜

麝香

膩粉

木香

檳榔各等

右寒末麵糊丸黍米大每服一丸甘草湯化下薛按前症多因姪姪胃經有熱或齎痰所致當審其母而兼治之

塗頭法

麝香

牛黃

麝香

青黛各二分半

蝎尾去毒一分半

薄苛二分

右爲末生棗肉杵膏塗帛上貼頭中以手烘熱頭熨之

薛按前法辛涼發散開竅祛風之劑當審用之余每以葱頭三五莖細切搗爛攤帛上以兩掌護熱貼頭門良久其邪即解諸病自退乃去其葱却以段帛寸餘塗糊仍貼額門護之春夏常用絹帛秋冬用絺絲以護貼之永無傷風之患亦因有母病致兒發搐者治驗見前

浴體法 治胎肥胎熱胎怯

烏蛇肉酒浸

白藜

青黛錢三

天麻鐵

鷗尾去

朱砂各五分

麝香半分

右爲末，桃枝下搘水煎浴之勿浴背。
薛按前法乃開發腠理，疏泄陽氣。若小兒所稟虛怯，或姪母所致，各說見本論。

神效當歸膏

治跌撲湯火等瘡，不問已潰未潰。

當歸

黃蠅

生地黃各一兩

蘇油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑，去渣入蠅熔化候冷，攬勾即成膏矣。

砭法

治丹毒赤色遊走不定，以口吮毒聚在一處用

細破器擊碎，取有峰芒者一塊，以筋劈開，頭尖夾之，用線縛定兩指，輕撮筋稍令磁芒正對聚處，懸示許，再用筋一根，類擊筋頭，令毒血遇刺皆出，毒入腹，不效症輕者止用口吮出毒，用藥敷之，如患在頭額，不用砭法，止宜用卧針，倒挑患處，以出毒血，其赤自退。

製附子法

取附子重一兩三四錢，有蓮花瓣頭圓底平者先備，童便五六碗，將附子放在坐上烟櫃中，良久乘熱投入童便，浸五七日，候潤透，揭去皮切四塊，仍浸二三日，用粗紙數層包之，浸濕埋灰火半日，取出切片檢。

視有白星者仍用瓦上炙熟至無白星爲度如急用
切作大片用童便煮二三沸熱瓦焙黃熟即可用
錢氏小兒直訣卷四畢

姦勉學類錄

秋田屋平左衛門



