



産科新論

上

ヤ 9
1110
1



文政庚辰秋季新鑄

立野龍貞先生著

產科新論

折肱齋藏版



91-1942

產科新論序

醫巫之為伎難小乎其論可以測造化生之機其術可以扶負天地化育之功者有焉立野龍貞者當今之名醫也言起死肉骨而濟生民於壘域者既眾矣又精於產科嘗



產科新論
序
著產科新論而布之於世。觀者
喧傳共該其術之神功焉。如其
論陰陽兩腎精分男女之本。變
子品體合胞形之理。悉測其微
而究其極者。幾似漏造化之玄機
而不遺之矣。至如其術則古今神

醫巫之所未發而皆自我叔之者也。
橫逆之險。產咸使得公媿達生
者。百不誤一。其術之神功。實可
駭世人之目矣。其書之所以名新
論者。蓋在於此乎。嗚呼。醫巫之為伎
難小乎。其技足以測造物之機。贊化

育之功者。我於龍貞乎觀之矣。
文政己卯秋八月

鷗齋老人興撰



沖鶴年鐫

世之業醫者不患其道之不明
而患其不用不患其術之不精而
患其不售者天下湯是也豈死
不仁之甚乎余所親視立野龍貞
翁者獨不然起於農夫志于醫術
孜孜強而不息將欲以明其道而精

其術蓋其志在於趨急救厄可
謂仁之術矣。病趨患者家之時或
衆醫會聚皆不能施其術束手
而坐家獨徐一施其術則其效
如神。與家之所診如今符節一坐
皆愕然。歎其術之神。余以此知家


術之精也。余嘗遊南嶺訪其處甚
見遇矣。東歸之後諫閩殆十年
病出者下之日屢來。生余家其交
愈厚。余以此知家不忘舊也。見其
貧賤孤寡之疾則審匄生救。常
竭其心力不敢求其報。余以此知家

有_レ也_レ夫如此則其術不淺_レ也亦
可_レ從而知已豈典_レ歟_レ逐_レ業勢汲
趨_レ名利者可_レ同日而論乎頃日毛
門人_レ哀_レ歎其_レ所_レ論_レ述_レ之_レ出_レ名曰產
科新論上梓_レ欲_レ以_レ公_レ諸_レ海_レ內_レ清_レ叙
于_レ余_レ采_レ而_レ讀_レ之_レ既_レ而_レ置_レ之_レ歎_レ云_レ嗟

呼若_レ刊_レ書_レ則_レ豈_レ獨_レ產_レ科_レ之_レ術_レ而_レ已
乎_レ實_レ為_レ學_レ者_レ之_レ教_レ言_レ策_レ矣_レ其_レ愛
胎_レ乳_レ汁_レ詐_レ下_レ胞_レ掀_レ起_レ術_レ則_レ前_レ人_レ之_レ所
未_レ及_レ而_レ死_レ凡_レ雷_レ之_レ所_レ能_レ及_レ也_レ由_レ此_レ觀_レ
之_レ歟_レ於_レ致_レ也_レ此_レ但_レ產_レ科_レ能_レ之_レ也_レ凡
四_レ推_レ疾_レ病_レ者_レ各_レ因_レ其_レ症_レ而_レ施_レ其_レ治_レ法

應世當無一所不至其志懇惻款誅
將以肉骨生死蹈人于壽域者其仁
術不亦大哉嗚呼諱斯也不知斯
人可也乎

王川小所來撰



夫天者生之不息故其德大矣鑿
之為術也以仁為心則其性亦感
矣立野先生弱冠志于鑿術疆
而不息屢奏其奇效不可勝數
烏每視罹產難殞命者慨然
歎云嗚乎近世產科雖衆矣至
其橫產危險者獨不能下手坐

產科新論
視其斃者亦不鮮矣何其術之拙也令人歎非命也謂之仁術可也乎先生彌勵弥勉一有以不安則猛奮激厲必致于自得而後止人稱其術之神良以哉於是橫產之險下胞之難咸使以分挽者如指其掌

雖然其知者奇之其不知者怪之先生固不拘知與不知唯任其真而已嗚呼天以生之成其德先生以其術施諸海內以救彼險產橫夭者其德不之盛矣乎此產科新論之所以作也讀者知其意所寓其術之神

以是為博施濟衆之助也亦
先生之志也

文政己卯之冬月

の人仙臺 中山元貞撰

江戸 井 義書

産科新論題辭

余南總叢陋ノ郷ニ生長シ。耒耜ヲ帶ビ。野老村
農ト相伍シ。桑麻秔稻ヲ談ジ。陰晴豊儉ヲ占ヒ。
夏畦病シト雖モ。官途ノ熱ヨリモ涼ナリ。秋收
急ナリト雖モ。閭里ノ營ヨリモ緩ナリ。世ノ繁
華艷麗。ミナ雲烟ノ眼ヲ過ルニ等シ。然レモ土
壤窮僻ニシテ。良鑿ニ乏シク。親戚故舊ノ病ヒ
ニ罹ル者アレバ。徃々ニ治ヲ誤リテ。天札ノ患
ヲ免ル、了能ハズ。余コレヲ坐視スルニ忍ビ
ズ。耒耜ヲ投ジテ。古鑿道ヲ學ヒ。郷里ノ天札ヲ

救ハン丁ヲ欲ス。コノ時ニ當テ。余ガ隣郷令目
村治郎兵衛者妻。不幸ニシテ横産ノ患ニ嬰ル。
衆鑿環繞シテ。百方已ニ窮極シ。實ニ心カヲ盡
スト雖モ。苦楚ヲ免レシムル丁能ハズ。只手ヲ
袖ニシロヲ箝デーヒヲ投ズベキノ手段ヲ曉
ラス。卒ニ余ヲ延テ治ヲ乞フ。往テ診スルニ。兒
手ヲ露ス丁膊ニ及ブ。仍テ諸鑿ノ治方ヲ詢フ
ニ。百方悉ク盡サマル處ナシ。余モ亦卓異ノ見
無ク。辭シ去ントス。婦余ガ衣ヲ牽テ。涙ヲ垂テ
言フ。賤妾ガ死生命乎。然ト雖モ兒ヲ不媿

ノ斃ル、寸ハ。命ト云ベカズ。若兒生ル、丁ヲ
得バ。妾モ亦活ン。乞フ努力ノ妾ヲ救ヘト。余當
時横生ヲ治スルノ術ヲ發明セズ。遂ニ一方ヲ
投メ去ル。其明日令媿スル丁ヲ果サズメ殞ス。
余コ、ニ於テ始テ悟ル人ノ病ニ罹テ。命ヲ殞
スモノ皆天命ト云ヘカラス。鑿タル者其術ヲ
究メザル寸ハ。亦ツノ罪ヲ辭スル丁ヲ得ズ。爰
ニ於テ尤モ思ヲ覃フメ。産科ノ書ヲ讀ミ。誓テ
一方生クノ婦ヲメ壽域ニ躋ント欲ス。夫レ産
難ハ令媿スル丁ヲ得バ。命必全キ丁前ニ産婦

ガ訴ル處ノ如シ。他ノ病ハ然ラス。診視モ難ク。治療モ容易ナラス。況ヤ死生存亡ハ。人ノ測リ難キ所ニモ。鑿モ亦ツノ治ヲ曉ルコト能ハザル者衆シ。産科ノ如キハ。コレニ異ナリ。分娩スベキ者ヲ。分娩サスルマデノモノナリ。鑿コレヲ濟フト能ハスンバ。何ヲ以テ他病ノ症ヲ見テ。其因ヲ察シ。臟腑ヲ洞視シテ。病ノ在所ヲ量テ。其人ヲ春臺ニ躋ストコトヲ得ンヤ。爰ニ於テ深ク慙愧シテ。刀圭ヲ投ジ。鑿學ヲ廢シテ。麋鹿ト共ニ游ンコトヲ欲スト雖モ。人ノ許スナク。再ビ刀

圭ヲ執リ。心ヲ鑿術ニ留メ。日夜刻苦スルコト久シ。遂ニ彷彿トメ。ツノ微旨ヲ得ルニ似タリ。鬼神コレヲ通ズルカ。往日余自以為ラク賀川氏ハ。産科ノ術神ニ通スト。今數々其書ヲ讀ニ。大底一己ノ私論ニ出テ。附會ノ說尤多シ。何ゾ險産ヲ救フニ足ンヤ。雖然險産ヲ救ノ端ヲ舉ルニ及テハ。實ニ千古ノ卓識ナル者ナリ。片倉氏此ニ繼ニ發蒙ヲ著メ。賀川氏ノ胞衣ノ表裏ヲ謬ルヲ辨ジ。且胞衣白膜一物ヲ論ズルニ至テハ。其真ヲ擧ルト云ベシ。其白膜四邊ニ縮蹙スト

云ニ至テハ。其論鑿ト云ベシ。余豈敢テ此ヲ蓋
ハンヤ。齊東野人ノ語ト雖モ。其善者ニ遇ヘバ
コレヲ取テ其善ヲ殘ナハズ其不善者ニ至テ
ハ是ヲ絀テ取ラス。當今ノ產科十二ノ八九ハ
皆賀川氏ヲ鼻祖トメ。必其門徒ニ非レバ私ニ
淑シテ其論說ニ眩惑セラル、ノ三。亦哀ムベ
シ。產科横生ヲ救ノ術ヲ了セズンバ。何ヲ以神
ニ通スト云ベケン。産婦ノ死地ニ就者十二ニシ
テ八九ハ皆横産ト血暈トナリ。然ルニツノ手
術アルトテ論ゾ術ニ及バズ。暈ヲ論ゾ其術疏

ナリ。横生ヲ救ノ梗槩ヲ擧テ。産器ヲ論及セズ。
余私ニ聞。賀川氏難生ヲ療スル毎ニ。專ラ産器
ヲ用ユト。然ルニ其論ノ爰ニ及ザル者ハ。其術
ヲ秘スルガ為カ。將其術ノ售レザルガ為カ。富
豪ノ以コレヲ懼ル、ガ為カ。夫レ兒頭横骨ニ
懸テ不出。或ハ兒腹中ニ斃レ。或ハ子懸收ラス。
或ハ兒手ヲ露シテ膊ニ及ビ。或ハ母氣大ニ疲
レ。死ニ濱スルノ類。手術ノ及所ニ非ル者。器ヲ
用ルニ非ンバ。其險産豈濟トテ得ンヤ。余深ク
コレヲ患ヒ。其所得ノ術ヲ述テ。コレヲ海内ニ

傳ント欲ス。老子曰夫兵者凶器也。不得止而用也ト。産器ヲ用ハ止トヲ得ザレバナリ。兵ヲ用ル者ハ。治ヲ欲メナリ。器ヲ用ル者ハ。其生ヲ欲メナリ。讀者意ヲ此書ニ注テ。反覆研究シテ。余ガ意ノ在所ヲ詳究シ。又余ガ産器ヲ用ルトヲ熟シ得バ。此患ニ罹テ非命ニ殞サシムルトナカラン。此技余師ニ就テツノ秘ヲ究ルニ非ズ。又書ヲ讀デ悟ルニ非ズ。古方ニ偏セズ。後世ニ僻セズ。日夜刻苦シ。自識獨得ニ出テ。専ラ産婦ニ就テ。親ク其術ヲ施シ。慮ヲ殫シ。心ヲ覃フス

ルト數十年。近ヲ推テ遠ヲ知り。寸ヲ推テ尺ニ及ブ。漸クニツノ底蘊ニ造詣ス。實ニ神助アルニ似タリ。因テ國字ヲ以テ之ヲ褒録シテ。剗刷ニ授ケ。海内ニ公布ス。讀者余ガ苦心ノ在所ヲ知ラバ。豈余ガ幸而已ナランヤ。天下ノ險産夭札ヲ濟ノ一助タラント云。

文政二年己卯秋

立野龍貞識

產科新論目錄

卷之上

經水論

受胎論

妊娠論

惡阻論 附乳汁論

雙胎論

血暈論

子癩論

鎮帶論

產椅論

卷之中

胎漏 附治術 并出圖說

轉胞 附治術 子懸 附治術

正產 附治術并出圖說

逆產 附治術并出圖說

坐產 附治術并出圖說

橫產 附治術并出圖說

血暈 附治術 胞衣不下 附治術

子宮脫肛膀胱脫 附治術

卷之下

妊娠雜病 附治方 產後雜病 附治方

妊娠麻疹論 并出治方

附錄治驗 二十五條



產科新論卷之上

賜克平泰

南總立野龍貞著 男 文仲子德全校

雲貞君固

經水論

經曰升已而降降者謂天降已而升升者謂地天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天故高下相召升降相因而變作矣夫人身氣血以天地之陰陽升降上下之理同之氣降于血升于血升于氣降于循環無端終于復始之經曰天地和合則經水安靜天寒地

凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧ストコレ乃チ天地ト升降ヲ同スル者ナリ
 氣血ノ源ハ胃ニアリ水穀胃ニ入テ腐熟スル時ハ
 中焦ヨリ出テ浮漚ノ如シ胃中ニ竝テ上衝シテ肺
 ヲ貫キ心ニ入テ亦已ニ變ジテ血トナリ周身ヲ榮
 養シ十二經脉ニ注グ十二經脉滿溢シテ奇經八脉
 ニ流傳シ奇經已ニ滿溢ノ胞中ニ下テ經水トナル
 馬玄臺曰任衝二脉奇經八脉之二也靈樞曰衝脉任
 脉皆起于胞中故為血之海矣經水常ニ三旬ニ一
 ヲ見テソノ期ヲ失ハザルヲ以テコレヲ月信紅潮



ト名ク

或問曰男女ニテ氣血アリテ婦人獨經水ヲ下ス
 ハ何ゾヤ余答曰男子ハ氣多ク血少クノ陽ニ屬ス
 衝任ノ二脉通スト雖モ女子ソ胞トソノ形ヲ異ニ
 ス環ノ端ナキガ如ク周身ヲ榮養ス故經曰男子以
 藏精女子以繫胞ト婦人ハ血多ク氣少クノ陰ニ屬
 而胞アリ衝任ノ二脉ハ胞中ニ起ル故ニ循環スル
 一能スノ胞中ニ集ル王太僕曰衝為血海諸經朝會
 男子則運而行之女子則停而止之謂之血室經曰任
 脉通衝脉盛男既運行女既停止スト是ナリ胞其守

ヲ失サルヲ以ノ故ニ三句ニノ一タビ下ル若シ胞
 病ヲ受テ其守ヲ失ヘバ則赤白帶下或血塊等ノ患
 ヲ生ス男子ハ則不然衝任ノ二脉壅閉ノ通ビザレ
 ハ則血循環スルヲ能クノ遂ニ囊中ニ流レ入テ内
 結シテ血疝等ノ病ヲ生ス故衝任ノ為病男子内結
 七疝女子帶下痲聚ト乃チ是ナリ

受胎論

先輩ノ受胎ヲ論スル其說紛紜聚訟ノ一ナラズ夫
 レ一陰一陽往來流行シテ間斷有ルヲナク萬化是ニ
 因テ生シ品彙コレニ因テ形ヲナス獨陽獨陰何ゾ

萬物ヲ化生スルノ理アラシヤ然ルニ產論ノ附録曰
 一娼未配有一惡少強與交其女未感而孕子聞曰女
 氣不感男精獨結其或男既產果如其言如此ノ語只
 一家ノ見ニ任テ強テ其奇ヲ舉ル者ニメ固ヨリ不
 足論ナリ天道ハ是ヲ生スルヲ敏トシ地道ハ是ヲ
 育スルヲ敏トス然リト雖陰陽風雨霜露ノ和氣
 ニアラザレハ萬品ソノ生ヲ遂ルヲ能ク故易曰男女
 構精萬物化生スト男ハ天ニ屬メ陽ナリ女ハ地ニ
 屬メ陰ナリ男子ニハニシテ天癸至リ女子ニ七ニ
 シテ天癸至ル所謂天一生水地ニ之ヲ成スト是ナ

産科新論 卷之七
リ男女百骸九竅五臟少モ異ナルノ理ナレ然ルニ
男女ヲ分ツ所以ノ者ハ只腎臟ニニツアリ左ヲ陽
トシ右ヲ陰トス陽精女子ノ胞中ニ入テ胎ヲ結寸
ハ男形成ル陰精女子ノ胞中ニ入テ胎ヲ結寸ハ女
形成ル經曰左右ハ陰陽ノ道路ナリ易曰乾道為男
坤道為女即チ是ナリ然ルヲ古人男女ノ分ヲ論ス
ルニ男ハ父ノ氣ニ由テ生シ女ハ母ノ氣ニ由テ生
ス或ハ精包血血包精等ノ說多シ是大ナル誤ナリ
父實ニコレヲ生ジ母實ニコレヲ育スルノミ何ゾ父母ノ
氣ニ從ヒ精血ノ包ニ從テ男女ノ形ヲ別タンヤ若

シ此說ニ從フ寸ハ天ハ陽ニシテ物ヲ生シ地ハ陰
ニシテ物ヲ成ト云義ニ乖違セリ易曰坤道其順乎
承天而時行然レハ則地ノ物ヲ生スル天ニ承順ス
ル寸ハ母ノ子ヲ生スルモ亦父ニ承順スルニ過サ
ルノミ余豈辨ヲ好ンヤ止テ得ズ是ヲ論スルノミ

妊娠論

賀川氏曰妊娠四五月下血塊治方曰當剖視之恐是
傷產也已知傷產當復檢胞衣已下與未下者與折衝
飲但下血塊者乃知非傷產也ト此ノ說ノ如キハ實
ニ世人ヲ惑スト謂フベシ如何ントナレハ妊娠四五

月下血塊者當剖視ノ理ナシ然ルニ剖テコレヲ視ル者ハ蓋シ囊兒ナランイヲ疑フ者カ若シ果ノ囊兒ナラハ何ソ當檢胞衣已下與未下者ノ理アラシヤ又産論翼ヲ閱スルニ兒白膜ヲ冒テ出胞衣ハ別ニ腹中ニアリ臍帶ハ胞衣ノ表面ヨリ垂ル而白膜ヲ貫クノ圖ヲ載ス是賀川氏胞ト白膜トヲ錯リ認テ二物トスル者ニ疑ヒナシ然レ氏翼ニ載ス家君平生治孕婦數萬其品胎者僅見二三而已故其法未詳君子於所不知則闕之可也ト云云此ニ由テ是ヲ見レハ賀川氏其不審ナル者ハコレヲ闕テ載ヒザル



明白ナリ而此ニ囊兒ノ圖ヲ舉ルモノハ果ノ囊兒ヲ見ルヲ數度ナラン然ルニ其論僻異ニシテ其圖モ亦誤レリ故ニ片倉氏以往コレガ謬妄ヲタツメ與其信也賀川氏又曰如倒生非卒然變動自胚胎而然以此吾門得妊娠八九月一按腹使知之也ト此等ノ技ハ實ニ神ニ通スルニ似タリト雖氏又疑ベシ余輩不肖ニシテ百夕ビ按腹スト雖モ此ハ兒ノ頭此ハ兒ノ足ト云フヲ辨知スルヲ得ズ其手足ヲ露シ肩背ヲ露スニ及テ始テソノ横逆正坐ヲ知テ而後死ト活トニ從テ術ヲ以分娩セシムルノ賀川

氏腹狀ヲ察ノ其横逆ノ患ヲノ免レシメハ可ナリ
 而其術ノ斯ニ至ラサルモノハ徒ラニ胎狀ヲ説クノ
 之又怪ムベシ腹内ノ症候ハ臨産ノ時ニ於テ何ノ
 益カ此アラシ賀川氏又曰古人謂其縮手足而居者
 亦非是也自其背而探之其左右足膝皆張而旁出則
 應是其面作箕股或結跌也如其手膊則並展其臂而
 常自依脇旁則未嘗縮手足也故生子頭上耳後横斷
 紋乃横骨當嚙之痕也如逆生者其孕本亦背面而上
 首胞衣蓋乎兒膏肓之上故其生遂自足踵而出也蓋
 古時未知其胚胎之初所已倒錯也而以臨産遽變者

ト忘論耳ト云云此レ則孟浪ノ私言ニノ公論ニ非
 夫後世ヲ証ニ庸醫ヲ惑ノ言此ノ二三ニ見ルニ
 足レリ若シ横骨相嚙ト如此ナレハ小水何レヨリ
 カ通スルト得ルヤ臨産子頭横骨ニカ、ル寸ハ横
 骨相嚙テ水道ヲ閉塞ス故ニ小水通ゼズ何ノ意ヲ
 用ザルノ甚ヤ余横逆坐正ノ胎ヲ見ルニ横逆ノ紋
 アルモノアリ正産ノ紋ナキモノアリ妄ニ横骨相嚙ノ
 痕ト云ベカラス此ノ事余ガ不敏、敢テ領畧スル
 所ニ非ズト雖氏囊兒ニ遇毎ニ其胎狀ヲ察ルニ口
 鼻ハ兩脚頭ノ間ニ當テ雙臂ハ左右章門穴ノ所ニ

置キ十指ヲ屈テ耳下ニ當テ其狀雞卵ノ如シ臍帶ハ臍ニ起テ或ハ左ノ股ヲクバリ又臍ニ至テカ、ム其形大腸ノ如シソノ末長サ二寸計リ兒ノ鼻梁ニ並ンテ胞ノ裏面ニ附着ス一モ臍帶白膜ヲ貫テ上テ胞ノ表面ニ附ク者ヲ見ス賀川氏胎狀ヲ論スル皆背面倒首スト又曰夫彌月之胎其大幾何子宮之中其寬幾何信使廻轉理當破裂ト此言未タ理ヲ悉ザル者ニシテ強テ新說ヲ構テ世人ヲ誣惑スル者ト云ベシ余嘗テ囊兒ニ遇毎ニ表面ヨリ此ヲ見ニ白膜ノ邊兒ノ項ニ當テ又徑リ二寸計ノ薄膜アリ

是レ破漿ノ處ナリ又平産ニ遇毎ニ探宮シテ是ヲ見ニ母ノ腰眼穴ノ邊ニ當テ居ル其狀雞卵ノ如シ古人廻轉シテ生ト云者はナリ賀川氏ノ廻轉セスト云者ハ通論ニ非ルナリ如何トナレハ兒生ントスル寸陳疼至ル毎ニ兒頭廻轉シテ母ノ背ニ面シ先白膜邊ノ薄膜破レテ水漿ヲ下シ而後ニ分産ス背面ニテ居ルト云者ハ全ク此無シト云ニハ非ス百中ノ一ニ多クハ難生ナル者ナリ如何トナレハ兒ノ項母ノ横骨ニ當リ薄膜ハ母ノ横骨ノ後或ハ膈尻ニ當レリ故ニ薄膜破傷スト雖氏豈輒ス

生スルヲ得シヤ故其生ルニ當テヤ兒頭横骨
 ニカ、ラザレハ或ハ坐産或ハ逆産其變測ルベカラ
 ス賀川氏ノ背面倒首シテ謂未縮手足者ハ余未ダ
 コレヲ見ス又細ニ囊兒ノ胞衣ヲ見ニ胞衣ハ乃チ
 兒ヲ包ム白膜ナリ白膜ト胞衣ト別物ニ非ス但表
 面ヨリコレヲ見ル時ハ表面ノ中央ハ譬バ鳥ノ肉ヲ
 タ、キテ附着スルカ如シ是ヲ胞衣ト名ク其胞衣ハ
 兒頭ヨリ腹面ヲ蓋フ其外邊ハ白膜ニシテ胎ヲ包
 ム是ヲ白膜ト名ク強テ分別セザル寸ハ一物ナル
 必セリ裏面ハ蓮葉ノ如クニシテ表面ハ蓮葉ニ類

セズ當ニ産スル寸ハ上ハ瘀血ニ壓レ下ハ臍帶ニ
 牽ル故ニ出ル寸ハ胞轉テ裏面ヲ表ニ露ニテ表面
 ヲ裏トス余數百ノ囊兒ヲ見ニ一モ胞衣兒ノ臀尻
 ヲ蓋ヒ胞衣ノ裏面ヲ表トシ或ハ胞衣ト膜ト異ナ
 ル者ヲ見ス賀川氏其狀ヲ會得セズ錯リ認テ圖ヲ
 作ル者カ余が見ル處ノ囊兒ニ因テコレヲ考ルニ
 賀川氏ノ圖ノ如クニシテ子頭横骨ニ當テ背面ス
 ル寸ハ胞衣ハ必母ノ脊骨ニ向ベシ然ル寸ハ必漏
 血ス故賀川氏胞衣兒ノ臀尻ヲ蓋ノ圖ヲ作ル者カ
 凡臨産下血スル者ハ皆胞衣歪斜ノナス所ナリ或

ハ胞衣先ニ下ル者皆必漏血ス古人ノ所謂漏胞胎
 崩ト云者ニメ是則臨產ノ變ナル者ナリ片倉氏發
 蒙ニ曰其胞莖當子宮中後面粘着母之氣血由是先
 入胞内乃流布於文理筋絡達胞帶中隧孔而至臍中
 以將養兒者無疑トコノ說柄鑿附會ナルヲ知ル
 夫胎ハ天地陰陽造化自然ノ成ス所ニノ理ヲ以論
 シ難シ胞衣ハ乃チ一滴水ノ浮皮ニシテ浮液ナル
 者即チ胎ナリ之ヲ長セシムハ母氣ノ養ト雖何
 ギ母ノ血氣ソノ臍中ニ入テコレヲ養ベキヤ若シ
 母ノ血氣胞帶ヨリ臍中ニ入テコレヲ長スル者ト

セハ雞卵魚子ノ如キ何ヲ以テコレヲ養ヤ果ノ然
 ラバ三月以前胎帶未成ノ時何者力胎ヲ育スル
 ヲスルヤ枯滯偏僻竟ニ通論ニアラス

惡阻論 附乳

妙一齊種子編曰惡阻者惡心而阻隔飲食也產寶謂
 之子病巢氏病源謂之惡阻其因粉耘トノ至今ニテ
 無定說有謂屬經水閉塞藏氣不宜者巢元方有謂屬五
 味不化中氣壅實者聖濟總錄有謂屬氣血積聚内鬱攻胃
 者丹溪有謂屬胃氣虛弱中脘停痰者陳良甫有謂屬痰飲
 血壅停滯肝經者載復有謂屬少陽之火上衝胃口者

趙養 諸家ノ説紛紜トモ枚擧ニ暇アラズ其説愈殊
 二ノ其治亦愈殊也余甚タ惑ヒ又因テ先賢ノ意ヲ
 索搜シテ惡阻ノ論説ヲ立ツ夫レ人ハ先天ニ生ジ
 後天ニ養ハル脾胃ハ人身ノ大本ニ是ヨリ貴ギ
 ハナシ其用水穀ヲ受テ腸ニ送リ腸是レヲ腐熟ノ
 正液ヲ生ジ三焦ノ腑ニ送リ三焦ノ腑亦其ノ清濁
 ヲ分別シ其清者ハ心ニ入テ血ト化シ脉中ニ行ク
 是ヲ變液ト云濁者ハ其儘脉外ヲ行キ是ヲ直液ト
 云變直表裏ヲナシテ一身ヲ榮養ス難經曰其清者
 為榮濁者為衛又曰榮行脉中衛行脉外ト云云依之

觀之古人ノ榮衛ト云者余カ言處ノ變直ナルモ
 カ古人三焦ノ腑ヲ論スル叔和啓玄ノ所説及ヒ難
 經ヲ閱スルニ三焦ハ名有テ形ナシト云云此ノ言
 ノ如キハ余カ考フルトコロト大ニ齟齬ス故ニ此
 ヲ信ゼズ徐道陳無釋徒三焦有形而如脂膜張从賓
 曰三焦為臟腑之外衛心包絡為君主之外衛云云此
 ノ説ノ如キハ余カ考ル所ト符節ヲ合スルカ如シ
 夫レ心包絡ト云フ者ハ心ヨリ出テ心ヲ包ミ故骨
 ニ附キ膈膜ヲ貫キ下テ胃大小腸ヲ包ム此ヲ名テ
 三焦ノ腑ト云フ相連テ五臟六腑筋骨皮肉ニ至ル

二テ各不包トコロ無シ此ヨリシテ直液ナルモノ
 相通シ變液ト表裏ヲナシテ一身ヲ榮養ス私ニ按
 スルニ惡阻ハ毎月下ルベキ血ノ下ルテアタハガ
 ルガ為ニ發スルナリ夫胞ト乳膜トハ表裏ナリ故
 ニ乳出ヅル時ハ胞衰へ胞盛ナル時ハ乳衰フ互ニ
 相盈虚ス故ニ未タ胎ヲ受ケザル寸ハ胞ノ包膜ヨ
 リ直液ナル者相通シテ胞ヲ養ヒ任衝ノ脉盛ニノ
 月事以時下ル既ニ妊スルニ及ンデハ後經下ルテ
 アタハスシテ遂ニ胞膜ヨリ三焦ノ腑ニ上ル此ノ
 時胃中動ノ内熱ヲ生シ其輕キモノハ卧ステ多ク

ノ起坐ヲ厭フ其重キモノハ惡心煩悶シテ水穀ヲ
 納ル、一アタハスノ吐ス此ヲ名テ惡阻ト云フ大
 率經水多キ者ハ一二月少キモノハ二三月ニシテ
 此症アルベシ二三月以上ニ至テハ則乳膜ニ上ル
 カ故ニ多ク乳頭ニ紫黒ノ色ヲ現ス又八九月ニ至
 テ不語ノ症ヲ發スルアリ名テ子瘖ト云フ素問曰
 人有重身九月而瘖スト是ナリ是レ乃チ後經其人
 ニ因テ三焦ノ腑ヨリ心ニ入り舌本ニ上ルヲ以テ
 致ストコロナリ故ニ子瘖ノ症ヲ發スルモノハ舌
 上必ス朱ヲソ、グカ如シ又嗽ヲ發スルアリ子嗽

ト云或ハ咳血シ或ハ吐血スルモノアリ皆瘀血ノ
 致ストコ口其症ニ因リテ種種異ナリ或ハ三焦ノ
 腑ヨリ相傳テ心ニ入ル寸ハ不語ヲ患ヒ或ハ肺ニ
 入ル寸ハ咳嗽或ハ咳血ヲ患ヒ或ハ脾胃ニ入ル寸
 ハ便血或ハ吐血ヲ患フ是等ノ症其時ノ變ニ臨ン
 テ宜ク治ヲ施シ分娩ノ期ヲ待ベシ分娩スル寸ハ
 自愈醫若シ其因ヲ知ラズノ其患ヲ除ント欲シ治
 ヲ誤ル寸ハ後患ヲ生ズ知ラズンバアルベカラズ
 或ハ邪氣外ヨリ入テ是等ノ諸症ヲ發スル者アリ
 是亦症ニ隨テ治ヲ施スベシ一槩ニ瘀血トノミ思

フベカラズ夫レ乳汁ハ變直未ダ分タザル水穀ノ
 正液ナルモノナリ然ルヲ程若水強テ此カ説ヲ構
 テ其色赤者稟火色也其色白者稟肺金色也ト何ゾ
 鑿スルノ甚シキヤ既ニ分娩シテ後ニ乳汁出ヅル
 者ハ胎滿月ニ至ルマデニ經血漸漸ニ上テ乳頭ニ
 アリ今婉スルニ因テ其乳膜中ノ瘀血皆下流シテ
 乳膜此カ為ニ空虚トナリ因テ水穀ノ正液ナルモ
 ノ乳膜ノ空虚ニ乘シテ上テ乳汁トナルナリ或問
 曰既ニ産シテ後瘀血下テザレハ乳汁出ザルモノ
 アルハ何ゾヤ答曰瘀血乳道ヲ閉ソクズルガエハ

ナリ又問乳汁出ヅルモノト雖胎ヲ受ル寸ハ乳
汁自ラ止ムモノハ何ゾヤ答曰既ニ妊シテ一二月
ノ間ハ瘀血上テ胃ヲ纏ヒ妊婦ヲシテ惡心煩悶セ
シム三四月ニ至ル寸ハ乳道ニ上テ壅塞スレガユ
ヘナリ又問満月ニシテ産シ其兒乳哺スル寸ハ後
胎ヲ受ル一或ハ遲シ又其兒生育セズ或ハ小産ス
ルモノハ後胎ヲ受ル一早キ一有モノハ何ゾヤ答
曰満月ニシテ産シ其兒生育スルモノハ乳哺セシ
ムルユヘニ乳汁出ヅル一盛ニシテ胞衰ノ胞衰
フトキハ任衝ノ二脉モ亦從テ衰ヘテ經水来ラズ

故ニ胎ヲ受ル一アタハズ又乳哺ノ兒有ト雖氏其
正液生ズル一盛ニナルモノハ乳汁出テ月水モ亦
来ル月水来ルモノ、如キハ胞亦盛ニナルガ故ニ
後胎ヲ受ル一早シ若シ生兒不育或ハ小産スルモ
ノハ乳哺セザルガユヘニ乳汁不出メ胞盛ニナリ
胞盛ニナル寸ハ任衝ノ二脉モ亦盛ニシテ經水
来リテ胎ヲ受ル一早シ此レ則受胎ノ遲速アル所
以ナリ

雙胎論

雙胎ヲ懷者ハ構精ノ感ニ由テ成ス處ナリ其左精

再々感スル者ハ共ニ男形ヲ成ス右精再々感スル者ハ共ニ女形ヲ成ス若シ左右ノ精共ニ感スル者ハ一男一女ヲ成ス胞交ハ各一ニノ兩胞相粘着ノ兩胎ノ間膜ヲ以テ此ヲ隔ツ是ヲ各胞トスレバ合ノ離レズ一胞トスレバ間ニ膜アリ其臍帶モ亦各一ニノ左右各胞ニ附着ス賀川氏ハ各胞ト云片倉氏ハ一胞ト云各觀ル處異ナリ怪ムベシ余カ觀處ノ雙胎凡數十人皆此ノ如シ孿子既ニ然ル寸ハ品胎モ理ニ於テ亦然ルベシ但明史ニ四子五子ヲ產スト云フ言アリ是亦余カ經驗セザル者ニノ得テ

論セザル處ナリ賀川氏曰妊脉窪ニテ為一道者孿胎ノ候片倉氏曰凡腹象皆突起前高比之尋常妊腹則甚大而不張於左右比及臨月揣其兩脇則空軟ト云云雙生ノ候二家ノ說異ナリト雖正各據處アルニ似タリ何レカ取捨スベキ因テ予東都ニ出テ後近來試ル處ノ雙胎二三ヲ舉テ以其證ヲ示ス加賀町ノ工人權太郎者妻妊娠腹大ヲ尋常ニ倍ス余ヲ延テ診セシムルニ任脉窪ニテ一道ヲナス臨産一女子ヲ產ス是任脉窪ム者雙胎必定ノ候ニアラス三十間堀榎屋新兵衛者女亦任脉窪テ一道ヲナス

坐蓐ニ及ンテ二女ヲ産ス総十郎町伊勢屋吉兵衛者妻腹狀平常ニ倍シテ左右ニ張ラズノ前ニ突起ス産ニ臨ンテ一男子ヲ生是亦雙胎ノ候ニアラズ竹川街南部屋彌兵衛者妻腹前ニ突起シテ其兩脇ヲ揣ルニ空軟ナリ坐草ニ及テ二男ヲ産ス由テ是ヲ考ニ二家ノ說槩ノ論スルモノニ定論トスルニ足ラズ且賀川氏曰孿胎一倒左倒首向下一倒右豎頭向上其生乎左先右後故後必逆生ト云云是則然ラズ予雙生ヲ見ルモノ數十人一モ一逆一順ナレモノナシ雙生ト雖正皆順ニシ其時ノ變ニシ後

ナル者手ヲ出スヲ見ルノミ其後生手ヲ出ス者ハ其一出ソレバ則内寛ニシ卒ニ力息ノ為ニ後ナルモノ歪斜スレナリ何ヲ以テ一逆一順トスルヤ思ハザルノ甚シト云ベシ

血暈論

賀川氏曰産後發血暈者率以分娩後輒起步自動其委食之府而瘀血之氣狭之上逼心下爾不為輒起步者血暈莫發矣又曰産婦不起則不血暈而今雖不起而發血暈者測法曰血熱盛而搏也ト云云此說取ルニ足ラズ産後血暈ヲ發スル者血虚ノ氣盛ニナル

が故ナリ夫レ血ハ氣ノ配タリ氣ニ從テ升降ス氣
ハ陽ニ外ルヲ主リ血ハ陰ニ降ルヲ主ル
循環無端周身ヲ榮養スルモノナリ然ルヲ令血脫
ノ陽氣殊ニ盛ンナリ陽氣盛ナル寸ハ陰血從テ外
リ易シ陰血衰フ寸ハ陽氣血ニ從テ降り難シ故ニ
氣血皆逆上メ面赤色ヲ發シ卒倒メ人事ヲ知ラズ
甚キニ至テハ肩背反張ス此ヲ名テ血暈ト云一ニ
氣暈トモ名ク余ガ家此ヲ治スルノ術在リ掀起ト
名ク產科血暈ヲ治スルヲ明了セザレバ何ゾ能
ク險産ヲ救フヲ得ンヤ心カヲ盡テ分娩ヲ得セ

シムト雖ト率ニ血暈ノ斃ル、モノ十ニメ八九十
リ能ク掀起ノ術ヲ曉リテ手術ヲ施ス寸ハ危ヲ救
ヒ死ヲ起ス一掌ヲ指カ如シ又氣血共ニ虛ノ血暈
ニ似テ血暈ニアラザル者アリ其症頭ヲ抵レ目ヲ
閉ゲ面色青白ナルモノナリ牙關緊急スルモノハ
治スベシ掀起ノ術主之若シ牙關閉ク者ハ治シ難
シ又胞衣不下シテ心中煩亂呼吸促迫スル者アリ
是レ瘀血心ヲ衝ントスルモノナリ早ク下胞ノ術
ヲ施サバ其患ヒ頓ニ除クベシ若シ衝心メ人事ヲ
辨ゼザルモノハ先ヅ掀起ノ術ヲ施メ後ニ下胞ノ

術ヲ施スベシ

子癇論

余子癇ヲ診スルニ皆口ニ涎沫ヲ吐シ卒倒ノ人事
 ヲ知ラズ頃更ニノ自醒メ醒テ後又發ス近世俗ニ
 號慶ノ顛癇ノ狀ノ如シ醫學正韻種子篇曰子癇者
 痰涎潮搐目吊口噤也ト云云余此ヲ療スルニ殺虫
 ノ劑ヲ投メ治スル者十ニノ八九ナリ依之此ヲ考
 ルニ顛ト癇トノ類ニハアラザルモノ多シ其偶子
 癇ノ症ト定ムル者ハ開宮導漿ノ二術ヲ施シ繼テ
 挺胎ノ術ヲ以テ分産ス然ラザレバ救フト難シ

鎮帶論

或問曰大凡産婦ハ前後皆鎮帶ヲ用ルト古ヨリ然
 ラシム今世醫家産婆賀川氏ノ説ニ因テ鎮帶ヲ脱
 セシム其言産論ヲ引テ曰

神功皇后征三韓時方有身而被鎧鎧不能合因作此
 帶束之既凱旋而誕

應神天皇竟無蓄害雖有其言無證蹟亦東鑑等鎮帶
 ノ言ヲ載其說附會スト雖中古ヨリニシテ皆庸俗
 ノ論ナリ夫天地ハ以至仁為其德以生生為其化矣
 試觀竹之生於宇下者拔地數寸必自屈曲生節豫避

其宇以達焉是可以觀天地好生之德焉矣又試觀盤石之底土蓄草根者其石不移則雖萬年不發動及一轉石也勃焉萌動焉是又可以察天地發生之機焉矣亦禽獸草木胎孕含苞未嘗假鎮帶之施設也今謂人不與此同者惑之甚也亦如譬樹藝者已植已培已澆已安之後人須棄之如忘者產育之理亦異於此矣如斯鎮帶ノ害ヲ舉ルノ多端ニシテ其說亦可謂盡ヒリト然ルニ子ハ其害ナシト云其說如何余答テ曰賀川氏ハ自賀川氏ノ術アリ余ハ亦余術アリ其術ヲ研究シテ以テ其險産ヲ救ベシ然ト雖余害ナシ

ト云所以者ハ

神功皇后三韓ヲ征シタマフ寸重身有テ鎧ノ合セザルカ為ニ此帶ヲ作りタマヘシ故ニ千里ノ波濤ヲ凌キ陣ニ趣キタマヘシ其身ニ恙ナクノ應神天皇ヲ御誕生ニシセリ然テ附會ノ說ト云テ取ラズ我未ダ千古以來是ヲ用テ其害アルヲ聞カズ夫レ妊娠五月以上其胎張大ナルニ至テ鎮帶ヲ束ル寸ハ腹カヲ助ケ而動作起居ニ便ナリ何ソ氣血ノ行ラザル如クニ緊縛スル者アランヤ竹ノ宇下ニ生シ草ノ石下ニ生ズト云說ノ如キハ元

是發生其處ヲ得ザルモノナリ又人ト禽獸草木ノ胎孕ト同ジト云カ如キハ千古ノ罪是ヨリ大ナルハナシ人尚貴賤強弱ノ異アリ是ヲ明察ニシテ其治ヲ施ス一ハ是余カ術ナリ然ルヲ禽獸草木ノ胎孕與人同シト云フハ鎮帶ノ設ヲカラザル而已ナラシヤ何ゾ人倫ヲ廢シテ禽獸ト群ヲ同クセザルヤ樹藝者ニ譬ルガ如キハ十歳以下幼育ノ理ニハ少ク似タリ懷孕ノ一ハ未ダ茁芽ヲ露サザルノ前ナリ草木ト雖凡人ノ培植灌溉ヲ得ザレバ發生セザル者アリ禽獸ニモ家鴨ノ卵ハ雞是ヲ温メザレ

バ發生セザルノ類多シ然ヲ天地至仁ノ徳ヲ以テ生スル者ト云テ養生保護セズニハ至仁ノ徳ヲ全スル一ヲ得ベクシヤ余ハ鎮帶ヲ以テ險産ノ害ヲ蒙ムル者ヲ見ズ又横逆ノ患ハ鎮帶ニ由ト云モノハ非ナリ蓋シ其横逆ノ謂ハ胎前若クハ血塊若クハ積聚有ニ由ルカ或燥尿有テ是ガ為ニ産道正出スル一ヲ得ザルカ或ハ初産其事ヲ得ズシテ子宮不開ニ力息スルガ為カ或ハ産婆其時ニ先テ強テ努力セシムルカ或ハ産門ニ横骨ノ異同有ニ由ルカ或ハ臀尻ノ寛狭ニ由ルカ是皆臨産ノ變ニ因テ

来ル者ナリ余家蓄慶ノ猫孕ス産ニ臨ニテ半身ヲ
露シ免スル一能ハス為ニ按腹シ且牽テ是ヲ出ス
又某家狗ヲ蓄臨産逆ニシテ免セザレト一日一夜
為ニ是ヲ出ス且友人ノ話ニ牝馬ノ難産ニシテ逆
生スルヲ見タリト云其他禽獸ト雖正險産アレル
世俗ノ知ル所ナリ然ラバ則草木蟲魚一切ノ生類
發生シ難キモノ何ゾ無シト云ベクシヤ况ヤ萬物
ノ靈タル人トシテハ七情内ニ鬱シ六淫外ヲ襲其
變極リナシ然ヲ發生ノ大本ナリト云テ其儘捨置
テ可ナラシヤ故ニ余ハ前後共ニ鎮帶セシム産後

ニ至テハ其腹内緩情ノ故ヲ以テ是ヲ束テ其腹力
ヲ助ケシム然ラザレバ腹内虚ニシテ不穩却テ血
暈等ヲ發スルモノ少カラズ尤モ慎ムベキ所ナリ
横逆一ニ鎮帶ノナス所ト云者ハ實ニ其意ヲ得ズ
鎮帶ノ故ヲ以テ産後諸症ヲ發スルト云カ如キハ
其論甚鑿ナリ何ゾ賀川氏一人ノ見ヲ以テ千歲不
刊ノ常制ヲ改ントス世ヲ誤ル一甚シト云ベシ

産椅論

産椅竹ヲ以テ製シ下モ席ヲ籍キ冒フニ被蓐ヲ以
テス尤輕軟ニメ久坐ニ耐ヘン一ヲ欲ス倚テ睡ル

及ラハ氣息平安ニシテ瘀血自ラ下降ス然レ邊
 鄙漁樵ノ家ニハ之レ有テ稀ナリ只都下華地ノ人
 都ベテ之ヲ用ユ産椅無キモノハ衣蓐ヲ重叠シテ
 是ヲ背面ト左右トニ置キ背ハ其高サ頭ト齊シテ
 シ項ヲ着テ睡ムルニ便ナラシム其左右ハ肘ヲ寄
 スニ便トス其背側屏障ニ並ニテ傾カザルヲ要
 ス今産椅ヲ用ユルモノヲ見ルニ産後三七日ノ間
 ハ必ス之レニ倚ル然レ其人ノ強弱ニ從テ此ヲ用
 ヲルヲ知ラザレバ却テ害アルナリ一槩ニ論ス
 ベカラス太率坐ノ産スル者ハ産後モ必ス椅坐ス

ベシ横卧ヲ禁ス險産ニ遇ヒ横卧ノ産スルモノハ
 産後必ス高枕ニノ横卧スベシ椅坐ヲ禁ス皆臨産
 ノ變ニ從テ之ヲ制スベシ若シ坐卧其制ニ違フナ
 ハ或ハ頭痛或血暈或頭眩或面目浮腫或血熱トテ
 ノ患ヲ生スルヲ必セリ敢テ匆匆ニスルヲ勿レ

產科新論卷之上終



