



女科筌蹄

乾

ヤ 9
1113
1



女科答蹄

上

49
1113
1

女科筌蹄卷上

目錄

經水病
 腹痛病
 心腹急痛
 梅挾氣
 崩漏
 帶下
 身體疼痛病
 乳諸病
 肥胖病
 臍下痛
 每經腹痛
 血塊病
 漏血
 淋疾
 血爪瘡





凡婦女ノ疾病男胃女ト異ナルト無ト云ハ非ナリ
 凡気ニヨリ流行スル病ナトハ男胃女相同シ内ヨ
 リ祭スル病ハ男女同シカラスソレモ微細ニス
 ルハ外ヨリスル病ニモ異ナルアリ形質不
同故也因ヨ
 リスル病ニモ同キトアリ一概ニ云ハカラス唯婦
 女ニ於テ專論スヘキハ經水ノ諸変子宮ニ關係
 スルノ諸疾妊娠及臨産後ノ諸患乳病諸症等ナ
 リ後世方書ニ毎ニ婦女人病門ヲ並舉ル所ヲ見
 ルニ必シモ男女ト異ナラサルモノアリ又全ク男
 子ト異ニシテ別ニ講ヤスシハアルハカラサルモノ

凡婦女ノ疾病
 凡気ニヨリ流行スル病
 リ祭スル病ハ男女同シ
 ルハ外ヨリスル病ニモ
 リスル病ニモ同キトアリ
 女ニ於テ專論スヘキハ
 スルノ諸疾妊娠及臨産
 リ後世方書ニ毎ニ婦人
 ルニ必シモ男女ト異ナ
 子ト異ニシテ別ニ講ヤ



ヲ載スルモアリテ女科ノ別明ナラス今此ニ婦
 女ノ病別ニ講セスハアレハカラサルモノヲ舉
 クモトヨリ世医ノ牙為子カ牙療ト同シカラサ
 ルト多シ此ハ皆緊要ヲ舉テ以テ初学女科ヲナ
 スノ筈蹄トス故ニ唯親シク試タレ牙ヲ舉テ細
 義ヲ論スルヲ見ルモノ簡易ニスキタリトセシ
 其詳ナルハ世ニ其人多シ宜ク就討論切磋スレシ
 ○世ニ婦女ヲ気病ト稱シ或痼症ト稱シ又血ノ道
 ト稱スルモノ皆是子宮ニ関係スル病ニテ男子
 ト同シカラサルナリ或平素頭痛多ク或時ニ眩

暈シ或不時寒熱アリテ外邪ノ如アリ又七情ノ
 変アルモアレ故ニ痼症ト稱スルナリ又世ニ積気
 ト稱シテ時ニ心胸下ニサレコシ甚シキトキハ
 人事ヲ夫ニ至ルアリ此亦男子ト同シカラス子
 宮ニ係ル病ナリ其外崩漏帶下ノ類ハ明ニ子宮
 ニ関スルナリ腹痛癥瘕ナトノ類世医皆子宮ニ
 カレルヲ云ハサレ凡往々子宮結毒瘍腫ノ類
 アリ詳審ニ診察スルハ子宮ニ関係スル病ナリ
 七八ナリ此男子ト全ク同シカラサル所ナリ泰
 西ノ説ニハ往水不利不瀕ヲ皆子宮ノ衰弱或等

急ニヨル所トス世ニ所謂婦女ノ痼ハ皆子宮寧
急ニヨルヲナリ子宮ニ關係スルノ病ハ男子ト
異ナルハツナリ

○ 凡臨産ニ於テ手術ヲ用ルハ子玄子ノ術長セ
リ今ニテハ其門人ニモ巧ナルモノ故ニ追々ハ
シクナレルヲ以テ其術ヲ用ルカヨシ妊娠産後
トモニ手術ヲ用ルハ皆然リ薬剤ヲ用ルハ
其長スル所ニアラスコノ故ニ予カ經驗スル所
ヲ述フ子玄子ノ術ヲハ此ニ載セザルナリ

經水病

大凡經水病ト稱シテ婦女ノ疾病ヲ論スルノ首
トスレ氏經水ニカハル諸病ト云ハ經水ノ常ヲ
失ヒテ或毎月同シク来ラス或ハ進ミ或ハ退キ
過度ニ或稀少ナルヲ萎ヲ謂ニ非ス他ノ後人書
ニハ此等ヲモ經水病ニ并セ唱フ總テ疾病ハヤ
ム所アリテノ名ナリ其人多血質ナル人アリ少
血質ナル人アリ故ニ他人ト同シカラストス
病トハ云ハカラス疾アリテ人故ニ經水常ヲ失
ハトカムルトアルヘシ故ニ經水失常ニ病門ヲ
立ルハナキハツナリ

經水病治法

經水ノ不利ヲ利スルハ落葉松耳 苗根ナト最効
アリ此外通劑ト稱スルモノ多ハ破血劑ヲ用タ
レ氏經水滯積シテ癥塊ナトニナリテハ破血劑
シナレハシ唯不利スルハ子宮ノ常ヲ失ニヨル
故ニ破血ノ主治スル所ニアラス既ニ婦人常ニ
大便秘シテ通シカタシト云モノ多シ是亦子宮
ノタ、ル、カ或ハシマリアシクメ穀道ニモタレ
穀道ニ壅閉スル故ナリ故ニ大黃芒硝功ヲナス
ト少シ是ニテヲモ考フヘキナリ

肥胖

凡婦人常ノ人ヨリ形體肥大ナルハ血滯ヲ常ヲ
失ナリ然氏資質ノ血多キ人アレハ必常ヲ失ト
云ヘカラサルニ似タリ但經候ヲ以テ權衡ヲハ
カルニ肥大ナル人ハ經少ク瘦小ナル人ハ經多
シ然ラハ經ノ多少スキタルナクハ中體ノ常ナ
リ輕少ニシテ肥大ナル氏經ノ多クシテ瘦小ナ
ルモ共ニ序ヲ次タルナリ
若其多血質ト云ハキモノハ經水多ク通シテ肥
大ナルトハ甚稀ナリ經水少クシテ肥大ナラサ

ルモノハ少血ノ人ト云ヘシ
此ハマ、アルモノナリ故肥大ノ婦ニ逢ハ、經水
ヲ閉テ少ト云ハ、是經血滯ルナリ然氏既ニ常
ヲ失タル故ニ醫治ニアツカラサケニナラス然
レ氏苦ム野ナケレハ必シモ茶ヲ用ルニ及ハス
胸ツカエ肩凝リ平素氣フシヤウニシテ動作懶
シト云モノハ病ナリ此ハ茶ヲ用ヘキナリ何ホ
ト肥胖ニテモ動作懶カラス氣ヲシヤウナラスト
云ハハ必茶ヲ用ヘキニ非ス然レ氏婦人ノ情容
儀ヲ重スル故ニ肥胖ノモニクキヲ恐ラ苦シム

可ナクテモ茶ヲ服シテ中体ナラシムヲ求ム医
若シ明ニ之ヲ辨セサレ氏多ク惑ラ生シテ茶ヲ
喫レ氏苦ム所ナキモノハ茶ヲ服シテ功ヲナス
トナシ病トナスナサザル、人別ハ心下殊ニ硬
ク呼吸ヲ妨礙シテ或ハ舌上乾クナト、云云ア
レハ明ニ苦ヲ見スト金氏既ニ病ヲナセルナリ

肥胖ノ治法

肥胖ハ甚醜ヲ以テ婦女大ニコレヲニクニ茶ヲ
求ムモノ多シ其心下鞭ク短氣シテ動作ニ懶
惰ナルトキハ茶ヲ喫サケトヲ得ス往年コレニ

夾鐘圓ヲ與ルニ服スレハ効アリ止レハ又モト
ノ如ク久服半年許ニ及ハズ頭切ナシ又應鐘散
ニ及鼻ノホヲ加テ長服セシメテ可ナリト云説
アリ又海人中ヲ多服シテ佳ナリト云説モアリ
其説ニ海人草ハ腸中ノ汚物ヲ去ル 肥胖家ハ其
本腸間ニ汚滯ノ物有テ然ル故ニ之ヲ用テ必効
アリトニ方トモニクシ試タシ氏未著シキ効ヲ
見ス○今膏ヲ試シニ剛人丸ヲ喫タルニ心下ヨ
クスキ短氣止ニ動作カルク大ニ効ヲ得タリ然
レハ肥胖家モ此ヨリ心ヲ用ハ必効ヲ得ルヲア

ルハシ

○總テ徑閉ハモトヨリ徑血ノ常度ヨリ少シト
云モノハ皆粘膠血カ本トナリテソレヨリ閉塞
シテ通セサルナリ其粘膠血ハ其本毒アルニヨ
ル其毒ハ毒下毒カ梅毒カノニツナリ何ニテモ
汞劑ハ其粘膠ヲホトク功アル故ニ用レハ必治
スニシ

腹痛病

腹痛疼痛ノ病イソイソアリ今此ニ先別テニト
スニハ臍上主トナリテ痛ニ臍下ニ及ナリ心下

滯字

ヲ按スレハ必堅クシテ徹々必腰腿ニヒキ或ハ
腰モ亦甚々痛ミ盡ハ輕夜ハ重シ此症往往初發
熱シ或惡寒スルヨリ起ル故ニ誤テ外邪病ノ如
クニ思フ熱診スルニ舌上必変アリテ多血症ノ
徴ヲアラハス多大便秘シ甚シキハ小便モ不利
ス脈弦實ニイヤ、數ナリ痛專ラ臍上ニアレ凡
臍傍ヨリ臍下ニ至リ多クハ磊砢タケモノアリ
或ハ損急シテ按スルハ盡ク痛ミ且多ク皆脹ラ
カヌ

腹痛ノ治法

婦人ノ腹痛ニ血ノ至トナラサルハナシ凡疼痛
スルハ皆酷厲ノ毒アリ故ニ良血ニテアルハナシ
必惡血故ニ瘀血ニテラサルハナシ此義ヲ知り
テ桃核承氣湯ヲ主用スレハヨシ最其痛心下ニ
在テ心ヲ冲ク勢ナトアレハ延胡索ナト用少腹
ニ在テ凝結甚シキモノハ牡丹皮ヲ用此ニ承ニ
伍シテ材用相類スル野ノ藥味ヲ用ヘキナリ桃
仁劑ヲ與テ止サケモノ當敵劑ノ主ル野ナリ然
レ氏當敵ヲ用ヘキモノハ甚少シ故ニヨリヨク
症ニメ疑似ヲ辨セサレハアヤマリ易ナリ

臍下痛

腹痛臍下ニ在テノ最多シ凡瘀血ノ凝滯シテ臍
下ニアルモノニハヤハリ氣ヲ交ルヲ以テ常ニ心
下ニ於テ事ヲナシ或痞靱或サシコミ心下ト相
連テワカラナス故ニコレヲ腹痛病ニトクナリ
此ニ臍下ヲ按スレハ堅硬ニメ石ノ如ク或ハ龜
甲ノ如ク多ハ臍ノ左方シク所ニアリ又直ニ臍
下ニ在テ按スルニモ痛ニ按セサレ氏痛ト云何
レ年ヲ歷テ治セヌ此子宮中ニ頑硬腫坐シタル
ナリ若帶下ヲトヒ惡臭ヲカヌルモノハ子宮癌

瘡ヲ生シタルナリ速ニ其實体ヲ察スヘシ

臍下痛治法

子宮ニ頑破腫ヲ生シタルモノハ處ヲ移サスシ
テ痛疼メ止ズ唯按スレハ血方ニヒビキ兩脇下
ナトニモ痛ムヤウニ覺ユルモノナリコレヲ治
スルハ下部解毒劑ヲ主用シテ剛地丸ヲ兼與フ
ヘシ若惡臭帶下ヲ兼タル瘰癧アルモノハ甚治
シカタシヤハリ前法ニ從テ頗ル至剛劑ヲ与ヘ
且スボイトニテ子宮内ヲ洗ヒ坐藥ナトヲ施ス
ヘシ洗ヒハ石灰水ニ猛赤ナト少シツ、加入シテ

用ルキヨシ能實體ヲ知テ療スレハ頑結ノモノ
ト蚤氏治セサレトシ然レ氏容易ニハ治セサ
ルモノト知ルヘシ

急痛

心腹急痛ハ卒然トメ祭スルモノ多シ間十五六
歳ノ女子ニテ天癸未タ至ラスト思ハル、モノ
ニ此症祭スルトアリ故ニ世医多ハ癖疾ナトノ
心得ニテ其藥ヲ用ルトアリ然レ氏多クハ治セ
スシテ手ヲ束テ余ニ乞モノ屢ナリ全熟レテコ
レヲ考ルニ實ニ瘀血ノ心ヲツクナリ其十五六

歳ニ多クハ月經マサニ通セシトシテ未タ通セ
ス故ニ辛ヲ好ナトアリテ急痛ヲ祭スナリ全体
急痛ハ大夕劇症ニメ可畏ノ勢アリ中中苦カ不
可及カ如ク大レ氏ヨク其實体ヲ得レハ治スル
ニ難カラス

急痛治法

予此症ノ叫號苦楚不堪シテキリキリマヒアリ
クモノヲ見ルト數人ニ及ヘリ必ニ三日又四五
日ノ中自治シテ後又時ニ祭スルニ當テハ諸藥
無カ故不可治ヤウニ兼テ思ヒ居タリ一時考案

シテ一方ヲ作ル

延胡索

五靈脂

硝石

谷朮石

大黃

右五味ヲ丸トシ用タルニ甚タ著シキ功アリ
ソレヨリ後此丸ヲ長服セシメテ遂ニ根治ス
後玉江氏此病ヲ治セシラキクニ桂枝五靈脂
大黃等ヲ用テ治スト云ヘリ然レハ同手段ナ
リ

每經腹痛

凡病古昔ヨリ今ニカハラス同クアルモノナリ
古ナクシテ今アルアリ古有テ今ナキアリ漢土
恭西ナトニアリテ我邦ニナキアリ本邦ニアリ
テ異邦ニナキアリ故病門ヲ立ルモ其他共時ニ
隨テ攀ルナキハ必シモ一樣ナラサルナリ經水
ノメクル毎ニ腹痛スルモノ人ニヨリテ大患ト
ナルアリ少シツ、痛ハ人毎ニアルモノナリ
甚ニ至テハ臥シテ床ニツカサケテ得ス又一
日臥メヌムコアリ二日三日ニ及シテハ起ルコ
ヲ得ス又其痛甚者ハ疾病トナシ療セスシハア

ルハカラス然レ氏漢土ノ方書ニ其病門ヲ見サ
ルナリ

○此腹痛ハ子宮口ノ緊縮セルヲ以テ其將ニ漏
出セントスルニ當テタヤスタ崗クヲ得スメ
痛ヲナスナリト思ハルレ氏其痛モノニ就テ其
腹ヲ按シ詳ニ考ルニ必シモ宮口トモ見ヘスイ
ツレニモセヨ血既ニ満テ漏出セントスルニ臨
テ痛ヲナスモノハ其處ノ脉管ニ緊縮メ速ニ閉
ケサルノ故ニ違ハナレ此實體ヲ知ラスシテ瘀
血ナト、思ヒ妄ニ破血ノ劑ナト用ルモ一モ効

アルナシ

毎經腹痛治法

此病患予屢試ヲ興レ氏効ヲ得ス故ニ治療ニ心
ヲ用ル人ニ過毎ニ必談此ニ及トモ未タ嘗テコ
レヲ得タリト云人ヲ見ス唯南都ノ人井ノ坊ナ
ルモノ此妙方ヲ得タリ人多ク其効アルヲ知リ
求メ来ルモノアリト云其方ヲ語ラサリキ其後
豫列ノ人今井柳庵此患ノ難救ヲ以テ問テコレ
ヲカタリケルカソレカ為ニ勞ラ厭ハス南都ニ
ユキ井ノ坊ニ逢テ之ヲ乞ケリ井ノ坊其志ノ篤

ヲ感シテ其方ヲ傳フ今此ニ記セヌ此ニ一法効
アリトテ人ノ傳ル所アリコレヲ後ニ載ス○山
田大圓江ヲニ在日此ノ病患ノコトヲ山田隆長ニ
カタレ隆長ハ官医ニシテ志篤キ人ナリ唯此一
方大ニ効アリトヲ殊ニ貴長スト云其方當取大
遠志中上品沈香中以上ノ三葉平素煮茶ノ如キ
大サトナシ水煮モ亦常ノ如ニシテ與ルニ二貼
ニシテ必愈但沈香ハ至テ上品ノモノヲ擇ハサ
レハ効ナシト云ヘリ別ニ一法ト上ニ云シハ桂
苓加大黃湯ヲ喫テ左ノ茶ヲカヌルナリ

梅核氣

綿實

各黑燒トシ等分爲

右ノ散茶ヲカ子ルナリ

梅核氣

咽間ニ灸臍内ノアルカ如キ覺テ嚥トモ下ラス
略トモ出サルモノヲ梅核氣ト名ツクルナリ此
病男子ニモアレ氏婦人殊ニ多シ故ニ古人モ婦
人雜病中ニ舉タリ從來疼飲ノ事トシ又血氣ノ
留滯スルナリトス其治法ニテ治シタルナレハ
小モアルハシ世年来其治法ニテ治スルモノ一人
モナシ因テ刻苦シテ治法ヲ考遂ニヨクコレヲ

治スルヲ得タリ蓋其病ハ一ナレ氏當今所有
ノモノハ毒自ラ深キナリ此ハ此病ニカキラス
スヘテ異ナル所アリ○此病單ニ患ルモノアリ
又腹痛下利ナト久シク不止羸瘦シテ虚勞状ノ
如ニナリ寒熱ナトアリテ古上糜爛シテ飲食ヲ
妨ルナト云病患ニ此症ヲカ子患ルモノアリ又
尋常子宮等急病ニ此症ヲ兼患ルモノアリ何
レモ同根ヨリ生スルヲ考ヘシ

梅核氣治法

此病症世医皆半夏厚朴湯ノ主治スル所トシテ

思ヒ考ルモノナシ故ニ此病ヲ見ルコトニ此方
ヲ用レ氏其方効ナキトキハイツニテモ手ヲ束
ヌルノミニテイカシスルヲアタハス南涯先
生ハ云其中ノ一種ニテ半夏厚朴湯ニテ治スル
モノアリト云ヘリ然氏此等ハ古来所有ノモノ
ニ就テ考ヘシ當今効ヲ得ルモノニアラス○花
岡伯行此病ニ逢テシバ苦ミ沈香天麻湯ヲ
ソ用テ効ヲ得ルヲ云ヘリ此ハ子宮等急病ヲ
モノニシテ當今ノ病ノ治スルノ劑ニ非ルナリ
凡世医ノ此病ニ効アリト云モノハ大率此類ナ

リ予カ此病ヲ療スルニ刻苦久シク年月ヲ経テ
終ニ禁方ヲ得ルヲ得タリ禁方ハ即紫微垣
リ前症ノ方ヲ兼テ此禁方ヲ用レハイツレノモ
ノニモ効アリ

血塊病

婦人一タニ産シテ後ハ血塊アルモノ多シ此ハ
分娩後産帶ヲ緊シクシテ瘀血ヲシテ去ラズシ
テ凝結セシムルヲ以ナリ然レモ經産ニ非スミ
テモトヨリ經血不行凝滯シテ塊トナクモノモ
ヤ、コレアリ久シク凝リテ堅ヲ癥瘕ト稱ス即

桂枝茯苓丸ヲ條ニ出ツ全按スルニ血ヲ堅リ凝
結スルヲ徒ニ不行ノミニ非ス必微毒ノ粘稠根
基トナリ經血ヲメ凝滯セシムルヨリ遂ニ堅塊
トナルナリ

○血塊病イロイロアリ腹痛甚シク或吐逆ナト
ヲカフルモノモアリ或ハ寒熱ヲ發シ羸瘦シテ
虚勞ノ如クナルモアリ

○血塊ノ小腹ニ在モノハヨクヨク審諦セスシ
ハアレハカラス小腹ハ子藏ノ在ル所ナリ子藏
中ニ毒アリ結聚為瘡者イロイロアリ及外ヨリ

コレヲ按スレハ堅塊ナシニ大ニ医ラシテ鑿ラ
失ハシムルナリコレヲ分辦スルノ法血塊ハ動
ク故ニ處ヲ移スナリ子藏ノ頑硬腫ハ處ヲ移サ
サレナリ又其中ニハ小塊カ三モアリト見エラ
血塊ニアリ頑硬腫ノ一ツアルモアリ此等ノモ
ノニ至テハ別テ分辦シカタシヨクヨク詳ニセ
スンハアルヘカラス

血塊治法

凡血塊ノ頑硬一ルモハ茶力決シテ不及モノ
ナリトオモヘリ然ルニ近年逐血ノ劑ヲ長服シ

人字丸方

午膝大黃

カラムロ

右糊丸

剛人丸

消石大圓
カラムロヲ加

テ大塊ノ消盡セルモノニ三人ニ及ヘリ最桂枝
茯苓湯ナトニ迄消ナト加テ服セシメ兼テ人字
丸ヲ逐血ノ加味ナトシ又大圓所謂夾ナトヲ用
ユ此ニ余力新考ニテ効ヲ得ルハ剛人丸ヲ用又
他ノ剛劑丸茶ニテモ兼用スル丁シカケノ如ク
ニシテ長服セシムレハ必効アリ
○又頑固ナル血塊トテモ藥力不及トテ術ヲ
以テ下スナリ往年賀川子玄子ノ子有齋構思
シテコレヲトリ出セリ此ハ患婦ニ努力セシメ
産ノ如クニシテ出セシト云山田氏一術アルヲ

余ニ傳フ近來東方ノ人ニ此手術ヲ得タリト云
アリ彼此聞合テ考ルトキハオノツカラエ夫ノ
生スルモノナリ兒ニ角カヤウノ手術カ構思ノ
長短ニテオノツカラエ妙術モ出ヘキナリ

崩漏

崩漏ノ名ハ血クツル、カ如クニ漏泄スルノ稱
ナリ此ニ二種アリ一ハ卒然トシテ血流出シ夥
シク下ルナリ是實ニ其名ニカナヘリ一ハ徑水
ノ七日ニテ可止モノカ二十日モ三十日モ不止
遂ニハ長ク半年一年ニモ及モノナリ此ハ崩漏

ノ名ニハカナハサレ凡古來コレヲモ崩漏ニアハセ
入レタリサテ此ニ一ノ怪ムヘキナリ右ノ卒
然トシテ滝ノ如クニ多ク下ルハ崩漏ノ正症ニ
シテ常ノ徑水ノ日長ク出ルハ崩漏ニハアラ
サレ凡其類症ニシテ多ク出ルカ少シク出ルカ
卒然トメ來ルカ徐徐ニ來ルマテノ異ナリト云
ハ崩漏中ニ并セ稱スヘキニ似タレ凡畢竟ハ
大ナルチカト年長ク下ル方ハ別ニ各月ヲ設
クヘキニ從來此方專ラ崩漏ト稱シテコレヲ帶下
ニ併セ稱ハ崩漏帶下ト連稱スルヲ常トナリ方

書ニ多ク一門トシテ治方相兼ルヤウニ心得タリ
常下ハ白物ノ汚物下ルモノニテ血ノ長ク出ル
トハ又異ナレ氏世医ノ意ニ長ク出ル所ノ血
カ変シテ白色トナレハ帯下ニテ未変セシテ血
ノマ、下ルカ崩漏ナリ心得タルヨリ一病ト
思定メテカク連稱シ又治法モ相カヌルヤウニ
思ヘルナリ此異邦ノミニアラス本邦俗古ヨリ
シテチナカチト連稱メ治法ハ皆合一ニセリシラ
チハ帯下ヲ稱スナガチハ崩漏ナリ此ヲ合一
ニスル一今ニ至テ風俗トナレリ我邦ハスヘテ

物毎ニ麁ナルユヘニカ、ルヲモアルヘケレ氏
異邦ノ精微ナル瓜俗ニテ合一ニナスハイカナ
ル一ニヤ元来上ニ云如ク卒然トシテ大ニ下ル
モノハ崩漏ノ名ニヨクカナニ崩下ハ崩血トモ
稱スヘシ此一種ノ急病ニシテ別ニ講セスハ
アルヘカラサルモノナリ又俗ニチカチト稱シ
テ經水止マス長ク日ヲ經ルモノハ又一種ノ病
ニシテ此ヲ崩漏トハナツケカタニ別ニ名稱ナ
クシハアルヘカラス然レ氏異邦ノ書ニイタマ
タ其名稱ヲ見アタラス故ニ姑ク假稱シテ漏血ト

ナツケ之ヲ公テ病門ヲニツニシ治法ヲモ別ナ
シ傳洽ノ君子其稱呼ヲ正シテ其非ヲ辨セシ
シ鹿幾ス

○卒然トシテ崩ル、カ如ク漏出スルモノ産後
ニ最多シ平素ニハアマリナシ然レ氏タママ
アリ予カ却トキ洗濯ヲナス家ノ婦崩血ヲ告来
リ中夜ニ大人ノ走リユキ救ヒシトアリ又予カ
紀別梁原ニ客居セシヨロ其地ノ野上屋カ右エ
門ナルモノ、妻正月中旬卒然トメ崩漏不止ヲ
救治マシトアリ此等ハ皆産後ニ非ス卒然トシ



テ崩漏スルナリ詳ニコレヲ案スルニカク卒然
トメ漏出スルモノハヤハリ平素經水滞リ毎月
常例ノ通りニ出ツヘキモノカ少シツ、ノフル
カ又ハ全ク止リテ通ヤス宿滞スルヲ數月ニ及
フ暴ニモレ出ルナリ然レハ漏出スルヲ自ラ以テ
病トナスハ既ニカソレ經血宿滞スルハ既ニ此
疾ヲ釀成スルナリ但産後ノ崩漏ハ此ト別ニス
今此ニハ産後ニ非ス平素ニ有ノモノヲ以テ云
崩漏治法
元来常度ヲ失テ宿滞セル所ノ血カ一時ニ下ル

症ナレハ他ニ治法ハナシ唯宿滯ヲ逐ニ下スニ
在ノミ世医目前ニ血ノ多クモルハニ眩シテ唯
収瀉ノ劑ヲ用シテ欲ス此大ナル誤ナリ何ホ
ト多ク歳ヲモ皆出ヘキ血ノ滯リタルナレハ逐
ク出スヨリ外ナシ又タマタマニ出シヘカラサ
ル血ノ出ルコトアルヘケレバツツレモ内ニ宿汚
シテ血ノコリ存シテソレカ害ヲナスヲ以テ漏
血不止モノナル故ニヤハリ其宿汚ノ血ヲ下サ
サレハ治セサルナリ予カ江戸堀ニアリシコロ
家事ヲ任シラキタル婦人暴漏ナリシカアマリニ



影シク下テ時ヲ移セテ不止故ニ予モ心臆シテ
中夜山内生ヲ招キ謀レルニ山内考察シテ曰ヨ
クヨク實體ヲラシハカレニ唯桃仁承氣湯ヲ用
ルヨリ外ナシトソレヨリ意ヲ決シテ用タルニ
果シテ治シタリ其甚シキニ當リテハ予モ眩惑
セシコトアリ世医ノマトヒルモ亦宜シカラスマヤ
予カ幼時ニ大人ノ崩漏ヲ治セラレタルハ補中
益氣湯ヲ主用シ人參ヲ多ク用タリト語ラレタ
リ其ヨル処ハ血脱ニ氣ヲ補ハ古聖人ノ法ナリ
ト云語ニモトツキタリ果シテ立野ニ効ヲ得タ

リト云へリ此語ハ医療手引草ニハ内經ニ出ル
ヤウニ云タレ凡内經中ニハ見アタラス此ハ龔
廷賢カ萬金一統述ニ出タリ語ナリ然レ凡常ニ
人人唱レ故古昔書中ニアルヘシト思ナリ又一
種如此ニ脱血ニ他菜ヲ用ヒス唯廣東人參ヲ獨
煎ニメ用ルカヨシト云治驗若干アリ此亦右ノ
血ヲヲキ氣ノ補フノ言ニ符合スルヤウナリ又
一説ニ廣東人參ト稱スルモノハ實ハ三七根ニ
シテ血菜ナリ故ニ金創トトニ銚ニ或カミラツ
クレハ血ヲ止ル功アリテ崩漏ニヨク効ヲナス

モ血ヲトムルナリト此説モ尤ナルヤウナレ凡
廣東人參ノ功ヲ爭ヒ論スルニ及ハ又唯其病ノ
實體ヲ考ルニ宿汚ノ血暴卒ニ漏脱スルニテカ
ヒナシ然レ凡速ニ出盡スト稍ノコリテ下リ盡
サルトアリコレヲ治スルノ要ハ其汚滯々ケヲ
下リ盡サシムルニアルノニ彼補中益氣ヲ用ヒ
又人參單方ヲ與ルノ羨ハ血ニカマハ又唯病婦
ノ氣カヲ脱セサラシメンコトヲ要スルナリ病婦
シカトシテ居シハ其間ニ宿汚ノ血モ下リ盡レ
トキハ全治スルナリ故ニ正法治ニテハ逐療ノ

劑ヲ用ルニアリ変法ニ至テハイロイロアリハ
シ又其人モトヨリ氣力衰脱シテ一時ニ血脱ニ
去ルヲ甚危キニ似タルモノハ急ニ収潘ノ劑ヲ
與テ暫ク止メ徐ニ下シサルヲモアルヘシ際
シテ下スヘカラサレナリ

漏血

此ハ畢竟經水ノ常度ニ從ハスイツマテモ長ク
下ルナリ但シ是モイロイロアリタトハ常度
三四日カ五六日ニテ止ルカ十日モ十五日モア
ルト云是ハ一症ナリ如此ニシテ一月中ニ兩度見

ルヲモアリ又五七十日モ不止ナリ又一年ニ
年モ不止モアリ人不止モノハ面身色痿黃ニメ
頭痛短氣ニ耳鳴リ胸動アリテ行歩ヲ苦ニ動作
ニ懶ク或脚足ニ微シク浮腫ヲ生ス一二月ノモ
ノハカクノ如クナルニ至ラス然レモヤ、其キ
サシヲ見ルニ至ル^大如此常度ヲ失ハ畢竟大便
ノ下利スル如ク三種ノ毒アリテシカラシムル
ナリ大便ノ下利スルハ秘閉スルト相及スレモ
畢竟其原カ一ナリ經血ノ不止モ閉止セント相
及スレモ其原ハ一ニメ同毒ナリト知ルヘシ故ニ

其毒ヲ去リ其原ヲ正ストキハ漏血自ラ止ムハ
シ出ル所ノ血ノ多少遠近ノ別アリト蚕氏コレ
ニ拘ハルナカレ世医唯此漏泄ヲ恐ルハ其
故ニ常ニ治ヲ失ナリ
歲月積テ不止諸薬功ヲ見サルモノ探宮シ見ル
ニ宮口破裂レテ結合セズ蓋其人結毒アリテレ
カルナリ山田氏カタレリ是モツトモ然ルヘキ
ナリ久不止モノハ必結毒アルヘシ宮口腐敗
シテ守ヲ失ナラ淋漏ノ如クナルモノアルヘ
キナリ○漏血ト名ケタルハ予カ假稱ナリ古

今此病ニ名ケ命シタルヲ見サルカ故ニ姑クコ
レテ假稱スルノミ本邦ノ俗コシラナガ血ト云
ハ甚當レリ然レ氏シラテト混一ニメ一薬ヲ以
テ治セント云ハ未タ當レリトセズ異邦ノ人漫
ニ崩漏ト稱シテ帶下ト合一ニスルニ至テハ危
漏ノ甚ト云ツヘシ

○漏血日久シキモノハ黃胖病ト形容ヲ同ス黃胖
病モ亦マ、大便ニ血ヲ下スモノアリ其毒同キ
カ考究スヘキナリ○漏血ノ久ラ経テ不止者
予初メハ唯ヲモヘテノ卅全汚滯ノ血アリテ根

トナレルカ又ハ有毒ヲ血凝滯メ原トナレルカ故ニ
常度ニ從ラ止ルヲアタハサルナリ故ニ之ヲ逐
下セハ必治スト此見ヲ定メテ難治ノモノヲ救
クシテモアレ氏マハ治セサルアリ河東富永可
阿合婦人金ナリ
其不治ヲ考ルニヤハリ結毒根トナレルナリ若小
腹ヲ按シメ凝結如血結モノアリテ手ニ觸ルレ
ハ痛ト云モノナトハ明ニ子宮結毒ナリ其人漏
血アラハ速ニ其治ヲ施スヘシ他ヲ顧ルヲナカ
レ○漏血不止シテ久シク苦々モノ世上ニマ
アリト云々既ニテ治シカタシトナシテ高閣ニ

サシオクナリ以差別ヲ明ニセハ盡ク治スルヲ
ヲ得ヘシ

漏血治法

一通リノ治ハ逐カヨシ然ルニ唯血ノ瘀滯セル
ノミナレハ桃仁承氣ヤ大黃牡丹皮湯ニテ逐テ
ヨシ熱ノ有毎ヲ以テ
ニ方ヲツカサ結毒ニヨク結聚スルモノハ
剛劑ヲ兼用セサレハ毒去ラサルカ故ニ治スル
ナシ又帶下毒根因トナルモノハ其毒ヲ去ニ
心ヲ用ヘシ帶下毒ヨリ柔々モノハ頭ニ油風多
キカ面色赤クシテノホセルト云フヲ苦勞ムカ

又下ル所ノ血ニ白物マシルカ臭気アルノ羨ナ
リ但臭気ハ結毒家ニモアル故ニ一概ニ決セラ
レ又イツレモ其毒ヲ本據トシテ逐除ヲ策トナ
スハキナリ

○漏血久シテ子宮ノ口ユルクシテシマリナク
ナリテ期ニ至ル氏不止者アリ此ハ收瀉ノ劑ヲ
ナスヲアルヘシ然レ氏此症甚タ辨モカクニ探
宮ニテモマサレハ明ニ定メカクニ然ルニ世医
漏血ノ人ニ逢ハハ一際ニ收瀉閉止ノ劑ヲ用ル
ハ何ソヤ○治ヲ施スウチニ逐陰ノ策行ハスシ

テマ、收瀉ノ策ヲ交ヘ施サスンハアルヘカラ
サルコアリ故ニ收瀉劑ヲ全ク瘵シテ全ク用ユ
ルニ足ラスト定ムルコハナラサルナリ此事ハ
予嘗テ論スルコニテ平素講明スヘキコナリ

帯下

帯下ハ米泔汁ノ如クナルモノ時々前陰ヨリ下
ルナリ是ニ二種アリ臭気ナキハ常ノ帯下ナリ
臭気アルハ梅毒ナリ常ノ帯下ハ男子ノ真淋疾
トハ異ナリ、真淋疾ハ痛アリテ少腹艱澁ヲ苦ム
婦人帯下ハ小便ニ変ナク疼痛モナシ然レ氏其

痛ヲナス 呀祖同シ 梅毒帶下ハ 男子梅毒ノ 淋疾
ニ 全ク同シ 此ハ 微黄色或淡綠色ノ 粘稠ナクモ
ノ 十ト時ニヨリ 交リ出ツ 臭氣ツヨク 陰門ノ 辺
腐爛スルコトモアリ 但常ノ 帶下ニモ 粘稠ナル
モアリテ 稀粘ヲ以テ 梅毒カ 梅毒ニアラヌヤ 否
ナルヲ 辨別スルコトハ 難キ又ナリ 凡 梅毒ト 定リ
タルハ 別ニ 思フ 勞スルニ 足ラス 唯常ノ 帶下ハ
治シカタクキコト 医ヨク 知ル 呀ナリヨクヨク 心ヲ用
サレハ 治スルコトカタクシサテ 又 眞淋ニテモ 梅毒
テモ 婦人コレヲ 患サルニ 非ス 隨分 淋ヲヤムコト

アリ然レモ 男子ニ 比シテハ 甚少シ 然ハ 毎月 經
水通スルヲ以テ 汚穢ノモノ 從テ 去ルヲ以テノ
故ト 見ヘタリ 淋ハ 別ニ 論スヘシ 帶下ハ 相似タ
レモ 小水ト 道異ナルヲ以テ 病別ナリ 然レモ 其
二種アルノ 別ハ 淋ノ 二種アルト 全ク 相同ヲ以
テ 考究スヘキナリ

帶下ノ 治法

此病ヲ 療スルニ 從來 收斂ノ 劑ヲ 用甚怪ハヘキ
ナリ 又 後世ノ 医流ニテハ 加減ハ 物湯ト云方
ヲ 主用ス 古医方ハ 土瓜根 散ナリ イツレモ 試 用

スルニ全効ヲ得ルヲナシ此唯男子ノ真淋疾ニ
モトツキテ治法ヲ考究セハ自ラ得ルヲ了レハ
シ今予カ試ル所ニテハ坐茶ヲ主用シ或ハ洗茶
ヲ制シテ時時子宮内外ヲ洗ヲヨシトス然レハ
此痛モ亦其根原必毒アリ其毒ヲ除去セシハ
治セサル理ナリ坐茶ヲ用ルハ外治ニテ唯坐茶
カヲ輔翼スルマテナリ真淋疾ハ湯液ノミニテ
治スルカ故ニ帶下モ亦湯液ノミニテ治スハシ
トハ謂ヘカラス予カ所見ノ下四五ノ幼女ヨリ
帶下ノ甚シキモノヲ見ケ又成長ノ婦女ニテハ

此病最多シイツレモ淋疾ノ如クニ暫時ニハヤ
マス多ハ歳ヲ経テ治マス○此病治シカタクヲ以
テ世医ノ所為ヲ見ルニ一モ治ヲ得ルモノナシ
因テ普ク考ルニ未タ適當ノ治法ヲ得ス元来其
原毒イカナルニヤタシカニ論シタル人ナシ予
思慮ヲ勞スルヲ以テ見聞スル所ノ説ヲ擧テ帶
下考一卷ヲ録ス常ノ帶下ニ臭気ナリ梅毒ニ臭
気アルヲ以テ見レハ帶下ノ毒ハ梅毒ト別ナル
ヲ自ラ分明ナリ

淋疾

世俗通々婦女ノ淋疾ヲ消渴ト稱ス此ハ淋ト云
名ヲ諱テ稱ラカハタルナリヤハリ淋ニ二種ア
ル一男子ト相同メ真淋ト梅淋トナリ其中婦人
ハ真淋多ク梅淋少シ男子ハ真淋少ク梅淋多シ
此ハ婦女月經ヲ以テ陰門中ノ毒ヲ洗ヒ去ルト
見ユ二種ノ別ハ真淋ハ小便スルニ溺道疼痛甚
シクナクニ通シ去リ難ク以テ常ニノズルカ故
ニ屢小便ニ臨ナリ此不得已又頻數ナルナリ白
色ノ粘物膿ノ如キモノ又出ル一常淋ニモナリ
此ヲ以テ梅淋ト定ムル一ハナシカク又血ヲ交

下スル一モナリ血ヲ帯ルモノハ痛殊ニ甚シ○
凡真淋ハ治シ易クシテ久ク経ルモノニアラス
治法當レハ不日ニ治ス是男子ニテモ相同ナリ
又數年ヲ経テ治セサルカ又ハサホドニ年ヲ経
サレ氏久シク治セスト云々ハ皆結毒ニ因ルモノ
ニテ決シテ真ノ淋疾ニ非ス真淋ノ原ハ血中ニ
毒アリテ血リレヨリ凝澁シ尿道ノ害ヲナス一
ト見ヘタリ此ハ男子モ相同シトカク此ニ論ス
ル所ハ真淋カ肝要ナリ梅毒ニ因レルモノハ梅
毒ノ治法ヲ用レハ悉ク治ス何ホト歷年ノ頑淋

ニテモ思フ勞スルニ足ラサルナリ

淋疾治法

婦女常ノ淋疾ハ八味丸料ニテ必効アリ其腹ヲ
診スルニ心下スキテ腹中塊アルカ如クニシテ
動悸高ク或ハ小腹微滿シ或ハ腰間ニヒキ痛ム
ト云モノ皆此方ノ症ナリ又胸動ツヨク心胸ニ
聚ル狀ナルモノハ柴胡姜朮湯ヨリ應ス常淋ハ
大抵此ニ方ニテ治スルナリ若シ治シカヌルモ
ノニハ夾鐘圓ヲカ子喫テ桂ナリ梅核ニハ頑固
ニシテ治セサルモノ多クアレ氏是ハ其治法ニ

テヨシ但シ常ノ淋ト見ヘテ諸薬功ナク頑固ナ
ルモノハヤハリ此治法ニウツシテ佳ナリ紀列

響

言詔又歩響マテモ前張ニヒキテ號哭スルホ
トノ痛ナリシカ諸医皆予ヲ束手タケテ芳野下
市ノ福嶋宗範翁治セラレタリ其治テ問シニ化
毒丸ニテ効ヲ得タリト予ニ詔レリ此真淋ノ頑
結ナルモノナレト此治法ニテ其概畧ヲ知ル
シ同所近旁ニ小原田村ト云地アリ此ニ善産門
ト云人ノ妻三年ノ間淋疾ニテ治スルナリ予

モ此ヲ療シテカラ盡セシ故ニ其艱難ヲ知ヤ
リ常ノ淋ニテ血分ニカ、ルリ故ニ大黃牡丹皮
湯ノ灸ハモトヨリ種々血茶ヲ用テ効ナカリキ
モトヨリ他医ノ茶モイロイロ用タレ氏寸効ナ
シ其後若山ニ往キ医ニ乞タルニ茶ヲ喫ヘラレ
其茶ヲ腹シテ終ニ治スル下ヲ得タリ然氏予ハ
コレヲ偶然ノトナシテ敢テ其茶カラ請ヒ求
ノモセスシテ抄過又其右浪華ニ出テ業ヲ閑ケ
ルニ伏見兩替町ニ綿屋喜兵衛ト云人アリ其人
ノ妻淋疾ニテ疼痛空テハケシク實ニ須臾モ不

可忍此人初メ血脹ヲヤミ予茶ヲ喫テ粗治シ其
後フト淋テヤミタルナリ故ニ血分ニ屬スル下
最明ナリ故ニ其治ヲ施シカラ盡セ氏寸効ナキ
ヲ以テフトカノ小原田村ノ下ヲ思ヒ出シタル
ニ日夜復更モ不可忍未トナル故ニ紀列ノ幸使
ヲ尋ヌルナト云ユルカセナル下ニハ非ス故ニ
其夫ニトキ示シテ急ニ小原田村ニユカシム其
夫諾シテ明日直ニカノ郷ニユキクハシク尋子々
ルニ彼亦仁恕ノ心ヲ以テクハシク書ツテ喫ヘ
タリシ乃其方ヲ喫ルニ乍効アリ其方ハ唐午膝

一味三棗酒ニ合テ以テ煮テ一合ヲトリ徐々ニ
服スツクレハ又ツクリ喫ルナリサキノ小原田村
ノ婦人ハ三年ノ頑淋此菜ニテサツハリ愈此
ノ綿屋喜兵衛ノ妻ハ未タ一月ニ足ラサレ凡疼
痛甚シクシテ須臾モ不_可忍モノカ作効アリキ其
後婦人ノ眞淋ニテ他藥無効ヲ治シカ子ルモノ
ヲ此方ヲ用試ルニ數効アリ至室トオスニ足レ

疼痛病

此ニ疼痛ト擧タルハ婦人ノ或ハ一臂或ハ一腳

疼痛シ或五六日又ハ十許日モ痛不止シテ免ヤ
角ヤスルウケ痛止テ常ノ如クニナリニ三月ヲ
隔ルカ又ハ半年一年モ過テ又乍癸スルアリ又
遍身疼痛シテ右ノ如ク癸作スルアリ又始終痛
ヲ不止モノアリ此等ノ癸予嘗テ大ニ其治ヲ難
ンシイロイロ手ヲツクセ凡効ヲ得ス因テ他医
ノ治ヲ施スヲ見ルニ一モ著明ノ効ヲ見ユ故ニ
一種ノ難治病ト心得ヘシ
○凡疼痛ノ甚シキハ酷厲毒ノ血中ニマシルニ
チカヒハナシ然ルニ婦人ハ血ヲ主トスル形質

故ニ瘰癧ノナリトノ心得ル故ニ治ラ得サ
ルナリ瘰癧ニテモ久ヲ経テ悪性ニシテ酷厲ナ
ルモノニ変セハ則其疼痛ヲナスノ厚トナルシ
然レ氏酷厲毒ハ梅毒アリ帯下毒アリソレラノ
毒アリ酸収ノ液ヲ生シテ良液ヲ妨害スルトキ
ハ不可堪忍ノ疼痛ヲナス故ニ此ニ目ヲツケ其
酷厲ノ毒ヲ驅除スルノ功知ヲナシサテ其液ヲ
盪滌スルトキハ必治スルヲ得ハシ徒ラニ瘰
血ヲ所為又ハ血不順ノ所為ナト心得テ其治ヲ
守ルトキハナカチカ治スルヲ得ス

疼痛治法

遍身疼痛シテ血ニ属スルモノハ當飯四逆湯主
之或ハ一臂或一脚又ハ兩臂兩脚ニテモ皆相同
シ免角婦女ノ身体疼痛ハ附子應々サレモ人ナ
リ然レ氏痛凡ノ姜又梅毒家ノ疼痛ハイカホト
又ヲ経ルモ附子ノ應スル所多シ
疼痛毒ノ別ニアリ一ハ梅毒ナリ一ハ帯下毒ナ
リ一ハ瘰癧血ノ久ヲ経テ変シタルモノナリ三ノ
モノニテ酷厲苛悪ニ変スル故ニ各其毒ヲ考究
シテ驅除ノ劑ヲ用兼テ湯液ニ奇良劑ノ如キ良

血ニ復セシムルハ久シニ治ス
トテ得ルナリ
紀列ノ原田村ノ丈助ト云モ
婦ニ遍身疼痛人人治セズ
リテ癸シテハ不可忍ナリ予
イロイロスレバ効ナカリシ
石ノ末一味ヲ長服セヨト
テ効ナリ余後予此方ノ効ヲ
者ニ誠ニ用ルニ數効ヲ得タリ

血風瘡

婦人一月ニ一度カニケ月ニ一度暴ニ大熱ヲ癸
シテヤ、サメントスルトキ一身ニ赤色ノ小疹
ヲ癸スルモノアリ或ハヤ、大ナルヲ癸スルア
リ又紫色ヲ帯ヒ班文ノ如キ癸スルアリイツレ
モ少ク痒ミアリソレカ茶ヲ用スト虫トニ三日
ノ中ニハ消シテ見ヘスナリサレバ其癸スル
トキハ憎寒癸熱頭痛如割モノモアリ又吐逆甚
シクシテ飲食下ラサルモノモアリ効ニ按スル
ニ此病全ク帯下毒ヨリ癸スルモノナルト分明
ナリ然レバ別ニ名ツクル所ヲ見サル故ニ血風

瘡ノ名ヲカリテ此稱トナスナリ

血爪治法

此病世医多ク平血飲ト云方ヲ用其方ハ人參敗
毒散ニ四物湯ヲ合セシ方ナリ何ニモセヨ荊芥
防瓜ノ莢ヲ多ク用テ皮膚中ノ毒ヲカリ去リ惡
血ヲヌヌシメテ良血トナルノ治ヲ施スヘシ○
初メ葛根湯ヲ主用シ其他ノ湯液ハ症ニ隨テ用
レ氏帶下毒ヲ去ル禁方ヲ兼用スヘシ然ラサレ
ハ決シテ根治スルコトナシ

乳病

乳病種種アリ産後乳汁ノ少モ疾病中ナリ乳瘍
ノ莢ニテハ乳癰アリ腫瘍ヲキ膿ヲ醸スルモノ
ハ通メ乳癰ト稱ス余嘗テ癰ハ一種ノモノニテ
瘡癤疔疽ト別ナレ故ニ此等ノ莢ヲ生スルトキ
ハイカニ名ツクルヤト疑テ生セシコトアリ今考
ルニ乳癰ハ凡乳房ニ腫瘍ヲ生シタルモノ、通
名トナシテ可ナリ乳岩ハ他ノ瘡瘍ノ莢ト別ナ
リ紅毛ニテキリールゲズルエルト稱スキリイル
ノ癰テ腫タルモノナリ故ニ膿潰スルコトナシ此
一種ノ艱物ナリ又乳房ニ結核ヲ生シ其物一ナ

ラス累累トメイクツモテキルコトアリ其初メ一
核ヲ生シタルハ乳岩ノ初登ト混シ易シヨクヨ
ク察セスシハアルハカラス乳核ハ消シ易シ乳
岩ハ消シカク又一種乳房ニ潰瘍ヲ生シ日ヲ
経テ後漏状ニナリ或ハ環姑串ノ如クナルモノ
ナリ假リニ乳漏ト稱ス痔漏ノ義ヲ取テ名ツク
ルナリ

乳病治法

乳汁通スルニ婦人乳汁凝リテ乳房カクキ塊ノ
如クナルトキハ乍惡寒發熱ヲ發スコレヲチカ

ゼト稱スイヌコガセノ如ク血中ニ凝滯スル処
アレバ必憎寒發熱スルモノナリ此症葛根湯ノ
所在ニテ容易ニ治ス但其凝結日ヲ経テ散セサ
レハ必腫瘍トナル瘍トナレハ必膿潰ス是乳癌
アリ疼痛強キハ葛根加朮附湯ヲ與ヘシ既ニ膿
潰セハ速ニ葛根加朮更大黃湯ヲ與ヘシサテ破
潰シテ後日久シクオサマラス膿汁出テ不止ト
キハ更ニヨク之ヲ診セヨ膿汁稀クシテ脈微數
ニナルモノハ精力乏シクシテ瘡口ニ膿ヲオシ
出スノカナキ故ニ身体中ノ諸血液ニ膿汁散漫

メ壞液トナラシトスルナリ此症ヤハリ葛根加
桔梗大黃湯ヲ喫ヘ伯列散ヲ兼用スヘシ又膿粘
稠ニシテ臭氣アリテ久シクオサマラサルモノハ
湯茶同方ニテ剛天丸ヲ兼子喫ヘシ此法ニテ治
セサルモノナシ葛根加言更午房子湯ヲ用○乳汁
少キモノハ必ニ医ニ通乳ノ薬ヲ求ルモノアリ
乳汁少モノナラス其腹ヲ按スルニ必下痞鞭ニ
テ腹内瘀血アルモノ多クハ食少シ桃仁承氣湯
ナトラ喫テ瘀血ヲサラサレハ食進マサル故ニ
乳汁マスナシ又形体羸瘦ニテ脉微細ニナリ

乳汁ウスクシテ漸ヤクホワルモノハ精気衰弱
スルナリ此必其故アルヘシ朋ニ瘀血ノ徵ヲ見
スンハ必他故アルナリ必矣此ハ幾次モ詳審ニ診
察シテ其實体ヲ得テ而後ニ療スヘシ世ニ通乳
ノ方多クレ其其實体ヲ詳ニセサルトキハ何ニ
由テ功ヲ得ンヤ然レ通乳ノ方モ亦屢人ノ乞モ
ノ故ニ効方ヲ左ニ擧ク

粳米 糯米 谷中 蒿苳 木ノ大 耳中 大
右四味水煎如他薬腹之此方ハ外臺ニ出福升
氏ノ所試得効也予亦試テ効ヲ得タリ

又穿山甲五不留行下通汁ニ効了リトテ數稱
スルヲキケリ予又一方ヲ構ヌ
括萎根大 桔梗 貝母 乾瓢 橘葉 各中
右五味ヲ常ノ菜ヲ如ク水煮シテ喫ヘシ又乾
瓢ヲ大トナシ貝母桔梗橘葉三味ヲ中トシ四
菜ヲ水ニテ煮テ別ニ生ノ括萎根ヲ薑擦子ニ
テオロシ絞テ汁ヲ得テ右湯中ニ入力キマモ
喫ルトキハ益佳ナリ此方乳房結核ノ萎スヘ
テ凝結ヲ生シテ乳汁ノ出ルヲ少キモノヲ主
治ス或散トナシ他菜ニ兼ヌルモ佳ナラシラ

ヲ服スルニ麦芽ノ煮汁ナトテ用ハ大ニ効シア
アルヘシ
凡乳ハ分挽後テクニニ乳汁堅ク凝テ疼痛不可
忍モノアリソレハ子亥子ノ揉乳ノ法ニ從フヨ
クモミ吸撞管ニテモタモノ吸フヘシ但其痛難
堪モノハ世俗ニモイロイロニスルモノアリ婦
人ノ情不可忍モノナレハ俗説ニ其菜ヲ施スモ
亦佳ナリ
○乳クビニ少ク糜爛ノ處テキテ乳ヲ咬ヘハ痛
不可忍モノアリ俗ニイキシト稱ス外科百効全

書ニ乳頭裂ト出タリ甚治シカヌルモノニテ敷
茶ライロイロスレ氏一旦ハ効アリテモ乍又生
スルナリスヘテ外教ノ茶ハ内ノ毒ヲカリサル
トアタハサルニヨリサツハリハ治セサレハツ
ナリ内ヨリ毒ヲ驅徐スレハ外ハ唯收斂ノ劑ヲ
敷ケハヨキトナリ内服ハ葛根加朮附湯ニ剛天
丸ヲ兼喫ルカヨシサテ外教ハ皆收瀉ヲ劑ヲ用
ズレ氏予ハ括蒼水ニ丹蒼ノ未至テサシ許ヲ加
ヘカキマセラ洗ハシムルニ速ニ効アリ何ホト
痛甚キモノモ此法ニ從ヘハ立所ニ効アルナリ

乳核ノ治シカタキハ乳岩ニ似タレ氏乳岩ハキ
リト腫ナレ故ニ揉テ痛ナシ痛アルハ乳ノ血
脈ニ凝結シタルモノ故ニ久シテ潰瘍ニモナル
ヘキナリ此物乳岩トハ別ナレ故ニ乳核ト稱シ
テ之ヲワカツトナリ血肉中ニ凝結メ久シク流
散セサレハ梅毒ノ粘液固着スル故ナリ汞劑ヲ
與ヘサレハ稀解スルヲ得ス○潰瘍日ヲ経テ
後漏孔ヲナシ膿汁ヤマサルモノカリニ乳漏ト
名ツク又乳房腐爛メ脇下ニ蔓衍シ臭気不可近
者ナトマ、有リ凡此類皆日久シク治セヌノ深

ク腐壞スレハ結毒ノ治ニ從テ某ノ某ヲ與レハ
治セサルモノ決シテナシ○乳岩ハ古來其治ヲ
難シシ全治ヲキクテ稀ナリ唯十六味ノ流氣飲
ト云方固守シテ長服セシメ効ヲ得ルト云テ屢
聞及此ハ後世ノ医家不得己ノ策ニ出タルト
ニテ正治ニ法ニアラスサレハ妄ニ他術ノタシ
カナラヌヲ施スヨリモマサル方ナリ近來ハ獨
嘯菴ノ説ニ當塊ヲ割去メ金創法ヲ以テ治スル
ト紅毛ノ法ノ如クニ云タルヲ岩永敬齋氏其治
法ヲ試タレタ一旦治ラ得テモ後遂ニ生ラ全セ

サルカ故ニヤ一二人ヲ試テ後ハ施サスト其門
人カタレリ花岡伯行モ岩永氏ニ瘍科ヲ學ヘル
故ニ其事ヲキタルニヤ數百人ヲ療スルニ生
ヲ得ルモノ甚稀ナリト云ヘリ予嘗テ紅毛ノ術
ハイカナルモノニヤト疑テ中井厚澤ニ問タルニ
ヘリスラハノ書中ニ載スル所ヲ乳岩ノ治法三術アリ
リテイツレモ截断スルトナリ然レハイツレハ
乳房ヲウカチ塊核ヲヌキ去ニハ非ス乳房ヲキ
リスツルトナリ然レハ予心ニ於テ甚々其説ニ
服セスイカニトナレハ乳岩治シカタキト甚シ

カ、ル難治ノモノハモト大毒アルニアラサレ
ハ生セス其毒タル心ス一處ニ凝聚スルトハ謂
カタシ蓋シ乳岩ノ物タルキリールノ毒ニヨリ
凝結スルナラ瘰癧ノ如シ故ニ累累トメ幾箇
モ小塊ノナルモノニテ一塊ヲトリサルト虫必
マタ一塊ヲ生シテ若狀トナリテ又治セサルナ
リ嵩トハ嵩窟ノ如クナル故ノ各ナリ是キリ
ルニ結聚スルモノ久ラ経ルト虫氏膿トナレ
ナク潰散スレハ唯稀水ノミ出テ疼痛ハケシク
内外ノ毒効ナリ精気日ニコレカ為メニ衰弊メ

遂ニ死ニ至ルナリ此ノキリールノ腫ヲ療スル
ニ此マテ多ク試ルニ茶効ナシカタキラ以テ茶
西ニモイロイロ考究スルナト見ヘテ唯是一病
ナリ一病ナリ腫ノミラ擧テ治法ラセシサグシタル
一書アリ其書治スヘキ茶ラニニ定ム一ハ水銀
ナリ一ハシキユ一タフリ一ハキアキアナリ虚
候アリテ衰弱スルモノハキアキアヲ用凝結シ
テ潰サレモノハ水銀ヲ用潰破シテ治セサルモ
ノハシキユ一タラ用ルナリ原法必シモカクノ好ク
ナラサレハ三葉ヲ分
テ用ル知ルホシ如
此三葉ハ甚考究シタルモノト見

エ内外共ニ用テ効アリサテキリル腫ハ瘰癧
結核鼠竅結核便毒ノナト皆同物故ニコレヲ
療シ試ルニ日久ト虽モ膿潰スルノコトアラス
膿ヲ膿スルモノハ皆血肉相因ルモノニテキリ
リルノミニ聚ルノモニアラスキリルノ結聚
ヲ散スルハ氣ヲ用ユルトキハ効ヲ得ルヲ
リト語レリ予乃チ之ヲ伯行ニ告タルニ拍行
試テ効ナシトテ再ニ用ヒス然レモ全治ノ法此
ニス干タルハナシトテ再ニ用ス然レモ全治ノ
法ハコレニ過タルハナシ救濟ノ志アツキ人ハ

心比ニ留メテ考究セハ必ス良治法ヲ生スヘシ
林周藏膏テナ全大補湯ヲ數百ヲ與テ乳岩ノ未
タ破潰セサルモノ治シタリト云ハ十六味流氣
飲ヲ長服セシメタルト同日ノ論ニメ正治法ニ
非ス婦女ノ情截斷傷破ヲ好マサルカ故ニ幾テ
百ノ葉ヲ服ストモ截斷ニマサルト云テ以テカ
カル葉ヲ長服セシムルナリ然レモ仁人ノ情ヲ
以テイロ、截斷ニ及ハス先正治法ヲ穿鑿メ内
外葉ヲ施シ効ナクシテ遂ニ破潰セントスルモノ
ノハ之ヲ曉諭シテ割去ノ法ヲ用ルカナラ不忍

者正治法ニ就テ適當ノ業ヲ考究セラコレヲ長
 服固守セシムルカノニ途ニ出ス
 外科正宗ニ小核ノトキ毒業ヲ掃シ入テ其核ヲ
 去ルノ法ナリ此法諸書ニ出ツ伯行スレヲ施セ
 ルヲ目撃セシニ果メ効アリテ全治セリ然レハ
 初ノ小核ヲ蔓行セサルウチニ内服業ハモトヨ
 リ適方ヲ与ヘ外ハ此法ニ從ヒ掃藥ヲ施ス可
 ナラン此外ナリト腫ニ用ヘキ業物治法ヲ究
 シクセハ必良法ヲ得ヘシ從來ナリト腫ノ
 別ナルナラシ知ラスニテ他人血内ニ結聚スル腫



瘍潰瘍ノ類ト同ク心得タレ故ニ治法ヲアヤマ
 リ救フナラ得サルニ至レルナリ

- 人字丸 牛膝膝 大黃 リアムロサ
- 承天丸 芎藭 十女 カル名 一々
- 剛仁丸 消石 大圓 カロメニ シ加
- 剛兜丸 甘連 大差 九倍名 加

書正古法。祝ヲ過宮ノ至ラ考亮ニシテニレラ
夜間將ニシムルヲノニ途ニ出ス
俗則其原モ果ニ難クハ其時 毒業ヲ捕ル入ラ其枝ヲ
痛平ニシ汚能古在圓ヲ精業ニ出シ伯行ニシテ其
是名ニ其野ニモ其ノ果必動ニ引テ全治セリ然レハ
少ノ子我ニテ蘇ルニ其ノ功ニシテニ内服業外ニ其
其進方ヲ方ニ引外ハ此法ニ便ニ神業ヲ施スニ可
也 其ノ外ニ其ノ功ニシテニ用ニテ其業治法ヲ究
其業ノ功ニ其ノ功ニシテニ其業治法ヲ究
其業ノ功ニ其ノ功ニシテニ其業治法ヲ究



