

女科癸蹄

坤

ヤ 9

1113


2



1113
2

女科答蹄

下





女科筌蹄下卷目錄

辨胎

妊娠諸病

惡阻

口舌痛

子懸

子煩

子癩

子淋

子嗽

子腫

產後諸病

胞衣不

血暈

兒枕痛

崩血

吧逆

下利

瘕病





女科筌蹄卷之下
 妊トリヤ不妊ヲ辨明スルノ種種ノ説アレヒ
 タシカラス唯子玄子ハ經畢後ハ寸五日ニ至
 リテ獨菓子ノ如キモノ子ニ應スルヲ確微トス
 此モ數ニ診シテ子熟セサレハ中ニタシカニ別
 ルトニ非ス日別々桑原氏ハ此診法ヲヨク熟シ
 タリト見エテコレヨリ外ニマサレル法ハ決シ
 テ無ト云ヘリ經水ノ少ク通メソノマ、妊スル
 モノナト經後ヲ日定メカタシ且經ノレルシト

辱勞
 小便失禁
 惡露不盡

屢變
 水腫病

女科筌蹄下卷目錄

辨胎

長胎

子胎

子胎

子胎

子胎

辨胎

長胎

子胎

子胎

子胎

子胎



云モノナクシテ経通セサルナリ姓スルモアレ
 ハ是亦経後ノ日定ラスト云人アリ是尤ナリ
 ナレ氏手熟シテ獨粟子ノ大サヲヨク診シ得タ
 ル人ナラハ経ノ有無ニハ狗ハルヘカラス其外
 イロイロノ外候アレ氏畢竟タシカナラス
 ミナリ山田氏ノ説ニ掌内中央ニ動アルモノハ
 妊娘ナリ是ハタシカナル徴ナリト云ヘリイカ
 アラシヤ又湖東ニヨク辨スルノ術ヲ得タル人
 アリト聞リ予イマタ其術ヲ傳ヘサルヲ以テ其
 是非ヲ知ラス今年湊氏長崎ヨリ飯来リ日泰西

人ハイカニシテ辨スルヤト問ヒニシトホ
 トハ探宮ニテ宮口ヲ候ニ見ルヨリタシカナル
 徴アリト云ヘリイカサマ是ハ詳ニ候マハ異
 ル處アルヘシ然レモ吾邦ニテハ行カクテ術
 レハ用ルナシ

妊婦諸病

凡妊婦ノ諸病後世皆子ノ字ヲ冠ラシメ稱スル
 事トナレリ是子ニヨリ所患ニ異アルコトアル
 義ナルヘシ其諸患種ニアル中ニ治シカクモ
 ノハ子嗽子淋子腫ノ三ナリ其他ハ右病ノ治法

ニ從テボゞ治スルコトヲ得ルモノナリ
總テ妊娠ノ病ハ其胎ノ有無ニ拘ハラズ唯一通
リニ治ラ施スヘシト云ハ古医方家ノ常論ニテ
誰人モ知リタルコトナリ予按スルニ古人ヨリコ
レヲ分テ論スルハ他ニアラス 妊娠ノ病ハ尋常
ノ如クニハ治シカタキヲ以テナリ殊ニ日ノカ
サナルモノハ診察シカタクメ腹候ヲ他ノ如ク
ニスルコトヲ得ス又明ニ辨断メモ胎アル人ニ菜
ノキカサレル多シ此モ人ノヨク知ルコトニテ公媿
セサレハ治スヘカラスト公媿メ後ハ療セサレ

氏オノツカラヲ治スルモノモマハアルナリ然レ
氏公媿マラ忍ハルハ尚可ナリ忍フコトヲ得サ
ルモノハ棄置クコトヲ得サレナリヤハリ其治法
ヲ講セズンハアルヘカラスト予往年紀列ニ在ノ
日正木屋善助ナリモノ、婦妊娠五六月時目疾
ヲヤミ眼胞腐爛甚シク疼痛不已其毒ノ状態詳
明ナリシヲ以テ五宝丹ヲ作り輕粉五分ヲイレ
テモ日ニ服シツクサシム目疾ハ乍テ治シタレ
氏口中腐爛メ微腫満面ニ生レ飲食菜汁一滴モ
下ルコトヲ得サレニ至リタリ此時腹中空虚

シラ唯胎才存シ動ノチニアタケノミ食通マカ
ル下計スルニ十二日ナリ菜ヲ喫シト欲スレ氏
咽ヲ下ル下ヲ得ス甚々危篤ノスカタナリ時ニ
余湯原敬輔ナレモノラヒキ来リテ此病婦ヲ診
シセメ以テ少ク病家ノ心ヲ安クシマシトス敬
輔曰此唯菜ノ病毒ヲ動スナリ少モ苦シカラス
ト此時唯麥ノ稗ヲ以テ冷水ニ二滴ツ、送り其
後稀粥汁サシツ、ヲ灌キ入レテ遂ニ生續ヲ得
タリ月満テ安産ス女子ツ、カナク子ハコトニ
無病ナリ由此觀之胎ノ有無ニ拘ハラズ可攻ハ

セメ浮スヘキハ浮シテ療治ハアタリマシ人下
ラテスヘキナリ妊娠中ノ病必シモ病毒ニヨラ
スメ胎ニヨル下モ下リ譬ハハ在脚股ノ辺ニキ
痛カ或胎動不安ト云下等ナリ此等ハ菜物切ラ
ナス所ニ非スメ菜ヲ用シ一概ニ云ヘカラス
昔大外 惡阻 胎前 產後 諸症 治法 卷之 五
妊娠既ニ一月ヲ越ルコトハ必悪心嘔吐ノ症ラ
奈ス是ヲ惡阻ト云ナリ此經水常ノ如ニメメダ
ルモノハ煩流スル故ニ逆ナシ既ニ胎ヲ宿ト
キハ煩流スヘキハ血進ハ下ヲ得サレ故ニ心下ニ

逆支スルヲ以テ悪心嘔吐セサルヲ得サルナ
リ故ニ胎ニアラスシテ唯經水ノ滯ルモノト云
ヘ氏ヤ、悪阻ニ似タルヲマ、アリ然ルカ故ニ
昭ヲ辨スルヲ難ナリサテ此悪阻ニ三月ニメ止
者大抵常トス四五月不止六七月モナラ不止ア
リ此皆其中オノツカテ支エル所アリテシカル
モノ故ニ強テ止ルヲアタハス然レ氏病家日
嘔吐シテ食セス日日ニ羸瘦スルヲ見テ後ニス
テオクニ忍ヒス医ニ治ラセテ切ナリ医亦其乞
ニ從テ治ラ施ササルヲアタハス或謂水気也ト

乾姜人参半夏湯又ハ半夏厚朴湯ナト典ヘ用ユ
生姜半夏ノ姜ヲ藥レ氏一モ其効ナシ又田舎ニ
テハ虻虫ノタ、リヲナスト多故ニ其中ニ驅虻
ノ劑ヲ加入シテ藥ルニマ、効アリ然レ氏此等
ハ皆其標ヲ逐ノ術ニテ正治トハナシカク此
悪心ヲ人皆省水トトノ停蓄スルヤウニオモ
トヤハリ血ノ留滯ナリ
此症正治法ハナキモノト見ヘタリ奥田氏曰嘔
吐ヲ止ント欲メイロイロ意ヲ用テ茶ヲ藥ルハ

天功ヲ知ラスメ人作ニテ製セントスルニ當ル
故ニ必逆スル所アリテ茶汁ヲウケス適受ルモ
心ヨカラス此此此ヨク解スルコトナリ唯ヲ治ラ
施シ茶ヲ喫シテラ乞如此モノハ無味無臭ナル
敢テカマイニナラ又品物ヲ喫ルニシカス他ノ
止吐ノ茶皆吐氣ノアル茶ナレ故ニ彼ニ其毒ナ
キモノハ必及テ害アラントス其無味無臭ノ品
ト云ハ一帆青曝乾伏苓ニ味水煮ニシテコレヲ
喫フレハ必ヨク受惠家人曰他医ノ茶ハ多クハ
ウケス唯此茶ハヨク受茶汁ナレハ功モ亦アル

ヘシトテ心ヲ安メ気ヲ下スカクテ日ヲ経ルト
キハ天功ニテ徐々ニ稀粥ナト通ヌ此法最モヨ
シ余按スルニ血ノ停蓄スルハ生姜ハ佳ナル
シ衣服ニ血ノ染シタルヲ洗去ニ生姜汁ヲ用ト
云或生姜葉ヲ曝シテ貯ヲキ水煮メ之ヲ以テ
單硝石丸ヲ喫テ佳ナラン又旋覆花ヲ可用ト云
人アリ此ハヤハリ水飲ノ停蓄スル方ナリ
凡妊婦ニ口舌糜爛メ熱湯塩味ノ類ニミテ飲食
ヲ妨ケ甚ハ唯稀粥ヲサマシ冷ナラシメテ啜ル

ニ至ル予往年ヨリシハシハ此症ニ逢ヒイロイ
口治ヲ施ストモヨクヨク考ルニヤハリ梅毒ノ
所為ナリ其人モトヨリ徽毒ノ患ナシト魚氏一
点其毒アルトキハ妊娠ナルヲ以テ月経通セス
汚濁ノ液下ニ漏泄シ去ルニ由ナキヲ以テオノ
ツカラ上ニ坐テ口舌腐爛ノ症ヲナスト見ヘタ
レ此處ニ心ツキテヨリ後ハ治セザルモノナシ

口舌腐爛治法

治法ハ七物解毒ノルニテヨシ唯剛天丸ヲ兼用
スルヲ佳トス糜爛ノ甚シキモノハ合嗽茶ヲ施

スヘシ是ハ緩和劑ヲ宜トス敷藥ヲ求ケモノハ
薔薇蜜ヲ與ヘシ甚シキハ蜜ニテモシテルナレ
氏先シシク方ナリ他ノ塩氣ナク菜菔ハ一モ用
ラレ又所ハ金鏡匙水研散ヲ兼用シテ得
サレモナリ若強ラ典ニテ施セハ一味ノ珍
珠未ラツタヘシ敷ニ用テ効驗ヲ得畢竟外敷ハ
唯一助トナスノ内服ニアラサレハ毒ヲ驅ル
ナナキヲ以テ全治スルナラズ

子懸
妊婦五六月或七八月ニ及テ心下滿シテ急

安臥スルヲ得ス蒲團アトツミヨクカ、リ短
先スルモノナリ甚シキハ腹肚マテ張満スレハ
ヤハリ心下急ナルキミアリ按スルニ此亦子宮
衝逆ノ一志ナリ

子懸治法

此唯枳實芍薬散ヲ湯トナシ用ヘシ速ニ愈後世
紫蘇和氣飲ト云方ヲ用大ナル達ナレ長功有ヤ
ウニ去ヘリスヘラ子宮孿急ニ芍薬ヲナス故其
意テテ療セハ佳ナレヘシ

子煩

壽世保元ニ子煩者心神悶乱也ト云ラ處方ハ花
苓防風麥門冬黃芩ナトノ羨ヲ用蓋子痼ト相同
シキナリ唯子煩ト云名ニ據レハヤハリ子懸ノ
如ク煩悶スルナレヘシ子懸ハ心下ノ煩満甚シ
クメ小腹ハ及テホクオホヘ胎ノ上ニ懸在スレ
カ如ニ見ユル故ノ名ナリ子煩ハ形状ハ左ナク
テ唯煩悶スルト多ク謂ナレヘシ何ソ心神悶乱
ニ至ルヤ心神ノ乱ルハ即子痼ナリ後世ノ書
ハ徒ニ名ヲ設ケ事ヲ繁クシテ義ヲ正シクスレ
ト明ナラス治法ハヤハリ子痼ノ治法ニテ從ヒ

子痲

妊娠六七月八月三ヶ月ノ間ニ於テ若シコケル
コトナトアレハ顛倒ニヨリ子宮大ニ變動スルヲ
以テ子痲ヲ登スルナリ又エケス凡何ソ尤ニ驚
愕スレコトアリテ卒然トメ登スレアリイツレ此
症ハ卒然トメ人事ヲ失セ或強直或拳急ニ又擣
擗ナト卒中凡又ハ小兒驚風ノ如クノ症ヲナス
モノナリ一タヒ登メハ其マ、ニテ治セズ胎子
出生セサレハモトニ復スルコトナキモノナリ

子痲治法

後世方書ハ羚羊角散ト云方ヲ用テ適當トスレ
ルコレヲ試ムルニ効ナシ世医ハ適當ト定メタ
レ功ナケレハ則命ノキハマル所トスレ凡研究
ノ足ラサルナリ唯速ニ吐劑ヲ與ヘシ吐ニヨリ
胎子出生スレハ精神ニ復スルモノナリ元來此
病ハ子宮變動メ上ニ衝キ卒厥ノ諸症ヲ顯ハス
ナリ故ニ苦薏湯ヲ用ルラ佳トス他ノ三黃瀉心
湯ノ羨ヲ用ルハ形状ニ眩シテ其實體ヲシラサ
ルナリ苦薏湯方治子痲頭暈又子宮上逆

苦薏

白芷

小茴

沙草

牛皮消

右五味

子淋

妊娠小便淋瀝シテ疼痛スルモノハ容易ニ治ス
ルモノアリシモタママハ至テ治シ難キアリ古
人モ其難治ヲ苦シ轉胞ノ名ヲ設タルニハ非ス
ヤトオモヘリ且古人ハ味丸ヲ處シタルハ甚至
當ノトナリ多クハ皆血分澱滯ニテ癸スルト
見ユ然レモ今時ハ常ノ淋瀝狀ニメ徽毒ニヨル
モノアリヨクヨクコレヲ辨スレハカタキナシ
其辨ハ常ノ淋ハ尿通シカタキ故屢尿ニ臨テ痛

不已徽ニヨルモノハ尿水ハヨク通シテ唯首尾
ニ痛アリ膿ノ有無ハイツレモ相同キヲ以テ微
トスレニ足ラサレナリ

子淋ノ治法

數尿管ニ臨ニ乍漏出セントスルカ如ニメ僅ニ
五六滴ヲ不過痛甚多數尿管ヲ催スモノハ味丸
ニ宜シ若不然唯尿管通スルニ於テ痛ツヨク通
スルト常ノ如クニシテ終リニ又痛ヲ癸シ必シ
モシハシハセサルモノハ下部ニ解毒劑ニ剛地
丸ヲ兼用スヘシ但痛ツヨクハオノツカラ尿

ヲ出ス下多カラサル故ニ屢尿スルモノナリ此
ノ疑似ヲ辨セスハアハルヘカラサル所ナリ又
八柔丸ノ症ニメ頑痼ニメ切ラ見サレモノハ大
黄牡丹皮湯ヲ用ル下アリ子淋ノ難治ニ至テハ
一旦ノヨクスル所ニ非スヨクヨク辨断スヘシ
又尿水全ク通セサレハ導尿管ヲ用ヘシ

子嗽

妊娠ノ嗽嗽病ヲ子嗽ト名タリ甚難治ノモノナ
リトカク腹中ニ心キテ嗽スル毒ニ孕急スル
其シキ故ニ大ニ苦シムモノナリ多ハ五六月

ノ後ニアリ初メ三四月マテノモノハ治シ易キ
故擧ルニ足ラス胎大ナルニ從テ嗽嗽マスマス
治シカタシ嗽スル毎ニ尿少ツ、逆出スルナト
シバシバアリ臨月ニ及ヒタルハ多クハ分娩セ
サレハ治セス凡テ嗽嗽ハ一樣ニ見ユレハ詳審
ニ診察スレハ微細ノ所ニ異ナル所アリヨクコ
レヲ別タサレハ治シカタキ下平素咳嗽ノ常ナ
リ妊娠ナリトテ一種ノ嗽ニ定マルト云フケハ
ナシ唯診察ノクハシキヲヨシトス

子嗽治法

心下有水気ヲ候得ハ小青竜加石ヲ與ヘシ小青
竜ハ常ニ用ルニモ腹半幸急アルモノニ効アリ
スヘテ幸急ヲ帯レラ心得テ某方ヲ處スヘシ尋
常款ノ治法ニテ効ナキモノハ子藏寧急ヲ療ス
ルノ法ニ從フヘシ〇往年予人ノ此病ヲ療メ効
ヲ得タルヲ見ルニ煉蜜膏ヲ用タリ此亦寧急ヲ
治スルニ本ツキタリト見ユ方ハイロイロアリ
擇ク用ヘシ最効アルヲ以テ此ニ舉クアトヨリ
擇ク舉ヘシ一奇方アリ四物湯ニ五月皮香附子
ヲ加タルナリ猥雜ノ方ナレモ其功アリ故ニ附

載ス参考ニ供スヘシ
古来胎子腫
妊娠四五月ヨリ後ハ腫ルハ多シ脚足トトニ
浮腫アリテ患トモナサス唯足ノ重キヲ苦ニス
テオク人ハシハシハアリ其腫一身ニ及テハ必
医業ヲ乞フ以テ医亦心ヲ盡シテ療スレモ腹内
充盈スル故ニ他ノ患者ノ如ク思マ、ニ診スル
コトヲ得ヌ且某ヲ用ルモ或忌諱アリテ強ク與レ
ハ嘔吐ナトスリテ意ヲ如クニナラヌモトヨリ
少ク脚足ニ浮腫ナトスル位ノ故ニ水気ハ

滞リカツテトナルモノニヤ利水ノ薬功ヲナシ
カタキ多シ故ニ大ニ医ノ難トスルモノナリ
妊婦水腫月ヲ累テ治セサレハ其胎子必死ス此
蓋シ水ニ壓シテ血ノ通路塞ヤリ養育ヲ得サレ
故カ或ハ水ニヒタサレ、ノ久シキヲ以テカ何
レニモ危キノ甚シ故ニ速ニ利水ノ功ヲ見シト
欲シテ医ノ心定マラス治ラ失フサナカラス

子腫治法

古来唯葵子茯苓湯ヲ用ルトスレハ水腫病ハ
トカク症ヲ詳ニシテ所用ノ方薬適中セサレハ

效ヲナストフシ最血分ニ事アル故ニ茯苓劑ノ
應スル野ノモノ多シ然レハ麻黄劑ノ應スル野
モ亦アリ子腫ラ人ノオソルハ腹半ニ胎アル
ヲ以テ診察レカクシ丸水腫ノ病タル診察ヲ精
密ニセサレハ薬効アルトナシ然ルニ其診察ヲ
詳ニシカクキカ第一ノ難ナリ
凡妊娠五六月以上ハ必足ニ微腫ヲ生スルモノ
ナリ此ハ大抵人ノ常ナリ且薬ヲ用テ効アルモ
ノ稀ナルト婦人ノ大率薬汁ヲ惡トシ以テスヘテ
置テ尚ハサレニ至レリ

子腫月ヲ重テ消マズ及テマスマス腫ルハモノ
ハ産スル所ノ兒必死胎ナリ長沙ニ所傳ノ方ニ
アラサル菜方ハ務テ其実効アルヲ穿サクシテ
用ヘシ頃日一婦人妊娠ハ九月ニテ水腫ヲ患葵
子茯苓湯圭苓湯ノ類ニ無功他ニ参考スヘキ症
ナシ穩婆曰唯是輕味ノ劑ヲ用テ佳ナリトテ高
津新術ニ售ル所ノ七服菜ト云モノヲ用タルニ
ヨク利水×腫盡ク消ス此亦参考ニ供スルニ足
ル

七服菜ハ梅毒ノ為ニ作ル和産ノ品物ヲ用

産後諸病ニ関スル事ニハ
凡産出ノ後變異ナクハ医菜ヲ用ルニ足ラス
若亦變異アレハ医ヲ乞テ菜ヲ服スルナレバ
其要トスル所ハ瘀血ヲ去ルニ在リ人皆産ノ時
脱血多ク見テ血虚スト思テ所用ノ菜ハ必補血
ノ劑ヲ主トス是其治ヲ誤ルノ本ナリスヘテ産
后ノ病婦ニ子ハ必オリ是ノ多ク問テ其
瘀血ニヨルヤ血虚ニヨルヤ決マント欲ス此
子カ常ニ試ル所ナリ其人資質ニ於テ多血アリ
少血アリ何ソ下物ヲ多少ニテ其瘀否ヲ決マシ

ヤ凡疾病ヲ見ハ唯其症ヲ詳審ニメ馳至ヲアヤマ
ラサレヲ要トスヘシ下物ノ多少ヲ問テ病ノ本
ヲ定メントスルハ病因ヲタツマレニ同シ古疾
医ノ道ヲ学モノハ耻ヘキナリ産出メ後胞衣
不下或血暈或ハ心腹痛ナトノ羨ハ其時ニ於テ
テキニアル病症ナリ又水腫痞疔狂乱ノ羨ハ日
ヲ経ルノ後ニ在リ最産出ノ時ヨリ祭スルモア
レヒ日ヲ引テ患ヲナスモノナリ前ニ攀ル血暈
ノ羨ハ日ヲ引カス治マサレハ必死ス故ニ産後
ノ患ハ急緩ノ二別アリ世医此別ヲ論セスシテ

唯血ヲ可泻可補ノミニ心ヲ用故ニ治ラ夫レ誤
ルモノ多シ

胞衣不下

後世諸書ニモ此病門ヲ立テ世俗ニモ胞衣下ヲ
スシテ上ニ冲キ急ニ死スト云習ハスヨリ大ニ
誤リ来リテ習俗ノ常トナリタケル凡人ノ腹中ノ
剝物ナリ何ヲ以テカ内ニ留ヌルナラシム又此
物上冲シテ死ヲ致ノ理ナシ其下ラサルハ必礙
ハレ野アルカ妨クル物アルナリ又上冲シテ死
ヲ致スモノハ必定瘀血ニメ胞衣ニアラサルナ

リ人皆胞衣不下ニ當テ徒ニ之ヲ下スニ心ヲ勞
シ瘀血ノ不可防ヲ忘却ス故ニ忽ニ此暴害ヲ生
スルナリ

凡胞衣不下數日ヲ過ルト虽氏害ナシ但其間屢
振寒戰慄スルヲ人恐ルハ一甚々以テ自ラ下ル
ヲ待ツト得ス其振寒スルモノハ脈衣マサニ
下ラントスルカ為ナリ又胞衣ニ拘ハラスト虽
氏瘀血ナト凝滯セシカマサニ下ントスルトキ
多クハ振寒戰慄ス故ニソレヲノクニカマワス
唯瘀血ヲ去ルノ手當ヲナシテ以テ其自ラ下ル

ヲ待ツヘシ其中手術ニ巧ナラハ手術ヲ以テトリ
サルヘシ胞衣ヲトリサレハ産婦ノ心安クメ意
氣下ル故ニ大ニヨシ又稀ニハ胞衣至テ大ニシ
テ下リカタキモアリ然レ氏子ノ出カタキニハ
似ス努カト医ノ手術トヲ合スレハ出去ラサル
ヲハナキナリ

胞衣不下治法

医務メテ産婦ノ氣ヲ下シ心ヲ安カラシムルヲ
肝要トス故ニ下ラスシテ時ヲ移スト虽氏少シ
モ害ナシ無造作ニトリサルヲ得ヘシヨシト

リ去テストモ内ニ於テ消化スルノ業ヲ興ルホ
トニ決シテ心ニカククルナカモト深切ニ云キ
カセハ自然ニオチツクナリ氏心ニハカ、リテモ
自ラ氣ノ下ルニ隨テ手術ヲ以テ探リ得レハ下
リ来ル此時一手ハ外ヨリ腹ヲ按シテ下ニ向ハ
シメ兩手術ヲ合セテヌキサルハ必シモ器物
ヲ假ルニ及ハス又帶既ニキレテモヒキ下ス
ヲ得サルハナラサテ外ヨリ腹ヲ按スルニ心ヲ
用ヘシ此ニハ時ニヨリ器物ヲ用ケルアルハシ
畢竟ハ胞衣モ亦唯瘀血ノ一物ナリナ心得オレ

ハ急アハテ、取り去ラシテヲ求ムルニハ及バ
サルナリ
松本生曰凡子宮ハヨク閉フサカルカ常ナリ故
ニ娩後日ヲ経ルトキハ口緊閉ス是ヲ以テ日ヲ
経ルホト胞衣サリカタクナリコレヲ取ノ術ハ
唯宮口ヲ開ニアリ若ソレカ為メニ便利ナル器
物ナトヲ製メロラ開シニハ胞衣ノ脱出スル
必セリト胞衣ヲハサニ安ス器物ナトハ世医ノ
構思不肖ト垂瓦目ヲ用サル所ニ於テ用ラナリ
ント微スルハカタシ是ヲ以テ多不足用

血暈

産后ホトナク眩暈ヲ祭スルヲ血暈ト稱スルハ
産後血動テ未タオサアテサレ時ニ祭スルヲ以
テナリサテ此症ヲ考ルニヤハリ是子宮衝逆ナ
リ子宮動スルヲ以テ症ヲ致スノミイカニトナ
レハ平素婦人屢暈ヲ祭スルモノハ皆子宮ノ動
スルナリ産ノ変動ニテ子宮ノ動スルナリ尤ナリ
然ルラ子玄子ノ説ニ食暈ノ虚暈ノト云タルハ
其コロ未タ詳ナルヲ知ラサレヲ以テナリ
○凡脱血スルモノハ必暈ス男子ニテモ或吐血

疑ハ胎前



衄血下血ノ災アルカ或ハ損傷メ失血スルカ金
創出血ノ災何ニテモ脱血スルナレハ必ス暈
ス産ニハ必分娩メ脱血スルモノ故ニ暈ハ其常
ナリ故ニ一通リノ暈ハナリウチナレト久シク
不止ハ子宮ノ動ナリト知レハシ
○血実スレハ暈シ血虚スレハ眩スト南涯翁ハ
云ヘリ然レハ眩暈ハ脱血常説ト云ヘケレト子
宮動揺ノ病アルモノ常ニ暈スルヲ以テシレハ
血虚ノ暈ヲ以概見シカタシ産后ニ於テニ症ト
モニアレハキナレハ明辨マスハアルヘカラス

血暈治法

第一子玄子ノ法ニ從ニ左側臥セシメテ枕ヲ高クシ針メニ倚臥スルカ如クスレハオノツカラヲサマルナリ然レ氏此時急ニ白湯ニテモ一口ノミタシト云モノナリ其時參連湯ヲフリ出シニシテ用ルカヨシソノアトハ三黃浮心湯麻沸湯ニテアサク煮出シ用ルラ適方トス此ニテ一通ノ血暈ナレハカツハリオサマルナリ又數頭眩ノキミアリテアトニ別ナラハ桂支茯苓湯ニ芒硝ヲ加用ヘシサナクテモ右ノ三黃浮心ハ唯

引字誤字

一二貼ノナリミナリ其右ハヤハリ桂苓湯ヲ用ルカヨシ

血暈ノ急ニ臨テハ酢ヲカ、シムルナリ俗間ニ又冷水ニナマノ味噌ヲ一塊カキタテ、與ルナリ此等ノ方ハ皆効ナキニアラス然レ氏子玄子ノ禁暈ノ術ノ連ナレニハシカス但時ニヨリテハイロイロノ変アルモノ故ニ切アル方ハ俗中ニ出ルト虫心を得オクヘキナリ此外科方奇菜ノ麥ハイロイロアルモ菜方ヲ特トスルハ拙キナリ且前ニ云如クニ脱血ニ因ルニ非

スメ暈ノ難止モノハ子宮ノ動ニ用ルコトナシハ
子宮衝逆ヲ抑ル奇茸鹿角精薄荷精トト合マ
テ平安散ノ如クニ製シ貯置テ用ルハ佳トラン

兒枕痛

産後ノ腹痛ヲ通メ兒枕痛ト稱ス此後世ノ通名
アリ全体産後ハ大小腹痛アルモノナリ然レ氏
初産ノモノハ先少シ經産ノモノハ瘀血多クシ
テ腹痛ヲ患ルモノナリ是ハ本邦ノ凡俗帯ヲカ
タクシテ血ヲ動カサヌ故ニ瘀血多クデキルナ
リト思ヘリ必シモ皆然ルニアラス其證ハ泰西

人モ經産家ハ産後腹痛アル氏初産ノ人ニハ腹
痛ナシト云ヘリ但帯ヲカタクシテ正坐スルモ
ノハ瘀血殊ニ多クシテテマリノ如クノ塊ナト
デキル故平素ハシツマリテ害シナサケルモノ
産后ハ動キ坐シテ痛ヲナスコトアリ

○産后ハ唯小腹ニ在テ疼痛スルモノハオソル、
ニ足ラス然レ甚シキ熱ヲ兼ヌルモノハ心ヲ用
サレハ治ラ先コトアリ兎角心下ヲ伺ヒ心下ニ事
アルモノハ痛唯小腹ニ在ト亟忽ニスルコト勿レ
○産後ハ心腹痛ヲオワル、コトナリ心腹痛トハ

痛専心下ニ在ラ心胸ハモカ、リ又小腹ニ痛
アケナリ此症ハ急ニ治ラ施ササレハ患立止ニ
至テ踵ヲ回サケナリ
産後日久シク腹痛メ必シモ心胸ニ係ラサレモ
ノハ心静ニ治ラ施ストモ苦シカラス

兒枕痛治法

産後痛ハ必批核承氣ヲ用ヘシ痛甚モノハ多ハ
身熱ヲ兼ヌ腹ヲ按スルニ塊手ニアタルモノハ
牡丹皮ヲ加用ヘシ
心腹痛ハ批承ニ延胡索人參ナト加靈辨丸ト云

方ヲ兼ヌ其方五靈脂大ニメ延胡索大黃ナトシ
ニ合セ丸トナセシモノナリ藥ノ品ヲ論セヌ急
ニ用ヘシ

予成童ノ頃花園伯行京ニ出テ勤学セリ屢會シ
テ医事ヲ談シタルニ産後心下急痛ノモノハ必
ス救フコトヲ得サレナリ此症半産後ニ最多シト
語レリカクテ土例ノ人谷方万六ナレモノ同シコ
ロ京ニ在テ医事ヲ好メレ故ニタマタマ医事ヲ
談スレ次テ彼ノ急痛ノコトニ及ヒタルニ一奇方
アリ決シテ救ハレサレモノナシト云ソレヨリ

懇求メ其方ヲ乞シニ抽核ヲ他藥ノ如ク水煮シ
テ用ルコトナリ其後ニ三々ニ人ニ尋ヌルニ産後
疾血痛ニコレヲ用テ効ヲ得ルコトヲ語りシ人ア
リ恐クハ奇効ナルヘシ予イマタ其急ナルニ試
ミサレラ以テ確タル處ヲ知ラス姑ク記シテ遺
忘ニ備フ

附記胞衣下ラサルモノアリコレヲ出サントシ
テ子宮ヲ探ントセシニ無用ナリ前陰ヨリ出ル
コトアルマシト云サレ氏出ツヘキ牙ヨリ出ササ
レハ術ヲシトテ強テ請タリコレヲ見ルニ前医

種ニ術ヲ施シタリト見ヘテ大ニ腫レテ閉塞マ
リセンカタナク抽核一味ヲ煎服セシメタレハ
腫愈胞衣下リタリトナリ 真村道逸ノ詒
伊藤忠公記
産後腹痛專臍下ニ在ルモノハ久シク治セス
ト云氏逐瘀ノ劑ヲ守リ用レハ必治ス但小腹ニ
塊ノ如ク見エテ子藏漫腫スルモノ半産後ニ在
リ此ハ既メ瘀血塊トナスコト勿レ

崩血

胞衣下ルト其マ、大血崩出シテ立トコロニ斃
ルモノアリ此子宮辺ノ動脈分塊ニヨリテ破裂

セルカ又子宮守ラ失カナリ何レモ急ナリ故
ニ早ク血ヲ止ムルヲ法トス常ニ婦人ノ所患ノ
崩漏ノ類ニ非ス
一通リ胞衣ノ了トニテ血ヨホト出ルモノナレ
凡此ハ汚血ニテ出ルハ其當リマハ故ニ恐レ
ニ足ラサレナリ綿綿トメ出ルヲ流ノ止サレカ
如クナルヲニクムナリ

崩血治法

子玄子過崩ノ術ヲ構思スレ凡今ハ甚々効少シ
トテ烏賊甲ヲ多ク服菜ニイレ用ト云ハリ西説

家ニハ大スボイトヲ以テ菜滓散ト云方ヲ子宮
口ニ射入ス是モ立トコロニ止ム故ニ隨テ内服
ノ菜ヲ喫ヘルナリ内菜ハ三黃浮心湯ニ玫瑰花
ヲ加喫テヨシ伯行ハ土民ノ瓜ニテ鹿胎子ノ
黒焼ヲ冷水ニテ喫テ佳ナリト云ハリ是ハレハ
シハ効アリトソ

産後嘔逆

産後發熱シテ嘔吐シ飲藥菜汁トモニ入ラサル
モノアリ此發熱スルノ元来瘀血ナト下リ盡サ
ス血ノ乱ルヨリ發スルナリ故ニ其嘔吐大率

水飲トトニ因ルコトハ少クメ皆血ノ変ニヨルコトナリ世医此義ヲシラスメ嘔逆ハイツニテモ水飲ノ所為ト心得半夏劑ト用ルコトナレ故ニ嘔不止シテ大ニ苦惱ラマスコトナリ數戰慄ラ祭スルモノナト別シテ嘔逆ノ症アルモノナリ
○田野ニテハ虻虫ノ害多キ故ニ産後ノ嘔逆ト魚氏ヤハリ虻虫ノ害ナルコト多クヨク其症ヲ察シテ治ラ施スヘシ
嘔逆治法
産後ノ嘔逆ハ桃核承氣湯ニ止レリ然レドモ

ツマニハ水飲ヨリ来ルモノモアルヘシ其症ヲ詳審ニシテ治ラ處スヘシ凡他医ノ治ラ經テ嘔逆不止ヲ以テ告来ルモノハ必桃核承氣ヲ與ヘシ必ヨク止ナリ承氣甜菜ニテウケカクキモノハ人參ノ苦味ヲ品ヲ擇ミ加テ佳ナリ若虻虫ノ害ヲナスモノハ鷓鴣古菜劑ヲ與ヘシ

産後下利

産後下利スルハヤハリ血ノ變ニヨルコトナリ下利スル所ノモノ瘰癧水ノ如クナルユヘニ皆水氣ノコナリトシテ治ラ誤ルコトナリ但下利是ニ因

ルモノアレルハ人知レ其血ニヨルハ人多ク
知ラサルナリサテ子カ知所多クハ瘀血胃ヲ侵
シ水穀ヲ分ツトク胸間ニオリリイタサシム
ルマ、消穀下利スルハヤハリ瘀血ノ害ナリ此
ハ産後ニカキラス平素婦人ニ瘀血家ニテハ
ナレハ以テ微スルニ足ル

下利治法

他ヲ顧ルトナク唯桃核承気湯ヲ用ルカヨシ世
医皆下利スルニ眩シテ下送ノ薬ヲ用ルトテ恐
ル、力故ニ敢テ淳利ヲ用ルトテ得ス必此ニ劣

スルトナカレ下利若甚シキモノハ急迫ノ甚シ
キモノ故ニイヨイヨ急ニ桃核承気湯ヲ用ルハ此
法ニヨク熟スルトキハ産後ノ痢疾ニ亦畏ル
ニ足ラサレナリ

瘧病

産後瘧病ハ半産ニ多シ正産ニハ少シ其初口旁
耳前ノ辺少シク鬱急スルヲ覺ルガテ二三時
経ルナキ必頻並拘急肩背掣引スルニ至ル其
甚ハ口喎メ語ルトテ得ス故ニ其初口旁ノ筋掣
引ス俗ニホツガラシト稱ス紀列田野ノ人其甚

ニ至テハ角弓反張ス予嘗紀列田間ニ在シヲ以
テ數此症ニ逢タリ初メ輕ハ治シ易シ重ニ至テ
ハ甚治シカタシ筑前ナトニハ半産症ヲ發スル
モノハ際シテ治セヌト聞傳フ唯オリオリ波濤
ノ至ルカ如クニ小腹ヨリツキ上リテ腹ヨリ胸
ニ及ビ衝至ルモノ全ク風氣ニメ物アルニアラ
ス余嘗テ妊婦ノ子痲ト産後ノ痲病ト同物ナレ
ハシトオモヘリ然ルニ痲ノ實體ヲ詳ニスルニ
病大ニ別ナリ痲病ハ産後ニカキルニアラス金
創獺犬ノ糞又ハ僅ハ損傷ヲナセシモノニモ痲

ヲ發スルナリリスヘテ痲病ハ一種ノ病ナリ此
ハ子宮衝逆ノ糞ニ非ス血脈中ニ風氣ヲ含ミイ
レテ漏ス所ナリ不得已上冲スルトニヘタリ此
余カ考案ニテ先輩ニ其説アルニ非ヌ姑ク録メ
識者ノ断ラマツ

産後ノ痲ハ子宮中ニ凡氣ノタマリタルナリト
山田氏云ヘリ此説其至當ナリトカク實體ヲ
明ニスレハ治法ハオノツカラ坐スルモノナリ

痲病治法

口嚙メ菜汁ヲモ灌入シカタキハ合谷ノ穴ヲ刺

ス¹ニ痛スヘシ最毫鉄ヲ用⁷左右トモニ判ス
ヘシト云ハ花園伯行ノ構思屢効ヲ得ルト云ヘ
リ又口噤シ肩ヘコリツマリテイカントモスヘ
カラサルトキニ密ニ酢トヲ等分ニメ茶盞ニ入
カキマハシ其中ヘ生姜汁少シハカリトニイル^ルトリ
加ヘヨク攪セテヨクニ一ポド喫ヘシト予カ膏
テ肥後熊本ニ過リシトキ其地ノ医松原道謙ト
云人傳ラレテ急喘ニ用テ効アル方故ニ瘧ノ口
噤急閉ノ牛ニ用ルモ亦効アリト云ヘリ○赤馬
カ関ニテ牛川爲仁産後瘧病ノ衆医ヲ東子不

可奈何ト云モノニ逢テ酒ヲアクマテ飲セタル
ニ疆直製引ノ部悉クヤハラキガニヤクニヤニテ
リタルヲアリ此ハ聞得タルヲアルニ非ス唯試
タルマテニテ終ニ死マリ余後予東遊ノ日舊友
内田貫保ヲ訪タルニ彼曰瘧病ハ古人專酒ヲ用
タルニチガヒナシ其證ハチ金方瘧病ノ治方ノ
見タルニ多クハ酒ヲ入テ煮ル^トセリ此古来
相傳ノ法トラシト云ヘリ彼此相合メ可考又豆
淋酒雞^天酒等ノ方試テ効ヲ得タル人アリ此等
ノ方ヲ用ルモ往^テ其^カ氣^味ヲ^考ス^ルニ^ハハ

母氏術 聖川ノ曲頭管
甚便利

日列飲肥ノ人桑原壽安ハ産科ニ長セリ此人ノ
説ニ痘癩ニシテ腮頰強リ嚙牙シテ言語ス
レトアタハス面メ未及張セサルモノハ單方
猿膽ヲ用テ効ヲ得ト用法ハ三分ヨリ五分ニ至
レ沸湯ニ和シ與フ嚙口不開モノハ六七才ノ管
ヲ取り其端ヲ真齒ノ根ニサシ入一人右ノ葉ヲ
含ニ管ヨリフキ入ルヘシ而医左手ヲ以テ頰頰
ニカケ右手ヲ以テ心下上沖ノ機ヲ按スルトキ
ハ婦モ口ヲ開クトアリト何レ如此スレハユル
ムトアルヘシ

山田氏ノ發明セルハ往幸一人ノ痘病上沖シテ
葉方切ナクイカシ氏スヘカラサルモノニ遇タ
リヨク探宮シテ毛引ヲ宮口ニサシイレテ毛引
ヲヒキ宮口開クトキハ上沖止ニ及張ユルマル
モハノ如ク閉ルトキハ又及張シ上沖ス此ニ放
テ宮口ヲ開キ遂ニ救フトシ得タリト午後或医
一婦人産後痘癩ホトント是カリシヲ此方ヲ
ニ遂ニ救ヒシト予ニ語ル 此事ハ鑑ニ此治法
ハ甚至當ノト見ユコレカ為メニ用ル所ノ器
ナト製シテ可トルヘシ己ムト得ヌ急ニ臨マ

ハ毛別ニテモ佳ナレハ此治法有子及張ス
ルニ及テ葉方ハ桃核承氣湯外ニ有効ノ方ナ
シ然レ博ク求ムハ有切ノ奇葉ナトアルハシ又
其劇症ニ至ラサルモ葛根湯ニ本患子虎杖根
ヲ加テ必効アリト是亦花園伯行カタレリ

蓐勞

産後熱アリテ去ラス日ヲ経テナラ熱アルトキ
ハ氣分モ了了々ラス漸クニ虚勞状トナル故ニ
産後三五日ノウチ必脈ノ靜ナラシテ要スル
ナリ草蓐ノ中ヨリ勞状トナル故ニ後世蓐勞ト

名ツクセ俗産勞ト稱ス初メニ在テハ治ニ易シ
月ヲ経テ羸瘦虚脱シテ下利ナト来ルヤウニテ
ツラハ多クハ治マス故ニ産后ハ日日ニ脈ヲ診
シテ靜ナラサルモノハ其慮ヲ必スナスヘキナ
リ
後世方書多ク婦人ノ篇ニ虚勞ノ一門ヲ立タリ
此男子ト異ニシテ産後ニカキラス崩漏後トト
ニモ虚勞トナルモノ多ク又血塊癥瘕ヨリ虚勞
トナル
於テナキナレラ以テ別ニ立タルナリ

凡産後ニカキラス崩漏后トカクニ虚勞状トナ
ルモノナリ其子細ハ医カ出血多キトキハソレ
ニ眩惑シテ頻ニ収瀋ノ劑ヲ用テ補血ト稱シテ
粘稠ノ劑ヲ用ル故ニ惡血去ルヲ得ス良血マ
テモソレカ為メニ腐化セラレテ遂ニ壞血ノ病
トナル何ソ知ラン産後血出ルハアタリマヘ
ニテ瘀血下リ盡ササレテ以テ患トス崩漏モ亦
惡血ノ害ヲ遺ス恐ルヘクシテ良血ノ減スルヲ
患トナスニ足ラサルヲ於是マ胸臆ノ大害ヲ
ナスヲ可知ナリ

蓐勞治法

蓐勞ノ初メ肺數ニメ他症未備唯々腹微滿シテ
コレヲ按スレハ微痛スルモノ伯行ハ八物湯ニ
牡丹皮ヲ多加ラ持重スヘシ必効アリト云ヘシ
イカニモ此ハ實驗アリテコレモ畢竟牡丹皮ニ
味ノ切ト見ユ予嘗テ此場ニ遇毎ニ桂苓湯ニ芒
硝ヲ少加持重ノ切ヲオサメ又其諸症既ニソナ
ハルモノハ桃仁承湯ヲ主用ス此法ニテ蓐勞ヲ
治セシハ勝テ計フヘカラサレリナリ産後エカ
キラス崩漏後ノ虚勞トナルモ治法ハカハリ同

様ナリ決シテ他法ヲ用ユニ及ハサルナリ。○勞
勞ヲモ崩漏後ノ虛勞ニテニ致甚シテ難己者ハ
泊夫藍ヲ用ヘシ血致ハ全体治シカクキモノナ
リ況ヤ惡心ニテ時時逆沫交リ血少ツ、出ルモ
ノハ甚陰難ナリト知レヘシ此症手足煩熱ツヨ
キモノハ五物桂枝舌更湯ノ應スルモノナリ
虛勞状ノモノ下利アルハ療スルニ心ヲ盡リカ
レハ救ヒカクシ芒硝ト用ルニハ至テ僅ツク
施スヘシ大黃モトヨリノナリ大抵ハ下劑カ
硝黃劑ニテトマルモノナリソレヲ止ラヌハ多ク

温經湯ノ症ナリ此方主治スル所ノ下利ハ必吳
茱萸ノ應スル所ノモノ故ニヨク其症候ヲ考究
スレハオノツカラ明ナリ

痿躄

産後ニ足不得起步ヲ俗ニコシヌケト稱ス此患
世ニ甚多シ其脈多ハ微數ニメ腹中ニカナリ唯
動ナトノ手ニ當ルノミニナ別ニ變急ナトモ見
ヘサルモノナリソレ故ニ世医皆血虛所為ト按
メ定メタリ全体産後ハ必血虛ストアラカシメ
定メラク故ニ脈微數ナルカ腹中カナキカ面色

ニ紅活下ル所見ハサレカ身体ニ羸瘦スル所了
レハイヨイヨ血虚ニチカヒナシト決断シテ治
ラ施スナリ此世医ノ謬誤ヲ致ス所以ナリ予
モ嘗テ此処ニ疑惑ナリテ治ラ失タルヲ數ナリ
後ニ至リ苦思シテ其謬誤ヲサトリタリ此症ニ
遇ハ幾次ニ小腹ヲ診シ其詳審ニ探リ見ルヘシ
必磊砢トメ凝血手ニアタルナリ此瘀血ヲ認得
ハ方ヲ定メテ先長ク攻ムヘシ必効アリ若凝血
ノ手ニ應スルナレバ微毒ノ微ヲ探リ求ムヘシ
此ノニニ決シテニタルモノナレバ他ニ求ルニ及ハサルナリ

○此症疼痛ヲカヌルアリ痛ニ微甚ノ異ナリ且麻
痺ヲ帯ルモノ多シ麻痺ハ愈血虚ナリト心得ル
カ世医ノ常態ナリ又筋惕トナレバナリ多ハ腿
脚トモ裏面ノスシ變急スルモノナリ凡痿躄ハ
粹液ニ関係スル故麻痺幸急筋惕肉瞤ハアリウ
チノ症ナリト知ヘシ

痿躄治法

余カ試テ効ヲ得ル所ノモノ産後ニテハ桃核承
氣丸黃牡丹皮湯ノニ方ノニ脉數ナレバ下不
知ナレモノハ桃承ニ宜シ不然ハ大牡ヲ用ラモ

佳ナリ南涯翁ハ乾^{カク}鯁^{カク}ヨク効ヲ奏ス專可用ト云
ヘリ^{カク}鯁^{カク}年余コレヲ子ブリ未ト下シ歷年痲痺
婦人ニ當飯芍藥湯ニ此未ト硝石丸ヲ兼用スル
ト一年ハカリニテ終ニ夕ツト得ルニ至リ夕
ルトアリ後ニコレヲ按スルニ鯁ヨク血ヲメク
ラスノ切ナリ歲月ヲ歴ルト久淹ナルモノハ痲
血ト云ハ氏急ニ驅除スルトカタシ如此ト云
ノハ必先メグラシユルメテ於テ後ニ驅除スル
ニ宜シトソレヨリ考究スルニ我邦足利氏ノ頃
ヨリ專ラ用ル壽命散ト云方アリ此方ハ七氣ト

テ産後鎗^{カク}痲^{カク}失^{カク}痲^{カク}金^{カク}創^{カク}打^{カク}撲^{カク}ト云^{カク}差^{カク}大^{カク}凡^{カク}其^{カク}未^{カク}ニ其
痲^{カク}血^{カク}ヲ去^{カク}ル^{カク}為^{カク}メ^{カク}ニ用^{カク}ル^{カク}ト見^{カク}ヘタリ其^{カク}方^{カク}牛^{カク}乾^{カク}
鯁^{カク}ノク^{カク}ロ^{カク}ヤ^{カク}キ^{カク}ニ又^{カク}ナ^{カク}マ^{カク}ヤ^{カク}キ^{カク}ヲ用^{カク}因^{カク}テ此^{カク}方^{カク}ヲ用^{カク}ル^{カク}ニ
シカスト思ヘリ方左テ具^{カク}鯁^{カク}鯁^{カク}藜^{カク}黒^{カク}ヤ^{カク}川^{カク}骨^{カク}沈^{カク}
香^{カク}以上五味未^{カク}トナシ白湯ヲ以テ送下スルナリ
元方分量ニサシヒキアリテ其症ニ從テ増減ス
必シモ一定セザルヲ以テ治トスレ氏予ハ一定
ニテ用ルニ舊痲血ノモノニハ効アリ

小便失禁

産後小便ノ禁ヲ失ハ産婦ノ時艱澆ナレヲ以テ

尿道ノコクチヲ壓摩シ不仁セシムルハ小便
道ノコクチモトヨリ粹液ノ道路所謂アリテ守
ラテス_一テレカコレヲ壓摩メ不仁セシムル
キハ偏粘ノ手足不遂スルカ如クニ守ラテス_一
ナリシ以テ遺尿スルニ至ル然レ凡如此モノ
平素晝夜ニ六々小便スルモノナレハヤハリ六
々小便ラ泄ラス又一種尿道ニ存在ノ粹液ノ道
路所謂尿道ヲ損傷ス截断スルナリ是モ小便
道ハ陰門ノ上唇ノ処ニ口ヲ通シテ唯上ツラノ
処ヲツタフテ旁脱ニ通スル故艱産ニテ大ニ出

カタキモノハ山ツラヲ破レ_一アケ故タマ
ニハカノ粹液ノ道路ヲモカキ破レ_一モアリ何
ニテ粹液ノ通路ヲ失ハハ尿ハ失禁スルハツア
リ唯此方ハ日夜イツトテク滴リワケテ不
ニ浸漏スルナリ産後ノ遺尿此ニ症アリイワレ
モ難義ナレ患ナレ凡前症ノ方ハ先輕ナリ此外
疾病ニテ不禁トナル_一モナレトハ云ハカラス
或瘀血ナトノ害アルマシトハ折レカタケレ
先ハマレナレ_一ナレハ無ト云モ可ナリ

失禁治法

此ハ尿道粹液道不作スルモノ故ニコレヲ醒覺セ
シムルヨリ外ハナキ故ニ辣茄 煙中葉草捲
右三味細剉シメ焼酎ニヒタシオキ綿少シハカ
リヲ以テコレヲヒタシ此ヲ陰ヲノコクテニ夾シ
クナリ一日ニ一決ツク 換テ新ナルヲ用如此ス
レハ粹液醒覺シテモトニ復シ守リテ失テナシ
又粹液ノ道路截断セラレテ通スル所ナキモ
ハコレヲツカシムルニ由テナラ以テ近來種々
ニメ構思ノ治ヲ試タレ人モアレ長未タ良法ヲ
得ヌ此疾ハ男子ノ淋漓ト同患ニメ治スルヤ

ウハナケレモ男子ハ淋漓ノ漏孔ヲフサケハ止
ルナリ婦人ノ尿道ノキレタルハ續ヘキ術ナシ
器物ヲ製シテ之ヲスクハントスレモ外物ハ肌
膚ニ密切ナラザル故ニ尿ソノ疎ナル処ヨリシ
タ、リモレテサツハリト止ルナシ唯此患ハ
高明ノ君子ヲ妙術ヲ考察メ良法ヲ生スルヲ俟
ノミ此等ノ症ニ至テハ服薬少シモ益ナシト知
ルナシ

水腫病

産後水腫世ニ甚多シ妊婦ヨリ水気不絶遂ニ

分曉ニ及テ後水腫益相マズモハ最重メ難
治如此モハ子多ハ不育全体妊中水腫ノモノ
ハ何ホト腫ト云凡分曉ハ甚々易シ陰門腫ミツ
ルトキハ産出ニ由テキハ見エルヲ以テ子
亥子乱刺ノ説アレキ刺シテ水ヲ去ニ及ハス及
テタマス久産スルモノナリトアリ産後水腫ノ
モノ治シカクキ多シ多ハ血分ニ関係ス而血
茶ニ別アリ破血ノ劑ニ宜アリ和血劑亦宜キア
リ此別明ナラサレハ功ヲ成ス^レトレ氏本ヨリ
水腫ハ危候分テ難キ^レナレニ産後ハ一身ノ血

液大ニ騷擾スルヲ以テ諸症ノ熱モ変スルナリ
ルヲ以テ益候ト難ク遂ニ其機ヲ失ニ至ルナリ
産門ノ大ニ腫ル、モノアリ別ニ心ヲ留ムニ足
ラス利水スレハ自消ス然レバ日久シク消ス
シテ痛ト加ルモノハ結毒ニ属スルモノアリ
速ニ其治ヲ移ス^レニ産後水腫日久不治ウテニ
ヤ、モスレハ痿躄トナルモノアリ此等ハ明ニ
衆方ニ関係ス一概ニ唯水ノ治ヲ施スヲ以テ水
不去ナリ務テ水ヲ去リテ而後痿躄ノ治ニ從ラ
ハレ

水腫治法

産後水腫ノ治法ハ。ヤハリ尋常水腫ト同ク各症
ヲ詳ニメ其目的ヲ失ハサズヤウニセサレハ切
ラ得ルヲナシ唯琥珀湯一方産後水腫ニ用屢効
アリ人ヨク知ル所ナリ蓋此方血分ニカノレラ致
ナリ産後ノ水腫ナリトテ治法ヲ難スルハ本邦
ノ医毎ニ誤治ラテス故テレシイカントテハ泰
西ノ医書産後ニ於テ別ニ水腫病ヲ擧ス此畢竟
平素他ノ水腫病ノ如ク診察ヲ詳審ニメ其機ヲ
失ハサズヤウニスレハ治ラアアマルヲナク故

ナリ唯血分ニ心ヲツクルハ常法ナリト知ル
シ

○水腫病ニモ心得ヘキハ彼ノ疾ノ下利ノ疾
ト同眼前ノ水腫ニ眩シテ瘀血ノ害ヲ忘ルヲ多
シ此ニ由テ急率ノ患ヲ生スルヲ數アリ必心得
テ其害ヲ防ヘシ

惡露不盡

俗語ニ産後ノオクモノト稱メ瘀血ノ色アシキ
モノ又水ナト交リ下リテ大抵七日夜ホトノ間
ト定メテ草薺守ニ坐臥セシムルヲナリ此オリモ

ノト云モノヲ惡露ト云七日ホトニテ盡サレハ
ニ七日ホトニハ盡ルモノナレ凡時ニヨリテハ
七八十日ノ間サツ下レモアリ故産後七十
五日ヲ以テ忌ト稱メ汚穢ト定メタルナリ古
來カク俗中ニ定ムルホトナレ故ニ久シク下ル
モノモヤマアレ凡大抵常人皆七日カニ七日久
モ三七日ホトニハ下リ止ムモノナリソレラ過
テ不止ラ不盡ト云ナリ此事ハサノ患ニモナ
ラサルナレ凡尋常ノ人一七日マニ七日ニテ
止ムト同シカラサル故病患トナレト見ニ此

ク世医誤テ瘀血盡ヌトスル人アリ惡露ト云
ハ下ル物ヲサスノ名ナリ腹中ニ在テハ惡露ト
ハ云ハス又不盡ト云ク惡露ノツキ又ト云テ故
ニオリヤマヌト云テニテ腹中ニ在テ下ラサル
ラ不盡トハ云ハサルナリ此ノ一菊圃漫筆ノ中
ニ既ニ辨シオキタル凡産後ノ一患タルヲ以テ
又此ニ舉ク其不盡ノ所以ハ瘀血多キカ精力薄
クシテ發出スルノ勢ニブキ故ナリナラ又他故
ナキトモアルカシ其症候ヲ詳ニヌルナラ要トス

不盡治法

惡露イワマテモ下リテ不止ハ惡露トアルヘキ
水血多キ故ナレハカク下リ盡スカヨシ然レハ
此ハ一通リナリ大凡七日ノ内ニ止ムカソレヲ
過テハ十日十二三日ノ中ニ止モノナリ故ニ世
俗ニ一七夜ニ夕七夜ト唱フルナリソレスキラ
猶不止者其中ニ故アリ其故ヲ考ルハ唯症候ヲ
詳ニシテソレヨリ實體ヲ察シテ而後ニ治法ヲ
處スルナリ先一通リ桃仁承氣湯ニ牡丹皮ヲ
加ヘ用又大黃牡丹皮ヲ用此ハ熱ノ有無ニテ
異ナリ益母草一味ク口マキトシ未メ服コシム

ルカヨシト云是ハ試タルナリ用テ佳ナリ免
角世医所用ノ方ハ收瀉ノ劑ナリ惡血汚水ノ類
下リツクヌラ度トス止ムヘキ道理ハ決シテナ
シ然レハ婦人汚穢ノ惡ヲ以テ速ニ清潔ナラセ
テ欲シテ医ニ乞フ切ナリ医亦其故ヲ正サス
シテ漫ニ收瀉劑ヲ用ルナリ症ヲ詳ニシテ其
故ヲ正シ其實體ヲ明ニシテ治法ヲ處スルトキ
ハ治セサルナリ又汚水惡血アリテ日ヲ引カ
サレハ盡サレモノナラハ何ト長クカ、リテモ
下リ盡ヌラ度トセサルナリ又人ス此ハ幾又シ

之患者ヲサトスヨリ外付
余嘗爲啞科癆科。舉切近之法。且詳解其術。
以爲初學筌蹄。唯於女科。則未及也。是以子貧。乞
其女科久矣。然予執掌不暇。數遇其責。今年暑退。
後稍得閒。乃且暮錄一二紙。遂以終業。夫編也。錄予
所親試。故唯載概畧。已至細義。未能盡之也。後學
者。補其遺漏。糾其謬誤。則予之大幸也。

文政丙戌仲秋既望

抱神堂主人題于安土街僑居

公宗為吐科為科舉切近之法且詳蘇漢
以為初學空端唯於女科則未及也意以平定
某女科人定然于說字亦教教通其有人家
後情應隨其自其
所說說說
文如丙女
者



