



癩瘡鄙言

ヤ 9  
1119





四方堂伊藤先生著

# 癩瘡鄙言

文錦堂梓

癩瘡鄙言序



癩毒之蔓乎天下也普  
 矣。而其為害人也酷矣。  
 蓋吾嘗親不幸罹此患  
 者。乃毒之侵強之士。天  
 之狡黠之女。或忽為廢

序

〇



畸醜怪之人。不則為天  
殤哀禁之物。甚哉癘毒  
之毒於天下也。然以昔  
世所未有故。古醫籍無  
言之及斯者矣。蓋余為  
之留心於此治者久矣。

而此出乃其多年所親  
強臨者也。頃日出肆某  
點求上木。顧其舌文之  
野。其言之鄙。其以兩西  
大才者必矣。雖然彼豈  
天。之被夫患者。庶



或有以免其廢天之厄  
者乎。是余所不敢辭之  
婆心也耳。

享和二年壬戌四月

四方堂伊藤述自題



癩瘡鄙言

凡例

一論中有先輩所發明者必舉其姓名不敢竊其說唯文辭煩冗者或省略之

一方中所載其本出于諸家者多而率必識其所出其或不識者或以其屬各家帳秘故或又以所出難詳也

一所載治驗雖非奇症奇治其可以為警戒者必錄之非謾記以誇術也他雖無不有危嶮之症



盡心治者其不可以為龜鑑者不載  
 一治効殊者雖俗間普知者載之不敢避其法方  
 之浮淺鄙俗  
 一附錄所載怪症奇事不必關懲毒之治姑記以  
 廣初學之識爾



癩瘡鄙言

越前

伊藤 迷叔 匹著

便毒

便毒勿妄刺若妄下之須待其起脹盛大後膿自從  
 毛孔溢出然後治之若起脹遲者宜朝暮事醉飽以  
 艾炷助瘡勢艾炷法見于後又多服後文所載之藥也又忍  
 痛步履亦可如疼痛劇不剛俟釀膿者以丸藥梅肉丸  
 促丸取暴瀉三四行後痛大定則須停後服若毒不  
 之類酷烈起脹早膿成速者慎勿下之凡癩家叢便毒者

世醫多以  
 巴豆劑大  
 黃劑等之  
 芥下之或  
 先刺之以  
 為治法捷  
 徑者大誤



患者之幸也。蓋便毒之在軀中也，必含血分。含之久，血必化膿。是故瘡熟膿溢之時，其膿必攝毒而出焉。其攝毒出也，非如用藥拔毒迂遠之比也。譬之渠中塵芥之得暴漲而盪流也，比諸掃除而去其功懸隔矣。此是治法中不多勞作用而得成大功者也。若妄刺之，妄下之，不唯折却瘡勢，而又致其瘡久不收口，而其毒率又遺軀中，後必致生變症矣。可不慎乎？又有欲熟而不果，熟若欲退而不果，退者予命曰便毒中穢症。雷火鍼能舉瘡勢。方見于後

下疳瘡

世醫多撰古綿而貼

世醫療下疳瘡，率必先貼膏藥，予大忌之。蓋膏藥脂為最害，所著之處，瘡圍必隨成蔓大，加之覆肩，畜熱是反助其邪也。雖不無引出膿之効，而畜熱之害力倍於其功矣。且其所謂膿者，多是黃水，雖無膏藥亦能自出，是非真膿。世或謂之為膿者，以所出之黃水留於瘡口，外膏藥裡者，鬱蒸變化以成，若膿狀故也。是症只用下藥，拔毒為得。疼痛劇者，用藥汁方見于後洗之，則痛乃定。是故以綿布裹之者，亦害之者耳。如



世醫多以粉劑等之藥參款忌處

不痛者以溫水或冷水瀉之日四五次每次以布拭淨此法能去瘡熱黃水止者為欲愈也若積年累月不愈者輕粉生々乳烟法毛蟹劑等諸藥主之

楊梅瘡

楊梅瘡毒在肌表比諸其舍筋骨者稍為易治勿以外治之藥強治之譬諸傷寒太陽病邪水劫之則或致喘滿或因傳陽明少陽也必乃釀致後患只宜服用藥于方見治之如手足合縫皺委之處膿粘着以妨屈伸舉動者赤小豆末粉之慎勿以外治之藥強治

之

骨痛

醫攻骨痛有好以烏附者是妄之甚者矣蓋烏附雖固非不可用之藥乎但如彼乃是見其身痛輒及于斯者是為妄如必欲用之則須先審熱之多少毒之淺深難易而後可施也又有諸病熱症反用烏附以濟功者是固非常法其活用機變存乎其人則未可豫論也如夫張子和畏熱藥如猛虎者乃亦偏僻之見已



雜症

有便毒下疳瘡楊梅瘡骨痛等諸症併病者大抵宜  
 下劑梅肉丸在促丸下劑久服之毒尚不竭者宜須  
 與輕粉生々乳之類毒尚新者慎不可施之是為緊  
 戒蠱毒誤治十之八九依此權衡又有咽喉腫脹蝕  
 傷或潰爛疼痛等症與平易劑不知者若遇此症雖  
 毒新者不可拘平常警戒須急以諸毒石劑輕粉生  
粟孤立乙烟法等之方治之是咽喉飲食呼吸之道  
 斯之類斯之類而性命之所關不遑顧後患也又不甚危險者伯

州散亦奏効多矣

久淋多癰毒

累月濃淋十之七八為癰之胎醫者須速施癰毒之  
 治勿使毒滋蔓矣非豬苓澤瀉海金輩之所能辨也  
 雖然禁忌則倣淋疾之法為可

施峻劑之法戒

凡施輕粉生々乳茂粟孤立乙斯類之治必先與瀉  
 劑伍促丸梅肉丸數旬俟毒稍枯涸而後始可施斯  
 治也儻毒尚新鮮者而與之假令當時有奇効後必



變症千萬或為是斃者亦不少矣可不懼乎予嘗療  
一農夫下疳瘡其人弱冠家甚貧為其父母嚴厲懼  
其呵叱秘之不求治者累月至陰莖臍爛龜頭殆脫  
落總來請治予曰毒深矣服藥非暮年恐不治其  
人曰僕父母嚴厲視今茲僕嬰此病耕稼不快利日  
夜譴責不輟矧服藥暮年乎願施速治之治縱令有  
後患固僕之所不辭永不讓國手恩雖叮嚀曉諭不  
可於是乎予以為渠固窮人今不施藥渠以予為趨  
利之徒愛資者且其或獲効於萬一亦未可必也乃

以梅肉丸取瀉三日與七寶丸七日涎沫連綿涌出  
者旬餘忽然發骨痛未幾而殭矣嗚呼今每診病客  
尚自悔思不已因記以為戒云

禁忌

此病之禁忌飲食尤緊要若守此禁不以鐵心者倉  
公復出靡如之何世或有滋味酌飽無所忌而得愈  
者乃其毒至淺稟賦太實健故也不可狃以為常雖  
毒淺乎稟賦不實壯者固不得倣彼雖稟賦實壯其  
體中素有濕熱蘊畜者亦然凡喰鷄鶩等肉助瘡勢



勤沉痾益臙氣而濟功者只便毒起脹不快若結毒諸症有之而已今為列禁忌於下

海鱸

海鯧

青花魚

仁志牟

加豆乃古

布里

之比

河豚

志伊良

鉛錘魚

雙鱺

松魚

鯢魚

鱒魚

香魚

鰲

諸魚鱗魚

諸多脂魚

諸河水魚

諸獸肉

諸鳥肉

栗子

芋

苟

諸蕪生物

諸辛辣物

諸酷酸物

諸凡

唯淋症禁

飲食之多品固此小丹子所不盡今聊紀民間平常充餐者

○羅此患者須緊戒浴溫泉下疳痔漏諸症雖得即驗後多上攻喉鼻耳目生惡症千狀萬態世醫動有以溫泉療此疾者予屢試之未見痊者大率為湯故病反加劇或為廢人不具之器或遂致不起



焉可不戒乎

○世醫之療此病禁慾甚嚴矣予則不必嚴焉凡染此毒者多是少年血氣未定之人雖中年以上人係此患者其放肆淫蕩可知矣是以予唯戒其過房而不敢囑以絕淫此蓋慮其竟不能固守戒警且俗情或喜犯禁恐房事反無度也若夫方用輕粉生々乳諸毒石劑之日則大禁之苟犯之其害尤不為輕焉

○芬脂善尅諸蛇如施反鼻劑須緊禁芬使藥力不

能峻烈



Blank columns for text on the right page.

經驗方

驅厲丸

治下疳瘡楊梅瘡骨痛喉嚨腫痛耳鳴頭  
痛等症免諸結毒

礬石

二十錢

大黃 十錢

輕粉

三錢

右三味糊丸日服一錢半五日或七日隨驥眩輕  
重或連服或停

○嘗療一官女結毒其人嬰此患者累年一以夙  
夜在公所一以慚羞不堪故治療不得意荏苒變  
為大便從牝器出之症於是大驚謀諸予予曰結



毒壞腸者耳蓋陰門後竅之內其際障絕如一皮  
革厚毒若結于此則或致此患矣與驅厲丸七日  
涎沫湧流口中腐爛乃以薔薇湯收之後服七味  
解毒湯數旬諸症去復常  
筋骨疼痛慰烙方 陳司成

草烏頭

桂枝

生薑

胡葱 各等分 和名未詳今姑以繇葱充之屢試屢効

右四味末和飯搗勻敷患所外以饅慰之  
迷曰本方川烏頭草烏頭並在今省為一品

七味解毒湯 治癰瘡諸濕毒在下部難治者 家方

忍冬

海藻 連鹽子大者佳 茯苓

大黃

通艸 各六分 昆布 方二寸上好者連

鹽用

甘艸 二分

右以水一合半煮取一合服

此湯兼用五足丸梅肉丸等之藥於毒在下部者  
其効尤妙

梅肉丸 治不問新久癰毒諸症及諸濕瘡諸惡瘡

橄欖 今以梅諸肉燒之 山梔子 各七枚半燒存性



巴豆 二莖半 ○實重者佳 輕粉 二莖  
去皮及膜

滑石 七莖

右五味糊丸麻子大日服十五丸或二十丸頓服  
之不得快瀉者漸增至五十九丸以比日取暴瀉四  
五行為量

此方本無有滑石蓋梅諸肉鹽氣濕濡諸藥令丸  
不能堅固故今加之以固之 ○巴豆去膜少嘔吐  
之患下皆効此

○越府檜皮屋彌即者為人孝悌小心偶遊花

街病淫蝕瘡漸羞不治者累月一日來求治予診

之龜頭後有一瘡大如錢龜頭下合縫處又有

瘡大如彈丸疼痛不可忍彌即曰僕尚有父母

在堂視僕羅此患痛心不啻君請勿施取涎沫之

治父母見其暝眩苦楚恐更加憂患焉瀉劑則唯

命矣予乃以蒲黃煎瀉之以梅肉丸下八十一日許

總如傾盆瘡瘻只遺結核乃與奇良散三十日約

一百一十日得全愈

○越府丸屋庄之助者病下疳瘡予與梅肉丸三



日涎沫流出以口中將靡爛不能復與之乃別作  
梅肉丸減輕粉者與之其病得愈蓋梅肉丸雖非  
涎沫出之劑人人稟資之異或稀有如此者尔後  
予作梅肉丸必有二方

伍促丸 治効大抵全梅肉丸

荆芥穗 三錢

輕粉 三分

巴豆

四分  
本皮膜

右三味糊丸服法同梅肉丸

速按此諸梅肉丸為稍易服蓋為無鹹酸之味也

○一沙彌年四十有奇少時游學東都之日偶折柳

染此毒請醫治而愈焉後數年忽腹痛不可忍以  
衆治莫微効厭之不復藥者數旬痛自愈焉爾來  
腹痛止則淋痛叢其淋之叢也欲尿而難得偶緣  
出一滴轉展躁亂疼不可言如此約十年一日來  
請治予與伍促丸殆二月次服解毒劑數旬諸症  
皆去矣今上檀說法音聲如鐘

○二條行院一妓結毒耳前耳後及腮下生結核  
大如梅子或鷄卵頸項僵直不可動搖日晡發熱  
惡寒腹滿下利請治予乃以伍促丸併荆防湯取



暴瀉日五六行三十數日諸症皆退唯脉仍不復常  
洪數更作東洋再造散三十日復常

桓文湯 凡服也豈丸吐者先服此湯且以送下能

防其患家方

半夏 一钱半

拍樓根

生薑 各一钱

黃連 五分

右四味水煎服益生姜先取自然汁當湯成方服  
之時滴入一規殼更良

風流湯 治儼毒諸症及諸濕毒

川芎

大黃

梔子

通艸 各七分

黃蘗 五分

右五味以水一合半煮取一合

京膈散 治毒攻眼目咽喉及諸上部者

連翹 一钱

大黃

芒硝

甘艸 各五分

梔子

黃芩

薄荷

各二分五厘  
藥舖稱波婆加理者佳

右七味以水一合半先煮諸藥取一合內芒硝更  
煮一二沸下火適寒温頓服



○平安木津屋橋街接屋某陽物生一腫瘡如挑核俛病痲焉瘡則經日自愈痲尚未愈或休或作居二年耳聾腹滿脉小數寒熱往來少氣不可多步陟漸羸瘦瘵症殆備矣予診之曰是本誤治之所致今臟大憊而疾尚病囑尔日哺喫醇酒半合棘鬣更一變慎勿有時之遲速酒肉之增減如斯三旬許當補臟腑渠曰唯々雖僉僕本癩家嘗聞酒肉■癩家之通禁今從師言無乃妨乎予曰然雖然今如尔之虛羸不得不先補臟益元渠乃信

西村正清圖書

本涼膈散  
薄荷少於  
連堯四之  
一今述所  
施薄荷反  
倍連堯則  
薄荷一錢  
連堯五分

肯而本於是從事於予所教者殆三旬脉變滑數少氣治者過半步陟如意而頗有可起之勢予曰而今而後始可施治也乃作涼膈散日服三大劑酒肉尚日喫不舍可五旬病除十之七八死候既去脉脈漸復執家事如平常偶有事之異却後不聞全愈否

治諸濕毒方 獨嘯菴方

當歸 山產佳 黃芩 黃連

連翹 大黃 川芎 各一錢

癩瘡御旨



右六味以水三合煮取一合半服  
蒲黃煎 渴下疳瘡疼痛

蒲黃

茵陳 各等分

右二味末蜜丸 枇杷核大將丸五枚以水一合煮  
取八分頻漱患處奇驗

七寶丸

治結毒痼疾或下疳楊梅瘡諸藥不効者

牛膝

輕粉 各四錢

鷄舌香 一錢

土茯苓

三錢○漢土者佳  
流球者不勝用

大黃 一錢

右五味糊丸日服五分或六分白湯送下

○丁巳秋熊澤某疾下疳瘡予與之以梅肉丸及

相文湯十餘日以下劑固不見即効渠不信予術

而請他醫々療之殆半年遂作骨痛於是復來請治

予曰此非易治之證非固守禁忌難治渠曰謹奉

命乃用七寶丸以取涎沫十日骨痛頓愈暨涎沫

止口中糜爛稍瘥因竊喰油膩膏粱病復發眼目

赤脉漸昏蒙輒請眼科數輩治者數月百藥亂投

不見一効咽喉腫脹一眼既盲一眼僅知晦睛因

又請予哀懇曰小人固蠢愚不能遵先生之教眼



目殆盲矣願先生不念舊惡辱施妙術再造之恩也予復與七寶丸兼用葶藶風流湯九日尋作涼膈散三十日得隻眼存諸症咸去

化毒丸 治諸結毒

薰陸 十錢 透明者佳 大黃

雄黃 鷄冠

亂髮 霜 各三錢 生々乳 一錢

右五味糊丸辰沙為衣每服一分日二夜一病重者漸增至五六分

○商人細物屋某結毒咽喉潰爛眼目昏晦衆治

不効請予予與化毒丸日三分兼服三黃湯約三十日所諸症咸去

○越八田村一農夫結毒累年耳鳴頭痛手足微痛來請治予以涼膈散與伍足丸取瀉旬許上部諸症頗理乃施化毒丸日服四分十五日痛則止尋投東洋再造散三十日諸症全愈

述曰生々乳煨煉不得法藥力不峻嶮予嘗以諸家煉法咸煉試參考研究遂得良法以別有煉法書今不贅



治結毒筋骨強急四肢屈曲而不伸者

風茄 五分 ○ 隨症增減 一名蔓陀羅花 反鼻 一匙

露蜂房 二匙

右以水二合煮取一合頓服之畢一時所或發狂  
亂言或昏倒不省人事者是其瞑眩耳不須解藥  
後必自解醒但病新者不見殊效○瞑眩久不解  
者上好茶三匙以水一盞半煮取一盞服淘茶飯  
亦佳

○一澳夫結毒右臂強直左手亦舉動不如意求

治予與麻沸湯為風茄八分者二日兩臂之患頓  
瘥無復所妨乃與伍促丸三十日許病全愈

○越府新在家某女可二十歲嘗病結毒首不可  
旋左手不可舉來請治予與桂枝湯方中加風茄  
二分者日服三劑三十日手不仁漸愈尋以伍促  
丸取瀉三十日許毒大去偶有事停後服後不知  
其如何

頑丹 効畧類麻沸湯 家方

麻葉 三匙 陰乾 反鼻 藥舖所鬻雪白者不勝用



右二味末蜜和勻頓服瞑眩亦粗似麻沸湯

○庚申秋越府淮南肆某結毒膝屈曲不伸數旬

衆治不効請門生蘭溪蓋谷桂介蘭溪諮諸予授以

頑丹蘭溪乃與五朮頓服之當夜丑時號呼念佛

其聲轟通街其狀恰如風狂狐魅之類即請蘭溪

而診之蘭溪曰是瞑眩爾即作大羌氣湯與之明

早快瀉數行藥毒解而能步履蘭溪仍與大羌氣

湯十日許病去十之八然彼本頑愚悖惱不服鑿

藥自作服益氣湯六味丸之類年餘雖步履無所

妨今尚不能為平人余製此方授蘭溪尋游東都又游京師二年于斯不遑多見病客故未遇此方正中症然其奇能有不可舍者因載焉

搜風解毒湯

土茯苓 十朮

防風 速按伊吹山產佳 木瓜 舶來者佳

通艸

薏苡仁 白鮮皮

金銀花 各五分 皂角子 四分

右八味分為三以水二合煮取一合服

荊防湯 治咽喉腫痛及上部諸患

荊芥

防風

辛夷



大黃 各六分  
川芎 三分

右五味以水一盞煮取一盞服多服益佳

治結毒諸症方 獨嘯菴

輕粉

竹茹

速按就樹竹而採者佳

梅諸肉

速按宜燒存性

天石

各四錢

丁香 一錢

右五味糊丸椒目大服十五丸或三十九丸

治微瘡誤過攻伐體虛憊毒尚不去者方

雄鷄 二翼

西洋參 末二錢

茯苓

末三錢 浸酒

右三味末先將鷄去嘴足羽腸以藥內肚裏為霜

白湯送下蓋藥末以滿肚為量此藥療毒沉隱不

可治者○此方或蒸熟去肉取藥末服

三味丸 治結毒諸症

輕粉

五錢

紅豆

十錢 所謂十八者

萍蓬

十五錢

右三味糊丸日服五分或八分

及鼻散 治楊梅瘡

獨活

連翹 各一錢

及鼻



川芎 各三錢

大黃

土茯苓 各四錢

右六味末温酒送下

安濟湯 治癩毒及疥疾 片倉元周方

芍藥 五分

連翹

銀花

虎杖 各七分

大黃 一錢

右五味先將四味以水二合煮取一合半去滓內

大黃更煮一二沸去滓服

再造散 山脇東洋

鬱金 五錢

皂角刺 一錢

大黃 十錢

白牽牛 六錢

及鼻 六錢

右為末温酒送下

治楊梅瘡瘰後僅遺一二瘡形如枯燥積年不愈諸

藥不驗者 洞三圭方

巴豆 不拘多少 實重者

右連皮燒和麻油敷患處則落癩

落癩後瘡疤尚高者

山椒 朝倉方 者俸 蒼朮 各等分

右水煎前之且



瘡癤

礬石 末

松脂 各等分

右二味和敷患處復洗復敷二方交施各日三次

若其瘡疤不甚高者

此謂瘡者癰毒結為瘡者也 燧雖平常之瘡亦可用

薰痔方 家方

燧眉笑 礬石 各一升

右二味以水六升煮取五升五合盆中盆蓋鑿

一孔如橘子大今病者以其肝門當其孔上座乘

湯燻而薰一炊時日五六次蓋盆孔上放鋪冲樣

隨去濕熱如意

又方

酒糟 不拘多少

法如前方

又方

馬屎 不拘多少

法如前方

痔痛不可忍者

人油

塗患處痛立止

治癰毒頭瘡累月不愈者

竒良 十莖

川芎

大黃 各一莖

布研末白湯送下多服益佳

瘡癤



治咽喉腫痛方

蓬砂

芒硝 各等分

右二味研末以津唾送下

如聖湯 治前症

桔梗 一莖二分

荊芥 六分

防風

伊吹山產 佳

連翹

甘艸 各三分

右五味以水二合煮取一合服

便毒促起脹方 家方

木鱉子

午房子

荊芥穗

防風

伊吹山產 黃耆 各七分 佳

右五味以水二合煮取一合服

速按諸病用木鱉之日須大禁獸肉不唯藥罔効

動害人張并癩亦當戒與猪肉同食

便毒灸法

理便毒瘡勢弱不能起脹滿大或起脹

遲者能舉其瘡勢

大蒜

右切作片安放瘡上灸其上以熱徹為度而止灸

灸十炷日三四次



水藥方 治結毒諸症

新汲水 百二十匙 茂栗狐立七斯 五厘 或七厘

蜂蜜 四匙

右三味攪勻七分七日服盡

遺毒散 治便毒 壽世保元

歸尾 芍藥 白芷

銀花 花粉 殭蚕

芒硝 木鱉子 穿山甲

大黃

右十味酒煎溫服厚蓋出汗

治楊梅毒瘡 劉氏經驗方

膽礬 白礬 水銀 各三匙

右三味研不見星入香油少許和勻座帳內取藥  
塗兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦  
盡即臥汗出或大便赤垢口出穢涎為驗每二次  
強者用四匙弱者二匙連用三日外用疎風散并澡  
洗

奇中湯 治癰毒在下部者 家方



奇良

大黃

芎窮

忍冬

各一錢

昆布

上好者方寸半連鹽用

右以水二合煮取一合服

伯州散

一名螃蟹散

治結毒及諸惡瘡

類方多有之今所舉方平

日所經驗者○或曰此方伯州川民間古來所傳故名又曰螃蟹與伯著國音通故醫以爲隱名未知何是

毛蟹

一名螃蟹和名津加

反鼻

各燒存性○速按藥舖所齏精自者藥力甚微

沉香

五錢上好者

鹿角霜

各十五錢

右四味細末每服五分日五次温酒送下○有下方加大黃者亦佳

治便毒不起脹及不發潰者方

片倉元周

麪粉

白芥子

各等分研

右二味盛絹囊浸滾湯頻熨患處

雷火神鍼

外科正宗

戟艾

三錢

丁香

五分

麝香

二分

藥與戟艾揉和先將夾紙作筒如指麤大用艾藥登實收用臨用以肖山紙七層平放患上將鍼點



著一頭對患向紙捺實待不痛方起鍼ヲ

龍膽瀉肝湯 治下疳便毒諸濕毒方 万病回春

車前子 通州 生地黃

當歸 山梔子 黃芩

甘艸 各五分 澤瀉 龍膽 各一錢半

右九味水煎服

鷄肉丸 治結毒諸症ヲ

鷄肉 四錢半 人言 二分

右盛土油盞密封勿使氣漏架火上燒二炷香時

カハラケ

フクシカク

ヒクワニホシクヘ

下火俟冷為糊丸一日服益乃服至七日搜風解毒湯送下服二三日身當麻痺是瞑眩耳劇者後方能定之ヲ

石榴湯

石榴 二錢半 甘艸 一錢

右以水二合煮取一合半服雖輕粉生々乳之瞑眩亦可服

蓋藤湯 治服輕粉水銀生々乳劑等藥或煙法等之  
瞑眩口中腐爛者其奇驗非平常綠豆石榴



癰疽

劑等之比家方

野薔薇根皮三 芫

甘艸五分

石膏二 芫

右以水二合煮取一合適寒溫含半晌俟凝如柳漆乃吐出如此數次以藥汁終日含不斷口中為妙

附錄

一 張子和療王宰妻病胸膈不利用痰藥一涌而出雪白蟲一條有口鼻牙齒走于涎中病者忿而斷之中有白髮一莖又嘉靖初長洲鄒表妻患小腹下左生一塊形如梅李久之吐出始則腐潰若米糝之狀中則若蜆肉之形以指撚開則有長髮數條在其中名醫竟不能治遂至不起予嘗以為如此說皆妄談謬言世間豈有如斯者乎安永越府商人米屋一左衛門者嘗病瘰為痼疾一日來告

癰疽



先君蘭齋先生曰尿道出一米粟先生求視之果是米粟莫可復疑者剖視之亦見黑髮數條在其內是予所待坐親睹由此觀之古人所言之怪症奇疾亦有未可概以爲皆妄譚者矣

一甲寅秋治姪女八木氏疾八木氏年二十有奇素有遺毒眼胞常赤爛或腿間生小瘡或陰瘡痒痛乍治乍復無有間日予與梅肉丸取瀉十日許諸症頓退且有所不圖而愈者渠腕上常有瘤如梅子大是亦因此舉而遂消

一甲寅春游平安謁皆川淇齒先生話及醫事先生曰古今醫論寒熱榮衛而未知人軀中有鹽氣者疑結下部而爲害百爾下部病之所以爲難治者爲是故爾予以爲理或然便製方試諸事實頗覺殊効即本篇所載奇中七味解毒是也蓋其方意取于海草連鹽用之以同氣相求之理撼其在下部之鹽氣而拔之是雖未知其理果然其藥果當其理否乎今用之見殊効則淇齒先生之賜也又觀梅肉丸方本用橄欖近代以梅諸肉而奏効如



斯者則與予所製海草劑之方意或同一理者與  
或曰是說恐鑿矣此用粉諸肉意為鎮輕粉耳鏡  
之傳水銀必收以烏梅可徵也予曰固然雖唯  
鎮粉毒而已何必以梅諸肉只用自梅或烏梅而  
已則知此丸之鹽亦不使鎮粉毒而已必有所以為  
矣也

一風茄雖瞑眩卒暴其用之少則莫有此慮即如  
前所記越府新在家某女之治法儻欲速驗者以  
六七分或一錢頓服之則見即効雖然虛羸及多  
熱症不可與蓋此藥只使其凝結筋骨者姑浮動  
散蔽之而已故雖得即驗後數旬復必發舊症醫

人須乘其毒散釋之時而以他藥驅之可也

一予嘗俾家僮終日剉麻黃浸水者曰左手指頭覺  
麻痺予診之脉腹無異候後復剉之想如初予亦  
診之而無他故於是乎予以為其所以名之用麻  
字者恐以有此毒故焉當夜入寢思之不輟乃思  
至麻芋之麻亦不無緣故矣侵早採麻葉方欲試  
諸家僮適門生蘭溪者來諮淮南肆某之治即本  
篇所  
記予曰天豈祐我哉乃製頑丹之方而以授之果  
有能大類風茄焉予之本州地固在北氣候寒涼



雜錄

故植風茄有能秀者鮮矣自製頑丹以往麻劑大  
得其便然未多試病客矣則如前頑丹方下所言

後檢本州麻  
條少見其端

一天明中有一醫游越售其伎未詳何國人一徽家  
請治醫乃詣藥舖沽輕粉大黃各一兩合劑頭服  
之明日病人忽然斃又一老醫施粉劑過多眩  
酷烈唇殞如截筒狀瞑眩定之後病客責復唇醫  
無辭可以抵賴而大窘焉病客終身患之此兩事  
足以戒初學蓋輕粉之峻毒功害俱大矣猶下魏延

之勇悍武侯御之而能致殊歎候沒之後果蘇狼  
心也持衡者可不慎乎

一明愈弁曰嘗聞河豚有不可食者三赤目蒼點燕  
尾餘若烹庖得法可食能殺痼疾不熟食之令人  
麻子不熟食之令人脹食其眼則酸迷記天明中  
越府茶屋安兵衛者煮河豚舉家食之當夜腹痛  
大熱咸頓殭唯主人雖同中毒幸得存命矣庸婦  
以鏡中殘魚將捨河水其向隣老嫗家貧窶見庸  
婦捨魚請曰吾今窮殆瀕死請賜之脫斯朝飢乃

迷按酸恐  
痾之誤

蘇翁評



死固所安若不死亦可矣便食而竭欣然還然不見少恙後數歲保天年而沒矣可見河豚之毒人祇依人々烹賦之異而然則未可必曰有異岳有毒者害人又烹庖不得法殺人而其他無故矣於是乎更知河豚之可畏

一越府象屋半兵衛者病腰痛累月屢更醫不見一効請伎予診之脉沉緊羸瘦心下鞭痛食不下者十日許乃以紫圓下之三日與小陷胃湯數日心痛漸退每餐喫小二盞旬許食益多神覺稍爽快

當時予意怡々以爲治得其的中不日當愈矣居二旬許右背去推骨三寸許京門上六七寸所生一瘡色焮赤覺微痛四五日後大起脹殷紫乃辭予請瘍醫刺之一日使報曰瘡中出飯數粒予安其言置而不顧次日又報曰出飯頗多即往診且捏其膿只逆出濃膿五色相雜者而已不見所謂飯者病者曰欲出之只有此術即將腹努力努張右背者狀乃飯粒併膿逆飛者數百粒予熟視之果然是精飯始知其言之不妄後數日口飲食一



合即瘡口出<sub>一</sub>合<sub>一</sub>則前後兩竅皆爲問物當時病  
 夫服<sub>一</sub>醫之藥<sub>一</sub>予只傍觀而已後七日請予之族  
 醫天野拙庵<sub>一</sub>診之<sub>一</sub>未<sub>一</sub>昇藥來<sub>一</sub>敝廬問<sub>一</sub>予之意<sub>一</sub>  
 予曰必也無<sub>一</sub>術然<sub>一</sub>殆不可治也拙菴曰然予  
 亦有術未知<sub>一</sub>足下之政如何<sub>一</sub>乃各書<sub>一</sub>諸掌上<sub>一</sub>而按<sub>一</sub>  
 之<sub>一</sub>兩掌同<sub>一</sub>寫粉字<sub>一</sub>予笑曰予與吾正<sub>一</sub>方今之郭荀<sub>一</sub>  
 哉拙菴便與<sub>一</sub>七寶丸<sub>一</sub>兼用<sub>一</sub>煎湯丸湯咸自瘡口流  
 出<sub>一</sub>形色不少<sub>一</sub>縑變<sub>一</sub>醫之術於是乎總<sub>一</sub>窮矣未<sub>一</sub>幾<sub>一</sub>而  
 斃

癩瘡鄙言大尾

并畑治藏



伊藤數馬著

享和三年癸亥正月

二條通油小路東入

皆山三郎右衛門

衣棚二條下

西村吉兵衛

全

皇都書林

二條通抑馬場東入

林伊兵衛

刻





