



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

原本無方目
以其各證皆
舉方也今一
方主衆證則
始證舉方而
餘證刪之除
重複矣故揭
方目備搜索

校正傷寒論卷之二下方目

卷之二太陽病篇十一首

桂枝湯

桂枝去芍藥湯

桂枝加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝二越婢一湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥甘草湯

甘草乾薑湯

卷之三太陽病篇三十五首

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

桂枝加厚朴杏子湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

茯苓四逆湯

調胃承氣湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

柴胡加芍硝湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當丸

卷之四太陽病篇二十六首

大陷胸丸

大陷胸湯

小陷胸湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋復代赭石湯

桂枝人參湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷之五陽明病篇八首

大承氣湯

小承氣湯

蜜煎方

猪膽汁

茵陳蒿湯

麻子仁丸

梔子蘗皮湯

麻黃連翫赤小豆湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

同卷少陰病篇二首

麻黃細辛附子湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

吳茱萸湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散

白通湯

白通加猪膽湯

真武湯

通脈四逆湯

四逆散

猪苓湯

四逆湯

烏梅丸

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

右傷寒藥方合百六首

卷之七霍亂陰陽易差後勞復病篇六首

四逆加人參湯

理中丸

通脈四逆加猪膽湯

燒裈散

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

合六首

右全篇藥方通計百十二首

方目

終

校正傷寒論卷之二下

原方一十四首
古今除重複得十一方



原本曰作爲

辨太陽病脉證并治上第一合一十六法
太陽之爲病。脉浮。頭項強痛而惡寒。

太陽病。發熱汗出。惡風。脉緩者。名爲中風。

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脉陰陽俱緊者。名曰傷寒。

傷寒一日。太陽受之。脉若靜者。爲不傳。頗欲吐。若躁煩。脉數急者。爲傳也。

傷寒二三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。

太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。若發汗已。身灼熱。若名風溫。風溫爲病。脉陰陽俱浮。自汗出身重。多眠睡。

原本名字下
有曰字

鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。剝則如驚癇。時瘓癰。若火熏之一逆尚引日。再逆促命期。

病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽七日愈。發於陰六日愈。以陽數七。陰數六。故也。太陽病頭痛。至七日以上。自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。針足陽明。使經不傳則愈。

太陽病。欲解時。從巳至未上。

風家表解而不了了者。十二日愈。

病人身大熱。反欲得衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗵嗵。惡寒。浙浙。惡風。翕翕。發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

桂枝

三兩
去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩
炙

生薑

三兩
切

太棗

十二枚擘

右五味。㕮咀三味。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已須臾。飲熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。遍身蟄蟄。微似有汗者益佳。不可令如水流離。病必不除。若一服汗出病差。停後服不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服

一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三

劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主

之

葛根

四兩

麻黃

三兩

芍藥

二兩

生薑

三兩

切

甘草

二兩

大棗

十二枚

桂枝

二兩

去皮

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫內

諸藥

煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜

粥餘如桂枝法將息及禁忌

臣億等謹按仲景本論

傷寒無汗用麻黃今證云汗出也

太陽中風自汗用桂枝

惡風而方中有麻黃恐非本意

證云無汗惡風正此

此方同是合用麻黃也此云桂枝加葛根湯恐是桂枝中但加葛根耳

卷有葛根湯
方中有麻黃
正此方同
證云無汗惡
風是合用麻
黃也此云桂
枝加葛根湯
恐是桂枝湯
中但加葛根
耳

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此爲壞病桂枝不中與之也觀其脉證知犯何逆隨證治之桂枝本爲解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與之也常須識此勿令誤也

若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。

桂枝

三兩去皮

芍藥

三兩

甘草

三兩炙

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

附子

一枚炮去皮破八片

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加附子。將息如前法。

太陽病。下之後。脈促曾滿者。桂枝去芍藥湯主之。促一作縱。

若微惡寒者。桂枝去芍藥加附子湯主之。桂枝去芍藥湯

桂枝

三兩去皮

甘草

二兩炙

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

右四味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥加附子。將息如前法。

桂枝

三兩去皮

甘草

二兩炙

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝

三兩去皮

甘草

二兩炙

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

附子

一枚炮去皮破八片

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥加附子。將息如前法。

太陽病得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一旦二三度發。脈微緩者。爲欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必痒。宜桂枝麻黃各半湯。

桂枝

一兩
銖去皮

芍藥

生薑

切
甘草炙

麻黃

各一兩
去節

大棗

四枚
擘

杏仁

二十四枚
湯浸
去皮尖及兩仁

者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥
煮取一升八合去滓溫服六合本云桂枝湯三合麻
黃湯三合併爲六合頓服將息如上法臣億等謹按桂枝湯方桂枝芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚麻黃一兩杏仁七十銖今以算法約之二湯各取三分之二即得桂枝一兩十六銖芍藥生薑甘草各一兩大棗四枚杏仁二十三枚零三分一枚之二权之得二十四箇合方詳此方乃三分之一非各半也宜云合半湯

桂枝湯則愈

服桂枝湯大汗出麻洪大者與桂枝湯如前法若形如
瘧一日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

桂枝

一兩十七
銖去皮

芍藥

一兩
六銖

麻黃

十六枚
去節

生薑

一兩六
銖切

杏仁

十六箇
去皮尖

甘草

一兩二
銖炙

大棗

五枚
擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥
煮取二升去滓溫服一升日再服本云桂枝湯二分

麻黃湯一分合爲二升分再服今合爲一方將息如
前法臣億等謹按桂枝湯方桂枝芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚麻黃湯方麻黃三兩桂枝二兩甘草二兩杏仁七十箇今以算法約之桂枝湯取十二分之五卽得桂枝芍藥生薑各一兩六銖甘草二十枚大棗五枚麻黃湯取九分之二卽得麻黃十六枚桂枝十枚三分銖之二权之得十一枚甘草炙

桂枝湯主之。
太陽病。發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可
更發汗。宜桂枝二越婢一湯。服桂枝湯。大汗出後。大煩渴。不解。脈洪大者。白虎加人
參湯主之。

桂枝去皮 芍藥 麻黃 甘草各十八銖
大棗擘四枚 生薑一兩二銖切 石膏二十四銖碎綿裹

右七味。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮
取二升。去滓。溫服一升。本云當裁爲越婢湯。桂枝湯
合之。飲一升。今合爲一方。桂枝湯二分。越婢湯一分。

臣億等謹按桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二枚。越婢湯方。麻黃二兩。生薑三兩。甘草二兩。石膏半斤。大棗十五枚。今以算法約之。桂枝湯取四分之一。卽得桂枝芍藥生薑各十八銖。甘草十二銖。大棗三枚。越婢湯取八分之一。卽得麻黃十八銖。生薑九銖。甘草六銖。石膏二十四銖。大棗一枚。八分之七并之。二湯所取相合。卽共得桂枝芍藥甘草麻黃各十八銖。生薑一兩三銖。石膏二十四銖。大棗四枚。合方舊云桂枝三今取四分之一。卽當云桂枝二也。越婢湯方。見仲景雜方中外臺秘要。一云起湯解。

服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿
微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。
芍藥三兩 甘草二兩 生薑切 白朮

茯苓各三兩 大棗十二枚擘

右六味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。小便利。

則愈。本云桂枝湯今去桂枝加茯苓白朮。
傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂
枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者
作甘草乾薑湯與之以後其陽若厥愈足溫者更作芍
藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和譏語者少與調
胃承氣湯若重發汗後加燒針者四逆湯主之

甘草乾薑湯方

甘草炙四兩 乾薑二兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

芍藥甘草湯方

白芍藥四兩 甘草各四兩炙

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

成本形作證

問曰證象陽且按法治之而增劇厥逆咽中乾而脛拘
急而譏語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言
何以知此答曰寸口脈浮而大浮爲風大爲虛風則生
微熱虛則兩脛攣病形象桂枝因加附子參其間增桂
令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內
結譏語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱
脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微
溏則止其譏語故知病可愈

大日本

尾張

淺野徵元甫校

校正傷寒論卷之二

原方三十九

首今除重複

得三十五首

校正傷寒論卷之三

辨太陽病脈證并治中第二

合六十六法方三十九首并見太陽陽明合病

法

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

葛根

四兩

麻黃

三兩

去節

桂枝

二兩

去皮

生薑

三兩

切

甘草

二兩

炙

芍藥

二兩

大棗

十二枚

擘擣

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗餘如桂枝法將息及禁忌諸湯皆倣此

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

葛根

四兩

麻黃

三兩

甘草

二兩

芍藥

二兩

桂枝

二兩

生薑

二兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之促一作縱

葛根

半斤

甘草

二兩

黃芩

三兩

黃連

三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

二兩

杏仁

七十箇去尖皮

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

太陽與陽明合病喘而胷滿者不可下宜麻黃湯

太陽病十日以去脉浮細而嗜臥者外已解也設胷滿脅痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞞此爲逆也大青龍湯

麻黃六兩去節

桂枝二兩去皮

甘草二兩炙

杏仁四十枚去皮

失皮生薑三兩切

大棗十枚擘

石膏如雞子大碎

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉
撲之一服汗者停後服若復服汗多亡陽遂虛惡風
煩躁不得眠也

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或
噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

凡一方主治
多證者以證
雖異本則一
也如此方及

桂枝各三兩去皮 五味子半升 半夏半升洗
右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升若渴者去半夏加桔梗根
三兩若微利去麻黃加荳蔻如一雞子熬令赤色若
噎者去麻黃加附子一枚炮若小便不利少腹滿者
去麻黃加荳蔻四兩若喘者去麻黃加杏仁半升去
皮尖且荳蔻不治利麻黃主喘今此語反之疑非仲
景意臣億等謹按小青龍湯大要治水又按本草荳蔻
花下十二水若水去利則止也又按千金形腫
者應內麻黃乃內杏仁者以麻黃發其陽故也以此證之豈非仲景意也

小柴胡湯是也若一方不足主治則加一二味治之
如葛根加半夏湯柴胡加龍骨牡蠣湯是也而今就各證加本者皆出于後人者也下皆同

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此

寒去欲解也小青龍湯主之

太陽病。外證未解。脉浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。
太陽病。下之微喘者。表未解散故也。桂枝加厚朴杏子湯
主之。

桂枝三兩去皮 甘草二兩炙 生薑三兩切 芍藥三兩
大棗十二枚 厚朴二兩炙去皮 杏仁五十枚去皮尖
右七味。以水七升。微火煮取三升。去滓。溫服一升。覆
取微似汗。

成本解下有者字
太陽病。外證未解。不可下也。下之爲逆。欲解外者。宜桂
枝湯。

太陽病。先發汗不解。而復下之。脉浮者不愈。浮爲在外
而反下之。故令不愈。今脉浮。故在外。當須解外。則愈。宜

桂枝湯

太陽病。脉浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍
在此。當發其汗。服藥已微除。其人發煩目瞑。劇者必衄。
衄乃解。所以然者。陽氣重也。麻黃湯主之。

太陽病。脉浮緊。發熱。身無汗。自衄者愈。

二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出。不徹。因轉屬
陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。
下之爲逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫
鬱在表。當解之。若發汗不徹。不足言。陽氣怫鬱。不
得越。當汗不汗。其人躁煩。不知痛處。乍在腹中。乍在四
肢。按之不可得。其人短氣。但坐以汗出。不徹故也。更發

汗則愈。何以知。汗出不徹。以脉濇故知也。

脉浮數者。法當汗出而愈。若下之。身重心悸者。不可發汗。當自汗出。乃解。所以然者。尺中脉微。此裏虛。須表裏實津液自和。便自汗出愈。

脉浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知。然以榮氣不足。血少故也。

脉浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯。

脉浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。

病常自汗出者。此爲榮氣和。榮氣和者。外不諧。以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脈中。衛行脈外。復發其汗。榮衛和。則愈。宜桂枝湯。

病人藏無他病。時發熱。自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗。則愈。宜桂枝湯。

傷寒。脉浮緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。

傷寒。不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者必衄。宜桂枝湯。

傷寒。發汗已解。半日許。復煩。脉浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。

凡病。若發汗。若吐。若下。若亡。津液陰陽自和者。必自愈。大下之後。復發汗。小便不利者。上津液故也。勿治之。得小便利。必自愈。

標正復集卷之三
汗之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外但虛故也

汗之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

乾薑一兩附子一枚生用去皮切八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後身疼痛脉沈遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人

參三兩新加湯主之

桂枝二兩芍藥四兩甘草二兩人參三兩去皮

大棗十二枚擘生薑四兩

右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升

桂枝四兩去皮甘草二兩

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩去節杏仁五十箇甘草二兩

石膏半斤碎

右四味以水七升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮

取二升去滓溫服一升

發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之

桂枝四兩去皮甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗

湯主之

茯苓 半斤

桂枝 四兩 去皮

甘草 二兩 炙

大棗 十五枚 摧

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐

取用之

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之

厚朴 半斤 去皮

生薑 半斤 切

半夏 半升 洗

甘草 二兩

人參 一兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝脅起則頭眩脉沈

緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

茯苓 四兩

桂枝 三兩 去皮

白朮 甘草 各二兩 炙

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

芍藥 甘草 各三兩 炙

附子一枚炮去皮破八片

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫三服疑

非仲景方

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

茯苓 四兩

人參 一兩

附子一枚生用去皮破八片

甘草 二兩 炙

乾薑 半兩

疑非仲景方
五字後人所
加當刪本

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日二服
發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣
與調胃承氣湯玉函云與小承氣湯

芒消半升

甘草二兩炙

大黃四兩去皮清酒洗

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更煮兩沸頓服

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散主之

猪苓十八銖去皮

澤瀉一兩六銖

白朮十八銖

茯苓銖十八

桂枝半兩去皮

西漢書

右五味擣爲散以白飲和服方寸七日三服多飲緩水汗出愈如法將息

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

茯苓二兩

桂枝二兩去皮

甘草一兩炙

生薑三兩切

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

未持脉時病人手叉自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聲無聞也所以然者以重發汗虛故如此

成本二兩作二刃其他兩
皆作刃

原本此章典
前章併非

校正傷寒論 卷之三

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘。

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止。發汗下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒。音到心中懊惱。上烏浩。下奴冬切。下同 梓子豉湯主之。若少氣者梓子甘草

豉湯主之。若嘔者梓子生薑豉湯主之。

梔子豉湯方

梔子十四

箇擘

香豉四合

綿裹

右二味以水四升先煮梔子得一升半內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服得吐者止後服

梔子甘草豉湯方

梔子十四

箇擘

甘草二兩

綿裹

香豉四合

綿裹

右三味以水四升先煮梔子甘草取二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子生薑豉湯方

梔子十四

箇擘

生薑五兩

綿裹

香豉四合

綿裹

右三味以水四升先煮梔子生薑取二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

發汗若下之而煩熱脅中窒者梔子豉湯主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之

梔子十四

箇擘

厚朴四兩

枳實

四枚浸水
炙令黃

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進
一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯
主之

梔子十四箇 薑一兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進

一服得吐者止後服凡用梔子湯病人舊微溏者不
動振振欲擗一作辟地者真武湯主之

咽喉乾燥者不可發汗

可與服之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞶
動振振欲擗一作辟地者真武湯主之

淋家不可發汗發汗必便血瘡家雖身疼痛不可發汗
汗出則痊

衄家不可發汗汗出必額上陷脉急緊直視不能目睭
音喚又胡絅切不得眠

下同一作瞬不得眠

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸

闕

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘一作逆

此章成無忌
之註不穩疑
錯誤

本發汗而復下之此爲逆也若先發汗治不爲逆本先
下之而反汗之爲逆若先下之治不爲逆

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏

後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表

原本凡用梔
子湯以下別
爲一章非

宜桂枝湯

病發熱頭痛。脉反沈。若不差。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯。

太陽病先下而不愈。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因致冒。冒家汗出。自愈。所以然者。汗出表和。故也。裏未和。然後復下之。

太陽病未解。脉陰陽俱停。一作微必先振慄汗出而解。但

陽脈微者。先汗出而解。但陰脈微。一作脉實者。下之而解。

若欲下之。宜調胃承氣湯。一云用大柴胡湯

太陽病發熱汗出者。此爲榮弱衛強。故使汗出。欲救邪

風者。宜桂枝湯。

傷寒五六日。中風。往來寒熱。胷脅苦滿。嘿嘿不欲飲食。心煩喜嘔。或胷中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脅下痞鞚。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或歎者。小柴胡湯主之。

柴胡

半斤

黃芩

三兩

人參

三兩

半夏

半升洗

甘草

炙

生薑

各三兩切

大棗

十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服。一升。日三服。若胷中煩而不嘔者。去半夏人參。加栝樓一枚。若渴去半夏。加人參合前成四兩半。栝樓根四兩。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥三兩。若脅下痞鞚。去大棗。加牡蠣四兩。若心下悸。小便不利者。

去黃芩加茯苓四兩。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂枝三兩。溫覆。微汗愈。若歟者。去人參。大棗。生薑。加五味子半升。乾薑二兩。

血弱氣盡。腠理開。邪氣因入。與正氣相搏。結於脅下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。嘿嘿不欲飲食。藏府相連。其痛必下。云藏府相連。其病必下。脅高。中痛。小柴胡湯主之。服柴胡湯已。渴者屬陽明。以法治之。

得病六七日。脈遲浮弱。惡風寒。手足溫。醫二三下之。不能食。而脅下滿痛。面目及身黃。頸項強。小便黃者。與柴胡湯。後必下重。本渴。飲水不而嘔者。柴胡湯不中與也。食

穀者。噦不

傷寒四五日。身熱惡風。頸項強。脅下滿。手足溫而渴者。小柴胡湯主之。
傷寒陽脈濶。陰脈弦。法當腹中急痛先。與小建中湯不差者。小柴胡湯主之。
小建中湯方

桂枝三兩 去皮 甘草二兩 炙 大棗十二枚 摼 芍藥六兩 切 生薑三兩

膠飴一升

右六味以水七升。煮取三升。去滓。內飴。更上微火。消解。溫服一升。日三服。嘔家不可用。建中湯以甜故也。
傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。凡柴胡湯病證而下之。若柴胡證不罷者。復與柴胡湯。必蒸蒸。

而振却後發熱汗出而解。

傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。
太陽病過經十餘日。反二三下之後。四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡。嘔不止。心下急。一云嘔止。小安鬱鬱微煩者。
爲未鮮也。與大柴胡湯下其則愈。

柴胡半斤

黃芩三兩

芍藥二兩

半夏半升

生薑五兩

枳實四枚

大棗十二枚

柴胡微本事方大柴胡湯有大黃半而且方下曰伊尹湯液論大柴胡湯大黃同姜棗八味今監本無脫文也由此觀之有大黃爲是且皇甫謐謂張仲景論廣湯液論爲傷寒論者益審矣

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加恐不爲大柴胡湯。

傷寒十三日不鮮。脅脅滿而嘔。日晡所發潮熱已而微

利。此本柴胡證。下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜服小柴胡湯以鮮。外後以柴胡加芒消湯主之。

柴胡二兩十

六銖

黃芩一兩

人參一兩

甘草一兩

炙

生薑一兩

切

半夏二十銖

本

洗

大棗四枚

擘

芒消二兩

右八味以水四升煮取二升去滓內芒消更煮微沸分溫再服。不解更作。臣億等謹按金匱玉函方中無芒消別一方云以水七升下芒消二合大黃四兩桑螵蛸五枚煮取一升半服五合微下即愈本云柴胡再服以解其外餘二升加大黃消不足取

大黃桑螵蛸也

傷寒十三日不解。過經讞語者。以有熱也。當以湯下之。

若小便利者。大便當鞭而反下利。脉調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此爲內實也。調胃承氣湯主之。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。當先解其外。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯。

桃仁

五十箇去皮尖

大黃

四兩

桂枝

二兩去皮

甘草

炙二兩

芒消

二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓。內芒消更上火微沸下。火先食溫服。五合日三服。當微利。

傷寒八九日下之。胷滿煩驚。小便不利。譏語。一身盡重。

不可轉側者。柴胡加龍骨牡蠣湯主之。

柴胡

四兩

龍骨

黃芩

生薑切

鉛丹

人參

桂枝

去皮

茯苓

各一兩半

半夏

二合半洗

大黃

二兩

牡蠣

一兩半熬

大棗

六枚擘

右十二味以水八升煮取四升。內大黃切如碩子。更煮一兩沸去滓。溫服一升。本云柴胡湯今加龍骨等。

傷寒腹滿譏語。寸口脉浮而緊。此肝乘脾也。名曰縱刺期門。

傷寒發熱。嗇嗇惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小便利。其病欲解。此肝乘肺也。名曰橫刺期門。

太陽病二日。反躁。反熨其背。而大汗出。大熱入胃。一作

其汗二字疑
衍文

林正伯集論 卷之三
自下利者。此爲欲解也。故其汗從腰以下不得汗。欲小便。不得反嘔。欲失溲。足下惡風。大便鞭。小便當數。而反不數。及不多。大便已。頭卓然而痛。其人足心必熱。穀氣下流。故也。

太陽病中風。以火劫發汗。邪風被火。熱血氣流溢。失其常度。而陽相熏灼。其身發黃。陽盛。則欲衄。陰虛。小便難。陰陽俱虛竭。身體則枯燥。但頭汗出。劑頸而還。腹滿微喘。口乾咽爛。或不大便。久則譫語。甚者至囁。手足躁擾。捻衣摸床。小便利者。其人可治。

傷寒脉浮。醫以火追劫之。亡陽必驚狂。臥起不安者。桂

枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

桂枝

三兩去皮

甘草

二兩炙

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

牡蠣

五兩熬

蜀漆

三兩洗去腥

龍骨

四兩

右七味。以水一斗二升。先煮蜀漆減二升。內諸藥煮。取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨。

形作傷寒。其脈不強緊而弱。弱者必渴。被火必譫語。弱者發熱。脉浮。解之當汗出愈。

太陽病。以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。名爲火邪。

脉浮熱甚。而反炙之。此爲實。實以虛治。因火而動。必咽

燥吐血

微數之脉。慎不可灸。因火爲邪。則爲煩逆。追虛逐實。血散脉中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。脉浮宜以汗解。用火灸之。邪無從出。因火而盛。病從腰以下必重而痺。名火逆也。

原本此章與前章併非今分之

汗出解

燒針令其汗。針處被寒。挾起而赤者。必發奔豚氣。從少腹上衝心者。灸其挾上各一壯。與桂枝加桂湯。更加桂二兩也。

桂枝

五兩去皮

芍藥

三兩

生薑

三兩切

甘草

二兩炙

大棗

十二枚

右五味。以水七升煮。取三升去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加桂五兩。所以加桂者。以能泄奔豚氣也。

火逆下之。因燒針煩躁者。桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。

桂枝

一兩去皮

甘草

二兩炙

牡蠣

二兩熬

龍骨

二兩

右四味。以水五升煮。取二升半去滓。溫服八合。日三

服

太陽傷寒者。加溫針。必驚也。

太陽病。當惡寒發熱。今自汗出。反不惡寒發熱。關上脉細數者。以醫吐之過也。一二日吐之者。腹中飢口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫

本草綱目 卷之三

七

吐之所致也。此爲小逆。

太陽病。吐之。但太陽病。當惡寒。今反不惡寒。不欲近衣。此爲吐之內煩也。

病人脈數。數爲熱。當消穀引食。而反吐者。此以發汗。令陽氣微。膈氣虛。脈乃數也。數爲客熱。不能消穀。以胃中虛冷故吐也。

太陽病。過經十餘日。心下溫溫。欲吐。而脅中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時。自極。吐下者。與調胃承氣湯。若不爾者。不可與。但欲嘔。脅中痛。微溏者。此非柴胡湯。證以嘔。故知極吐下也。

太陽病。六七日。表證仍在。脉微。而沈。反不結胸。其人發

狂者。以熱在下焦。少腹當鞭滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀熱在裏故也。抵當湯主之。

水蛭

熬

蟲蟲各三十箇去翅足

桃仁

二十箇去皮尖

服

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。不下更

太陽病。身黃。脈沈結。少腹鞭。小便不利者。爲無血也。小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯主之。

傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。當下之。不可餘藥。宜抵當丸。

水蛭

二十箇去

蟲蟲

二十箇去翅足

桃仁

二十五箇去皮尖

大黃 二兩

右四味。擣分四丸。以水一升。煮一丸。取七合。服之。猝時當下血。若不下者。更服。太陽病。小便利者。以飲水多。必心下悸。小便少者。必苦裏急也。

大日本 尾張

淺野徽元甫校

校正傷寒論卷之三

校正傷寒論卷之四

原方三十首
今除重複得
二十六首

辨大陽病脉證并治下第七 合三十九法 方三十首
并見太陽少陽合病法
問曰。病有結脅。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛。寸脉浮。關脉沈。名曰結脅也。何謂藏結。答曰。如結脅狀。飲食如故。時時下利。寸脉浮。關脉小細沈緊。名曰藏結。舌上白胎滑者難治。

藏結無陽證。不徃來寒熱。一云。寒熱而不熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。

病發於陽。而反下之。熱入。因作結脅。病發於陰。而反下之。因作痞也。所以成結脅者。以下之太早故也。結脅者。項亦強。如柔痓狀。下之則和。宜大陷胸丸。

大黃半斤 蕤蘆子半升 芎消半升

杏仁半升去皮

尖熬黑

右四味。擣篩二味。內杏仁芎消合研如脂。和散取如彈丸一枚。別擣甘遂末一錢七分。白蜜二合水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更服。取下爲效。禁如藥法。

結胷證。其脉浮大者。不可下。下之則死。

結胷證悉具。煩躁者亦死。

太陽病。脉浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣

躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞶。則爲結胷。大陷胷湯主之。若不結胷。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。大陷胷湯

大黃六兩去皮 芎消一升 甘遂一錢

右三味。以水六升。先煮大黃。取二升。去滓。內芎消。煮一兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利止後服。

傷寒六七日。結胷熱實。脉沈而緊。心下痛。按之石硬者。大陷胷湯主之。
傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胷無大熱者。此爲水結在胷脅也。但頭微汗出者。大陷胷湯主之。

太陽病重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。一云。日晡所發心脅大煩。從心下至少腹。鞭滿而痛不可近者。大陷脅湯主之。

小結脅病。正在心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷脅湯主之。

黃連 一兩

半夏洗 半升

桔梗實 大者一枚

右三味以水六升先煮桔梗。取三升去滓內諸藥煮。取二升去滓分溫三服。

太陽病二三日不能臥。但欲起心下必結。脉微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。必作結脅未止者。四日復下之。此作協熱利也。

分字疑誤

太陽病下之。其脈促。不結脅者。此爲欲解也。脉浮者。必結脅。脉緊者。必咽痛。脉弦者。必兩脅拘急。脉細數者。頭痛未止。脉沈緊者。必欲嘔。脉沈滑者。協熱利。脉浮滑者。必下血。

病在陽。應以汗解之。反以冷水渙之。若灌之。其熱被劫。不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。寒實結脅。無熱證者。與三物小陷脅湯。白散亦可服。一云。與三物小白散。

文蛤散

文蛤 五兩

右一味爲散。以沸湯和一方寸七服。湯用五金。

原本白散亦可服。五字爲一章非。

身熱以下文
理不明疑誤
脫底本亦同

白散

桔梗三分 巴豆一分去皮心 豆蔻研如脂 貝母三分

右三味爲散。內巴豆更於臼中杵之。以白飲和服。強利進熟粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。身熱皮粟不鮮。欲引衣自覆者。若以水浸之洗之。益令熱劫不得出。當汗而不汗。則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥三兩。如上法。

太陽與少陽併病。頭項強痛。或眩冒。時如結胷。心下痞鞶者。當刺太椎第一間。肺俞。肝俞。慎不可發汗。發汗則讖語。脈弦。五日讖語不止。當刺期門。

成本取作写

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而厥遲。身涼。胷脅下滿。如結胷狀。讖語者。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實而取之。

婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘡狀。發作有時。小柴胡湯主之。證未去者。柴胡桂枝湯主之。

桂枝去皮

黃芩一兩

半

人參一兩

甘草一兩

炙

本云以下不可讀也。疑誤脫成此段無

右九味以水七升煮取三升去滓温服一升。本云人渴而不嘔但頭汗出。往來寒熱心煩者。此爲未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。

用人參作半劑

傷寒五六日已發汗而復下之。曾脅滿微結。小便不利。右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升。

成本乾姜生
蛎共作三兩

柴胡半斤

桂枝三兩去皮

乾薑二兩

括樓根四兩

黃芩三兩

牡蠣熬二兩

甘草二兩炙

溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。
傷寒五六日頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。
大便硬。脈細者。此爲陽微結。必有表。復有裏也。脈沈亦
在裏也。汗出爲陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入
在裏。此爲半在裏半在外也。脈雖沈緊。不得爲少陰病。
所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與
小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。

傷寒五六日嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。
柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。必蒸
蒸而振却。發熱汗出而解。若心下滿而鞭痛者。此爲結
胷也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者。此爲痞。柴胡不中

半夏二合半洗

芍藥一兩半

大棗六枚

生薑半切

柴胡四兩

與之宜半夏瀉心湯

半夏

半升洗

黃芩

乾薑

人參

甘草

炙各三兩

黃連

一兩大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服

一方用半夏一升

太陽少陽併病而反下之成結胷心下鞶下利不止水漿不下其人心煩

脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱汗出發作有時頭痛心下痞鞶滿引脅下痛乾嘔短氣汗出

不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

芫花

熬

甘遂

大戟

溫服之平且誤六字疑錯

右三味等分各別搗爲散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢溫服之平且服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因脅煩面白青黃膚瞞者難治今色微黃手足溫者易愈

心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

大黃

二兩

黃連

一兩

右二味以麻沸湯二升瀆之。須臾絞去滓分溫再服。

臣億等看詳太黃黃連瀉心湯諸本皆二味。又後附子瀉心湯用大黃黃連黃芩附子恐是前方中亦有

黃芩後但加附子也。故後云附子瀉心湯本云加附子也。

心下痞而復惡寒汗出者。附子瀉心湯主之。

大黃

二兩

黃連

一兩

黃芩

一兩

附子

一枚炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升瀆之。須臾絞去滓內附子汁分溫再服。

病不可忍者也若強忍之則輕變重二則死故聖人教其救之今云忍之一

本以下之。故心下痞與瀉心湯痞不鮮。其人渴而口燥煩小便不利者。五苓散主之。一方云忍之一日乃愈。傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞕。乾噫食臭。脅下

有水氣腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。

生薑

四兩切

甘草

三兩炙

人參

三兩

乾薑

一兩

黃芩

三兩

半夏

半升洗

黃連

一兩

大棗

十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服。一升日三服。附子瀉心湯本云加附子半夏瀉心湯。甘草瀉心湯同體別名耳。生薑瀉心湯本云理中人參黃芩湯去桂枝加黃連并瀉肝法。

傷寒中風醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞕而滿。乾嘔心煩不得安。醫見心下痞謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞕也。甘草瀉心湯主之。

日乃愈者吾不知何謂是豈仲景叔和之語哉。成本亦載之。然則自宋板校正以前有之也。因知通編之偽章不止叔和後人之所載特解。本云以下四十五字不可說也。成本無

甘草

四兩
炙

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半升
洗

大棗

十二枚
擘

黃連

一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服。一升日三服。臣億等謹按上生薑湯法本云理因發陰而生是半夏生薑甘草湯心以療痞氣中也其方必各有參今甘草湯心中無者脱落之也又按千金并外臺秘要治傷寒醫食此方皆有入參知脱落無疑

藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復不止者當利其小便赤石脂禹餘糧湯

赤石脂一斤碎太一禹餘糧一斤

成本作旋復

代赭石湯

旋復花

三兩

人參

二兩

生薑

五兩

代赭

一兩

甘草

三兩
炙

半夏

半升
洗

大棗

十二枚
擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻

黃杏子甘草石膏湯

校正傷寒論

卷之四

太陽病外證未除而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞕。表裏不鮮者。桂枝人參湯主之。

桂枝四兩 別切 甘草四兩 炙 白朮三兩 人參三兩 乾薑三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升去滓溫服一升日再夜一服。

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者。大柴胡湯主之。

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮。胷中痞鞕氣上衝喉咽不得息者。此爲胷有寒也。當吐之。宜瓜蒂散。

瓜蒂一分 赤小豆一分

右二味各別搗篩爲散已合治之。取一錢七以香豉一合用熟湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之。不吐者少少加得快吐乃止。諸血虛家不可與瓜蒂散。

病脅下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者。此名藏結死。

傷寒若吐若下後七八日不解。熱結在裏表裏俱熱。時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者。白虎加人

參湯主之

知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 人參二兩

粳米六合

此方以下後人之所加不足取也當別本

右五味以水一斗。煮米熟湯成去滓溫服一升。日三服。此方立夏後立秋前乃可服。立秋後不可服。正月二月三月尚凜冷亦不可與服之。與之則嘔利而腹痛。諸血虛家亦不可與。得之則腹痛利者但可溫之當愈。

傷寒無大熱。口燥渴心煩背微惡寒者。白虎加人參湯主之。

飲水無表證者。白虎加人參湯主之。
太陽少陽併病。心下鞭頸項強而眩者。當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。

黃芩湯

黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗十二枚擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升。日再夜一服。

黃芩加半夏生薑湯

黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗十二枚擘

半夏半升

生薑一

兩半切

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜

一服

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯

主之

黃連三兩

甘草三兩

乾薑三兩

桂枝三兩去皮

人參二兩

半夏半升

大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服晝三夜二

疑非仲景方

一云腑下心
下鞭七字成
當削本

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若其人大便鞭

云

本無

臍下心小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝附子湯

桂枝四兩

去皮

附子三枚炮

去皮破

生薑三兩

大棗十二枚擘

甘草二兩炙

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服初一服

去桂加白朮湯

附子三枚炮

去皮破

白朮四兩

生薑三兩

甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服初一服其人身如痺半日許復服之三服都盡其人如冒狀勿怪此以附子朮併走皮內逐水氣未得除故使之

初一服以下
成本無後人
之所加也當
削本

耳法當加桂四兩此本一方二法以大便鞭小便自利去桂也以大便不鞭小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦宜減服之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

甘草炙二兩 附子一枚炮去皮破 白术二兩

桂枝去皮四兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗止復煩者將服五合恐一升多者宜服六七合爲妙

成本以字無傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之

知母六兩

石膏碎一斤

甘草炙二兩

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服臣億等謹按前篇云熱結在裏表裏俱熱者白虎湯主之又云其表不解不可與白虎湯此云脉浮滑表有熱裏有寒者必表裏二字差矣又陽明證云脉浮遲表裏寒四逆湯主之又少陰一證云裏寒外熱通脈四逆湯主之以此表裏自差明矣千金翼云白通湯非也

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之

甘草炙四兩

生薑切三兩

人参

二兩

生地黃

桂枝去皮三兩

阿膠

二兩

麥門冬

半升去心

麻仁

大棗三十枚擘

右九味以清酒七升水八升先煮入味取三升去滓

內膠烊消盡溫服一升日三服一名復脉湯

脉按之來緩時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中止不能自還因而復動者名曰代陰也得此脉者必難治

大日本

尾張

淺野徽元甫校

校正傷寒論卷之四

校正傷寒論卷之五

原方二十首
今除重複得
八首

原字可疑然
成本亦有

辨陽明病脈證并治第八

合四十四法方二十一方
附并見陽明少陽合病法

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。陽明之爲病。胃家實是也。

問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病。若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實。大便難者。此名陽明也。

問曰。陽明病外證云何。答曰。身熱。汗自出。不惡寒。反惡熱也。

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者何也。答曰。雖得之一日。惡寒將自罷。卽自汗出而惡熱也。

問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中主土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。

本太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出。濺濺然者。是轉屬陽明也。

傷寒三日。陽明脈大

傷寒脉浮而緩。手足自溫者。是爲繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。大便鞶者。爲陽明病也。

傷寒轉繫陽明者。其人濺然微汗出也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脉浮而緊。若下之。則腹滿小便難也。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。

陽明病。若中寒者。不能食。小便不利。手足濺然汗出。此欲作固瘕。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷水穀不別故也。

陽明病。初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼翕翕。如有熱狀。奄然發狂。濺然汗出。而解者。此水不勝穀氣。與汙共并。脉緊則愈。

陽明病。欲解時。從申至戌上。

陽明病。不能食。攻其熱必嘔。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。攻其熱必嘔。

陽明病脈遲。食難用飽。飽則微煩。頭眩必小便難。此欲作穀癥。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故也。

陽明病法多汗。反無汗。其身如蟲行皮中狀者。此以久虛故也。

陽明病。反無汗。而小便利二三日。嘔而歟。手足厥者。必苦頭痛。若不歟。不嘔。手足不厥者。頭不痛。

陽明病。但頭眩。不惡寒。故能食。而歟。其人咽必痛。若不歟者。咽不痛。

陽明病。無汗。小便不利。心中懊憹者。身必發黃。

陽明病。被火。額上微汗出。而小便不利者。必發黃。
陽明病。脉浮而緊者。必潮熱。發作有時。但浮者。必盜汗出。

陽明病。口燥。但欲漱水。不欲嚥者。此必衄。

陽明病。本自汗出。醫更重發汗。病已差。尚微煩。不了了者。此必大便鞕。故也。以下津液。胃中乾燥。故令大便鞕。當問其小便日幾行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以津液當還入胃中。故知不久必大便也。

傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。

陽明病。心下鞕滿者。不可攻之。攻之利遂。不止者。死。利

止者愈

本草綱目 卷之五

陽明病面赤色不可攻之必發熱色黃者小便不利也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濶然汗出者此大便已鞢也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下大承氣湯

大黃

四兩酒洗

厚朴

半斤炙去皮

枳實

五枚炙

芍藥

三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更

煮取二升去滓內芍藥消更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯

大黃

四兩

厚朴

二兩炙去皮

枳實

三枚大者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

陽明病潮熱大便微鞢者可與大承氣湯不鞢者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞢後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復

成本至字無

輒而少也。以小承氣湯和之。不轉失氣者慎不可攻也。夫實則讞語虛則鄭聲。鄭聲者重語也。

直視讞語喘滿者死。下利者亦死。

發汗多若重發汗者。其陽。讞語脉短者死。脉自和者不死。

傷寒若吐若下後不解。不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者發則不識。入循衣摸牀。惕而不安。一云循衣妄撮。惕不安微。喘直視。脉弦者生濇者死。微者但發熱讞語者。大承氣湯主之。若一服利則止後服。

陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞶。鞶則

讞語小承氣湯主之。若一服讞語止者更莫復服。
陽明病。讞語發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。因與承氣湯一升。腹中轉氣者更服一升。若不轉氣者勿更與。之明日又不大便。脉反微濇者。裏虛也。爲難治。不可更與承氣湯也。

陽明病。讞語有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五六枚也。若能食者。但鞶耳。宜大承氣湯下之。

陽明病。下血讞語者。此爲熱入血室。但頭汗出者刺期門。隨其實而寫之。澌然汗出則愈。

汗出讞語者。以有燥屎在胃中。此爲風也。須下者過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛裏實故也。下之

愈宜大承氣湯

柴胡湯

傷寒四五日。脉沈而喘滿。沈爲在裏而反發其汗。津液越出。大便爲難。表虛裏實。久則讞語。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁面垢。又作枯 訞語遺尿。發汗則讞語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗出者。白虎湯主之。

二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足熱。汗出。大便難。而讞語者。下之則愈。宜大承氣湯。

陽明病。脉浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗。則躁心憒。公對反切 言語。若加溫針。必怵惕煩躁。不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動

此章原本分爲三章非

膈心中懊惱。舌上胎者。梔子豉湯主之。若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。若脉浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。

陽明病。汗出多而渴者。不可與猪苓湯。以汗多。胃中燥。小便不利。猪苓湯復利其小便故也。

脈浮而遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。若胃中虛冷。不能食者。飲水則噦。

脈浮發熱。口乾鼻燥。能食者。則衄。陽明病。下之。其外有熱。手足溫。不結胷。心中懊惱。飢不能食。但頭汗出者。梔子豉湯主之。

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。曾脅滿不去者。小柴

柏正傳家譜 卷之五
胡湯主之

陽明病。脅下鞭滿。不大便。而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濶然汗出。而解。陽明中風。脈弦浮大。而短氣。腹都滿。脅下及心痛。久按之。氣不通。鼻乾。不得汗。嗜臥。一身及面目悉黃。小便難有潮熱。時時嘔。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脉續浮者。與小柴胡湯。脉但浮無餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿加曬者。不治。

陽明病。自汗出。若發汗。小便自利者。此爲津液內竭。雖鞶不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根。及大猪膽汁。皆可爲導。

蜜煎方

食蜜 七合

右一味。於銅器內。微火煎。當須凝如飴狀。攬之勿令焦著。候可丸。併手捻作梃。令頭銳大。如指長二寸許。當熟時急作冷。則鞭。以內穀道中。以手急抱。欲大便時。乃去之。疑非仲景意。已試甚良。○又大猪膽一枚。瀉汁。和少許法酢。以灌穀道內。如一食頃。當大便出。宿食惡物。甚效。

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。

陽明病。脈浮。無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。

陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。
身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此爲瘀熱在
裏。身必發黃。茵陳蒿湯主之。

茵陳蒿 六兩

梔子十四枚擘

大黃二兩去皮

右三味。以水一斗二升。先煮茵陳減六升。內二味煮。
取三升。去滓。分三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正
赤。一宿腹減黃。從小便去也。

陽明證。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。
故令喜忘。屎雖鞭。大便反易。其色必黑者。宜抵當湯下之。

陽明病。下之。心中懊憹。而煩。胃中有燥屎者可攻。腹微

滿。初頭鞭。後必溏。不可攻之。若有燥屎者。宜大承氣湯。
病人不大便五六日。繞脅痛。煩躁發作有時者。此有燥
屎。故使不大便也。

病人煩熱。汗出。則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明。
也。脈實者。宜下之。脉浮虛者。宜發汗。下之與大承氣湯。
發汗宜桂枝湯。

大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎也。
所以然者。本有宿食故也。宜大承氣湯。

病人小便不利。大便乍難。乍易。時有微熱。喘冒。不能臥
者。有燥屎也。宜大承氣湯。

食穀欲嘔者。屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。屬

上焦也

太陽病。寸緩。關浮。尺弱。其人發熱汗出。復惡寒不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞶。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。渴者宜五苓散。

脉陽微而汗出少者。爲自和也。汗出多者。爲太過。陽脉實。因發其汗出多者。亦爲太過。太過者。爲陽絕於裏。亡津液。大便因鞶也。

脉浮而芤。浮爲陽。芤爲陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。

成本鞭作難

趺陽脉浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則鞶。其脾爲約。麻子仁丸主之。

麻子仁二升

芍藥半升

枳實半斤

大黃一斤

厚朴一尺炙

去皮

杏仁一升去皮尖

熬別作脂

右六味蜜和丸。如梧桐子大。飲服十九日三服。漸加

以知爲度。

太陽病。三日發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。

傷寒吐後。腹脹滿者。與調胃承氣湯。

太陽病。若吐。若下。若發汗後。微煩。小便數。大便因鞶者。

與小承氣湯。和之愈。

校正傷寒論

卷之五

得病二三日。脉弱無太陽柴胡證。煩躁心下鞭至四五日。雖能食以小承氣湯少少與之微和之令小安。至六日與承氣湯一升。若不大便六七日。小便少者雖不受食。但初頭鞭後必溏。未定成鞭攻之必溏。須小便利。屎定鞭乃可攻之。宜大承氣湯。

傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此爲實也。急下之。宜大承氣湯。

陽明病。發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。

陽明少陽合病。必下利。其脈不負者爲順也。負者失也。

成本順字上
爲字無

互相射賊。名爲負也。脉滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

病人無表裏證。發熱七八日。雖脉浮數者可下之。假令已下。脉數不解。合熱則消。穀喜飢。至六七日。不大便者。有瘀血。宜抵當湯。若脉數不解而下不正。必協熱便膿血也。

傷寒發汗已。身目爲黃。所以然者。以寒濕在裏。不解故也。以爲不可下也。於寒濕中求之。

傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。茵陳

蒿湯主之。

傷寒身黃發熱者。梔子蘗皮湯主之。

原本分若脉
於寒溫中水
之者次非仲
景氏之譖其
說在特解
不鮮以下爲
二章非

肥梔子十五

甘草一兩

黃蘂二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服。

傷寒癥熱在裏身必發黃麻黃連軺赤小豆湯主之。

麻黃二兩

連軺一兩連

杏仁四十箇

赤小豆一升

大棗十二枚擘

生梓白皮切一升

生薑二兩

甘草二兩炙

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服半日服盡。

原方一首今刪

辨少陽病脉證并治第九

方一首并見三陽合病法

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下。

吐下則悸而驚
傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譏語此屬胃胃和則愈胃不和煩而悸躁一云

本太陽病不解轉入少陽者脅下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沈緊者與小柴胡湯若已吐下發汗溫鍼譏語柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰故也傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也

傷寒三日少陽脉小者欲已也

校正傷寒論 卷之五
少陽病欲解時從寅至辰上

不須服藥

渴三日三更夜二更人入室食而卒

表六十

大日本

尾張

淺野微元甫校

尚未甚不寐

四村正衛圖書

校正傷寒論卷之五

麓原內

四村正衛圖書

