

類聚方集覽

1803

ヤ 9

1128



誤字考正

賜谷先生著

類聚方集覽 全

生績堂藏



類聚方集覽標註序

東洞子爽著之方極類聚方一
書及醫方分量皆醫家大所寶
也故今集之令可一覽以便日
用又粗有所得者註之其標以

序

示子弟也然方極之文固貴簡
故世人遽見或以為不詳今往
注補註其主症者必以為禪其
術也若夫類聚方者殊貴精嚴
故域而刪之至或有方無症者

多矣蒙士必有疑焉抑古人言
稱六經動及陰陽其志蓋始於
取譬則區別其症之目已告子
不取者惡其辭也惡辭者為
蒙士固執以生惑心之故已雖然

之如斯則有方而無症者不女
世豈得莫有疑者哉今此舉也
舊必刪而再收之亦不豈者不
以欲明其術也要之舊刪與再
收兩存之則子弟之業思過半

矣故舊本矩而域之者不敢削
之有再收者圈其傍以別之皆
標揭其說以審事情其他亦附
出皆平生所施之治驗與張氏
遺書其義相得之說而冀有小

補其漸者已暫言其凡例以為
之序下爾

享和三年庚寅五月

上總 雜問 煥 子昂撰



類聚方集覽目錄

- 桂枝湯
- 桂枝加芍藥湯五
- 桂枝加葛根湯六
- 桂枝加黃耆湯七
- 桂枝加厚朴杏七
- 桂枝加附子湯九
- 桂枝附子湯一
- 桂枝去桂加苓朮湯十
- 桂枝芍藥加皂莢湯十一
- 桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯十二
- 桂枝加桂湯五
- 桂枝去芍藥湯五
- 栝蒌桂枝湯六
- 桂枝加芍藥大黃湯七
- 烏頭桂枝湯八
- 桂枝芍藥加附子湯九
- 桂枝附子芍藥加朮湯二
- 桂枝芍藥加黃辛附湯一
- 桂枝芍藥加龍骨牡蠣湯三

目錄

挂枝加芍藥生姜人參湯 叶	挂枝二越婢一湯 五
挂枝二麻黃一湯 四	小建中湯 六
挂枝麻黃各半湯 五	黃耆挂枝五物湯 七
黃耆建中湯 七	挂枝甘艸湯 八
黃耆挂枝苦酒湯 八	挂枝甘艸附子湯 九
半夏散 八	挂枝人參湯 二
挂枝甘艸龍骨牡蠣湯 九	茯苓甘草湯 十
人蔘湯 十	茯苓戎鹽湯 十
茯苓杏仁甘草湯 二	苓姜朮甘湯 三
葵子茯苓散 三	苓桂甘棗湯 四
苓桂朮甘湯 三	

苓桂五味甘艸湯 四	苓甘五味杏辛湯 五
苓甘杏味辛夏湯 五	苓甘姜味辛夏仁湯 六
苓甘姜味辛夏仁黃湯 六	茯苓澤瀉湯 七
澤瀉湯 七	五苓散 七
茵陳五苓散 八	猪苓湯 九
猪苓散 三	牡蠣澤瀉散 三
八味丸 一	栝蒌瞿麥丸 一
麻黃湯 二	麻黃加朮湯 三
麻黃甘草湯 四	麻黃附子甘艸湯 四
麻黃附子細辛湯 五	麻黃杏仁甘艸石膏湯 五
麻黃杏仁薏苡甘艸湯 五	牡蠣湯 六

麻黃淳酒湯 六冊	生夏麻黃丸 六冊
小青龍湯 七冊	大青龍湯 八冊
文蛤湯 九冊	越婢湯 九冊
越婢加朮湯 十冊	越婢加半夏湯 十四冊
葛根湯 十四冊	葛根加半夏湯 十四冊
葛根黃連黃芩湯 十四冊	小芫胡湯 十四冊
芫胡加芒消湯 十四冊	
芫胡去半夏加栝蒌湯 十四冊	
芫胡加桂枝湯 十四冊	芫胡姜圭湯 十四冊
芫胡加龍骨牡蠣湯 十五冊	大芫胡湯 十五冊
白虎湯 十五冊	白朮加人參湯 十五冊

白虎加桂枝湯 二十五冊	小承氣湯 下之
厚朴三物湯 三下之	厚朴七物湯 三
大承氣湯 四	大黃黃連瀉心湯 八
瀉心湯 九	附子瀉心湯 九
大黃附子湯 十	太黃甘遂湯 十
抵當湯 十一	抵當丸 十一
橘皮大黃朴硝湯 十一	大黃硝石湯 十一
大黃牡丹皮湯 十三	大黃甘州湯 十三
調胃承氣湯 十四	桃核承氣湯 十五
下瘀血湯 十六	五瓜根散 十六
甘州湯 十七	桔梗湯 十七

烏頭湯 七	白通加猪胆汁湯 六	白通湯 六	赤丸 八
葱白附子散漿散 六	白通湯 六	大烏頭煎 七	
附子梗米湯 五	葱白附子散 五		
通脉四逆加猪膽汁湯 四	乾姜附子散 五		
四逆加入葶湯 四	茯苓四逆湯 四		
四逆湯 三	通脉四逆湯 三		
生薑甘草湯 二	甘草乾薑湯 二		
甘麥大棗湯 九	甘草粉蜜湯 九		
甘遂半夏湯 八	芍藥甘草附子湯 八		
排膿湯 七	芍藥甘草湯 八		

真武湯 八	附子湯 九
天雄散 一	梔子豉湯 一
梔子甘草豉湯 一	梔子生薑豉湯 一
枳實梔子豉湯 一	梔子大黃豉湯 二
茵陳蒿湯 二	梔子檉皮湯 三
梔子厚朴湯 三	梔子下姜湯 三
大陷胸湯 四	大陷胸丸 五
小陷胸湯 六	括蕞薤白白酒湯 五
括蕞薤白半夏湯 七	瓜蒂散 七
文蛤湯 八	大半夏湯 八
小半夏湯 九	生姜半夏湯 九

目錄

小半夏加茯苓湯 _四	半夏苦酒湯 _四
半夏厚朴湯 _四	半夏乾姜散 _四
干姜人參半夏丸 _四	半夏瀉心湯 _四
甘州瀉心湯 _四	生薑瀉心湯 _四
吳茱萸湯 _四	
厚朴生薑半夏甘草人參湯 _四	
黃連湯 _四	干姜黃連黃芩人參湯 _四
大建中湯 _四	黃連阿膠湯 _四
黃芩湯 _四	黃芩加半夏生薑湯 _四
六物黃芩湯 _四	三物黃芩湯 _四
白頭翁湯 _四	白頭翁加甘州阿膠湯 _四

木防已湯 _八	木防已去石膏加茯苓芒消湯 _八
防已伏苓湯 _九	防已黃耆湯 _九
枳實芍藥散 _十	枳朮湯 _十
排膿散 _十	桂枝枳實生薑湯 _十
枳實薤白桂枝湯 _十	橘皮枳實生薑湯 _十
茯苓飲 _十	橘皮竹茹湯 _十
橘皮湯 _十	桂枝茯苓丸 _十
芎歸膠艾湯 _十	旋覆花代赭石湯 _十
赤石脂禹餘糧湯 _十	桃花湯 _十
大猪胆汁方 _十	蜜煎導方 _十

目錄

酸棗仁湯 七十五

麻子仁丸 八十五

蜀漆散 八十五

桔梗白散 九十五

備急圓 十六

消礬散 六十六

蛇床子散 六十六

既試方 九方

竹葉石膏湯 六十六

炙甘草湯 六十六

桂枝芍藥知母湯 六十六

葶藶大棗瀉肺湯 七十五

已椒薑黃丸 八十五

十棗湯 九十五

走馬湯 十六

礬石湯 六十六

礬石丸 六十六

麥門冬湯 六十六

烏梅丸 六十六

頭風摩散 六十六

栝葉湯 六十六

當歸芍藥散 六十六

黃玉湯 六十五

既試方

射干麻黃湯

射干三分麻黃生薑

各四分

細辛紫苑欬冬花

各三分五味子六分大棗一分半夏六分

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上

沫內諸藥煮取三升分溫三服

欬而上氣喉中水雞聲

厚朴麻黃湯

既試方

厚朴三分麻黃二分五厘石膏五分杏仁半夏各四分干姜細辛各一分五厘小麥一錢五味子四分右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓肉諸藥煮取三升分溫一升日三服效而脉浮者

皂莢丸

皂莢八兩刮去皮用酥炙右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三

九日三夜一服

效而上氣時時吐濁唾但坐不得眠

桂枝芍藥知母湯

桂枝知母防風各四分芍藥三分甘草麻黃各二分生姜蒼朮各五分附子一分五厘

右九味以水七升煮取三升溫服七合日三服

諸支節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣

試方

○治腰痛有奇驗如婦人或兼患則丸打撲之人亦同

温温欲吐

當歸四通湯

當歸桂枝芍藥細辛各四分大棗一錢甘州三分

通州三分

右七味以水八升煮取三升去滓温一升日

三服

手足厥寒脉細欲絕者當歸四通湯主之若其人內有久寒者宜當歸四通加吳茱萸生

姜湯主之

當歸四通加吳茱萸生薑湯

於前方內加吳茱萸六分生薑一錢

竹葉石膏湯 治枯燥氣逆或欲吐者

竹葉四分石膏一錢半夏四分人參二分甘州一分

五厘米七分麥門冬八分右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮

米熟湯成去米温服一升日三服

既試方

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

麥門冬湯

麥門冬二錢半夏四分人參二分甘州一分

粳米四分大棗二分

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升

日三夜一服

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者

炙甘州湯

○行動如常而其脈結代心中動悸如有驚惕者非此方不能治之

甘州二錢生薑二分人參一分生地黃一分

桂枝二分阿膠一分麥門冬七分麻黃四分

大棗五分

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三

升去滓內膠烱消盡溫服一升日三服一名

復脈湯

治傷寒脈結代心動悸者○治虛勞不足汗

出而悶脈結悸行動如常○治肺痿涎唾多

既試方

心中温液液者

栝葉湯

栝葉干姜各六分艾二錢

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取二升分温再服

治吐血不止者

黄土湯

甘州乾地黄木附子阿膠黃芩各四分竈中

○反胃之症世醫難其治此方速治之實奇劑也

烏梅丸

烏梅九十細辛附子桂枝人參黃柏各十錢干

姜二十錢黃連三十錢當歸川椒各八錢

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相

既試方

得肉白中與蜜杵二千下丸梧子大先食飲
服十九日二服稍加至二十九禁生冷滑物
臭食等

虻厥者當吐虻令病者靜而復時煩此為厥
寒虻上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩
者虻聞食臭出其入常自吐虻虻厥者

當歸芍藥散

當歸芍藥

各二兩

芍藥一斤茯苓木

各四兩澤瀉

○治小便微難腹
中痛者

半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服

婦人懷妊腹中疝痛

大黃麩蟲丸

大黃十斤黃芩二兩甘艸三兩桃仁一升杏

仁一升芍藥四兩乾漆一兩乾地黄十兩蟲

一升水蛭百枚蟻蠶一升麩虫半斤

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五

既試方

九日三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂飲傷
房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血
肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛

頭風摩散

大附子一枚鹽等分

右二味為散沐了以方寸匕已摩疾上令藥
氣行

○芍藥甘草大棗二味雖有小異其所主治則掣急也桂枝湯有此三
味而方極不言掣
急症者以不待其
言而可知故也方
極桂枝加芍藥湯
下云本方症而拘
攣劇者桂枝去芍
藥湯下云本方症
而不拘攣者桂枝
加芍藥生薑人參
湯症云或拘攣可
以見已
桂枝湯不言拘攣
小建中湯不言上
衝其他如八味丸
半復瀉心湯等一

類聚方集覽

日本

南總

雉問煥子炳標注

男 適之適校

桂枝湯

治上衝

桂枝頭痛

桂枝發熱

桂枝汗出

桂枝惡

風生桂枝者

桂枝芍藥生薑各三兩大棗十二枚今用各七分五厘

厚 甘州二兩五分

右伍味咬咀以水柒升微火煮取三升去滓

類聚方集覽

症一藥不必相對
要之諸方皆效藥
併力以成其功耳
故每證注其主藥
者唯示綱概而已
○按其發汗也有
非如水流滴病必
不除者又有大汗
出後風氣去溼氣
在者不可一概而
論之宜慎之

適寒溫服一升今以水一合四服已須臾飲
熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍
身熱熱微似有汗者益佳不可令如水淋漓
病必不除若服汗出病差停後服不必盡
劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其
間半日許令二三服盡若病重者一日一夜服
周時觀之服一劑盡病症猶在者更作服若
汗不出者乃服至二三劑

○凡稱太陽者主
桂枝麻黃葛根等
之症是
中風者猶言傷風

○煩者苦悶之謂
而是眩眩也雖眩
眩病未得除故又
用桂枝湯也

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱
者汗自出蓄蓄惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻
鳴乾嘔者○太陽病頭痛發熱汗出惡風者
○太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯
方用前法若不上衝者不可與之○太陽病
初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻
與桂枝湯則愈○太陽病三日已發汗若吐
若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中

與也觀其脉證知犯何逆隨證治之○桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也常須知此勿令誤也○若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也○太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解○太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲解外者○太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今

○頭痛有熱但桂枝症而已若六七日不大便且小便不清者乃承氣症也服承氣湯則上衝得降若小便清者宜服桂枝湯○先其時發汗者凡治潮熱之要術也潮熱則不得日發熱曰先其時也余常治今稱瘧者若遇上衝發熱

脉浮故知在外當須解外則愈○病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不譫以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈○病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄○傷寒發汗

類聚方集覽上

汗出等症則以桂枝湯先其發熱時溫服須臾歎熱稀粥溫覆以待其發熱而取汗或遇柴胡白虎等症乃各隨症處方服之如桂枝湯法凡瘧瘧皆一服即愈其他潮熱似瘧者其治皆同蜀漆散即截瘧藥也其下云未發前服亦先其時之謂也

○復煩者病未盡故也小柴胡湯有此例宜併觀
○清便自調者謂清穀止也清穀雖止身疼痛未愈者猶宜四逆輩恐非桂枝湯症
○稱陽明病者有潮熱譫語燥屎等之症是也
○下利腹脹滿以下三條皆非桂枝湯症與清便自調條義同

解半日許復煩脉浮數者可更發汗○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者○傷寒六下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯○陽

明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯○太陰病脉浮者可發汗○下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯○吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯少和之○下利後身疼

○服桂枝湯，大汗出者，亦暈眩，而病未得除，故耳。脈洪大，微細不拘，而可也。
○若形如瘧，四字檢桂枝二麻黃一湯，條無域焉。於此條域者，恐轉也。

痛清便自調者，急當救表。宜桂枝湯發汗。
婦人得平脈，陰脈小弱，其人渴，不能食，無寒熱，名娠。娠桂枝湯主之。於法六十日，當有此症。設有醫治逆者，却一月加吐下，若則絕之。
○產後中風，續之數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下悶，乾嘔，汗出，雖久，陽且証續，在耳。
○服桂枝湯，大汗出，脈洪大者，與桂枝湯如前法。若形如瘧，日再發者，汗出必解。宜湯，條無域焉。於此條域者，恐轉也。

奔豚主劑，雖居多，特加桂湯為最可也。○又發後有發，大熱不止，是火邪也。今謂之，炷熱，又稱灼熱。此方主之。生平頭痛，有時發，苦之一二日，或四五日，其甚則昏迷，吐逆，絕飲食，惡藥氣者，每發服此，則速起。○或每天陰欲雨，頭痛者，亦當服之，能免其患也。○燒鍼下，恐有脫也。

桂枝一麻黃一湯

桂枝加桂湯 治本方證而上衝劇，倍加者

於桂枝湯方內加桂二兩

桂枝一芍藥大棗生姜各六分 甘草四分

右五味煮如本方

燒鍼令其汗，鍼處被寒，核起而赤者，必發奔

豚，氣從少腹上衝心者，灸其核上各一壯，與

桂枝加桂湯

類聚方集覽上

此方治腹拘攣劇者誠然然遍身拘攣皆危之則腹字恐衍文○治奔豚拘攣劇者東洞子曰腹滿時痛者拘急而痛也是以芍藥為主爾○舊刊有脫文故今收之

○東洞子曰不拘急故去芍藥煥謹按脈促胸滿非此方所主而舊刊不刪者恐寫誤然若刪脈促胸

五
桂枝加芍藥湯 治本方證而腹拘攣劇倍加芍藥

者 於本方內加芍藥三兩

桂枝大棗生姜各六分芍藥一錢二分甘草四分

右五味煮如本方

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加

大黃湯主之

桂枝去芍藥湯 治本方證而腹不拘攣去芍藥

按脈促胸滿非此方所主而舊刊不刪者恐寫誤然若刪脈促胸

○東洞子曰黃耆主治皮膚水氣可考藥微○千金外臺並用黃耆五兩

○黃病宜利小便者用茵陳五苓散類當以汗解之者用麻黃湯酒湯類有自汗盜汗而身重者用此方

世稱勞瘵者多如此故曰勞氣也日久將斃之間生惡瘡者間有之然則用七寶丸梅肉散類而救勞瘵者蓋亦有之志于仁者宜深思焉

為瘰 桂枝加黃耆湯 治桂枝湯證而黃汗黃自汗者黃盜汗者黃於桂枝湯方內加黃耆二兩

桂枝芍藥大棗生姜各六分甘草黃耆四分

右六味煮加桂枝湯

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久久其身心甲錯發熱不止

按諸病黃家條備參考者而已

○甲錯者皮膚枯燥鱗甲錯出也

按當以汗解之者非此方所主也

○東洞子曰桂枝加大黃湯因桂枝加芍藥湯加大黃者也故方名從之矣

○治小兒宿食不化而腹痛者若嘔者倍大黃凡用此方宜倍加大黃

者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必

身潤即胸中痛又從腰以上必汗出下無汗

腰體弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身

疼重煩燥小便不利此為黃汗○諸病黃家

但利其小便假令脈浮當以汗解之

桂枝加芍藥大黃湯 治桂枝加芍藥湯證而

有停滯大者

於桂枝加芍藥湯方內加大黃一兩

大實痛者拘急殊甚腹中大結實而痛也

○東洞子曰當有胸滿症

按曰當有胸滿症當有上衝症類皆經文其症闕故補之也以下做之

桂枝大棗生薑各六分芍藥二錢甘草四分大

黃二分右六味煮加桂枝湯

○太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太

陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加

大黃湯主之

桂枝加厚朴杏子湯 治桂枝湯證而胸滿厚

微喘杏子者

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏子五十個

多刺諸藥不能治抵當用此方至言哉此方之妙起死起廢不可勝數也余常見中風卒倒或癱瘓不語破傷風牙關緊急失音傷寒厥逆四逆輩不能救者若向死冷汗如膏或腹中切痛及驚風癲風痛風白虎歷節一切逆冷不仁諸痛癢疾諸藥不能救者屢與此湯得効至多又諸瘡癰疽用之內托排膿之功至速也最可奇者走馬湯備急

桂枝芍藥大棗生姜各六分甘草厚朴杏子

各四右七味煮如桂枝湯

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳○天陽病下

之微喘者表未解故也

烏頭桂枝湯 治腹中絞痛頭手足逆冷頭或

不仁頭若疼痛頭者

烏頭五枚錢三

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五

圓紫圓等方下吸稱諸卒暴急病以此方起死回生者如神皆余平生必得効也古語曰病者苦急則急食甘以緩之至哉此言烏頭和蜜則如龍乘雲矣然瞑眩亦不少始宜少與之不知乃加之此蓋抵當之謂乎如上乃謂諸難証急病非大毒驗烈劑則不能抵當世人漫畏瞑眩多難服之者豈不嘆哉

東洞子曰是烏頭煎而合桂枝湯類聚方集覽上

合解之得一升後初服二合不知即服三合

又不知後加至五合其知者如醉狀得吐者

為中病以水九勺煮烏頭取三勺去滓內蜜六勺再煎取六勺別煮桂枝湯取六勺

相和以水煮服亦可也法依桂枝湯然不

及蜜煎○寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身

疼痛灸刺諸藥不能治抵當用此方

桂枝加附子湯 治桂枝湯證而惡寒附支節

微痛附子者

方也當列烏頭煎
方後今列之桂枝
加附子湯者示其
異也又按煎法可
依大烏頭煎之法
○桂枝加附子湯
治後世所謂痛風
者又曰小便難是
附子餘力足以治
之也

於桂枝湯方內加附子一枚

桂枝芍藥大棗生姜各六分 甘州四分 附子三分

右六味如桂枝湯煮之服

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四

支微急難以屈伸者

桂枝去芍藥加附子湯 治桂枝去芍藥湯證

而惡寒附子者

於桂枝去芍藥湯方內加附子一枚

○東洞子曰當有
上衝症此方與桂
枝去芍藥加附子
湯同而治與方名
異彼方下云微惡
寒此方下云身體

桂枝大棗生姜各七分 甘州五分 附子三分

右五味煮如桂枝湯

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯

主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主

之

桂枝附子湯 治桂枝去芍藥湯證而身體疼

痛不能自轉側附子大者

桂枝四兩八分 附子三枚九分 甘草二兩四分 生姜

疾煩惡寒輕疾煩
重獨在附子多少
也

○今稱痛風者及
上衛難降者主之
皆宜加朮

○曰不嘔不渴者
身疼外無所患之
謂也不與生薑相
關

○去桂加朮湯者
即白朮附子湯也
曰大便鞭小便自
利者去桂加朮大
似不可解者且用附子方多而獨無服後身疼如胃狀則服此為

三兩大棗十二枚各六分

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

以水一合八勺煮取六合

傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不能自轉

側不嘔不渴脉浮虛而瀼者桂枝附子湯主

之若其人大便鞭小便自利者去桂枝加朮

湯主之

桂枝附子去桂加朮湯 治前方證而大便鞭

甚亦可怪因屢試附子服眩則效速而合蜜則如神人皆知之又用此方其

人大便硬則服此

大麥功粗似合蜜

者若以桂芍藥

類加此方以用之

或用之大便不鞭

之人則服此稍少

得効亦微然則大

便鞭者附子成功

之機也病解而大

便亦通此是附子

餘力所及也蓋桂

芍芍有降衝逆解

拘攣驅動博之力

故胸腹開爽服眩

直差此無化藥氣

引小便自利亦不上衝桂者

於桂枝附子湯方內去桂加朮四兩

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服

一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如

胃狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得

除故耳

附子九朮八甘草分四大棗生姜各六分

右五味煮如本方

類聚方集覽上

走而下以不暇止而攻病故也甘草大棗之甘則緩其急而停壅於氣氣今不得走故亦阻遲力以迫逐水氣此所以順眩也小便自利者水之積甚於不利故溢出者也

桂枝去桂加芍藥湯方內去桂加芍藥各三兩
芍藥大棗生薑茯苓各六分
甘草四分
右六味煮如桂枝湯

未知其所出也。頭項強痛發熱無汗與此方相逆。延總似葛根湯症

。東侗子曰證不備也此方合桂枝去芍藥湯與麻黃附子細辛湯也證宜於二方之下求也藥微有辨按藥微云桂姜棗艸黃辛附湯枳木湯二方同因同證煥按金匱要畧二方相攝連且二方言證正同而枳木湯但不曰氣分耳此枳木湯不謂因

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者
桂姜棗艸黃辛附湯 治桂枝去芍藥湯與麻黃附子細辛湯二方證相合者
黃附子細辛湯 一方證相合者
桂枝生薑各三兩大棗十二枚 各六分 甘草麻黃細辛各二兩 附子一枚 三分
右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈

也而吉子曰二方同因者何也抑是與腎氣丸亦主之麻黃甘草湯亦主

以水一合四勺煮取六勺

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

之之類一例也故氣分字管枳朮湯而二方同因也夫氣血固不拘然既曰氣分豈無說乎長沙方中曰亦主之者多有焉因並觀之必主皆一毒而毒所在之部位則有表裡上下之不同也此二方亦雖同曰氣分乎實有氣血之別焉一則心下堅大而屬血分者一則心下堅大而屬氣分者直指方云氣為痰飲既隔心下堅脹名曰氣分加味枳朮湯聚血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分調榮飲入門亦粗同此因金匱立說雖不出古欲強別氣分血分則足以為徵乎麻黃附子細辛湯下吉子曰有痰飲之變也者非一定之證也心下堅大證調榮飲證並可稱痰飲之變之一也且曰當汗出如虫行皮中即愈此亦病在皮表與調榮飲證相同也因是觀之桂姜棗附湯為血分也明矣夫氣血不拘者固又實難別而諸家別之者蓋以皮肉赤紋為痰飲之變乎壹其皆水氣也故吉子謂之痰飲之變金匱云地人則經水不通經為血血不利則為水

名曰血分諸家因曰熱血化為水吉子以為水與血下也學者思諸

桂枝去芍藥加皂莢湯 治桂枝去芍藥湯證

而吐濁唾涎沫者

於桂枝湯方內去芍藥加皂莢二枚

桂枝 生姜 大棗 各七分 甘草 皂莢 各五分

右五味煮如桂枝湯

肺痿吐涎沫者

桂枝加龍骨牡蠣湯 治桂枝湯證而胸膈腹

骨有動者

類聚方集覽上

○加皂莢湯主小兒平生垂涎者其甚者為鼻淵為風涎潮而口鼻間及腮赤者皆主之

○東洞子曰當有胸腹動症

○又手冒心者主
之是近方傷寒門
升陽散火湯症而
胸腹有動者也

○小腹弦急與挑
拔承氣症小腹急
結異也常從小腹
引陰頭弦急且晝
夜思色_三戈者是
也男女正同又陰
吹正喧玉門不閉
時自漏精者主治與夢交同矣。加蜀漆龍骨牡蠣湯東洞子曰當有

於桂枝湯方內加龍骨牡蠣各三兩

桂枝芍藥大棗生姜龍骨牡蠣各四分甘

草三分右七味煮如桂枝湯

夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脉極

虛芤遲為清穀亡血失精脉得諸芤動微緊

男子失精女子夢交

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 治桂枝去

芍藥湯證而胸肚腹龍骨有動劇蜀者

心腹動而衝通證。近方黃連解毒湯證而暴熱至危者主之。又灸後大熱
諸藥不能治者主
之

桂枝生姜蜀漆各三兩大棗十二枚各四分

牡蠣五兩九分龍骨四兩六分甘草二兩三分

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內

諸藥煮取三升去滓溫服一升以水二合四

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥

不安者○火邪者

桂枝加芍藥生姜人參湯 治桂枝湯證而心

下痞鞭人或拘攣芍藥及嘔生者

類聚方集覽上

○東洞子曰當有
心下痞鞭或拘急
或嘔症

○脉沈遲字東洞
子不刪者示不拘
脉強弱也其他脉
促脉弱等當刪而
不刪者多有焉蓋
雖脉候之惡以不
足畏故也乎

○皮膚燥痒者主
之及治瘧疾服如
挂枝湯法

挂枝湯方內加芍藥生姜各一兩人參三兩

挂枝大棗人參各六分芍藥生姜各八分甘州

分四右六味煮如挂枝湯

發汗後身疼痛脉沈遲者

挂枝二麻黃一湯 治挂枝湯證多麻黃湯證

少者 挂枝一兩十七銖八分五厘芍藥生姜各

一兩六銖大棗伍枚各六分麻黃十六銖杏仁

十六個各三分五厘甘州一兩二銖五分五厘

脚學急而上衝者
主之

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再以水

五升煮○服挂枝湯大汗出脉洪大者與挂

枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解

挂枝二越婢一湯 治挂枝湯證多越婢湯證

少者 挂枝芍藥甘州麻黃各十八銖四分五厘

生姜一兩三銖七分大棗四枝石膏二十四銖

各六分右柒味咬咀以五升水煮麻黃一

○治瘧疾服之如
挂枝湯法
風癘疥癩皆主之
又曰寒熱往來中
或大病將愈之時
身發斑且痒者皆
主之

二沸去上沫內諸菜煮取一升去滓溫服一
升以水一合六
少脈微弱者此無陽也不可發汗

桂枝麻黃各半湯 治桂枝湯麻黃湯二方證

相合者

桂枝一兩十六銖五分芍藥生薑麻黃甘州

各一兩大棗四枚杏仁二十四個各三分

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

自利衄遺精手足煩熱口乾等症用膠飴與它症不同余別有考。東
洞子曰桂枝加芍
藥湯當入于此而
以有桂枝之名列
于彼
○東洞子曰當有
盜汗之證

中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥

○男子黃小便自利○婦人腹中痛

黃耆建中湯 治小建中湯證而盜汗黃黃汗

黃耆或自汗黃耆

於小建中湯方內加黃耆一兩半二三分

虛勞裏急諸不足

黃耆桂枝五物湯 治桂枝湯證而嘔倍加身

體麻痺黃耆芍藥不急迫去甘州者

類聚方集覽上

○東洞子曰桂枝
加黃耆湯症而嘔
無急迫者

此方治後世所謂麻木而滋膚湯症者宜隨証加味

黃耆芍藥桂枝各二兩大棗十二枚各六分生

姜六兩一分錢

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三

服以水一合八勺煮取六勺○血痺病從何得之師曰夫

尊榮人骨弱肌膚盛車困疲勞汗出卧不時

動搖加被微風遂得之但以脉自微潛存寸

口關上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證

○沾衣正黃謂黃汗出至多也治水病身重汗出者

按當有從小腹引陰弦急症說見干桂枝加龍骨牡蠣湯標注然彼主胸有動此主身體腫與多汗宜隨證加味

身體不仁如風痺狀

黃耆桂枝若酒湯 治身體腫黃耆若酒發熱汗出

桂枝汗沾衣黃耆桂枝色正黃如藥汗黃耆若酒者

黃耆五兩一分錢芍藥桂枝各三兩九分

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升

溫服一升以苦酒二勺水一合四勺煮取六勺當心煩服至六

七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也○

黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風

水汗沾衣色正黃如藥汗脈自沈何從得之
師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之

○東洞子曰當有急迫證

桂枝甘草湯

治上衝桂枝急迫甘者

桂枝四兩

二錢甘草二兩一錢

右二味以水三升煮取一升去滓頓服以水

○又手冒心者亦因上衝也

悸欲得按者

半夏散及湯

治咽喉痛

甘半甘夏上衝桂急迫甘

○喉痺腫痛甚而湯藥不下語言不能或為痰涎壅盛之狀者主之

者

桂枝甘草半夏各等分錢一

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方

寸七日三服若不能散服者以水一升煎七

沸內散兩方寸七夏煎三沸下火令少冷少

少燉之○少陰病咽中痛

桂枝甘草附子湯

治桂枝甘草湯證而骨節

煩疼附子小便不利本者

甘草木各二兩

六分附子二枚九分

桂枝四兩一錢

○即甘艸附子湯東洞子曰當有衝逆之症治後世所謂痛風歷節風手近之則痛劇者

分二 右四味以水六升煮取三升去滓温

服一升日三服初服得微汗則解能食汗出

復煩者服五合恐一升多者服六七合以水

二勺煮取六勺 ○風溼相搏骨節疼煩掣痛不得屈

伸逆之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不

欲去衣或身微腫者

挂枝甘草龍骨牡蠣湯 治挂枝甘草湯證而

胸牡腹有動龍骨及急迫倍者甘

。火逆以下恐有
脫誤

謹按此方挂枝甘
艸主藥則挂枝甘
艸湯症而吐下心
下痞鞭小便不利
者主症也人參湯
即挂枝人參湯症
而不上衝者主之

挂枝 一兩四分 甘草 五厘 牡蠣 龍骨各二兩九分

右為末以水五升煮取二升半去滓温服八

合日三服 以水一合二勺煮取六勺

火逆下之因燒鍼煩躁者

挂枝人參湯 治人參湯證而上衝挂急迫甘

者

挂枝甘草各四兩 八分 人參乾姜各三兩 六分

右五味以水九升先煮四味取五升內挂夏

人參湯下稱急痛者余竊疑轉訛且如胸痺胸滿逆搶本是枳實薤白桂枝湯專主治之曰人參湯亦主之者示臨機應變之略耳非專主之症也又曰利下不止曰霍亂故知二方用乾薑者為治吐與下利。協與挾通。藥入則吐者宜加欬秀水梗米。

。腎氣動所謂腎間動也常人有之若其動劇而引胸脇者牡蛎所治也此稱膈上築者差後不了虛羸故其動發露者乃桂枝人參湯証已何必去朮且長沙方中間有加減法不足取

煮取三升溫服一升日再夜一服以水一合八勺煮取

六○太陽病外證未除而數下之遂協熱而

利利下不止心下痞鞅表裏不解者

人參湯即理中丸也治心下痞鞅參人小便不利本

或急痛草甘或胸中痺干姜者

人參甘草朮乾姜各三兩七分五厘

右四味擣篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯

數合和一丸研碎溫服之日三服夜二服腹

中未熱益至二四九然不及湯湯法以四物

依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服一

升日三服以水一合六勺加減法若膈上築者

腎氣動也去朮加桂四兩吐多者去朮加生

姜三兩下多者還用朮悸者加茯苓二兩渴

欲得水者加朮足前成四兩半腹中痛者加

人參足前成四兩半寒者加乾姜足前成四

兩半腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食

。熱物入腹中而
自覺熱不快者此
胃上有寒之候也

。東洞子曰當有
衝逆嘔吐症
此方與五苓散相
表裏也說見于五
苓散條

。按厥也者逆也
衝逆者必頭汗出
若頭汗出多兼嘔
悸者此方主之

。實有微喘之症

頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被○霍

亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散

主之寒多不用水者理中丸主之○大病差

後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫

之○胸痺心中痞留氣結在胃胸滿脇下逆

搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

茯苓甘草湯 治心下悸茯苓而上衝桂枝嘔逆者

茯苓桂枝各二兩八分生姜三兩一分甘草一

兩四分右四味以水四升煮取二升去滓分

溫三服以水一合二

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者○傷

寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草

湯卻治其厥不爾水漬入胃必作利也

茯苓杏仁甘草湯 治悸茯苓而胸中痺仁杏者

茯苓三兩一分杏仁五十個一分甘草一兩五分

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三

服不差者更服以水一合二勺煮取六勺

胸膈胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之

橘枳姜湯亦主之

茯苓戎鹽湯 治心下悸茯苓小便不利 赤者

茯苓半斤二錢四分 朮二兩六分 戎鹽彈丸大三分

右三味先將茯苓朮煎成入鹽再煎分溫三

服以水一合二勺煮取六勺去滓內鹽令消服

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎

如流者亦難治也此方加桂三分服之或加川芎亦可。代戎鹽以青鹽

尤可也。白魚者鯉魚也

鹽湯並主之

葵子茯苓散 治小便不利葵子心下悸 葵子腫滿

因小便者 葵子一斤 茯苓三兩

右二味并為散飲服方寸匕日三服小便利

則愈○**妊娠**有水氣身重小便不利洒淅惡

寒起即頭眩系

苓姜朮甘湯 治心下悸茯苓小便自利 朮腰中

冷如坐水中乾姜 朮 若體重形如水狀乾姜 朮者

類聚方集覽上

○東洞子曰當有心下悸症又按葵子一斤本艸綱目作三兩今從之此方實治妊娠水腫也域妊娠字者恐轉訛

○東洞子曰當有心下悸證宜遺尿失禁者兼用見于後編

○腎著湯此方加杏仁治姪姬腫滿有驗

○能療上衝急迫者病從小便去

甘州木各二兩五分乾姜茯苓各四兩錢一

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中

即溫以水一合二勺○腎著之病其人身體重

腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自

利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕

久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢

苓桂朮甘湯 治心下悸茯苓上衝起則頭眩

桂枝甘草小便不利木者

○此方合真武湯亦名桂枝加苓朮

附湯而無大棗且茯苓為君與先出

桂枝加苓朮附湯少異

○腎氣丸主小腹水氣此方主心下有飲者

○東洞子曰當有拘急證

茯苓四兩一分桂枝三兩九分朮甘草各二兩

六分右四味以水六升煮取三升去滓分

溫三服以水一合二勺○傷寒若吐若下後心

下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則

動經身為振振搖者○心下有痰飲胸脇支

滿目眩○夫短氣有微飲當從小便去之苓

桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之

苓桂甘棗湯 治臍下悸茯苓而攣急大棗上衝甘草

○積聚久不愈
 顏色蒼然種種苦
 腦或似勞瘵者加
 味增煎服人家常
 用味增也
 又病臥舉體憊然
 一振如有驚惕者
 其間十許息而復
 微憊振如此不止
 者服此乃漸愈
 又瘡發輒狂言不
 止喧喧終日而臍
 下有動若主之
 ○苓桂五味甘州
 湯以下五方皆骨
 蒸家要術

○以下五方隨時活用之則皆佳劑也然隨症加減之法其要言則似有理者其實不足信之何則病隨時易轉變其預期次序必如此者至稀也不可拘拘者也抑以面熱為胃熱上薰之候而加大黃者實然其說詳于調胃承氣湯標注

桂枝者 茯苓半斤一分錢 甘草三兩四分 大

棗十五枚五分 桂枝四兩六分

右四味以水一斗先煮茯苓減二升內諸藥

煮取三升去滓溫服一升日三服以水二合煮取六分

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚

苓桂五味甘州湯 治心下悸者欲作奔豚

急迫者 茯苓桂枝各四兩八分 甘州二

兩六分 五味子半升一分錢



○以下五方隨時活用之則皆佳劑也然隨症加減之法其要言則似有理者其實不足信之何則病隨時易轉變其預期次序必如此者至稀也不可拘拘者也抑以面熱為胃熱上薰之候而加大黃者實然其說詳于調胃承氣湯標注

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服

以水一合六勺煮取六分 ○救逆倚息不得卧小青龍湯

主之青龍湯下已多唾口燥寸脈沈尺脈微

手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面

翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復冒

者與苓桂五味甘州治其氣衝

苓甘五味姜辛湯 治前方證而不上衝去痰

飲滿細辛者 茯苓四兩六分 甘州乾姜細

類聚方集覽上

辛各三兩四分五厘五味半升九分

右五味以水八升煮取三升去滓温服半升

日三服以水一合六勺煮取六勺

衝氣即低而反更咳胸滿者用桂苓五味甘

草湯去桂加乾姜細辛以治其咳滿

苓甘姜味辛夏湯 治前方證而嘔半者

茯苓四兩六分甘州細辛乾姜各二兩三分五味

半夏各半升九分

右六味以水八升煮取三升去滓温服半升

日三服以水一合六勺煮取六勺○欬滿即止而更復渴

衝氣復發者以細辛乾姜為熱藥也服之當

遂渴而渴反止者為支飲也支飲者法當胃

胃者必嘔嘔者復內半夏以去其水

苓甘姜味辛夏仁湯 治前方證而微浮腫杏子

者 茯苓四兩四分甘草乾姜細辛各三兩

三分五味半夏杏仁各半升六分

類聚方集覽上

○衝氣復發者蓋
眩暈也而未全差
故復須用此二味
以二味為熱藥不
可拘

右七味以水一斗煮取三升去滓温服半升
日三服以水二合○水去嘔止其人形腫者
加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故
不內之若逆而內之者必厥所以然者以其
人血虛麻黃發其陽故也

冬甘姜味辛夏仁黃湯 治前方證而大便微

結人黃者 茯苓四兩四分甘草乾姜細辛大

黃各三兩三分五味半夏杏仁各半升六分

東洞子曰以上
五方當有驚悸肉
腠筋惕等症

○茯苓澤瀉湯東洞子曰當有心下悸或小便不利症。煥按當有大便秘
結症。嘔吐蓋因
心下有支飲也吐
而渴者胃反吐水
穀而腹中空乏故
也渴而飲乃為支
飲服湯而支飲下
則吐止渴差故澤
瀉之主治吐與渴
者以除心下支飲
故也且澤瀉治支
飲見于澤瀉湯條

右八味以水一斗煮取三升去滓温服半升

日三服以水二合○若面熱如醉此為胃熱

上衝其面加大黃以利之

茯苓澤瀉湯 治心下悸茯苓小便不利木上衝

桂枝及嘔吐澤瀉渴欲飲水澤瀉者

茯苓半斤一錢澤瀉生薑各四兩六分甘草桂

枝各二兩三分木三兩四分

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉更煮取

類聚方集覽上

救而胃者五味子
小便不利而胃者
澤瀉。若胃眩至
甚之謂也。此症所
謂癩眩也。又稱水
眩與癩瘕相似而
非矣。

桂枝主治。衛逆故
與澤瀉俱治水逆。
○治中陽病渴而
小便不利者。又治
癩疾。服如桂枝湯然。彼癩病此飲煖水。是為異耳。又髮

脫每數十莖自脫落而空缺不毛地。桂枝而有鬚者亦五苓所主也。多因
肛門及前陰生瘡
或在筋漏下帶下
後也。小兒亦主之
髮生。乳解毒劑
又癩病陰核腫大
而痛者。或小兒啼
怒不止。隨啼隨腫。
若啼怒止。則陰腫
亦減。者及盤腸氣
類皆主之。又主婦
人產門出糞。

二升半。溫服八合。日三服。以水二合。五勺先

澤瀉更煮。○胃反吐而渴。欲飲水者。煮五味。取八勺內

澤瀉湯。治若胃眩。瀉小便不利者。

澤瀉五兩二錢五分木二兩一錢

右二味以水二升煮取一升。分溫再服。以水

二勺煮○心下有支飲。其人苦胃眩。

五苓散。治消渴。澤瀉小便不利。未或渴欲飲

水。澤瀉水入則吐。澤瀉者

脫每數十莖自脫落而空缺不毛地。桂枝而有鬚者亦五苓所主也。多因

澤瀉 兩六銖半八分猪苓 茯苓 木各十八銖

六分桂枝半兩四分

右五味為末。以白飲和服。方寸匕。日三服。多

飲煖水。汗出愈。

太陽病發汗後。大汗出。胃中乾。煩燥。不得眠。

欲得飲水者。少少與飲之。令胃氣和。則愈。若

脈浮。小便不利。微熱。消渴者。○發汗已。脈浮

數。煩渴者。○中風發熱六七日。不解而煩。有

○曰意欲飲水反
不渴按欲飲者渴
故也此症初當以
汗解之而不汗誤
灌冷水故毒內攻
而益煩是以水飲
支滿心下無餘地
因雖煩渴而不能
飲故曰反不渴此
與水入則吐者一
也文蛤五苓皆為
散用者奇也且文蛤散宜以白虎湯送下之若水飲凝結逆攻心胸者非

表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆○
病在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之
其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲
飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓
散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白
散亦可服○太陽病寸緩關浮尺弱其人發
熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下
之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉

是五苓散所能治宜小陷胸湯或通攻益劇衝迫咽嗑者急與桔梗白散
且白虎湯標注可

併考
五苓散與茯苓甘
艸湯互有表裏相
救之力故用五苓
散若不差者宜服
茯苓甘艸湯而後
五苓散之功不見
其勢如小柴胡湯
於小建中湯是余
數經驗者也
○本以下之者言
初太陽病之時誤
下之也桂枝湯條
曰攻痞宜瀉心湯

屬陽明也小便數者大便必鞭不更反十日
無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之
渴者○霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水
者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之
○傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯
苓甘草湯主之○男子消渴小便反多以飲
一斗小便一斗腎氣丸主之脉浮小便不利
微熱消渴者宜利小便發汗○假令瘦人臍

宜併觀

○東洞子曰當有
小便不利或渴證
○黃病宜從小便
去之若上之豈必
行備前方症乎

東洞子曰當有便
膿血證

下有悸吐涎沫而癩眩此水也○本以下之
故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥
煩小便不利者

茵陳五苓散 治發黃茵陳兼前方證者

茵陳蒿末十分五苓散五分

右二物和先食飲方寸七日三服○黃疸病

猪苓湯 治小便不利澤瀉若淋瀝阿膠若渴

欲飲水猪苓者

澤瀉

○若脉浮云云按
五苓散症也
○陽明病云云按
白虎湯症也

猪苓茯苓阿膠滑石澤瀉各一兩六分

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內

下阿膠烱消溫服七合日三服以水一合二

內膠○若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者

○陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以

汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也○小

陰病下利六七日效而嘔渴心煩不得眠者

猪苓散 治渴猪而心下悸茯苓小便不利未者

類聚方集覽上

○加赤小豆等分
尤妙若無葶藶宜
以甘遂代之
脚氣腫滿小便不
利者宜以八味丸
煎汁服此方

猪苓茯苓木各等分

右三味并為散飲服方寸匕日三服○嘔吐

而病在膈上後思水者解急與之思水者

牡蠣澤瀉散

治身體水腫

澤瀉葶藶

腹中有動

牡蠣

括藁

而小便不利

商陸

海藻者

牡蠣澤瀉括藁根蜀漆葶藶商陸根海藻等

右七味異擣下篩為散更入臼中治之白飲

和服方寸匕小便利止後服日三服

○八味丸東洞子曰外臺秘要作桂枝二兩附子二兩今從之○八

味丸之症其

天病差後從腰以下有水氣者

其二小腹拘急及

八味丸治臍下不仁小便不利者

拘急引陰股者其

乾地黄八兩山茱萸薯蕷各四兩澤瀉茯苓

三小便不利者其

牡丹皮各二兩桂枝附子各一兩

四小便反多者其

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸

五陰痿者皆主之

日再服

聞之師云稱臍下

腳氣上入小腹不仁○虛勞腰痛少腹拘急

不仁者學者可深

小便不利者○夫短氣有微飲當從小便去

思焉與他稱身體

類聚方集覽上

以飲一斗小便一

斗言飲而直溺不

暫停于中也與小

便清利相似或云

便清利相似或云

小便不利者○夫短氣有微飲當從小便去

男子有此病於婦人即為漏下實同症也婦人不有此症猶如男子無漏下故特稱男子消渴以明婦人無之然東洞子刪男子字蓋以為此症不限男子乎又芎歸膠艾湯下東洞子曰諸血症不別男女矣此漏下之主方也而其言如斯或以為應變審症則彼與是互用乎實是臆脫已如其定義得君子是正。加牛膝車前子名玄英湯能治好

之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之○男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主之○婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者何也曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈括萹瞿麥丸 治心下悸小便不利瞿麥惡寒子附而渴括萹根者 括萹根二兩茯苓薯

娠轉胞不得溺。括萹瞿麥丸東洞子曰當有心下悸證但有水氣之人而曰渴此言可味夫有渴者何拘熱有無卒猪苓澤瀉皆治渴者可以徵焉

續各三兩附子一枚瞿麥一兩右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三九日三服不知增至七八九以小便利腹中溫為知小便不利者有水氣其人若渴麻黃湯 治喘而無汗麻黃頭痛發熱枝惡寒 麻黃三兩杏仁七十個各九分 桂枝二兩六分 甘草一兩三分右四味以水九升先煮麻黃減一升去上沫

類聚方集覽上

○今試煮麻黃無上沫不拘而可也其他麻黃劑皆同治瘧疾服如桂枝湯法
○啜粥亦良然有瞑眩葛根湯及諸麻黃劑皆同

○凡心腹痛按之痛止者是氣通也
○傷寒耳前後及面上腫者風毒腫也宜早刺之不刺而自潰膿者危症

內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息以水二合煮取六分
太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者○太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下○太陽病十日以去脈浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥

已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解○以然者陽氣重故也○脈浮者病在表可發汗○脈浮而數者可發汗○傷寒脈浮緊不發汗因致衄者○陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛又按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證

平日上衝難降者宜此方
永病小便不利帶前方證者亦主之

者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治○陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈

麻黃加朮湯 治前方證而小便不利 朮者

於麻黃湯方內加朮四兩

麻黃杏仁各七分桂枝五分甘草二分朮一分

右五味煮如前方

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之

○東洞子曰水病而腫脹或喘或自汗出或無汗者主之

麻黃甘州湯 治喘急麻黃息迫甘或自汗或不

汗麻黃者甘州二兩一錢麻黃四兩二錢

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘州

煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服慎

風寒

裏水越婢加朮湯主之甘州麻黃湯亦主之

麻黃附子甘州湯 治前方證而惡寒附子或微

痛附子者

○東洞子曰當有惡寒症

此方與越婢加朮湯二方皆主水病而此方主在表之水氣故曰或自汗或無汗亦毒在肌表之症也

麻黃甘草各二兩錢一附子一枚七分五厘

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服水以

一合四勺○少陰病得之二三日麻黃附子

甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗

也○水之為病其脉沈小屬少陰浮者為風

無水虛脹者為氣水發其汗即已脉沈者宜

麻黃附子甘草湯浮者宜杏子湯

○少陰病者踈卧惡寒脉沈小等是也

○金匱注杏子湯恐是麻黃杏仁甘州石膏湯余按應是麻黃杏仁薤白甘草湯

○東洞子曰嘗有

惡寒證

按變者無窮非一定之證豈為方之極乎蓋有深意乎別有考

麻黃附子細辛湯 治麻黃附子甘州湯證而

不急迫去甘有痰飲之變細者

麻黃細辛各二兩錢一附子一枚七分五厘

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服水以

一合四勺○少陰病始得之反發熱脉沈者

麻黃杏仁甘草石膏湯 治麻黃甘草湯證而

咳杏子煩渴石膏者 麻黃四兩八分杏人五十

○東洞子曰嘗有煩渴證

要方集覽上

個甘艸二兩各四分石膏半斤一分六分

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升以水一合

六○發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無

大熱者

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治前方證而不煩渴

無石有水氣薏苡者 麻黃半兩八分甘草

二兩杏仁五十個各四分薏苡仁半兩一分六分

東洞子曰當有喘滿證外臺古今錄驗作薏苡半斤麻黃四兩甘艸杏仁各二兩右四味以水五升煮取二升分溫再服汗出即愈今從之。近方濕湯症者主之宜隨症加木

○凡麴室浴室井中窩中窩穴庫藏及烟薰噎塞一切熱氣濕氣積鬱之所而有卒倒氣絕者急宜服此方即蘇

病者一身盡疼發熱日晡必劇者名風濕此病傷於汗出當風或久取冷所致也

牡蠣湯 治麻黃甘艸湯症而胸腹有動牡蠣蜀漆

者 牡蠣麻黃各四兩一分甘草二兩五分蜀

漆三兩七分五厘右四味以水八升先煮蜀

漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫

○骨蒸家宜隨證服此 療瘧服如桂枝湯法凡寒熱潮者治與瘧同

服一升若吐則勿更服以水二合四勺先煮麻黃蜀漆得一合八勺內二味煮取六勺○治牡癰

東洞子曰當有喘症

或為兼用可也

麻黃厚酒湯

治喘而發黃或身疼者

麻黃三兩三錢

右一味以美清酒五升二合煮取一升半六

頓服盡冬月用酒春月用水煮之○治黃疸

半夏麻黃丸

治喘麻黃而嘔者

半夏麻黃各等分

有驚怖而喘者宜兼用劑

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三九日

三○心下悸者

小青龍湯

治咳

五味細辛麻黃上衝枝頭痛發熱

惡風

枝桂或乾嘔者

麻黃芍藥乾姜甘草桂枝細辛各三兩三五

味子半夏半升六分

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升以水二合煮取六勺

○秋嗽家要方

類聚方集覽上

○加減法總無驗
及本文或渴或利
以下十七字其是
後人傳入也又曰
此方加石膏治未
方証而有心下水
氣或渴者

加減法若微利者去麻黃加薤花如雞子若
渴者去半夏加枳實根三兩若噎者去麻黃
加附子一枚若小便不利小腹滿去麻黃加
茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升
傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或
渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者
傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯
已渴者此寒去欲解也○病溢飲者當發其

○二方皆主溢飲
而有煩渴者大青
龍湯效甚者小青
龍湯

汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之○欬逆
倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯下已多
唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥逆氣從小腹
上衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下
流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味
甘草湯治其氣衝○婦人吐涎沫醫反下之
心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之
涎沫止乃治痞瀉心湯主之

東洞子曰當有煩渴証

大青龍湯

治喘

杏仁及欬嗽

麻仁

麻仁

渴欲飲水

石上樹

枝

或身痛

麻仁

惡風

麻仁

者

麻黃六兩

分

桂枝甘草各二兩

杏仁四十個

各三分

生薑二兩

大棗十二枚

各四分

五厘

石膏雞

子大

二錢

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗

汗出多者溫粉粉之一服汗者停後服汗多

太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出

而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡

風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆

也○傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無

少陰證者大青龍湯發之

後條辨續論皆云當是

○病益飲者當發其汗大青龍湯主之

小青龍湯亦主之

類聚方集覽上

東洞子曰厥逆筋惕肉瞤直武湯

○脈微弱以下恐非長沙家法當不

拘焉近方家怯癘蓋因是而生

○傷寒脈浮緩條豈必為小青龍湯

證乎

○近方川芎茶調散証而煩渴者主

○東洞子曰大青龍湯證而不咳嗽上衝脚攣急者上之不渴當作渴自汗出之下常有或無汗字

○識按水腫或脚疾者主之不拘渴與熱是以不與大青龍湯相類矣故曰不渴無大熱

○加朮湯此方加附午名越婢加朮附湯本方證而有水氣者主之

文蛤湯

治煩渴

文蛤石膏

而喘咳

麻黃杏子

急甘草者

文蛤石膏各五兩

七分五厘

麻黃甘草生姜各三

兩大棗十二枚

各四分五厘

杏仁五十個

三分

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出

即愈○吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主

之兼生微風脈緊頭痛

越婢湯

治大青龍湯證而不咳嗽

無上衝佳

者

麻黃六兩

九分

石膏半斤

一分

生姜三

兩

大棗十五枚

六分

甘草二兩

一分

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取三升分溫三服

以水一合

二勺

○風水惡

風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱

越婢加朮湯

治本方証而小便不利者

於越婢湯方內加朮四兩

麻黃

六分

石膏

八分

大棗

各四分

甘草

二分

分三

右六味煮如本方

類聚方集覽上

厲風氣後世名
脚腫風

東洞子曰當有
煩渴咽逆證

裏水者一身而目黃腫其脉沈小便不利故

令病水假如小便自利此亡津液故令渴也

○裏水越婢加朮湯主之甘草麻黃湯亦主

之○治內極熱則身體津脫賤埋開汗大泄

厲風氣下焦脚弱

越婢加半夏湯治本方証而嘔吐者

於越婢湯方內加半夏半升

麻黃半夏各六分石膏八分生姜三分大棗四分甘

效而咽啞不利
數間微喘不斷者
此謂效而上氣

葛根劑三方類
家亦有用之疫癘
其初一二日表熱
甚者用葛根湯或
半夏一服得汗即
愈者不少也下汗
止後服兼用三黃
丸亦驚癘破傷風
類諸插插反張角
弓者主之桂枝加

草二分

右六味煮如本方

效而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮

大者

葛根湯治項背強急葛根發熱枝惡風桂枝或

喘麻黃或身疼芍藥者

葛根四兩六分麻黃生姜各三兩大棗十二枚

各四分桂枝芍藥甘草各二兩三分

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二

類聚方集覽上

葛根湯括蕒桂枝湯類大同小異各宜隨証又治雁瘡及諸痛痒或無名者且標注所舉皆外證已外証雖則爾當主腹症此謂本末腹症本也外証末也萬萬咸同。東洞子曰合病條病之說非疾醫事也。氣水氣也。

東洞子曰當有項背強急心悸症能解嚴

升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆

取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁

忌以水二合煮取六勺

太陽病項背強几几無汗惡風○太陽與陽

明合病者必自下利○大陽病無汗而小便

反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘕

葛根加半夏湯 治本方證而嘔者

於葛根湯方內加半夏半升

葛根半夏各六分桂枝芍藥甘草各三分麻黃

大棗生姜各四分

右八味煮如本方

太陽與陽明合病不下利但嘔者

葛根黃連黃芩湯 治項背強急葛根心悸黃連而

下利黃芩者 葛根半斤一錢甘州黃芩各

二兩四分黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥

類聚方集覽上

煮取二升去滓分温再服以水二合六勺煮取六勺

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脉促者

表未解也喘而汗出者

小柴胡湯 治胸脇苦滿柴胡或寒熱往來黃芩

或嘔半夏者

柴胡半斤八分黃芩人參甘草生姜各三兩大

棗十二枚各三分半夏半升六分

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎

○按心下痞鞭證不可開
○治瘧服如桂枝法也柴胡加芒消湯柴胡去半夏加栝蒌湯柴胡加桂枝湯柴胡姜桂湯大柴胡湯皆同宜各隨其證

○加減法不足信

取三升温服一升日三服後加減法若胸中

煩而不嘔去半夏人參加栝蒌實一枚若渴

者去半夏加入人參合前成四兩半栝蒌根四

兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇下

痞鞭去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不

利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱

者去人參加桂三兩温覆取微汗愈若欬者

去人參大棗生姜加五味子半升乾姜二兩

○或胸中以十二
六字恐僂又

○脉但浮者豈必
為麻黃湯證乎

以水二合四勺煮取一合
二勺去滓再煎取六勺

傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默
不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴
或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利
或不渴身有微熱或欬者○太陽病十日以
去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛
者與小柴胡湯脉但浮者麻黃湯主之○血
弱氣盡滕理開邪氣因入與正氣相搏結於

○以法治之者蓋
柴胡去半夏加枳
實湯

○傷寒四五日以
下非小柴胡湯証
柴胡蘆桂湯証乎

脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不
欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使
嘔也○服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治
之○得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫
醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身
黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本
渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦
○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手

足溫而渴者○傷寒陽脉懸陰脉弦法當腹
中急痛者先與小建中湯不差者○傷寒中
風有柴胡證但見一證便是不必悉具○凡
柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與
柴胡湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解○大
陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴
胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急
鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡下之則愈

○經水適斷者非
婦人而何婦人
字不可刪蓋筆受
者誤也且熱入血
室者而曰經水適
斷其血必結此言
大可疑又非柴胡
證反是桃核承氣

○傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡發
潮熱已而微利此本柴胡証下之而不得利
今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱
者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加
芒消湯主之○婦人中風七八日續得寒熱
發作有時經水適斷者此為熱入血室其血
必結故使如瘧狀發作有時○傷寒五六日
頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大

湯證也。婦人傷寒寒熱
得來經水適來者
正是熱入血室證
也其血必下而如
瘧狀謔言妄語如
有神聖者宜用小
柴胡湯加乾地黄
紅花尤效矣
。近方家但以脉
別半表半裡證此
空論也以胸脇苦
滿為半表半裡之
候可也若其微旨
別有腹診之法詳
于腹診圖解

便鞭脉細者此為陽微結必有表復有裏也
脉沈亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不
得復有外症悉入在裏此為半在裏半在外
也脉雖沈緊不得為少陰病所以然者陰不
得有汗今頭汗出故知非少陰也。可與小柴
胡湯設不了了者得屎而解。○傷寒五六日
嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴
胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為

逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿
而鞭痛者此為結胸也。大陷胸湯主之但滿
而不痛者此為痞。柴胡不中與之宜半夏瀉
心湯。○陽明病發潮熱大便溏小便自可胸
脇滿不去者。○陽明病脇下鞭滿不大便而
嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津
液得下胃氣因和身濈然而汗出解也。○陽
明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心

痛又按之氣不通鼻乾不得卧啞卧一身及
 面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫
 刺之小差外不解病過十日脉續浮者與小
 柴胡湯脉但浮無餘症者與麻黃湯若不尿
 腹滿加噦者不治○本太陽病不解轉入少
 陽者脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未
 吐下脉沈緊者○若已吐下發汗溫鍼譏詁
 柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之○

傷寒初服小柴胡湯差已後更發熱者病未盡也故再用小柴胡若其
 證變者或以汗或
 以下各隨其證凡
 差已後再發者皆
 此例也初服瀉心
 者再與瀉心初服
 承氣者再與承氣
 產後三證所多
 有也各宜隨證治
 之豈獨小柴胡湯
 而已耶故東洞子
 刪之平若病鬱冒
 者宜失笑散或忽
 暈絕者宜急刺其
 百會以取血
 產後心胸若煩熱

嘔而發熱者○傷寒差已後更發熱者小柴
 胡湯主之脉浮者以汗解之脉沉實者以下
 解之○諸黃腹痛而嘔者○新產婦人有三
 病一者病瘕二者病鬱冒三者大便難何謂
 也曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘕亡
 血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便
 難產婦鬱冒其脉微弱不能食大便反堅但
 頭汗出必以然者血虛而厥厥而必冒冒家

此轉變生虫也服
三物黃芩湯得虫
下乃愈產後諸疾
久久不差或至不
救者間有此證不
可不知也

東洞子曰小柴
胡湯證而有堅塊
者主之

瘧疾及諸如瘧
狀者且陽明病燥
屎之外證或近方
家稱勞證名無根
火者皆是潮熱而
實也非虛矣東洞
子以為虛實弗可
拘故於潮熱者實
也五字域焉而異
之乎然余恐蒙士
見此乃以潮熱為
虛乎故云爾

欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭
汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨
盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食
婦人在州蓐自發露得風四肢若煩熱頭痛
者與小柴胡湯頭不痛但煩者三物黃芩湯
主之

柴胡加芒消湯 治柴胡湯證而若滿難解
者 於小柴胡湯方內加芒消六兩

柴胡分八半夏分六芒消分六人參黃芩甘草生

姜大棗各三

右八味以水二合四勺煮取一合二勺去

滓再煎取六勺內芒消更上火微沸令消

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡必發潮

熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今

反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者

實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒

東洞子曰嘗有胸脇苦滿證

消湯主之

柴胡去半夏加枳實湯 治小柴胡湯證而渴

枳實不嘔夏去半者

於小柴胡湯方內去半夏加枳實根四兩

柴胡八分人參黃芩甘草生姜大棗各三分枳

實根四分右七味煮如本方合二升

治瘧病發渴者亦治勞瘵

柴胡加桂枝湯 治小柴胡湯與桂枝湯三方

。加桂枝湯姜桂湯下言症甚寥寥須於小柴胡湯下求之其他主症亦歷觀類方相通用則有益甚多猶白虎湯主症在白

虎加入參湯下夫加桂枝湯者日用佳方親家常茶飯且功效多矣由按經曰主小柴胡湯者而服此方則其効勝小柴胡湯者至多可以不思哉

證相合者

桂枝黃芩人參芍藥生姜各

一兩半大棗六枚各三分甘草一兩分半夏二

合半分八柴胡四兩分八

右九味以水柒升煮取三升去滓溫服一升

日三服今煮如小柴胡湯

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

下支結不證未去者○發汗多亡陽識語者

不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液

類聚方集覽上

○中猶言傷也

○東洞子曰頭汗出者是衝逆也又曰當有胸脇有動證

○今煮如小柴胡湯

後自愈○心腹卒中痛者

柴胡姜桂湯 治小柴胡湯證而不嘔去半夏渴

拈薑而腹中有動牝上衝桂枝者

柴胡半斤八分桂枝乾姜黃芩牡蠣各三兩三分

拈薑根四兩四分甘草二兩二分

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎

取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗

出便愈○傷寒五六日已發汗而復下之胸

脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也○廬寒多微有熱或但寒不熱者

柴胡加龍骨牡蠣湯 煥案治小柴胡湯證而

胸牝腹有動龍骨心下悸茯苓煩驚牡蠣上逆桂枝大黃

者 半夏二合四分大棗六枚生姜人參龍

骨鈎丹桂枝茯苓牡蠣各一兩半各二分柴

胡四兩六分大黃二兩三分

類聚方集覽上

○東洞子曰當有胸腹動證此方主又手月心等升陽散火湯證而煩躁上逆胸腹有動者與桂枝加龍骨牡蠣湯同然此方主苦滿是為小異耳

驚癇或心氣不定者主之

○東洞子曰小柴胡湯證而胸腹拘攣可下者主之又曰本方當有大黃五兩經再煎下有取三升三字又曰一方以下注文也

金匱要略有大黃二兩右七味作右八味

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如棊子更煮一二沸去滓溫服一升傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者

大柴胡湯 治小柴胡湯證而心下痞硬

參腹滿枳實大黃拘攣藥或嘔生薑者

柴胡半斤分八黃芩芍藥各三兩大棗十二枚

各三分半夏半升分六生薑五兩枳實四枚各五分

右七味以水一斗一升煮取六升去滓再煎

溫服一升日三服一方用大黃二兩分二若不

加大黃恐不為大柴胡湯也煮如小柴胡湯

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日

柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下

急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之

則愈○傷寒十餘日熱結在裡復往來寒熱

者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結

○白虎湯東洞子
曰以上三章非白
虎湯之証乃於白
虎加人參湯條下
辨之。又曰煎法可
後白虎加桂枝湯
。按口不仁者渴
而古上乾燥生肌
故言語不利且不
知食味是也加之
以讖語遺尿自汗
身重乃白虎証也
明矣為非白虎証
者余未得其說
診脈以決白虎証
者不可不知按脈稍久稍用力而指頭熱者是裏熱也。白虎類與五苓

散亦互有相救之勢。蓋証先與白虎湯而難愈者此支飲得除心下開爽
而白虎之功見也
余知之者曰服文
蛤散若不差者與
五苓散是文蛤散
與五苓散相表裡
也。文蛤但治渴故
準擬以知白虎與
五苓相救也。治驗
亦多。
○東洞子曰白虎
湯症而心下痞鞭
者主之。又若渴欲
飲水口乾舌燥條
曰為則按以上四

在胸脇也。但頭微汗出者大陷胸湯主之。○
傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利
者○按之心下滿痛者此為實也。當下之。○
傷寒後脈沉沉者內實也。下解之。

白虎湯 治大渴引飲 石膏 煨燥 知母 粳米

知母六兩六分 石膏一斤六分 甘草二兩二分 粳

米六合二分

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服以水一合 煮取六分

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒○三陽合病

腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讖語遺

尿發汗則讖語下之則額上生汗手足逆冷

若自汗出者○傷寒脈滑而厥者裏有熱也

白虎加人參湯 治本方證而心下痞鞭人參者

於白虎湯方內加人參三兩三分

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者

章千金方作白虎湯去之外臺亦同而方後曰傷寒論方今從之

炎暑中昏暴吐瀉惡風汗出而渴此為喝病治中喝及霍亂或四肢厥冷者又治瘧疾服如桂枝湯法加人參湯加桂枝湯皆同

○傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者○傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者○若渴欲飲水口乾舌燥者○太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴

白虎加桂枝湯 治白虎湯證而上衝桂枝者

於白虎湯方內加桂枝三兩三分右以水一斗五升煮取八升去滓溫服○溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔

類聚方集覽上

類聚方集覽下

日本

南總

雉間煥子炳標注

男 適之適校

小承氣湯

治腹滿

枳實厚朴

而大便難大者黃者

大黃四兩

一分

厚朴二兩

六分

枳實二枚

九分

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分

溫二服

以水二合

初服

湯當更衣不爾者盡

飲之若更衣者勿服之

類聚方集覽下

也。更衣謂大便下也。

○病後及平日頻放屁者宜此方

○大滿不通者宜主大承氣湯外症雖有微發熱惡寒手已稱微亦何拘拘
○小便清者說見于桂枝湯標

○失氣當作矢氣轉訛也矢與屎通轉矢氣謂放屁夫欲用大承氣者先與小承氣而以轉失氣為其候若此或不然且曰攻之必脹滿者亦不足信之若用大承氣有失害者雖小承氣不當用之此摸索以冀有漏中者已蓋僥入也明矣要之嘗一誤藥而怯癘為痼者之言

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮不可與承氣湯若大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛

者必衄宜桂枝湯○陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯損之不轉失氣者慎不可攻也○陽明病

也非長沙家法且
診燥屎之法詳于
大承氣標
畢竟大小承湯二
方本同証也若去
消石者譬之鉤刀
遂弗可用已若以
大承氣湯為不可
則當按他方用之
不可忽諸

○下利讖語者有
燥屎是大承氣湯
症
○長沙氏有小承
氣湯我未能信之

其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭
則讖語小承氣湯主之若一服讖語止更莫
復服○陽明病讖語發潮熱脉滑而疾者小
承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣
者更服一升若不轉失氣勿更與之明日不
大便脉反微流者裏虛也為難治不可更與
承氣湯也○大陽病若吐若下若發汗微煩
小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈○

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下
鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微
和之令小安至六日與承氣湯一升若不
便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後
必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭
乃可攻之宜大承氣湯○下利讖語者有燥
屎也○大便不通噦數讖語者

厚朴三物湯 治小承氣湯證而腹滿甚
厚朴 枳實

而况於厚朴三物湯乎

○東洞子曰此方合厚朴三物湯與桂枝去芍藥湯而加生姜二兩方也由是觀之當有二方證而上逆嘔証

○治後世稱膨脹者又大黃合桂枝合芍藥能治衝逆

○按或以甘州湯為後方可也此表裏相救也曰陽明病不吐不下心煩者調胃承氣湯主之由是知之

倍者 厚朴八兩 三錢四分 大黃四兩 一錢二分 枳實五枚 五分 右三味以水一斗二升先

煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升

以利為度 前煮如 ○痛而閉者

厚朴七物湯 治腹滿 枳實發熱 桂枝上逆 桂枝

而嘔 生者

厚朴半斤 八分 甘州大黃各三兩 三錢 大棗十枚

二分 枳實五枚 生姜五兩 各五分 桂枝二兩 二分

右七味以水一斗煮取四升溫服 八合 日三服 以水合五 嘔者加半夏五合下利去大黃寒多者加生姜至半斤
病腹滿發熱十日脉浮而數飲如故

大承氣湯 治腹堅滿 厚朴芒 若下利臭穢 大黃

芒消者凡有燥屎者臍下必磊

砢也肌膚必枯燥也煥曰以手按腹病人兩

手護之眉皺作楚是也

蕎麥煎法蕎麥桿
為麤末加鹽炒熱
入囊以摩腹上能
令藥力透

大黃四兩一分厚朴半斤二分枳實五枚七分

芒消三合九分

右四味以水一斗先煮二物取五斗去滓內

大黃煮取一升去滓內芒消更上火微一兩

沸分溫再服得下餘勿服以水三合煮厚朴枳實減半去滓內

大黃煮取六分內芒消令消

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

所謂治有汗吐下和之四者蓋本于茲

宜與小承氣湯標併觀上條同

手足戢然而汗出者此大便已鞅也大承氣

湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其

熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可

與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下陽明

病潮熱大便微鞅者可與大承氣湯不鞅者

不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之

法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有

燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞅

○傷寒有燥屎者
外証多如是其機
不可失矣

○醫宗必讀云治
傷寒九日以來口
不能言目不能視體不能動四肢俱冷六脉皆無以手按腹病人兩手

護之眉皺作楚跌陽脉大而有力乃知腹有燥屎也遂下之得燥屎六七
枚而口能言體能
動矣

後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲

飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞫

而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不

可攻也○傷寒若吐若下後不解不大便五

六日上至十餘日日晡必發潮熱不惡寒獨

語如見鬼狀若劇者發則不知人循衣摸床

惕而不安微喘直視脉弦者生澹者死微者

但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止

後服○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃

中必有燥屎五六枚也若能食者但鞫爾○

汗出譫語者以有燥屎在胃中此為風也須

下之過經乃可下之下之若早語言必亂以

表虛裡實故也下之則愈○二陽併病太陽

證罷但發潮熱手足熱熱汗出大便難而譫

語者下之則愈○陽明病下之心中懊憹而

煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞫後必

此非桂枝湯証
恐桂枝麻黃各半湯

六
唐不可攻之若有燥屎者○病人煩熱汗出
則解又如瘧狀日晡必發熱者屬陽明也脉
實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承
氣湯發汗宜桂枝湯○大下後六七日不大
便煩不解腹滿痛者此有燥屎也○以然者
本有宿食故也○病人小便不利大便乍難
乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也○
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩燥心下

但發熱汗多者
不可妄攻之詩云
戰戰兢兢如臨深
淵如踏薄冰此之

鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微
和之令小安至六日與承氣湯一升若不大
便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後
必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭
乃可攻之○傷寒六七日目中不了了睛不
和無表裏證大便難身微熱者此為實急下
之○陽明發熱汗多者急下之○發汗不解
腹滿痛者急下之○腹滿不減減不足言當

謂也下條口燥咽乾者亦同焉然大承氣湯証而急下之者急下之可也世醫本恐下劑故以不得盡其劑故雖下利未爽快見其未爽快以為既虛妄與補藥亦何愚也除病莫如盡未盡無止後服夫病如火也一星之火咸陽為灰毒之不盡雖少乎不可不除矣

下之○陽明少陽合病必下利其脈不負者煩也負者失也互相剋賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之○少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之○少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之○少陰病六七日腹脹不大便者急下之○下利三部脈皆平按之心下鞭者急下之○下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之○入病

○中風卒倒有因食噉太過者此曰食厥此方主之

○差後至其年月日時復發者何必下利乎諸病或有一例宜深思之初服承氣湯病解能食後更發熱者病未盡故也更與承氣小柴胡湯條有此例宜併觀之

有宿食何以別之曰寸口脈浮而大按之反澁尺中亦微而澁故知有宿食當下之○下利利不欲食者以有宿食故也當下之○下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之○下利脈反滑當有所去下之乃愈○病腹中滿痛者此為實也當下之○脈雙弦而遲者必心下鞭脈大而緊者陽中有陰也

可以下之○瘕為病胸滿口噤卧不著席脚

惡露不盡非產後而何刪產後字者記者訛也且恐桃仁承氣湯証

東洞子曰當有心悸証

以下三方善用之應變奏功不可勝計矣風引煩悸手足解曳惡對人厭煩費面色時時變志氣恍惚積熱蒸面及狂疾諸病驚風疳癆等症謂此

癰痲者或酒毒傷食或眼生翳障赤澁流淚或諸麻帶下又諸血症心煩者諸心腹卒痛皆主之

東洞子曰煎法當從大黃黃連瀉心湯附子瀉心湯之法也又曰不足千金作不定今從之

學急必斷齒○病解能食七八日更發熱此

為胃實○產後七八日無太陽證少腹堅痛

此惡露不盡不大便煩燥發熱切脈微實再

倍發熱日晡時煩躁者不食食則讖語至夜

即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱也

大黃黃連瀉心湯 治心煩黃連心下痞按之

瀉心湯者黃連大黃二兩錢黃連一兩錢

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分

服

溫再服以麻沸湯八勺內藥

心下痞按之濡其脈關上浮者○傷寒大下

後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯

攻痞宜大黃黃連瀉心湯

瀉心湯 治心氣不定黃連心下痞按之濡黃連

黃芩者 大黃二兩錢黃連黃芩各一兩分

右三味以水三升煮取一升頓服之

○總與上方同而此方為勝

心氣不足吐血衄血三六○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之○婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

附子瀉心湯 治瀉心湯證而惡寒附者於瀉心湯方內加附子一枚

右四味切參味以麻沸湯二升漬之須臾絞

去滓內附子汁分溫再服

大黃錢一黃芩黃連各五分附子七分

右四味以水九勺先煮附子取六勺去滓

內諸藥煮一二沸須臾絞去滓服

心下痞而復惡寒汗出者

大黃附子湯 治腹絞痛附子惡寒細辛者

大黃二兩分九附子三枚一錢三分細辛二兩分六

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強

類聚方集覽下

○胸脇腹偏背滿腹絞痛至甚身不可轉側肉骨如磬坐卧兩不得者治之如神又曰承氣柴胡類以此方為

後方或長服承氣柴胡類之人一日開服此方而用前藥乃奏功平倍也。此寒也者謂水氣惡寒即水氣故附子治之又細辛治之。

人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里進一服以水一合五勺煮取六勺。腸下偏痛發熱其脈緊弦此寒也。以溫藥下之。
大黃甘遂湯 治腹滿如敦狀大黃小便微難甘遂
甜或經水不調者
大黃四兩一錢四分甘遂阿膠各二兩七分
右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下以水一合八勺煮取六勺

治諸打撲要劑也。或為木石所壓或從高墜若劇則瘀血上攻心腹實痛膨脹關亂二便不通或厥冷垂危者並主之。金匱云亦治男子膀胱滿急有瘀血者蓋此破傷風者服之且

婦人小腹滿如敦狀小便微難而不渴生後此為水與血俱結在血室也。
抵當湯 治瘀血凡有瘀血者二少腹鞭滿小便快利者一也腹不滿其人言我滿者二也。煥案健忘者亦有瘀血急則以湯緩則以丸。水蛭虻蟲各三十個耐桃仁二十個分大黃三兩錢二右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服為末以水一合煮取六勺

類聚方集覽下

傳瘡口有効又竹木刺在肉中者和飯附瘡口即取出又眼目赤疼流淚痛不可忍者洗之最妙

。尿雖鞭云云是患血症之人

太陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈乃以然者以大陽隨經乘熱在裏故也○太陽病身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也○陽明證其人喜忘者必有畜血必以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖鞭大便反易其色必黑○病人無表裏證發

。為丸主治與浮石丸同東洞子曰治病不別男子婦人雖然則然乎心下痞按之濡與腹不滿其人言我滿者於症則同於方則異男子必三黃丸婦人乃浮石丸抵當丸豈必為無異乎○晬時周時也陰症傷寒有熱小腹痛應小便不利

熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血○婦人經水不利下

抵當丸 治抵當湯症而緩者

水蛭 蟅蟲 桃仁 各二十個 大黃 三兩 六錢

右四味杵分為四丸以水一升九煮一九取

七合分服之晬時當下血若不下者更服○

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為

類聚方集覽下

者反利者宜兼用
此方或單用更無
餘藥可救其或若
傷寒二字緊要也
不可刪

○橘皮大黃朴消
湯中諸魚毒者皆
主之又總治宿食
在心胸間而不化
不限魚毒魚毒久
而為癥病者以苦
酒飲漿水煮服妙
○大黃消石湯當
有心煩症治噎噎
又平日懊懣者主之或為丸為兼用劑亦可也

有血也當下之不可餘藥

橘皮大黃朴消湯 治胸間有宿滯橘皮而結芒消

大者 橘皮一兩六分大黃朴消各二兩一分

右三味以水一大升煮至小升頓服即消以水

一合八勺 煮取六勺 ○鱸食之在心胸間不化吐復

不出速下除之久為癥病

大黃消石湯 治發黃黃蘗腹中有結塊大黃

者 大黃黃蘗消石各四兩八分梔子十五枚消石

分四 右四味以水六升煮取三升去滓內消
石更煮取一升頓服以水一合二勺煮三味
黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和
裏實當下之

大黃牡丹皮湯 治臍下有堅塊大黃按之則

痛瓜子及便膿血挑核者

大黃四兩六分牡丹一兩四分桃仁五十個芒

消三合各三分 瓜子半升一分

類聚方集覽下

○東洞子曰千金
方作牡丹皮三兩
瓜子一升芒消二
兩瓜子一升當分
十兩
按便毒與腸癰治
相類故便毒未潰
者服之可以下之

奇術也便毒腸癰
共不可論膿成與
未成
此方不獨治腸癰
而已專能治無名
惡瘡癰疔腫塊癩
瘰癧流注楊梅便毒
及一切有膿者及
淋疾帶下痔漏痢
疾等雖及數年者
皆有奇功
。東洞子曰當有
急迫証
治心腹虫痛加鷓
鴒菜益奇
吐食或因大便秘閉故用大黃

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再
煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血以水三合
六勺煮取六勺去內芒消令消○腸癰者小腹腫痞按之
即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡
寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪
數者膿已成不可下也

大黃甘州湯 治秘閉大黃急迫甘州者

大黃四兩錢二甘州一兩分五

鷓鴒菜益奇吐食或因大便秘閉故用大黃

。東洞子曰但拘
急而大便不通者
主之
實者謂堅實有塊
也
凡噦逆家之要妙
也

右二味以水三升煮取一升分溫再服以水一合

八勺煮取六勺○食已即吐者

調胃承氣湯 治大黃甘州湯證而實芒者

大黃四兩錢一甘州二兩分五芒消半觔錢二

右三味以水三升煮取一升去滓內芒

消更上火微煮令沸少少溫服以水一合八勺煮取六勺

去滓內芒消令消

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣

類聚方集覽下

此症而用桂枝湯，非醫人哉？為誤者，昭昭然，曰得之便，厥其然。

○一切牙齒疼痛者，加黃連服之，大有奇効。及小兒疳蟲蝕齒，或至色黑者，亦加黃連用之。不早治之，稍至朽盡，夫世醫謂一切口病多因胃熱者，不可謂無也。調胃者，蓋疏滌胃中熱毒之謂乎？病人面熱亦胃熱也。宜此方加黃連亦可也。若甘姜味辛夏仁。

黃湯條有微宜併觀

○陽明病不吐不下，心煩譫語燥屎等傷寒用此方之樞要也。但曰大黃甘艸湯証而實者，於是後生或惑，故云爾。又主痢疾。

急反與桂枝湯欲攻其表，此誤也。得之便厥，咽中乾煩躁吐逆者，作甘艸乾姜湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者，更作芍藥甘艸湯與之。其脚即伸。若胃氣不和譫語者，少與調胃承氣湯。若重發汗復加燒鍼者，四逆湯主之。○發汗後惡寒者虛故也。不惡寒但熱者實也。當和胃氣。○太陽病未解陰陽脈俱停，必先振慄汗出而解。但陽脈微者，先汗出而解。

但陰脈微者，下之而解。若欲下之，○傷寒十三日不解，過經譫語者，以有熱也。當以湯下之。若小便利者，大便當鞭而反下利，脈調和者，知醫以丸藥下之，非其治也。若自下利者，脈當微厥。今反和者，此為內實也。○太陽病過經十餘日，心下溫溫欲吐而胸中痛，大便反澹，腹微滿，鬱鬱微煩，先此時自極吐下者，與調胃承氣湯。若不爾者，不可與。但欲嘔胸

○日數固，或不拘，然太陽病三日者，但變為陽明病之稱也。故曰屬胃也。不然，則但有桂枝証。

○小腹急結者，有二焉。一則帶急迫者，二則無逼迫，但小腹結實而有塊耳。赤白帶下，主之並痢疾打撲瘀血者，小腹急結有塊者，男子亦宜此方。產後百疾莫神於此方之神焉。善會

毒

此術則產論及其它方法皆可以覆醫，甄催生亦至妙。又經水之變皆

○乾血著臍下，故其痛不可忍。是以稱毒痛，又因經水之變。治打撲功次，于抵當湯凡攻瘀血劑

中痛微唐者，此非柴胡證，以嘔故知。極吐下也。○陽明病，不吐不下，心煩者。○太陽病三日，發汗不解，蒸蒸發熱者，屬胃也。○傷寒吐後腹脹滿者。○大便不通，胃氣不和者。

挑核承氣湯

治血證

挑核小腹痛急結 大黃上

衝枝者

挑仁五十個 桂枝 芒消 甘草 各

二兩

各五分 大黃四兩

錢

右五味以水七升，煮取二升半，去滓內芒消

更上火微沸，下火先食溫服五合，日三服。當微利。以水一合，五勺，煮取六勺。

太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，當先解外，外解已，但小腹急結，乃可攻之。

下瘀血湯

治臍下毒痛

挑核及經水不利 大

廣者

大黃二兩

錢四 挑仁 蟅虫 各二十枚

右三味末之，煉蜜和為四九，以酒一升煎

皆治打撲，若無麝蟲以蜜與代之。

挂合破血劑能助其功，是治衝逆之餘力也。

○一味玉瓜根以苦酒煮服，治經水不利者。

陰癩腫者陰囊腫大及陰莖腫脹或水疱光澤是也小兒亦同。

丸取八合頓服之新血下如豚肝以酒八勺

六○產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不

愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯

主之亦主經水不利

土瓜根散 治少腹拘急芍藥經水不利 挂枝土

或下白物廣者

芍藥挂枝廣蟲土瓜根各三分

右四味杵為散酒服方寸匕日三服

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者陰癩腫

甘州湯 治逼迫及咽喉急痛者

甘州二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七

合日二服以水一合○少陰病二三日咽

痛者可與甘州湯不差者與桔梗湯

桔梗湯 治甘草湯證而有膿或粘痰者

類聚方集覽下

○一本治下有病字。東洞子曰甘州主急迫也。甘州湯五苓散二方善知運用之妙則與諸方相表裡而有再快功也。

○東洞子曰粘痰如膿者主之。

按金匱再服下有則洗膿血也五字

東洞子曰有粘痰或膿血而急迫者主之
按排膿散排膿湯二方排膿字足以知其主治故略其症乎又桔梗湯下效而胸滿振寒

桂枝一兩錢 甘州二兩錢

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

以水一合八勺煮取六勺 ○少陰病二三日咽痛者可與

甘州湯不差者 ○欬而胸滿振寒脉數咽乾

不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為

肺癰

排膿湯 治膿血瘰及粘痰 桔梗 生姜 急迫 甘州者

甘州二兩分 桔梗三兩分 生姜一兩四分

條即排膿湯症也用之大勝桔梗湯

棗十枚錢 右四味以水三升煮取一升

温服五合日再服 以水一合八勺煮取六勺

芍藥甘州湯 治拘攣 芍藥 急迫 甘州者

芍藥甘州各四兩錢

右二味以水三升煮取一升半去滓分

温再服之 以水一合二勺煮取六勺

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥

類聚方集覽下

○見于調胃承氣湯標

○凡腹弦急按之不撓者主之
治腹痛雖然亦宜因其腹症

東洞子曰芍藥
甘艸湯加減之方
也故當有變急症
煥按當有嘔症此
方主水病曰雖利
心下續堅滿者下
利而腹空故遍身
水氣直飯心下也續與此湯續得下利水氣盡而愈故曰此為留飲欲去

故也

發汗不解反惡
寒此以謂風氣去
濕氣在也

咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾姜湯與之以

復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘艸湯與

之其腳即伸若胃氣不和譫語者少與調胃

承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

甘遂半夏湯 治芍藥甘艸湯證而心下鞭滿

嘔甘遂者 甘遂三枚分半夏十二枚錢

分芍藥五枚甘艸指大一枚各八分

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半斤

續與此湯續得下利水氣盡而愈故曰此為留飲欲去

和藥汁煎取一合頓服之以水一合六分煮

四勺和藥汁煎取六勺○病者脉伏其人欲自利利反

快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也

芍藥甘草附子湯 治芍藥甘艸湯證而惡寒

附者 芍藥甘草各二兩錢附子一枚六分

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分

溫服以水二合煮取六勺

發汗病不解反惡寒者虛故也

類聚方集覽下

○藏躁之藏與藏
堅癖之藏同此陰
中急躁色慾妄動
也每以狂疾者服
此方如神故吉子
於此獨不刪藏字
可謂得矣弗可容
易看過

○粉之說紛紛誰
知其是非然余謹
案是甘州粉也何
則吐涎吐虫此是
病危篤欲絕之時
多有焉急迫至劇
者心心痛死謂朝發夕死非藥力不效是也且曰毒藥不止言

甘麥大棗湯 治急迫州而狂驚小者

甘草三兩四分 小麥一升四分 大棗十枚四分

右三味以水六升煮取三升分温三服以水

二勺煮 ○婦人藏躁喜悲傷欲突象如神靈

取六勺 咳作數欠伸至矣

甘州粉蜜湯 治吐涎吐虫心痛發作有時者

甘州二兩二錢 粉一兩一錢 蜜四兩四錢

右三味以水三升先煮甘州取二升去滓內

者心心痛死謂朝發夕死非藥力不效是也且曰毒藥不止言

麻牛

雖剛烈之藥不能治之而此方能救之亦何神也急食甘以緩之之謂也其
如是故一味甘草
煮汁而不足再內
甘草粉又內蜜以
助其藥勢而後始
有毫西日之力焉
其他稱温粉白粉
而此但曰粉且受
于甘草下故余知
之不實以此知之
而已經驗無算故
居恒每戲云豈死
者我能使之起勿
謂余誕又按甘草
一名粉草若蓋本
于斯及可以為微

粉蜜攪令和煎如薄粥温服一升差即止以水

九勺先煮甘州取六勺去滓

內粉蜜攪令和煎如薄粥 蛇蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥

不止

生薑甘州湯 治發唾涎沫不止生薑 心下痞

硬參急迫甘者

生薑五兩一錢 人參三兩六分 甘草四兩 大棗十

五枚各八分

類聚方集覽下

也。生薑甘州湯東

洞子曰當有心下痞鞭強急之症

○甘州乾姜湯東洞子曰當有急迫之証

治久痢兼用承氣丸

四逆輩本出于此方而卻為四逆之

後方有再快之功焉

大率急卒逆冷者宜此方大病在解

不差而厥冷者宜四逆輩矣

右四味以水七升煮取三升分溫三服

肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

甘草乾姜湯

治厥而煩躁甘多涎唾乾者

甘草四兩錢乾姜二兩分五

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服以水一合二勺煮取六勺

肺痿吐涎沫而不咳者其人不可不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為

肺中冷必眩多涎唾甘州乾姜湯以溫之若

服湯已渴者屬消渴○傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲攻

其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者

作甘草乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫

者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣

不和讖語者少與調胃承氣湯若重發汗復

加燒鍼者四逆湯主之

類聚方集覽下

○詳見于芍藥甘

草湯及調胃承氣

湯標

類聚方集覽下

東洞丁曰此方
甘艸君藥也

乾姜治結滯之水
毒故傍治小便清

利
清穀之清與圖通
者鑿也言穀食不

化無莫穢故曰清
穀也小便清利亦

爾言飲而直尿且
色不變也

加葱白大有驗

四逆湯 治四肢厥逆甘草身體疼痛附子下利清

穀附子或小便清利甘草者

甘草二兩一分乾姜一兩半附子一枚各九分

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓

分溫再服強人可附子一枚乾姜三兩以水

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥

湯標
。說見于調胃承氣

咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯與之以
復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與
之其脚即伸若胃氣不和讖語者少與調胃

承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛

者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救

表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○病發熱

頭痛脈反沉若不差身體疼痛當救其裏○

類聚方集覽下

病發熱以下反麻
黃湯症已但以日

○說見于桂枝湯
標

脉沉為四逆湯症
非可從

。當吐之者宜服
瓜蒂散上文皆瓜
蒂症故知之

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者○利不渴
者屬大陰以其藏有寒故也當溫之宜服四
逆輩○少陰病脉沉者急溫之○少陰病欲
食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐如得
之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當
吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫
之○大汗出熱不去內拘急四肢厥又下利
厥逆而惡寒者○大汗若大下利而厥冷者

嘔而脉弱云云條
皆舉証之相反者
也其為難治實然
然空論也不足以
為據

末二條皆霍亂病
且最末條恐通脉
四逆湯

此方乾姜君藥
也乾嘔不止者加
梗米

○下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻
其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯○嘔而脉弱
小便復利身有微熱見厥者難治○吐利汗
出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者○既吐
且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外
熱脉微欲絕者

通脉四逆湯 煥案治前方證而乾嘔倍加者
甘艸二兩 附子一枚 乾姜三兩
錢一分 五厘 一分 六分

類聚方集覽下

○東洞子曰當作附子大者一枚以干姜知其然甘草新校正作三兩是也
加減法不足信之身反不惡寒以下二十六字亦攙入
加葱白大有驗不拘面色

○裏寒外熱外寒裏熱之辨治傷寒少陰症及下利之緊要不可不知說見

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脉即出者愈後加減法面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生姜二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩煮如本方
○下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者

于白虎湯標

○東洞子曰當有心下輕病也辨之藥徵人參條下

○東洞子曰當有心下悸惡寒症煖案當曰四逆加人參湯症而悸者

寒外熱汗出而厥者

四逆加人參湯 治四逆湯證而心下痞鞅人參

者 於四逆湯方內加入人參一兩

甘草 乾姜附子 各七分 人參五分

右四味煮如本方

惡寒脉微而復利利止亡血也

茯苓四逆湯 治四逆湯證而悸者

茯苓六兩 一錢 人參一兩 二分 甘草二兩 五分

恐是脫字又按此條方證似不相對

○若無猪膽以水銀或黃金水却有已上數方中此方最如神篤志者記慢驚風危篤者主

乾姜一兩半附子一各三分

右五味以水五升煮取三升去滓温服七合

日三服以水六勺

發汗若下之病仍不解煩躁者

通脉四逆加猪膽汁湯 煥案四逆湯證而煩

躁猪者八於四逆湯方內加猪膽汁半合

如無猪膽以羊膽代之○吐已下斷汗出而

厥四肢拘急不解脉微欲絕者

○當有下利煩躁惡寒証

此方晝日燥躁夜則安眠者實能治之大奇也

乾姜附子湯 煥案治下利附子乾嘔姜干者

乾姜一兩一分附子一枚一分

右二味以水三升煮取一升去滓頓服以水

八勺煮取六勺

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜

不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者

附子粳米湯 治腹中雷鳴半夏切痛附子或

嘔吐半夏者附子一枚三分半夏一錢

頤聚方集覽下

寒氣水氣也

○東洞子曰當有惡寒或浮腫症煥曰主諸水氣者又曰此散腹脹如疝何一日三用之為治然腹脹甚又曰此方為諸烏頭劑後方○緩急亦水氣之變也緩猶痿謂痿弱不可舉也急者變急

艸一兩分二大棗十枚分五粳米半升二錢

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服以水一合六勺煎取六勺

服中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

薏苡附子散 治胸中痺薏苡惡寒附子者

薏苡仁十五兩大附子十枚分等

右二味杵為散服方寸匕日三服

胸痺緩急者

○此方亦生水氣之變

腹無積聚四字於方極為刺語恐記者訛也

薏苡附子敗醬散 治一身甲錯附子敗醬腹皮急

附按之濡如腫狀附子腹無積聚者

薏苡仁十分附子二分敗醬五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半

頓服小便當下以水一合二勺煎減半

腸癢之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腸內有癰膿

白通湯 煥案治乾嘔干下利附而頭痛葱白

類聚方集覽下

○東洞子曰當有氣逆証

當有惡寒症
干姜附子湯症而
頭痛氣逆者主之

葱白四莖

二錢

乾姜一兩

附子一兩

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

以水一合八勺煮取六勺○少陰病下利

白通加豬膽汁湯

煖案治白通湯證而厥逆

附子乾嘔乾姜煩躁劇人尿者

葱白四莖

乾姜一兩

附子一枚

人尿

五合 豬膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁

○葱白倍用可也
上方同
今代人尿以水銀
有效黃金水亦可
也

○日服湯脈暴出
者死實爾實爾不
獨此方爾諸厥逆
脈伏者服湯後微
續漸出者嘉兆也

○強人弱人異服
度者弗可謂無也
亦何剛乎烏頭桂
枝湯曰初服二合
云云烏頭湯曰不
知盡服之皆謹之
至也執七之間莫
亦諸

人尿和令相得分溫再服若無膽亦可用

水以

一合八勺煮取六勺○少陰病下利脈微者與

白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加

豬膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

大烏頭煎

治毒繞臍絞痛或自汗出手足厥

冷者 烏頭大者五枚

三錢

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令

水氣盡取二升強人服七合弱人五合不差

○刪腹痛字者亦記者訛也
已下二方若輕病則去蜜水煎服亦可也
○東洞子曰當有自汗盜汗浮腫症

○燮曰以上二方與烏頭桂枝湯大同小異譬如柏仲其救濟之妙不可勝數矣如略說見于烏頭桂枝湯標

明日更服不可一日再服以水九勺煮取三勺去滓內蜜六勺

煎取○復痛脉弦而緊弦則備氣不行即惡

寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝遠

臍痛若發則自汗出手足厥冷其脉沉弦者

烏頭湯 治骨節疼痛不可屈伸烏頭 若自汗

黃者或盜汗者若腹絞痛者

麻黃芍藥黃耆甘州各三兩分 川烏五枚

咀以蜜二升分煎取一升即出烏頭

好古之士勿失其機。病歷節者每節皆患也非惡辭之例刪之者記者

誠也攻五藏者言病勢盛而過于腹內也

右五味咀咀四味以水二升煮取一升去滓

內蜜煎中更煎之服七合不知盡服之以水

七勺煮四味取九勺去滓內蜜煎中更煎取六勺

病歷節不可屈伸疼痛○脚氣疼痛不可屈

伸○寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急不

得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆

赤丸 治心下悸赤丸 有痰飲細辛 惡寒附子 或微

厥附子 者 茯苓四兩半夏四兩一方用

類聚方集覽下

○東洞子曰當有心下悸及嘔而腹痛症與諸麻黃劑相表

裡也宜為後方于
金方發汗圓加大
附子一名神丹湯
神丹與直朱同所
謂神丹甘遂之神
丹是也。以知為度
謂腹眩也。寒氣水
氣也。
○宜煎家附子湯
同。
治一食一行者附
子湯同。

○加減法及其人
或咳以下十四字
不足信之。

桂烏頭二兩細辛一兩

右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大
先食酒飲下二九日再夜一服不知稍增之

以知為度○寒氣厥逆

真武湯

治心中躁_疾身_疾脚_疾動_疾振振欲_疾擗_疾地

_{附子}小便不利_疾或嘔_疾若下利_疾附子_疾若拘

痛_疾者_疾茯苓芍藥生薑各三兩_疾五分

朮二兩_疾附子一枚_疾四分

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合

日三服_疾以水一合_疾後加減法若效者加五

味半升細辛乾姜各一兩若小便利者去茯苓

苓若下利者去芍藥加乾姜二兩若嘔者去

附子加生薑足前成半斤

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不

利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其

人或效或小便利或下利或嘔者○大陽病

發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身
潤動振振欲擗地者

附子湯

治身體攣痛

附子芍藥

小便不利

痞鞭人若腹痛者

附子二枚茯苓芍藥各二兩分六分人參二兩分四分

朮四兩分八分

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升

日三服以水一合六勺煮取六勺少陰病得之一二日

東洞子曰嘗有
心下悸小便不利
或痞鞭症藥微辨
之
真武湯與此方太
同小異筋惕肉瞤
等症宜互相通用
。金匱要畧下云
婦人懷妊六七月
脉弦發熱其胎愈
服腹痛惡寒者小
腹如扇所以然者子藏閉故也當以附子湯温其藏

。天雄散東洞子曰失精家而小便不利臍下有動或惡寒或上逆者主

之藥微有辨

案藥微據本草附

方為說曰桂枝加

龍骨牡蠣湯條蓋

脫天雄散亦主之

六字此說實然然

彼主陰常強急此

方則主陰痿且大

有膜眩錢七日

三服恐不可也

天雄即附子

宜與桂枝加龍骨

牡蠣湯條參觀
。東洞子曰集註
曰舊本有一服得

口中和其皆惡寒者當灸之○少陰病身體

痛手足寒骨節痛脉沉者

天雄散

治小便不利

木上逆

臍下有動龍骨

而惡寒附子者

天雄三兩當作三枚朮八

兩桂枝六兩龍骨三兩

右四味杵為散酒服半錢七日三服不知稍

增之半錢七

梔子豉湯

治心中懊懣者

類聚方集覽下

吐者止後服七字
此因瓜蒂散中有
香豉而誤傳於此
今為刪正余亦從
之以下微之
案慎懷多在太病
差後日過食而發
故服湯乃得吐而
解
大病差後食已胸
中微煩昏沉者主
之反覆顛倒者煩
躁不眠不能安卧
床之甚者也結痛
亦是差後過食故
已

○惡熱身重以上
誤藥變發慎懷者
之初證也何必為
微不可拘焉

下利後條或為上
條虛煩注文而可
乎不加刪之

梔子十四枚分八香豉四合二錢

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉

煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐

者止後服以水一合六勺先煮梔子取一合去滓內豉煮取六勺

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛

倒心中懊憹○發汗若下之而煩熱胸中窒

者○傷寒五六日大下之後身熱不去心中

結痛者未欲解也○陽明病脈浮而緊咽燥

口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身

重若發汗則燥心憤憤反讖語若加燒鍼必

怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣

動膈心中懊憹舌上胎者○陽明病下之其

外有熱手足溫不結胸○心中懊憹饑不能食

但頭汗出者○下利後更煩按之心下濡者

為虛煩也

梔子甘艸豉湯 治本方證而急迫甘草者

類聚方集覽下

少氣者與短氣有微飲之短氣同

○東洞子曰已上二方証以若字者冠梔子豉湯證之辭今裂而列之故敢加梔子豉湯証而六字以通其意也
○枳實梔子豉湯東洞子曰當有心中懊懣胸滿症

懊懣與胸滿或為難別乎按此心下鞭滿耳
以上四方粗無大異大概皆主差後宿食而獨此方為最勝然不加黃者不足以立功

於梔子豉湯方內加甘草二兩分

梔子生薑豉湯 治本方證而嘔生者

於梔子豉湯方內加生薑五兩錢

梔子豉湯證而若嘔者

枳實梔子豉湯 治本方證而胸滿枳實者

枳實三枚分梔子十四枚分豉一升八錢

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實

梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分

再服覆取微似汗以水一合六勺先煮二味取八勺下豉煮取六勺

大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有

宿食者加大黃如博碁子大五六枚

梔子大黃豉湯 治枳實梔子豉湯證而閉大黃

者 梔子十二枚二分三厘大黃一兩一分五厘枳

實五枚七分五厘豉一升八分錢

右四味以水六升煮取二升分溫三服以水一合

熱痛蓋懊懷劇者

八勺煮酒黃疸心中懊懷或熱痛

茵陳蒿湯

治一身發黃茵陳大便難大者

茵陳蒿六兩八錢梔子十四枚大黃二兩

各六分右三味以水一斗先煮茵陳減六升

內二味煮取三升去滓分溫三服以水二合

取一合二勺內小便當利尿如皂角汁狀色

正赤一宿腹減黃從小便去也

穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心膈不安

○劑讀為齊蓋古齊與劑通故轉訛已

久久發黃為穀疸○陽明病發熱汗出此為

熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而

還小便不利渴引水漿者此為瘧熱在裏身

必發黃○傷寒七八日身黃如橘子色小便

不利腹微滿者

梔子蘘皮湯

治身黃蘘皮發熱心煩梔子者

梔子二十五個一錢五分甘艸一兩五分黃蘘二兩

一錢右三味以水四升煮取一升半去滓分

亦治發黃兼用承氣丸

溫再服以水一合六勺煮取六勺○傷寒身黃發熱者

梔子厚朴湯 治胸_子腹煩滿厚朴者

梔子十四枚六分厚朴四兩枳實四枚各一分

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分

三服溫進一服得吐者止後服以水一合四勺煮取六勺

傷寒下後心煩腹滿卧起不安者

梔子乾姜湯 治心中微煩者

梔子十四枚乾姜二兩各一分

○主真心痛

凡病勢盛者宜倍

甘遂

此方與梔子豉湯

茵陳蒿湯輩為表

裡大有再快之功

焉其他或為兼用

後方亦得矣下方

亦同余常為兼用

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二

服溫進一服得吐者止後服以水一合四勺煮取六勺

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者

大陷胸湯 治結胸大黃若從心下至小腹

鞞滿大黃者

大黃六兩九分芒消一升三錢甘遂一錢一分

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內

芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利

所以得効者以芒
消量多故也喜方
者思諸
若結痼甚者兼以
蕎麥稗糜其心腹
法見于大承氣湯
撰

若不結胸以下
茵陳蒿湯証也故
知與此方有表裡
之勢因以此方為
後方

○刪但結胸已下者恐不可若刪之則非天陷胸湯証。世有肩背急痛
而俄死者急用之
可以救之此所謂
真心痛而其痛微
肩背者已不急治
之則朝發不待夕
夕發不待朝者也
病人唯覺肩背痛
者無他譬猶腹中
病沉結則偏覺脊
背苦痛也其初以
大陷胸丸証曰結
胸者項亦強知之
因救肩背急痛者
甚多

止後服以水一合八勺先煮大黃取六勺
去滓內芒消令消內甘遂末服之
天陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動
則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反
惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內
拒痛胃中空虛客氣動膈短氣燥煩心中懊
懣陽氣內陷心下因鞅則為結胸天陷胸湯
主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而
還小便不利身必發黃也○傷寒六七日結

胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞅者○傷
寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴
胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也
但頭微汗出者○太陽病重發汗而復下之
不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮
熱從心下至小腹鞭滿而痛不可近者○傷
寒五六日但嘔而發熱者柴胡湯證具而以他
藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已

下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解
若心下滿而鞭痛者此為結胸也。大陷胸湯
主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之
宜半夏瀉心湯

大陷胸丸

治結胸

杏仁 甘遂

若項背強

葶藶大者 黃芩消

按白蜜二合水二
升此蜜為十分之
一也。以水一合二
勺準之。則蜜一
勺。撮也。故曰蜜下
之。強或謂強水濕布水。杜撰哉。兼用蕎麥稗摩法見于大承氣湯。標

○治真心痛
無葶藶以大戟代

一錢七白蜜二合今一水二升二合煮取一
升六溫頓服之。一宿乃下。如不下更服取之
為效禁如藥法

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和

小陷胸湯

治小結胸者

病正在心中按之 痛煩悸而嘔者

黃連一兩四分半夏半升四分枳實大者一
個八分 右三味以水六升先煮枳實取三
升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服水

○實有心煩症
治心痛
滑滑穢急痛後死
者主之說詳于大
陷胸湯標

○結胸病正在胸中不在心下心中當作心中恐轉訖

五苓散標注宜併觀曰亦可服與他稱亦主之者一例也

○治心痛

栝蔞實一味以白酒煎為膏服之治喘息效唾者

一合八勺先煮栝蔞取九勺內二味煮取六勺

○小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者○

病在陽應以汗解之反以冷水灌之若灌之

其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲

飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓

散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白

散亦可服

栝蔞薤白白酒湯

治胸背痛

栝蔞實薤白白酒

喘息

咳唾

栝蔞實薤白

者

栝蔞實一枚

薤白半

升二錢四分

白酒七升

二合

右三味同煮取二升分溫再服

取六分服

胸痺之病喘息效唾胸背痛短氣寸口脉沉

而遲關上小緊數

栝蔞薤白半夏湯

治前方證而嘔者

夏者

栝蔞實一枚

六分

薤白三兩

九分

半夏半升

八錢

白酒一斗

三合

○東洞子曰嘗有嘔或胸腹鳴症直心痛

類聚方集覽下

○東洞子曰當有欲吐症謹案曰治温温欲吐者此本于四逆湯條實是瓜蒂症然但曰温温欲吐而已瓜蒂之功豈盡於此哉真心痛真頭痛及產後鬱胃忽暈絕者並胸痺皆主之或舌疽或結毒入眼及黃疽耳鳴又瘧疾胃蒸若一切痼疾結在上部而胸中滿者皆宜此方

右四味同煮取四升温服一升日三服同上

胸痺不得卧心痛徹背者

瓜蒂散 治温温欲吐者

瓜蒂赤小豆各一分五分

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合四分用熱湯七合匕煮作稀糜

去滓取汁和散温頓服之不吐者少少加得

快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

又大頭痛有時發者發時即服之有效。凡服瓜蒂從三分至五分不宜多服已煩更以烏羽或紙繩徐徐摩拂咽下以挑促其吐可也又曰亡血家大禁之然產後暈倒者此瘀血逆攻也改服此方病人手足云云條恐不必此方所主也戒慎蓋在此間曰吐方之賢於瓜蒂者有青橘散在詳于類聚方後編。○文蛤散說見于五苓散標注

病如挂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞅氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之○病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之○宿食在上脘當吐之

文蛤散 治渴者 文蛤五兩十錢

右一味為散以沸湯和一錢匕服湯用五合

病在陽應以汗解之反以冷水漬之若灌之

類聚方集覽下

類聚方集覽下

類聚方集覽下

類聚方集覽下

其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯百散亦可服○渴欲飲水不止者

大半夏湯 治嘔吐半夏而心下痞鞭參者

半夏二升四分錢人參三兩三分白蜜一升二分錢

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十

遍煮取二升半溫服一升餘分再服以水三合四勺

○東洞子曰外臺云嘔心下痞鞭者今從之胃反之病因急結故大便秘閉秘閉故吐逆不止若服蜜則急結愈大便通而後嘔吐得止○千金方云治胃反不受食食入即吐者

煮取六勺○胃反嘔吐者

小半夏湯 治吐而不渴者

半夏一升四分錢生姜半斤一分錢

右二味以水七升煮取一升半分溫再服以水

二合八勺○嘔家本渴渴者為欲解今反不

渴心下有支飲故也○黃疸病小便色不變

欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者

○諸嘔吐穀不得下者

類聚方集覽下

○黃疸病條恐方證不相對

○此與半夏厚朴湯同病然云咽中如有炙瘻者毒結著于咽中僅為有小異

憤憤心亂也

生姜半夏湯 治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

噦心中憤憤然無奈何者

半夏半升錢三生姜汁一升四

右二味以水三升煮半夏取二升內生姜汁

煮取一升半分四服日三夜一嘔止停

後服以水一合二勺煮半夏取

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

心中憤憤然無奈何

小半夏加茯苓湯 治小半夏湯證而眩悸茯苓

者 半夏一升一錢八分生姜半斤一錢二分茯苓

三兩四分五厘

右三味水七升煮取一升五合分溫再服水以

二合八勺○卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸

者○先瀉後嘔為水停心下此屬飲家

半夏苦酒湯 治咽中生瘡音啞半夏苦酒者

半夏十四枚五分雞子一枚去黃

類聚方集覽下

○痘瘡間有此證
半夏一錢卵一枚
醋一杯煎二三沸
少少嚙之

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者

半夏厚朴湯 治咽中如有炙轡半夏或嘔生

或心中悸茯苓者 半夏一升二錢厚朴三兩

三茯苓四兩四分生姜五兩五分乾蘘葉二兩二分

右五味以水七升煮取四升分温四服日三

○東洞子曰當有悸症又案千金作胸滿心下堅咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下案帖帖結者負宜與道方四七湯併考且其方正同又加桔梗枳實益可也又代蘇葉以蘇子尤可

或加伏龍肝可又為兼用劑

夜一服以水一合五分煮取六分○婦人咽中如有炙轡

半夏乾姜散 治乾嘔吐逆涎沫半夏者

半夏乾姜各等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半二合

煎取七合六分頓服之○乾嘔吐逆涎沫

乾姜人參半夏丸 治嘔吐干姜不止生美心

下痞人參者

乾姜人參各一兩七分半夏二兩一分

類聚方集覽下

○東洞子曰當有心下痞證或三味水煎合生薑汁服或加伏龍肝

或為無用方
此方之功專在姪
婦則姪娠一子不
可刪世醫多置姪
婦用半半夏者不
通之至也非生動
無功又曰一味半
夏末服之治此症
二陳湯亦同

右三味末之以生姜汁糊為丸如梧子大飲
服十九日三服○姪娠嘔吐不止

半夏瀉心湯 治心下痞鞭參腹中雷鳴半夏
干姜
者 半夏半升九分黃芩乾姜人參甘艸各

三兩大棗十二枚各四分
五厘黃連一兩一分
五厘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三
升溫服一升日三服以水二合煮取一合二
勺去滓再煎取六勺

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以

○半夏瀉心湯東
桐子曰嘔而腸鳴
下心下痞當作心
下痞鞭
雷鳴因水氣也

○東洞子曰嘗有
急迫症

他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖
已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而
解若心下滿而鞭痛者此為結胸也夫陷胸
湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與
之○嘔而腸鳴心下痞者

甘草瀉心湯 治前方證而心煩不得安艸者
半夏瀉心湯方內加甘艸一兩一分
五厘

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀

○狐惑病蓋狂証也此症或為烏梅圓鷓鴣菜湯症爭蝕於喉者喉痺之類蝕於陰者肛門之疾

○以上三方積聚家亦為要方

不化腹中雷鳴心下痞鞅而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞅也○狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面自乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲啞

生薑瀉心湯 治半夏瀉心湯證而嘔生薑者

半夏瀉心湯方內減乾姜二兩生薑四兩

半夏九分甘草人參大棗黃芩各四分黃連五分

乾姜各五分生薑六分

右八味煮如半夏瀉心湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞅乾噫

食臭膈下有水氣腹中雷鳴下利者

吳茱萸湯 治胸滿吳茱萸心下痞鞅人參而嘔生薑

者 吳茱萸一升八分錢人參三兩大棗十

類聚方集賢下

○按心下痞鞅嘔而胸滿腹拘急者專主之治小兒平生頻吐

白沫者

得湯反劇者宜厚
朴生姜半夏甘草
人參湯此再快方
也恐脫文
少陰病條方症不
相對此四逆湯症
乎

東洞子曰當有
吐逆証

二枚各四分 生姜六兩九分

右四味以水七升煮取二升去滓温服七合

日三服以水二合一 ○食穀欲嘔者屬陽明

也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也○

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者○乾嘔

吐涎沫頭痛者○嘔而胸滿者

厚朴生姜半夏甘草人參湯 治胸腹滿厚朴

而嘔半夏者 厚朴生姜各半斤一分

夏半升分九 人參一兩一分 甘草二兩分三

右五味以水一斗煮取三升去滓温服一升

日三服以水二合一 ○發汗後腹脹滿者

黃連湯 治心煩連心下痞人欲嘔吐

衝桂枝者 黃連甘草乾姜桂枝各三兩大棗

十二枚各四分 人參二兩分三 半夏半升分九

右七味以水一斗煮取六升去滓温服一升

日三服夜二服以水一合一 ○傷寒胸中有熱

○東洞子曰當有
心中悸心煩上逆
症

解醒

胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

乾姜黃連黃芩人參湯 治心煩黃連心下痞

鞭參吐干姜黃連者

乾姜黃連黃芩人參各二兩五分

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

以水一合八傷寒本自寒下醫復吐下之

寒格更逆吐下若食入口即吐

大建中湯 治腹中大痛膠飴嘔不能食干姜

東洞子曰此方主心中煩悸及心下痞鞭而吐下者胃反者主之也

或為發用方

吐

腹皮起如有頭足膠飴者

蜀椒二合六分乾姜四兩一分人參二兩六分

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一

升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可

飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之以水

六勺煮取八勺太津內膠飴煮取六勺

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮

起出見有頭足上下痛而不可觸近

○皮起出見者因腹中有虫也

或云此方去芍藥

良治淋家心煩而小便不利者

治痢阿膠雞卵二味微火煎為膏服之治心煩而不得眠者

○東洞子曰當有心下痞腹強急症

黃連阿膠湯

治心中悸而煩

黃連黃芩不得眠膠阿

挂者

黃連四兩

一分錢

黃芩一兩

三分芍藥

九分

二兩分

雞子黃二枚

一分

阿膠三兩

九分

右五味

以水五升先煮三物取二升去滓內

膠烱盡

少冷內雞子黃攪令相得溫服七合

日三服

以水一合半煮三物取六勺去滓內膠烱盡少冷內雞子黃攪令相得

少陰病

得之二三日以上心中煩不得臥

黃芩湯

治下利

黃芩腹拘急芍藥者

下痢加禹餘糧大有即功其他下痢藥宜加禹餘糧

黃芩三兩大棗十二枚

各九分

甘草芍藥各二

兩分

右四味以水一斗煮取一升去滓溫

服一升日再夜一服若嘔者加半夏半升生

姜三兩

以水二合煮取六勺

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩加半夏生薑湯

治本方証而嘔

生薑者

於黃芩湯方內加半夏半升生薑三兩

黃芩大棗生薑 各四分 五厘 甘州芍藥 各三分

夏 分九 右六味煮如黃芩湯

太陽與心陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者○乾嘔而下利者

六物黃芩湯 治心下痞鞭 人參乾嘔 干姜下利

黃芩 大棗 上衝 桂枝 者

黃芩人參乾姜各三兩大棗十二枚 各四分 五厘

桂枝二兩 五厘 半夏半升 分九

○東洞子曰當首心下痞鞭症

說見于小柴胡湯

右六味以水七升煮取三升分溫三服 以水

四勺煮 乾嘔下利

三物黃芩湯 治心胸苦煩者

黃芩一兩 分四 苦參二兩 分八 乾地黄四兩 分一錢 六分

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐

下虫 以水一合八勺煮取六勺

婦人在章晨自發露得風四肢苦煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但煩者

類聚方集覽下

○東洞子曰當有
心悸症一本作白
頭翁三兩

○東洞子曰雖曰
產後非唯言產後
也當以血證為準
又當有急迫症
按曰非唯言產後
者然然產後下利
者服之亦殊有効

白頭翁湯 治熱利下重白頭翁 秦皮 心悸黃連者

白頭翁二兩黃連黃柏秦皮各三兩各七分 五厘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升

不愈更服一升以水二合 勺煮取六勺

熱利下重者○下利欲飲水者以有熱故也

白頭翁加甘草阿膠湯 治前方證而有血證

阿膠急迫者

白頭翁湯方內加甘草阿膠各二兩

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡
分溫三服

白頭翁黃連黃柏秦皮各六分 甘草阿膠各四分

右六味以水一合七勺煮取六勺去

滓內膠令消服

產後下利虛極

木防已湯 治水毒心下痞鞭人煩渴者

木防已二兩六分石膏雞子大一分桂枝二兩六分

類聚方集覽下

○東洞子曰當有
煩渴症
案水病而心下痞
鞭煩渴而上逆者

或喘滿者專主之
方極文恐有脫落

○東洞子曰當有
心下悸證

分四人參四兩

右四味以水六升煮取二升分温再服

八勺者
取六勺

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其

脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已

湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈

者宜木防已湯去石膏加茯苓芒消湯主之

木防已去石膏加茯苓芒消湯治心下痞

參人

故木防已湯症而
不煩渴心下痞堅
及悸者專主之

堅泄而悸者 木防已湯方內去石膏

加茯苓四兩芒消三合

右五味以水六升煮取二升去滓內芒消再

微煎分温再服微利則愈

防已分六桂枝分四人參分各八茯苓分各八芒消一分

右五味以水一合八勺煮取六勺內芒消

令消

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其

脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈未防已
湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈
者

防已茯苓湯 治四肢聶聶動茯苓防已芍藥水氣在

皮膚黃耆防已而上衝桂枝者

防已黃耆桂枝各三兩六分茯苓六兩一錢一分甘

草二兩四分

右五味以水六升煮取二升分温三服以水一合

○聶與腠同嫩弱
小動見四肢聶聶
此水氣之變也
加米尤良

八勺煮取六勺○皮水為病四肢腫水氣在皮膚中
四肢聶聶動者

防已黃耆湯 治水病身重防已汗出惡風黃耆

生小便不利水者

防已四兩六分黃耆五兩七分五厘木生薑各三兩

大棗十四枚各四分五厘 甘州二兩三分

右六味以水六升煮取二升分温三服以水一合

八勺煮取六勺○風溼脉浮身重汗出惡風者○治

類聚方集覽下

○東洞子曰分量
煎法非古今從外
其

風濕一作風水

風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病病者但下重從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸

枳實芍藥散 治腹滿枳實芍藥或痛芍藥者

枳實芍藥各等分 右二味杵為散服

方寸匕日三服并主瘕膿以麥粥下之

產後腹痛煩滿不得卧○產後腹痛法當以

枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血

治腹痛宜生薑汁送下之
服紫圓備急大陷胸輩而不得効者宜以此方為後方乃知神且下瘀血抵當輩亦同例也

○枳朮湯東洞子曰當有小便不利症。煖日無用承氣丸尤可又曰當聞吉子時或以此方合他方以奏奇効此於吉子則可於吾輩則不可以吾之不可學吉子之可又大不可也方今安為加減作合方者有焉豈可不思焉

○東洞子曰有瘡瘻而胸腹拘滿者主之

著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

枳朮湯 治心下堅滿枳朮小便不利枳朮者

枳實七枚二錢 朮二兩六分

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中

硬即當散也以水一合煮取六勺

心下堅大如盤邊如旋杯水飲吸作

排膿散 治瘡家胸腹拘滿枳實若吐粘痰枳實或

便血雞子者

枳實十六枚一分錢芍藥六分桔梗二分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞

黃相等揉和令相得飲和服之日一服

桂枝枳實生薑湯 治胸滿枳實上逆或嘔生

者 桂枝生薑各三兩九分枳實五枚一分錢

右三味以水六升煮取三升分溫三服以水

二升煮取六升○心中痞諸逆心懸痛枳實

枳實薤白桂枝湯 治胸中痞枳實厚朴

○吞酸兼參連丸

懸如懸飲之懸

○東洞子曰當有嘔症又曰痞下脫滿字

而痛薤白者枳實四枚厚朴四兩各八分薤

白半升一分錢桂枝一兩二分枳實一枚四分

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去

滓內諸藥煮數沸分溫三服以水一合六分

取八分去滓內諸藥煮取六分

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心

枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

橘皮枳實生薑湯 治胸中痺橘皮滿實而嘔生

胸痺心中云云症若無亦使不利心下痞鞭乃人參湯主之人參湯條可併考

類聚方集覽下

主吃逆橘皮湯橘
皮竹茹湯亦皆同
案當有心下痞證

凡曰亦主之者說
具于前或為兼用
後方亦可也乎此
在入人畧已
治吞酸兼參連丸
○東洞子曰當有
心下痞證

者 橘皮一斤 二錢四分 枳實三兩 四分五厘 生姜

半斤 二錢二分

右三味以水五升煮取二升分溫再服 以水一合

五勺煮取六勺 ○胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘

艸湯主之橘枳姜湯亦主之

茯苓飲 治心下痞鞭 參入 而悸 茯苓小便不利

胸滿 枳實橘皮 而自吐宿水 生姜橘皮 者

茯苓人參朮各三兩 六分 枳實二兩 四分 橘皮一

兩半 五分 生姜四兩 八分

右六味水六升煮取二升八合分溫三服如

人行八九里進之 以水二合煮取六勺

治心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間

虛氣滿不能食消痰氣令能食

橘皮竹茹湯 治胸中痺 橘皮生姜 而吃逆 竹茹者

橘皮二斤 三錢二分 竹茹二升大棗三十枚生姜

半斤 各九分 甘艸五兩 五分 人參一兩 一分

類聚方集覽下

○吃逆一本作嘔逆

右六味以水一斗煮取三升温服一升日三

服以水二合○噦逆者

橘皮湯 治胸中痺橘皮而嘔生噦者

橘皮四兩錢二生姜半斤錢四

右二味以水七升煮取三升温服一升下咽

即愈以水一合四

乾嘔噦若手足厥者

桂枝茯苓丸 治拘攣芍藥上衝心下悸及茯苓

○桂枝茯苓丸東洞子曰當有衝逆心下悸証又曰是非唯治婦人病方也。煥曰此催生之佳方一名奪命

圓又名催生湯案此條恐有脫誤然以臆解之曰以癥瘕害于妊娠故未

及三月得漏下且

不止而胎動者有

焉或子死于腹中

者有焉或經閉而

非妊娠者有焉為

死胎乎為血塊乎

不易辨也經水始

斷後三月許經血

卻利或一月而止

者亦有焉是妊娠

而時胎受病以下

血也非經閉凡妊

娠中見血下者此

子死于腹中之徵

也或其後斷不見

經水有變牡丹挑仁或胎動桂枝芍藥者

桂枝茯苓牡丹挑仁芍藥各等分

石五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前

服一九不知加至二九

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不

止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者

前三月經水利時胎下血者後斷三月不血

也或以血不止若其癥不去故也當下其癥

血者有焉血下不
正者亦有焉此所
謂漏下不止也癥
者有塊之謂與上
癥瘕不同既為死
胎非可育且未下
而為災故以為塊
已若癥瘕則非此
方可下豈可謂當
下其癥矣死胎見
種種變證者皆主
之夫死胎者用
他攻擊劑甚不可
即促命期大可畏
哉此解雖似牽強
余屢有治驗且聞見忽畧而誤者故委悉之四方君子勿疑而擯之

○芎歸膠艾湯東洞子曰凡治吐血下血諸血證者不別男子婦人矣
煥曰血證有不別
男女者焉有不可
不別者焉此有為
而言已蓋欲救理
學之弊也
婦人每有孕二三月
月或五六月必墮
胎不育者始覺有
妊輒服此藥續服
不愈以及八九月
或終十箇月而免
不育之患者不數
○代赭石湯宜有
欲嘔証

芎歸膠艾湯 治漏下阿膠 腹中痛 芍藥者

芎藭阿膠甘艸各二兩分艾葉當歸各三兩

四分芍藥四兩分乾地黄六兩分

右七味以水五升清酒五升合煮取三升去

滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作

以水一合清酒一合煮取六分去滓內膠令消盡

婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞墮

○旋覆花代赭石湯 治心下痞噯噯氣不除

旋覆花 代赭石 甘草 旋覆花 甘艸各三兩 大棗十

二枚各四分 人參二兩分 生姜五兩七分

夏半升分 代赭石一兩分

右件七味以水一斗煮取六升去滓再煎取

三升溫服一升日三服以水二合煮取一合

○傷寒發汗若吐若下解後心下痞噯噯

氣不除者

○東洞予曰此章非疾病醫義故不取雖然赤石脂禹餘糧湯證可從于此也又云當利其小便下方脫或云脫者五苓散余謂此猪苓湯詳見于古今方考

赤石脂禹餘糧湯 治毒在臍下而利不止赤石

脂禹餘糧者 赤石脂禹餘糧各一斤一錢六分

已上二味以水六升煮取二升去滓三服水以

一合八勺 煮取六勺

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞅服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便

○赤石脂丁名桃花石 治又痢

桃花湯 治腹痛下利便膿血赤石脂者 粳米

赤石脂一斤一錢六分 乾姜一兩一錢一分 粳米一升一錢

右三味以水七升煮米令熟去滓温七合內

赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

以水二合煮取六勺 ○少陰病下利便膿血

者○少陰病二三日至四五日腹痛小便不

利下利不止便膿血者○下利便膿血者

大猪膽汁 治肛中乾燥大便澁者

○蜜皂莢末相和灌穀道中却勝於蜜煎猪膽汁法若急則用蠟油其法如蜜導且不及煎成之即用人家常用蠟挺子土瓜根末海蘿汁和為挺用之亦如蜜煎法且別服土瓜根末佳又治難產用土瓜根內產門以為導且服之皆如上法和海蘿汁

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出○陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜導煎而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導

蜜煎導主治見上蜜七合令其氣平置於合內一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀握之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如

○藥徵可考書夜昏睡數日不覺者亦間有宜此方者

○東洞子曰虛煩當作煩躁

指長二寸許當熱時急作令則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

酸棗仁湯 治煩燥酸棗仁而不得眠甘者

酸棗仁二升二錢四分甘艸一兩一分知母茯苓等

蕪各二兩二分

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥

煮取三升分溫三服以水一合六勺煮酸棗仁取一合二勺內諸藥煮

取六○虛勞虛煩不得眠

○水氣聚於心膈而腹中空虛喘咳

不得臥者主之

三日一劑可至三四劑此先服小青

龍湯一劑乃進

○上氣說見于越婢加半夏湯標

葶藶大棗瀉肺湯 治浮腫葶藶效逆喘鳴葶藶迫

塞胸滿葶藶強急大棗者

葶藶搗丸如彈丸大五分大棗十二枚錢三

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮

取一升頓服以水一合八勺先煮棗取一合

肺癰喘不得臥○肺癰胸滿脹一身面目浮

腫鼻塞涕出不聞香臭酸辛效逆上氣喘

鳴迫塞○支飲不得臥

○宜痔疾

麻子仁丸 治平日大便秘者

麻子仁二升十二兩芍藥枳實各半斤四兩大黃

一斤厚朴一尺各八兩杏仁一升六兩

右六味末之煉蜜和九梧子大飲服十九日

三以知為度○跌陽脈浮而瀉浮則胃氣強

瀉則小便難浮瀉相搏大便則堅其脾為約

已椒蘆黃丸 治腹滿大黃葶藶口乾舌燥椒目二

便澁滯大黃葶藶者

類聚方集覽下

○椒目治水氣故截瘧傷寒或以此方間為無用

防已椒目葶藶大黃各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一九

日三服稍增口中津液渴者加芒消二兩

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣

蜀漆散

治寒熱發作有時

蜀漆

而臍下有動

龍骨者

蜀漆雲母龍骨各等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢七

瘧多寒者名曰牡瘧

東洞子曰當有臍下動症發作有時因水氣之變非唯治瘧也寒熱往來似瘧狀者皆去之

○一切水氣痰飲之變胸滿心痛久咳勞熱腹脹肩背痛及脚氣或四肢痛或身體痛等痛引胸脇者皆主之或為兼用又云治水腫

十棗湯

治病氣在胸腹

芫花甘遂大戟

制痛棗大者

芫花甘遂大戟各等分

右三味等分各別搗為散以水一升半先

煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人

服一錢匕麻人服半錢溫服之平且服若下

少病不除者明日更服加半錢得快下利後

糜粥自養

以水一合二勺先煮大棗五錢取六勺內藥末一錢頓服之

天陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人

類聚方集覽下

夫有支飲家云云
條此後世稱勞飲
者已早服此藥乃
可救之

○桔梗白散東洞
子曰有結毒而濁
唾吐膿者主之或
宜為湯用之法如
走馬湯
煥曰以下三方救
急之妙不可勝而記且雖畏壓溺者皆能治之五苓散標可併考又且是

馬白散備急之三方不獨備于急卒而已諸痼癢疾結毒及廢疾之人宜
為後方以攻之如
其運用便存人人
之畧也若善達其
術則諸方為表裡
乃互相成其用再
快之妙不唯在此
方爾亦不可不知
焉夫濟世之士知
治病有前方後方
則思過半矣小建
中湯條曰腹中急
痛者先與小建中
湯不差者與小柴
胡湯不知者謂仲
景亦有所不能邪

熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇
下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未
和也○病懸飲者○飲家其脈弦為有水○
夫有支飲家效煩胸中痛者不卒死至二百
日一歲

桔梗白散 治毒在胸巴咽 吐下如膿
汁桔梗 貝母者 桔梗貝母各三分巴豆一分
右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病

在膈上者吐膿而膈下者瀉出若下多不止
飲冷水一杯則定
效而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥
臭久久吐膿寒如米粥者為肺癰○病在陽
應以汗解之反以冷水濕之若灌之其熱被
劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反
不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實
結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可

類聚方集覽下

此何似企望偶中者之為也余案此說甚非矣曰先與小建中湯先也者預設後方之言也其他設數方以速其功者不為心也因是觀之治有前後兼用方者古之道也明矣雖然前方不得其所則後方亦無効矣要之執己家之妙計但在方與症相對而已東洞翁之教人亦此耳夫登高者必自卑萬里之行必自一步飛失方證於近索味熟於

服

走馬湯 治胸腹有毒巴豆杏仁若心痛巴豆杏仁若腹

痛巴豆者 巴豆杏仁各一枚

右二味以綿纏搥令碎熱湯二合捻取白汁

飲之當下老少量之通治飛尸鬼擊病以熱湯六

勻餘如上法○中惡心痛腹脹大便不通

備急圓 治心乾姜腹大卒痛巴豆者

大黃乾姜巴豆各一兩

遠而不究自睫之謂者余謂之迷方之士豈可不思焉。桔梗白散卒中小兒驚風牙關不關者入之鼻中

右藥各須精新先擣大黃乾姜為末研巴豆內中合治一千杵用為散蜜和丸亦佳蜜器

中貯之莫令歇氣

主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹痛

卒痛如錐刺氣急口禁停尸卒死者以暖水

若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令

下咽須臾當差如未差更與二九當腹中鳴

即吐下便差若口禁亦須折齒灌之

類聚方集覽下

○加膠皮尤良
阿膠一味煎洗亦
奇
四肢身体諸痛皆
洗之有效

○為養用劑是也
大麥汁能利小便

礬石湯 治脚氣痿弱不仁上入搶心者

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

治脚氣冲心

消礬散 治一身悉黃腹脹如水狀消大便黑

消時澹礬者 消石礬石各等分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸匕日三
服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候

○黑疽腹滿者極
為難治方士勿忽
諸

○蛇床子楮木皮
礬石各等分加五
倍子少許煎洗陰
中而後內藥尤良

也○黃家日晡發熱而反惡寒此為女勞
得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱
因作黑疽其腹脹如水狀大便必黑時澹此
女勞之病非水也腹滿者難治

礬石丸 治婦人經水不利下白物者

礬石三分杏仁一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者
再內之○婦人經水閉不利藏堅癖不止中

○宜先洗陰中而後內藥法如上方又治陰中腫痛

有乾血下白物

蛇床子散 治婦人下白物陰中痒或有小瘡

者蛇床子仁

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大

綿裹內之自然温

温陰中坐藥

類聚方集覽下終

類聚方集覽誤字抄上

○本文 ○標注

○標掲元本標掲ニ誤レリ今正ス序文○挂枝湯標注元本救條ヲ脱ス今補入ス○下
 ハ下ノ誤ニテウ六行○若形如癰ノ四字○圈点有ヘシ四行○發奔豚域スルハ誤キテオ
 六行○加ハ如ノ誤六丁ウ三行七丁オ五行八丁オ二行同○贅言言ハ贅言ノ誤六丁ウ未○心ハ必ノ誤
 モ丁オ未○發熱不止以下八字○圈点有ヘシ七丁オ○方後元本方下ニ誤ル今正ス九丁ウ○
 冒狀元本冒狀ニ誤ル今正ス十丁オ○用此方其人大便硬トテオ○用之大便不硬之人日レ上
 ○眼眩元本目逆ニ誤ル今正ス日未○不暇止而攻病日ウ○相逐庭ニテオ○氣分レ○域
 ト圈点トアルヘシテウ○可称痰飲之變之一也一丁ウ一丁ウ○又手ハ又手ノ誤十三丁ウ十丁ウ
 ○四枝ハ四枚ノ誤十五丁オ○胸ノ下ニ腹字ヲ脱十丁オ○入參湯ノ上○有ヘシテウ初ノ舉
 體リテ三丁ウ六行○若冒眩ハ苦冒眩ノ誤標同又案標注冒眩ノ下再レ冒眩ノ二字ヲ加フ
 へシテウ○不見ハ可見ノ誤九丁オ九行○以飲一丁ウ九丁オ六行八味丸下並標皆同○臆脱
 ハ臆說ノ誤十三丁ウ未○半復下ニ各字ヲ脱ス十三丁オ六行○其ハ共ノ誤日ウ○僂入ハ攬入

ノ誤日以下皆同 ○兼主以下八字○圈点有ヘシ三九丁六行ノ半复上加字有ヘシ四丁才○桂
桂ハ桂枝ノ誤日未○太陽與以下十二字○圈点ヲ加ヘシ日ウ五行○黄芩ハ黄芩ノ誤日
才才六行○陽脉以下八字○圈点ヲ除クヘシ四丁ウ行○不得臥ノ臥字汗ノ誤日丁ウ行
○心胸若ノ三字四肢苦ノ誤日丁才未○四肢下ノ若字苦ノ誤日ウ行下七行同ノ難愈
者ノ下ノ與五苓散乃愈ノ六字アルヘシ五丁才初行ノ下ノ卷ノ大小承ノ下氣字ヲ脱ス
二丁四行○不鞞者ノ三字墨引ハ誤日才五行○宜桂枝湯ノ四字墨ヒキハ誤日丁ウ行○
心煩ノ下之濡ノ下元本黄芩ト有ハ誤今大黄ト作ルケウ七行ノ惡對ノ厭煩翼ノ日ノ源
心湯標ニ全瘡並ニ血淋ニ奇効有リ補入スヘシ九丁ウノ提出ハ提出ノ誤日丁ウ○瘕ハ瘕
ノ誤日丁ウノ甄ハ甄ノ誤日丁才○桂枝ハ桂枝ノ誤日丁ウ○胃氣不和ノ四字○圈点
ヲ加ヘシ才才八丁ウ三行下九丁才六行九丁才三行皆同○喜悲傷ノ十九丁ウ行ノ故藥ハ故余ノ誤日丁才
行ノ及可ハ及可ノ誤日未○一分五厘ハ七分五厘ノ誤日丁才未○脉微ハ脉微ノ誤日丁才
大行○半复ノ下半升ノ二字ヲ脱ス九丁才未ノ燥躁ハ煩躁ノ誤日○附子一兩ハ一枚ノ誤

大丁ウ行○下利ノ下脉微者ノ三字カ又ハ下文不殘カ有ヘシ日三行○服湯以下十一字
「」域スル者大誤日丁才四行○復ハ腹ノ誤日ウ三行○一方用桂ノ四字注文又桂ノ下
四兩ノ二字有ヘシ八丁才未○二九ハ二九ノ誤日ウ三行○其人以下十四字墨列有ヘシ
九丁才未ノ惡熱身重ノ一條恐クハ寫誤有シ三丁才○心下チ心中トシ鞞滿ノ下ニ若
熱痛ノ二字有ヘシ三丁才○胸ハ心煩ノ誤腹煩滿ハ胸腹滿ノ誤日三丁ウ三行○葶
藶半升元本半升ノ誤今正ス九丁才ウ六行ノ直ハ真ノ誤日丁才未○胸痺「」域ト○圈
ト有ヘシ日ウ○取ハ作ノ誤日五行ノ咽下ハ咽中ノ誤日丁四行○呕家元本吐家ノ誤日今
正ス三九丁才五行○婦人ノ二字「」域有ヘシ四丁才二行○生姜ノ上ニ加字有ヘシ四十三
丁才一行○麻米ハ糜ノ誤日丁才五行○不得眠ノ注ニ雞子黃ヲ補入スヘシ日ウ行○
四丁ハ六丁ノ誤日丁才五行○二分ハ九分ノ誤日丁ウ行○蜜導煎ハ蜜煎導ノ
誤日丁才四行○諸痼廢疾ハ諸痼難症ノ誤日丁才○既試方○分温ハ温服ノ誤日丁
四行○麻黃ハ麻仁ノ誤日丁才二行○心中温ハ心中温温日ウ行○憂ノ下傷字ヲ脱ス六丁

之行」の頭痛有熱但桂枝症而已若六七日不大便且小便不清者乃承氣症也服承氣湯則上衝得降若小便清者宜服桂枝湯の復煩者病未盡故也小柴胡湯有此例宜併觀の清便自調者謂清穀止也清穀雖止身疼痛未愈者猶宜四逆輩恐非桂枝湯症の稱陽明病者有潮熱譫語燥屎等之症是也 右四條桂枝湯標元本脫文ナリ

此書刻既成時、重ク病ヲ物モ覺エ又内ニモ出ノ一ヲ言出ス一杯モ有ケラシ依テ人々摺立仕立等ノ一取イツキ病床ニサヘ持ヨセテ見セシト病愈テ能ミシハ誤字モマアリ板ノサテ殊ニワロシサレ程ナク道方ノ經驗アル限ヲ集ラ此書ノ後編トモヲボシク仕ラキタル板ニ上ルベケレハ其ツイテニ直スベキハ直シテ誤字トテモ心有人ハ推量ニ知ベキワサレハト思ヘリニ程ノ誤字ヲアラウクトテ子弟ノ書讀見セラレハ其慙志モ捨ガタク直ニカクモノシテ集後ノ末ニセタリ

生續堂

お季賜言先生を古くは名を出
お名極く知り是之世を
由來心の御意に世而して
之女何待具そのひ及昔は
歌曰益虫を好むは加
と此則成るる事今も

可急致之或之何因以生
豈之取私一云書之何云

門人下總 大川唐之亮跋



