

徵
瘡
理
方

養浩元善校正
寛永頃?

ヤ 9

1129



79
1129

篇目

新製化毒園方論

化毒効驗

化毒禁忌

白丹砂製法

生々乳白丹砂

備急丹方

解毒湯方論



91-2059

新製化毒園方論 目録 一三

葛藤湯方論

膿淋

朱砂千金方論

新製紫金丹方論

益氣湯方

熏藥方論

敗毒散加減方論

便毒初起散法方論

不治

毒入眼目

禁忌

養浩拙者元善長父 校正

徵瘡理方



新制化毒丸

養浩拙者元善長父 校正

下疳便毒楊梅諸瘡。毒氣熾盛者。及結毒骨痛
癰漏結核諸症。宜化毒丸。初發毒氣未顯者。不

宜此方

化毒丸 新製

養浩拙者元善長父 校正

大黃 六錢 白丹砂 一錢 製見于下

右糊丸麻子大衣朱砂。每服一分八厘至貳三分。日二服重者三服。七日而止。翌日以備急丹。方見于下五分或六七分下之。下利七八行以糜粥自養。利過不止者與冷水一盞。若毒氣結於頭面而頭痛甚及耳目失職者。化毒中加真珠一錢。

化毒効驗

服化毒之後三四日口中必爛。吐臭痰穢物。或少下利。此其驗也。勿懼矣。

化毒禁忌

凡服化毒者。禁一切熱物。酒尤宜禁矣。

白丹砂方

礬石 三錢 雲母 二錢 煇硝 十錢 水銀 九錢

明礬 十二錢 綠礬 十八錢 食鹽 十五錢 枯礬 六錢

青鹽 三錢 五分

右九味研碎細末。以鹿角搗勻。以水銀磷滅
 為度。盛于俗稱五嶋土器者三枚。各掩蓋令
 氣不泄。燒已俟冷。又別以新土器。易掩蓋土
 器。以糊布封兩器合處。又以銅線如十字文
 取真鹽泥固濟。令注器底而上。以蓋器而下。
 寬之以文火燒一時所。次以武火又燒之時
 以冷水灌所下土器四周。勿令其燥。燒
 三時所。先取出一器。開之精華。耀之如霜如

針。滿映于下器者。名曰白丹砂。若未滿映再
 如前法

生之乳白丹砂

吾朋不用生之乳者。比之一呆白丹砂。其力微
 弱。且難用。病者。難。竟。麝。香。氣。者。故。矣。
 備急丹方

大黃

巴豆

干姜 各等分

右丸

解毒湯方論

服白丹砂及輕粉水銀其人眩暈將死者。互此湯矣。

解毒湯

生杏葉大 黑豆大 大黃中 甘草少

右煎服不效三日而全解其効如神

草薺湯方論

既用化毒後。宜長服此方以驅除余邪。

草薺湯



草薺大 大黃小 忍冬中

右煎服如常法。腹中有結痞者。加胡黃連菘亦。

膿淋

膿淋又名內下疳。草薺湯主之。

朱砂千金方論

肌爛赤潰者。用之傳患處。

朱砂千金方

石脂五分 黃丹一錢

右搗勻

新製紫金丹方論

年深痼疾及瘡毒太盛者。用化毒以驅大毒之
後。更可與此丸以驅余邪。又或治結毒咽中腐
爛最妙。又一切梅毒結毒。其人虛弱不堪化毒
者。漸之服少許為妙。或痼疾頭上孔穴膿水淋

治毒通年逾日梅毒結毒助骨疼痛日久不愈

溼身體羸瘦不食者。益氣湯方見于下合此丸少許

宜無用。雞卵肉亦宜食。既矣。或痼疾鼻柱腐壞。

咽中潰爛者。又宜此丸

紫金丹 新製

唐龜板三錢 石決明三錢 大黃六錢

輕粉一錢

右糊丸。衣朱砂。分為三十貼。日一或二服。宜

草薺湯無用。若覺口中少爛者。當隔五六日

魁 鼻 幼者 黃 漬 子大 骨 喉 五在

而又用也

益氣湯

白朮

當歸

升麻

柴胡

人參

陳皮

黃芪

甘草

熏菜方論

結毒諸症。其人虛弱不堪。化毒者。及一身諸微瘡。膿汁不止者。皆治之。又治結毒痛。九微瘡。癩。于頭面者。皆宜熏矣。

熏藥方

百草霜

十冬

好辰砂

五冬

真珠

六分

右三果蜜和勻。分為二十一貼。每日用三貼。先以一貼安火上。蒙被熏鼻孔。取烟宜口含。清水。

敗毒散加減方論

曰于粉毒。頭痛不食。心下妨悶者。敗毒散加石羔黃連黃芩。

敗毒散方

紫胡

桔梗

羌活

獨活

伏苓

川芎

枳殼

前胡

甘草

右煎服

便毒初起散法方論

便毒初起宜試方。若按之而不痛。其色赤者膿已成也。不豆以方矣。

便毒初起散方

川芎大

大黃中

木別子

穿山甲

五靈子各小

右煎服得下為妙。外以鹽和燒酒。另以蒼耳子末。包于布袋。以醃于酒中。頻之蒸之。

不治

結毒耳聾。目盲並不治

毒入眼目

初發毒氣欲入眼。而先腫爛者。或眼中赤脈為痛。不能視物者。急宜刺尺穴前後絡。取血為妙矣。

禁忌

黴瘡結毒。諸症宜食諸鳥獸肉油膩補血之物。蒜茄不佳。

慎禁飲酒勿食諸干魚干鳥賊干鱈魚最害。終身宜斷之矣。

寬本元年甲子三月退藏密牒寫

享和二年癸亥冬養浩元善長取校正

水藥方 吉雄考 ワアトル百七支

フツヒル五重或七重
メルリス 四支

右一日十二支目一度服四支早且晚
之三度每服拌之令茶與水調和の上
部有毒加烏賊甲五六分下部有毒
加遠久利加無幾利一分若無則以牡

是 才 十

下以忌

蛎末三分代之右服菜之時稀粥
或大麥粉以水煉之如粥之狀服菜
四麥納干胃中而後直以稀粥或
麥粉之食之而後食常飯由
菜中大便秘者服下劑一日快溲而
後吞翌日又服劑水藥不然
口中糜爛大抵口中臭氣繁之時
新上各水藥而及下劑皆吐延者



